




拔太盼亞局方製煉發蒙

写一册

洋学文庫
文庫8
C 464





拔太形亞局方製煉發蒙

交力和ヲルウツシカ異物相抱合スルノ力ヲ標示スルノ語ナリ故ニ引カト殊ナリ

引カハ和ニ是ヲアレンテレキニガスカラク上云フ同物相引接スルカヲ標スルノ語ナリ

假令諸塩分テ同質相求テ結芒スルノ智ハ皆引カニ属シ羅僂ト修見ト異質

相抱合スルカ如キハ共ニ交力ニ属ス交力物ニ随テ各強弱アリ甲ト乙ト交力乙ト丙トニ

若ラス乙ト丙トノ交力又丙ト丁トニ若カス是ナリ故ニ試ニ丙ヲ取テ甲ト乙ト相抱合セル者如

ハ甲ト乙ト自ラ散散セト丙ト新ニ抱合ス假ニ羅僂塩ノ哥兒私篤弗修見ヲ含メル者ニ

他ノ修見ヲ取テ加フルキハ忽テ哥兒私篤弗修見ヲ散散シ羅僂塩ト新ニ加フル修見ト

再ニ相抱合ス是哥兒篤弗修見ハ諸種ノ修見ノ中羅僂塩トノ交力最ニ弱ナル者

ナレハナリ○右ノ如クニ物抱合セル者ニ新ニ他ノ一物ヲ加ヘ從前ノ抱合自ラ離散ノ初ノ

一物ト新ニ加ヘ一物ト各テ交力ニ由テ再ニ相抱合スルヲ稱シテ單ニ交力ニ由ル分解ト云

フ又復交力由ノナル者アリ假ハコウトシユールアムモニアキ尋常ト稱コイルストフシエポト

アス尋常ト稱ト混和シ火上ニ置クハコウトシユールトアムモニアキト抱合及コイルストフシエ

勝保氏の蔵書



トボツトアスノ抱合共ニ自ラ散膏メウトシユールハボツトアスト新ニ抱合シコールストフ
シユールハアンモニアキト新ニ抱合スルカ如キ是ナリ此ニ由テ成ル所ノ物ハコールストフシユール
アルモニアキト之ヲ又交力ニ由ルノ分解ト云フエハウトシユールハボツトアスト交力ヲ逞ニシ

成分

和ハバタデ
一ルシユフ

一ルストフシユールハアンモニアキト交力ヲ逞ニ從前抱合共ニ自離散ス○成分凡一物
体ヲ合成セル各種ノ分子ヲ云フ成分ニ單ナルアリ又復ナルアリ假ハ純精ノ食塩ノ
成分ハウーゲトウトシユールナリ而シテウーゲハ單質ノ物ナレバウトシユールハ更ニ酸素

ト未詳ノ基素ト相合成スル所ノ者ナリ故ニ食塩成分ノ單ナル物ト復ナルモノト相
合成セル所ノ者ナリ○基素モ又一個ノ成分ナレバ可ト物体ノ基料ト給スルキ者非レハ

基素
和コロンドストフ

是ノ基素ト名ルナレバ假ハ諸種修見ハ諸單質若クハ復資ノ物質酸素ヲ得
テコレト混合ノ各種ノ修見ト成者ナリ故ニ諸種ノコールノ基素ハ即テ諸單質若

クハ復資ノ物體ハ酸素ハ則テ適イ此ニ寓舎メ可一成分ヲ成スモノナリ故ニコール
ルシユールノ基素ハ即テコールノコールニシテコールノ基素ハ則テ水トコールスト

フナリ又諸中和塩中ニ含ム羅維質土質金資ヲ以テ可基素トスルモ亦一般ノ

義ナリ○酸和ハ諸種ノ物體酸素ヲ得テ是ト相合和シ却テ毫モ修見ノ性ヲ有セザル
モノナリ酸和又多ク酸素ヲ加ヘテ變テ修見トナスヘキモノナリ即テコールスーフオ

キセイデアルセニキセイデ及砂糖ノ如キ是ナリ砂糖ハ植物
中ノ酸和ナリ又多ク酸素ヲ加フト

酸和
和コールシユール
セルトスフ

虽モ決テ修見トナスヘカラサル者ナリ諸般ノメタールオキセイデノ金素ノ如キ
是ナリ○蓋テ修見ト酸和トノ区別ハ酸素ト基素ト相合和セル機會ト基

素ノ性質ノ同シカラサルニ由ル者ノ固ヨリ可受ケル所ノ多少ニ由ル者ニ非サル
ナリ可故ハ本モ亦一個ノ酸和ナリ可酸素ヲ含フ大ニ諸般ノ修見ニ勝レリ然

レ毫モ修見ノ性ヲ見ハサス知ルヘシ酸素多キ者ハ修見トナリ酸素少キ者ハ
酸和トナルニ非サルナリ○氣素ハ諸種ノ物體多量ノ熱素ニ和メ游蕩スル物ナ

リ熱素物體ニ勝ツヘキ物體ノ分子ノ各個ノ引カヲ排披ノ自家ノ膨脹力ヲ以テ
物體ヲ展延メ已マズ若シ此時ニ方テ濃氣ノ押カ有テ是ノ壓制スルニ非サルハ物體ノ

漸ク流融ノ体止ム所ナカルヘキナリ○氣素ニ種ノ別アリ一ノ常住ノ氣素ハ
シテ不常ノ氣素ト移ス常住ノ氣素ハ常住ノ形ヲナス者ヲ人間極度

ニシテ不常ノ氣素ト移ス常住ノ氣素ハ常住ノ形ヲナス者ヲ人間極度

ニシテ不常ノ氣素ト移ス常住ノ氣素ハ常住ノ形ヲナス者ヲ人間極度

ニシテ不常ノ氣素ト移ス常住ノ氣素ハ常住ノ形ヲナス者ヲ人間極度

ニシテ不常ノ氣素ト移ス常住ノ氣素ハ常住ノ形ヲナス者ヲ人間極度

ニシテ不常ノ氣素ト移ス常住ノ氣素ハ常住ノ形ヲナス者ヲ人間極度

ニシテ不常ノ氣素ト移ス常住ノ氣素ハ常住ノ形ヲナス者ヲ人間極度

ニシテ不常ノ氣素ト移ス常住ノ氣素ハ常住ノ形ヲナス者ヲ人間極度

ニシテ不常ノ氣素ト移ス常住ノ氣素ハ常住ノ形ヲナス者ヲ人間極度

ニシテ不常ノ氣素ト移ス常住ノ氣素ハ常住ノ形ヲナス者ヲ人間極度

ニシテ不常ノ氣素ト移ス常住ノ氣素ハ常住ノ形ヲナス者ヲ人間極度

ニシテ不常ノ氣素ト移ス常住ノ氣素ハ常住ノ形ヲナス者ヲ人間極度

ニシテ不常ノ氣素ト移ス常住ノ氣素ハ常住ノ形ヲナス者ヲ人間極度

ニシテ不常ノ氣素ト移ス常住ノ氣素ハ常住ノ形ヲナス者ヲ人間極度

寒氣逢フト虽モ決メ液形ヲナス即ケヨニールストフカス酸素熱素ト云キ
ストカフス空氣熱素ト云アアールストフカス水素熱素ト云等是ナリ不常ノ氣類ハ

一度ニ熱素ヲ得テ氣形ヲ為ト虽モ寒氣若クハ押カ逢ハ再ヒ凝聚ノ液形ヲ
為スモノナリ即ケヨニールカス水素熱素アルコイルカスアルコイルトアルテラカス

和ニールカス
熱素

熱素等是ナリ○熱素ハ可質甚ク精微ニ且張カ具セシ一種ノ流体ナ

リ此物能ク諸体ニ穿透シ万物ニ弥湊シ常ニ物質ヲ排散流融セシトスル性質アリ
然レ諸体ノ分子各ニ引カ具具有箇相求リシカユニ容易ニ排散セラルニナシ

故ニ諸般ノ物体ハ此両力引カト勝カト勝方ニ隨テ可質ノ硬軟ヲ成ス者ナリ引カ大熱
素ニ勝ツハ可質モ堅硬ナリ若シ熱素稍引カニ過クレバ可質則ク

流動シ熱素尤モ旺スルハ可質則ク氣形ヲ成ス熱素ニ和合散逸ノ方アリ和

合者ハ諸物ノ体中ニ和スルモノナリ午ヲ以テ是ニ觸レシモ毫モ溫熱ノ侵ヲ覓エテ

ルモノナリ散逸ハ去ク諸物ノ体中ニ寓含スル可量自ズノ常度ニ踰ルカニ
若人コレニ觸レハ則溫熱ヲ覓或ハ是ニ他ノ冷体ヲ接スルハ則熱氣傳蜀ス者

ナリ故ニ太陽ノ光線由テ濛氣及ヒ濛氣中ノ萬物ニ分付シ人身ニ觸レテ溫

熱ヲ覓エルモノハ即ケ散逸ノ熱素ナリ又諸物ヲ燒クニ由テ氣中ニ生ズル熱

氣モ亦此ニ屬ス○和合熱素決メノ神具ヲ以テ觸知スハカラサルモノナリ即

ケ濛氣及諸種ノ此氣變テ可氣形ヲ保シメ水銀及諸種ノ流動物

和ニールカス
張力

アレテ可流シ失ハサレハル者是ナリ熱素ヲ引受スル性質諸物各ハ強弱

和ニールカス
光素

ノ差等アリ○張力ハ同体ノ分子多ク相接觸セルモノニテ綠故アツテ壓縮

セラルノ時自己ノ機軸ニ由テ再ヒ伸張スル力ヲ云フ○光素モ亦甚ク精

微ナレ流動体ナリ蓋シテ性稟未タ詳ナラス此者太陽ノ光線ニ隨テ熱

素ニ和シ太陽ノ周圍ノ諸曜ニ照射ス可諸体中ニ方テ屈折返射スルニ隨テ

諸物ノ上面ニ萬種ノ色形現登ス此者熱素ト交力甚タ密ナリ諸物ヲ

焚キ濛氣中ノ熱素散逸スルハ光素モ亦相共ニ散逸弥蔓ス此物又酸素

交力多シ膏ニ草木中ノ酸素ヲ引去ニナラス又去クガタールニユーレシ及メタ

等ニ物質誠ニ

ニールカスニユーレセルニ金素ノ修現及金素ノ酸和於テモ屢テ酸素ヲ奪却ス故ニ百類ノ諸品ハ硝

シ多ク酸素ヲ引クニ由テ変メオキセイデユト爲リ復メワキフルレユト^中初メ如
溶和混合スル^ト出ハス終ニ粉末ニ爲テ分離スルナリ<sup>〔水中メワキフエリフワール
ストフガスト^ク含^フ試ニカルバートルレユール^レフル^ク以テ彼水中^ニ加^ルキハ帶青黒
色ニメ宛モヨイゼルキ^{セシ}如キ物漸ク无底ニ沈落ス是^ハフルハ銀ト交力甚ク強キ^ニ
ニ急ケワールストフガスト^ク棄テ銀ト混合シ自ラ无底沈^マサレ^ハイテルレユール^ハ偶^シ
矢テ液中ニ溶和スルナリ<sup>〔植物ノ收蓄質中ニ混スル^ク試ニメワキフルレユール^ハイゼル
以テ液中^ニ加^フ中^ハ急ケ黒色ノ塗查^ヲ生スルハ植物ノ收蓄性ノ修見ト一分ノヨイゼル
オキセイ^レユール^ハ抱合メ沈着ス<sup>〔植物ノヨキスターク^クフル^ハメキスターク^ハ及粘稠質液中
ニ混スル^ク試ニカルバートルレユール^ハ以テ液中^ニ加^ルニ^ハ液ノ上面ニ清澄ト爲テ
无底塗查^ヲ生スルハ^ハ中^ヨキスターク^ハフ^ハ含^メ微ナリ若シ否ラヌメ^ハ液濁リテ
乳白色トナリ[〕]尋テ白塗沈降スルハ可^ハ液植物ノ粘稠質^ヲ含^ム微ナリ是^ハカル
バイテルレユール^ハクイウキ^ハノ酸素トヨキスターク^ハフ^ハ若クハ粘稠質ト抱合シテ
復液中ニ溶和スル^ト出ハス自ラ沈降スルモノナリ^{〔液中鉄質^ヲ含^ム物^ヲ試ニ}</sup></sup></sup>

可^ハ若クハ諸液計^ヲ取リ此^ニカル^ハチン^レユール^ハ加フルニ急ケ黒色ノ塗查^ヲ生スル
介中鉄質^ヲ含^ム微ナリ是^ハカル^ハチン^レユール^ハ鉄ト混^シ固^ク溶解ス^ハチン^ハ中和
塩^ト爲^ル者ナリ[〕]可^ハフ^ハウ^ハエ^ハント^ハニ^ハユール^ハニ^ハオ^ハット^ハア^ハス^ハ以テ此^ニ加^ルニ青色ノ塗查^ヲ
生スルハ鉄^ハ元^ハアル^ハノ微ナリ是^ハ始^メヨリ水中^ニ在^テ鉄^ハ溶化セル修見<sup>〔水中メワキ
ハ鉄^ハ溶和スル^ト出ハス故ニ鉄質^ヲ含^ム物^ヲフ^ハウ^ハエ^ハンド^ハレユール^ハニ^ハオ^ハット^ハア^ハス^ハノ基^ハ素^ハニ^ハオ^ハット^ハ
水^ハ中^ニハ^ハチン^ハス^ハ修見^{ナリ}ト[〕]ス^ハト^ハ共^ハ交力^ハ由テ自ラ相抱合シ鉄及^ハフ^ハウ^ハエ^ハンド^ハレユール^ハ類^ハニ^ハ可^ハ舊^ハ配^ハ失
ニ^ハ物相會シ又新^クニ結合シ溶解ス^ハチン^ハサル^ハ青色^ハノ中和塩^ト成^ル者也<sup>〔水中
ニ^ハ鉛質^ヲアル^ハセ^ハニ^ハ質^ハ及^ハ諸種^ノ金^ハ素^ハヲ含^ム物^ヲ試ニ可^ハ諸種^ノ金^ハ質^ヲ含^ム水^ハ液
ニ^ハメ^ハワキ^ハフ^ハエ^ハリ^ハス^ハワール^ハスト^ハフ^ハワール^ハレ^ハユール^ハ加^ハ諸異色^ハノ塗查^ヲ无底沈降ス即^チ鉛質
ハ黒色^ハヲ^ハメ^ハカル^ハセ^ハニ^ハハ^ハ黄色^ハヲ^ハメ^ハカル^ハ知^キ是^ハナリ[〕]是^ハメ^ハワキ^ハフ^ハエ^ハリ^ハス^ハワール^ハスト^ハフ^ハワール^ハレ^ハユール^ハ
ノメ^ハワキ^ハフル^ハト^ハ相混合シメ^ハワキ^ハフ^ハエ^ハオ^ハウ^ハテ^ハメ^ハタル^ハレ^ハ金^ハ素^ハニ^ハ硫^ハ黄^ハト^ハ爲^ルテ水^ハト^ハ分離スル^ハク
以テ可^ハニ^ハ又^ハ是^ハ加^ハニ^ハユール^ハア^ハク^ハチ^ハズ^ハワキ^ハフ^ハエ^ハリ^ハス^ハワール^ハスト^ハフ^ハワール^ハレ^ハユール^ハ以テスル^ハモ^ハ同^シ
然^レ此^ハ試法^ハ有毒^ハ金^ハ素^ハ即^チ鉛^ハノ如^キク^ハ試^ハミ^ハル^ハ最^モ佳^トス^ハ可^ハ故^ハ鉄質^ヲ含^ム物^ヲ知^キ</sup></sup>

第三
諸種燃体
及可製煉

ハ此試薬中ノウエインステーニフシヨールニ由テハフルト結合スルヲ妨ケラレハ故
ニ塗漬ヲ生スルヲ無シ「水中銅質ヲ含者ヲ試ニアルモニアキシテ加テ美碧色ヲナ
スハ銅質ヲ含シ微ナリ」是銅トアルニモニアキシテ抱合スルノ候ナリ「水中炭素ニキ
シテ含者
ヲ試ニ上ニ奉ル所ヲ用ワリテエリスワーテルストフワーテルストウ、ワーテル
ルヲ以テアルセキ
有無ヲ試ルノ外更ニ法アリ可法アルイバーレアニモニアキシテ以テ製スル
キセイデシテ液中ニ加フルニ淡緑色ノ塗生スルハアルセキヲ含者ノ微ナリ是試
薬中ノコレベルオキセイデシテ一分コアルセキト抱合シ固ノ溶化ハハカラカル物トナリ
沈降スルナリ「水中カセイゲソウト」四種塩修見ト抱合
中和塩トナルモノモナリ若クハヨウテシウト土
若クハ金質ヲ修見ト抱合
中和塩トナルモノモナリ
挾雜為ス者ヲ試ニ○亜ル哥見テ溶化スハナリ中和
塩ノ水中ニ飽和飽和ハ物多ク水液ニ溶和シ液力已ニ尽キ復溶
化スハカラカルナリスルモノニ亜ル哥見テ等分若
クハ稍多ク加ヘ急ニ攪混シ尋テ静置スルハ中和塩自ラ結晶ス是亜ル哥見
ハ水ト交力甚タ強キカニハ水急ニ亜ル哥見ト抱合シ中和塩水ヲ失ヒ必結晶
セカレテ得ヤル物ナリ「燃体是ニ猛熱ニ氣中ニ置テハ或遲或速ニ火

和
燃体

焰ヲ發シ焚燒スル者此皆名テ燃体ト云即ケ一切ノ動植物ニ屬シ動物ニ有テハ骨
山物ニ在テハ硫黃、デイヤ、マント諸金及諸種土膏等即ケ地中ノ膏脂ニテ琥珀、石脂
油ノ美ヲ云フ皆是ニ屬ス問曰燃ノ言ナニ如何曰諸種ノ物体内中ノ「エールストフ」抱合シ光素
ト熱素ト共ニ氣中ニ共ニ「エールストフ」失テ緩マニ散逸スルヲ名ケテ燃体ト云光素
散逸シ失ヘ直ニ相合スルハ光
焰ヲ發シ急ニ散逸ス是物ノ燃ニ
可起原ヲ求ムルハ物体内熱度大ニ増劇スルナリ九ニ種有一
曰他ノ方ニ焚燒セル物体内熱ニナリニ曰二固ノ物体内急ニ大ニ相摩、湯スルナリ熱度
増劇シ物体内燃ニ定級アリ唯可増劇スルヲ物体内熱素ト交力ヲノ稍酸素
ト熱素トノ交力ニ過テスルニ至シハ則テ燃ユ可故ハ熱素ノ常ニ出クハ氣形ヲ保テ火
ヲ發セカルモノハ出ク酸素ト抱合スルヲ以テナリ然レ今物体内熱ニ頻ニ氣中ノ酸素
ヲ引自ラ是ニ抱合スルハ物体内熱ニハ
酸素ヲ引自ラ是ニ抱合スルハ
素ト共ニ急ニ散逸シ光焰ヲ發シ即ケ物体内熱ニ焚燒スルナリ
物体方ニ燃ユルハ可体内ニ含蓄スル所ノ諸種單質ノ物各可配合シ出テ氣素ト為テ
飛散シ又可物體ヲ合成セル成分ノ種ナリニ随テ種々物質「ウアーテルスト」ガスニ見

硫黃成質

ト相混合ノ氣中ニ昇騰ス今諸種ノ燒体ヲ考テ左ニ示ス二種アリ曰單質ノ者
又抱合是也單質ハ即ケ世見ニ有テ尋常ノ硫黃ヲ云黃色帶黑黃色灰色ノ
數品アリ汚物雜フルノ多クニ適テ各々色ヲ異ニス抱合ハ可類甚タ多シ即ケ水
銀ト抱合セル物ハ朱砂トナリ鉄ト抱合セル者ハコイセンキーストナリアルセニツキト抱
合セルモノハフリスゲールト及コウリビダメントト成リ又コユーリストウト抱合メ修見
ノ形ヲテ更ニ諸金屬ト抱合メ諸種ノカタールトト為ル<sup>ロウハタシハ
シノ美ウ云</sup>又右ノ修
見ノ形ヲナス者諸土ト抱合メ中和塩ト成物有即ケアリユイシアールト抱合セル
中ハ明礬ナリカルキト抱合セル中ハギブストナリスワールアルト抱合セル中ハオリ
ールスパットト為ル○木炭石炭植物ナリ故ニ是レ植物ニ属ス純粹ノ木炭ハ一ノ
黒色ノ石炭ニ少許ノカルキアルト及少許ノ羅偃塩混和セル者ナリ此黒色ノ
石炭ヲ名テ炭素ト云フ木炭ヲ燒テ出レナリ炭素ハ可熱ニ時方テ酸素
ト甚シキ火カシ生テ故木炭ヲ燒キ炭素突出スル時直ニ炭素ガ分解メ炭
氣中ノ酸素ト抱合シ一種ノ炭素ト成リ此炭素ハ地ニ入ル其メ重ク人畜可

木炭

中ニ入ル即チ窒死ス火燭モ是ニ逢ハ即チ滅ス此氣又羅偃塩ト大ニ交力アリ
故ニ尋常ノ羅偃塩ハ術ヲ以テ是ヲ分解スルニ非ハ常ニ此氣ト抱合メ離レス且術ヲ以テ
既ニ是ヲ分解セル純精ノ羅偃塩ト雖モ硝子壘ニ入レ最モ固封スルニ非ハ再ヒ
此氣ヲ引テ相共ニ抱合ス何者此氣人家日夜焚リ所ノ薪炭ト人畜日夜吐リ所
ノ氣息ヨリ出テ濛氣中ニ充盈スレハリ此氣又水ニ逢フハ忽チ吸收セラレ此氣
ト飽和スル所ノ水ハ^地トセリ及^同フ^温ニ出リ^泉ト^ル如レ此氣右ノ如
ク水ト抱合スト雖モ^水水若シ火ニ由テ煮沸シ若クハ寒氣ニ逢テ水ヲ結フハ忽
チ水ヲ出テ飛散ス冬日溝瀆中氷下氣球ヲ胎スルハ即チ此氣ナリ炭素灼熱
スル^中方テ又出ク水ヲ分解ス可故ハ炭素方ニ灼熱スル^中方テ忽チ水ニ觸レ
ハ即チ水質ノ酸素ヲ引キ是ト抱合ヒ上ニ云所ノ一種ノ氣类トナリ濛氣中飛
散シ此氣一分ハ是ト同時ニ散逸スル所ノワートルストフガスハ混和メ相共ニ并騰ス○因
ホリユ^スハ箇植物ノ中ニ於テ是ヲ見ル^ヲアリト雖モ動物ノ体中ニ最多ク^コヲ含
ム且^コヲ採ル者專ラ動物ニ於テ^ヲ獲ルカユヘニ^ニ覓者此者^ヲ動物ニ属セ^ル自性ハ此

剥私剥律私

物も亦酸素と交力甚し故に其ノ酸素ヲ分解ノ常ニ可中ノ酸素ト抱合ス大に可

抱合ス其ノ漸余ナリ故に熱素ノ散逸スルヲ知ヘカラス 酸素と熱素と相共ニ散逸ス故に宜ク光熱ヲ察ス

熱素生ス 光素ハ明ニ在テハ見ルハカラスト雖モ暗中ニ在テハ甚明ナリ可察ス其ノ所ニ

息及呼吸ノ窒塞スヘキ熱素ハ即チホスホーリシユールニテ気中ノコレルストーフヲ

失テ散逸セル熱素ト抱合メ蒸散スルナリ此者ヲ強ク摩擦シ稍熱素ヲ生スルハ

則大ニ爆音ヲ生シ光熱ヲ榮メ焚焼シ全ク衰メホスホーリシユールトナリ此時多量

光熱素散逸ス此物ヨリ少許ノ亜的児ヲ以溶化スルニ亜的児既ニ此物ト混

スルハ則チ暗中ヲ照スヲ得○スホーリエリスワイデルストフワイテルニ製法アリ

フヨルドニイゼレ一ツ （註）製法鉄屑一ツヲ硫酸半ツヲ在ニ味細混合シ其ニ内ニ精密ニ下ロシテ

緑岩油 （加） 倍者古ニ果先スホーリエリスワイゼレニテ硝子燭ニ内ニ是ニ緑岩油ヲ注シ

燭口ニ曲官ヲ接シ曲官ハ諸種ノ気素ヲ另ニ下ロシテリユクトハツト （名）名氣素ノ製法ニ關

スルニ是ヲ設ケ可上ニ硝子燭ニ水ヲ満タルヲ倒置シ上ノ曲官ノ末半ニ下ロシテリユク

トハツトノ水中ニ挿入シ下ロシメ倒置セル硝子燭口ニ向ハシテ斯ノ如クスルハ始ニ某

料ヲ盛レル硝子燭ヨリ一種ノ気素升騰シ曲官ニ傳ヘ水ヲ透テ徐ニ下リテリユ

クトハツトノ上ニ倒置セル硝子燭中ニ聚リ硝子燭中ニ貯ラル所ノ淨水自ラコレト交

代ス可水漸ク漏泄スミカニテ減スルニ至リ硝子燭ヲ以テコレリユクトハツトノ水中ニ

ニ於テ硝子燭 （倒置セル硝子燭也） ノ口ニ固挿シ水ヨリ出シ頻リニ振盪シ水トミカニテ精密

混和セル是ガヴロードワイテルストフワイテルナリ乃チ是ヲ取テ他ノ小ナル硝子燭ニ

移シ固封シ貯フ但ニ振盪スル間微ニ硝子燭ヲ緩メ外氣ヲ納メ硝子燭中ニ生スル所

ノ真空ヲ填メシム否ナレド硝子燭自ラ破裂ス○右ノ製造間鉄ニ由テ水質

ヲ分解シ水中ノ酸素鉄ト抱合シ鉄モ亦是カガニ酸和ナリ然レテ綠岩油中ニ

溶化ス先ツ酸和ナリ水トミカニテ修見ニ由セル （註）修見ニ由セル 水中ノ水素 （酸素ヲ失テ散逸） 忽チ熱素及一分ノ硫

黃ト抱合 （硫黃ヲニテ修見ニ由テ修見ニ由テ） ゲズワイフェルドワイテルストフカスナリ曲官ニ由テコレ

リユクトハツトニ傳ヘ水ヲ透テ上湧シ倒置セル硝子燭中ニ會聚シ可後振盪ノ由テ

終ニ水ト混合スルモノナリ硝子燭中ニ真空ヲ生スル所以是ヲ振盪スルニ由テ可ス

盡ク水中ニ溶化シ更ニ他ノ氣ノ可後ヲ填充スル者ナレハ也硝子燭破裂スル所以

ボウクスシユール○コールストフエール○アルセニキシユール○コハミウムシユール○ウーテルボードシユール
○チユグスデーシユール○動物ニ属スルモノ可数ハ○オスホールシユール○メルキシユール○メルキツウケ
ルシユール○ミイレシユール○ヘットシユール○アラーフウエンドシユール○リユパセシユール○ドラース
チーシユール○各種ノ修見普通ノ性アリ可一コレヲ舌上ニ置ク時ハ多少刺戟スルノ呈ア
リ可ニ青色ナル植物ノ生計ニ加ヘル青色忽チ赤色トナル可三是ヲ羅僣塩若クハ羅
僣塩トシ加フル中ハ自ラ沸騰シ金素ヲ加フルニ由リ結晶ノ中和塩トナル可四火ヲ以テ焚クヘカラ
ス出ク多ク水ニ溶化ス○修見羅僣塩若クハ羅僣塩トシ加ヘ沸騰スルト是ニ金素
ヲ加ヘテ沸騰スルト可理全ク異ナリ○羅僣塩若クハ羅僣塩トシ加ヘテ沸騰スルトハ羅僣
塩羅僣塩トシ中ノコールストフエール熱素ヲ抱合メ気形ヲナシ液中ヨリ逸散スル者
ナリ可故ニ尋常ノ羅僣塩同土中ニ必スコールストフエールヲ含メリコールストウシユ
ールハ一切ノ修見ノ中可性尤モ弱シ故ニコレニ他ノ修見ヲ注クハ勿レケ塩中ヨリ駆出
セラレテ自己ノ交力ヨリ熱素ヲ抱合メ気中ニ飛散スルナリ○修見ニ金素ヲ加ヘテ発ル
所ノ沸騰ハ全ク吾ノ理ト異ナリ可故ニ金素ノ修見中ニ溶和スルハ必ス先ツ酸素ヲ

得テ酸和トナルニ非サレハ溶化スルコト得ス故ニ金素ヲ以テ修見ニ投スルハ修見中ノ酸
素ヲ吸収ス先ツ是ト抱合メ酸和トナル此ニ於テ修見ノ基素ヲ失テ自持スルコト出
ス直ニ熱素ヲ抱合シテ液中ヨリ逸出ス此時沸騰ヲ發スルナリ然レ修見ノ基素ハ
酸素トノ交力水ノ基素即ケト酸素トノ交力ニ勝ルハ中ハ加フル所ノ金素ニ由テ先
ツ修見ト混和セル水質ノ酸素ヲ吸収ス是ト抱合シテ酸和ト成ル此ニ於テ水ノ基素
忽チ酸素ヲ失テ散逸シ熱素ヲ抱合メ液中ヨリ逸出ス是ヲ沸騰スル所以ナリ
○右ノ二種ノ中初者ハ銀若クハ水銀ヲ以テ硝石精ニ投スルカ如キ是ナリ銀
若クハ水銀ヲ以テ硝石精ニ投スルハ硝石精忽チ可酸素ヲ奪ハレバハベテ
リフオキセイデ即ケト硝石精ノ基素ナリ自ラ逸散シ液中ヨリ逸出ス後ノ者ニ於テハ
鉄屑若クハ亜鉛屑ヲ以テ緑礬精ロフバニシ中ニ投シ發ル所ノ沸騰ノ如キ是
ナリ是鉄若クハ亜鉛先ツ水質ノ酸素ヲ引キ是ト抱合メ水素忽チ散逸シ熱
素ト抱合メ液中ヨリ外騰ス水素若クハ酸素ハ○中和塩ニ種アリ一クオキセイ
チヘリフトトニニクエウテシウレト泥フオキセイチヘリウレハ修見ト羅僣塩ト偏勝

ニ過キ第三級酸和トス^{第三級ハ等一級ニ勝リ}製法^{各物考}見ユ名^{此修見ハ一坊ノ修}

見ノ中^{最モ峻カニ}修見ノ名種ノ基素ト抱合セル者ヲ^{驅逐ノ自ラ可基素}

ト抱合スルナリ^{故ニ他ノ修見ノ名種ノ基素ト抱合セルモノヲ分解セントスル中ハ必此修}

見ノ用ユ此修見諸種ノ燃体ニ觸ル中ハ必ス多クノ酸素ヲ失ヒ多クノ^{スロウヘリ}

曇暗トナル^{酸素失フヲ少キ時ハ茶褐色トナリ多キ時ハ終ニ黑色トナリ}○諸腫

ノ金素先^{ウ多クノ酸素ヲ得テ酸和トナリ非サレバ平常ノ温暖気中ニ於テ}

緑蓉油ノ純精ナルモノヲ以テ溶化スル^{トキハス銀及水銀ハ多量ノ緑蓉油中ニ}

投シ火ニ上セ沸スルニ至ル^{則テ溶化ス此時スロウヘリフシユールガス}多ク升騰ス是

緑蓉油多ク^{酸素ヲ失フ由テ一カハ變メスロウヘリフシユールトナリ此スロウヘリ}

フシユール^{我濃氣ノ暖氣中ニ在テハ他物ニ和スルニ非サレバ氣化シ免ル^{トキハ}}

水ヲ和ス^{後溶化スル^{トキハ}得ヘシ是鉄及亜鉛先^{ウ水中ノ酸素ヲ引テ酸和}}

剪淨緑蓉油^{ナリ尋テ緑蓉油中ニ溶化スルナリ故ニ多量ノ^{スロウヘリ}テリス^{トフカ}送散ス○緑蓉油}

ヲ剪淨スルニ長頸ノ硝子壺ヲ用ユ^{所以ハ緑蓉油ヲ損失セザラシカ^{ナリ}何者短}

頸ノ硝子壺ヲ用ユ^{中ハ可水氣已ニ尽ル時ニ方テ緑蓉油從テ騰出シ急ニ靜}

止^{スハカラサレハナリ}○剪淨緑蓉油唯油中ニ混和セル水氣ヲ蒸散メ^{油性ヲノ銳烈^{ナリ}シムル}

者^{ナリ}再^餾方ハ則テ^ス常ニ水氣ヲ蒸散スルニ^{テラス}又^キ油中ニ混濁セル鉛質

及自挾雜スル^{所ノ者ハ盡ク}是ヲ淨除シ^{最モ純粹ナル油ヲ得ルナリ}可故ハ水氣ハ尽ク

最初接スル^{所ノ最餾壺ニ滴シ油ハ尽ク}後ニ接スル^{所ノ最餾壺ニ滴シ鉛質等諸}

種ノ挾雜物ハ皆列^{萬見}底ニ止ス^{ナリ}問曰緑蓉精ヲ製スル^{時ニハ}緑蓉油ニ

水ヲ加フ^{ハ直ニ熱氣ヲ生スル^{何ノ故}曰緑蓉油ハ熱素ト交力多シ故ニ^{質中}常ニ}

熱素ヲ含ム^{タル}今新ニ水ヲ加フレ^{カユニ}交力頗ニ衰^{衰ノ熱素漸ク解散ノ衝}

奈^ス此時熱氣ヲ生スルナリ○^奈烟硝石精ハ^{山物中ノ未成ノ修見ニ和}蘭是^{ナリ}

バイテリフシユール^{ト云フ}ナルバイテリ^{オキセイデ}酸素ト抱合メ^{等ニ級ノ酸化ヲ為ス者ヲ}

酸化^{ハ即チ}修見^{アリ}タルニ^此ナルバイテリ^{オキセイデ}本ト^{單質ノ者ニ非ス}ス^キスト^{フト}酸素ト

再
精製緑蓉油

剪淨緑蓉油

緑蓉精

奈烟硝石精

硝石精
(五)セー

抱合ノ等ニ級ノ酸和ヲ為ス者ナリ此故ニ硝石精及発烟硝石精ノ基素ハ元素ニケ
ツキストフナリ志ハスツキストフハ先ツ今ノ酸素ヲ得テ酸和トナルニ非サレハ多量ノ酸
素アリ是ト抱合メ硝石精及発烟硝石精トナルト云ハス故ニ今此酸和即チ「カルヘイ
」ヲ以テカリニ硝石精及発烟硝石精ノ基素トス○発烟硝石精ヲ製造スルノ間硝石
ニ注ク所ノ緑若油直ニ硝石中ノ「ボリトアスト」抱合レカリ「セー」ルヲ硝石質中
ヨリ駆逐ス此ニ於テ硝石精氣中ノ熱素ト抱合レテ氣形ヲナレ列馬見馬ノ口ニ衝逸
ス然レ此間熱氣甚シキ故ニ基素「スル」ト酸素ト固ク保持スルト云ハス熱素由テ
酸素ノ一分ヲ奪ハレ熱素ト酸素ト「カルヘイ」テリ「セー」ル「カルヘイ」テリ「セー」ル
精トナレ此物列馬見馬ノ口ヲ出ルニ及ビ漸ク熱素ヲ失セ一分ハ已ニ液形ヲナレ等
一個ノ基素餉場中ニ滴瀝ス然レ「セー」未タ熱素ヲ失ハカル部ハ液形ヲナス「セー」出ハ
ス第ニ等三ノ基素餉場ニ至リ「セー」中貯アル所ノ水ト混合ス硝石精ト発烟硝石精
ノ製造ノ已另ハ用ニル所ノ火度ノ強弱ト緑若油ニ水ヲ加フルト否ナルトニ係リ硝石精
ヲ用ニ緑若油ニ水ヲ加フ発烟硝石精
烈火ヲ用ニ緑若油ニ水ヲ加フ
発烟硝石精ノ烈火ヲ用ニ且緑若油ニ水ヲ加フ「セー」

精中一分ノ酸素ノ為ニ奪ビ未成ノ修見ト成硝石精ノ「セー」及「セー」故ニ熱素甚シ「セー」速ニ冷テ
凝餉シ毫モ酸素ヲ失ハカルニ「セー」基素餉場ニ落テ成満ノ修見トナル硝石精ヲ製スルニ
ナレ「セー」ス「セー」ニ「セー」用ニ「セー」ナレ「セー」硝石精ヲ製スルノ間緑若油硝石中ノ「セー」
ト「セー」ト抱合レ硝石精ヲ駆出スル「セー」発烟硝石精ヲ製スルノ時ト異ナル「セー」ナレ此特
硝石精直ニ水ノ蒸氣ト混合シ列馬見馬ノ口頭ニ放テ速ニ熱氣ヲ失ヒ水ト共ニ露
珠ヲナレ「セー」ノ基素餉場中ニ滴ス○硝石精ヲ製スルニ「セー」用ニ熱素ノ為ニ酸素ヲ奪
ハレ「セー」所以熱氣若シ甚シ「セー」中ノ精中ノ基素ト酸素ト「セー」ノ交力大ニ熱素ト酸素
ノ交力ニ勝レ「セー」故ニ此精ヲ製スルニ終リニ「セー」火力若シ稍「セー」度ニ過ル「セー」
餉場ノ精中ニ「セー」此「セー」ノ烟ニ「セー」現ス是精中ノ酸素熱素ニ由テ「セー」可「セー」
奪ハレ発烟精トナリ「セー」基素餉場中ニ入リ「セー」未ル「セー」故ニ「セー」基素餉場中若シ微ニ此烟
氣ヲ生セバ製シ終ルノ後「セー」基素餉場中微温ノ砂火ト「セー」安シ「セー」烟ニ「セー」蒸散
シ「セー」精澄明トナレ「セー」至リ固封シ貯フ「セー」硝石精ヲ製スルニ終レ後「セー」ナル「セー」
ニル「セー」ノ溶液「セー」水ニ溶化スル「セー」滴シ「セー」精勿ニ「セー」濁スル「セー」可精中緑若油ヲ含

多酸海塩精

ノ徴ナリ 硝石精ヲ割るハ開トトシ中ノ緑岩油多ク故ニ緑岩油ト銀ト交カハ銀ト硝石精
ノ交カハ勝サルニ緑岩油出ル硝石精中ニ溶化セシ銀ト抱合ノ固質ノ中和塩トナリ鬼ノ底
ニ沈着スルナリ故ニ徐ニミカレバイテリニユルニシテ溶液ノ滴シテ精全リ濁ワレト至リ静
定メ空脚ヲ去リ中ハ則ケ純粋ノ硝石精トナレ○多酸海塩精ニ未詳ノ基素ト抱合シテ
成ル所者ナリ丁製造ノ間緑岩油海塩中ノコソウダ^{海塩ノ基素ト}抱合メ海塩精ノ海
塩ノ質中ヨリ配出ス此ニ於テ水^{緑岩油中ニ混合スル}ト海塩精ト抱合シ更ニ熱素ト抱合シ元形
ヲナレ列馬見馬ノ頭ニ升^騰シ此ニ熱素ヲ失ヒ滴瀝トナリ其餾^餾中ニ餾下ス
可一分水ト抱合セサル者ハ滴瀝トナリ出ハス元形ノミテ第三ノ塩中ニ至リ丁
内貯フル所ノ水ニ由テ吸收セラル合メ精液トナリ列馬見馬ノ底ニ残ル者ハ列マールニ
トシテグト剩餘ノ緑岩油ナリ多酸海塩精ハ水ヲ加フルハ熱ヲ登ス^{名物考案ノ所ニ海塩精ニ局方ナリ}
是亦水ヲ加フルニ由テ修見^テ熱素トノ交カ減衰シ一分ノ熱素散逸ノ熱素
ス此ニ於テ熱ヲ登ス○製法海塩^{三分アリ}ニステインステインオキセイデ^{天造者細末一分右ニ味精}
細混和シ硝子ノ列馬見馬ノ内ニ淨製緑岩油^{水四分}一分半ヲ注ギ列馬見馬ノ

多酸海塩精

ルフセリニ三三個若クハ四個ヲ接ス^{此硝子塩ノ内ニ各蓋ニ蓋水ヲ以テリニ各ノニ}右ノ如クニ列馬見馬
ノ砂火上ニ安シ文バツテ是ノ熱素^{蒸餾}ス斯ノ如クマルハコアルニユールトウトシテ^{多酸}
精 氣形ヲ為ノ夥シク各個ノ硝子塩中ニ入来リ水中ニ溶化ス乃ケ集メ取り一個ノ硝
子塩ニ充テ固封メ暗室ノ冷処ニ貯フ此精上ニ記スルガズワールドワールステインステイン
ルノ製法ヲ以テ是ヲ製スルモ亦見メ簡易ニ良ナリ○右ノ製造ノ間緑岩油海塩ノ
質ヲ分解シテ基素ヲ奪ハレト抱合シ^{基素}カウトニ^{即ケ}海^海ヲ^海配^配逐^逐ス此時ナリ
トシテ直ニ水^{初ノ緑岩油}抱合シテ強キ交カニ由ラブリユースターニオキセイデ^ン分解メ
可酸素許マタ奪ヒテト抱合ス此ニ於テ一分ノブリユースターニオキセイデ^ン海塩精中
ニ溶化シカウトニユールブリユースターニ^ニ変シテ餘ノ海塩精ハヨリユースターニオキセイ
イデヨリ取りタル酸素ト合シ^{多酸}オール^{海塩精}ニ^トナリ^ト氣形ヲ為メアルフセフレス
ルトニ接續セ^ノ中ニ入来ル若シ^カワリヘリ^フワーデ^ルステ^ンフワーテル^ヲ製法ヲ以テコレヲセイ^スルハナリ
掉^ノミ^スト^水ト相和セシムルハ^法スワーヘリ^フワーテル^ニ多酸海塩精^ノ性大ニ尋常海塩精^ニ
異ナリ此精黃金ヲ熔解スル^コトニシ^フワーテル^ニ固^ニナル^トナレ^ル若シ此精ヲ晴明

コーニングスワート
ス
ガルヘイテルウトル
ル

ノ処置ウチ光素由テ可酸素ヲ奪ハレ尋常ノ海塩精トナリ故。須ク之ヲ貯
中ニ貯フヘシ此精水ト交力甚タ微ナリ假ト振掉ノキリ混和スト是ハ静定
スル中ハ自ラ分解ス故ニ是ヲ貯ル者宜ク場中ニ光置セシメ且固ク密封スヘキ
ナリ此精他質ニ混合スルニ非サレバ氣形トナリテ飛散スルヲ尋常ノ海塩精ノ
如シ此精諸種ノ氣類ノ中最モ肺ニ害アリトス諸種ノ物体ノ此精中ニ浸スル
ハ可ナリ直ニ色ヲ失ヒ白色トナリ或ハ硫黄用スルハ炭末ヲ取テ此精中ニ投スル
則ハ急ケ指ヲ奪スルコトナリユルコトホホホレシユルコトコトリストフシユルコトナリ
製法硝石精ニ海塩精四分右ニ混混合シテ長頸ノ硝子タニ内レテ封シ是ヲ冷
水中ニ安シ愈々冷ナル静定スルヲ兩日他ノ硝子場ニ移シ暗室ノ冷処ニ固封シ貯フ布
製造ノ間海塩精可強キ交力ニ由テ硝子精中ノ酸素ノ多分ヲ奪シ
自ラ多酸海塩精トナリ此ニ放テ硝石精可酸素ヲ失ヒ一分ハサヘイテリフオキセイデ
トナリ一分ハ癸烟硝石精トナリコオキセイデハ氣形トナリ飛散シ癸烟硝石精ト多酸海
塩精ト混和ス此物即ケコーニングスワートルナリ故ニ癸烟硝石精ト多酸海塩精ト相合

ボラノスレ
蓬岩塩
セイ色

メ成所ノ者也○此修見出ク生黃金^{酸和}ヲ溶化ス是先ツ有餘酸素ヲ以テ金質
ノ酸和トナレ次ニ修見ノ以テ是ヲ溶化スル者ナリ此他一切ノ修見共ニ酸素之ナリ
此ニ及フナレ唯多酸海塩精ノミ稍ニ此ニ近シト故ニ亦出ク黃金ヲ溶化スル性質アリ
或ハ酸素饒多ナル修見アリト虽モ基素ト酸素ト甚タ固ク抱合メ分離スヘラサル
故ニ他物ヲ酸和トナスコト出ハス^{緑岩油}
蓬岩塩^{酸素}未詳ノ基素ト抱合メ成レ所ノ山物中成満ノ修見也通常多クハ
ラ抱合メ蓬砂是ナリ或ハ清瀦セリ湖水中ニ散満セル者アリコトアイレリル人曾テ
伊太里亞国ノセルシアイ^{湖ノ水半}コトニテ試テ蓬砂塩九十四ルヲ得タリ
蓬岩塩製造ノ間緑岩油蓬砂中ノコトウダ^{蓬砂ノ基素}ト甚キ交力ヲ以テ抱合メ
ラクスレユルヲ駢出ス此ニ放テ新ニ純粋ノコトウダスレユル^{基素ヲ失トコトハハフルシユ}
ルワトトラ生ス此ニ物共ニ液中ニ汁ニ遊漾ストイハレコトウダスレユルハコトウダフルシユルニ
此スレバ水液ニ和シ難シ故ニ是ヲ冷ス中ハコトウダスレユルハ先ツ鱗状ノヲ結芒シコトウ
フシユルハ尚液形ニ結芒セズ此時可結芒セル者ヲ聚メ取り餘液ヲ火ニ上セ蒸

アセチンエーテル

蒸餾醋

盆

アセチンエーテル
醋精

名物考所載醋精
醋ニ同シセイ色

熱シ更ニ冷メ結晶セシ者ヲ取り斯ノ如ク数ハスルハ終ニ多量ノボラクスエーテルヲ得ナリ

○蒸餾醋ハ水炭ニ素酸素ヲ抱合メ成ル所ノ植物中未成ノ修見ナリ故ニ是ヲア
 セインフエーテルト謂フ酸素未成ノ修見是ヲ製スル者或ハ蒲桃酒ヲ酸化セシメテ是ヲ造リ或諸
 種ノ植物ノ生汁ノ泡釀スヘキモノヲ取り先ツ是ヲ泡釀セシメ水炭ニ素已ニ分ノ酸素
 含ム液トナル是ヲ濃氣ニ晒シ多ク濃氣中ノ酸素ヲ吸収セシメテ後蒸餾シテ液中
 ニ混和セル粘質ヲ除去ス是レ即チ蒸餾醋ナリ○醋精ヲ製造スル間アセチンフ
 エーテル鹽蓬塩日ト抱合メテ質中ノコイルストフエーテルヲ驅出ステ後水気ヲ蒸散
 ノ緑茶油ヲ注ク故ニ緑茶油又アセチンフエーテルヲ自ラ鹽蓬塩日ト抱合メアセチンフ
 ストフエーテルヲ驅出シ緑茶油又アセチンフエーテルヲ驅出ス是レ即チ鹽蓬塩日ト抱合メアセチンフ
 アセチンフエーテル此ニ於テ大ニ可水気ヲ脱シテアセチンフエーテルトシテ炭素ヲ失ヒ鋭烈ナリ
 此ニ於テアセチンフエーテル直チニ熱素ト抱合メ氣形ヲ為メ升騰ス且此熱度ニ於テ
 ハアセチンフエーテル中ノ炭素復固ク保持スルヲ出ハス可一介アセチンフエーテルヲ肉レ
 テ半ハ熱素ト合メコイルストフエーテルヲ脱シテ半ハ逸ノコイルストフエーテル中ニ止ル此至
 テアセチンフエーテル甚タ鋭烈ニ變メアセチンフエーテルナリ蒸餾タンニ入り熱素ヲ

失ヒ液形ヲ為ス滴瀝ス列馬見ニ止ル者ハアセチンフエーテルウダト此ニノ炭素ナリ

○醋精ト蒸餾醋トノ区別諸家論スル所ニテラス或曰蒸餾醋本ト多ク酸素ヲ食

故ニモク醋精トナル是ヲ以テ本ト另物ニ非ラス又曰醋精ハ唯蒸餾醋中ノ水気ヲ脱

失スルヲ多クシテ更ニ他ノ区別ナシ蒸餾醋本ヨリ成満ノ修見ニ更ニ酸素ヲ増

加スヘキノ理ナレト右ノ諸説適從シ難シ醋精ハ多ク水気ヲ脱失スルハ固ヨリ言

フ俟スノ明ナリ唯醋精ハ蒸餾醋未成ノ修見ヨリ出テ却テ成満ノ修見トナル所以

可製煉ノ間多ク炭素ヲ失テ酸素ノ量見大ニ是ニ勝ツヲ以テ新ニ他ノ酸素ヲ

ワエインステラエーテル
酸素ノ量自ラ是ニ勝
此炭素ノ減スル故ニ

純精酒石
セイ色

此物炭水ニ素酸素ヲ得テ酸和シ植物中未成ノ修見トナル可酸性アルエーテル

シエーリングエーテルヨリ微弱ナリ○此製造ノ間酒石中央中ノ修見酒石中央ノ修見

結晶土ト抱合シワエインステラエーテルナルキトナリ器底ニ沈降ス此時酒石中央ノ修

見ニ由テ結晶土中ヨリ驅出スル所ノコイルストフエーテルハ直チニ熱素ト抱合メ氣形ヲ為シ

液中ヨリ沸漏ノ形散レワエインステラエーテルホットアス即チ蒸餾酒石ナリ由テ有餘ノ修見ヲ奪ハル故ニ今更ニ蒸餾酒石

琥珀鹽

〔五セー〕

剥私剥兒修兒
おスホル

此物植物中成満ノ修見ナリ琥珀本ト山物ナルカ故ニ此物モ亦古来諸家は山物
 中ノ修見ト以テ為リ然レ今明ニ此修見ノ質ヲ檢査スルニ全ク植物中ノ修見ヨリ他ナレシ
 故ニ此修見成分ヲ另テハ「コレストフェロール」「フーリストッヒ」「ワテリス」トフカス及炭素トナリ
 基素ハ即ケ水炭ニ素テ全ク上ノ醋精兩石炭安息香花等ノ如シ此修見ヲ製造スル
 間猛熱焚燒スルキニ方テ琥珀成分自ラ分解シハ然油トナリ一水トナリ一修
 兒トナリ共ニ熱素ト抱合ノ気形トナリ并騰シテ熱素ヲ失フニ及ニテ油ト水トハ液形ト
 為テ氣餾場中ニ餾瀘レ修見ハ鮮美ニ羽毛狀ノ芒刺トナリ「コイトル」ト及「氣
 餾」ノ類ニ着ク此芒刺ヲナス者即ケ琥珀鹽ナリ製煉元ニ終リ中ハ黒色ニテ光彩
 アル炭狀ノ物ロトリトノ底ニ殘ル○製法骨灰（獸骨ノ尚氣スル者ノ四比水ニ貫三
 百四錢鏡列綠岩油ニ百八錢）右先ク骨灰ヲ錫鍋ソ内レ綠岩油ト水ト合シタル
 者ヲ取テ徐ニ此ニ注キ火ニ上セキヲ止メス攪混シ煮ル一時間ヲ火ソ下ニ靜定シ
 澄滓皆沈ミ上清全ク澄明ナル候ニテ液ヲ傾ケ取り澄滓ニ屢々水ヲ注
 テ洗濁テ液ヲ絞リ（搾器ニ内レ攪初ノ清液ト合シ紙ニテ瀘シ先ク錫鍋ニ内テ硝
 子鉢ニ寫シ火ニ上テ過多ノ水氣ヲ蒸散シ液ノ量ニ百八十ハ或トナリ）此間白色ノ澄
 至ト品毛白直生ノ尚止マサルハ其ノ尚蒸散ス
 白色ノ澄末絶テ生セサルニ至リ委ク之ヲ抄ミ去
 リ可液ニ硝砂精ヲ滴加スルハ再澄渣ヲ生ス又紙ヲ以テ是ヲ瀘シ清液ヲ磁鍋ニ
 内レ尽ク水氣ヲ蒸散シ直ニ硝子ヲ列寫見寫若クハ磁瓶ニ寫シ更ニ烈火ニ上セテ
 質流動スルニ至リ尚少時火ニ上置キ可後火ヲ下シ冷ヘテ後器ヲ破テ見レハ明潔
 ニシテ硝子質ノ物アリ是即ケ「おスホル」修見ナリ之ニ六倍ノ水ヲ加エ蒸餾
 固封シ貯フ○此者おスホルト同ク植物及山物中ニ存テ之アルヲ見ルコトアリ
 ト虽ニ動物ノ体中ニモ多ク是有ヲ以テ古来是ヲ動物中ノ「コイトル」ニ屬ス此物
 製煉中初メ先ツ綠岩油骨灰中ノ「コイトル」ヲ抱合シ（骨質ハ本ト揮發炭及炭
 スルハ揮發炭ニ素共ニ飛散ス灰中ニ止マリ「おスホル」ニユルハ驅逐セラレテ直ニ水中ニ溶化ス可
 所ノモノハおスホルニユルコトナレバ「おスホル」ニユルモノナリ）骨質ハ本ト揮發炭及炭
 靜定シ沈ム所ノ澄滓ハ綠岩油ト「コイトル」ヲ抱合メ「コイトル」ヲフルニユルカキトナリテ
 凝結スル者ナリ次ニ上清ヲ取り錫鍋及硝子鉢中ニテ水氣ヲ蒸散スル間生スル
 所ノ白澄ハ可液中ニ懸留スル処ニ此モノヲ「コイトル」ニ漸ク水氣ヲ蒸散スルニ隨

子鉢ニ寫シ火ニ上テ過多ノ水氣ヲ蒸散シ液ノ量ニ百八十ハ或トナリ
 至ト品毛白直生ノ尚止マサルハ其ノ尚蒸散ス
 白色ノ澄末絶テ生セサルニ至リ委ク之ヲ抄ミ去
 リ可液ニ硝砂精ヲ滴加スルハ再澄渣ヲ生ス又紙ヲ以テ是ヲ瀘シ清液ヲ磁鍋ニ
 内レ尽ク水氣ヲ蒸散シ直ニ硝子ヲ列寫見寫若クハ磁瓶ニ寫シ更ニ烈火ニ上セテ
 質流動スルニ至リ尚少時火ニ上置キ可後火ヲ下シ冷ヘテ後器ヲ破テ見レハ明潔
 ニシテ硝子質ノ物アリ是即ケ「おスホル」修見ナリ之ニ六倍ノ水ヲ加エ蒸餾
 固封シ貯フ○此者おスホルト同ク植物及山物中ニ存テ之アルヲ見ルコトアリ
 ト虽ニ動物ノ体中ニモ多ク是有ヲ以テ古来是ヲ動物中ノ「コイトル」ニ屬ス此物
 製煉中初メ先ツ綠岩油骨灰中ノ「コイトル」ヲ抱合シ（骨質ハ本ト揮發炭及炭
 スルハ揮發炭ニ素共ニ飛散ス灰中ニ止マリ「おスホル」ニユルハ驅逐セラレテ直ニ水中ニ溶化ス可
 所ノモノハおスホルニユルコトナレバ「おスホル」ニユルモノナリ）骨質ハ本ト揮發炭及炭
 靜定シ沈ム所ノ澄滓ハ綠岩油ト「コイトル」ヲ抱合メ「コイトル」ヲフルニユルカキトナリテ
 凝結スル者ナリ次ニ上清ヲ取り錫鍋及硝子鉢中ニテ水氣ヲ蒸散スル間生スル
 所ノ白澄ハ可液中ニ懸留スル処ニ此モノヲ「コイトル」ニ漸ク水氣ヲ蒸散スルニ隨

礶砂石灰精
セー豆

若ハ自餘ノ諸オト混シ火ニ上セ煨クハ抱合ノ稍々透明ノ硝子質トカレ又是ク水ニ溶スルハ勿心ケ熱氣ヲ發此物熱氣ヲ發シテ多ク水ニ入テ頓ニ是ヲ失フ故ニ○此物アムモアキ一名キ發羅僞鹽即チ動物中羅僞鹽ナリ水ト抱合スル者ナリ是レ羅僞鹽中最モ銳烈ノ者トス可質ヲ分折スルハ水素トオケツキストフシテ成リ○此物製造中石灰ニ由テコウトシエールニアキ礶砂ヲ分解シ石灰トコウトシエール礶砂中食ム所ト其交カニ由テ固ク抱合シアムモアキ礶砂中食ム所ト其交カニ由テ固ク抱合シ自ラ散逸シ熱素ト抱合ノ氣形トナリコトヒトヨリ騰出ス此汽水ニ混スルニ非サレハ決メ液形ヲ為ス可キ故ニ蒸餾多ク中ニ水ヲ貯メテ是ヲ受テ是ト混和セシム然レバ水ト混和スル以前ニ可氣形ヲ束壓スルヲ有レ非サレハ一度水ニ和スル後復々速ニ氣形ヲ為シ水ト分レ故コトヒトト蒸餾シテノ間硝子ノ長官ヲ接シ氣ヲ通シ孔ヲ通行セシム此狹窄アル細孔ニ於テ十分ノ束壓ヲ受ケ水ニ入テヨリ細カニ水質ト混和ス是ノコフルーイバーレアムモアキ即チ礶砂加ト云フ諸種ノ貝殼類ハ皆石灰土コトリストフシエール也及ヒ膠質ヲ以テ成リ是ク煨キ灰ト為スノ間コトリストフシエールト膠質ハ未タ散逸シ餘ヲ所ノ者ノ唯純粹ノ石灰土ナリ

羅僞鹽
貝灰

石灰

是ク貝灰云石灰礦ハ石灰土コトリストフシエール也及ヒ此ニサノ水ヲ雜エテ成リ是ク煨キ灰ト為スノ間コトリストフシエールト水氣ト未タ熱素ト抱合シ氣形ヲ為ス可キ散ス餘ヲ所ノ者ノ唯純粹ノ石灰土ナリ是ク石灰土コトリストフシエール也及ヒ此ニサノ水ヲ雜エテ成リ是ク煨キ灰ト為スノ間コトリストフシエールト水氣ト未タ熱素ト抱合シ氣形ヲ為ス可キ散スハ從前堅剛質ヲ失ヒ多粗脆トナリ可性苛酷是レ水ヲ注クハ大熱ヲ激発シ多量ノ水ヲ吸収シ尽クハ是ヲ煨煨中湯ヲ所大ニ熱素ヲ保受スルノ性力ニ由ル者トス蓋シ煨煨中未タ可液質ヲ脱失ナシ熱素ヲ含蓄スル者今ヲ新ニ水ヲ得テ再ヒ是ト抱合シ熱素ヲ保受スルノ力俄ニ衰ヒ上ニ復々是ヲ含蓄スルコト出ハス多量ノ熱素一頓ニ散逸シ周圍ニ送發スル者ナリ○石灰ハ固ヨリ單質ニ決メ分折ス可キ者非ハ故ニ石灰水中含ム所ノ石灰ハ固ヨリ石灰ノ分質水ニ溶化スル者ニ非ス可キ全質溶化スル者ナリ即チ和蘭ノ氣侯平等ノ暖氣中ニ於テ一百八十錢ノ水ニ一錢ノ純石灰ヲ溶化スルヲ得問曰石灰水ヲ大氣ニ晒ラスハ上面薄膜ヲ生スルハ如何答曰石灰ハ火力ニ由テ全クコトリストフシエールト脱スト雖ハ大氣中ニハ人家日夜焚燒スル所ノ薪炭ノ火ト人畜絶エス呼出スル所ノ氣息ニ因テコト

石灰水
ヒイ豆

煨 製

麻僞涅失

ルストフシユール常ニ充塞スルニ石灰ヲ以テ大氣ニ晒ス其ハ勿ク其基ニキ力ニ由テ
コイルストフシユールヲ引キ密ニ是ト抱合メ終ニ悉ク變メコイルストフシユールト爲ル至
ル石灰水モ亦是同シ水溶化スル所ノ石灰水面大氣ト相接スル所ニ於テ勿ク
氣中ノコイルストフシユールヲ引キ是ト抱合メコイルストフシユールナル石灰水ノ
上面生ズル所ノ薄膜即チ是ナリ是ニ種ノ中和鹽此膜増加ノ漸ク重キ則チ自
ラ破裂メ底底沈ミ可水面又新ニ膜ニ生ズ此ノ知テ逐次ニ是ヲ生シ可究ニ終ニ水
中ノ石灰尽クコイルストフシユールナル石灰水ヲ貯フル者ハ必ス是ヲ密
封スキナリ○問曰煨製ヨクモシアモ亦石灰ト性質同一ナルカ答曰可煨煨由

修見典羅
僞塩抱合者

「色ヤイ」
「ボットアス」

テコイルストフシユールト水氣ヲ脱スルハ石灰ト異ナルヲ無シ然レ可性質苛酷ナラス具
燒煨後水ニ溶化スルヲ愈ニ少シ是レ可石灰ト異ナル可ナリ石灰ハ燒煨スルニ由テ
此物諸種ノ植物ノ灰汁ヲ製成シ水氣ヲ蒸散メ製成スル所ノ者ナリコイルストフ
シユールボットアスニ比スルハコイルストフシユールト合メテ甚タナシ釐ビ典羅僞比スルハ
唯此少ノコイルストフシユールトニ由テ可裂シキ侵蝕ノ性質稍ニ緩和スルニミテ爾餘羅

コイルストフシユール
ボットアス

僞塩性質キ皆具ナル此物ヲロゲウチヘコイルストフシユールボットアスニ比スルハコイルス

トフシユールト合メテ甚タ多ク則チ羅僞ト修見ト偏勝ナリ相抱合メ中和鹽ト也結芭

スルモノナリ○製法剥馬亞斯ニ分兩水ニ分古剥馬亞斯ヲ兩水ニ溶和シ瀘ノ滓

ヲ去リ太ナル蒸餾タンノ口廣キ者ニ内ニ料瀘ニニ右ノ蒸餾タント同ト大サハトリ

ルト頸側ニ孔ヲ取リ是ニコイルシユールカキ石灰ニ合ハモノ也三分ヲ盛リ可嘴ヲ以テ

深ク蒸餾タンノ口ニ挿シ可嘴頭殆ント蒸餾タン中藥汁ノ上面ニ及ハシムニ器ノ接

際ハ塗封スルヲナリ唯宜クニ先ノ位置ヲ固定シ後屢々綠岩油ヲ加フル中動搖ス

ルヲナカラシムヘシ否ラサバ可結芭妨グ次ニ淨製綠岩油ニ分兩水ハ分ヲ和スルモ

ト取リ一時毎ニ六分一ヲロトル止ノ頸側ノ口ヨリ加ヘ六時ニ加ヘ尽クス可加フル毎トニ

可沸騰ノ間木棍ヲ以テ是ヲ攪滾シ且毎分「キユル」ヲ以テ可口ヲ固封スヘシ右

加ヘ六時中六回テ綠岩油ヲ加ヘ尽クス後靜定スル十二時ニ開キテ是ヲ看

ルニ透亮美潔ナル結芭鹽可中ニ在リ大抵初メ用テ所「ボットアス」此結芭鹽ヲ分

テ取リ剩餘ノ液汁ハ更ニ瀘過シ微火ニ上セ水氣ヲ蒸散スルハ復々頗ル多ク

量ノ結芭塩ヲ得^{大抵初得}○有説ク所積次ノ結芭塩ヲ取リタル剩餘ノ

液汁ハ火ニ上ニ水氣ヲ蒸散スル以前久シク大氣ニ觸レシムル一勿レシ若然ラズ

一二日モ大氣ニ觸レシムルハ大ニ可成毒ヲ失ヒコトハボツトアス再々「ローグ」リ

ケヘシユールボツトアストナル復月ハ殊ニ甚シ^{蔵集ノ失フヤリ}○最後殘レ所ノ

液汁ハ淨潔ナラス故ニ假ニ結芭スト虽モ宜ク措テ用ユルナカルヘシ○凡ソ此物ヲ製

セント欲スル者ハ宜シク天氣ノ寒暖ニ意ヲ用ユヘシ天氣愈々寒冷ナルハ羅僂

節ヲ避クヘシ最寒時^{即ケホ}是ヲ製スル則ハ羅僂ノ修見ヲ引ク猶サクメ未タ全ク

飽和セサルモノ寒氣ニ由テ俄ニ凝結スルノ憂ヒアリ故ニローレンイ少ノ驗冷熱器

ヲ五十度ヨリ六十度ニ至ルマテノ氣候中ニ是ヲ製スルヲ佳トス右ノ製造ノ間

綠蓉油ト結麗土ノ石灰土ト抱合メ「ギ」アスト^{此六配}ヲ爲リ結麗土中ノ「コ」ルストフ「シ」

藥液ノ未タ水氣ヲ蒸散セサル以前可去リ飽和スルト飽和セサルヲ試ムルノ法

右ノ藥液決許ヲ分ケ取リ是ニ「コ」ウト「シ」ール「ク」イ「ウ」キ「ノ」溶液サ許ヲ滴和スルハ

忽ケ「コ」ウト「シ」ール「ト」^{油鹽セ}「ボ」ツ「ア」スト抱合メ「イ」ツ「キ」ールセル「コ」ウト「シ」ール「ク」失フ

由テ却テ「コ」ールストフ「シ」ール「ト」^{初メ由ツトアスト}抱合メ「イ」ツ「キ」ールセル「コ」ールスト

フ「シ」ール「ト」抱合スル者ハ液中ニ溶化スル「ト」去ハス必ス底ニ沈落スル者白色ナルハ

「コ」ウトアスト修見ト全ク飽和スルノ徵ナリ^{抱合スルモノ}若シ黃色ナルハ「コ」ールストフ「シ」ール「ト」未タ

足ラサルノ徵ナリ

鮮蓬塩

セイ(名)

此物山物中ノ羅僂ナリ「コ」ウトアストニ比スルハ性緩ニ頗ル清涼スルノ性アリ且尋常

「コ」ウトアストニ結セセサル此物ハ去リ初ノヨリ結セセリ又是ヲ大氣ニ晒セバ水氣ヲ引

カス加之ナラヌ是ヲ燥乾ノ所置置ケハ可固有ノ水氣ヲ失ヒ可結芭ノ形ヲ保

製法鮮蓬塩晶一分布沸湯ニ分ニ溶化シ瀘過メ滓ヲ去リ冷ニメ「ギ」アスト

ニ内レ可後結麗土ヲ「コ」ール「ト」盛シ綠蓉油ヲ注ク等ノ変ニ上ノ「コ」ール「シ」ール「ボ」ツト

アストノ製法同シ此物大氣ニ晒テセハ可光彩ヲ失ハス且「コ」ノ舌上ニ置タ「コ」

久シカラサレバ羅屈塩ノ味ヲ覺ユルナシ又是ニ種々ノ試薬ヲ加フルニサレモ可形
色ヲ變セサレバコロールニシトコウダトモモキリ飽和セルノ徴ナリ右ノ製造ノ間
アル所ノ分解抱合都テコロールニシテハポットアスト同シ

礮砂揮發花
セイ色

此物製造ノ間礮砂ト結鹿土ト復交力ニ由テ各々分解セラレ可故ハコウトシ
即チ海鹽ヲ終見テトカルキ 即チ石灰ヲ結鹿土
一ハ礮砂質中會合ニシ 質中會合所ノモノ
六カカハキ アムモニアキ
即チ動物ノ
砂中會 トノ交力ニ勝ル故ニコウトシユルニ忽ケアムモニアキヲ棄テ直ケニカルキト
抱合ス此由ヲ結鹿土ノ質中ニ會合所ノコロールストフシユルニ依テ驅セラレテ却テア
ムモニアキト抱合シ熱素ニ和メ氣形ヲナレ兼餉タニ入テ再ヒ熱素ヲ失ヒ凝固
メタンノ裡面又ハコルトトノ頸邊ニ付ク列屬見屬ソ底ニ殘ル者ハコウトシユル
カルキコウトシユルニ抱合スナリ

礮砂精
セイ名

此物製造ノ間コウトシユルニ由テアスト抱合シコウトアストノ質中ニ會合所ノコ
ロールストフシユルニ配セラレテ忽ケアムモニアキト抱合シ熱素ニ和メコルトトノ頸間ニ升
リ熱素漸ク去リテ凝固ノ寸周圍ニ附着シ次ヲ升リ来ル所ノ水ノ蒸氣ニ由

再製鹿角塩
セイ色

再ヒ溶化シ液形ヲ為シ兼餉タニ滴下ス是ニ則テ礮砂精ナリ此製造ノ間
兼餉タニ中ノ水面ニ膜ヲ生スルアリ是ニコロールストフシユルアムモニアキニ微ニ水氣ヲ得テ
結晶スルナリ寸後水多クコルトトノ頸既ヨリ滴下シ是ニ觸ルキハ再ヒ溶化
ス然レハ滿面ニ觸ラサレ故ニ尽ク溶化スルコトハス故ニ宜シク術ヲ了ルノ後頻リニ
兼餉タニテ振蕩ノ可溶化ヲ助クベシ此物ヲ問曰此物ヲ製スルニ用テ木炭ハ
何ノ要スル所ヤ○答曰是寸質中ノコルト動レ物キ油
可故此製造ノ間炭素木炭ノ原油中會合所ノ色素油中ニ在テト抱合シ是
ニ寸油全ク可色ヲ脱ノコロールニアムモニアキ鹿角塩中ト共ニ熱素ヲ和メ氣形トナ
リ兼餉タニ移リ熱素ヲ失ヒ再ヒ凝固シテ寸周圍ニ附着ス○此物製造中
礮砂中ノコウトシユルニ結鹿土ノカルキアルニテ抱合シコルトトニ留リ結鹿土ヨ
リ取出セラレコロールストフシユルニ礮砂ノアムモニアキト抱合シコロールストフシユルアムモ
ニアキト為リ實百見油ト共ニ熱素ニ和シ氣形ヲナシ兼餉タニ入り熱素ヲ失テ塩
ノ裡面ニ固着ス○此物製造ノ間再製鹿角塩ト同シク炭素ト油即チ鹿角ノアルカリ
液中ニ會合所ノモノ

再製鹿角塩
セイ名

海塩

ペイテルニエールワグ子ア「カルペイトン」ニアルムモニアキ」混和スルアリ是ヲ淨除
スルハ剥離アス「溶液」加クハ是ヲ以テ消石ノ溶液ニ加フルキハ直ニ「カルキ」
「コク子」エ「アムモニア」ヲ分解シ其抱合為ス所ノ「カルペイトン」ニ「エール」ヲ奪ヒ
自ラ是ト抱合シ「カルキ」ト「ワグ子」トハ「下質」重キ故ニ「雲底」ニ沈着シ「アムモニア」
ハ「下性揮発」スル故ニ水蒸氣ヲ蒸散スルノ間「雲底」ニ「元中」ニモ散シ去ル矣其於テ
純精ノ硝石トハ然レモ消石ノ溶液中ニ若シ「ソウトシユール」アルキハ「ソウトアス」
又是ト抱合シ「液」中ニ溶化ス然レモ硝石ノ結晶シ「ソウトシユール」ボツトアスハ速ニ
結晶セザル故ニ終ニ自ラ「分」ス是レ人能ク新ク「得」ル所ノ消石ハ「淨製」セサルガ
カル所以ナリ○「問曰海塩ヲ煨テ大ニ熱スルニ至レハ爆聲ヲ奏シ「逆散」スルハ何ゾヤ
答曰海塩ハ熱氣ニ達フト其固有ノ結晶水中ニ溶解スルナレ然レモ「可結
晶」水ハ熱氣ヲ「得」テ膨脹セザル「ヲ」ヲ「得」テ「逆散」ニ見芒刺ヲ細碎ノ逆散ス其時
爆聲ヲ奏スルナリ結晶水ハ

結晶ノ結晶水ニ至ルニ至リハ「自ラ」溶解スルハ「皆」結晶水ノ
中ニ溶解スルナリ海塩モ又「結晶」水ヲ「得」テ「逆散」スルハ「大ニ」上セ○
「溶解」スル「能ハ」カルナリ

硝砂

生物即チ揮発性塩一名「アムモニア」中ニ「得」ル「ソウトシユール」ト「海塩」ノ「抱合」ノ「成」ル「所」

ノ中和塩ナリ「近人」製造ノ法多シト云々性質皆一般ナリ

製法「ソウトアス」通氣蒸餾醋「利」ア「エ」ト「上」セ石合メ硝子タニ内レ措ク「數日」可

同時ハ攪動シ「可結」飽和スルヤ否ヲ試験シテ若シ二物偏勝アルキハ新タニ「ア」

加テ飽和飽和セシメ已ニ飽和スルヲ候ヒ得ハ「錫箔」ニシテ文火ニ上セ絶ヘス手ヲ止メ

攪動シ水蒸氣全ク尽キ乾固スルニ至リ是ヲ取テ少量ノ蒸餾水ニ溶化シ硝子

釜ニ盛リ「再」文火ニ上セ復タ乾固スルニ至リ硝子燻ニ内レ密封シ貯フ○「右」製造

間醋「ソウトアス」ト抱合ノ「ソウトアス」ニ含ム所ノ「ソール」ストフ「エール」ハ「驅出」セテ熱

素ト和シ「ソール」タツ「カ」トナリ「モ」散ス其時「三方」沸騰ス○製法「鹽」達「塩」通

宜蒸餾醋「鹽」達「塩」ト「右」飽和スルヲ候ヒ硝子タニ内レ靜止スル「二三」日「後」ニテ

濾シ「磁」子「内」シテ文火ニ上セ水蒸氣ヲ蒸散シ芒ヲ結フニ至リ「紙」上ニテ乾カシ「密」蓋「内」シ

密封シ貯フ「右」製造ノ間醋ト「鹽」達「塩」ト抱合ノ「鹽」達「塩」中ノ「ソール」タツ「エール」

驅出ス其於テ沸騰ヲ奏スル「上」ノ「アムモニア」ニ「ソール」ボツトアスト同シ

民埴利精 玆物製造ノ間ハ可分鮮及ヒ抱合ニトノ可ヤイニツルソー必ト同シ

セウ(八五)
司エシニエール
玆者製造ノ間酒石炭中過多ノ修見トホットアスト抱合シ酒石炭ニ由テ中和塩ト

セウ(八五)

也水中ニ投スルニ多ク溶解セム初メ養カ所ノ沸騰ヲホットアスト中ニホットアストヲシテ

再製酒石炭

別子名物考
製法考

酒石炭ノ修見ニ由テ駆逐セラルカ故ナリ○製造法 酒石炭石一俵先是ヲ試シ他ノ中和塩

若クハ金葉ノ如ク混濁セルモノナキヲ明カシ次ニ少量ノ沸騰ヲ以テ是ヲ溶化シ底

ニ置過シ磁子ニ内シ文火ニ上セ水氣ヲ蒸散シ上面膜ヲ生ズニ至リ微冷メ

諸芒セシメ固封シ野フ○尚曰若ク製造ノ前酒石炭中ニ混濁セル中和塩若クハ

金葉若クハ砂滓セルハ何ノ術カアル答テ曰試テ用テニ若クハサシ今其ニテ挙テ左

ニ示ス其ニ酒石炭ヲ細末トシ細砂精ニ浸ス一二時ニシ緑色ヲ現スルハ是ナリ

酒石炭中銅質ヲ含ムノ候ナリナニ酒石炭ヲ水ニ浸シ是レニフルーイバーホットアスト

中ニ置過シ下ニルニ白色ノ土粉沈落セルハ是其酒石炭中土質ノ中和塩ヲ含

ムノ候ニナリ中和塩中ノ種々ノ修見 ホットアストニシテ 若クハイニエールニシテホットアストニシテ

ホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテ

者ナリ若シ金質ノ中和塩中ニ混セルナリナニ金質各種ノ色ノ酸和ト為テ若

底ニ沈落スルニ由テ分析スルカアル者ハ唯是レホットアストニシテホットアストニシテ

ホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテ

色ノ粉末沈落セルハ是レ酒石炭中ニホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテ

所ノカアルペーセルニシテ若クハホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテ

ニ溶化シホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテ

右ノ如キ複雑物アルハ其ニ用ニ使ヘス○玆物他 中和塩ト異テ 所以ニナリ一箇ノ

修見二箇ノ修見ニシテ抱合スルヲ以テナリ玆製造ノ間酒石炭中過多ノ修見ニシテ

塩ト抱合シホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテ

ホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテ

過多ノ水氣ヲ蒸散シ次ニホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテ

過多ノ水氣ヲ蒸散シ次ニホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテ

過多ノ水氣ヲ蒸散シ次ニホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテ

過多ノ水氣ヲ蒸散シ次ニホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテ

過多ノ水氣ヲ蒸散シ次ニホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテ

過多ノ水氣ヲ蒸散シ次ニホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテ

過多ノ水氣ヲ蒸散シ次ニホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテ

過多ノ水氣ヲ蒸散シ次ニホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテ

第一方
酒石炭
方(一五)

ホットアストニシテ

過多ノ水氣ヲ蒸散シ次ニホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテ

過多ノ水氣ヲ蒸散シ次ニホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテ

過多ノ水氣ヲ蒸散シ次ニホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテ

過多ノ水氣ヲ蒸散シ次ニホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテ

過多ノ水氣ヲ蒸散シ次ニホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテ

過多ノ水氣ヲ蒸散シ次ニホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテホットアストニシテ

併見與羅倫
塩土配合者

コウチン馬房校映物
カイヤ名

水気ヲ蒸散スルガ爲ニ隔ヲ以テ冷石トニ点スルガ即チ結芒セシム
其結液ハ再ニ蒸テ結芒セシム右ノ製造ノ間ハホスルニエールト蘇達塩ト配合シ
蘇達塩中ノコールストフシエールヲ駆出ス故ニ沸騰ス

精製食利塩

第二方
固性硝研
ヤウ名

コウチン馬房校映物
カイヤ名
中食利塩ニ含ム所ノスワーフルニエールヲナシテ
カヤニ由テバットアストト配合シバットアストニ含ム所ノコールストフシエールヲ駆出ス
此ニ於テコールストフシエールハ勿クヤ上ノコリナシテト配合シ白色ノ粉末ト成テ若
底ニ沈落ス是レ即チナクナシテ過見後ナリ
○問曰食利塩ヲ精製スルハ何ヤカ
答曰是レスワーフルニエールナクナシテ混スル所ノコウトシエールナクナシテラ除キカ爲ナリ
食利塩ヲ沸騰ニ溶カシ水気ヲ蒸散シ放冷スル後結芒セサレ剩餘ノ液ハコウト
シエールナクナシテナリ此物亦能ク麻屑但失アル故ヲ製スルニ用ユヘシ
此物ヲコウトシエールトナルト配合ノ成ル所ノ中ニ加塩ナリ製造ノ間結晶土中ノカルキ
カールネトコウトシエールト配合シ結晶土中ノコールストフシエールヲ駆出ス

鹿角灰

○此物水ト交力甚タ強シ故ニ是ヲ大氣ニ曝曬セシムルハ少時ニ忽チ水氣中ノ水氣ヲ
引受メ水ニ混動スルニ至ル又是故ニ亞ル哥見ヲ製スルヤ此者ヲ用テ最後コール
此ノ中ニ殘ル所ノ水氣ヲ吸除セシム○此物燒蝦スル少時ナキハ能ク暗中ヲ照ハス
ノ性アリ此物ヲ水ニ飽和セル液トコウトアストヲ水ニ飽和セル液ト合スルハ水ニ一燒ノ
固塩トナル其理ハコウトシエールハコウトアストト交力強キ故ニ忽チカルキヲ捨テコウト
トアストト配合シコウトアストニ含ム所ノコールストフシエールヲ駆出ス又ニ於テカルキハ
再ニコールストフト配合ノ復タコールストフシエールナルト爲リ上ノコウトシエールバット
アスト共ニ水氣ヲ吸收スルナリ○鹿角ヲ炭火ニ投シ直チニ燒蝦スルハ
其中含ム所ノコールストフシエール水水素ニ至テ亞ル哥見ノ揮発ナル部々分解散
シ動物性ノ油ヲ出スルヲ見ル其鹿角ヲコルトトニ内シ火ニ上ヤ蒸餾スルハ
揮発ナル動物ノ油多出リ最後コルトトニ殘レル炭火ヲ取テ熾火ニ投シキハ唯
コールストフシエールニ蒸散シテ可也見ル所ナリ
○右ノ二個ノ製法ニ於テ鹿角共ニ全ク
先中ノ酸素炭素ト配合ノ生スル所ナリ

イテツプスミ
セイ 名

此物水銀ト硫黃ハ交力有モ甚^{タシキ}故ニ製造ノ間研磨ニ由テ一物密ニ抱合シ
水銀ノ細玖硫黃ノ分子ノ細孔ヲ填充シ硫黃ノ分子ノ上面ノ變化シ此ニ光線ノ
射照全ク變シ可色從テ變ス是此ノ製造ノ間硫黃黑色トナリ水銀可流体ナ

ヨルバーレサルペー
テルシエーレツイツキ

失ヲ取以ナリ、○製法酸和水銀以硝石精製者三分淨製消石四分右硝石精ヲ硝子壺ニ

入レ文火ニ上セ徐々ニ酸和水銀ヲ加ヘ蓋閉メ全ク溶化スルニ至リ硝子壺ニ寫シ固封シ貯
メ○右ノ奇ニ蓋ニ水^{ナニ分ヲ加ヘ}タルビーテルシートルクイッキホリト云フアムステルダム局方

ノ〇右ノ奇ニ蓋餉水

十二分ヲ加へ

サルーテリシールクイッキオツトエフアムステルダム局方

クイヅキホクトニ代用スヘシ問曰右ノ奇十二分ノ水ヲ加ヘ修見ノ力大ニ弛弱スト虽凡水銀ノ酸和令解沈落セサル者ハ何ヤ荅曰右ノ奇ハ生水銀ヲ用ヒス成満ノ酸和ヲ以テコレヲ

ソウトエールグイッキ

製スル故ニ製造ノ間絶ヘテ硝石精中ノ酸和ヲ水銀ヲ引キ去リテ故ニ硝石精ノ力

外永
セイ

尤モ少シモ弛弱セズ是レ水ヲ加フト虽モ酸和ニ密底ニ沈コサル所以ナリ○製法

造ノ間水銀硝石精中ニ溶化シ多クノ可酸素ヲ吸収ス故ニカルセーテリフカス硝石精中飛散スルヲ甚タ多シ此時成ル所ノ酸和ハ剩餘ノ修見ノ中ニ溶化ス可後水氣ノ蒸散シルノ間又多ク修見ヲ分解メカルセーテリフカス飛散ス是

不可後水

氣之蒸也

散
シ
ル
ノ

間又多

修見

解

ル
一
テ
リ

火力増進スルニ値ヒ水銀絶ヘス酸素ヲ吸収スレハナリ水氣已ニ悉ク蒸散スレハ
 兎中ニ餘ス所ノ藥料全ク水銀酸和ト硝石精トヲ以テ結成ス可後海塩ト
 綠礬ヲ加フルニ及ビテ三杓兎中ニ餘ス所ノ藥料各分解變化ス即チ綠礬ニ含
 及海塩綠礬ナリ

先中餘下

所藥料

録卷ノ加フ

ルニ及ンデ

三景

么所^{「スワール・シュール」}ハ可^{「スワール・シュール」}強キ交力ニ由テ鉄^{「スワール・シュール」}ト合^{「スワール・シュール」}ノ緑砦質^{「スワール・シュール」}ス成ス者^{「スワール・シュール」}

捨テ^テソ^ソウ^ウダ^ダニ^ニ會^會ム^ム所^所ノ^ノ羅^羅屈^屈塩^塩ト^ト抱^抱合^合シ^シソ^ソウ^ウト^トシ^シエ^エト^トル^ルヲ^ヲ駈^駈出^出ス^スソ^ソウ^ウト^トシ^シエ^エト^トル^ル

舊配ヲ失フテ散逸シ直ケニ水銀ノ酸和ト抱合ス此ニ於テ硝石精復是ト

抱合スル一鉢ハス可酸素一分ヲ以テコウトエーニ分附シ自ラ可ルニテリフカスト

ナリテ飛散

故三

係セテ「オールゲシェー」ルデノウトシェー」ト爲リ水銀ノ酸和ハ「オールゲシェー」ルデ

シゲト
シュールグイツキ
ト
為ル
此時ニ
方テ
火力益々
壯タルカ
故
オ
フル
ゲ
エ
ール
デ
ソ
ウト

「ハル
ワフル
ツキ
トミ
キ
エ
ル
ク
イ
デ

エ
エ
一
九
ク
イ

凝結ノ芒刺狀ヲ爲シテ可所ニ穿着ス并永是ナリ○此物初メ生水銀ヲ以テ

升汞^ニ如^ク研磨^{スル}ノ間水銀^ニ由^テ升^ニ含^メル過^ク多^ク酸素^ノ一^分ヲ引^キ去^リ水

アゼイニラシール
クイフオ

銀是ト抱合ノ灰色ノ酸和トナレ可後火ニ上ス由リ熱素ノ助ケテ更ニ多ク酸素
ヲ引キ升永ト生水銀ト此ニ至テ共ニ般白色ノ半酸和（灰色ノ物ニ此ニ至ルハサ許ノ海
塩精多量ノ水銀ヲ含藏スルニ至ル此時熱素ニ和ノ共ニ汽形ヲナシ硝子曇ノ上邊ニ至リ
再ニ熱素ヲ失ヒ凝結牢着シテ芒刺ノ形ヲ為ス○製法水銀一セツアルジニドサレベテ
レニエールニセツボツトアス溶液（沸騰止
ラ度）右水銀ヲ硝子タンニ内レ是ニ硝石精ヲ注キ沙火ニ
安シ水銀尽ク溶化スルヲ候ヒボツトアスヲ取り徐ニ此ニ加ヘ水銀ノ酸和尽ク底底ニ沈
ムニ至リ是レハ另ケ取り多量ノ水ヲ以テ是ヲ洗淘シ微火ニテ乾カシ之ヲ硝石タンニ内レ
並ニ醋適急ニ加ヘ（水銀ノ酸和尽クノ
溶和スルヲ度トス）水銀ノ酸和尽ク溶化スルニ至リ此ニテ瀘シ火ニ上
セ水気ヲ蒸散シ上面膜ヲ生スルニ至リ放冷シ結芒セシメ硝石タンニ收メ固封シ貯フロトシ
製法 右ノ製造最初水銀硝石精中ニ溶化スル間水銀ニ由テ硝石精ニ含ム所ノ酸和
過半ヲ吸收シ水銀是レト抱合シ酸和トリ直ケニ剩餘ノ修見ノ硝石中ニ溶化ス
故ニ此時「カルベ」テリ「フガス」（硝石セリ「酸素」ヲ失ヒ
修見ニ和ノ修見散ルモノ）ノ蒸発スルヲ甚ク多シテ後「ボツトア」
スノ溶液ヲ加フルニ由テ酸和再ヒ修見ト別レテ底底ニ沈落ス是レ「ボツトア」ハ修見ト

ウエイシステーン
ニラレレクイッ

交力尤モ甚クシ故ニ直ケニ此ヲ引キテ抱合ス此ニ於テ酸和亦タ可中ニ溶化シ止マレ
去ハス自家ノ重力ニ由テ底底ニ沈落スルナリ此時液中ヨリ沸騰外散スルモノ
「ボツトア」中ノ「コールスト」フ「シュ」ニ硝石精ニ駆逐セラレテ散ルノ候ナリ○右ノ
知ク酸和底底ニ沈落スレ後テ分ケ取り水ニテ洗ヒ是ヲ醋ヲ注クニ仍テ酸和
再ヒ醋中ニ溶化ス醋ノ量甚ク多ク「ラカハ」次ニ火ニ上セ過多ノ水気ヲ蒸散シ從テ
是ヲ貯冷スルニ由テ必ス結芒ス○製法溶永水（水銀ヲ硝石精
飽和スル者適宜）酒石溶液（酒石沸
騰止者）右溶永ノ猶温ナレ方テ酒石溶液ノ方サニ熱セシモノヲ取テ徐ニ滴和シ澄
査シ沈落スル者全ク止ムニ至リサ時靜定シテ上清ヲ傾ケ去リ澄査ヲ分ケ取り
冷水サ許ク以テ之ヲ洗淨シ次テ多量ノ沸湯中ニ溶化シ紙ニ瀘シ冷処ニ
於テ結芒セシム可結芒セシ餘液ハ水気ヲ蒸散シ放冷メ又結芒セシム斯ノ如ク數
々ノ可後全ク結芒セサレニ至リ結芒塩ヲ取り固封シ貯フ右ノ製造間溶永水
ト酒石ノ溶液ト複交力ニ由テ各々分解ス即ケ硝石精ト「ボツトア」ス交力甚ク故
ニ水銀ノ酸和ヲステ、酒石中ノ「ボツトア」ト抱合シ「カルベ」テリ「シュ」ニ「ボツトア」ナリ是ニ

由テ駆出セラル、肝ノ「ウエインステーニフシユール」ハ直ニ水銀ノ酸和ト飽合シ「ウエインステーニフシユール」ノ中ニ溶化シ得、キヤ答曰「ウエインステーニフシユール」ハ硝石

精^ニ比^{スレバ}甚^タ弱^シ故^ニ硝石精中^ニ溶化^{スル}所^ノ水銀悉^ク可^ニ溶化^{スル}アタハス

製法水銀硝石精等分右磁甕内ニ水銀尽ク溶化スルヲ候ト是ニ煎餾水ヲ

加稀薄ニ後更ニ礪砂精ヲ取り徐々ニ点滴シ水銀尽シ器底ニ沈ム至リ

是ヲ另テ取り、
 蒸餾水ヲ洗ヒ乾シ貯フ。
 是「エデニブル」ノ
 局方ノ製法ナリ。
 右ノ製法水銀ヲ溶化ス。

ニ火カヲ須スルヲナシ否ラカハ水ヲ如クニ及テ一分ノ水銀自テ分解ノ鬼底ニ沈落

ス是ツ以テ水銀酸素ヲ引クヲ多カラスヲガレバ一テリフガスニテ散スルヲモ亦從テサ

ナシ可後礪砂精ヲ加フルニ由テ礪砂ト修見ト抱合ニ水銀イ酸和修見ヲ失テ

器底ニ沈落ス
カレテル
シユ
ル
アムモニア
水銀些少
抱合
液中ニ溶化ス
○

此製造簡弁永三合所ノ剩餘ノウツヒール「ボットアス」ト^{此時「フールストア」}抱合^{「ユール熱素三和生」}

形ヲ爲テ 水銀ノ酸和ノ僅ニ分ノコウトシユルト 抱合シ自來ト爲テ鬼底ニ沈ム若シテ

白降汞

セイ 名

フウトシユールムモニア

可塗微^ニ黃色ヲ現ス^ニ至^ルハ則チ水銀酸和ス^ル所ノ一分ノリウトエ^ニモ亦稍

ミホツトアスニ引カルノ徴ナリ此ニ至レハ礮砂ニ含ム所一分ノソウトエユーモ亦始テ

オットアスミ吸収セラレ一分揮発羅屈塩
即ケコムモニアキニ
 礆砂ノ基素
 頓ニ寸偶ヲ失ヒ直ケ

熱素_ニ和_シ氣中_ニ送散_シ傍人ノ鼻孔ヲ侵刺ス故_ニ此_ニ至テ宜_シク速_ニホツト

此方礬砂ヲ加フル者ハ「ポットアス」溶液ヲ加ルノ度ヲ的知ズルカ爲メナリ可故ニ外ノ系ハ「イーアルゲニール」デソル

トシェールノイツギニメ酸素ヲ●吸引シテ外汞ト碓砂ト酸素ヲ含ム圓等トナレニ含ム一碓砂ニ比スレハ頗々多シ故ニホツトアスノ客夜ヲ如フト馬ニ先ツ外汞ニ含ム所ノ有餘ノ酸素ニ非サレハ碓砂酸

素ヲ吸引スル
無レナリ
○製法白汞降適宜海塩精同上右先ツ白降汞ヲ硝子壺ニ内

徐々ニ海塩精ヲ加ヘ白降汞全ク溶化スルニ至テ止
但レ微火上
於テスヘ次ニ緩慢ニ水気ヲ散

散_シ放_レ冷_メ結_セ芒_シノ分_テ是_ヲ取_リ蒸_シ餹_シ水_ヲ許_ヲ以_テ洗_シ淨_シ陰_ニ乾_メ之_ヲ貯_メ

是^レ水銀ノ酸和成満ノ結芒スカル者ナリ甚タ升汞ニ似タリ唯升汞ノ含ム所

ノ修見ハコトフルゲエーデソウトエーレ
過酸海藍精ナレ
此物含ム所ハ尋常成満

ノ
コ
ウ
ト
シ
ル
ナ
リ
故
ニ
升
汞
ニ
比
ス
ル
修
鬼
ヲ
含
ム
所
較
ル
サ
ナ
シ
二
物
ノ
区
別
唯
是
ノ

三ナリ是ニ反ノ上ノ白降汞ハ甚タ甘汞ニ近ク多量ノ酸和水銀少許ノ海塩精ト

銅岩
抱合ニ成ル是ヲ水和スルニ鎔化スルヲ去ハス唯其秉比スルハ修見ヲ含ムト較々サナキ

○製法銅屑ニテ綠岩油ニテ右銅屑ヲ硝子ノコルニ内ニ徐々ニ綠岩油ヲ注シ
沙火ニ安シ煮テ銅屑溶化スルニ至リ溶化セサレハ更ニ綠岩油ヲ加ヘテ全ク溶化セシム
シ此ニ於テ酸臭アリ疎黄氣多クコルヨリ升ルニ壺中唯暗褐色ノ物ヲ殘ス
是ヲ取り多量ノ水中ニ溶化シ濾シ火ニ上セ水氣ヲ蒸散シ冷定メ結芒セシメ
陰乾ノ固封シ貯フ○右ノ製造ノ間初ノ煎煮スル間銅ニ由テ綠岩油中ノ酸素
ヲ吸引シ過多ノコワイヘリフシエール未成ノ綠岩油ヲ生ス此物熱素ニ和シコワイヘリ
フシエールガストナリ氣中ニ飛散ス即チ硫黄精ナリ酸素ヲ吸引セルノ銅ニ剩餘ノ修見
ノ中ニ混和ス之ヲ水ニ溶化スルニ修見ト抱合セル者ト多量ノ酸和ト自ラ分另ス見
ト抱合セル者ハ中和塩ナリヨリ水中ニ溶化ス酸和ハ唯酸素ヲ引クニ此ニ於テ濾シ褐色
ニ修見ト抱合スルモノニ非ス水中ニ溶化セス自ラ分另スルナリ
酸和ヲ去リ餘液ヲ火ニ上ヒテ水氣ヲ蒸散シ放冷スルハ方形ノ芒ヲ結フ
製法コワイフルニエールニ上適宜右ニ時細末ト為シ硝子壺ニ内ニ徐々ニ礮砂精
ヲ注シ沸騰全ク止ミ最初生スル肝ノ渣滓全ク溶化スルニ至リテ止ム此ニ於テ可液

礮砂精

鐵部
至シ○可製造ノ間火氣ニ由テ酸素トノ交力大ニ進ミ撒スル所ノ水中ノ酸素ト鉄

天藍色トナル此ニ右ノ液ト同量若クハ較々多量ノ亞見哥尔ヲ加エ沈ム所ノ
暗青色ノ結芒鹽ヲ取り火ヲ用ヒ乾燥カレ硝子ニ收メ固封シ貯フ○右ノ製造ノ間綠
岩油ヲ強キ交力ニ由テ銅酸和ヲ棄テ直ニ「アムモテキ」礮砂精ト抱合ス礮砂精ニ含ム
所ノコイルストフシエールニ俄ニ驅逐セラレテ由テ自ラ熱素ト抱合シ氣形ヲ為シ蒸散ス此
時銅酸和ノ一分ハ綠岩油ト「アムモテキ」ト抱合セル者ニ參リテ混同シ一分ハ剩餘礮
砂精中ニ溶化ス銅酸和ト抱合セルモノ次ニ亞見哥尔ニ加フ亞見哥尔ハ水ト交力甚タシ故ニ右
液中ノ水氣ヲ多分吸收ス此ニ於テ必ス美潔暗綠色ニ針ノ如キ芒ヲ結フニ
至シ○可製造ノ間火氣ニ由テ酸素トノ交力大ニ進ミ撒スル所ノ水中ノ酸素ト鉄
液ト抱合シ半酸和トナル水素ハ頗ル偶々失テ散逸シ一分ノ熱素ヲ得氣形ヲ為
シテ飛散ス○此者製中綠岩油鉄ノ酸和ト合フ鉄ノ酸和ヲ棄テ「ボットアスト」ト抱合
シコワイフルニエールニボットアストト為シコイルストフシエールニハ熱素ニ和シ氣形ヲ為シ蒸散シ鉄
ハ綠色ノ酸和トナリテ器底ニ沈落シ終ニ上清ノ液ヲ去リ洗ヒ且乾カス後漸ク
褐色トナル○問曰此法製中必ス兎口ヲ密閉スルハ何ノ理ヲ答曰此物製中

等三方
又方
〔名〕

硫黃焰ヲ發セサフニ要ス若シ稍々焰ヲ發スル中ハ水ワフルホウデンドエイセルト為ナ
ス氣中ノ酸素ヲ引テ自ラ水ワフルエール生シ水ワフルエールセルトナレハナリ
フコソイハ是ヲ製スル者必ス鬼口ノ密閉ノ外氣ヲ通セサフレムヲ所以ナリ
石ワフルエールセルトナレハナリ
撒余未介扶斯ナリ○此物製中鉄ト綠岩油ト相逢ニ由テ鉄ト酸素トノ交力大ニ増進シ
鉄ニ由テ綠岩油中ノ酸素ヲ吸收セントスレハ綠岩油ハ其基素酸素ト抱合スルコ
甚タ牢密ナルヲ為テ鉄ノ力ニ速ニ是ヲ吸收スルコト出ハス先ツ水質綠岩油ヲ
分解ノ可酸素水中ノ吸收ニ是ト抱合シテ半酸和ナリ尋テ綠岩中ニ溶化ス
此時液面沸騰ノ蒸氣スル所ノ氣ハ水質ニ含ム所ノ水素新々ニ酸素ヲ失フメ散
逸シ熱素ニ和メ外騰スルモノナリ是ヲワテレストフカスト云フ古人所云「オントフ」ハ
乾白ナルチスリユク止ナリ○是レ前條ノ撒余未介扶ス熱乾ノ製ス所ノ者ナリ○ナルチス

比スレハ常ニ可水氣ヲ已失スルコトナラズ水氣ヲ已失ス故ニ金ヲ可熱乾ノ間更ニ許多ノ酸素
ヲ吸收メ是ト抱合シ初メ半酸和ナル者終ニ成滿酸和ナリ故ニ復タ綠岩油中ニ溶
燬製ナルチス化スルコト出ハス水ニ和スル中ハ淡褐色ノ酸和ナリ鬼底ニ沈ス○製法「ナルチス」
右味最初先ツ是ヲ熱乾シ多時烈火上ニ是ヲ燬キ絡ミ色変メ暗赤色トナルニ至レ
右製中多時烈火ニ置クニ由テ可質中會所ノ綠岩油熱素ニ和メ氣形ヲ為
テ蒸散シテ間鉄ノ酸和ハ大氣ヨリ許多ノ酸素ヲ引キ赤色ノ酸和ナリ一
分ノ綠岩油ト和シ鬼底ニ止レ○此ノ前乾白比スレハ一分ノ綠岩油ヲ缺キ却テ
許多ノ酸素ヲ含ム
此物ヲ製スルニ鉄屑ヲ用ユル中ハ海鹽精ヲ費スル甚タ多シ可故ハ初メ先ツ多酸
素ヲ引キ酸和ナリ尋テ可剩餘中ニ溶化スレハナリ故ニ製中海鹽精ノ基素
多ク散逸シ熱素ニ和シ氣形ト蒸散ス此時沸騰ヲ發ス○若シ是ヲ製スルニ上
率ル所ノ格碌屈私末見扶斯ヲ以テスル中ハ鉄質既ニ綠岩油中ノ酸素ヲ得テ酸
和ナリ故ニ海鹽精ヲ費スル甚タサナリ速ニ可中ニ溶化スルコト得○鉄ノ酸和既海
鹽精中ニ溶化シ次テ火ヲ増シ水氣ヲ蒸散スル間多量ノ海鹽精必ス飛散ス此ニ於テ
一分ノ酸和自ラ散逸シテ「ウトレール」セル則外鉄鹽ト離レニ固物トナル可後リ
「ウトレール」セルハ火力ニ由テ上ノ鉄鹽ノ上邊ニ固着シ酸和ノ鬼底ニ止リ変

外鉄鹽
セー石

右味最初先ツ是ヲ熱乾シ多時烈火上ニ是ヲ燬キ絡ミ色変メ暗赤色トナルニ至レ
右製中多時烈火ニ置クニ由テ可質中會所ノ綠岩油熱素ニ和メ氣形ヲ為
テ蒸散シテ間鉄ノ酸和ハ大氣ヨリ許多ノ酸素ヲ引キ赤色ノ酸和ナリ一
分ノ綠岩油ト和シ鬼底ニ止レ○此ノ前乾白比スレハ一分ノ綠岩油ヲ缺キ却テ
許多ノ酸素ヲ含ム
此物ヲ製スルニ鉄屑ヲ用ユル中ハ海鹽精ヲ費スル甚タ多シ可故ハ初メ先ツ多酸
素ヲ引キ酸和ナリ尋テ可剩餘中ニ溶化スレハナリ故ニ製中海鹽精ノ基素
多ク散逸シ熱素ニ和シ氣形ト蒸散ス此時沸騰ヲ發ス○若シ是ヲ製スルニ上
率ル所ノ格碌屈私末見扶斯ヲ以テスル中ハ鉄質既ニ綠岩油中ノ酸素ヲ得テ酸
和ナリ故ニ海鹽精ヲ費スル甚タサナリ速ニ可中ニ溶化スルコト得○鉄ノ酸和既海
鹽精中ニ溶化シ次テ火ヲ増シ水氣ヲ蒸散スル間多量ノ海鹽精必ス飛散ス此ニ於テ
一分ノ酸和自ラ散逸シテ「ウトレール」セル則外鉄鹽ト離レニ固物トナル可後リ
「ウトレール」セルハ火力ニ由テ上ノ鉄鹽ノ上邊ニ固着シ酸和ノ鬼底ニ止リ変

鎮痛液
マルテス イキ
セ色

鉄壺内レ時、振掉シ浸ス、一兩日ヲ火ニ上セ煮テ半ク減シ瀘過シ此ニ六分
一桂精ヲ加エ固封シ貯フ右製中鉄ニ由テ楤樟汁中ニ含メル一分ノ草酸ヲ分
解シサ許ノ鉄質コレト抱合ノ半酸和トナリ終ニ剩餘ノ液中ニ溶化ス次テ瀘過
スルニ由テ可溶化セラル鉄屑ヲ分泌ス○此物製中海鹽精ニ由テ多ク硝石精中
ノ酸素ヲ吸収シカルベリナガスニ多ク散逸ノ氣中ニ升騰ス硝石精ノ基素酸素ヲ
散ルル海鹽精ハ是ニ由テホーフルゲニールドソウトニトナル即ケ多酸可後可過多
ノ酸素ト鉄屑ト抱合シテ鉄ノ酸和トナリ終ニ剩餘ノ修見中ニ溶化ス可後火
ニ上セ水氣ヲ蒸散スル申又サ許ノホーフルゲニールドソウトニトナル及ウトニ
此ニ於テ終乾ケル固鹽トナリ水ト交力尤モ強シ之ヲ温処ニ置ク中ハ頻リニ氣中吸
引ノ二日間終ニ流動体トナル至レ次ニ是ニ加フルニ亞的兒ヲ以テスル中ハ相抱合
ノ黃褐色ノ液トナレ可後是ニ亞的兒ヲ加ヘ日光ニ晒ラスニ由テ竟ニ色清澄ノ
液トナレ是レ光素ノ酸素ト交力甚ク強ク鉄ニ含メル一分ノ酸素ヲ奪ヒ去リ液色
全ク消失シ亞的兒去ク細ニ液中ニ混合スルノ徴ナリ○撈埵見曰ヲ曾テ此某

錫 酸和
「チオキセイナユ」

ヲ製スル後法ノ如ク天日ニ晒ス一二日ノ液色全ク清澄トナレリ是ヲ暗処ニ措ク
一兩月出シテ是ヲ見ルニ藥液再ヒ色ヲ生スルニテラス黃褐色ノ粉末鉄ノ酸和ナ
夥ク器底ニ沈降メ全質悉ク曇濁トナレ可兎口ヲ塞スルニ猶甚ク固封セリ兎口ヨ
リ外氣ノ出入ノ志ル者ニ非ス此ニ於テ全此液色ヲ消芒スル果ノ日光ノ所為ニ由ルカ如
何ニテ試シテ欲シテ再ヒ次日方テ是ヲ晒ラス三日ノ液中ノ粉末全ク溶解シ色全ク
消シ澄明潔白ノ液トナレ後大意ヲ用ヒテ是ヲ貯フルニ三月ヲ経テ殆ド復タ色ヲ生
スルニ故益々信ス此液ノ色ヲ失ハ実ニ光素ノ是レ酸素ヲ奪ヒ去ルモノナリ可再ヒ色
ヲ生スルニ暗中ニ於テ重テ酸素ヲ吸収スルモノナリ○製法 *W. P. H. (1871)* 洋製者
適宜右ニ味火ニ上セ全ク溶解候ニ是ヲ木函ニ封シテ結露ヲ以テ此ヲ以テ分リ殘余ノ錫ヲ取テ
レ急疾ニ振掉スル中ハ一分ノ錫變ノ粉末トナレ結露ヲ以テ此ヲ以テ分リ殘余ノ錫ヲ取テ
再ヒ火ニ上セ熔解シ又右ノ木函ニ入レ振掉スル初ノ如クシ亦粉末ヲ分テ取リ斯ノ如ク
スルヲ屢々シテ全料尽ク粉末トナレ至リ共ニ從テ水ニ投シ意ヲ用ヒテ振掉スルハ
ハ錫末ニ悉ク兎底ニ沈ヒ結露土ハ皆水面ニ浮漾ス可後尽ク上液ヲ傾ケ去リ

鉛
ロドダランニ

望末ノ取り乾錫屑中貯火ヲ以テ磁体ヲ温メ熱ニ朱ノ右錫末ヲ研磨
スルハ極細末トスルヲ得右製中強キ振掉ニ由テ錫ノ熔解セリ者尽ク粉碎
至細ノ球トナリ此無數細球振掉ニ由テ斷ハス轉動シテ周圍更ニ函内ノ大氣ヲ受
テ頻リニ氣中ノ酸素ヲ引キ是ト抱合メ半酸和トナリ錫熔解ノ方ニ熱スル故ニ酸
次ニ屢ニ熔解シ且振掉スルニ由テ悉ク變ノ酸和ト為ル○鉛鑽大抵硫黃ト混合
ス鉛純粹ナルモノハ是ヲ大氣ニ晒ラスハ氣中ノ酸素殊ニヨールストフニテ吸収シ大
中常ニヨールストフニテ
シニールトフニテ
上面ニ膜ヲ生ス
此膜ハヨールストフニテ
○鉛ハ金中ノ甚タ柔軟ナルモノ
張力サナク可質モ亦甚タ緊密ナラス可色灰白ナリ是レ水ニ浸セバ多時殆ト變
化スルナリ諸種ノ修見ト抱合スルニ總テ甘穠ノ味ト為リ可性毒甚タシクノ危害
アリ○製法 鉛純粹者適宜 右ニ味磁鍋ニ内レ烈火ニ上セ流動スルヲ候ヒ予
ヲ住メ攪混シ灰色ノ粉末トナルニ至リ研磨ノ極細末トナシ固封シ貯フ右製中
鉛大氣中ノ酸素ヲ引吸メ半酸和トナリ是鉛ト酸素ト本ト交力サナカラス然レ今
烈火ニ上ニテ大ニ熱シ且絶ハス是ヲ攪混スルニ由テ粉粹セル細球頻リニ轉動シ每球

鉛酸和
ロドオキセニテ

密陀醋
密ニテ

鉛醋
密ニテ

亜鉛

周圍ヨリ大氣ヲ引受スル故ニ氣中ノ酸素ヲ引ク尤モ速ナリ○此物製中ヨ
ドヲキセイデ 即ケ鉛酸和 亞鉛醋ト抱合シ且醋中過多ノ水氣ヲ蒸散ス○此物ハ是
レ前ノ密陀醋ト大抵異ナルヲナシ唯密陀醋比スルハ水氣甚タ多シテ殊ニ峻ナリ和言
テルクフルーイニドアセイニテニールトフニテ云○亜鉛ハ鑽アリ又自態酸和アリ然レ酸和ノ炉胆
石是ナリ可中微ニ土質ハ鉄質トフ合ム亜鉛ハ鍛冶スヘキ者ニテラス故ニ諸ノメドバニテ
レニ 諸金ニテ 異ナリ又是ヲ打テ薄片トナスヘク粉末トナスヘカラス故ニ又諸ノメドバニテ
ベレニニールトフニテ異ナリ又此物右ノ二種ノ諸金ト大ニ異ナル所ハ之ヲ取テ少時烈火ニ接
スル則ニ速ニ鮮明ナル光焰ヲ發シテ焚燒シテ綿絮狀ヲナシ器内ノ周圍ト燃余ノ
亜鉛ノ上面ニ附着ス○製中烈火ニ由リ熱勢大ニ増シ亞鉛酸系ト交力酸素ト
熱素トノ交力ニ過ルハ忽チ氣中ノ酸素吸収シ是ト抱合シテ亞鉛酸和ト為リ熱
素ノ酸素ヲ失ヒ新タニ散逸セルモト合和シ焰氣トナリテ外騰シ終ニ綿絮ノ狀ヲナシ
坩ノ周圍及燃余ノ亜鉛ノ上面ニ着ク是ヲ由テ外氣ノ通路ヲ絶スルハ焰氣頓ニ滅ミ
フ抄と取ル中ハ復タ忽チ発ス○既ニ製シ終ルハ可秤量四分ノ一ヲ増ス 酸素ト抱合
合スル故ナリ

酸和
シニキオキセイニテ
亜鉛萃
密ニテ

スビースガランシ

皓礬

レモ可固有ノ重力ノ幾シト減損スルヲ知ラス可後は水ニ溶カス片ハ可末全ク酸和
セスメ猶金形ヲ存セル者ハ皆光底ニ沈降シ塗査ト为レニ自ラ分必スルヲ得カルナリ
○製中亜鉛ニ由テ水質ヲ分解シ水中ノ酸素ト亜鉛ト抱合シ亜鉛酸トナリ次テ錫
砒油中ニ溶化ス此時水素ハ熱素ト共ニ酸素ヲ失テ散逸シ気状ナシテ分騰ス故ニ必ス
沸蒸スルナリ右ノ製中ノ初メ亜鉛中ニ溶化スル片ハ黑色ノ塗末ヲ生スルアリ是レ亜鉛
ニ含銅ノ可トリストフビクナリ是瀝過シ他ノ汚物ト共ニ淨除ス可後水気蒸
散シ放冷スルニ由テ終ニ結芒スルナリ

スビースガランシ

此者ハシリキバールメターニシテアンチモニーニトスワフルホウテントスビースガランシト相混ズルモノ有リ
若シ是ヲ土埵内ニ可トシ蓋閉シ火トナリ埵底通ナルノ後自ラ溶解ス若シ可埵ロ
掩ス火トナリ置キ片ハ酸素ヲ引キテ酸和トナリ白色ノ煙氣ヲナシテ升ル土埵周圍及ヒ
煖余ノシリキスガランシト上面ニ銀形ノ芒刺ト为テ固着ス○スビースガランシノ半酸和ハ劇
シク催吐藥ナリ是レ又ニ成滿ノ酸和ハサモ催吐功ナシスビースガランシニ固圀ノ有レ絶
純粹ノモノナレハ必ス硫黃土質若クハ石質ヲ挾ム故ニ近人熔解シテ是ヲ淨除シ安質

ノタールサフラン

石

没扭ト名ケテ世間ニ化貝ス○スビースガランシノ純否ヲ鑒定スルノ法「シリカガランシ」ニ多
ヲ取り是レ三分ノ硝石ヲ研和シ是ヲ埵上通江ノ埵中ニ投スルニ燒燬スルノ後埵ニ殘
野ノモノ純白色ナルキハ則純粹ノ「スビースガランシ」トス黃色ナル者ハ鉄ヲ混シ綠色ナ
ルモノハシリキエインステーニシテ混スル者ナリ宜ク淨製メ聽用ス○製中「スビースガ
ランシ」ニ由テ硝石ヲ分解シテ酸精即チ硝精ヲ分テ室素ト酸素トナス酸素ハ可強キ交
カニ由テ硫黃「シリカガランシ」中ニ在ルシリカヲシリカト抱合シ半ハ成滿修見即チ硫
半ハ未成ノ修見即チ硫精ト成リ又忽ケホットアス硝石ノ及剩余ノ硫黃ト抱合ス「スビー
スガランシ」モ又一分ノ酸素ヲ引受シ終ニ褐色ノ半酸和トナリ此間室素ハ熱素ト和シ気
形ヲナシ自ラ飛散ス故ニ右ノ製中得ル者ハシリキワールフルニシテホットアス硫黃精ト
相混ズホットアスニ抱合
セルモノニナリシリキエインステーニシテシリカガランシトオキセイデ
ルサフラン及ヒシリキワールフルニシテシリカト抱
合セルモノニナリ相混ズ成ル野ノモノナリ可後沸湯ヲ以テ屢々洗淘スルニ由テ可混合スル中和塩
及シリキワールフルハ悉ク溶解流渙シ去リ余スル者ハ唯純粹ノシリキエインステーニシテシリカ
オキセイデトナリ○製中綠砒油ヲ強キ交力ニ由テ海塩精ヲ驅逐シシリキエインステーニシテシリカト抱合シ

亞鉛尾碌扶散

安質沒扭酒

七名
金硫黃
石

篋頭ニ抄ヘル染料忽テ暗色ノ汚膜ヲ生シ是レヲ製スルモノ誤認シテ燒燬尚未タ足ラ
 ストメ火上ニ置クヲ甚タ久シク酸素ヲ引クヲ終ニ可度ニ過キ透明硝子質ノ看却テ
 曇暗灰色ノ塊トナルヲアレナリ○此者製中フルガラストスヒースガウスオキセイキユニ
 即チ前條
 ヒットリユム 一分酒中ニ溶化シ催吐ノ功ヲ為スナリ○此物製中釐乙典珥羅屈硫黃
 アンチモニー 一 抱合メヨワーフルーフルト为リ次テ「スビースガウス」ニ溶化シ「スビースガウス」オウデンテズワーフル
 一フルト為リ可後煮ト「サ時」ナルキハ「ヨワー」ヘリ「ヨワー」テルストフガスニ漸ク分離并登ス次テ放
 冷シ瀘過シ綠砒精ヲ滴加スルニ由テ更ニ夥シク并登ス惡臭多ク蓋散スル物はナリ○此「ヨワー」ヘリ「ヨワー」
 テルストフガスノ生スル所ハ「硫黃」ト「アス」ト抱合スル中ハ「酸素」ト交力甚クシ故ニ水中
 含所ノ一分酸素ヲ引キ是ト抱合シ「スビースカチニス」亦酸素サレ引キテ半酸和
 トナリ是ニ由テ水ノ酸素ヲ失ヘル者水素トナリ又サ許ノ硫黃ト和レ竟ニ「熱素」ニ朱
 メ気形ヲナシ飛散ス是レ「ヨワー」ヘリ「ヨワー」テルストフガスナリ綠砒精ヲ滴和スルニ由テ「ヨ
 ワー」フエリ「ヨワー」テルストフガス多ク蒸発スル所ハ「綠砒精」ヲ加フル中ハ直ク「ヨ」ト「アス」ト
 抱合シ初メ「ヨ」ト「アス」ニ含所ノ硫黃是レカ为ニ尽ク驅出セラレ水ニ混入シ水中ノ酸

ケルメス三子テー
セ(色)

素ヲ引クノ尤モ多ク且速ニシテ水素ノ酸素ヲ失フテ散逸スル者随テ棄ケレタリ問曰
此奇製中ノ液冷スルハ則ケ渾濁スルハ何ソ答曰製中火力ニ由リヨビテデローシ硫
黄ヲ溶化スルハ甚タ常度火力ニ由ラ
カルタイフニ過ク故ニ火ヲケシ熱気ヲ失フハ初メノ如ク溶
化レ留マリト出ハス大半硫黄漸々分離メ塗查トナリ液中ニ溶化スル者ハ僅ニ可一分ニ
過キス是ヲ以テ可液冷ニ隨ヒ漸ク渾濁ニナルナリ此液ヲ瀘過スルニ必ス是放冷スル
後ニ於テスルモ亦此理ヲ以テ故ナリ若シ温メ来メ瀘スルハ冷
後必ス又渾濁スルナリ○此物製中ヨリトアスト硫黄
ト自ラ抱合シ次テコズビースカラニスト混和シコズビースカフニスホウデシズワフルト为ル又煎煮
ノ間コズビースカラニスト共許ノ硫黄ト共ニ水中ノ酸素ヲ引キ是ニ由テコズワヘリフワテルス
トフガニ生ス上ノコズビースカラニスホウデシズワフル水中ニ溶化ス○藥液煎沸スルノ間
右ノ諸物ヲ溶化スルハ甚タ常度ニ過ク故ニ藥液冷スルハ自ラ分離メ褐色ノ塗渣ト
ナリ鬼底ニ沈シ液中ニ溶化スルモノハ僅ニ可一分ニ過キス可塗末ヲ分ケ取り可上清ノ液ニ
濾紙ニ殘レル粗滓ヲ加ヘ再ヒ煎煮スルハ又可中分ノ藥料ヲ溶化ス重テ瀘過シ
放冷スル後鬼底ニ沈ム塗末ヲ取り又可上清ノ液ニ紙上ノ粗滓ヲ加ヘ煮ユル始ノ如ク

「アスワールスウェーデン
エンスピースカリス」

「アウトレース
ガラン」

「アスワールスウェーデン
エンスピースカリス」

ノ如クスル数回可終リサシモ液ニ溶化スルモノ無キ至リ毎回分テ取ルモ塗末ヲ集メ水ニ
テ洗ヒ尽ク羅僞塩氣ヲ去リ乾カレ貯ルナリ同曰金硫黄ト曰ルモミラールト何ヲ以テ異
ナルヤ答曰曰ルモミラール金硫黄ト比スバアスワールスオキセイチユレヲ含ム較多シ金

硫黄二分アスワールガランスオキセイチユレ三分硫黄ト合和シ成ルメタルミラールト三分ノ

硫黄ト合和シ成ル是ニ葉ノ同シカラサル所ナリ○製法金硫黄一分生石灰新焼

右ニ味先ツ精細ニ研和スル後三十分ノ沸湯ノ注キ磁体ニ盛リ文火ニ上セテ手ヲ

佳ノス攪滾シ乾キテ黃色粉末トナル至リ硝子タンニ内ニ固封シ貯ル此物製中在灰

金硫黄ト抱合シアスワールスオキセイチユレヲアルル一種トナル此物テ硫黄由

水中ノ酸素少許ヲ吸収ノ是ト抱合ス故ニ水素依テ偶々失ヒ散逸シ熱素ト和シ気形ヲ

為メ散散ス○製法アスワールスオキセイチユレニ水銀四分硫黄一分右石臼ニ内ニ細研和シ水銀全

星ヲ見カレ至リ製中先ツ水銀硫黄ト抱合スルヲコチオアスミラールト知リ而後アスワールス

ト抱合ス水銀トコチオアスミラールトニ海塩ハ乾者緑茶

油五分雨水四分右メタルカフランド海塩細ニ研和シコトル止ニ内ニ徐々ニ緑茶油ヲ滴

加シ最初先ツ雨水ヲ以テ沙火ニ安シ是ニ硝子管ヲ接シ又巨口ノ蒸餾タツ冷水ニ浸シ右硝

子管ノ一端ヲ以テ可ニ挿シ溜滴ヲ受ク最初文火ヲ加シ漸ク火ヲ加シ溜滴全

止ム至リ急ニ越人入號之診過親中底子問を曰太子病辛血氣交錯ヲ精神ヲ害シ奪テ死ス帝

○他ノ硝子タンニ移シ収メ密封シ貯ル右ノ製中緑茶油攪連ト抱合シコトル止ニ海塩ヲ配

逐々此ニ於テコトル止ニ直ニメタルカフランド海塩ト抱合シコトル止ニ水銀

溶化シ竟ニ熱素ヲ和メ相共ニ氣形ヲナシ蒸餾タツニ移リ再ヒ熱素ヲ失ヒ液状ヲナシテ点滴ス

○此者製中酒在英饒余修兒ト見瓦碌扶ト抱合シコトル止ニ海塩ヲ配

為リ水中ニ溶化シ次テ酒在英饒余修兒ト見瓦碌扶ト抱合シコトル止ニ海塩ヲ配

素安質モニト抱合ス後水氣ヲ蒸散シ次テ於冷スルニ由テ必ス結ス○此物可成質果

片状ニナリ色帶青光沢アリ是ヲ大ニ晒ラセハ黃色若クハ赤色トナリ稍ニ曇ヲ生ス此

物多サ柔軟ニ且是ヲ搗ケハ速ニ粉末トナル若シ是ヲ坩ニ盛リ蓋閉シテ火ニ上スヤハ

速ニ溶解ス若シ蓋閉セスノ是ヲ熔解セシムルヤハ丁上面酸和ヲ生ス若シ燉ヲ通紅トナルニ

ルヤハ徐々ニ青燐ヲ生シ且ツ帶黃色ノ酸和トナリ外散ス此物初ヨリ金硫黄モノ有ス

鑽

〔名〕

「アスワールス
エンスピースカリス」

鑽

質ノモノアリ 鑛質ノモノハ 硫黄ヲ以テ 混清ス ○製法 淨製硝石精 水等分ヲ「イヌミスト」硝
精ト飽和
スルヲ度トス 右ニ味先ツ「イヌミスト」ヲ 搗キ 粗末トナシサ 許ツ 硝石精中ニ 投じ 可終リニ味全ク飽
和 硝石精復タ「イヌミスト」ヲ 溶化スルヲ 出ハスニ至リ 瀝過ス 是ヲ 取テ 徐ニ「イヌミスト」量
三ニ倍ノ 蒸餾水ニ 投じ 上清ヲ 傾ケ 去リ 白泥ヲ 取り 濾紙ノ 漏斗ニ 盛リ 悉ク 酸液ヲ
洗除シ 全ク 乾テ 後 溫暖多蔭ノ 處ニ 於テ 蒸餾水ヲ 以テ 洗淨スルヲ 二回 是ヲ 硝子多ク 内
レ 黒帛ヲ 以テ 可外ヲ 包ミ 固封シ 貯フ 右製中「イヌミスト」ニ 由テ 硝石精中ノ 酸素一分ヲ 引
キ 収メ 酸和ト 爲リ 饒余ノ 修見中ニ 熔化ス 此時 酸素ヲ 失ヒ 散逸スルヲ 可カルテ テリ フオキ
セリデハ 酸素ニ 和シ カルテ テリ フガ ストナリ 気狀ヲ 爲シテ 升騰ス 可後 多ク 水ヲ 加フルニ 由テ
修見ノ 力大ニ 衰弱シ 可中ニ 溶化セル「イヌミスト」 酸和ヲ 保持スルヲ 出ハス 酸和唯至サ 硝
石精ト 抱合シテ 底ニ 沈降ス 次テ 瀝過シ 又 洗淨スルニ 由テ 悉ク 汚染セル 修見ヲ 除卻
メ 純一ノ 酸和トナシ ○ 黒紙ヲ 以テ 硝子ヲ 蓋色スルハ 光素ノ 酸素ヲ 引キ 去ルヲ 防遮スルヲ 爲
メナリ ○ 昆設 尔弗ヲ 製スルノ 間 沙糖ト 植物ノ 體質ト 自然ノ 抱合スルモノ 幾シト 希ナ
リ 唯下 體質 含ムル 水様ノ 部分ヲ 以テ 砂糖ヲ 溶化スルニ 自然ノ 抱合ト 結スハケレヒ

奇方
昆設 爾弗

浸奇煎

可餘ノ 配合ハ 皆全ク 以テ 是ヲ 爲スナリ ○ 浸奇ハ 熱氣ヲ 用テ 煎奇ニ 比スルハ 甚ク サナリ
藥氣ヲ 損スルヲ 至テ 微ナリ 凡ソ 此ニ 用キ 品 可 物質 甚ク 脆軟ニ 速ニ 水中ニ 溶化スル
且 是ヲ 煎煮スルハ 可効ヲ 奏スルニ 部分ノ 甚ク 揮発スルヲ 爲メ 速ニ 飛散スル者ナリ 煎
奇 是ニ 及メ 煮沸スルヲ 甚ク 久シ 故ニ 此ニ 用キ 品 然テ 可 物質 硬固ニ 久シク 煎煮ス
ト 云トモ 藥氣 耗散セズ 可 功ヲ 奏スルヲ 揮発走竄ノ 部ニ 行ラズ 長ク 煎煮スルニ 非レハ 可
功力 水質ニ 分附スルハ 可 物 乾中 可 功力 華 尔弗ニ 比テ 物ノ 如キ 是ナリ ○ 此奇 水氣
ヲ 蒸散スルヲ 甚ク 多ク 可 質 尤モ 稠厚トナリテ 揮発ノ 部分ハ 大半 飛散ス 或ハ 製中 太氣
ノ 胃腸ニ 由テ 諸變化メナスモノナリ 此數ハ 件 共ニ 煎奇 及 浸奇ニ 異ナルヲ 以ナリ ○ 草木
ノ 生汁ヲ 取リ 「イヌミスト」トナス者ハ 可 製同シ カラサルト 可 藥ヲ 加ヘ カルトニ 由テ 乾草ノ 「イヌミ
スト」ト 異ナリ 是ニ 用テ 諸品 或ハ 浸奇トナシ 或ハ 蒸餾ノ 露水ヲ 取リ 更ニ 是
ヲ 煎煮シ 或ハ 絞テ 可 生汁ヲ 取リ 是ニ 砂糖ヲ 加エ 法ノ 如ク 是ヲ 製ス 砂糖ハ 奇中ノ 水分ニ
溶化シ 次テ 可 水中ニ 含ムル 草ノ 實質ト 混合ス ○ 植物ノ 引「イヌミスト」 羅甸 是ヲ 可 引「イヌミスト」 甚
タ 舍利 另ニ 似タリ 唯「イヌミスト」 菓實ノ 軟肉ヲ 取リ 搗爛シ サ 時 是レヲ 煮ル 後 絞リテ 淨ヲ

イヌミスト

舍利 另

傑 庚

傑列乙

醋奇

酒奇

燒耐酒奇

「スレイム」

植物粘油
諸精油美

去リ再煮テ多ク水氣ヲ蒸散シ沙糖ヲ加フルト舍利另ヨリ甚クサナシ是レ舍利另
異ナル所以ナリ○羅甸是ヲケラケト云フ是レ生液汁ヲ以テ製スル者ニ非ラス植物ノ水ヲ
煮テ質中ノヨシト粘汁トヲ瀉出シ製スル者ナリ又「動者ノ者」
法ニ從テ動物体中ノ膠質ヲ瀉出シ製スル物ナリ共ニ水氣ヲ蒸散スルト尤多ク凝固
スル至リ○醋奇ハ且ニヨシト粘汁トニミラ瀉出スルニ非ラス又ヨリ植物質中揮発油ヲ瀉
出ス揮発油ハ長ク香素ヲナス故ニ醋奇ハ芳香ノ氣ヲ含ム○酒奇ハ藥料ヲ酒中ニ浸漬
スルノ間物質中ノヨシト粘汁揮発油及華爾斯共ト酒中ニ飽和スバニ飽和スルハ復
多ク可中ニ溶化スルヲ去ハス是ニ混和スト雖ニ靜止スルハ自ラ分離ス燒耐ヨリ物質中ノ
華爾斯ト揮発油ヲ溶化スルニ尋常ノ燒耐ハ必ス多ク水氣ヲ含ム故ニ又多クヨシト
質ヲ溶化ノ可中ニ拔膏ス是ヲ以テ唯藥奇中ノ華爾斯ト揮発油ノミヲ溶化セシト欲スルモ
ノハ純粹ノ燒耐ヲ用フルヲ要ス○此物唯水中ヨシト溶化スルモノナリ
此物炭素水素及少許ノ酸素ヲ以テ合成スルニ可配奇ノ比量ハ一定スルヲナシ物ニ
随テ各々異ナリ此物植物揮発油ト異ナル所以ハ唯食所ノ炭素ノ多クニ係リ粘油
油ニ此スル炭素ヲ
含テ更ニ多シ

粘油ハ火ニ上セ熱度沸騰スルト雖ニ飛散スルヲナシ却テ可質漸ク分
離ス揮発油若シ此熱度ニ至ルハ直ニ熱素ヲ和シ氣形ヲ為メ稍ニ飛散ス

獸脂

是ヲロトルトニ内ニ煎餾スルハ酸水燒油「アラシチ」出テ又許多水素炭酸「アールスト
共ニ氣形ヲナシ騰出スロトルトニ止マルハ物ハ唯光彩アル黒炭ノミナリ此黒炭ヲ取テ
灰ト為ル時ハ「カール」ニ「カル」ト純粹ノカールナリ○上ニ云煎餾シテハ酸水一種ニ修
児ヲ含メリ此修児諸種ノ修児ト異ナリ是ヲ淨製スルモノヲ「ワット」ニト云フ此物常
ニ獸脂ノ中ニアリ獸脂ニ純料ノ石灰ヲ加ヘテ溶解シ是ヲ綠岩油ヲ加ヘテ煎餾スルハ
則テ是ヲ「ワット」○製法家猪脂「淨製者」硝石精「一」右家猪脂ヲ磁鍋ニ内ニ文火ニ上セ溶
解スル後是レ硝石精ヲ注キ硝子管ヲ以テ予ヲ止メス攪滾シ少時ノ後是ニ「ワット」ムスサ
「ワット」以テ滌タル青紙ヲ浸ス可ク色サシモ變セサルニ至テ止ム此奇純自ヲ要ス已ニ製シ終ル
後蓋ヲ滌着セリ所ノ修児ヲ淨除シ磁蓋ニ内ニ密持シ冷所ニ貯メ右製中硝石精

「アルシエール」デ、オ
レイ、フ、オー、リー

猪脂ニ由テ分析セラレ酸素猪脂ト抱合シ窒素些少ノ酸素含ミ熱素和シ気形ヲ為
シカレベテリ、フ、ガ、ス、ト、ナ、リ、テ、能、散、ス、リ、ク、ム、ス、サ、ツ、ブ、ノ、油、紙、ヲ、浸、メ、色、ヲ、変、セ、カ、ル、ハ、硝、石、走、ク、介
折セラレ猪脂ト飽和スルノ徴ナリ。○製法、阿利、襪、油、十、六、号、右、一、味、硝、子、タ、ン、ノ、潤、大、ナル、者、ニ
内、ニ、是、ヲ、冷、水、若、ク、ハ、雪、中、ニ、安、シ、是、ニ、引、込、ユ、ア、ト、レ、ト、止、メ、長、頸、ナル、物、ヲ、接、シ、可、頸、側、ノ
孔、ヨリ、左、ノ、諸、葉、ヲ、加、フ、海、塩、セ、リ、ア、ワ、ル、ト、ブ、リ、ユ、シ、ス、テ、ン、オ、キ、セ、イ、デ、四、号、再、縮、緑、岩、油、水、半、
比、量、ノ、加、フ、者、接、際、ヲ、固、封、セ、ス、海、塩、精、ノ、升、騰、ス、ル、モ、ノ、サ、メ、密、塞、ス、ル、ヲ、ナ、シ、シ、メ、カ、タ、メ、ナ、リ、煙、窓、ノ、下、ニ、於、テ、ア、ワ、ル、ト、止、メ、微、火、ニ、上、テ、徐
ニ、縮、滴、ス、火、氣、稍、過、ク、レ、ハ、蒸、餾、タ、ン、ヲ、熱、セ、シ、ム、カ、故、ニ、油、ト、酸、素、ト、抱、合、ス、ル、ヲ、去、ハ、ス、海、塩、精、多、
カ、故、試、ミ、可、接、際、ヲ、嗅、ク、ニ、精、氣、殆、ン、ト、認、ム、ハ、カ、ラ、ル、ヲ、佳、ト、ス、斯、ノ、如、ク、微、火、上、ニ、置、ク、一、二、日、若
ク、ハ、三、日、ナ、ル、ヘ、シ、夏、日、四、日、ヲ、經、ル、ニ、非、サ、レ、ハ、飽、和、ス、ル、ヲ、去、ハ、ス、可、間、時、ニ、蒸、餾、タ、ン、ヲ、振、掉、ス、ヘ、シ
殊、ニ、早、朝、蒸、餾、タ、ン、冷、ム、ル、キ、ハ、於、テ、ス、ル、ヲ、佳、ト、ス、○此、法、ニ、由、テ、製、ス、ル、斯、ノ、奇、ハ、阿、利、襪、油、酸
素、ト、熱、素、ト、抱、合、ス、ル、ヲ、可、質、稠、粘、シ、テ、濃、膏、含、利、另、ノ、稠、ヲ、得、ル、ニ、至、ト、一、ニ、製、煉、已、終、リ
右、ノ、油、奇、ヲ、取、リ、テ、是、ヲ、冷、水、ニ、テ、洗、淨、シ、可、上、面、ニ、添、着、セ、ル、此、ヲ、海、塩、精、ヲ、除、去、シ、可、後、是
ヲ、硝、子、壺、ニ、寫、シ、精、密、ニ、固、封、シ、冷、ノ、所、ニ、貯、フ、右、ノ、製、中、綠、岩、油、海、塩、ア、ワ、ル、ト、止、メ、抱、合、シ、海、塩

「デス、ワ、ー、ヘ、ル、デ、イ、
オ、ー、リ、ー」

精ヲ驅逐ス海塩精ハ驅逐セラレテ散逸シ可強キ交力ニ由テアリ、ユ、イ、ン、ス、テ、ン、オ、キ、セ、イ、デ、含
メル、一、分、ヲ、吸、引、シ、リ、オ、ト、フ、ル、ゲ、ニ、ユ、ル、テ、ソ、ウ、ト、レ、ユ、ル、多、海、塩、精、熱、素、ニ、和、シ、氣、形、ト、ナ、リ、テ、蒸、餾、タ、ン、
ニ、入、リ、壺、中、ノ、油、上、面、ニ、冒、觸、シ、直、ニ、可、酸、素、一、分、ヲ、奪、ヒ、去、ラ、ル、時、ニ、蒸、餾、タ、ン、ヲ、振、掉、ス、ル、ニ、由、テ、油
ノ、上、面、逐、時、改、メ、リ、故、ニ、終、ニ、悉、リ、酸、素、ト、飽、和、ス、ル、ニ、至、ル、製、法、亞、麻、油、一、号、硫、黄、華、ニ、三、号、右、微
火、ニ、煮、硫、黄、華、全、ク、溶、化、ス、ル、ニ、至、ル、○右、製、中、硫、黄、油、混、和、ス、ル、時、ニ、方、テ、硫、黄、ニ、由、テ、亞
麻、油、含、メル、一、分、ノ、酸、素、ヲ、吸、引、シ、硫、黄、コ、レ、ト、抱、合、シ、酸、和、ト、ナル、此、ニ、於、テ、油、中、ノ、水、素、ト、炭、素
ト、當、志、ノ、配、合、ヲ、失、ヒ、自、持、ス、ル、ヲ、去、ハ、ス、直、ニ、本、々、油、ノ、分、折、セ、ラ、レ、サ、ル、物、ト、和、シ、硫、黄、ノ、酸、和、ト、抱
合、ス、已、ニ、酸、和、ト、抱、合、ス、ト、雖、モ、猶、絶、ハ、ス、ア、ワ、ル、ト、止、メ、ア、ワ、ル、ト、止、メ、ユ、イ、ン、ス、テ、ン、オ、キ、セ、イ、デ、蒸、發、ス、ル、此、奇
ヲ、製、ス、ル、者、最、モ、心、ヲ、用、ユ、キ、ハ、硫、黄、油、已、ニ、抱、和、ス、ル、ヲ、見、ハ、速、ニ、火、ヲ、下、ス、ニ、在、リ、否、ラ、サ、レ、ハ、油、質、全
ク、分、折、セ、ラ、レ、ア、ワ、ル、ト、止、メ、ユ、イ、ン、ス、テ、ン、オ、キ、セ、イ、デ、頻、リ、ニ、散、逸、シ、サ、料、尽、ク、鬼、外、ニ、溢、
流、ス、ル、ニ、至、ル、○硫、黄、油、抱、合、ス、ル、ヲ、知、ル、ノ、法、此、奇、ニ、二、滴、ヲ、取、リ、硝、子、若、ク、ハ、磁、皿、上、ニ、点、滴、ス、ル、硫
黄、分、滴、ス、ル、候、ナ、リ、硫、黄、黄、鼻、ニ、入、カ、ル、ハ、則、ケ、硫、黄、油、抱、合、ス、ル、ノ、徴、ト、ス、○此、物、製、中、最
初、水、ヲ、以、テ、蘇、蓬、塩、具、ト、生、石、灰、ヲ、煎、煮、ス、ル、ニ、由、テ、蘇、蓬、塩、中、ニ、含、メル、コ、ー、ル、ス、ト、フ、レ、ニ、ユ、ル、石、灰、

白石鹽

ニテ吸収シ鹽類ノ性最モ猛烈トナル可後瀝過メ石滓ヲ去リ更ニ火ニ上セ饒多ク水氣ヲ
蒸散シ是ニ油ヲ加フルハ速ニ抱合シ硬固ニキル水中ニ溶化スヘキ自色ノ石鹼トナル

問曰尋常礞砂揮発膏名物老銳烈礞砂揮発膏名此ハ油ト羅偏鹽ト抱合

スル丁甚タ固密ナラザルハ何ソヤ答曰是レ全クコールストフシエールノ有無ニ係在セリ何者コ

ールストフシエールハ甚タ油ト羅偏鹽ト抱合ヲ妨ケ銳烈礞砂揮発膏ハコールストフシエール

ヲ含マズ尋常礞砂揮発膏ハ多ク是ヲ含ムヲ以テナリ○製法药刺巴脂白石鹼名ニテ

燒酒ニ十度ノ者分量药刺巴石鹼 右ニ味全ク溶化スルヲ候ヒ火ニ上セ熬散シテ丸料ノ調ト

ナルニ至ル問曰此奇水ヲ用ヒス燒酒ヲ用ユルハ何リ答曰燒酒長クニ物ヲ溶化スレハナリ

水ハ主石鹼ヲ溶化スレハ药刺巴ヲ溶化スルヲ去ハス故ニ物抱合ス油ハ主ク植物ニ含

ム所ノ揮発油及萃尔斯ヲ溶化ス○山物揮発油ヲ問曰琥珀ワ淨製スルニ水ヲ加ヘテ

煎餾スルハ何リ答曰琥珀油ノ中ニテ暗褐色ヲ起因スル物ハ炭素ナリ炭素ハ沸湯ノ

熱一度ニ升發セズ故ニ水ノ煮沸スル中ニ方テ唯揮発油ノ熱素ニ和シテ蒸騰シ蒸餾

タルニ滴シ炭素ノ酸和却テ列篤尔篤中ニ止マル是レ水ノ加ヘテ蒸餾シ清稀ノ油

油奇
藥味ヲ以阿
利模油ヲ浸
スモノ

植物揮発油

ヲ得ルハ此ナリ○凡ク植物ノ皮葉花実等ニ含メル揮発油ハ水ノ煮沸スル熱度ニ及
ニテ直ニ熱素ニ和シテ蒸騰シ水ノ蒸氣ト共ニ蒸餾タルノ内面ニ達シ熱素ヲ失ヒ

液形ヲナシ蛇管ニ由リ蒸餾タルニ滴シ水ノ上面ニ浮漾ス但シ印度方ノ香窠草主

丁子ノ如キハ可油ノ重量水ニ勝サルカ故ニ水底ニ沈降ス○此物ヲ製スルニ木炭ノ

ホヲ用ユルハ鹿角油ノ暗黒色ヲ淨除スル為ナリ炭素ホ炭ニ色素油中ニ在テト抱合シ色

素ヲ可揮発ノ性ヲ失ヒ微熱ニ由テ外騰スルヲ去ハサシム故ニ唯清稀白濁ノ精油ノミ

去ク蒸餾タルニ滴スルナリ○此物製中最も未タ蒸餾セザル中ニ已ニコールストフシエールニ由テ多分

ノ水氣ヲ脱スホットアス水ト交力甚ク強ク可後ホットアス全ク水氣ヲ引クヲ去ハスニ至リ更ニ

火力ニ由テ助ケテ是ヲ吸引セシム故ニ此ニ於テ三十二度ノ亜見箇見ヲ得再ヒ是ニ加フルニ

ウトシエールカルキヲ以テ更ニ蒸餾スル中ハ又一分ノ水氣ヲ吸引シ終ニ三十四度ノコアルカルキナ

ル是ヲウトシエールカルキト水ノ交力アル大ニホットアスニ勝レハナリ○此物製中熱氣ヲ

生ルル所以ハ綠蓉油燒酒ト抱合シ又燒酒ニ含ム所ノ水ト抱合スルヲ以テナリ可水可熱素ハ

ヲ保持スルカ大ニ衰弱ス故ニ可含ム所ノ熱素大ニ散逸シ液中ヨリ外騰ス此時熱勢ヲ

コイル油
名

アルコール

収歛的兒
名

亞的兒
〔名〕

起発スルナリ故ニ綠蓉油ヲ滴ル毎ニ可硝子タシ冷ムヲ待テ是レヲ滴セス一尙ニ多ク滴
加シ可液ヲシテ大ニ熱沸セシムギハ酒精大ニ損耗ス宜ク意ヲ用ユキナリ○此奇ヲ製スル
間アルカールニ綠蓉油ノ介折スルニ非ラス綠蓉油却テアルカールニテ介折ス試ニ二個同量
同質ノ綠蓉油ヲ取リテ可一ハ亞的兒ヲ製スルニ用ヒ可一ハ另ニ藏メ貯ヘ既ニ亞的兒製
シ終ルノ後亞的兒ヲ製スル為ニ用ヒテ貯メ綠蓉油ト藏メ貯ヘレ綠蓉油ヲ比較スルニ可
量サモ減却スルヲ無ク又是レニ羅屈鹽ヲ加フルニ何レモ同分量ノ羅屈ニ由テ始メテ飽
和ニ是此劑ヲ製中綠蓉油少シモ介折セラレカハ明徴ナリ○アルカールニ成分ハ炭素
水素及酸素ナリ亞的兒ヲ製スルノ間最初清稀白五ナル綠蓉油漸ク変シテ
暗褐色トナル是レ亞爾箇兒ニ含ム貯メ炭素ナリ明ケレ可故ハ炭素ハサレテ酸素
ニ和スルハ黑色トナル今此奇ヲ於テアルカールニ含ム貯メ炭素綠蓉油中少許ノ
酸素ト抱合シテ黒色ヲナス者ナリ且炭素ハ水素ニ比スレハ甚メ重シ是レ又アルテルヲ
アルカールニ比スレハ甚メ輕量輕キ貯メ以テ此ニ於テ當ニ明カニ識得スヘシ亞的兒ヲ
製スルニ用ユルニ可一綠蓉油ハ實ニ綠蓉ヲ以テ亞爾箇兒ノ一成分ニ引キ去リテ亞

消石亞的兒
〔名〕

海鹽亞的兒
〔名〕

アセインアール
〔名〕

的兒トナスガ為ニ用ユル貯メ物ヲ決シテ亞爾箇兒ヲ以テ綠蓉油一成分ヲ引取
テ亞的兒トナスガ為ニ用ユル貯メ物ニ非カルナリ○亞爾箇兒ニ已ニ綠蓉油ニ由テ可炭
素ヲ引キ去ルト雖モ炭素ヲ脱スルニ非ラス尙至テ炭素ヲ含ム是ヲアルカール
テルト云フ熱素ニ和シテ氣形ヲナシ蒸餾ニ入リ熱素ヲ失ヒ大氣中ニ在リ壓束ニ由テ
再ニ液形ト為テ点滴ス○今余諸種亞的兒ノ如キモ亦必修見ト亞爾箇兒ト或ハ彼
或此ト或ハ彼は一存多サ介折セラレテ亞的兒トナルニ非ルハナシ○此奇消石精ト亞
爾箇兒ト浸漬スル間少シ火カヲ燉ラヌ唯水氣ニ媒助ニ由テ二液自ラ相抱合ニ亞的兒トナリ
水ニ燒酒ニ下後蒸餾スルニ唯コレヲ淨製スルカ多ナリ○此奇ハ多酸海鹽精ヲ火カヲ助
メ待テ亞的兒トナルニ創中アルユイニステーション
故ニ此奇ハ酸素ヲ含ム一むモタシト知ルヘシ
此奇製中蒸餾醋ノ利トナスニ抱合セルモノ綠蓉油ニ由テ驅出セラレ却テ亞見箇兒ト合
テ亞的兒トナル故ニ此奇ニ於テハ亞爾箇兒ト蒸餾醋ト両ナカラ介折セラル者ナリ
奪ヒ去ラレ蒸餾醋利トナスヲ奪ヒ去ラレシテアリ
既ニ蒸餾スルノ後石灰水ヲ加工攪擾スレハ存中ニ留セル
所ノ些少ノ綠蓉油及蒸餾醋ヲ引キ去ルガ為ナリ

