



洋学文庫
文庫8
E 100
2





濟生三方卷中

若狹 杉田信成卿 譯



阿片第二

物^{モノ}埴^{ナリ}耳^{ミミ}曰^{イハレ}。サク^サクラ。ヒタ^ヒエ。ア^アン^ンコ^コラ。シル^シル^ルキ^キム^ムス^ス。ペ^ペク^クテ。ア^アゲ^ゲン^ンチ^チビ^ビユ^ユス。エ^エス^スト。オ^オヒ^ヒウ^ウム。シ^シム^ムバ^バ。ヘ^ヘ口^コ。

カ^カロ^ロン^ンチ^チス。イ^イン^ン。マ^マニ^ニイ^イム。ペ^ペリ^リチ^チ。按^アニ^ニ用^{ヨウ}井^イル^ルハ^ハ。細^{ホソ}カ^カノ^ノ貴^キ重^{ジュウ}ナル^ル生^{シヨウ}活^{カツ}ヲ^ヲ得^{トク}セ^セシ^シノ^ノ庸^{ヨウ}醫^イカ^カノ^ノ手^テハ^ハ。假^カ獄^ク也^ヤ。バ^バカ^カロ^ロン^ンチ^チノ^ノ艇^{テイ}ヲ^ヲ以^{ヨリ}テ^テス^ス。チ^チキ^キス^ス。河^カヲ^ヲ譯^{ヤク}シ^シ。新^{シン}難^{ナン}キ^キガ^ガ故^コ者^{シャ}。此^{コノ}ヲ^ヲニ^ニ原^{ゲン}語^ゴト^ト云^{イフ}グ^グ。

濟生三方

阿片第二

一

天真妻蔵反

此ニ論スル者ハ。第二將軍ニシテ。即阿片是ナリ。此藥ハ其力甚大ニシテ。靈妙非常。其能甚奧微ニシテ。悟ルベカラズ。天地モ此草ノ成熟ニ當テハ。コレニ冠ヲ賦與ス。○吾輩之ヲ將軍ト呼フ。寔ニ理アリ。何トナレバ。此藥悉將軍ノ性ヲ具スルヲ以テナリ。此物ハ其カ能。生命ノ本源。身軀ノ深奥ニ達シ。其功能。生殺ヲ擅ニシ。病將ニ變セムトスルノ際ニ當テ。投施機ニ中レバ。能。生ヲ救フベク。機ヲ誤レバ。能。死ヲ致スベシ。而シテ此功特。此藥ニ在リテ。他藥ノ以テ代フベキ者ナシ。故ニ從來醫家ノ世ニ於テ。王トナリ帝トナリテ。能。人ヲ

利シ。又能。人ヲ害セシナリ。

古賢物埤耳其オヒオロチイ書ニ言ヘルヲ寔ニ萬世

不刊ト謂フベシ。曰ク。サクラ。ヒタエ。アンコラ。シルキユ

ムス。ヘクテ。アゲンチビユス。エスト。オヒウム。シムバ。ヘ

ロ。カロンチス。イン。マニ。イム。ペリチ。○阿片ハ是一把

ノ兩刃刀。コレヲ良工ニ托スレバ則貴靈ノ天資。コレ

ヲ庸手ニ假セバ則暴殺ノ苛毒ナリ。○嗚呼如何ゾコ

レヲ良工ニノミ托シテ。コレヲ庸手ニ奪フヲ得ベ

ケムヤ。

阿片ノ史ハ即是醫ノ史ナリ。○夫古往今來醫術ノ盛

衰阿片常ニコレニ從ハザルト無シ。或ハ天賦ノ靈藥ト貴バレテ。盛ニ世ニ用井ラレ。或ハ恐レテ拋棄セラ。然レモ其缺クベカラザルヲ以テ。復再舉ゲ用井ラ。大醫先生瓦列奴斯舍電沈忽弗滿物耳忽ホクニハ極メテ此藥ヲ貴ビ。此藥ナカリセバ。醫ヲ行フベカラズト謂ヘリ。○近世ニ至テモ。人皆阿片ヲ以テ各病ヲ治スベシト謂ヒ。醫各腰ニ阿片ノ瓶子ヲ帶スルニ至レリ。此時ニ至テハ。百千ノ醫藥皆其伍ヲ退キテ。阿片獨戰ヲ擅ニス。然レバ阿片實ニ醫術ノ長トナリ。醫法モ亦大ニコレガ為ニ變革ヲ受ケタリ。是ニ於テカ百病

ノ原性ヲ論シテ。皆陰性ト為スニ至レリ。凡此ニ偏セザレバ。必彼ニ僻スルハ。世間百事ノ常ニシテ。阿片ニ於ルモ亦然リ。夫然ク大ニ阿片ヲ愛重セシニヨリ。又從テ誤用モ多カリシカバ。近年マデ阿片ヲ以テ人ヲ害セシトモ亦多カリシナリ。コレニ加フルニ。庸醫阿片ノ真功ヲ知ラザルノ蒙昧ヨリ。今ハ人人大ニ阿片ヲ懼ル、ニ至レリ。是ニ於テカ醫術貴靈ノ一藥ヲ失ヒ。幾多ノ患者必當無二ノ救途ヲ喪フニ至ル。

即今ハ正ニ是此兩偏ヲ衡平シ。正中ヲ索ノ得テ。以テ

古來貴靈ノ一藥ヲシテ。再其真知遇ヲ得セシムベキ
ノ時ナリ。故ニ今此篇ヲ著スハ。人ヲシテ阿片ノカラ
確知セシメ。且コレニ不易ノ範則ヲ立テ。又兼子テ少
年醫輩ヲシテ。コレガ權衡ヲ得テ以テ誤用ノ過ナク。
必當ソ症ニ於テコレヲ施サシメムヲ願フノミ。此
ニハ死生利害。悉其本能ヲ知り。其主治ヲ定メ。且其必
須ノ諸症ヲ明辨スルノ三件ニアリ。

夫藥ノ本能ヲ知り。其真性ヲ定ムルハ。是第一ノ要務
ナリ。○凡各病皆其本性アリテ。然モ人身活機ノ内ニ

在リ。而シテ各藥ノ功能亦然リ。夫一藥ノ能ハ即是人
作ノ病ナレバ。其真性ヲ問ハズ。亦必其藥力ニ因テ發
スル所ノ生機ノ變換ニアルベシ。然レバ一藥ノ本能
ヲ舉ゲムニハ。次ノ件件ヲ察スルニアリ。即先其藥全
身ニ如何ノ變ヲ起スカ。又其力如何カ各系ニ達スル
カ。又特ニ何レノ系ニ達スルカトイフヲ明ニシ。特
ニ其正能ト奇能トヲ辨スルニアリ。○此ニハ唯阿片
曾テ功ヲ奏セシ所ノ病名ヲ舉グルノミヲ以テ。足レ
リトスベカラズ。是唯試驗ノ學ヲ博ムルノミ。又舍密
術ヲ以テ其質ヲ分解スルモ。亦未足レリトスベカラ

ズ。其故ハ藥ノ能力。常ニ必人身特生ノ區域ニ屬スルヲ以テナリ。又彼ノ一家ノ理論ノ如キハ。固ヨリ從フベカラズ。是其建議ノ風。東西アルニ從テ。常ニ向背ナキヲ得ザレバナリ。○然レバ藥ノ本能ヲ定ムルニハ。唯其生體上ニ於テスルノ功ヲ以テ憑據トスベシ。特ニ其功人ノ耳目ノ及ブベキ所ニ在ル者ニ據ルベシトス。○益又特ニ其能ノ直發真正確實ナル者ニ據ルベクシテ。其藥ヲ用井タル後ニ發スル所ノ百般ノ諸症ヲ槩取スベカラズ。此ノ如キハ猶忽沒越阿巴智醫流名ノ為ス所ノゴトシ。必真功ノ外。更ニ偶發ニシテ。

唯其患者ノミニ在ル所ノ諸因。及内外偶發ノ諸感。力ヲ併セテ其藥ノ能ヲ變ゼザルヲ得ズ。

然レバ方今ノ業宜ク經驗ニ就テ。阿片ノ直發真正確實ノ能即正ト。迂回偶發ノ能即奇トヲ辨スルニアルベシ。

大哉區域難哉辨議。夫百千年来阿片ノ試験極メテ多ケレバ。今コレニ因テ其本能ヲ知ルハ。人或ハ看テ以テ容易トスベシ。是特ニ然ラズ。其故ハ幾多ノ試験中。其功能特ニ其患者ノ天稟ニ因ル者。病ニ由テ變易セラル抗拒ニ因ル者。地方病性流行病性ニ由テ生機大ニ

變スルニ因ル者。習癖ニ因ル者。即東方諸國ニ於ルカ
 如キ。及試者ノ意ニ因ル者トヲ辨識スルヲ要スレ
 バナリ。特ニ驗者ノ眼鏡ニ由テ真象大ニ變シ。コレニ
 因テ幾多ノ妄論僻說世ニ出ヅルニ至レリ。今予此無
 數ノ試驗。及予ガ多年ノ實驗中ニ於テ。其最信スベキ
 者ヲ舉ゲ定ノムトス。特ニ近世貌樂運名ノ治術大ニ
 此ニ益アリ。蓋貌樂運ノ治術ハ。從來阿片ヲ人ニ用井
 タル最弘最大ノ試驗ト謂フベキナリ。

必見之症

今阿片ヲ以テ生體ニ觸レシムルハ。其觸ル、一ノ

内面外面ヨリスルヲ論ゼズ。必次ノ症ヲ發ス。

第一脉興奮シ實トナリカヲ得ル。○此功ハ用後直ニ

發スル者ニシテ。且必見ノ症トス。其ヲシテ疾トナラ

シムルガ如キハ。一定ノ功ナラズ。生カノ強弱ニ從テ

異ナリ。健全ノ時ニ於テハ脉稍疾トナルヲ以テ常ト

ス。生力増盛ノ時ニ於テモ亦然リ。然レモ若衰弱ノ為

ニ脉既ニ疾ヲナス者ニ於テハ。阿片能コレヲ除キ。其

ヲシテ徐ナラシメ。且齊ナラシム。又多量ニ用井レバ。

脉ヲ徐トナシテ。猶卒厥ノ脉ノ如クナラシム。

第二血沸漲ス。○其徵ハ則脉實トナリ。諸脉管膨脹シ。

新ニ血積ヲ起スヲ以テ知ルナリ。此症ハ常ニ頭ニ發シ。肺ニ發シ。或ハ彼此ノ素因アル部ニ發シ。動レバ出血ヲ致シ。或ハ焮衝ヲ發セシム。

夫此血液沸漲ハ。阿片固有ノ能ニシテ。特ニコレヲ標示セザルヲ得ズ。古人モコレヲ血液稀釋ト名ヅケ。阿片ノ本能ト謂ヒシナリ。而シテ此功ハ實ニ每發必見ノ者ニシテ。大衰弱血虛ノ患者ト雖。脉必實大ヲナス。是實ニ人為ノ多血。假虛ノ多血ナリ。蓋阿片ヲ用井テ後。頭部血積ノ危害ヲ致シ易ク。或ハ又血溶解シ。生體ノ和合分潰シ易キハコレガ為ナリ。

第三生温増加ス。○是血液沸漲。運行増進ノ必由テ致ス所ニシテ。又阿片必見ノ功ナリ。

第四神經系特ニ腦直ニ強ク侵制セラレ。特ニ其力制抑セラレ。知覺ノ機減衰ス。是ニ因テ麻醉嗜眠。昏睡等ヲ發シ。又局處ニ用井テ其部ノ知覺ヲ奪ヒ。麻痺セシメ。痙及痛ヲ祛ク。或ハ又内服ノ後。却テ神氣爽快ヲ為シ。腦神活發シ。或ハ終ニ譫妄狂躁ヲ起スヲアリ。然レド。是一時ノ興奮ニ由テ致ス所ナルガ故ニ。速ニ復虛衰ニ陥ルナリ。而シテ此功極メテ確實ナラス。或ハ其量ニ闕リ。或ハ患者ノ性ニ闕ル。蓋其理一ニハ。人身抗

拒ノ力奮起シテ。阿片ノ猛毒ヲ防ガムトシ。以テ常ヲ
 尖スルニ因テ。外表ニ神經諸症ヲ呈スト雖。終ニ阿片
 ノ麻毒勝ヲ得ルニ至ルノ由テ致ス所ニ係リ。又一ニ
 ハ。阿片ノ力能血ヲ催進シテ腦ニ入ラシムルヲ以テ。
 此血腦ヲ刺衝シテ其運機ヲ増進セシムルヲ猶其他
 ノ腦中血積腦焮衝等ノ諸症ニ於ルガコトキニ由テ
 致ス所ナリ。凡毒活體ヲ侵スノ本力ヲ確知セムト欲
 セバ。其局處ノ功ヲ見ルヲ最要トス。而シテ阿片局發
 ノ功ハ。常ニ覺機ヲ抑制スルニアリ。即コレヲ腸ニ用
 井レバ。其運機ヲ休歇セシメ。皮表ニ施セバ痛及癩ヲ

鎮止スルヲ以テ知ルベシ。但其皮ニ施スハ。表皮ヲ剥
 セザル部ニ施スヲ謂フナリ。若夫表皮剝離セル部ハ。
 外物コレニ觸レテ必輕痛ヲ起セバナリ。特ニ脂類ハ
 此力多シ。

自注ニ曰ク。阿片ノ純真ノ功ヲ知ラムト欲セバ。唯
 宜クコレニ慣レザル人ニ用井テ知ルベシ。譬へバ
 度兒格及東方諸州ノ人ノ如キ。及和蘭人モ久服シ
 テコレニ慣ル者ニ在テハ。生體既ニ阿片ニ慣レ
 テ。其刺衝ニ感スルヲ少ク。以テ一種ノ病性ヲ為ス
 ニ因テ。阿片ノ功亦從テ變ゼザルヲ得ズ。度兒格

齊生三考 卷中 八 天眞樓藏反

ノ人阿片ヲ用井テ其驍勇ヲ増スハ其理蓋阿片消
 長二極ノカニ因ルナリ。即其消極トイフ者ハ阿片
 麻醉ノカニ由リテ危ヲ輕シ己ヲ忘レシムルノ功
 ヲ謂ヒ其長極トイフ者ハ血腦ト心トニ進入スル
 勢ニ因テ精カト勇氣トヲシテ共ニ増盛セシムル
 ノ功ヲ謂フナリ。○又和蘭ニ在テモ久ク阿片ヲ過
 用スル者ニ於テハ多量ヲ服シテ唯己ノ痛楚ヲ忘
 レ病ノ身ニ在ルヲ知ラザルニ至リ是ニ因テ精神
 爽快ヲ得ルノミニシテ他ノ症ヲ發セザル者多シ。
 第五大便閉止シ咽乾燥ス。是内服ノ後消食管及其分

泌管。局處ノ麻痺ヲ受クルニ因ル。○即是腸ノ麻痺。腸
 ノ眠ナリ。

第六皮表ノ分泌増進シ汗出ヅ。○是阿片興奮ノ力。其
 動脈ノ運機ヲ催進スル功。及中心ヨリ外表ニ發越ス
 ル功ト。又其鎮靖ノ力。皮膚ノ痙攣ヲ弛ムル功。及尿管
 ロヲ開達スル功ト。一併シテ此機ヲ發スルニ係ル。蓋
 阿片常ニ醗膿ヲ進メ。又熱病ニ用井テ屢粟疹ヲ發シ。
 紫斑ヲ發シ。及鷺口瘡ヲ發セシムルハ此能ニ因ルナ
 リ。

第七以上論載スル所ノ外。更ニ陰部ト尿管トニカヲ

致シニ器ノ機能ヲ増盛セシム。此功殆必見ト稱スベシ。但特ニ陰部ニ於テ顯著トス。即淫蕩ノ夢想。陰莖ノ勃起。精液ノ漏泄等ヲ發スルヲ以テ知ルベシ。其泄尿ヲ増進スルモ亦屢驗スル所ナリト雖。未以テ必見ト稱スベカラズ。且果シテ泌尿ヲ増進スルカ。抑刺衝ノ力唯泄尿ヲ促スノミナルカ未疑ヲ免レザル所ナリ。第八多量ニ用井或ハ久服スレバ血溶解シ生體ノ和合分潰シ腐敗シ寒壞疽ヲ發シ死後速ニ腐壞ス。○此力ハ阿片ノ奇能トイヘド。多量ニ服スル間或ハ服後。
自註ニ曰ク 即阿片中毒若クハ久ク過用スル後ニ於テ必見ノ症

トス。凡熱病ニ多量ノ阿片ヲ與フレバ。必腐敗熱ニ變シ。焮衝ニ用井レバ寒壞疽ニ陷ラシム。又慢性病ニ於ルモ阿片ヲ連用スルノ後ハ體質溶解セムトシ。及出血シ易キノ症ヲ發スルナリ。彼ノ都兒格人ノ如キモ。過服ノ後ニハ遂ニ底野迦病ヲ發ス。其症ハ則過大ノ出血ヲ發シテ。漸衰死スルニ至ルナリ。又此症ニテ死セル屍ノ速ニ腐敗スルハ。亦必見ノ一事ナリ。此力ニ於テハ。阿片實ニ電ニ同ト謂フベシ。其故ハ雷震ノ人屍亦其腐敗速ナルヲ以テナリ。

本能

夫然ク阿片ノ功ヲ詳察スレバ。興奮ノカニ兼子テ鎮
 靖ノ功ヲ具ヘ。活發ノ勢ニ兼子テ剋殺ノ威ヲ具フル
 一。寔ニ特異無比ニシテ驚異スベキ者ナリ。是蓋此藥
 ノ他藥ニ異ナル所ニシテ。又施治ノ際ニ於テ此藥ノ
 特拔貴重ナル所ナリ。○覺機ト神經生トヲ抑制シ或
 ハ全ク之ヲ奪除シ而シテ却テ心臟ノ刺衝機及血生
 即機性造育ノ原生ヲ興奮シ且之ヲ強盛ナラシメ是
 ト共ニ身中ノ生機ヲ増盛催促シ遂ニ動化ノ亢極ニ
 至ラシメ造成ノカヲ消滅シ及舍密ノ分解ヲ催起ス
 ル。是此靈藥ノ真性ニシテ。即其本能ナリ。○衰弱ニ因

テ脉沈ナル者ヲ速ニ興奮シ。實トナラシメ又衰弱ニ
 因テ脉疾トナレル者ヲ遲トナラシメ。劇キ血積ヲ發
 シ。或ハ焮衝ヲ起サシメ。又寒壞疽溶潰過炭化腐敗ヲ
 起ス一極メテ速ナルハ。是皆此本能ヨリ出ヅル所ナ
 リ。

然レバ阿片ハ真ニ一大強心藥ニシテ。予コレニ過グ
 ル者アルヲ知ラス。○蓋其能實ニ衝突直入スル者
 ニシテ。途ヲ彼此ニ假リ。良能ノ對抗ヲ待テ而シテ後
 見ル、者ニアラス。即生力極メテ虚憊セル患者ニ試

用シテ。以テ明驗ヲ得ベシ。蓋藥能ヲ確定セムニハ。啻ニ健全ノ人ニ試ルノミナラズ。病時ノ生カヲ検査スルノ極メテ切要ナル。亦コレニ因テ明ナリ。見ズヤ。彼ノ窒扶斯性熱。惡性痘等ニ因テ。生カ沈衰耗竭セル者ニ阿片ヲ用井レバ。則其功ノ神速驚クベキヲ。嗚呼其脉認ノ難ク。疾ニシテ振戰シ。且間歇スル者。忽實トナリ。齊トナリ。カヲ得ルニ至リ。皮表一齊ニ温ヲ生シ。生カ均ク發越シ。患者自生ヲ得カヲ得。勇ヲ得。快ヲ得ルヲ覺エ。分利機是ニ於テ一頓ニ旺發シ。良全ノ諸機始ノテ萌生シ。分利泌列其途ヲ得ルヲ。豈顯著ノ功

ニアラズヤ。

阿片ニ然ク強心ノ功アルヲハ。古賢モ既ニ熟知シテコレヲ運用セシ所ナレド。貌樂運名ニ至テ最能。此能ヲ詳明セリ。但他ノ一能ヲ遺忘セルノミ。他ノ一能トハ何ゾ。此藥又兼子テ神經系ヲ鎮靖シ。且其興奮ノ力峻烈ニシテ。深ク生カノ本源ニ達シ。却テ速ニ大衰弱ニ變シ。或ハ竟ニ麻痺ニ至ラシムルヲ謂フナリ。然レバ此藥未曾テ真正持久ノ強壯カアリト謂フベカラズ。故ニ彼ノ所謂刺衝興奮未以テ阿片ノ能ヲ盡スニ足ラズ。又其刺衝大過ノ說。及後能ノ論。其ニ未備レリト

スベカラズ。其故ハ阿片ノ能更ニ深遠ニ達スルヲ以テナリ。夫阿片ノ力ハ其興奮ノ功ト共ニ直ニ生命ノ源ヲ侵シ。活體舍密ノ和合ヲ制シ。其刺衝大過ハ又兼子テ生活大過トナリ。生機ヲシテ自然ノ限界ヲ踰エシムルニ至ル。即阿片ノ力能速ニ腐敗ヲ致シ。寒壞疽ヲ生シ。溶解ヲ促スヲ以テコレヲ證スベシ。

夫阿片ニ興奮ノ功能アリテ。特ニ生活ノ元運ヲ奮發スルハ固ヨリ其本能ナリ。而シテ鎮靖ノ功亦等ク確ナリ。此功ハ尋常ノ説ノ如ク。刺衝大過ノ所由ナル竒道ノ能ニ非ズシテ。特立ナル一猶興奮ノ能ノゴトク。

而シテ直ニ神經ヲ制スル者ナリ。即局處ニ用井テ緩和止痛鎮痙ノ功ヲ奏シ。或ハ全ク其部ノ機能ヲ阻遏スルヲ以テコレヲ證スベシ。

故ニ予ハ謂ヘラク。吾輩貯フル所ノ百藥中其能峻烈直入兼子テ多性ニシテ生機ノ全系ニ達シ特ニ生力ノ本源ニ達スル一阿片ノ如キハ未コレアラズト。凡阿片ヲ用井ル者ハ。是生死ノ權ヲ掌握スル人ナリ。而シテ其生ト死ト相界スル一毫髮ノ如シ。信哉舍電沁ノ言。曰ク。阿片ナカリセバ醫術至ラズシテ且完カラザラムト。

濟生三考 卷中

功理

阿片ノ功然ク驚異スベク。且二箇相反ノカヲ具ヘ。他藥中コレニ類スル者ナキ。如何シテ其理ヲ窮ノム。是推理ノ各家疑ヲ抱ク所ナリ。

此一問ハ數百年來醫家ヲシテ。心ヲ費シ神ヲ勞セシムルノ一事ナリ。是蓋皇天理家ニ擬スルノ一謎ニシテ。極メテ尤大可學ノ一事ナリ。而シテ從來コレヲ猜セムトテ。建立セル論議極メテ多シ。悉ゴレヲ舉ゲムニハ。實ニ倦ムベキノ事ナリト雖。亦以テ人智ノ漸明ナルト。理學ノ漸闡クルトヲ觀ルベク。又此靈藥生體

天眞樓藏反

ノ深源ニ感應スル者ナルガ故ニ。以テ兼テ古來生機ヲ説ケル本論ノ沿革ヲ觀ルニ足ル。

其説ノ最古キ者ハ。人身ノ生氣原レヘンス阿片ニ

由テ枷鎖セラレ。恰モ魅セラレ、ガ如シト。自注ニ曰大

ヘリユラム阿片ノ功ヲ説キテ尚ホ曰ク生氣此藥○コ

ニヨリテ表ヨリ驅逐セラレ最裏ニ聚積スト

レニ次テ瓦列奴斯名ノ寒温説起レリ。其説ハ阿片ヲ

以テ寒性ノ物トナス。故ニ又常ニ芳辛藥ヲ加ヘ用井

タリ。○次ニ悉兒彪斯名ノ説起レリ。此人本舍密ヲ以

テ萬物ノ理ヲ論辨ス。而シテ阿片ニ於ル亦一種ノ揮

發硫黃氣アリテ。其功力皆コレニ舍ルト謂ヘリ。○歇

齊生三考 卷中

古

天眞樓藏反

濟生三考

天眞樓藏反

爾蒙突トハ。阿片ノ功ヲ其亞爾カ歐斯生ニ諸機ヲ發スルカニ達スト謂ヒ。コレヲ以テ其効驗ヲ辨明セリ。
 ○醫家更ニ器械ノ學ヲ執ル者アリ。阿片ノ能ヲ論シテ。其細小管ヲ過塞スルニ因ルト謂ヘリ。○コレニ次テ又一説アリ。博ク世ニ傳ヘテ久ク醫家ノ通論タリキ。其説ハ則阿片ノ功。唯其血ヲ沸漲セシムルニ在リト云。名哲弗フ毘ビ堉エ兒ル忽ホ弗フ滿マ名ノ如キモ殆ト此説ニ左祖セリ。○此ヨリ後。神經系ノ學更ニ精微ニ入り。且其生機ニ交渉スルノ大ナルヲ闡發ス。法兒列爾名ノ大發明ヲ以テ。知覺刺衝ノ二機大ニ相異ナルヲ詳ニ

セシヨリ。生理ト病理ノ二學亦一變シ。神經性病理學起リ。コレニ從テ阿片ノ功ヲ説ク一亦一革シ。説者皆阿片ノ功ヲ以テ專ラ神經ニ達スト謂ヘリ。鳩盧連名ノ如キ最然リ。自註ニ曰佛郎西ノ學者貌拉傑突名ノ尚其リ。○近世ニ至テ二説アリ。共ニ記載スルニ足ル。其一ハ留散忽弗滿名ノ發明ニ出ヅ自註ニ曰佛郎西ノ學者貌拉傑突名ノ尚其ハ後ルハ五十年ノ人ナリ看者或曰凡細脉管及其末稍ハ。心臟及大脉管ニ比スレバ刺衝機劣弱ナリ。故ニ阿片ノ刺戟ニ因テ其刺衝機ヲ失フ一心ト大管ヨリ速ナリ。コレニ因テ細管中血液ノ運行妨礙セラレ。

濟生三考

天眞樓藏反

此抗拒ニ因テ心臟ノ對抗却テ増盛スト云。其二ハ彼ノ貌樂運ノ説ニシテ。世人ノ多ク知ル所ナリ。其説ニ阿片ハ活體ノ全系ヲ刺衝スルヲ最強ク最疾ニシテ。而シテ其力速ニ消散ス。故ニ其能始メハ劇ク全身ノ刺衝ヲ起シ。次テ速ニ生カヲ耗竭セシムルヲ極メテ甚シ。此衰耗ハ即奇道ノ衰弱ナリト云。○更ニ近今ノ説アリ。理學ノ一派ト刺里帝突按ニ越天列幾的兒寶スル。以テ生體ノ以テ機ヲ辨明スル一學ナリ。又コノ説ヲ本トシ。再舍密ノ論ニ近ツケリ。

當今ノ諸家ハ。槩阿片ノ功ヲ以テ活體ノ全系ヲ刺衝スル者トナシ。其麻醉ノ能ハ過度ノ刺衝奇道ノ衰弱ニ由ルト謂ヘリ。然レモ予ハ此ニ二件ノ疑問アリ。其一ハ則別ニ揮發ニシテ特ニ血管ヲ興奮スルヲ全ク彼ノ如キ藥アリ。即麝香モ。模尼亞ア。葛私多カ。儂ト。謨等ム。是ナリ。此等ノ藥然ク阿片ノ如ク麻醉ノ能アラザルハ何ゾヤ。其二ハ則更ニ麻醉ノ藥アリ。毫モ血管系ヲ刺衝スルヲナク。脈ヲ變スルヲナク。温ヲ變スルヲナク。或ハ却テ脈ヲ遲ナラシメ。然ク心臟ノ機能ヲ減殺シテ。而シテ最劇麻醉ノ能ヲ呈スハ何ゾヤ。○此二件ニ由

テ考フルニ。麻酔分ハモト特立ノ物ニシテ。敢テ心臓
血管ヲ刺衝スルカニ關ラズ。特ニ神経系ニ直達シテ
コレヲ鎮壓抑制スル者ニシテ。固ヨリ過度ノ刺衝ニ
由ラザルヲ明ナリ。而シテ阿片亦明ニ此麻分ヲ含有
ス。其證左ノ如シ。第一阿片特異ノ香是ナリ。此香ハ則
菲^ヒ臘^オ沙^シ密^シ蔓^マ陀^タ羅^ラ華^ワ及^及他^他ノ麻^マ毒^ドアル草^カ類^ルノ香^クニ同^トク
シテ。此香アレバ常ニ麻分アルヲ知ルベシ。次ニ阿
片局處ノ鎮靖力是ナリ。夫阿片ハ外敷シテ亦止痛鎮
靖ノ功アリ。而シテ毫モ血管系ヲ興奮スルヲナシ。特
ニ多量ニ久ク外用スレバ。毫モ血管ヲ興奮セズ。唯神

海三三六

方真集

經ノ交感ニ由テ腦ニ達シ。麻酔ノ症ヲ發セシム。是予
嘗^テ夏^ニ日^ニ阿^片ノ大^塊ヲ握^持シテ。自^自試^試驗^驗セル所^所ナリ。註自
ニ曰或ハ阿片ノ能ク強ク以テ全ク葡萄酒ノ能ク同ト云者アリ然レバ最強ノ亞爾箇地未曾此功アラズ又
單ニコレヲ顛顛ニ敷キテ睡ヲ生ゼシム。自註ニ曰予
方アリ神經性患者ノ不寐ニ毎クコレヲ兩顛顛ニ貼
セシメテ此苦患ヲ免レシム其方菲臘硬膏四錢ニ
阿^阿片^片一^一刃^刃又^又内^内服^服ノ時^時其^其胃^胃ニ達^達スル^{スル}ニ方^方テ^テ直^直ニ^ニ胃^胃ノ
局^局處^處ノ覺^覺機^機ト^ト神^神經^經機^機ト^ト奪^奪ヒ。食^食思^思消^消化^化力^力及^及蠕^蠕動^動機^機
ヲ除^除却^却シ。又^又灌^灌腸^腸藥^藥ニ和^和シ用^用井^井テ直^直ニ腸^腸ノ蠕^蠕動^動機^機ヲ
除^除却^却ス。次ニ阿^阿片^片ノ蒸^蒸氣^氣ハ即^即其^其單^單純^純ノ麻^麻分^分ノミニシ
テ。而^而シテ能^能麻^麻醉^醉ノ能^能ヲ致^致ス。即^即阿^阿片^片水^水ニア^アク^クオ^オノ如^如レ。

齊生三方

卷中

十七

天真集

此物單ニ揮發ノ蒸氣ヲ含シ。舍密術ヲ以テモ亦コレ
ヲ檢出スベカラズ。而シテ眼焮術ニ用井テ能軟和ノ
功ヲ奏ス。次ニ又其水製越幾斯ハ。麻醉止痛鎮靖ノ功
アリテ。而シテ血管系ヲ興奮セザルヲ。恰非^モ^ヒ^オ^シ沙密^シ蔓
陀羅華等ノ單純麻藥ノ如クニシテ。其脂製越幾斯ハ
却テ興奮ノ功ヲ致ス等ヲ以テコレヲ觀レバ。則阿片
ニ一個ノ麻分アリテ。此分ハ脉管血液ヲ興奮スルヲ
ナク。能カヲ呈ス。明ナリ。况阿片ニ消石等ノ消焮藥
ヲ加フレバ。能其催熱ノ力ヲ奪フベクシテ。而シテ鎮
靖ノ力ハ異ナラザルニ於テヲヤ。

然レバ阿片ニ鎮靖興奮ノ二力各異ニ存スルヲ疑ナ
シ。而シテ其功理ヲ原子ムニハ。次ノ如ク説クヲ以テ
真且純ト謂フベシ。阿片ニ二分アリテ特異精密ニ和
合ス。其一ハ麻分ニシテ專ラ神經系ニカヲ致シ。其一ハ
興奮分ニシテ專ラ血管系ニカヲ致ス。コレヲ證スル
ニ。唯有カノ麻藥ヲ舉ゲテ以テ足レリトスベシ。乃此
二分各異ニ特立シ。其麻醉ノ功未必シモ興奮ノ功ニ
率ハザルヲ知ルベシ。若夫二功唯一ノ刺衝カニ出
ヅル片ハ。必互ニ相率ハザルヲ得ズ。蔓陀羅華ハ阿
片ニ亞テ最強ノ麻藥トス。而シテ屢獸ニ與ヘテ試驗

齊生三方
卷中
六
天眞樓藏反

スルニ。毫モ脉ト血管系トヲ興奮スルナシ。第艾答
利斯ハ却テ脉ヲ鎮靖シ。莨菪ハコレニ反シテ稍脉ヲ
興奮ス。而シテ青酸ハ知覺ノ全機ヲ殲滅シ。毫モ心ト
血管トヲ興奮スルナシ。○麻藥ノ功然ク差異アル
ニ由レバ。予ハ謂フニ。以テ生體ノ原カナル知覺刺衝
ノ二機各異ナルヲ證スルニ足ルト。

予今此ニ舍密加ニ就テ。阿片ハ如何ノ成分コリ成レ
ルカヲ問ハムトス。庶幾タハ其諸種ノ功理ヲ究ムル
ニ足ラムカ。○古昔ノ舍密家ハ。阿片ヲ水葡萄酒或ハ

燒酒ニ溶解シ。其溶クル者ト溶ケザル者トヲ分チテ
足レリトス。而シテ其水ニ溶クル者^{エキスタラク}。又^{シユムモ}
ハ功力稍弱シト雖。尚麻酔ノ能アリテ而シテ
絶エテ催熱ノ能ナシ。故ニ其催熱ノ能ハ哈爾斯性ニ
シテ水ニ溶ケザル部ニアリトス。是ヲ以テ醫家血ノ
興奮及焮衝ヲ懼ルベキ症ニハ。水製阿片ヲ用井タリ。
近時ノ舍密家ハ。其學大ニ進ミ。更ニ造化ノ祕奧ニ入
ルベキノ新途ヲ啓キ。又其カヲ阿片ニ試ミ。検査精詳
ヲ究メテ。其窒素炭素水素ヨリ成レルヲ發明シ。又
其近成分ハ四ナリト云。即模兒彪母默格紐母那耳格

齊生三方
卷中
十九
天真婁歲反

濟生三才

天眞樓藏反

智澀及越幾斯分是ナリ。自註ニ曰予ハ謂フニ此越幾
於テ而ハ輕テ世ノ舍密家總テ此分ヲ輕視シ特ニ阿片ニ
知ルヨリ能ハザル物ノ名ヲ然レバ越幾斯分ノ名ヲ命
レド其功ト性トヲ論スルニ至テハ諸家一定セズ唯
模兒彪母ハ單用シテ功少キヲ疑フベカラス此物功
ヲ致サムニハ必先一個ノ酸ニ和スルヲ要ス而シ
テ其酸ニ和セル者ハ其功殆阿片ニ同ク過用シテ死
ニ至ラシムベシ又其那耳格智澀即極樂斯澀ニ至テ
ハ或ハ大能アリト謂ヒ或ハ能少シト謂ヘリ又那耳
格智澀ハ興奮ノ功ヲ奏シ模兒彪母ハ鎮靖ノ能ヲ致

スト云説未確定セザル所ナリ更ニ越幾斯分アリ聖
 際亞國ノ舍密家森度別兒窟宋名人ノ説ニ此物ハ阿片
 中最カアル者ナルベシト言ヘルハ宜ナリ。
 舍密家然ク検査ヲ究メテ而シテ醫家ノ得ル所何モ
 ノゾ○單模兒彪母既ニ阿片ニ非ズ默格紐母亦阿片
 ニ非ズ那耳格智澀亦阿片ニ非ズ越幾斯分亦阿片ニ
 非ズ舍密ノ巨擘窩兒斐拉人名モ亦言ヘルガ如ク阿片
 ノ能ハ此四分ノ和合ヨリ出ヅ予ハ更ニコレニ次言
 フ加フ曰其和合成立全ク特異ニシテ而シテ舍密ノ
 分離ニ因テ破潰ス然レバ醫家ノ宜ク記スベキ所次

濟生三才

天眞樓藏反

ノ如シ。凡阿片ヲ用井ムト欲スル者ハ宜ク直ニ阿片ヲ用井ルベシ。○然ルキハ阿片含ム所ノ諸分ヲ用井ルヲ疑ナク。特ニ其特異機性ノ和合ニ於テ用井ルヲ得ルナリ。蓋此和合ハ萬物成立ノ源ニシテ其基本ノ存スル所ナリ。

醫家ニ在テハ古昔ノ二方却テ要緊ナリトス。即揮發溶液及水製溶液ニシテ。甲ヲ「チンクチュラオピイト名ツケ。乙ヲ「エキスタラクチュム・アクオレム」ト名ツク。○甲ハ麻醉ニ兼子テ血積ヲ起シ。心臟ノ機力ヲ増進シ。乙ハ麻醉ノ能アリテ。催熱ノ力甚少シ。○此二種ノ別

ハ試驗ニ據リテ確定セル所ニシテ。施治ノ際ニ方テ要緊ノ事件ナリ。即鎮靖ノ力ニ兼子テ興奮ノ力ヲ要スル症ニハ。甲ヲ用井。又單ニ鎮靖ノ功ヲ要シテ興奮沸血ノ力ヲ懼ル、者ニハ。乙ヲ用井ル等ナリ。

舍密學ニ於テモ亦右ノ區別ヲ切要トス。其故ハ其水ニ溶クル者ハ。單ニ麻醉ノ力ヲ致シ。燒酒ニ溶クル者ハ。麻力ノ外更ニ興奮ノ力アルヲ以テ。其興奮ノ力ハ麻力トハ自異ナルヲ明ナレバナリ。而シテ甲ハ則黙格紐母酸模兒彪母ト。越幾斯分ノニニシテ。乙ハ則純模兒彪母及那耳格智涅ナリ。

齊三三行
世
天眞婁歲反

予更ニ予カ検査ノ論ヲ舉グ。看者以テ贅トナスコ勿
 レ。○夫刺衝機ハ啻其名覺機ト異ナルノミナラス。實
 ニ覺機トハ別ニシテ。特ニ存シ。自其機能ノ源ヲ有ス。
 而シテ神經ノカニ由テ感動變易セララルト雖。本神
 經ノカニ頼テ而シテ起ル者ニ非ザルナリ。○此論ニ
 至テハ。法兒列爾名人ノ説理アリト謂フベシ。而シテコ
 レヲ證セムニハ。唯心臟ヲ細檢シ。其壯大ノカニ比ス
 レバ神經甚少キヲ見テ知ルベシ。又胚胎初成ノ時。心
 ノ部ニ鼓動スル一點ヲ生シ。此點神經ナシト雖。能張

縮スルヲ見テ悟ルベシ。以テ註ニ曰。予尚ホ二證ヲ舉ゲテ
 テ生體ニ固有スルカナルヲ刺衝機ノ特異自立ニシ
 セル後。舍密性或ハ器械性ノ刺衝物ヲ以テ。筋纖維ニ
 收縮振盪ヲ起シシム。即運動ノ力陸續スル者ニ在テ。
 未悟ラザル所ニシテ。即運動ノ力陸續スル者ニ在テ。
 常ニ疲困セザルハ。以テ疲困セザルハ。縮張ノ如シ。若夫
 神經ニ關ル諸機ハ。必疲困セザルハ。縮張ノ如シ。若夫
 以テ亦刺衝機ノ特有ナルニシテ。其部ニ舍リ。且自
 回復スル固有力ナリ。テ證スルニ足ル。但其機
 能ヲ明辨セムガ為ニ。宜ク刺衝機及刺衝系ヲ統攝ス
 ベシ。故ニ予ハコレヲ血生及血管系ト名フク。蓋此中
 ニ生活スル所ノ物ハ本血ナルガ故ナリ。夫血ハ主ナ
 リ。血ノ為ニシテ心アリ。又血行アリ。彼ノ常論ニ所謂
 心ノ為ニ血アルニハ非ズ。○血ハ生ノ源ニシテ。又其

伴ナリ。神經ハ然ラズ。神經ハ血ニ由テ始メテ其生ヲ得ルナリ。夫流體ハ凝體ニ先タツテ成ル。凡生アル者必流體ヨリ成ル。是啻ニ其初成ノ時ノミナラズ。其存スルノ間常ニ然リ。然レバ血ト血管系トハ彼ノ機性生活ノ源ニシテ。即テ造育生活ノ本ナリ。故ニ血ハ生ノ材ニシテ。神經ハ生ノ工ナリ。○是ヲ以テ外感ノ感受モ。亦常ニ只神經系ニノミ係リ。特ニ神經ニ頼テ而シテ起リ。然ク唯奇道ノ感傳ニ由テノミ血生ニ傳フル者ニ非ズ。能直ニ血ニ傳ヘ。特ニ其和合ト其生トニ感スルヲ。猶其直ニ神經ニ感スルガゴトクナリ。予コレ

ヲ證スルニ。近ク刺絡ノ功ヲ以テス。夫刺絡ハ直ニ血ノ和合ヲ變セシムルヲ固ヨリ論ナシ。温モ亦然リ。夫温ハ直ニ血ノ沸漲ヲ進ノ。血管ノ生ヲ増盛スルヲ。未曾神經系ノ接ヲ得テ而シテ始メテ然ルニアラズ。○阿片亦然ク一齊ニ直ニ神經ト血トニカラ達シ。瞬間ニ血ノ生カラ壯盛ス。即服後直ニ顯著ノ沸漲ヲ呈ハスヲ以テ知ルベク。又心ノ機能増盛スルニ由リ。且直ニ血ヨリ成ル所ノ産物。即釀膿等ノ健運ニ由テ悟ルベク。及生機總テ亢盛シ。コレニ因テ血速ニ溶解腐敗ニ進ム等ヲ以テ明ラムベシ。○吾輩今日生カノ名ヲ以

濟生三考 卷中

真林

テ理會スル所。往日ニ比スレバ唯更ニ大ニ更ニ廣カ
ラムヲ要スルノミ。見ズヤ植物ハ亦生活ノ機性體
ニシテ。神經ナシト雖。然モ生カアルト刺衝機アリテ
存スルノ明ナルヲ。又見ズヤ各自神經ナシト雖。諸
種采觸ノ物能。其生カヲ増上セシメ。或ハ抑制シ。或ハ
枯死セシムルニ至ルヲ。是乃今時ノ試験ニ因テ知
ル所ナリ。而シテ又カネト若キ植生。即動物内生ノ基ナリト
イフ。豈非ナラムヤ。
約シテコレヲ言ハ。阿片ノ能ハ。他藥ノ如ク刺衝興
奮等ヲ以テ説明スベキ者ニ非ズ。猶造化ノ重器ナル

温光越列幾等ノ如ク直ニ功ヲ生カニ致シ。其諸支諸
流ニ入り生カニ透徹シテ其内ニ充在ス。而シテ特ニ
生活ノ機性造育ノ力。即其本源造成ノ勢ヲ増盛シ却
テ知覺ノカヲ抑制ス。

主治

阿片ノ本能已ニ明ナルキハ。其應用ノ主治亦自明ナ
リ。即左ノ如シ。
痙。神經性症。即覺機常ヲ失ヒ増進スル者。詳ニコレヲ
言ハ。血管系ト血生トノ生カ虚衰スル者。○但此症
ハ其全身ニ在ルト。局處ニ在ルトニ論ナク。又其急性

齊生三考 卷中 主治 甚 天真婁歲反

ト慢性トニ論ナシ。

神経系ノ興奮愈盛ニ。心ト血管系トノ生力。即生活本
系ノカナル者。愈沈衰シ約シテコレヲ言ハ。生力實
ニ虚衰スルヲ愈多ケレバ。阿片愈適應シ。愈合當ス。是
實ニ阿片ノ一大勲ニシテ。コレニ因テ能。急劇ノ危篤
ヲ防ク所ナリ。例スルニ惡性痘寒壞疽及窒扶斯ニ於
ルガ如シ。

是故ニ先。脱液。或ハ人爲ノ瀉血。及腸胃ノ泄出ニ因テ。
身體虚衰セル者ニハ。阿片愈適應ス。
故ニ神経系ノ興奮ヲ鎮靖シ其不整ノ機能ヲ整理シ

此分ニ屬ス。病亦。痙ヲ除キ特ニ痛ヲ止メ心及機性生活ノ
カラ壯盛ニス。○是即吾輩阿片ヲ用井ルニ當テ專率
由スル所ナリ。

特異ニ分テコレヲ言ハ。疼痛發汗スベキ症。總テ中
心ヨリ周圍ニ血行ヲ進ムベキノ症。腸ノ泄出衰憊ヲ
致スベキ者等。是ナリ。

主治已ニ明ナレバ。其禁忌亦隨テ知ルベシ。第一多血
及焮衝。是ナリ。○凡刺絡主治ノ症尚在ル間ハ。阿片ハ
懼ルベキノ苛毒ナリ。其故ハ。阿片ハ血積ヲ増サシム
ルヲ尤劇ク。持ニ頭腦ニ進メ。且焮衝性ノ刺戟ヲ増盛

スレバナリ。○諸熱病其初起ニ於テハ必常ニ焮衝ノ性ヲ具ス。故ニ阿片ハ禁ズベシ。若誤テコレヲ用井ル片ハ其熱皆窒扶斯ニ變スルナリ。是貌樂運ノ醫流。世ニ盛ナル間。吾輩屢見聞スル所ニシテ。予ハ則予ガ人。為神經熱論中ニ説キタリ。

第二胃中汚物鬱滯スル症是ナリ。此症アレバ阿片適應セザルノミナラズ。其汚物ヲ留瀦セシムルニ因テ害アリ。

第三血質甚溶解シ腐敗ニ傾ク症是ナリ。此症ハ阿片ニ因テ益増進ス。

應用

此偉大ノカヲ各病各症ニ應用スルヲ論スルハ。固ヨリ予ガ敢望ム所ニ非ズ。若コレヲ為サムト欲セバ。須一部ノ原病學ヲ著スヲ要スベシ。其故ハ凡有ノ病患上ノ主治ヲ以テ言ハシ。阿片ヲ施スベカラザル者ナキヲ以テナリ。○故ニ予今唯阿片ノ應用。特異無雙ナル諸症。其應用疑フベクシテ精詳ノ辨識ヲ要スル諸症。及當今世人未其應用ヲ明知セザル諸症ノミヲ列擧ス。

局處焮衝

齊生三方 應用 局處焮衝 共 天眞婁歲反

阿片ノ功其最ナル者ハ局處焮衝ナリ。是蓋當今幾多ノ消熱醫流當ニ掉頭スベキ所ナリ。○然レモ是實ニ然リ。而シテ予ハ謂フニ。焮衝ニ阿片ヲ應用スルハ。是今ノ醫術。往日ニ勝ル所ニシテ。又醫ノ良巧ヲ見ルベキ所ナリ。○夫局處ノ焮衝ニ全身及局處ノ瀉血ヲ行ヒ。又他ノ消焮諸藥ヲ用井テ後。屢其諸症未全ク除カザルコトアリ。或ハ一タビ減退スルモ。再強劇ニ發スルコト亦屢コレアリ。譬バ脇胸痛ニ於ル刺疼。咳嗽。短息ノ如シ。而シテ其脉ハ則疾ニシテ熱ヲ帶ブルト雖。小ニシテ復刺絡ヲ行フベキニ非ズ。此症ニ於テハ。消焮ノ

治法ニ因テ血ト血管系トノ所患ハ全ク除キ。唯焮衝部ノ神経系ノ刺衝ノミ尚殘留スル者ナリ。此刺衝ハ即増進覺機ニシテ。或ハ又痙ト名ツク。而シテ多量ノ刺絡ヲ以テ衰弱ヲ致スニ因テ。愈強盛ヲナスベシ。故ニ此時ニ於テ更ニ瀉血ヲ行ヘバ。疼痛及局處ノ諸症益增長ス。此症ニ在テハ阿片ヲ以テ無雙ノ神藥トス。此藥一晝夜間ニ能焮衝ノ殘餘ヲ一掃ス。蓋此藥此ニ要須ナルニカラ併有スルコト。他藥ノナキ所ナルニ由テ然リ。即一ニハ其焮衝セル部ノ増進覺機即痙ヲ消除シ。一ニハ衰弱シテ機能廢絶セル血管ヲ興奮シ。コ

レニ因テ其部ノ機能ヲシテ。滲出瀦留セル血ヲ吸收
シ。毎ニ必須ナル局處及全身ノ分利機ヲ完成スルニ
適セシム。但此二件ハ消焮療法ヲ連用スレバ。愈險惡
ニ進マザルヲ得ザル者ナリ。
胸脇痛即肺焮衝ノ痛アル者ニ在テ。右ノ症ニ遇フ
特ニ多シ。而シテ阿片ノ用法度ニ適スルハ。患者ノ
血ヲ費ス_ト甚少シ。或ハ唯阿片ヲ以テ生命ヲ救フ
ベキコアリ。但其症ヲ診決スル_ト極メテ難シ。蓋良工
ノ良工タル所。是ニ於テ見ルベシ。其故ハ此症若阿片
ヲ誤用スル_トハ。其大害又測ルベカラズ。彼ノ貌樂運

ノ醫流行ハル、時ノ如キ。先刺絡ヲ行フ_ト須タズ始
ヨリ直ニ阿片ヲ用井ル_ト常トス。然ル_トハ其痛ハ能
止ムト雖。煩悶除カズ。焮衝又消散セズ。或ハ變レテ寒
壞疽トナリ死ニ陥リ。或ハ硬結膿潰ニ變ズ。故ニ患者
一旦輕快ヲ得ル_トヲ覺エ。醫亦阿片ノ功ヲ稱讚スト
雖。却テ知ラズ。患者已ニ將死ノ胚胎ヲ抱キテ。早晚肺
勞ニ陥ル_トヲ。○阿片ノ危險ナルハ。然ク一時痛ヲ止
メ。病苦ヲ除クガ為ナリ。コレニ因テ醫モ患者モ輕快
ヲ得ルト謂ヒ。又コレニ因テ有カナル藥ヲ投スベキ
ノ時日ヲ間過スルニ至ル。

故ニ先適應ノ瀉血ヲ行ヒ。適應ノ消焮法ヲ施シテ後。
 胸中ノ刺疼退カズ。或ハ一タビ退クモ必再發シ。或ハ
 其勢更ニ劇ク。芫青膏亦功ナク。其脉ハ則小ニシテ軟。
 復刺絡ヲ行フベカラザルニ至テ。方ニ阿片ヲ施スベ
 キノ長期トス。是概第五日第六日ニ在リ。此時ニ方テ
 ハ阿片一匁ヲ拈歇兒散トナシ。臨卧ニ與フレバ。一夜
 間ニ能焮衝ノ殘餘ヲ厭絶シ。局處及全身ノ分利尚整
 ハザル者ヲ完成ス。或ハ又此症ニ予ガ屢試用シテ峻
 功ヲ取レル所ノ加汞劑ヲ與フベシ。蓋此汞ハ焮衝ノ
 遺症ナル淋發ノ凝留ヲ疏解シ。且吸収セシムルノ能

アルニ因ル。

其方

甘汞 六匁

阿片 一匁

白糖 二錢

右研和シ六包ニ分チ。二小時或ハ三小時ゴトニ一
 包ヲ與フ。

右ノ症ヲ完治スルニ。唯此散劑ヲ連用スルヲ一晝夜。
 乃至二晝夜兼子テ祛痰飲ヲ温服セシムルノミヲ以
 テ足ルヲ多シ。即疼痛消除シ。呼吸緩解シ。痰出デ。汗發

齊生三考

廿九

天真婁歲反

シ。而シテ熱狀ノ脉鎮靖ス。

單純焮衝様癩麻質性胸脇痛ノ初起ニ於ル。亦唯其臂

ニ峻カノ刺絡按ニ七ハ十錢ヲ行ヒ。而シテ後直チニ

挖歇兒散一服ヲ與フルノミヲ以テ完治スルヲ多シ。

予曾心焮衝ノ一症ヲ見タリ。醫己ニ多量ノ刺絡ヲ行

ヒ。復血ヲ瀉スベカラザルニ至リ。而シテ心悸強劇。煩

悶死セムトシテ止マズ。老利兒結兒斯水亦功ナシ。予

乃阿片ヲ與ヘテ速ニ此殘患ヲ掃除スルヲ得タリ。

但諸焮衝病ニ阿片ヲ用井ルニ方テ。宜ク子細ニ其脉

ニ注意スベシ。コレ阿片ノ當否ヲ決スベキ確徵ナリ。

故ニ上ニ既ニ説ケルガ如ク。脉其カト緊トヲ失ハザ

ル間ハ。此藥ヲ與フベカラザルヲ固ヨリ論ナシ。又已

ニ用井ルノ後モ。子細ニ脉ヲ檢點スベシ。若其脉再緊

トナリ疾トナラバ。コレ血ノ焮衝狀ノ殘餘アリテ。阿

片ニ因テ再興奮セラル、ノ證ナリ。然ルキハ阿片ヲ

用井ルヲ尚早キニ過ギタリ。寧阿片ヲ止メテ菲膾沙

密。老利兒結兒斯水。第芟答利斯等。催熱ノカナキ麻藥

ヲ用井ルニ如カズ。

諸他部ノ局處焮衝。亦右ノ規則ニ從フベシ。○即腹部

諸臟ノ焮衝。肝焮衝。脾焮衝。胃焮衝等ニ於ルガ如シ。特

齊生三才 卷中 三才 天眞樓藏反

ニ胃焮衝ニ於テハ。其部ノ覺機ト神經交感トノ大ナルニ因テ。病神經性ヲ得ルノ甚大ニシテ。患者本焮衝ノ為ニハ死セズ。却テコレニ因テ發起スル全身ノ神經痙ニ因テ死スルノ多キヲ以テ。阿片獨無二ノ救生藥タルノ最多シ。○吾輩屢急性霍亂ニ於テ同症ヲ見ルノ多シ。又亞細亞霍亂ノ治法ハ。總テ劇症胃焮衝ノ治法ニ異ナルヲナシ。即適宜ノ瀉血ヲ行ヒテ後。阿片ニ甘汞ヲ加ヘ。粘滑ノ油劑ニ伍シ用井ルヲ無二ノ救途トス。○又腸焮衝焮衝性吐糞ニ於テ。適宜ノ瀉血ヲ行ヒテ後。焮衝ノ神經性殘患ニ因テ。腸攣縮シ大便閉

止シテ通セザル時ハ。コレヲ通利セシムルニハ。甘汞ニ阿片ヲ加ヘ用井。温浴法ヲ行フニ如クヲナシ。或ハ峻下藥ヲ要スル者アリ。此時ニ方テモ亦阿片ヲ加フベキト多シ。近時頑固ノ吐糞ニ巴豆油ヲ用井テ功ナク。阿片ヲ加ヘテ始メテ利セシメテアリ。○膀胱焮衝焮衝性尿閉ニ於ルモ亦然リ。若夫瀉血功ナク測胞子及利尿藥其勲ヲ顯サバレルキハ。則阿片能尿ヲ利セシムベシ。

咽焮衝特ニ格摟痲ハ又宜ク注意スベキノ一症ナリ。諸種ノ咽焮衝特ニ格摟痲ニ於テ。醫宜ク銘記スベキ

ノ一事ハ已ニ適宜ノ消焮法ヲ行ヒ。血ノ刺衝已ニ除
キテ後。神經ノ焮衝尚留_ホマル者アリ。即嚥器及_ヒ聲器ニ
於テ痙性ノ患狀殘留シ。其患嚥器ニアレバ嚥下困難
除カズ。聲器ニアレバ呼吸困難除カザル。猶焮衝尚_ホ
存スル時ノゴトシ。而シテ此患能終ニ死ヲ致ス。ア
リ。○此時ニ至テハ。消焮法ヲ連用スルモ亦寸功ナシ。
是此症ノ焮衝ニ非ズシテ。其殘患ノ痙ナルヲ以テナ
リ。故ニ唯阿片。或ハ他ノ有カナル鎮痙藥ヲ用井。頸圍
ニ芫青膏ヲ貼シ。或ハ鎮痙軟和ノ毳布ヲ施ス等。始メ
テ功ヲ奏スベシ。○特ニ格樓癆ニ於テハ。世醫或ハ單

ニ焮衝ニ注意シ。消焮ノ法ノミヲ固執スルヲアリ。コ
レニ因テ患者遂ニ治セズ。若夫此時ニ至テ。阿片或ハ
麝香ヲ與フレバ。速ニ殘患ヲ一掃シ。窒塞ノ危害ヲ消
除シ。以テ生命ヲ救フヲ得ルナリ。○世醫格樓癆ヲ
論シテ。或ハ焮衝性トナシ。或ハ痙性トナス。蓋其藥ノ
功ニ因テ言フ所ニシテ。共ニ理ナキニ非ズ。其故ハ此
病其本性ト初起トニ於テハ。固ヨリ焮衝性ニシテ。唯
消焮ノ藥ノミヲ以テ能治スルヲ多シト雖。亦其焮衝
期。屢速ニ痙性神經性期ニ變スルヲアリテ。此期ニ至
テハ。唯有力ノ鎮痙藥ノミ能コレヲ救フヲ得レバ

ナリ。
 腦・焮・衝・亦全ク前則ニ從テ療スルヲ要トス。特ニ此症ニ於テハ。阿片ヲ以テ特異治腦ノ藥トナスベシ。夫此症ニ適宜ノ瀉血ヲ行ヒ。寒罨ヲ施シ。清涼下劑ヲ與ヘテ後。麻醉醒ノズ。或ハ譫妄息マズ。其脉復瀉血ヲ行フベカラザルハ。是焮衝已ニ腦ノ神經性患狀ニ變スル者ニシテ。或ハ腦中已ニ洩ヒヲ滲出スルヲアルベシ。此時ニ至テハ唯阿片ヨク此殘患ヲ除キ得ベシ。但其洩ヒノ滲漏アルベキ者ニハ。更ニ甘汞ヲ加フルヲ要トス。○近世ノ諸家此病ヲ療スルニ。多クハ單ニ消

焮法ヲ執リテ阿片ヲ遺忘セリ。予近日阿片ノ耽飲譫妄ニ良功アルニヨリテ。再其腦焮衝ヲ治スルノ利用ヲ興復スルヲ得タリ。但予深ク自喜ブノミナラズ。又深ク世人ノ予ガ説ヲ以テ新奇トナスヲ怪ムナリ。其故ハ腦焮衝其本性神經性ナル者。及血ノ焮衝已ニ消除スル者ニ阿片ヲ用井ルハ。往昔ヨリ明知セル一事ニシテ。名工巨擘ハ既ニ稱用セル所ナルヲ以テナリ。
 右ノ規則ニ率ヒ用井テ。阿片ノ眼焮衝ニ偉勲アルヲハ。當今世人ノ普ク知ル所ナリ。

神經熱及窒扶斯

右ニ説ク所ニ據リテ。又阿片ノ神經熱及窒扶斯ニ利
アルヲ知ルベシ。○夫神經熱ハ其因必シモ腦焮衝
ナルニ非ズト雖。又其腦ト神經系トノ所患ヲ兼子ザ
ルハ少シ。而シテ其腦本病ノ中心トナルヲ猶心臓ノ
焮衝熱ニ於ルガ如シ。○凡局處ノ刺衝アレバ則血積
ヲ生シ易シ。今此病ニ於ルモ亦然リ。然レモ血積ト焮
衝トハ尚霄壤ノ懸隔アリテ。且其血積常ニ副症ニシ
テ本症ニハ非ザルナリ。○但阿片ヲ用井ムト欲スル
ニ方テハ。血積亦甚大ニ恐ルベキノ一症ナリ。故ニ此

症ニ於テ。腦ト神經系トノ神經性所患ヲ治セムニハ。
阿片ヲ以テ適應トナスト雖。若コレニ兼子テ腦ニ血
積アルカ。或ハ焮衝アルカハ。其害亦甚大ナリ。而シテ
阿片ノ力。唯此病ノ昏睡及卒厥ニ陷ルヲ促スベキノ
ニ。其證ハ則彼ノ貌樂運ノ醫流行ハル、間。吾輩屢哀
ムベキノ諸症ヲ目撃セルヲ以テ知ルベシ。○當今ハ
世人貌樂運流ノ害アルヲ懼ル、ヨリ。遂ニ阿片ノ功
用ヲ遺忘スルニ至レリ。故ニ予今此ニコレヲ辨明シ。
阿片ヲシテ其本分ノ聲價ヲ得セシメムト欲スルナ
リ。

濟生三考

世

天真樓藏版

濟生三才 卷中

天眞婁歲反

神經熱ニ阿片最良功アリテ必要闕クベカスザルノ
症四アリ。

其一。神經熱其初ヨリ單純神經性ナル者。即虚衰ノ熱
ニシテ。精カヲ過勞シ。交媾手淫ヲ過行シ。若クハ過飲
等ニヨリテ發シ。或ハ既ニ神經性ナル人ニ發シ。或ハ
毫モ焮衝ノ候ナキ者。是ナリ。此症ニ於テハ少シク瀉
劑ヲ用井テ後。直ニ阿片ヲ與フベクシテ。更ニ他藥ヲ
要セザルヲ多シ。當今阿片ヲ耽飲譫妄ニ稱用スルハ。
其理亦此ニアルナリ。○又一種ノ神經熱アリ。特ニ少
年脆弱神經性ノ人ニ發ス。大抵患者大ニ疲レ。其脉刺

衝セラレ、狀アリ。而シテ唯輕キ譫妄アルノミニシ
テ。別ニ局處ノ患狀ナク。又脉ニ焮衝ノ候ナク。又頭部
ニ血積ノ徵ナキ者ナリ。此症ニ於テハ。消火ノ諸藥稍
功ヲ奏スト雖。熱ト譫妄トハ稽留シテ八日ヨリ十四
日ニ至ル。此ニハ唯其消焮ノ湯液ニ少量ノ阿片丁幾
ヲ加フルヲ以テ足レリトス。コレニ由テ熱譫妄共ニ
速ニ消ス。

其二。已ニ適宜ノ瀉血ヲ行ヒ。寒罨ヲ施シ。下藥ヲ用井
テ後。血積ノ徵除クト雖。譫妄尚止マズ。或ハ却テ狂躁
ニ變スル者アリ。是純然タル神經性ノ者トス。阿片以

濟生三才

世五 天眞婁歲反

濟生三考 卷中 天眞棗核反

テコレヲ完治スルニ足ル。但甘汞ヲ加フルト前方ノ如クニシテ更ニ良ナリ。

予嘗阿片ヲ以テ予ノ同僚ヲ救ヒシコアリ。當時ノ喜遂ニ忘ルベカラズ。予ガコレヲ診スル時ハ劇症窒扶

斯ノ第七日ニアリ。脉小ニシテ殆數フベカラズ。昏睡醒メズ。譫妄シ。又筋惕アリ。瀉血寒暈下劑甘汞已ニ多

量ニコレヲ施セリト云フ。予乃前方ノ如ク阿片甘汞ノ和劑ヲ與フ。六服ノ後脉稍徐トナリ。且大ニ顯レ。瘕

症消除シ。頭部輕キヲ覺エ。分利始メテ起リ。遂ニ全治スルコトヲ得タリ。○此ノ如キ治例。予悉コレヲ舉ゲム

ニハ其幾許ナルコトヲ知ラズ。

其三窒扶斯其初發ヨリ泄瀉痢霍亂等ヲ兼子發シ。コレニ因テ已ニ血ヲ腦ヨリ誘導スルコトヲ得タリト雖。

又其生力耗竭シ。真虚ニ因テ死スベキノ恐愈多キ者アリ。此症ニ於テ其泄利ヲ遏メ。腸ノ刺衝ヲ鎮靖シ。以

テ性命ヲ救フニ於テハ。阿片ヲ以テ無二ノ藥トス。○千八百六年及千八百七年文化三年ニ於テ。字漏生國名

ニ流行セル軍中疫ハ。實ニ窒扶斯ノ瀉下ニ合併セル者ニシテ。唯阿片ノミヲ以テ能コレヲ救フコトヲ得タ

リ。

濟生三考 卷中 天眞棗核反

其四。生力全ク耗竭シ。保生法インヂカチオヒタリス按ニ唯生ヲ保ツヲ主トスル療法。主治ノ候顯レ。有カノ神經藥及興奮藥ヲ與フレ。其脉沈小ニシテ疾ナル者興復スルヲ得ザル症。是ナリ。此時ニ在テハ他ノ刺衝藥ニ阿片液ヲ加ヘ。少量ニ屢用井ルヲ以テ最大良法トス。

此症ニ於テハ。阿片能一夜間ニ其小疾ノ脉ヲ鎮靖シ。實ニシテ且カアラシメ。譫妄ヲ鎮メ。神識ヲ醒起シ。虚衰セシムルノ泄出ヲ遏止シ。以テ望外ノ變革ヲ致ス。實ニコレヲ貴靈ノ天寶ト稱スルニ足レリ。

然リト雖。凡神經熱ヲ療スルニ方テハ。宜ク先下藥ヲ

用井テ。頭腦ヨリ導降シ。而シテ後始メテ阿片ヲ與フベシ。切ニ其早キニ失スルヲ勿レ。

間歇熱

阿片ノ功又間歇熱ニ於テ最昭明ナリ。特ニ惡性間歇熱ニ於テ著シ。此病ニ於テハ。實ニ阿片ヲ無二ノ救生藥ト稱スベシ。而シテ吾輩阿片ノ此カヲ知リテヨリ。始メテ能此病ヲ治スト言クヲ得ルナリ。蓋此カヲ發明セシハ。實ニ留散ドク忽弗ホフ滿マン名ニ在リ。夫間歇熱阿片ヲ施スベキノ症ハ。其發作ゴトニ卒厥昏睡等。生命危殆ノ症ヲ兼子發シ。太抵第二發或ハ第三發ニシテ死

二至ル者ナリ。此症ニ於テハ。阿片二般ノ方ヲ以テ能ク
生命ヲ救全ス。即其一ハ此卒厥ノ發作中ニ用井ルニ
在リ。凡、刺絡ヲ以テ此卒厥ヲ救ハムト欲スル者ハ甚
惑ヘリ。此症ハ全ク痙攣ヨリ他ナクシテ。而シテ能ク
レヲ除キ。其厥症ヲ復セシムルヲ得ルハ。特、阿片ノ
ミナリ。其二ハ發作ヲ防止スルガ為ニ用井ルニ在リ。
此發作ハ即間歇熱ノ發動ニシテ。コレヲ預防シ。務メ
テ速ニ熱ヲ遏止スレバ。即病全ク治ス。然レド此發動
ヲ遏止スルニハ。次方ヲ施スヨリ。的切ナルハナシ。其
方ハ則發作ノ間時ニ於テ。新ニ研末セル黃幾那ハ錢

ヲ與ヘ。其終服ニ阿片一匁ヲ加ヘテ。次ノ發作前ニコ
レヲ與フ。此方ハ總テ頑固ノ間歇熱ヲ截スル最確ノ
方ト稱スベシ。

痙

痙性神經病ニ阿片ノ一大藥タルヲハ。世人ノ普ク知
レル所ニシテ。又常ニ多ク此症ニ施用ス。故ニ庸醫ト
雖。痙ノ名ヲ聞ケバ。阿片ノ名ヲ舉ゲザル者ナシ。而シ
テ大不幸正ニ其中ニ在リ。其故ハ痙ニ阿片能クコレヲ
救フベキ者ト。阿片能クコレヲ害シ。能ク死ニ至ラシムベ
キ者アリテ。其差別帝ニ霄壤ノミナラザルヲ以テナ

リ。○蓋能コレヲ辨識シ。且コレニ注意スル者幾人ゾヤ。故ニ予此ニコレヲ説カザルヲ得ズ。
阿片ヲ用井ムト欲スルニ方テ宜ク辨明スベキノ症三アリ。其一ハ則其瘧多血或ハ頭腦血積ヲ兼子。或ハ焮衝性ヲ兼子。或ハ單ニ焮衝ニ因テ發スル者。其二ハ則瘧胃腸汚物ヲ兼ヌル者。或ハコレニ因テ發スル者。其三ハ則瘧右等ノ合併症ナク。單純神經性ノ者是ナリ。其第一症ハ少年ノ人ニ多ク。特ニ小兒生齒ノ時ニ發スル症ニシテ。阿片能其瘧ヲ増進シ。或ハ卒厥ヲ發シテ死ニ至ラシムベシ。此症ハ必先瀉血ヲ行ヒ。消焮

誘導ノ藥ヲ施シテ。其血積ヲ掃除スルヲ要トス。大抵此法ニ因テ瘧全ク治スルヲ多シ。按ニ世ニ所謂小兒驚風ハ蓋此類ナル
シ。若夫右ノ方法ヲ施セバ。瘧尚留連スル者ハ。始メテ阿片ノ施用ヲ許スベシ。然レモ仍先無熱ノ鎮瘧藥即菲溫沙密。老利兒。結爾斯水。亞銘等ヲ與ヘ。其功ヲ奏セザル時ニ至テ。始メテ阿片ヲ用井ルヲ以テ勝レリトス。○其第二症ニ於ルモ亦阿片功ナクシテ害アルベシ。此症ハ宜ク先吐下藥ヲ以テ胃腸ヲ淨滌スベシ。大抵コレニ因テ瘧ヲ鎮ムルニ足ル。而シテ若瘧尚止マザル片ハ。始メテ阿片ヲ與フベシ。○其第三症ハ則阿

片適應ノ症ニシテ。其神經性ノ痙攣真ノ衰弱ニ因レ。或ハ曩ニ瀉血ヲ行ヒ。若クハ下劑ヲ與フル等ニ由テ。患者衰弱スルヲ愈甚ケレバ。阿片愈適應ス。要スルニ。其脉愈小愈軟愈虚ナレバ。阿片愈宜トス。但單純依私的里性ノ痙攣ニ於テ宜ク更ニ注意スベキハ。依私的里ノ患者。屢阿片ヲ嫌惡スル異癖アルヲ以テ。常ニ菲臘沙密葛斯突樓謨等ノ調和劑ヲ加ヘ用井ルニ在リ。舍電汎名ノ製劑。其意蓋此ニ在リ。又古人ノ稱用セル底野迦及密篤利達多等。皆阿片ニ芳辛ノ諸藥ヲ加フルモ同理ナリ。

但予ガ久ク試驗スル所ニ據ルニ。神經性ノ劇症痙攣。特ニ其腹部或ハ脊椎及肋間神經ニ根據スル者ニ於テハ。阿片ヲ内用スルヨリハ。灌腸藥トシ行フテ。其功更ニ峻ナリトス。

創後之神經症

更ニ創傷ノ刺衝アリ。此ニコレヲ辨論セザルヲ得ズ。○大創大失血ノ後或ハ多量ノ瀉血ノ後。患者痙性トナリ。全身強直シ。死セルガ如キ者。或ハ右ノ原因ノ後。第二三日ニ於テ疼痛極ノテ劇ク。脉及其他ノ症狀。神經性痙性ヲ呈シ。脈衝ノ色鮮活ナラズ。其膿却テ稀

水トナラムト欲スル者ニハ。阿片實ニ無二ノ救生藥ニシテ能速ニ其全症ヲ變革セシムルヲ得ルナリ。是此藥一併ニ能痛ヲ緩ノ。痙ヲ除キ。生カラ増加シ。且其固有ノカヲ以テ。特ニ尿管系ト其造育機トヲ興奮シ。焮衝ト化膿ノ機ヲ旺盛セシムルニ因ル。近日予子宮截開法ヲ行ヘル患者ニ於テ。阿片ノ此力ヲ證スルヲ得タリ。予ガ診セルハ手術後第五日ニシテ。患婦頗衰弱セリ。其手術ハ破漿後三十六小時ニ於テ行ヒ。瓦拉歌^ガ名ノ快手ニ因テ六分時ニ術ヲ完了ス。但術前二度術後一度刺絡ヲ行ヒ。而シテ内服ニハ

李歇里ノ飽和劑ヲ用井。兼子テ菲脛沙密越幾斯ト老利兒結爾斯水トヲ隔次ニ用井タリ。術後第五日ニ至テ疼痛極メテ劇ク。恰陣痛ノ如ク。患婦號叫スルニ至ル。脉進テ百三十五動ニ至リ且小ナリ。而シテ兩手冷エ。粘汗出デ。創ノ焮衝鮮活ナラズ。乃阿片液一滴鎮痙液二滴ヲ取テ。一小時ゴトニコレヲ服セシム。一二時ノ後疼痛退キ。脉復シ減スルヲ二十動。創縁鮮活ニ焮衝シ。分泌ノ液濃稠ヲナシ。コレヨリシテ快復ノ良機發成シ。遂ニ全治スルヲ得タリ。創後ノ牙關緊急及全身強直ニ於テ。阿片無二ノ救生

藥タルハ。醫家普ク知ル所ニシテ。復予ガ言ヲ待タズ。此症ニ於テハ阿片ノ神經痙ヲ鎮靖スル力。最驚讚スベキ所ナリ。但此ニハ全身ノ神經覺機。痙攣ノ為ニ縮閉シ。阿片ノ麻力亦輒功ヲ顯サバルニ至ル。故ニ此症ニハ能極大量ヲ用井テ害ナシ。然レモ其痙已ニ鎮靖スルキハ。覺機常度ニ復シ。阿片ニ抵抗スルノ機能再顯ル。○此症ニ於テモ。亦多量ノ阿片ヲ灌腸藥トシ用井ルヲ峻功アリトス。特ニ牙關緊急スル者ニ於テハ。灌腸藥ノ外他道ナシ。其量ハ則每一回阿片液四錢。或ハ八錢ニ至ルベシ。

精神錯亂

阿片ノ功精神錯亂ニ於ル甚一定セズ。或ハ迅疾的切驚クベク。或ハ毎ニ其功ナク。或ハ又大害ヲ致スリ。○故ニ其症ヲ辨別シ。其當否ヲ察定スルヲ必要トス。○其況則ト謂フベキハ。凡精神ノ所患單純神經性ニシテ。真ノ衰弱ヲ兼子。或ハ衰弱ニ因テ發スル者ナルキハ。阿片愈功ヲ奏スベシ。例スルニ精神錯亂過飲。或ハ過房ニ因スル者。即振揚譫妄依私的里性ノ者。焮衝後ニ發スル者。及單ニ神識ニ因スル者ニ於ルガ如シ。然レモ若多血ノ候アルカ。或ハ其腦陽性焮衝様

ニ興奮セラル、カ。或ハ黒膽質ノ人ニ多キガ如ク。病ノ本因。腦ト神経系トニ在ラズシテ。却テ腹部諸臓ノ壅塞鬱蓄ニ在ルキハ。阿片只害アリテ益ナシ。但其有形ノ因既ニ除キテ後。病單純神経性トナリテ留連スルキハ。阿片能功ヲ奏スベシ。○又神経性譫妄ニ阿片ヲ用井ルハ。内服スルヨリハ。灌腸藥トシテ用井テ其功勝ルヲ多シ。

咳及胸患

咳ト胸患トハ。亦阿片ヲ施スニ方テ。宜ク明辨スベキノ一症ナリ。○夫諸種ノ咳。或ハ諸種ノ肺勞。阿片ニ因

テ治スルヲ固ヨリ多シ。然レモ又阿片ニ因テ却テ險重シ。或ハコレニ因テ始メテ真ノ肺焮衝ニ至リ。遂ニ真肺勞ニ陷ルヲ更ニ多シ。其理蓋胸患ノ性各異ナルニ因ルナリ。而シテ其各異ヲ辨識スルハ。即醫ノ術ナリ。若夫其咳焮衝性ノ者ナルカ。或ハ肺ノ焮衝若クハ血積ニ因スルカ。或ハ否ザルモ是等ノ症狀ニ兼ヌルキハ。阿片常ニ害アルベシ。聖京咳ニ於ルモ亦然リ。其焮衝狀ノ刺衝ヲ兼ヌル間ハ。阿片常ニ害アリ。又腸胃性ノ咳ハ。唯吐藥ヲ以テノミ治スベクシテ。阿片ニ因テハ必險重ス。若夫其咳單純神経性ナルカ。或ハ痙性

ナルキハ。阿片ヲ除クノ外更ニ的切ノ藥ナシ。唯一服ノ柁歇兒散臨卧ニコレヲ與ヘテ能ク其症ヲ一掃ス。又百日咳ノ第二期神經性ノ時ニ至テハ。阿片ヲ以テ主藥ノ一トナス。又肺勞ノ一種其初起ヨリ單純神經性ニシテ肺ト神經全系トノ覺機尤進スルヨリ發スル者アリ。此症ニ於テハ肺及全身ノ覺機ヲ鎮降スルヲ以テ最要トス。故ニ驢乳。依蘭苔漿沙列布。温浴法。毛布衣等ヲ用井ルノ外。更ニ阿片ヲ兼子用井テ能ク其咳ヲ減シ。諸症ヲ除クヲ得ベシ。

痢

痢ニ阿片ヲ應用スルハ。又精細ヲ要スルノ一事ナリ。○夫此症ニ於ル。亦其各症ヲ明辨スルヲ最要トス。凡膽液性。或ハ焮衝性ノ痢ニ阿片ヲ用井ムト欲スル者ハ。多クハ患者ヲ藥死スベシ。然レモ單純。痲質性ノ痢ニ於テハ。阿片ヲ無二ノ救生藥トス。千七百九十二年^{我寬政四年}野戰ニ。李漏生^{名國}ノ陣中。流行セシ所ノ痲質性痢ノ如キハ。濕冷ニ因テ發シ。其勢極メテ猖獗ニシテ。當時ノ常法ナリシ大黃末ヲ以テ療セシノ間。既ニ幾千人ヲ斃セシガ。阿片ヲ用井ルニ至テ始メテ治シ。遂ニ全ク除クヲ得タリ。○但此症ニ於テモ亦

宜ク先伊百加格安那ノ吐劑ヲ與ヘ。而シテ後阿片ヲ施スベシ。但一回ニ全量ヲ與フルヲナカルベシ。宜ク粘液或ハ乳劑ニ和シテ少量ニ屢與フルヲ要トスベシ。否ザレバ動レハ頓ニ利ヲ過閉スルヲアリテ最危シ。要スル所唯粘液及血ノ分利増進スル者ヲ徐ニ減少シ。且其痙攣ニテ大便ヲ停止スルヲ除クニアリ。コレ上法ヲ以テ最能達スベキ所ナリ。

尿崩

尿崩ニ於ル其症狀又痢ニ同キ所アリ。コレ此病又尿痢ノ名アル所ナリ。何トナレバ此症ニ於ルモ亦其近

因腎ノ機能病ヲ得テ興奮レ遂ニ搖擗性ヲナスニ在リテ。又其蜜尿ニ於テハ補給カ分泌機舍密機性一種特異ノ變ヲ得テ尿中常有ノ鹽ヲ生セズ。却テ糖ヲ生スルニ因レバナリ。○夫此近因ヲ治セムニハ。阿片實ニ主藥タリ。但其遠因幾般アリテ。或ハ全ク近因ニ反セルヲアレバ。預諸般ノ藥ヲ施スヲ要シ。又コレニ因テ全治ヲ得ルヲアリ。○若夫多血血積病。毒轉移腹部壅塞等ノ原因アラザルカ。或ハコレ有ルモ已ニ除キテ後。尿崩尚留連スルハ。宜ク單ニ尿崩ノミヲ主治シ。腎ノ特異ノ興奮ト。其分泌ノ乖戾トヲ復スルヲ主トス。

ベシ。此ニハ阿片ヲ一大主藥トス。是此藥此症ニ現存
 スル所ノ兩件ノ主治ヲ兼ヌルヲ以テナリ。即一ニハ
 局處ノ神經興奮ヲ除キ一ニハ強ク皮表ニ導キ蒸氣
 ヲ催進シ。以テ患部ノ病機ヲ誘導シ。且コレニ對衝ス。
 故ニ此ニハ肉食ニ兼子テ。阿片ヲ用井ルヲ必當ノ主
 藥トス。但大量連服スルヲ要トス。是屢予カ親驗スル
 所ナリ。寔兒連落兒樂蒲拉涅子共ニ等亦其試説アリ。風
 秘多斯名亦其尿管篇中ニ阿片ヲ稱讚セリ。
 毒及傳染毒ヲ防グノ力。又阿片ノ功中顯明ノ一事ナ

リ。
 古人謂ヘラク。阿片ハ能毒及傳染毒ヲ拒グノ力アリ
 ト。彼ノ密多里達篤ト名ソクル製劑ハ。阿片ニ芳辛ノ
 藥ヲ和スルヲ猶底野迦ノゴトキ者ナリ。ホンチュス名地
 ノ王ミトリダテストイヘル者。毒ヲ防グガ為ニ毎日
 コレヲ用井シヨリ。遂ニ此名ヲ得タリ。又マルキュスア
 ウレリウス帝ハ。常ニ底野迦ヲ用井タリ。
 夫神經ノ知覺少シク痴鈍ヲナセバ。能毒及傳染毒ノ
 カヲ減スト云フノ説。理ナキニアラス。蓋毒ノ感傳ス
 ルハ。生體ノ感受機ニ關リ。感受機ハ則知覺ノ敏鈍ニ

關ルヲ以テナリ。依ト毘埵兒性依斯的里性ノ人ハ其
覺機特異ニ内部ニ引縮スルガ故ニ。外感ニ應スベキ
ノ感受機衰弱シ。コレニ因テ傳染病流行病ニ罹ル
少キモ亦一顯證ナリ。

但毒ニ二種アリ生毒毒傳染死毒是ナリ。是宜ク辨識ス
ベキ所ナリ。

其生毒ニ於テハ阿片唯二般ノ應用アリ。其一ハ其神
經ヲ痴鈍ニシ。神經力按ニ即衰弱セシムルノ能ナ
リ。其二ハ其汗ヲ發シ。毒ヲ揮散驅逐スルノカナリ。○
但古昔ノ醫輩ハ阿片ノ血行ヲ増進シ。熱ヲ起シ。焮衝

ヲ催スノカラ詳察セザリシナリ。コレニ因テ誤用極
メテ多ク。世ニ大不幸ヲ播セリ。蓋其説ニ急性諸熱病。
皆傳染毒ノ致ス所ナルヲ以テ。宜クコレヲ驅散スベ
シト謂ヒテ。普ク阿片ヲ用井タルガ故ニ。諸種ノ熱病。
多クハ惡性腐敗性ニ變シ。粟疹紫斑ヲ兼ヌルニ至ラ
ザル者殆少シ。
急性傳染毒ニ於テハ阿片然ク常ニ大害アルベシ。但
其傳染ノ初ニ於テハ。托歇兒散一服ヲ服シテ温覆發
汗シ。能一晝夜ニシテ其病ノ萌芽ヲ刈リ盡スノアル
ノミ。

慢性傳染毒ニ於テハ然ラズ。此ニハ阿片ノ血ヲ興奮シ。皮表ニ導達シ。揮散セシムルノ大能。最善ク適應シ。此症ニ於テ屢生體ノ抗拒缺乏スル者ヲ補フコトヲ得ベシ。

慢性傳染毒中第一徵毒ヲ論ゼザルコトヲ得ズ。幾多ノ試験ニ據ルニ。徵毒ノ殘患。水銀功ナキ者ニハ。阿片ヲ以テ峻藥トナスベシ。千七百八十年我安永ヨリ千七百八十五年我天明ニ至ル間。英吉利ニテ汞ヲ用井ズ。單ニ阿片ヲ以テ徵毒ヲ治スルノ説ヲ唱へ。且多ク其試説ヲ刊行セリ。夫然ク單ニ阿片ヲ以テ徵毒ノ諸症

ヲ消除シ得ルコト固ヨリ疑フベキニ非ズ。別爾那兒ド人名ノ治徵秘方ハ。阿片ト亞爾加里トヲ以テ製スル者ニシテ。其功亦著シ。予ガ親驗スル所。及諸家ノ驗説ニ據テ考フルニ。汞ノ特異徵毒ヲ殺スノ力ハ。阿片ノ能得テ代ルベキ所ニ非ズト雖。徵毒ニ因テ發スル所ノ諸症。生體ノ抗拒。及病毒ノ分利ト排泄トハ。阿片ノ力ヲ以テ能コレヲ催進調理スルコトヲ得ルナリ。傳染ハ第二期。焮衝ノ狀除キテ後。阿片ヲ加ヘ用井テ著ク汞ノ力ヲ強進スルコトヲ得ルハ。予カ屢驗スル所ナリ。經久徵毒。特ニ屢汞ヲ誤用シテ變性セル者ニ於テハ。阿

片ニ昇汞ヲ伍シ用井テ峻功アル。迥ニ單昇汞ヲ用井ルニ勝レリ。此時ニ於テ昇汞ヲ用井ムト欲セバ阿片實ニ缺クベカラザル者ニシテ。啗ニ汞ノ調和藥タルノミナラズ。更ニ汞ノ一大助藥タリ。コレニ因テ啗ニ此苛厲ノ礦ノカナル胃中灼熱胃瘵惡心疝痛下利等ノ危症ヲ防グベキノミナラズ。大ニ汞ノ徽毒ヲ揮散驅除スルノ功カヲ增加シ。特ニ毒ヲ再育スルノ機ヲ滅盡スベシ。是此症ヲ療スルノ正鵠ナリ又兼子テ阿片ノ皮表ニ導達スルカ大ニ利アリ。此功ハ汞ニハ全ク無キ所ニシテ。特ニ衰弱遲鈍ノ患者ニ於テ能有

利ノ發汗分利ノ泌別ヲ致ス所ナリ。

阿片ノ此功ヲ詳明シ。且其應用ヲ理會セシメムガ為ニ。予今此ニ此病ノ然ク變性隱伏セル狀態ノ内情ヲ辨說セザルヲ得ズ。此症ハ則世人或ハ經久徽毒ト名ヅケ。或ハ變性徽毒假扮徽毒等ト名ヅケ。又續發徽毒或ハ第二徽毒ト名ヅクル者ニシテ。近世最多ク。且幾多ノスヲシテ。其生ヲ苦マシムル所ノ者ナリ。蓋此症常ニ同一ノ性ナルニ非ズ。屢甚異ナル者アリ。第一其毒尚現存スルト毒ヲ再育スルカノミ存スルトヲ辨識スルヲ要トス。

毒已ニ殲キテ而シテ毒ヲ再育スルカノミ生體ニ存
スルコトアリ。是微毒ニ承ヲ用井テ。其諸症纔ニ消スレ
バ輒足レリトシ。更ニ連用セズレテ治法尙未完ナル
者ニ最多キ所ナリ。○蓋此再育ノ力ハ專ラ神經ノ所有
ニシテ。猶諸種各異ノ自然分泌ノゴトシ。○然レバコ
レヲ除カムニハ。有力ノ神經藥ヲ必要トシ。特ニ阿片
ヲ以テ特驗ノ藥トナシ。又承ノ良佐トナスベシ。○或
ハ又其毒隱伏蟄睡セル者アリ。是治後經久ニシテ毒
再發スル者アルヲ見テ知ルベク。又他ノ諸感ニ比シ
テ知ルベシ。即温素ノ如キ能顯レ或ハ能潛ミテ體中

ニ存スルコトヲ得。又狂犬毒ノ如キ數月乃至數年間體
中ニ潛伏スルコトヲ得ルヲ以テコレヲ證スベシ。○此
時ニ方テ其揮發鑽透刺衝ノ功ヲ以テ。此睡毒ヲ醒覺
興奮シ以テ。分利ノ經營ヲ受ケシムル者ハ。阿片ヲ舍
テ何ゾヤ。又慢性痙攣アリテ。毒ヲ縛任鎖閉スル者ア
リ。此時ニ方テ能此痙ヲ除キ。毒ヲシテ發動スルコトヲ
得セシムル者ハ。阿片ヲ舍テ何ゾヤ。
又毒已ニ久ヲ經テ。深ク生體ニ侵入シ。恰生體ニ瘡合
化同スル者アリ。○此時ニ方テ深ク生體ノ纖細部ニ
入り。其ヲシテ遍ク一新ノ抗拒ヲ起サシムル者ハ。阿

片ヲ舍テ何ゾヤ

更ニ一症アリ。近日最多シ其症ニ於ル其毒已ニ微ナ
ラス。久ク汞ヲ誤用スルニ因テ其本性ヲ失フト雖未
完ク殲滅セズ。却テ一個新發ノ病機ヲ生ジ。全ク特異
ノ惡液トナレル者ナリ。此症別ニ命名ナシ。恐クハ嗣
生。微毒トモ命ズベシ。此症單ニ汞ノミヲ以テハ復
治スベカラザル者ナリ。或ハ又過量無法ニ汞ヲ用井
ルニ因テ患者實ニ汞毒ヲ得ル者アリ。右ノ諸症ニ於
テハ阿片ノ興奮鑽徹シテ分利ヲ進メ。特ニ皮表ノ分
利ヲ催進スルノカ必當ナリ。

右説ク所ノ各異諸症。其見徵ニ至テハ。蓋屢辨シ難ク。
或ハ全ク辨スベカラザルヲアリ。故ニ尋常コレヲ統
稱シテ續發微毒。或ハ變性微毒トイフ。然レ凡是等ノ
症。塗擦法。吐涎法共ニ功ケキ者ニ於テ昇汞ニ阿片ヲ
加ヘ用井テ全治スルヲ得タルハ。予ガ屢親驗スル
所ナリ。

若夫其病果シテ汞病ナルハ。汞能コレヲ治スルヲ
ヲ得ザルベシ。又コレヲ以テ其汞病ナルヲ察知ス
ベシ。此ニハ唯硫黃能全治ヲ遂グルヲ得ルナリ。但
阿片ハ又其良佐トナスベシ。

是ニ由テ。予又阿片理家毒按ニ即上ニ所謂死毒ニテ專ラ金石ノ毒ヲ謂フヲ解スルノカヲ舉ゲザルコトヲ得ズ。理家毒トハ特ニ礦性ノ毒ニシテ。汞毒。鉛毒。及砒毒ヲ謂フナリ。凡是等ノ毒。已ニ局處按腸ニカヲ奮テ後第二道ナル血管全系ニ遷移スルハ。阿片ヲ以テ隊長トナスベシ。鉛毒ニ於テハ先第一道ヲ掃滌シテ後。阿片ヲ以テ主藥トナスハ。世ニ知ル所ナリ。又慢性ノ汞毒。砒毒ニ於ルモ亦同。但此ニハ舍密化調ノ大藥ナル硫黃ヲ兼用スルヲ要トス。又阿片流涎ヲ防グノ力。其理蓋亦此ニ基ク。此力ニ由テ。汞ニ伍用シテ能流涎ヲ預防シ。又其已ニ來

レル者ヲ治ス。但此力ハ其理又其皮表ニ導達シ。汗ヲ發シ。コレニ由テ誘導對衝スルノ能ニ關ルコトアリ。即次條ニコレヲ辨明スベシ。蝮蛇咬等ノ動物毒ニ阿片ノ功アルハ亦專其速ニ汗ヲ發シ。分利ヲ起スニ由ル。

分利 使皮膚活發

皮膚ノ全系ニ分利ヲ進メ活發セシメ其病性ノ泌別ヲ起サシムルハ實ニ阿片ノ特異秀拔ノカナリ。此力ハ次ノ二症ニ於テ最彰明ナリ。

其一ハ痘ナリ。若夫惡性神經性痘。見點後第五日。或ハ

第六日ニ於テ醸膿成ラズ却テ水様稀膿ニ變セムト
欲シ。痘實セズ。或ハ惡色ニシテ寒壞疽ニ陷ラムトシ。
生力沈衰シ。窒扶斯性熱甚シキハ。其痘ノ醸膿ヲ進
メ。分利ヲ完成シ。以テ患者ヲ救フニ於テハ。其功阿片
ヨリ峻ナルハナシ。是予ガ少壯ノ時屢實驗セル所ナ
リ。特ニ多ク千七百八十六年我天明ウエイマル地名ニ流
行セル惡性痘ニ於テ試驗セリ。○蓋此ニハ阿片二般
ノ能ヲ以テ能。其勲ヲ致ス者ナリ。即一ハ其鎮靖ノ能
ヲ以テ。全身皮膚ノ痛楚。患者ヲシテ衰憊セシムル者
ヲ除キ。一ハ其興奮ノ能ヲ以テ。其既ニ半ハ死セルノ

皮膚ニ。有力ノ分利機ヲ催進スルニ在リ。○其二ハ寒
壞疽ナリ。特ニ老人ノ皮膚ニ局發シテ。前發ノ嫩衝ナ
キ死壞ナリ。此症ハ單ニ造育ノ生力不足ナルニ因ス
ル者ニシテ。諸ノ試驗ニ由ルニ。阿片實ニ無二ノ救藥
ナリ。

阿片ニ醸膿ヲ進ノ良膿ヲ造成スル異功アリ。故ニ凡
膿ヲ進ムベキ諸症ニコレヲ用井テ大利アリ。

但阿片ヲ用井テ。蜜汗ヲ發スルノミナラス。形狀不定
ノ疹ヲ發シ。特ニ粟疹狀ノ疹ヲ發シ。以テ分利ニ至ル
ヲアリ。特ニ隱伏依窟篤アル患者ニ於テ。予屢驗スル

所ナリ。是慢性諸病。特ニ神經病ニ於テ宜ク注意スベ
キノ要件ナリ。凡、神經諸病。尋常見テ無形ノ因ヨリ發
スト為ス者。却テ有形ノ因ニシテ。病毒神經ニ固著シ。
其整齊ノ機能ヲ妨グルニ因テ發スル者多ケレバナ
リ。今一例ヲ舉グ餘ハ類推スベシ。

一男子歳壯。六年来膝痛ニ罹リテ蹇跛ス。偶、痢ヲ患ヒ
テ阿片ヲ用井ザルヲ得ザルニ至ル。已ニシテ強ク
發汗シ。全身ニ疹ヲ發シ。膝疾隨テ除キ。爾後行歩常ニ
復スルヲ得タリ。○此症蓋、レ麻質毒ノ膝ニ轉セル
者ニシテ。此毒阿片ニ因テ誘動セラレ。疹トナリテ皮

膚ヨリ分利シ去レル者ナリ。

異常組織

諸種ノ外部瘰肉ニ於テ阿片ノ功亦甚偉ナリ。特ニ腔
内瘰肉。鼻痔。聽道瘰肉等ニ久ク外敷スレバ。漸ニシテ
凋萎シ。遂ニ全治スルニ至ル。蓋此局處ノ治力ハ。醫宜
ク諸種ノ類症ニ試用スベキ所ナリ。

姑息之能

阿片姑息ノ能力ハ常ニコレヲ副能ト為スト雖。屢本
事トナルヲアリテ。然モ其力他ノ諸麻藥ニ超絶ス。今
コレヲ説テ以テ此篇ヲ終ヘムトス。○何ヲカ姑息ノ

濟生三考
卷中

天眞樓藏版

能ト謂フ苦痛ヲ軟和シ意思ヲ鎮靖興奮シ且死ヲ輕
易ニスルノ能是ナリ。○夫不治必死ノ症ニ於テハ生
命實ニ痛苦ノ羈絆ニシテ其死スルニ方テモ尚且幾
多ノ苦ヲ受クルヲ免レザル者多シ。此時ニ於テハ
阿片ノ此一能亦多トスルニ足レリ。况ヤ其生ヲ勸慰
スルヲ阿片ニ如ク者ナキニ於テヲヤ。○故ニ予ハ謂
ヘラク。阿片假令更ニ一個ノ他能ナキモ。此一事實ニ
天ノ貴賚ト稱スルニ足ルト。
千百ノ醫藥中。痛苦ヲ鎮ノ。然モ久クコレヲ消除セシ
ムルヲ阿片ノ如キ者ハアラス。予ガ療スル所ノ患者。

宵ニ阿片ヲ服シ。詰且ニ至テ全ク症ヲ改メ。言語態容
ヲ一新スル者。予ガ驗スル所常ニ百回ノミナラス。而
シテ其功特留スルヲ常ニ一晝夜ニ至ル。
予今其症ノ一二ヲ舉ゲムニ。肺勞ノ患者。已ニ其回生
ニ望ナク。煩悶ト大氣ノ缺損ニ因テ。漸消耗スルガ如
キ。不治ノ癌病。日夜痛楚ヲ受クルガ如キ。胸水ノ患者。
久ク死悶ヲ受クルガ如キ等是ナリ。○此症ニ遇テハ。
阿片ナクンバ誰カ醫タルヲ願ハムヤ。此ノ如キ患
者。阿片ニ因テ其狂迷ヲ免ル者。幾許ナルヲ知ラ
ズ。蓋阿片ノコレヲ救フハ。常ニ其身體ノ痛楚ヲ除ク

濟生三考
卷中

天眞樓藏版

ノミニアラス。更ニ精神ニ一異ノカヲ與ヘ。且ッコレヲ
 弊起シテ。自安息セシムルニ在リ。
 此鎮靖ノ力最昭然タルハ。其險症ニ於テ死ヲ易クシ。
 令終ヲ得セシムルニ在リ。若夫醫己ニ其命緒ヲ繫ク
 一能ハザルニ至テハ。此一事實ニ亦醫ノ仁術ニシテ
 且其好福ナリ。此時ニ方テハ。阿片啞ニ將死ノ痛苦ヲ
 除クノミナラス。更ニ死スベキノ勇トカトヲ與ヘ。其
 意思ヲシテ魂魄歸スル所アルノ理ニ安ンゼシム。
 予ガ實驗スル所固ヨリ多シト雖。今此ニ近日驗スル
 所ノ一症ヲ舉ゲテ。他ヲ類推セシム。

一男子。已ニ久ク胸病ニ罹リ。肺ニ膿囊ヲ生ジ。正ニ死
 ニ瀕セリ。將死ノ苦悶極メテ劇ク。窒塞ノ恐休ム時ナ
 ク。遂ニ真ノ狂迷ニ陥リ。其狀態殆傍觀スルニ堪ヘザ
 ルニ至ル。○乃其干牌ヨリ。每一小時ニ阿片半片ヲ服
 セシム。三小時ノ後患者安息シ。二片ヲ服シテ後睡ニ
 就キ。數時間安眠シ。詰旦睡醒メテ意思爽快。痛ナク悶
 ナク。精神又強壯鎮靖シ。其親眷ニ向テ徐ニ別ヲ告ゲ。
 更ニ己ノ福ヲ語り。又幾多ノ良戒ヲ遺シ。而シテ再睡
 ニ就キ。睡中ニ生ヲ畢ハレリ。

危害

濟生三才
卷中

阿片ノ危害ニ於テハ。予更ニ此ニ一言セザルヲ得
ズ。嘆ズベシ其危害甚大ニシテ。阿片ノ世ニ害アル其
世ニ利アルト未以テ大小ヲ定ムベカラズ。然レモ是
刺絡ニ於ルモ火藥ニ於ルモ亦然リ。凡^レ天地間ノ大威
大カアル者。皆然ラザルハナシ。譬ヘバ火ノ如シ。凡^レ物
世ニ利スルノ力愈大ナレバ。其世ニ害スルノ力亦愈
大ナリ。豈其誤用ノ害アルヲ以テ。コレヲ無キニ如カ
スト謂フベケムヤ。
其危険ノ第一最大ナル者ハ。其殄殺ノ力ニアラズシ
テ。却テ其誑誘ノ力ニアリ。○阿片ヲ多量ニ服スレバ。

疼痛煩悶。痙攣及其他ノ苦惱等。實ニ良能救援ヲ呼喚
スル所ノ音容ナル者ヲ鎮靖シ。更ニ意志ヲ強クシ。想
像ヲ盛ニシ。精神ヲ勇壯ナラシメ。コレニ由テ患者ト
醫ト共ニ其真狀ヲ察スルヲ得ズ。又其危篤ヲ悟ル
ヲ得ズシテ。輕忽ニ望ヲ養ヒ。是ヲ以テ有力ノ救援
必^レ須ニシテ。尚^ホ其濟ルヲ希フベキノ時日ヲ錯過スル
ニ至ル。
其第二ノ危険ハ則卒厥狀ノ腦患ナリ。○此害特ニ一
歳ノ小兒ニ於テ最大ナリ。予今阿片ヲ禁戒セムト欲
スルモ。筆其意ヲ盡スヲ能ハズ。此ニハ一滴ノ阿片液。

濟生三才

五七
氏真斐鐵版

已ニ過強ノ量トナスベシ。只危篤ノ極。必須ノ症。譬へ
 バ大瀉下。精カラ耗竭スル者ノ如キ。始ノテ阿片ヲ與
 フベシ。但、仍灌腸藥トナスヲ以テ勝レリトス。若夫内
 服ニハ。一滴ヲ砂糖ニ研和シ。四分シテ其一ヲ與フル
 ヲ以テ適量トス。

其第三ハ。陽性焮衝ニ於テ焮衝ヲ増進シ。膿潰ヲ促シ
 或ハ寒壞疽ニ變セシムルニ在リ。

其第四ハ。胃腸ノ汚物ヲ溢閉シ。腹部諸臟ノ閉塞硬結
 ヲ致シ。且門脈系ニ血ノ蓄積ヲ増加スルニ在リ。

其第五ハ。血ノ溶解腐敗ヲ増進シ。崩汗ヲ促シ。粟疹紫

斑。驚口。瘡ヲ起スニ在リ。諸熱病ニ於テ投施時ニ適ハ
 ズ。或ハ其量過大。或ハ其服用過久ナレバ。此害ヲ招キ
 易シ。特ニ腸胃熱ニ於テハ最然リ。

其第六ハ。習慣ニ在リ。○凡經久病。阿片ヲ連用スレバ。
 終ニコレニ習慣シテ。常日ノ必須トナリ。病已ニ治ス
 ルノ後モ。仍全身ノ覺機ヲ興奮シテ。健康活發ノ度ニ
 至ラシメ。以テ形體ト精神トヲシテ。日用ニ足ラシム
 ルガ為ニ。不缺ノ要藥トナルニ至ルヲ。猶燒酒家ノ終
 ニ燒酒ニ習慣シテ。日常ノ必須トナルニ至ルガゴト
 シ。而シテ其由テ致ス所ハ。則毎ニ其量ヲ加フルニア

り。是所謂阿片癖ニシテ。全ク耽飲ノ癖ニ同而シテ其
所發ノ症ハ則神經ノ衰弱常ニ増加シ。諸部振戰シ。消
食カト補給カト共ニ廢絶シ。終ニ振惕譫妄ヲ發シ。神
識五神共ニ遲鈍シ。出血ヲ發シ。血溶解シ。勞瘵ヲ致ス
等ナリ。

濟生三方卷中終

