


獨度涅烏斯草水譜
初稿本

洋学文庫
文庫 8
F 5
3



從廿七章

カノコキイヌ

到廿五章

フウゲントコウヌ

初編第一套

枉行燒矢再刻分

大政八乙酉二月十二日癸筆

共十四冊

獨度涅烏斯初編第二下

第二十七章 カノヒリス

第二十七章

葛覓必低斯 一名野設乙布列斯

名義 葛覓必低斯 齊亞乙備哈同亞俞哈同

乙發木斯葛

乙發藥 乙發亞兒的力葛 同乙發葛覓必質玉里意多必

居禿伊爾斯已居亞 奇兒及斯密屈居屈禿熱爾瑪

奇兒土設乙布列斯 爾業謁理乙奇木斯葛的奈

地不 和思谷里迭斯曰此草三種アリ

附考 此草ノ形状百印暴莫樹松ニ似スト雖其氣

松脂ニ似タルヲ以テ厲竭百印暴莫矮松樹ト名

ツクベシ

建斯

第一種

和名ヒキヨモキ

漢名莢蒿

第二種

和名コシホカ

漢名馬先蒿

此物北生葛^カ兒^ニ犂^ス斯^ス又北生哈^カ蔓^シ兒^ルノ名アリ大


ニ紛擾ス意ヲ用ユベシ唯其香松脂及百^キ吉^ガ暴^バ莫^ム脂

ノ氣アリコレニ依テ本條ノ種類ニ列ス

△正恭曰前條野生葛^カ兒^ニ犂^ス斯^スノ附考第四種缺

刻^カ葉^カ葛^カ兒^ニ犂^ス斯^ス是ナリ

第三種



總論 此草ノ種類ハ好テ砂石ノ地ニ生ス又葡萄及

膽^タ八^ハ樹^シ下ニ生ス園圃ニ栽テ甚繁茂ス

○第一種ハ地上ヨリ許多ノ小茎ヲ生シ每節葉ヲ

著ス狭長三裂ス七八月葉間黃花ヲ開ク莖葉共ニ

粗糙ニノ毛茸アリ松脂及落葉松脂ノ氣アリ地^チ和^ワ

思^シ谷^コ里^リ迭^ダ斯^ス曰此葉小^コ動^{ドウ}鐸^{トク}兒^ル兒^ル鐸^{トク}佛^{フツ}甲^カ草^{ソウ}○和名

ニ似テ薄ク粗糙ニノ毛茸アリ粘氣ヲ帶フ

Dioscorides zegt dat dit soort van blaasem de *Elegne* *Sonderbaer*
 ofte *Sempervivum* minst gelijct, maar ^{of} nietand *Sinnus*, want ofte
Rapumeticol ende oetel: Ende oerhaer die dit soort oetel te hem
 comt, sal ten eersten inghen *Sattel* van blaasem met het oerhaemde
Sempervivum minst oer een comt, *eyken* *verlyct* als by dat met wel
 orde maectlyke en bedict: want elck deel ofte oerhaemde van syne
 blaasem, is van gheante de blaasem van *Sonderbaer* deer gelijc:
eyken *verlyct* van dat *Sempervivum* twelck onder de *Elegne* *Sonderbaer*
 oerhaer de eerste is yende *eyken* *verlyct* *Elegne* *Sonderbaer* *gerisene* is.

六月項葉間 = 花アリ赤小豆花ノ如ニメ大サ三分許黄色ナリ花萼ニ莢ヲ結フ五分許ニノ稍胡麻莢ニ似タリ故ニ莢蒿鬼油麻ノ名アリ自生ノ地ニアラサレハ育セス移栽ヘ又實ヲ蔞テモ生セス秋後枯テ黑色ナリ是即真ノ漏蘆ナリ蘆菴言俗名莢蒿莖葉似白蒿花黄生莢長似細麻之莢大如筋許有四五瓣七八月後皆黑異于衆草蒿之類也トアリ附考ナ^花白^花音^花ノモノ未目撃
 ○第二種ハ第一種ヨリモ巨クシテ方莖節アリ枝

Faint handwritten notes in a foreign script, likely Latin or Greek, covering the right margin of the page.

クロキ

附考第一種野設乙布列斯ハ其花白色ナルモ青
色ナルモアリ

△正恭曰本條第一種ハ和名ヒキヨモギ又ヨモ
ギモドキト名ツク山野ノ陽地ニ生ス春苗ヲ生
シ一莖直立ノ多枝ヲ分テ葉對生ス狀稍文ニ似
テ細ク黃綠色脚葉紫ヲ帶フ莖葉共ニ毛茸アリ

六月項葉間ニ花アリ赤小豆花ノ如ニメ大サ三
分許黃色ナリ花萼ニ莢ヲ結フ五分許ニメ稍胡
麻莢ニ似タリ故ニ莢蒿鬼油麻ノ名アリ自生ノ
地ニアラサレハ育セズ移栽ヘ又實ヲ蔣テモ生
セス秋後枯テ黑色ナリ是即真ノ漏蘆ナリ蘆菘
言俗名莢蒿莖葉似白蒿花黃生莢長似細麻之莢
大如筋許有四五瓣七八月後皆黑異于衆草蒿之
類也トアリ附考ノ其花白色音花ノモノ未目擊
○第二種ハ第一種ヨリモ巨クシテ方莖節アリ枝

屈曲シテ葉潤久岐多シ花淡赭色或ハ紫赤色葉中ヨリ出ツ花後莢ヲ生ス備兒線箇祿乙鐸ニ似テ甚小ク根細長ニノ鬚アリ是亦毛茸アリテ微白色ヲ帶フ松脂及百吉暴莫脂ノ気アリ地和思谷里透斯曰此物枝曲リテ碗原名按缺兒斯彼國ノ状ヲナス其枝对生スルカ故ナリ

△正恭曰茅二種ハ和名シホカニ菊ト云山中場地又溪澗ノ邊ニ生ス春舊根ヨリ苗ヲ生シ高二三尺許ニ至ル葉ハ榆ニ似テ厚ク長一寸四五分

澗一寸許兩邊缺刻アリテ鋸齒ノ如シ故ニ江列ニテハ鋸草トイフ九月此花アリ眉兒豆ノ如クノ紫赤色大ク一寸許花後莢ヲ結フ扁シテ短シ是本草ノ馬先蒿ナリ

○茅三種ハ莖細ク高サ一掌横徑葉モ亦從テ小ナリ花モ小ニノ莖頭ニ著ス淡黄色根モ小ニノ甚細ク葉枝共ニ繭紬色此草モ全ク木脂ノ気アリ

附考 荷斯天祿以吉ノ野設乙布列斯

郭留識烏斯白羅甸ニコレヲ葛覓必低斯亞烏斯

實カ^キ亞^カ葛^トト^カ祿^ス設^ヒ布^レ列^スノ異品ナリ甚ク愛
スベキ草ニノ一根數莖高ク一尺許或ハ小ナル
モアリ方莖ニメ硬ク毛茸多シ多節兩々相對シ
尋常野設^ト布^レ列^スニ似テ且潤ク四極又多岐ナ
ルモアリ葉面綠色ニメ光澤アリ背^ス神經^ジ多シテ
毛茸アリ臭惡シカラス味熱ス然レ佳ナリ節間
枝ヲ出シ葉多ク附著ス前種ニ似テ且硬シ後節
間ヨリ別ニ葉ヲ出ス狹長羅^ス麻^カ印^シ和名ニ
ニ似タリ莖末ニ花アリ萼狀心臟様ノ如ク第三

種ニ稍相似テ甚大暗紫色或ハ紫碧色愛スベシ
其唇少シク垂テ白色ヲ帯ヒ深赤色ノ星点アリ
每葉中ニ四子アリ長クメ稜アリ黑色光澤アリ
根黑色硬メ鬚アリ毎年新芽ヲ出ス又花淡紅或
灰白色ノモノアリ五月ノ末ニ花アリ後速ニ子
熟ス

撰脩地^ガ和^カ思^シ谷^コ里^リ迭^テ斯^ス曰^ク凡^ソ藥^ニ用^ユルニ第一種ノ
者ヲ良トス第二種三種ハ功用相同シト雖レ稍劣
レリ

性効 哈列釋斯曰其性燥ノ第三度温ノ第二度ナリ

主療 諸臟ヲ蕩滌シ肝腎ノ諸病ニ甚良ナリ○黃疸

周身發黃ニハ酒ニテ服ス○經水ヲ通シ小水ヲ利

スルニ酒ニテ服シ或ハ蜜ニ和メ外傳ス○痛風ノ

般ニマル者蜜水ニ和シ煮テ服ス十四日ニシテ愈

ムト世人ノ祝ナリ○封緘斯國ノ地方ニテハ此草

ヲ以テ底力野迦劑トメ用ユ能ク烏頭ノ毒ヲ解ス

○此草木トナシ無花果丸料ニ加テ大便ヲ通シ乳

房ノ頑硬ヲ和ラケ金瘡ヲ治ス又蜜ニ和メ經久ノ

漬瘍ニ傳シテ良ナリ

附考 黃疸ニ葉ヲ酒ニテ服スル一七日ニメ愈ユ

○獨度涅烏斯ノ説ニ此草ノ煎汁ヲ以テ大麥粉

ヲ調和シ關節ニ塗テ甚良ナリ○大便ヲ通スル

ニハ煎汁ニ銅屑蜜及ヒ樹脂ヲ和メ外傳ス○婦

人陰部ノ諸病ニ此草蜜ニ調和シ其處ニ貼ス又

浸淫瘡ニ貼メ流注セガラシム○凝血ヲ解キ汗

ヲ發スルニ水煎シテ飲服シ且身體ニ摩擦ス○

野設乙布列斯丸ノ方野設乙布列斯的列綿的印

落葉フハ 奇兒ルモ 木杏ク 屈低ク 飲レ トモニ合シ丸ト為ス能ク
痛風フハ 及水腫ク フ治ス又無花果ク フ加テ大便ク フ通利
ス○此草醋煎シ服シテ速ニ死胎ク フ下ス○痛風
原ス 質ク 葛ク 治スルニ此草一錢落葉松脂四錢ク
合シ服ス○頭腦及神經關節ノ諸病寒ヨリ発ス
ル者ニ水煎シテ服ス○四肢癱瘓ク フ治スルニ此
物ノ花ク フ採リ砂糖ク フ以テ空設ク 兒ク 弗ク トシ毎夜臨
臥服ニ錢ク フ服ス○乳房硬結ニ生鮮ナル者搗キ
爛シ乳房ニ外貼ス

他用 菩樂思薩福樂曰此草羊ノ諸病ヲ治ス故ニ

羊ニ與ヘ食セシムレハ羊 健ナリ○此草ク フ以
テ帽ニ造リ頭ニ戴テ人ヲシテ醉サラシム

野設乙布列斯 一名第^二按^低兒

カ^リ斯

名義 前章三種ノ外ニ異品野設乙布列斯二種アリ

第一種ハ大ナリ第二種ハ小ナリ

○第一種 第二按^低兒^カス

羅甸ニコレヲ按^低兒^カス亞兒^カ的^カ樂^カト稱^ス我^カ邦^ニ

ハ異品野設乙布列斯又異品葛^カ覓^カ必^カ低^カ斯^カト名^カツク

波爾杜^カ尾^カ爾^カニテ以^テ兒^カ發^カ吉^カ力^カ那^カト云^フ或^ハ人^カコ^レラ

乙發^カ木^カ斯^カ葛^カ達^カト云^フ是^レ其^カ狀^カ相^カ似^カタルヲ以^テ得^テ稱^ス

第二十八章

異品野設乙布列斯 一名テウエーテ第二按低兒

カリス

名義 前章三種ノ外ニ異品野設乙布列斯二種アリ

第一種ハ大ナリ第二種ハ小ナリ

○第一種 第二按低兒カリス

羅甸ニコレラ按低兒カリス亞兒的樂ト称ス我邦ニ

ハ異品野設乙布列斯又異品葛覓必低斯ト名ツク

波爾杜尾爾ニテ以兒發吉力那ト云フ或人コレラ

乙發木斯葛達ト云フ是其狀相似ルヲ以テ得称

セルナリ然此草ハ香氣重ノ佳ナラス彼物トハ
 全ク相反セリ〇地和思谷里迭斯曰此物枝葉共ニ
 葛覽必低斯ニ似テ稍硬ク粗糙ニ短ク花紫ニメ
 香重シ是即チ按低兒カス亞兒的樂ナリト即チ予
 カ此章ニ説モノト同シ是故ニ葛覽必低乙姪斯ノ
 名ヲ設ク是野設乙布列斯様ノ義ナリ是第一種ノ
 按低兒カスト分チンカ爲ナリ按低兒カスノ第一
 種ハ野設乙布列斯トハ大ニ異ナリ地和思谷里迭
 斯ハ按低兒カスノ名アルモノニ種ヲ示セリ一種

林奈斯卷十卷 哈納卷五鳥莫第百四十一種
 八度度選部部莫莫 獨度ニロセルラ
 全一ニエラ出

及北亞里利加ノ間此種有之又業得理印蘭社ノ突立ル丘阜ノ砂地ニ見出
 及北亞里利加ノ間此種有之又業得理印蘭社ノ突立ル丘阜ノ砂地ニ見出

熱爾瑪尼亞微線縛而ト云暗野ノ中ニ綿ノ如ク突出スル故ナリ然此
 熱爾瑪尼亞微線縛而ト云暗野ノ中ニ綿ノ如ク突出スル故ナリ然此

ニ同シキヲ以テ羅甸、撒福後而轉外名ヲタリ人コヒ小ノ名ヲ按シラコト分別
 ニ同シキヲ以テ羅甸、撒福後而轉外名ヲタリ人コヒ小ノ名ヲ按シラコト分別

コローセ

ケレウリフナリ白色ニ又斑アルモアリコレヲ医業初年ニ供スルナリ
コレヲ舍利別ニ造小兒嘔嗽及胸病ノ冒寒傷冷毒ヨリ突スルモノト爲ス
○劣斯爾五人ハコレヲ因服外用ノ止痛ノ劑トス

此草ノ小ナク延タル花茎ヲ出モノノ葉及萌芽ヲ上塊ニ雜ヘテ少クニ
延タル花茎ノ者ヲ裁レハ小草ヲ生シ回クテ其香ニノ唯雄花ノミ出ス
單ノ雄花ノ者ハ長ク花美ナラス其葉初生ハ回ケレ後ハ長大ナルナリ
此物処々アリ故ニ二室ノ名ヲ附接スルナリ

gynopeltis *lat. m. proctum. can. simplicissimo*
mont. flore rubinifera *cutel*
ternaria, gynopel. mont. longiore ferio et flore.

ハ鄰線「リ」セシ小巢葉ニ似タリ第十八卷二十一種ハ野設「セ」

乙布列斯「イ」ブ「レ」ス葉ニ似タリト此章ニ説トコロノ者ナリ

○此草葛力「カ」リ草「カ」リノ種類ニモアラス葛力ノ種類ハ

其液鹹シ此物ハ鹹味ナシ

○第二種

此物モ亦第ニ按低兒力斯ニ併入スベシ然レ稍似
タルノミニテ真トナシ難シ

附考 異品野設乙布列斯ノ別種是レ葛力ノ必低斯

ノ種類ニ充ルモノ六種アリ一ハ苛「カ」七「シ」百「ヒ」空「クウ」和「ワ」

乙切草第三章 其子木脂ノ氣アルカ爲ナリ
卷二十四章 生祿乙姪^イ 章第五卷一 又法兒末樂^ラ 章五卷三
布列斯^ブ 箇祿乙鐸^ド 一名算禿力^カ 那^ナ 第八卷二 四ハト
カ鳥莫^カ 第九卷五 八謁手樂^ラ 第十二卷十 大小共ニ
本章ニ記ス但羅別兒^イノ野設^セ乙布列斯^ブノ一種ト
スルニ依ルノ三六ハ野設^セ乙布列斯^ブノ葉ナキ状
ヲナスモノ是ハ諸厄利亞ノ海邊諸山ヨリ見出
セリ又熱爾瑪^マ 丘亞ノ諸列ニ生ス状甚亞兒列斯^ス
ニ似タリ多ク小枝ヲ發ス高サ二尺許或ハ餘レ

ル者アリ斜曲ニノ堅ク灰色ナリ又暗綠色ノ葉
ヲ著ス其状小動鐸兒^ル 爬兒鐸^ド 佛甲^ト 牡生野設^セ
乙布列斯^ブノ間ニノ常ニ綠色冬ニ至テ枯レス是
設^セ 丟莫^ム 佛甲^トノ種類ナリ根ハ甚堅ノ
鹹^セ シテ液^カ 葛^カ 類^レ 味ニ似タリ
此物二種アリ其ニ多枝ヲ發メ叢生ス一
ハ大草^ト 白色齒刻アル小葉ヲ以テ密著ス部^ト 榮
姪羅設^セ 野設^セ 乙布列斯^ブヨリ大ナリニハ状小ニノ
葉密著セス狭長ニメ圓シ花ハ綠色ニメ
圓^ト 四^ト 十^ト

Heracleum
var. buxifolium

カールス

Handwritten notes at the top of the right page, possibly a title or reference.

度箇椰布コイブ蓄シ二似ニタリ此種類カノラ葛カノ覓ヒ必ズ低ク兒ル
密ミ久キ樂ラ達ダ地チ和ワ思シ谷コ送ソ斯ス未ミ訥ネ兒ル又マ謁ケ力リ葛カ亞ア列レ吉キ
算ソ短ダ力リ那ナ箇コ兒ル絀シ悉シ二克クツ或シ人ヒ第ニ按レ低レ兒ル力リ
斯ス二克クタリ

○按レ低レ兒ル力リ斯スノ種類カノ 愛ニハ第ニ按レ低レ兒ル力リ

斯スノミラ擧ク第一按レ低レ兒ル力リ斯スハ葛カ力リノ種類カノ二

シテ古書ノ内ニハ茨クヲ結フ諸草ニ屬ス今第二

按レ低レ兒ル力リ斯スノ名アルモノヲ記スト雖ヒ又マ野ノ設セ

乙布列斯スノ種類ヲ附續シテ各四種ヲ載ス

○第一種 按レ低レ兒ル力リ斯ス 葛カ箇コ椰イ布ブ蓄シ二似ニタリ 二百十三

郭留識鳥斯スコレヲ伊ス把レ你レ亞ノ内ノ發シ斂シ的シ亞ノ

近傍ニ生スルヲ見タリ故ニ名ツク然レ第一按レ

低レ兒ル力リ斯スニハ當ラズ此草ハ第一按レ低レ兒ル力リ斯スノ

ノ如ク莖ヲ直立セス長ク一咫許ニノ地上ニ延蔓

ス多ク小枝ヲ出シ赤色葉ハ鄰ニ線ニ似タリ

微シク露ノ液ヲ含ミ塩ノ水ヲ灌クカ如シ

味亦微鹹四月ノ初葉間小花ヲ發ク四瓣ニ白色ニ

シテ且淺青蓮色ナリ根ハ直ニメ汚黑色ナリ

1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

度箇椰布トコ = 似タリ此種類ヲ葛カ 覓必低カ 兒ル
密久樂達地ミキラ 和思谷送斯ワシ 未訥兒ミナ 又謁力葛亞列吉カ
算姪力那箇兒サシ 細悉 = 克ツ或人ハ第二按低兒力カ
斯 = 克タリ
○按低兒力カ 斯ノ種類 愛ニハ第二按低兒力カ
斯ノミヲ舉ク第一按低兒力カ 斯ハ葛力ノ種類ニ
シテ古書ノ内ニハ茨ヲ結フ諸草ニ屬ス今第二
按低兒力カ 斯ノ名アルモノヲ記スト雖レ 又野設カ
乙布列斯ノ種類ヲ附續シテ各四種ヲ載ス

1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

按低兒力斯發斂的亞

郭留識鳥斯カ コレヲ伊斯把伊亞ノ内發斂的亞ノ
近傍ニ生スルヲ見タリ故ニ名ツク然レ 第一按
低兒力カ 斯ニハ當ラズ此草ハ第一按低兒力カ 斯ノ
ノ如ク整直立セス長ク一咫許ニメ地上ニ延蔓
ス多ク小枝ヲ出シ赤色葉ハ鄰線カ 小葉ニ似タリ
微シク露様ノ液ヲ含ミ塩蔵ノ水ヲ灌クカ如シ
味亦微鹹四月ノ初葉間小花ヲ發ク四瓣白色ニ
シテ且淺青蓮色ナリ根ハ直ニメ汚黑色ナリ

○第二種

小第二按低兒力斯

羅別兒ハ按低兒力斯葛竟必低乙姪斯未訥兒ト

名ツク又蘭蚪匱古及ヒ布祿忿線ノ地ニテハ乙

發木斯葛達ト云フ是コレラ賤ニスルナリ何者

其芳香アル真ノ野設乙布列斯ニ相似タリト雖

而モ香氣佳ナラス且莖堅ノ低ク葉多シテ長

潤微鋸齒アリテ奇兒子忽輪又字祿乙箇祿乙鐸

ニ似タリ花大ニメ紫色豔白^{白色}ノ毛茸アリ子ハ

野設乙布列斯ニ似テ毛茸アリ根堅ク味苦シ微

シク瀉下ス性好カラス此草ヲ獨度涅烏斯ノ第

二按低兒力斯ニ充ツ其形狀似タリト雖而モ

小ナリ

○第三種 意太里亞國第二按低兒力斯

羅甸ニコレラ按低兒力斯亞兒的樂意太魯留莫

是葛莫ト樂達ノ種類ニシテ厲竭百印暴莫箇祿

乙鐸ニ似タリ意太里亞ノ學者第二按低兒力斯

ニ充ツルト雖而真ニアラス此草小枝アリテ葉

形蒙亮百爾カ乙爾斯ノ葛莫ト樂達ニ似テ甚ク

小ナリ茎頂ニ苔及ヒ毛様ノ淡黄小花ヲ開ク味
甚大燥ナリ

○第四種 按低兒祿乙姪斯

耶箇備斯達カ鳥斯曰此草甚タ按低兒カ斯ニ似
タルヲ以テ名ツク其根細ノ白色ヲ帯ヒ堅シテ
鬚多シソレヨリ細茎ヲ抽テ節多ク葉薄シテ長
ク茎ヲ圍テ生ス葛カ葉ニ比スルハ薄メ狭シ茎
頭小白花ヲ開ク花謝ノ後莢ヲ結フ字樂斯_亞ノ
如シ甚タ粗糙ニメ黑色ノ小子アリ罌粟子ニ似

タリ大小ノ二種アリ小ナル者ハ茎稍短ク安生
セスノ直立ス

總論

第一種大畧品野設乙布列斯ハ伊斯把係亞ノ

都城及ヒ拂郎察ノ屬那爾暴念ノ地方曠野及ヒ膽

八樹邊ニ生ス其狀第一種真野設乙布列斯ノ如ク

地ニ安生ス茎堅メ甚細ク葉ヲ著ス葉辺微鋸齒ア

リ花モ亦相似タリ夏秋ノ頃開ク然ヒ紫赤色ニメ

每莢四子ヲ結フ根硬メ巨大白色ヲ帯フ味苦メ悉

箇_コ犂_レ謁_エ苦菜ノ如シ此草凡テ毛茸多ク香重クシテ

徒ナラス真種ノ芳香ナルニ類ナリ

○第二種小異品野設乙布列斯ハ伊斯把你亞ノ地

ニ野生ス而ノ葉謁堉爾蘭杜ニ齋来ス茎軟弱ニノ

葉ハ第一種真ノ野設乙布列斯ニ似タリ然レ花異

ニメト參奇諾ハ的ラ斂レ續ハ断ニ似タリ又夏秋間ニ發ク白

色稍長メ潤シ花後莖中四子相並フ根ノ大ク其形

状ニ應セリ

性効主療地和思谷里达斯曰第二按低兒力斯ハ其

功稍野設乙布列斯ニ似タリト蜜水及醋ヲ以テ用

レハ癩症ヲ治ス其他尚功用多シ○哈列釋斯曰此

物氤氣精微ニメ蕩滌淨除ノ功アルト真ノ野設乙

布列斯ニ勝レリ

附考布加穉斯曰第二按低兒力斯ハ子宮硬結及

腹痛原箇名莫箇發カ斯カヲ治ス癩症ニハ四錢ヲ蜜醋ニテ

服ス○郭留識鳥斯曰伊斯把你亞ノ俚俗此煎汁

ヲ用テ療血ヲ蕩滌ス

第二十九章 一圖

列珍見姪兀鳥物 一名大兀鳥物

名義設力鐸屋容覓哈厄勒設力鐸屋烏莫末乙烏斯

羅比輪地那力亞末玉兒同設力鐸屋亞藥局○意設

加委那伊斯把兮兒登姪樂斯兀輪地力那斯全兀祿

斯思箇兒物兒子熱爾瑪悉迦兒葛樂烏禿同斯哇兒

辰葛樂烏禿同兀兒鐸物兒子同謁斯迦歷列察拂郎謁

斯葛列列同兀鳥物爾業謁姪斯珍見姪兀鳥物同兀鳥

縛兒的兒同設弄地涅語厄設力鈍別謁

和名クサノコウ

漢名白屈菜

第二十九章

斯^ス珍^{チン}見^{ケン}姪^ダ兀^ガ鳥^ウ物^ウ 一名^{コト}大^{ダイ}兀^ガ鳥^ウ物^ウ

名^ナ義^ギ設^セ力^リ鐸^{トク}屋^エ容^{ヨウ}覓^ミ哈^カ兀^ガ鳥^ウ物^ウ 設^セ力^リ鐸^{トク}屋^エ鳥^ウ莫^ム末^マ乙^イ鳥^ウ斯^ス

羅^ラ比^ヒ輪^{リン}地^ヂ那^ナ力^リ亞^ア末^マ玉^{ヨク}兒^ニ同^{トウ}設^セ力^リ鐸^{トク}屋^エ亞^ア藥^{ヤク}局^ク意^イ設^セ

甸^{ケン}加^カ委^ウ那^ナ伊^イ斯^ス把^バ兮^シ兒^ニ發^{ハツ}姪^ダ樂^{ラク}斯^ス兀^ガ輪^{リン}地^ヂ力^リ那^ナ斯^ス全^{セン}兀^ガ祿^{ロク}

斯^ス思^ス箇^コ兒^ニ物^{モノ}兒^ニ子^シ熱^{ネツ}爾^ニ瑪^マ悉^{シツ}迦^カ兒^ニ葛^カ樂^{ラク}烏^ウ禿^ト同^{トウ}斯^ス哇^ワ兒^ニ

反^{ハン}葛^カ樂^{ラク}烏^ウ禿^ト同^{トウ}兀^ガ兒^ニ鐸^{トク}物^{モノ}兒^ニ子^シ同^{トウ}謁^{ダツ}斯^ス迦^カ歷^{リキ}列^{レツ}察^{サツ}拂^{フツ}郎^{ロウ}謁^{ダツ}

斯^ス葛^カ列^{レツ}同^{トウ}兀^ガ鳥^ウ物^{モノ}爾^ニ業^{ヤク}謁^{ダツ}姪^ダ斯^ス珍^{チン}見^{ケン}姪^ダ兀^ガ鳥^ウ物^{モノ}同^{トウ}兀^ガ鳥^ウ

縛^{バク}兒^ニ的^{ダツ}兒^ニ同^{トウ}設^セ弄^{ロウ}地^ヂ涅^{ニエ}利^リ亞^ア設^セ力^リ銳^{ダツ}別^{ダツ}謁^{ダツ} 莫^ム斯^ス

和名クサノコウ

漢名白屈菜

古ノ本草家元鳥物ノ種類ヲ二種ニ分ク第一種ハ
大元鳥物ニノ即チ本條ナリ第二種ハ小元鳥物ニ
ノ次條ニ載スルモノナリ名同シト雖ヒ形狀迥ニ
異ナリ

○此草異稱多シ厄勒齊亞ニテ百和左亞葛樂的亞
亞和烏備玉斯葛樂烏悉和斯胖地和斯力撒奇祿覓
地恩和祿左客等ノ諸名アリ羅甸ニ法備烏莫ト云
○和力拔悉烏斯ノ 第三卷ニハ和東那ト
名ツク地和思谷里迭斯曰和東那ハ本條ノ液汁ナ

リト然ヒ谷里迭斯又外ニ一種ノ和東那ヲ説テ曰
其葉孔ヲ穿タル如ニノ棘缺杪芥ニ似タリ即チ此
書緇尼斯部葉莫和名鳳凰草ノ條ニ於テ説ヘシ○亞的
涅烏斯曰或人コレヲ亦亞涅木涅ト名ツク然ヒ眞
ノ亞涅木涅ト同シカラス○亞比線那ノ書第百九
十九章ニ此草ヲ葛烏君ト名ケ或ハ覓未蘭ト名云
フ彼説ニ大元鳥物ヲ亞兒法兒沓久列又亞列竭撒
兒沓斂涅ト云ヘハ覓未蘭ハ小元鳥物ニ近シ且彼
書第四百八十六章ニ曰覓未連ハ一種ハニノ狀節

ノ如ク微黒色ヲ帶ヒ奇淫珍屈ト留莫トイリモ味辛
シト是ニ由テ考レハ「ノミ」覓未連ハ斯珍見「ト」姪兀鳥物ト
別物ナルヲ明ケシ○「ハ」捌鳥留斯「ト」及淫記「ト」ヲレヲ未
未樂斯ト云フ而メ又曰「ト」未樂斯ハ一種ノ小草根
ニメ多節ナリト且別ニ設カ鐸尾鳥「ハ」莫ヲ載タリ然
ハハ一物ニ非ルヲ明ケシ
○此草設カ鐸尾客又斯哇「ト」劉箇祿「ト」乙鐸「ト」共ニ藥子ト
名ツク是藥「ト」原名斯哇「ト」劉聞「ト」又厄勤齊亞「ト」來ルハ生
生シ燕去ルハ枯ルカエハナリト此說誤レリ

經年萎ニサレモノナリ又俗説ニ燕子初生ノ片ハ
馨ナリ「ト」此草ヲ以テ服「ト」抹スレハ即チ開ク故ニ名
ツクト是亦妄誕ナリ何則諸鳥「ト」ニ離ハ初生ヨリ
ノ能視ル或ハ眼開カサルモ時日ヲ経レハ自ラ明
ナリ殊ニ燕ハ他鳥ヨリモ速ク開ク此說馨兒淫カ
斯設兒帥斯ノ書第六卷六章ニ見ヘタリ然レ燕母
此草ヲ以テ其子ノ眼ヲ抹スルヲ何ニ據テ起ルト
ナラバ亞カ斯「ト」的列斯ノ禽蟲譜第七卷ニ曰或人
初生ノ燕ノ眼目損傷シ突出シタルニ此草ヲ以テ

療セリト蓋此說ニ就テ傳會セルモノ也

△正恭曰利類思鷹論治鷹眼眩昏之病ノ條ニ格

理多尼亞草根即燕子草即中國穀精草小燕初生

而替抹其眼即開又此草燕來則生燕去則死ト見

ヘタリ鷹論ハ鑑定ノ書ナリ格理多尼亞草根ト

ナルハ即チ本條ノ對譯ナリ是其形狀ヲ審ニセ

ズノ唯燕來則生去則死ノ說ニ拠テ謾ニ穀精草ニ

擬充スルモノナリ

附考業謁堉爾蘭社ニ兀鳥物一名兀鳥縛兒的兒

ト云羅甸ニ設力鐸斤烏莫ト稱ス是天ノ賜ト云

ル義ニノ其多功ナルヲ以テ名ツクルナリ

○剪裁花斯珍見ハスニハレラフ姪兀鳥物ハスニハレラフ

羅甸ニナレラ設力鐸斤烏莫ハスニハレラフ末ハスニハレラフ兀鳥斯ハスニハレラフ縛兒質匹ハスニハレラフ

鐸ハスニハレラフ覆力ハスニハレラフ和ハスニハレラフト稱ス形状總説ノ下ニ附ス

○或人ハ及黎設箇莫ハスニハレラフノ第二種ヲモ亦設力鐸

斤ハスニハレラフ亞ハスニハレラフト名ツク又蒲兒縛兒的兒ハスニハレラフ延胡ハスニハレラフモ設力鐸斤ハスニハレラフ

亞ハスニハレラフ字樂屈密質斯ハスニハレラフト云フ共ニ本條ノ種類ニアラ

ス意太里亞人ハ亞迦黎ハスニハレラフ煙ハスニハレラフ糶ハスニハレラフ斗ハスニハレラフヲ設力鐸斤ハスニハレラフ亞ハスニハレラフノ

トス而ノ本條ヲ設力鐸尾亞覓沙那トス

トス而ノ本條ヲ設力鐸尾亞覓沙那トス

總說 此草曠野道傍樹籬ノ邊ニ生ス高燥ノ地ヨリ

樹陰ノ處ニ多シ莖高サ一尺五六寸許軟ニメ圓ク

節アリ稍粗糙ニメ枝アリ葉對生シ缺刻アリテ甚

毛莖葉ニ似テ稍大ニ且軟ナリ色葱青ニメ微綠ヲ

帶テ花比和犁兒和名アラセイトウニ似テ黃色四月ヨリ六

月ニ至ル花後狹長ナル小莢ヲ結フ比和犁兒ニ比

スレハ短小内ニ微黃色ノ小子アリ根ハ短ク皮肉

赤ニ黃ニメ洎夫藍色ナリ鬚根多シ同色ナリ全草

香重シ年ヲ経テ萎ハスコレヲ摘テ揉ハトキハ液

汁出ツ味辛辣ニメ微苦

△正恭曰救荒本草曰白屈菜生田野苗高一二尺

初作叢生莖葉青白色莖有毛刺稍頭分叉上開四

瓣黃花葉頗似山芥菜葉而花又極大又似漏蘆葉而

色淡味苦微辣救飢採葉和淨土煮熟撈出連土浸

一宿換水淘洗淨油塩調食是和名草ノ王ト云モ

ノナリ又タムシクサト云フ莖ヲ摘メハ黃汁出

ツコレヲ癬ニ塗テ能治愈工故ニ名ワク本邦處々

原野多アリ

附考 此草好テ園圃中陰處ニ生ストハルケルト兒迦兒列

水仙ノ生スル処ニアリ結実ノ時ニ先ダテテ根

上四指横径ニノ其茎ヲ切断スレハ翌年新苗ヲ

生シ能ク二年ヲ保ツ

○剪裁花斯珍見姪元鳥物

郭留識鳥斯曰是本條ノ種類ニノ奇ヒ姪爾山山

都蘭土ニ自生ス形状大ク共ニ尋常ノ者ト異ナ

ルナシ但花葉ヲ異ニス葉甚小ニメ缺刻多ク

柔軟ニメ薄シ花四瓣黄色ニメ只花辺齒刻アリ

花後長角ヲ結フ尋常ノ者ト同シ内白膜アリテ

隔ヲナシ小黒子ヲ保ツ終夏開キ随テ子ヲ結フ

秋後自落テ嫩苗ヲ生ス冬ニ至テ萎ニス

性効 其性熱ニメ且燥第三度ニ至ル淨除スルナ強

主療 地和思谷里迭斯曰此草ノ自然汁ハ最近眼目

ヲ明ニス何則此物淨除ノ功アリテ粘稠液ヲ稀釋

ス故ニ眼球ニ滴メ眼目昏暗ヲ治ス殊ニ蜂蜜ニ和

シ銅錫ニテ煎煉スルモノ其功最任強シ○此根ハ
 黃疸ヲ治ス熱ナキ症ニノ膽藏閉塞ヨリ發スル者
 ニ良ナリ是肝膽ノ閉塞ヲ開達スルエハナリ○又
 根ヲ咀嚼シテ齒痛ヲ止ム酒ヲ以テ服スルハ浸
 淫瘡ヲ治ス

附考 此花ノ自然汁蜂蜜及人乳或ハ醋屬液ヲ平
 和スル諸藥ニ和メ目翳ヲ除キ潰瘍ヲ乾シ皮膚
 疥癬ノ白屑アル者及頭上白屑小兒癩疽ヲ治ス
 ○葉子ノ盲ナル者此葉ヲ以テ目ニ貼ス最良ナ

二十九卷

men drijft ook wat de blaas van dit veldt inden blaas

Tegen de maekke plantte van den roet gedragen, Dageelicht
 genden: maer op de botten geleijft, het loel vermindert, 官痛

ヲ療ス○此草ノ自然汁蟲齧ニ滴メ痛ヲ止メ又
 疣目ヲ去ル○**哈列釋**斯曰此物ノ自然汁ハ能ク
 眼球ノ翳膜癥痕ヲ除キ眼目ヲ明ニス○**布立**
 斯曰此草諸癥痕ヲ除キ又能ク驕馬ノ眼目白翳
 ヲ除ク

シ銅錫ニテ煎煉スルモノ其功最^レ強シ○此根ハ
黃疸ヲ治ス熱ナキ症ニテ膽藏閉塞ヨリ發スル者
ニ良ナリ是肝膽ノ閉塞ヲ開達スルニハナリ○又
根ヲ咀嚼シテ齒痛ヲ止ム酒ヲ以テ服スルハ浸
淫瘡ヲ治ス

附考此花ノ自然汁蜂蜜及人乳或ハ醋屬液ヲ平
和スル諸藥ニ和メ目翳ヲ除キ潰瘍ヲ乾シ皮膚
疥癬ノ白屑アル者及頭上白屑小兒爛痘ヲ治ス
○葵子ノ盲ナル者此葉ヲ以テ目ニ貼ス最良ナ

リ○

○此根ヲ以テ葛密兒列
ノ油ニ浸シ搗テ溫メ臍中ニ貼メ疝及ヒ子宮痛
ヲ除ク○此草乾シ搗キ末トナシ金瘡及ヒ惡瘡
ヲ療ス○此草ノ自然汁蟲齧ニ滴メ痛ヲ止メ又
疣目ヲ去ル○**哈列釋斯**曰此物ノ自然汁ハ能ク
眼球ノ翳膜癢痕ヲ除キ眼目ヲ明ニス○**布立**
斯曰此草諸癢痕ヲ除キ又能ク驢馬ノ眼目白翳
ヲ除ク

○大元鳥物ノ粵煎質粵煎質ハ製劑ノ名

羅別兒ノ説ニ大元鳥物花根莖葉ヲ連子搗爛シ

硝子器ニ藏メ馬糞中ニ置テ一月許腐爛スルニ

至テ取出シ鍋竈ニ入テ蒸餾シ其滓全ク乾燥ス

ルヲ窺ヒ搗テ細木トシ而メ水ヲ灌キ再復馬糞

中ニ置テ三十日ニメ熟灰中ニ於テ蒸餾シ油氣

水氣ヲ分利スコレヲ升鍊家ニ大元鳥物ノ粵煎

質ト名ツク又其滓ノ灰ニナルニ至テ水ヲ以テ

鹽ヲ收取リコレヲ金瘡第三品ノ要藥トシ升鍊

家ニ甚稱譽ス

大元鳥物ハ金瘡ヲ治スルニ甚功驗アリ故ニ輕

キ金瘡ニハ此液汁少許ヲ滴スレハ速ニ愈ルナ

リ是郭留識鳥斯ノ經驗スル所ニシテ今時ニ至

テハ衆人ノ知ルトコロナリ

撰脩

地和思谷里迭斯曰夏月此草ヲ絞リ陰乾シ餅

ト為シ貯テ缺乏ニ供フ

第 二 十 章

一 因

兀鳥物

一名斯百煙箇祿乙鐸

名義言ス金尺客密屈弄厄勒設力鐸尺鳥莫密釋斯

羅比輪地那力耶未訥兒同斯屈祿効樂力耶未訥兒

藥法蒲斯設兒祿意太謁斯劫列勒拂郎百質禿拔斯

悉涅禿全苛乙屈物兒葛樂鳥禿熱爾瑪部樂的輪

葛樂鳥禿同缺列印斯哇兒辨葛樂鳥禿同物印葛樂

鳥禿同法弗字禿鄰同缺列乙涅兀鳥物業謁埃斯百

煙箇祿乙鐸同

此物ニ斯哇兒辨夢ノ名ヲ以テスルハ夔來テ笛ヲ

第三十章

小兀鳥物

一名斯百煙箇祿乙鐸

名義設力鐸尼客密屈弄尼勒設力鐸尼鳥莫密釋斯

羅比輪地那力耶未訥兒齊亞斯屈祿歛樂力耶未訥兒

藥法蒲斯設兒祿意太謁斯劫列勒佛郎百質禿拔斯

悉涅禿全奇乙屈物兒葛樂烏禿熱爾瑪部樂的輪

葛樂烏禿同缺列印斯哇兒葛樂烏禿同物印葛樂

烏禿同法弗字禿鄰同缺列乙涅兀鳥物業謁塔斯百

煙箇祿乙鐸同

此物ニ斯哇兒辦曼ノ名ヲ以テスルハ變來テ笛ヲ

生シ夢歸ル片ハ苗枯ル、内テナリ

設樂椒客ハ見未蓮ト名ツク。○此物痔疾ヲ治ス故

ニ斯百煙筒祿乙鐸ノ名アリ

附考

或人ノ説ニ鐸的兒部蔓莫ヲ羅甸ニ葛力達

捌留斯忒力斯ト稱シ斯百煙筒祿乙鐸ノ一種ト

ス葛列力烏斯箇兒丟斯及ヒ其他ノ人モ此説ニ

從テ設力鐸左烏莫魯釋斯捌留斯忒列ト稱ス然

レ予ハ從ハス

○斯屈祿歛樂力耶ト稱スル草數種アリ達樂救

斯ハ斯迷兒縛兒的兒ヲ斯屈祿歛樂力耶ト名ツ

ク又或人ハ哈列和布悉斯ヲ斯屈祿歛樂力耶的

兒力耶獨度涅乙ト稱ス

總説

此草諸國共ニコレアリ曠野道傍及溝渠下濕

地ニ生ス三月ノ初苗ヲ生シ莖軟ニ短ク叢生ノ地ニ

垂ル葉稍圓ニメ綠色滑澤ナリ此兒藤葉ニ比ス

レハ差小苗ニ續テ花アリ黄色化念孛花毛莖及ヒ

種ニ似タリ四月ノ初花落テ後小莖子ヲ結フ細子

充ツ又化念孛花ニ似テ又小五月ニ莖ヲ苗枯ル

苗枯レハ 然中ハ根求難シ根ハ細鬚ヲナシ小塊ヲナスヲ穀
類ノ如クモノ懸垂ス大ワ的兒物ルルハケキノ如シ

附考 小設力鐸屋ド亞アハ陰湿ノ地ニ生ス稀ニ燥地
ニ生スルモノアリ其功力最猛烈シ

○重瓣ノ者ハ玉亞吉繆斯葛覓樂律烏斯ハ彼ノ

園中ニ栽タルヲ記セリ

性効 其性熱ニメ燥ナリ熱ハ大元鳥物ヨリモ烈シ
ク化念孚亮ニ晴レリ

主療 哈列釋斯及ヒ地和思谷里迭斯ノ説ニ此物能

人ノ皮膚ヲシテ速ニ發泡シ潰爛セシム又爪ノ穢
穢ナルヲ除ク○此草根汁ヲ鼻中ニ吸入スレハ孔
中ヲ刺戟シ頭腦ヲ蕩滌シテ鼻孔ヨリ洩出ス○今
時々人此草ノ根際ノ小顆ヲ連子採リ痔疾ニ用ユ
故ニ斯百煙箇祿ト名ツク此草及根ノ自然汁
ヲ取り酒或ハ患人ノ尿ニ和メ痔ヲ洗ヘハ即チ萎
枯セラ痛固去ル或人曰此草但痔痛ヲ和クル而已
ナリ

附考 此草葉根共ニ咽喉腺腫及ヒ其他不潔潰瘍

痔疾癰疔目斯^ス哇^ワ莫^ム綿^{メン}病寒腫ニ貼メ軟和分利ノ
功アリ○哈^ガ列^レ釋^シ斯^スノ説ニハ此草浸蝕銳利ノ功
アルヲ以テコレヲ用ユル^ルヲ恐ル然^レ本邦ニ
産スル者ハ浸蝕セス又意太里亞ノ本草家ノ説
ニモ亦彼國ニ産スル者モ浸蝕ノ功ナシ故ニ用
ル^ルヲ畏レストイヘリ○
スヲチケル及ヒ爪ノ潰瘍
ヲ治スル^ル猶獨度涅烏斯ノ説ノコトシ○此草
一味痔疾ニ傳テ功アリ又瘍腫及^カ消散ス
ルニハ無花果葉ニ裏ミ熱灰中ニ煨シ用ユ○此

根及草和^ラ兒^ル列^レ部^ブ聲^シ田^テニ包ミ熱灰中ニ煨シ取出
シ搗キ鷄卵油及亞麻油ニ和シ痔ヲ治スル^ル最
任速ナリ○意太里亞ノ斯百煙筒^シ祿乙^シ能^シ根ノ白
顯モ亦能痔疾ヲ治シ^シ其痛ヲ和ラ^シ伊斯杞^シ
亞ノ産モ亦然リ或人ハ此葉ヲ水煎シテコレヲ
温蒸洗浴ス

章 大斯百煙筒祿乙鐸

名義 今爰ニ二種ヲ舉ク其葉形及ヒ名稱相近シ芽

一種ハ真物ナリ芽二種ハ別謁屈斯久乙莫ナリ

○第一種 大斯百煙筒祿乙鐸

斯屈祿歛樂力亞末玉兒羅密兒列木兒備亞同荷兒

樂力亞同葛斯在蘭救樂同部樂雲物兒子熱爾瑪撒

烏兒物兒子同兀祿弗斯荷乙屈物兒菱葛樂烏壳同

兀聲壳斯百煙筒祿乙鐸社乙兀聲壳吉力乙兒筒祿

乙鐸業謁垣斯屈祿薄力亞意太斯屈祿歛樂乙列拂
尔蘭杜斯屈祿薄力亞里亞

第三十一章

大斯百煙箇祿乙鐸

名義今爰ニ二種ヲ舉ク其葉形及ヒ名稱相近シ芽

一種ハ真物ナリ芽二種ハ別謁屈斯久乙莫ナリ

○第一種 大斯百煙箇祿乙鐸

斯屈祿歛樂力亞末玉兒羅密兒列木兒備亞同苛兒

樂力亞同葛斯尅蘭救樂同部樂雲物兒子熱爾瑪撒

鳥兒物兒子同兀祿弗斯苛乙屈物兒葉葛樂鳥尅同

兀聲尅斯百煙箇祿乙鐸社乙兀聲尅吉力乙兒箇祿

乙鐸業謁垣斯屈祿滿力亞意太斯屈祿歛樂乙列拂
尔蘭杜

和名ヒナノウス 漢名山玄參

羅甸ニ通ノ斯屈祿欵樂力亞ト稱是也吉力乙兒箇

祿乙鐸ノ義ナリ而メコレニ木玉兒大人稱之附接

スルハ是レ小斯百煙箇祿乙鐸ト別タシカ爲ナリ

或人コレヲ哈列和布悉斯エ克ツ的當ナラス哈

列和布悉斯ハ香氣アリ此草香氣ナシ其他尚異ナ

ル處多シ

○第二種

別謁屈斯久乙莫葉謁垣深杪按杪尼斯箇祿乙鐸全

柳爾力烏斯曰此草拂郎參ニテ設掘乙謁ト稱ス○

或人コレヲ別杪尼葛亞苦寢質力斯ト名ツク是レ

水別杪尼ノ義ナリ但真ノ別杪ニ差相似タルノ

ミ又缺蠶覓嫩ニ充ル説アリ然レ地和思谷里迭

斯ハ缺蠶覓嫩ノ葉ハ物謁及部厲車ニ似タリト

イハハ此物ニハ非ルナリ

附考 別謁屈斯久乙莫ハ繼兒涅留斯ノ缺蠶覓嫩

歇爾地爾紋督ノ的兒邊達力亞ナリ是の兒綿的
印ト功ヲ回スルカ故ナリ達樂救斯ハ和設乙末
斯亮留莫亞兒的留莫ト名ツク

○大斯百煙箇祿乙鐸ハ世ニ著シク甚名譽アル
草ナリ爰ニ其種類ヲ漏セリ今其遺漏ヲ補フハ
總說ノ後

ニ奉ク

總說 第一種ハ曠野空野森林ノ中ニ生ス苗高サ一
尺半許方莖直立暗紫色ニメ微黒ヲ帶フ内空ナリ
每節二葉對生シ潤ノ末尖ル葉邊鋸齒アリテ大踏

的^テ斂^レ類^ニ葉ニ似テ稍大ク黒シテコレヲ撫ルニ刺
ナシ七八月枝梢小花ヲ開ク暗紫色状小兜ニ似タ
リ大サ亦大踏的斂ニ同シ花後子ヲ結フ形圓シテ
頭尖銳甚小ナリ根ハ小塊多ク且節アリテ白色ヲ
帶フ傍生メ深ク地中ニ入ラス根四方ヘ引蔓シテ
嫩苗ヲ生ス

△正恭曰ヒナノウスハ江列ニテスキノサキト稱ス東都ニハ
道瀧山及乳鳥山ノ辺ニ多クアリ

△正恭曰エナノウスハ江州ニテスキノサキト
稱ス東戸ニハ道灌山及飛鳥山辺ニ多アリ苗高
五尺許方莖ニノ葉對生ス胡麻葉ニ似テ細鋸齒
アリ秋莖末數花ヲ著ス大サ三分許春白ノ狀ノ
如シ故ニ籬ノ白ト名ツク紫黑色矣ハ圓^形尖リ
中ニ小黒子アリ根巨ク長ニ三寸多櫛^葉シテ稍
天門冬ニ似タリ^根ノ木根ノ如シ世人コレヲ玄
參トス非ナリ是本草原始ノ山玄參ナリ玄參ハ
形狀大抵相同シト雖^レ葉長ニアリテ色アカ^ク

4
花淡黄色又黄色モアリ根堅カラス白色ニシテ
コレヲ^割ハ黒色ニ変シ潤^ア是レ一種ノモノ
ナリ

○第二種ハ湟池河辺流水ノ傍ニ生ス燥地ニ於テ
ハ未見之莖葉花實共ニ第一種ニ甚似タリ然レ其
狀稍大ニノ根ニ塊ナク細鬚多シ

附考

小窪的兒別壳花トイフモノアリ

龍同

ノ名醫多瑪斯守涅及レ獨爾弄屈ノ楊

貌佛通ノ兩家ノ園中ニアリ尋常窪的兒別壳花

ニ比スレハ小ナル一四分ノ一ナリ

○大斯百煙箇祿乙鐸ノ種類即チ碩學ノ葛祿留

斯郭留識烏斯ノ書中ニ説トコロノモノナリ

第一種 干乘ノ大斯百煙箇祿乙鐸

羅甸ニコレヲ斯屈祿歛樂力亞設列質葛ト稱ス

初生葉地ニ塌シテ生ス差斯葛備烏設和名松葉

ニ似タリ後一莖ヲ抽テ方莖内空高ク二尺餘緑

色ニメ後紫色ヲ帯フ或ハ太陽ニ向フ處悉ク紫

色ナルモアリ莖ノ本ハ大葉圍リ著キ多ク齒刻

アリテ对生ス莖ニ生スル葉ハ翳ノ如ク化歛蕨

及レ化涅葛莫覓建斯葉ノ如キ齒刻アリテ尚亦

多ノ齒刻分テリ茎ノ半バヨリ末ニ至テ枝ノ節ヨリ別ニ方ナル小枝ヲ分テ小葉ヲ著ス其枝又小枝ヲ分テ花ヲ著ス其狀小囊莢ヲナシ中空ニシテ尋常大斯百煙筒祿乙鐸ノ花ニ稍相似タリ色黄ニメ緑ヲ帶フ六瓣ニメ下瓣甚小少シク外反ス左右ノ瓣ハ稍長ノ上ノ方微紫ヲ帶フ上ノ二瓣ハ最大ニメ微ク外反シ色紫黒ヲ帶フ中心短黄莢ヲ出ス根ハ大サ一拇指ノ如ク巨キ鬚ヲ分テ白色ナリ或人コレヲ留達悉劉斯のカスト

大ニシテ百
カスト

ノ大斯百煙筒祿乙鐸ノ別種

羅甸コレヲ斯屈祿欒力亞設列質葛。設若香ト稱ス苗高サ二三尺許方茎紫黑色コレニ葉齊列ナラズシテ長キ小茎ニ附着ス狀跼的歛葉類葉ニ稍似タリ然ニ軟滑ニメ刺傷セス葉面暗綠色ニメ光澤アリ背ハ光澤ナシ茎ヨリ短小枝ヲ出ス四稜ニメ他ノ品類ヨリハ甚小ナリ末ニ小莖ヲ出ス分烈シテ五尖ヲナス内花ヲリ四瓣ニメ最上

多ノ齒刻分テリ茎ノ半バヨリ末ニ至テ枝ノ節ヨリ別ニ方ナル小枝ヲ分テ小葉ヲ著ス其枝又小枝ヲ分テ花ヲ著ス其狀小囊莢ヲナシ中空ニシテ尋常大斯百煙筒祿乙鐸ノ花ニ稍相似タリ色黄ニメ緑ヲ帶フ六瓣ニメ下瓣甚小少シク外反ス左右ノ瓣ハ稍長メ上ノ方微紫ヲ帶フ上ノ二瓣ハ最大ニメ微ク外反シ色紫黒ヲ帶フ中心短黄莢ヲ出ス根ハ大サ一拵指ノ如ク巨キ鬚ヲ分テ白色ナリ或人コレヲ留達悉劉斯的能力ト

イフ

第二種

干乘ノ大斯百煙筒祿乙鐸ノ別種

羅甸コレヲ斯屈祿効樂力亞設列質葛。設若香ト稱ス苗高サ二三尺許方茎紫黒色コレニ葉齊列ナラス長キ小茎ニ附着ス狀踏的歛葉類葉ニ稍似タリ然ニ軟滑ニメ刺傷セス葉面暗綠色ニメ光澤アリ背ハ光澤ナシ茎ヨリ短小枝ヲ出ス四稜ニメ他ノ品類ヨリハ甚小ナリ末ニ小莖ヲ出ス分烈シテ五尖ヲナス内花ヲリ四瓣ニメ最上

ノ瓣ハ分テ兩岐ヲナシ上へ反張ス最下ノ瓣ハ
下垂シテ唇ノ如ク其他ノ二瓣ハ各左右ニ出ツ
花後小莢ヲ結フ其先分レ尖テ兩岐ヲナスニ似
タリ内細子アリテ尋常大斯百煙箇祿乙鐸子ニ
似タリ大抵本條ニ似タリト雖根塊ナク微臭
アリ

第三種

大斯百煙箇祿乙鐸ノ別種

葛覽樂律烏斯ノ説トコロニメ羅甸ニコレヲ斯
屈祿歙樂カ亞百列屈カ那ト稱ス尋常大斯百煙

箇祿乙鐸ニ似テ但根ニ塊ナキノミ

性効二種共ニ性燥ニメ温ナリ

主療第一種ハ腺ノ硬腫羅甸斯在留覽ヲ治ス○痔

瘡疼痛ニ甚良ナリ或人ハ此草ヲ項ニ懸テモ亦能

治スイヘリ然モ予未タ親試セス又一説ニ此草根

鹽氣ナキ酪ニ和シ陰湿ノ地ニ安スルヲ十五日ニ

メ取出シ微火ニテ煮瀝テ滓ヲ去リ腺腫及ヒ痔疾

ニ塗テ奇効ヲ得ルトイヘリ

第二種ハ葉淨除ノ功アリ故ニ經久臭穢ノ潰瘍ニ

甚功アリ汁ヲ取り蜂蜜ニ合シ煮テ用ユベシ

附考 或人別謁屈斯久乙莫ノ子ヲ搗キ蜜ニ和シ

膏ノ如シメ額上ニ貼シ淚眼ヲ除ク○此草ノ自

然汁硫黃硝石ヲ和シ耳中ニ滴メ耳痛ヲ止ム○

地和思谷里迭斯曰鉄蟲覓奴莫ノ全草也良ヲ連

每葉三十二條陳之ニコトヲ云フ

又ヨリ諸良肉ヲ取テ木懸ニ懸シテコトヲ云フ

テタ田ヒ○正日本國此全草ノ葉ハ鐵蟲ノ食

第三十二章 茵奶薩

名義 茵奶薩 羅甸○厄 勸齊亞

布力羅斯ハ久花樂兀トイフ得和鐸留斯哈薩ハ刺

カ葛力亞又彪力葛力亞トイフ又布蟾兒力烏莫ヲ

モ彪力葛力亞ト雖は別種ナリ是ハ弗祿乙茵祿乙

鐸ナリ藥局ニテハコレヲ知モノナシ

得和字樂思緝斯ハ北生牡生ノ二種ヲ説ケリ地和

思谷里迭斯ハ兩種ノ間ニ中間ノ一種ヲ加ヘタリ

然任後世ノ本草家彼ハ此ヲ以テ真トシ此ハ彼ヲ

甚功アリ汁ヲ取リ蜂蜜ニ合シ煮テ用ユベシ

附考 或人別謁屈斯久乙莫ノ子ヲ搗キ蜜ニ和シ

膏ノ如シメ額上ニ貼シ淚眼ヲ除ク○此草ノ自

然汁硫黃硝石ヲ和シ耳中ニ滴メ耳痛ヲ止ム○

地和思谷里迭斯曰缺蠶覓奴莫ノ全草根ヲ連

子絞リ自然汁ヲ取リ飲服スレハ吐血ヲ治ス甚

功アリ又泄瀉及赤帶下ヲ清涼ニシ且止ム又血

血ヲ止ム○其葉金瘡ニ傳テ瘰癧ス一妙ナリ○升

鍊家ニ別謁屈斯久乙莫及大斯百煙筒祿乙鐸

ヲ多用ユ○五月中旬此全草ノ蒸露ヲ滴シ疣目

及ヒ諸息肉ヲ除ク木綿ニ浸シテコレヲ貼シ且

毎服三十二錢朝夕ニコレヲ用ユ

カ葛力亞又彪力葛力亞トイフ又布蟾兒力烏莫ヲ

モ影力葛力亞ト雖ヒ別種ナリ是ハ弗祿乙箇祿乙

鐸ナリ藥局ニテハコレヲ知モノナシ

得和字樂思紐斯ハ此生牡生ノ二種ヲ説ケリ地和

思谷里迭斯ハ兩種ノ間ニ中間ノ一種ヲ加ヘタリ

然レ後世ノ本草家彼ハ此ヲ以テ真トシ此ハ彼ヲ

以テ真トス故ニ今辨別スルノ難シ

○第一種 ゴートコチイサ 大箇奶薩

印低旭莫ム 旬密力達力斯ス 同 姪力亞力烏莫ム 同 苛部力
歙哈同ム 孚樂屈木薩ム 同 繆斯ス 的祿斯ス 同 必薩ム 同 契訥設
末質質斯ス 齊危勒ム 沓乃斯ス 同 達那悉客ム 同 苛乙箇斯ス 同 乙
斯蟠斯ス 同 第訥斯ス 木斯ス 同 部列蒲屈ム 訥斯ス 同 亞訥烏
備亞斯ス 同 苛姪密亞斯ス 同 以兒登ム 兒竭樂ム 伊斯把ム
大箇奶薩ム ハ 狹葉潤葉ノ二種アリ 得和孚樂思紐斯ス
ハコレニ 牡生ノ稱ヲ附接ス 諸本草家ノ説ニ大箇

奶薩ノ第二種ヲ地和思谷里迭斯ノ拔葛里斯スニ充

ツ是稍相似タルヲ以テナリ然レ真ニアラス

△正恭曰ゴートコチイサ 大箇奶薩ハ 狹葉潤葉ノ二種トモニ天

名精ニ近シ天名精ハ 秋後葉地ニ塌ノ生シ状煙

草葉ニ似テ小ク毛茸アリテ皺文多シ故ニ細目

ニ一名皺面草ト名ツクコレヲ摘メハ臭気アリ

因テ豕首羸顛等ノ名アリ本邦ニテハ猪屍草ト

イフ夏ニ至リ條ヲ抽テ高二三尺ニ至リ小葉互

生ス秋葉間ニ蒼様ノ花アリ圓小ナル蒂アリテ

花淡黄色實ハ絮ニ似テ人衣ニ粘ス是瀾葉コトイ蔘コトイ
蔘ニ似タリ又一種小葉ノ者アリ莖葉花ニ細ク
ノ花状相同シ是狹葉蔘コトイ蔘ニ似タリ且本草天
名精ノ主治ヲ併考スルニ功用稍相同シ恐ラク
ハ一種ノ者ナルヘシ

○第二種 中間蔘コトイ蔘コトイ

去兒物コトイ兒コトイ子コトイ熱爾瑪コトイ動鐸コトイ兒物コトイ兒コトイ子コトイ同斯樂コトイ低葛コトイ樂コトイ鳥コトイ

禿別謁コトイ莫斯コトイ

中間蔘コトイ蔘コトイモ亦香臭ノ二種アリ臭氣アルヲ斯珍コトイ

建ケン姪ヂ蔘コトイ蔘コトイト云ヒ香重カラズシテ頗蜂蜜ノ氣アル者ホニラリケテ蔘コトイ蔘コトイト云フ

△正恭曰此物形状旋覆花和名小輪ニ近似ス然レ本草旋覆花ノ主治ヲ併考スルニ功用同シカラス疑ラクハ唯其葉形稍相似タルノミニメ自ラ別種ノ物ナルベシ

得トク和ワ字ジ樂ラク思シ緇シ斯スハ北キタ生シ蔘コトイ蔘コトイトス此書ニ圖スルハ最小蔘コトイ蔘コトイナリ小蔘コトイ蔘コトイハ稍大ニメ芳香アリ

花淡黄色實ハ絮ニ似テ人衣ニ粘ス是瀾葉コト奶コト薩カニ似タリ又一種小葉ノ者アリ莖葉正ニ細ク
ノ花狀相同シ是狹葉コト奶コト薩カニ似タリ且本草天

録ニハ其葉ハ蘇麻ノ如クシテ白ク
△五毒曰此此非此非蘇麻ノ如クシテ
ハ蘇マニ意香コト薩カニ似タリ

蘇カ薩カニ似タリハ蘇マニ意香コト薩カニ似タリ

送斯ノ拔葛里斯ニ充ツ是稍相似タルヲ以テナリ

然正真ニアラス

○第二種 中間ミツ奶コト薩カ

吾兒物兒ニ子ツ熱爾瑪ニ動鐸兒物兒ニ子ツ同ス斯樂低葛樂鳥カ

杏別ト錫ト莫斯ト

○第三種 小ケ奶コト薩カ

捌尼容ハ羅力ニ拔訥ハ質斯ト同ス

得和字樂思ハ細斯ハ北生ニ奶コト薩カトス此書ニ圖スル
ハ最小ハ奶コト薩カナリ小ハ奶コト薩カハ稍大ニメ芳香アリ

故ニ芳香シキクニケテ菌コトイフ奶サイ薩サ 名ナタルモナリ

附考 此草種類多シ其状ノ大小葉ノ潤狭銘齒ノ

有無或ハ芳香或ハ臭氣アルモノ又ハ毛茸アリ

テ爾細色ナル等ノ異アリ皆一種類ノモノナリ

郭留識クワリウシキ烏斯ウス及キ羅別兒ラベエ等ノ諸家多ク其品類シ

舉トテ斯シラ審シニセハ一書ヒトトモラナスベシ而シテノ好キ事コトノ

士シラシテ大ニ有益ナルトアラシ

○依ヒトカラスト加得カトノ菌コトイフ奶サイ薩サ

是依ト加得カ婦人方ノ中ニ菌コトイフ奶サイ薩サト名ナツクル

モノナリ然シテ此條ニ称スルモノト誤ルシカラス

即チテ前ニ記セル亞莫部アム祿ロク悉シツ耶ヤナルベシ其形状

稍相近シ

總說 第一種大菌コトイフ奶サイ薩サハ狭葉潤葉ノ二種アリ狭葉

ノ者ヲ真ノ菌コトイフ奶サイ薩サトス南方海濱ノ諸國勿コトイフ釋シツ茶チャノ

海岸及キ羅瑪ロマノ孚フ陸リク撈ラウ遮シャ尹イン拂フツ郎ラウ察サツノ那ナ而ニ暴ボウ念ニョウ蒙モウ

秃ツツ百ヒャク爾ニ利リ爾ニ斯スノ道傍ニ最多シ好キテ葡萄園ノ辺ニ

生ス郭留識クワリウシキ烏斯ウスノ説ニハ伊斯巴你亞ニテハ發ハツ斂シツ

的テ亞ヤ纏マツル而シテ拭シ亞ヤ或シテハ暴ボウ念ニョウ立ツク數スウ節セツ念ニョウ等ニ生ストイヘ

リ苗高サ三尺許或ハコレヨリ過クルモノアリ根
際ヨリ數莖ヲ分チ木様ニメ莖圓シ葉繁密ニシテ
黃綠色狹長ニメ瞻八樹葉ノ如ク大サコレニ倍ス
秋莖頂互ニ小莖ヲ出シ一花ヲ著ス黃色「ユリゲ」弄
若菜「ハハ」花ニ似タリ後絮トナリ風ニ隨テ飛散ス絮ノ
一種ニ似タリ後絮トナリ風ニ隨テ飛散ス絮ノ
本ニ細子アリ小ニメ「ハハ」法比「ヒ」屈斯「ク」箇「コ」祿「ロ」乙「イ」鐸「ト」黃「ウ」氏「シ」菜「イ」子「シ」
ニ似タリ根巨大ニメ少ク鬚アリ冬ヲ經テ枯レス
此草微シク芬芳ニシテ重シ細毛アリテ糙濇且粘
氣ヲ帶フ又潤葉ノ者ハ真ノ箇「コ」奶「ネ」薩「イ」ノ「コ」種トス處

々曠豁ノ地古壁ノ傍及ヒ石地ニ生ス「ハハ」潤「ク」斯「ス」列
鳥的兒部「ウ」葦「ル」莫「グ」和名櫻「ル」葉ニ似テ最「ハ」正「ル」小ニメ黑色ヲ
帶コレヲ撫ルニ毛茸多クメ軟ナリ莖ヲ抽テ高サ
三四尺圓メ莖葉トモニ毛茸アリ末小枝ヲ分チ枝
頭ニ小長花ヲ開キ車輻狀ヲナス初黃色後微紫ヲ
帶フ終夏ナリ後又絮トナリ風ニ隨テ飛散ス根ハ
四方へ繁行メ嫩芽ヲ生ス此亦香重シト雖「ハ」甚「ク」タ
臭カラズ且粘氣モナシ

○芽二種中間「ミ」箇「コ」奶「ネ」薩「イ」モ亦香「ク」二種アリ惡臭アリ

ルモノ斯^ス珍^シ建^シ姪^シ箇^コ奶^コ薩^コナリ流水止水ノ傍好テ下
湿ノ地ニ生ス葉長シテ潤サ一拵指横徑茎圓クノ
直立シ高サ二尺許ニ至ル白毛茸多ク香重クシテ
惡臭アリ夏月枝頂花ヲ著ス葛^カ密^ミ兒^ル列^レ花ニ似タリ
唯稍大ニメ瓣黄色ナルヲ異トス花後絮トナリテ
飛散ス根鬚多シ又^又香氣ナルモノ^ヤ蜜^ミ香^ク箇^コ奶^コ薩^コナリ
和蘭ノ下湿ノ地亞爾杜^アスノ海界ノ瀦水ノ処ニ
多コレアリ粗大ニメ茎巨ク堅ニ線稜アリ内空ナ
リ茎末ニ至テ枝ヲ分テ葉鋸齒深シ^シ刻^クカ如ク

多ク茎ヲ圍テ附着ス總テ繭細色ノ柔^ク茸^クアリ夏
月黄花アリ後絮トナリテ飛散ス前種ニ比スレハ
香重カラス稍蜂蜜ニ似タリ根ハ鬚ニメ黑色ナリ
○茅三種小箇^ケ奶^コ薩^コ是モ亦最小ト小トノ二種アリ
最小ノモノヲ又^モ北^キ生^シ箇^コ奶^コ薩^コト稱ス處々水傍下湿
ノ地ニ生ス一種ノ小草ニメ高サ一咫許總テ毛茸
アリテ繭細色香氣別種ノ者ト同シ葉モ至テ小ナ
リ^夏葛^カ密^ミ兒^ル列^レ及^シ列^レ印^シ花^ル兒^ルノ荅ニ似テ中等ナリ黄色
微黑ヲ帶フ又長絮トナリ風ニ隨テ飛散ス根細シ

其小ナル者ハ芳香茵蔯ト稱スモノナリ伊斯
巴尼亞ノ禿列鐸拂郎察ノ那爾暴念ノ邊ニ多シコ
レハ前種ニ異ナリテ一種ノ者ナリ一莖直立高サ
一尺半又ハ過ルモノモアリ軟枝ヲ生シ毛茸アリ
テ糙瀆ス粘氣アリ葉カ那カ耶ニ似テ毛茸又粘氣
アリ秋枝ノ側ニ花ヲ附著ス細小ニメ黄色又紫ト
ナリテ飛散ス根ハ細シ前ノ諸種ヨリハ香氣佳ナ
リ

性効茵蔯ノ種類ハ總テ性熱ニメ燥クリ然トモ

中間ト最小ノ者トハ功力少シク劣レ

主療地デ和思谷里送斯コリ曰此葉酒ヲテ服メ經水ヲ催

シ死胎ヲ下シ淋瀝ヲ療シ黃疸及ヒ赤痢ヲ治ス○

醋ニテ服スレハ癩癩ヲ治ス○此葉水煎シ浴湯ト

ナシテ子宮病ヲ治ス○此草ノ自然汁油ニ和シ身

體クニ擦テクラ去ル又頭上ニ塗テ頭痛

ヲ療ス○此草蛇ヲ避ク其處ニ置キ或ハコレヲ燒

薰スベシ又蚊ヲ避ク且其香氣アルヲ以テ蚤ヲ殺

ス○地ハ和思谷里送斯及ヒ哈列釋斯ノ説ニ此葉蛇

咬ノ膿潰腫起スルモノニ貼ス最佳功アリ

附考 箇奶薩カサ薰燒シ或ハ各處ニ置テ諸毒及

穢汚ノ諸毒蠅蚊ノ類ヲ避除ス○葉搗爛シ蜘蛛

及ヒ毒蛇咬傷ニ貼ス又金創及諸寒腫ニ貼ス○

穀類中ニ藏置テカサ箇奶カサ兒カサ斯カサヲ防拒ス○葉搗

爛シ足心ニ貼メ下血及泄瀉ヲ止ム○伊斯巴你

亞ニ於テ一老婦此草根ヲ酒ニテ服シテ疥癬ヲ

治ス○小箇奶薩カサ葉頭部ニ貼メ頭痛ヲ治シ諸語

ヲ止ム○郭留識カサ鳥斯曰皮膚疥癬ヲ治スルニ伊

斯把カサ屋亞回ノ一老婦箇奶薩根ヲ酒ニテ飲服セ

シムリ又一僧徒此草ノ根葉ヲ採リ膏ニ造リテ

コレヲ用エカサ箇奶薩カサハ二種

撰脩 允藥用ニハ大箇奶薩カサ芳香箇奶薩カサヲ撰用スベ

シ中間最小ノ種類ハ用ユルニ堪ヘス功力稍劣リ

妨害 缺カサ草性毒ニ用ユルニ勿レ此液

附考 此草妊婦ニ用ユルニ勿レ其液子宮ニ入ル

片ハ墮胎セシム又野牛及羊ナレヲ食ヘハ甚害

アリ少ク食スト雖且必大渴ヲ發シ終ニ死ニ至

第三十三章

封茲東竭

名義

鄰救亞葛尼斯羅
婿訥屈祿斯速厄勒
婿訥屈祿

斯損同廠茲舜件熱爾瑪封茲東竭業謁垣歛救亞姪

百兒祿伊亞巴鄰救亞地葛涅里亞蘭救謁姪志尹

桑福扮姪斯屯竭利亞荷乙耶婿古別謁莫斯

亞彪犂烏斯ノ書ヲ閱スルニ異稱多シ厄勒齊亞ニ

弗力及亞荷覓尼客斯布列尼客斯布列涅客葛拔兒

樂質客葛拔兒力客箇力木斯百乙兒及斯列烏古力

和斯等ノ名アリ又羅甸ニ葛尼南救亞覓設鐸尼葛

ト云フ○布カ標斯ハ蟾訥屈祿斯速斯ト名ツケ二種ニ別ツ然レ第一種ハ地和思谷里迭斯ノ書中ノ獨屈祿斯ノ條ヲ翻メ載タリ是本條ニアラス和斯線東竭ナリ第二種ハ彼說ニ小刺ヲ出ストアレハ本條ナルト明ケレ○阿質烏斯ノ說ニハ蟾訥屈祿帥莫トカ木尼烏莫トラ一種ノ草トス是哈列釋斯カ單味能毒編ノ祝ト吻合ス又和カ拔悉烏斯及ヒ捌烏留斯謁及涅託等ハカ木尼烏莫一名列木尼烏莫ト詳ニ説タレレ蟾訥屈祿斯損ノ名ハ著ハサス

○龍姪禮質烏斯ハ此草ヲ味兒姪物謁姪一名哈樂斯緇莫トス然レ味兒姪物謁姪ト達莫覓物謁姪トトハ裁儀ムルニ差異ナルモノナリ此書第三卷二十八章ニ詳ナリ

附考 近來ノ本草家封茲東竭ノ品類ヲ分ツ然レ今通常ノ封茲東竭ハ大小ノ二種アル而已即チ獨度涅烏斯カ其出處ニ由テ大小アリト云モノ是ナリ

○小封茲東竭 此草拂却察ノ蘭軒遺古ノ地方

鹿息ノ瘠地ニ生ス高サ一掌半或ハ一尺許ナリ
羅別兒コレヲ蘭ラン置古ノ小封茲東竭ト稱ス即
業謁堉爾蘭杜ノ本草家ノ所謂甘茅亞封茲東竭
ノ一種ナリ

○大封茲東竭 羅別兒曰翁尔辣々及把岳亞ノ

地方ニハ最大物謁姪ヨリハ多ク生ス其高サモ

亦同カラス脚葉ハ潤シテ綠色地上ニ垂ル花ハ

枯白色年ニ由テ花茎ヲ生セサル一アリ又園圃及

樹籬ノ傍等ノ陰地ニ生スルハ花ヲル一稀ナリ

○最大封茲東竭 羅別兒曰又最高封茲東竭ト

名ツクコレヲ羅甸ニ蟠訥屈祿斯帥莫末吉悉輝

莫ト稱ス予コレヲ業謁堉爾蘭杜ノ園中ニテ見

タリ前種ト同クメ葉花子共ニ他種ヨリモ二倍

ス

總說

此草沙地荒地或ハ道傍下湿ノ地ニモ亦コレ

アリ葉長濶小ニメ軟ナリコレヲ撫ルニ滑澤ニメ

柔毛茸覆ヘリ初生ハ葉叢生ス二三年ヲ経テ茎ヲ

抽ス故ニ地和思谷里迭斯ハ花茎ナレト言フ誤ナ

リ莖高サ一又半圓クノ^補爾袖色六七月ニ多枝ヲ分
チ花排列ス赤色ニメ紫黒ヲ帶フ後一花コトニ四
子簇生ス人衣ニ著スルノ牛房子ノ如シ四子中間
ニ一小刺ヲ出ス堅利根ハ直ニメ巨大溪ク土中ニ
入ル然レ地ニ由テ形状ヲ異ニス故ニ^獨び^都ニ生
スルヨリ甚大ニメ葉濶キモノアリ或ハ小ニシテ
低ク或ハ葉狹キモノアリ其低シテ葉狹モノヲ^甘第^引
亞ノ封^ツ茲東竭ト云フ

附考封^ツ茲東竭子ハ甚小ニメ毛刺アル殼中ニア



リ其殼能人衣ニ著テ^龜芽草^及竊衣ヨリモ甚シ
根ハ形色粘氣共ニ^尾兒^縛兒^的兒ニ似タリ其香
氣人ヲシテ^眠ラ^催セシム○玉函^涅斯達力烏斯
ノ説ニハ白花ノ者アリトイヘリ

性効根葉共ニ中等ノ寒ニメ稍軟和ノ功アリ

主療地和^思谷里^迭斯曰此草酒ニ煮テ服スレハ大
便ヲ通ス○此葉ヲ老豕ノ股ニ和シ貼スレハ毛髮
脱落ヲ治ス是レ火熱及^醋腐液ニ由テ發スル者ナ
リ羅甸ニコレヲ亞落^閉濕耶ト云又火傷ヲ治ス○

地^ヂ和^ワ思^シ谷^コ里^リ迭^テ斯^ス曰^ク能^ク犬^ノ咬^ム傷^ヲ治^スト然^レ任^セ其^ノ全^ク質^ヲ
ヲ審^ミニセザルニ由^ルテ何^ノ理^{アリ}テ其^ノ功^{アリ}ト云
一^クヲ知^ラス○此^ノ根^ノ熱^ク灰^中ニ煨^シ内^痔ヲ瘡^シ痛^ヲ
止^ム

附^ク考^ス封^シ茲^ツ東^ト錫^ゲノ火^傷ヲ治^スル一^ハ婦^人等^モ能^ク

知^トコロナリ是^ノ能^ク清^涼ニシ且^ニ燥^シ痛^ヲ止^メ其^ノ
滿^溢ノ毒^ヲ禦^クカ爲^ナリ便^テ溶^化セル膏^ニ合^ス
シ熱^處ニ滴^ス○其^ノ性^緩和^ニメ粘^滑ナルカ故^ニ
能^ク大^便ヲ通^ス宜^ク酒^煎シテ冷^服スベシ○此^ノ草

其^ノ香^氣ニ由^テ眠^ヲ催^ス近^世意^太里^亞及^ニ諸^邦
ニ於^テ醋^屬ニメ稀^涼ナル冒^寒傷^冷毒^ニ多^ク用^ユ
是^ノ清^涼ヨリハ大^ニ相^密ノ功^{アリ}○此^ノ葉^能ク大^ク
便^ヲ通^ス酒^煎メ用^ユ又^ニ油^ト塩^ト水^ニ入^レ煎^シ
用^ユ○新^鮮ナル葉^ヲ採^リ金^瘡膿^潰骨^ヲ損^傷
スル者^ニ貼^メ良^効アリ其^ノ葉^自然^汁モ亦^ニ功^{アリ}
○自^然汁^及ニ蒸^露水^癩毒^{ヨリ}来^ル所^ノ小^瘡及^ニ
潰^瘡ヲ治^ス○葛^菟樂^律烏^斯曰^ク内^痔ノ痛^ヲ止^ム
ルニ此^ノ根^ヲ水^ニ調^和セル小^麥粉^ヲ包^裏シ熱^炭

中ニ煨シ後取出シ粉ヲ去リ其根ヲ以テ率櫻悉

禿離九子名也醫學堂鑑ニ見代用ス○封茲東竭丸亞列吉

算姪兒達樂兒力亞釋斯此ノ九子ヲ用テ腹痛ヲ

和ク又其他斯ノ如キノ類証ヲ治ス其後莖局ニ

傳ラコレヲ造リ必輪姪蟻訥屈祿斯撒ト名ツク

此物根皮一味ヲ丸ス此九子三分錢ノ半ヲ鋪後

二時我國ノ一時也ニ用エ能人ヲメ眠ラシメ冒寒傷

冷毒毒ノ諸症ヲ治ス

第三十四章 窩伴禿羅斯禿

名義 謁烏弗樂悉亞羅謁部力古禿諸厄亞烏伴

禿祿斯禿熱爾瑪亞莫部祿斯葛別謁

和名コ、ノグサ伊吹山漢名未詳

此草古來ヨリ謁烏弗樂悉亞ト稱ス伊斯把尼亞及

意太里亞拂却察ノ人モ皆コレニ克ツ近世ノ本草

家ハ謁烏弗祿設乙涅ト呼フ又一種謁烏弗祿設乙

嫩トイフモノアリ和斯線東竭第二十一章ナリ

或人說ニ本條ヲ和評樂力斯又和弗達兒密葛ト云

此藥分爲二下
 一、下
 二、下
 此藥分爲二下
 一、下
 二、下
 此藥分爲二下
 一、下
 二、下

此藥分爲二下
 一、下
 二、下
 此藥分爲二下
 一、下
 二、下

卷三十四
 醫學

症眼目一切諸病：內服外用之，最氏奇効アリ

○眼目諸疾ニ葉乾シ末トナシ鷄子黃ニ和シ服
ス或ハ蘆薈ヲ合シ茴香馬鞭草ノ蒸露ヲ以テ服
ス尤妙ナリ○眼目ヲ明カニスルニ此草ヲ久ク
酒ニ浸シ服ス或ハ細末ヲ酒ニテ服ス甚妙ナリ
然レ一説ニ酒ヲ用ヒスノ細末單服ヲ單服シ或ハ煎
汁ヲ服スルハ明目酒ヨリモ勝レリトス何者酒
ハ其蒸氣頭腦ニ滿溢シ葛達カダ見ミ飲シ時時浸浸鼻鼻鑿鑿等等ヲ發ス
若シ酒ニテ用ント欲セハ茴香蒸露或ハ沙糖ヲ
和シテ其性ヲ緩和スバシ羅別兒ノ説ニ蘆亦齊

ニ於テ一友人冒寒傷冷毒ヲ壅迫シテ少シク淚
眼ヲ患フ明目酒ヲ用ユルト三月許ニメ兩眼明
ヲ失セリ故ニ酒ニテ用ユルト禁ス而メ冒寒
傷冷毒ノ熱ニ屬スルモノヨリ寒ニ屬スルモノ
ニ用ユルヲ佳トス又或人ノ説ニ世人稱譽スル
所ノ明目酒ハ眼目ヲ療スルヨリハ害アルト大
ナリト言ヘリ○亞兒訥兒アエネエ述ツ斯ス比ヒ兒エ樂ラク訥ネ烏ウ亞ア穉ジ
斯スハ一老夫ノ久シク明ヲ失シタリシラ此草ノ
生葉或ハ乾葉ヲ飲食及ヒ諸物ニ和メ服食シ全

愈シタリ

追附 此物久服ノ明ヲ失スル者舊ニ復シ昏暗ノ者眼鏡ヲ廢スル者少カラズ且肥人ノ粘液多キ者ニ屢益アリ細末一錢酒ヲ以テ空心ニ服ス數日ニメ一切眼疾ヲ治ス又方此物茴香各十六錢肉豆蔻膜三分錢ノ一冰糖適宜ヲ加ヘ散藥トシ用ユ○眼目昏暗及其他諸症ニ此草水或ハ酒ニ煎シ外貼ス又自然汁蒸露水共ニ妙ナリ○健忘ヲ治ス強記シテ忘レサラシム甚良功アリ○黃

疸ヲ治ス此物硃砂少許ヲ加ヘ水ニ浸ス一宿能混和シ其水ヲ服ス甚功アリ○癩毒ヲ治ス此草莖葉根ヲ連子酒ニ浸シ服ス又水煎シ浴湯トナシテ其輕症ヲ發汗セシム○齒痛鉅齒ヲ治ス全草燒灰シ淋汁トナシ濕テ嗽クベシ○鼻香臭ヲ聞ケル者初發ニ自然汁ヲ鼻中ニ塗ル大ニ功ヲ著ス又口瘡ヲ治ス○金瘡難治ノ症又胸脇痛ヲ治ス此葉油ニ浸シ大陽ニ晒ス一本邦ノ時半時ニ當許滓ヲ去リコレヲ塗ルベシ○婦人愁鬱シテ

顏色好カラサル者此花酒煎シテ服ス
追附ノ一
條ハ第三

十五章ヨリ
爰ニ附入ス

妨害
缺

附考 前ニ明目酒ノ熱ヨリ發スル眼目諸病ニ害
アルヲヲ既ケリ最ニ精神衰弱ノ人ニ害アリト
知ヘシ

第三十五章 第二種富件壳羅斯壳

名義 謁烏弗樂悉亞兒的樂ト羅

今通ノ謁烏弗樂悉亞兒的樂ト稱ス是即ケ第二

種富件壳羅斯壳ノ義ナリ然ニ真ノ富件壳羅斯壳

ニ全ク相似ス唯一差數ヲ分ツノミ又富件壳羅斯

壳ト哈樂斯トニモ近カラズ此物ハ根ヨリ特立スルノ

ミニノ彼カ如ク叢生セス又節モ高カラス何ニ由

テ此名アルヲ知ラス

總論 此物下濕ノ地ニ生ス乾燥ノ地ニハ絶テ生セ

ス間收地陰処ニコレアリ苗高一咫或ハ尺許茎四
シテ多枝ヲ分チ对生スルノ翼ノ如シ葉小ニノ椀
長尖リテ下へ彎曲ス葉間^{七月}頃葉間小花ヲ著玉數月
ヲ経^{保ツ赤色ヲ帯フ}テ^{赤色}根ハ鬚アリテ四方へ蔓延ス

性効主療 共ニ未詳

此書... 卷之... 目錄...
 〇 第一編
 一 論...
 〇 第二編
 一 論...
 〇 第三編
 一 論...
 〇 第四編
 一 論...

大正百餘箇新し

