

獨度涅烏斯草木譜

初稿本

洋学文庫
文庫 8
F 5
4




初部二套

一章ヨリ

十章迄 ケラニウム

筆耕版下清書成束

共十四冊



獨度涅槃島新

遠西草木譜卷之三十一上

遠西獨度涅烏斯草木譜茅三卷 初編

東都 吉田正恭 纂修

桑名 石井當光 原譯

長崎 羽栗 費 譯定

會津 荒井行順 校

小引

前ノ茅二卷ニ於テハ羅甸名亞Aヨリ謁Eニ至ル諸

草ヲ記シ且其種類ニ附屬スル者ヲ舉ク此茅三卷

ニ於テハ字F極G合H乙I葛K而Lヲ冠スル者

ヲ記シ而メ其形状ノ相類スル者ト其稱呼ノ相近
者トハコレニ附屬ス

第一章

比立扁去洛

名義

比立扁去洛

羅甸 何姪斯的煙部列劫 爾業謁垣

今世通ノ比立扁去樂ト称スル者ハ但一種ノ也

羅別而ハ別ニ一種山比立扁去洛ヲ舉タリ

○第一 比立扁去洛

此草意太里亞伊斯把屋亞拂即察ノ諸國通シテ皆

比立扁去洛ト称ス屋谷洛烏斯列布湿由斯ハ尼

勒齊亞語ニテ撒立扁去碌ト呼フ熱尔瑪屋亞ニテ

碌壳斯的印部列古ト云何姪斯的煙部列劫ノ義也

泐石

附考

斯の煙部列劫ノ名アル草數種アリ此草ハ

形状ノ同ニアラス唯其功腎膀胱ノ結石ヲ泐ス

ルヲ以テ泐石ノ義ナル由ナリ

熱尔瑪屋亞ニ味兒度哈兒破ト名ツク是野著ノ義

ナリ地和思谷里透斯ノ烏南的箇緑乙鐸ト云モノ

是ナリ既ニ彼カ尼勒齊亞語本草曰烏南的箇緑乙

鐸ハ葉捌斯質那劫ニ似テ白花特生ノ巨ク高サ一

尺許実ハ迷兒姪ノ如ク根巨ク微長圓塊ヲ

スト是今所謂比立扁去洛ニ似タリ捌斯質那劫ハ

葉狹ク比立扁去洛ハ葉濶シ然レ形状ヲ熟視スル
ニ葉小ニノ堅ク且黒色ナルノミ又其花白茎一石
ニ過ズ最モ高燥石地ニ生スルハ高カラズ鱗砌様
ノ子ヲ結フ一稍送兒姪ニ似タリ根モ大ニノ圓塊
ヲナス高谷里迭斯ノ説ト同シ又一種烏南的アリ
是野生物印哈兒鐸ノ未熟實ナリ又抹質玉留斯ノ
烏南的ト稱スル者ハ小翳兒鐸能天ノ一種ナリ又
一種甚相似タル者アリ或人ハ悉烏莫ノ種類トス
今人勻久索度樂結斯ト稱スル者ナリ此物亦ニ出

處同シト雖トモ形状ハ大ニ異也一物ニアラス

○茅二 山比立扁去洛

是羅別而ノ所稱ナリ郭留識烏斯ハ亞列屈禿祿陸
福斯亞兒撒那ト名ツク是化涅葛莫速建斯ノ一種
ナレバ也

附考 羅別而ノ所謂山比立扁去洛ハ郭留識烏斯

ハ二三種ニ分テ化涅葛莫速建斯ノ一種トス尚
獨度涅烏斯説ニ同シ此事ハ茅十八卷二十七章
ノ附考ニ辨ス

郭留識鳥斯異草譜第六卷三十三章曰比立扁

去洛ノ種類數品アリ翁加里亞荷斯天祿以吉

草芥地森林近傍ニ多シ又乾燥下湿地ニ生ス種

類多シト雖氏尋常ヲ辨スレハ品類推ノ知ベシ

○第一 比立扁去洛ノ別種

羅別而ノ説ニ別謁莫斯譜厄利亞佛即察草芥ノ

谷中ニ生ス真比立扁去洛ニ似タリ根繁蕪シテ

長ク圓塊ヲ作ス長鬚アリテ傍芽ヲ出ス脚葉ハ

百的兒設熱紅毛ニ似テ柔軟暗綠色高サ一尺五

寸或ハ其半ニ至テ節アリ傍枝ヲ生シ小葉ヲ著

花細小繖狀ヲ作シ白色亞孺斯及胡荽花ニ似テ

リ夏ニ至テ開ク

○第二 狹葉比立扁去洛

羅別而コレヲ鳥南的狹葉按救斯質覆加亞ト名ツク

尋常鳥南的ニ似テ但狹小ナルノミ

○第三 悉迦兒令屈狀鳥南的

羅別而ハ法列力鳥斯郭兒述斯ノ臘兒設尼吉

莫ニ充ツ北方諸邦殊ニ譜厄利亞ノ泥土池辺ノ

謁百ノ生スル處ニアリ然レ知者稀ナリ葉別謁
莫斯祿シ煙ニ似テ傍芽多ク茎暗緑形色共ニ悉
迦兒令屈荷葉ニ似タリ比立扁舌洛ヨリ悉迦兒
令屈ニ近シ故ニ我ハ用ヒズ何則病者ニ與ヘテ
害有ラン一ヲ畏ル抹質玉留斯曰悉迦兒令屈狀
烏南的根ハ比立扁舌洛ニ代用スル一勿レ甚毒
アリ人ヲシテ卒厥昏倒シ眩暈セシム根ノ黃汁
最レ畏ルベシ

△正恭曰悉迦兒令屈狀烏南的ハ物印曼ノ比立

扁舌洛亞寡質葛即テ水比立扁舌洛ナリ今彼圖
ヲ以テ補馬

總說 第一真比立扁舌洛ハ独シ都蘭土諸厄利亞ノ

高燥堅硬石地ニ生ス其狀矮小園圃ニ栽ルハ長大
ナリ葉ニ長ノ缺刻多ク長鋸齒アリ岸設力吉ニ似
テ硬ク薄小ニシテ暗綠色葉間堅莖ヲ抽テ線稜アリ
高サ二尺許六七月ニ茎頂枝ヲ分テ小花攢簇シテ
繖狀ヲ作ス六瓣小白花ヲ開キ芳香アリ中心花莖
白色星光ヲ為シ一處ニ攢簇ス根黑色ニシテ牝生

百和^ハ左^イ山^イ芍^イ 根ニ似テ結頭様ノ小圓球ヲ多隆起シ

長細鬚ヲ旋纏シテ四方ヘ蕃衍ス但小ナルノミ

○茅二山^ベ比立^リ扁^{ペン}去^キ洛^ラハ羅別而ノ説トコロ也高山

絶頂ニ生ス特生メ高一掌半巨クメ圓ク稍線稜ア

リ茎頂白花ヲ開ク状帽曹ノ如シ葉ハ尋常ノ者ヨ

リ小ナリ根ハ狭長結頭ヲ作メ細鬚ヲ懸垂セス茎

ニ固著ス郭留識烏斯曰翁加里亞及荷斯天祿以吉

ノ高山ニ産ス此草ハ合^イ涅^チ葛^カ莫^ムノ種類ナリ

附考 羅別而ノ所謂山^ベ比立^リ扁^{ペン}去^キ洛^ラハ至テ稀品也

故ニ烏^ウ南^ナ的^テ悉^シ奇^キ比立^リ扁^{ペン}去^キ洛^ラ亞兒^ア的^テ樂^ラ蒙^モ託^ト那^ナト

名ヅク根蕃衍セス鬚少ナク茎際ニ附^リ著^スメ圓長

ナル小球巨サ大抵均シク微隆起メ一年ヲ經ク

ル天門冬根ニ似タリ又小^カ黄^{ワウ}亞^ア斯^ス福^フ姪^ジ留^{リウ}斯^スニ似

タリ又芍藥根ノ状ヲナス茎高ク一掌半巨圓微

ク線稜アリ茎中間ヨリ下ニ葉互生メ形^ケ掘^リ留^リ物^ト

着^シト比立^リ扁^{ペン}去^キ洛^ラトノ間ニアリ鋸齒細ニメ奇^キ兒^ル

子^コ荷^カ輪^{リン}ニ似タリ茎頂ニ白花擯簇シテ穂ヲナス

美ニシテ愛スベシ其状曹ニ似テ白^{ハク}華^カ的^テ斂^シ及^ビヒ

烏頭封茲久兒列建斯ノ如シ

△正恭曰樊噲一名花野野刈日光山中禪寺ノ

絶頂ニ生ス其葉稍薊ニ似テ缺刻深ク鋸齒アリ

根際ヨリ四五葉叢生シ中心一莖ヲ抽テ三四葉

ヲ著シ其中間ヨリ碎葉互生シ末ニ至リ四五月

頃徳ヲ成シ花状續断ニ似テ微天紫紅花多簇著

ス根鬚少ク幹際ヨリ分叉ノ條ヲ作シ多攢簇ス

アガミノ名アレト薊類ニアラズ花状全異ナリ

山比立扁岳洛ニ近シ本編ニハ花白色トアレト

此物紫紅色ニメ説ト異ナリ然レ圖ニハ紫紅ニ

著色スレハ紫白二品アリト見ヘタリテ亦曩者ニ

花戸ニ於テ白花者ヲモ見タリ漢名未詳

性効真比立扁岳洛ハ熱ニメ燥ナリ開達淨除ノ功

最巨著シ且微レク聚斂ノ功アリ殊ニ根ヲ以テ勝

レリトス羅別而ノ山比立扁岳洛ニ非ス

主療此物煎汁ト為シ尿ヲ通シ結石ヲ下ス故ニ能

淋疾小便不利ヲ治ス○林の鳥斯些ヒ兒發質久斯

及釋蒙耶律分悉斯ノ説ニ此根細末トシ癩癩ニ甚

功アリ食品ニ雜テ亦佳ナリ又痲氣腹痛腸中風氣
雷鳴ヲ治スルニ茴香子少許ヲ加テ最効アリ○地
和思谷里迭斯ノ書中ニ烏南的根ヲ酒服スレハ淋
疾ヲ治ス

〔附考〕真比立高去洛根ハ癩癩卒厥頭眩ニ甚効アリ
最良能腎臟結石膀胱粘液ヲ除ク故ニ先哲モ
汚穢婦人ノ病ニ試用セリ著シ故ニロシヤニ生スル泐石草ノ
名アルヲ宜ナリ○又此根胃中風氣ヲ破リ喘急
ヲ治シ寒液ヨリ生スル諸病ヲ治ス

第二章 蟲涅的

名義列及那布樂質羅甸字而末力亞同葛布里薄兒
電同璣斯薄兒壳熟尔瑪 蟲涅的業謁垣薄兒別竭烏
列拂即 尔蘭杜

古昔ヨリ羅甸ニ列及那布樂質ト名ツク曠野平原
ニ生ス花美艷ナルヲ以テ曠野女王ト云ノ義ナリ
字而末力亞ハ業字兒繆斯榨ニ似タルカ故ナリ厄
勒齊亞ニ連樂兀樸俾ト名ツク此兒悉薄兒電ト
ハ別物ナリ

布立株斯今草ニ曰此草松即察ニテ祿鐸樂トイフ
一茎ニノ節アリ無花果枝ノ如シ葉ハ踏的歛類
ノ如ク中間白色ヲ帯フ日ヲ経テ全赤色ニナル花
銀白色然モ蟲涅的ハ茎一箇ノ長枝ニメ葉ノ附際
ニ節アリテ膝ノ如シ葉鋸齒ハ踏的歛ノ如ニシテ
中間白カラズ背白色ニ至リ葉茎共ニ赤色早謝
ス然モハ蟲涅的ハ祿鐸樂ニ相似タルノミニシテ
別ニ一種ノ者ナリ

附考 此草ノ名称古人モ能辨スルヲナシ今世ニ

ニ至テ 独度涅烏斯羅別而ノ兩士ハ布立孫斯人
祿鐸樂ハ本條ニマラサル一ヲ辨ゼリ

羅甸ニ列及那布樂質トイフハ即テ曠野女王ノ

義ニノ野生ノ叢花ニ卓出シ美艷壯觀ヲ為スヲ

以テ諸草モ羞色ヲ顯スノ所由ナリ

阜兒末カ立又阜兒末カ立比兒竭ト云是其葉字

兒繆斯ニ似タルカ故也而モ亦哈梨屋毗樂達葉

名名大ニ似テ子龍芽草ノ如シ其形色綴文ハ野

根草ニ似タリ又璣天祀兒鐸ト

名ツク小花多攢簇ノ枝ヲ覆ヒ野羊ノ長鬚ニ似

タルカ故ナ也雪白色後ニ稍鮮紅ニ変ス羅甸ニ

薄兒真葛部樂トイフ業錫理尔蘭杜ニ稀ク璣天

部喇鐸ト呼フ者アレト非ナリ是ハ羅甸ニ葛布

里福カ烏莫ト呼ヌノ也業錫理尔蘭杜ニハ通ノ

柔涅的ト稱スコレニ非ス主療全ク異ナリ

效屈悉烏斯及達樂救斯ハ所謂璣天祀兒鐸ハ一

種草此物ト天ニ異ナリ

孚洛按姪斂ニ葛兒苗緑乙鐸ト稱ス家屋ノ傍

家屋 草

ニ生スルガ故ナリ○熱尔瑪左亞ト遊ル兒ル莫ム高カ樂ラ
鳥ク禿ト呼フ其根蠹シ易キカ故也○喜倫歌ル兒ル志シ
鳥斯ハ必古涅蒙ト云詰厄利亞ニテハノ兒ル姪ル鳥兒ル
姪ガ又ハ兒ル姪ル斯物謁的ト云羅別而ハ意太里亞語ニ
テノ箇祿斯禿法那力亞ト云○按護ビ兒ル樂喇ハ百
天テ質ル兒ル樂ラ末玉兒トシテテ亞兒ル伴質那ノ種類トス
郭留識鳥斯ノ説ニハ意太里亞ノ必莫必涅兒樂
ノ種類トス何則其香氣功用モ亦相近シ此説可
ナルベシ

總説 此草壕澤河傍ノ曠野ニ生ス下湿ノ地ヲ好ム
形状比立扁去洛ニ似タリ其葉亦多簇リアキリモニ龍芽草ニ
似タリ硬ノ周圍ニ鋸齒アリ葉面粗糙ニ皺皴アリ
テノ腦兒ル莫ム暴ボ莫ム葉ニ似タリ葉背白色ヲ帶ス莖直立
ノ高サ三四尺或ハ其餘ニ至ルモノアリ稜アリテ
内空虚赤色微紫色帶フ七八月ニ至テ莖頂ニ多小
花ヲ開キ攢簇ノ穂ヲナス白色芳香比立扁去洛ノ
如シ又六月比花アルモノアリ子ハ小ニシテ曲リ
三四粒相簇リテ一小顆ヲナス根モ微香アリ四方

ハ繁延ス外皮黒色内暗赤色ナリ

附考道傍曠野陰温ノ肥地ニ生ス業謁垣爾蘭杜

拂郎察熱尔瑪尼亞意太里亞等ノ地方ニ於テハ

此草ノ外ニ如此ノ愛好スベキモノヲ見テナシ

○此根長クシテ外皮黒色内黯赤色ニシテ肝臟

ノ如ク香氣烈ク味收斂ニメ「ユエケレシ」斂「ユエケレシ」ノ如シ甚

土中ニ繁延ス

性効性燥ニメ寒且香シキ收斂ノ功アリ

主治此根煎汁トシ或ハ細末トシ赤痢ヲ治ス又池

瀉ヲ止ノ諸下血ヲ療ス○又花ヲ酒ニテ煎服スレ
ハ四日熱ヲ療スル功アリ

附考此草根ヲ服スレハ清涼ニシテ微ニ收斂ノ

味ヲ帶フ故ニ泄瀉下血ヲ止ム○諸家ノ説ニ此

草手ニ接テ掌中或ハ動脈上ニ貼メ瘡疾ノ熱ヲ

除ク○此草能ク痛瘡ヲ治ス○馬ヲ飼フ人此草

ヲ水煎シテ馬ニ與テ腹痛及ヒ蛔蟲ヲ治ス

撰用

附考凡ソ用ユルニ慎テ「トケ」璣「トケ」天部「トケ」喇「トケ」録「トケ」ヲ用ユル

勿レ誤テ用ユレハ大ニ人ヲ害シ尿血セシム

打黎壳留莫

⑤六圖

本編二圖
物印四圖

物印曼九百七十一号
馬号

十六五

茅三章

打黎壳琦莫

一名發尔

名義打黎壳琦莫

羅甸

假聲

後兒別兒

業詞

此草當時本草家必哈繆莫ト名ツクル者アリ此

ハ厄勒齊亞ノ必哈嗽ニメ即チ呂的ヲ去フ也是故

ニ或人ハ琦達捌留斯壳カ斯ト云フ是水呂的又澤

呂的ノ義ナリ一説ニ布設烏度辣後兒後琦一名辣

後兒後琦莫木那箇劣莫ト名ツクルハ根黃ニニメ

大黃ノ如カ故ナリ然レ其根ノ大黃ニ似タルヲ知

ル者ナシ我ハ打黎壳留莫ト名ツクルヲ勝レリト

又是ラ地和思谷里送斯ノ説ニ其葉胡蔓ニ似テ稍

肥大茎ハ呂的ニ香ノ茎ヨリ相ク葉ヲ生スト云リ

是厄勒齊亞人ノ説ナリ今此ヲ見ルニ大打黎壳琦

莫ノ種類ハ葉胡蔓ノ嫩葉ト相似タリ又谷里送斯

ノ打黎壳琦莫ノ條ニ其葉差肥大ニ密著スルヲ斯

的兒缺呂的ノ如シトイフニ相合セリ○厄勒齊亞

ニテハ曾テ打黎壳弄ト名ツケ或ハ打立郭壳弄ト

モイフヲ羅甸ニテハ打黎壳琦莫又打立郭壳琦莫

ナト稱スレト是ハハ部トノ見字ノ大讀ニ

打黎壳^{即チ}琦莫ト称スベキ也

此草大小二種アリ大ニ属スル者各四種小ハ唯一種ノミ

附考

初生本草家ハ種々ノ名ヲ称ス羅別爾ハコレヲ或人ハ呂的ヨリモ粵百ニ似タルカ故ニ布立孫斯ノ丕尔蘭鐸琦莫ト思ヘリト記セリ此ハ忌臭アルトナシ故ニ石淋ヲ治スルニ譽アリ之ニ因テ初生本草家ハ泐石草ト名ツクル也然レ未審ノ考ニメ經驗ナキトナラン

○独乙都ニ於

其根ノ黄色ナルヲ以テ假棘抜兒別兒ト称シ譜

元利亞ニテモ異種棘抜兒別ト称スル也

○或説ニ速比亞第五章熱尔瑪屋亞ニテ物尔撒

綿ト云此ハ古人所謂打黎壳琦莫一名打立郭壳

琦莫ナリ龍姪列曾烏斯ハ別勿兒涅尔十一卷二

以テ真ノ打黎壳琦莫トセリ發聲カ烏斯谷兒述

斯ハ捌姪部婁莫第八卷ヲ打黎壳琦莫ト名ケテ

独度涅烏斯ノ打黎壳琦莫ハ達立郭壳琦莫ト称

スベシト云ヘリ然レ皆謬説ナリ

意太里亞ニテハ此草ヲ「ハ」ハ見ル姪ト末ト兒ト谷トトト稱ス

總說 茅一種 大ト打ト黎ト秃ト增ト莫トハ熱馬瑪屋亞及業錫控

尔蘭杜ノ地方曠野及溝渠ノ傍下湿ノ地ニ生ス苗
高ク二尺餘一莖直立線條アリテ微後内空ニシテ
節間枝ヲナク或ハ綠色或ハ赤色ニ紫ヲ帶モ
アリ葉潤大長岐二缺刻アリテ微鋸齒ヲナス葉面
暗緑或ハ褐色ヲ帶背淡緑莖頂七八月ニ花アリ時
トノ連連アリ莖頂穂ヲナシ各様小葉アリ 皚白色
且爾細色毛状ニ似タリ花後小莢ヲ結フ三稜ニメ

内圓子ヲ含ム冬ニ至テ葉落ツ根ハ黄色ニメ屈曲
横ニ傍延シ春ニ至リ莖末ニ嫩芽ヲ生シ漸ニ繁所
ス

○茅二種ハ產地共ニ茅一種ト同シ其形状モ亦甚
相似タリ但葉小ニメ暗綠色ナルヲ異トス莖圓ニ
ノ稜ナク線條ナシ

○茅三種ハ伊斯巴你亞ヨリ業錫控尔蘭杜ニ將來
ス差高クメ色ク赤色紫ヲ帶フ葉潤大ニメ綠色葉
黄色根繁延スルヲ茅一種ニ同シ香ハ茅一種ヨリ

モ重シ

○茅四種モ亦伊斯把你亞ヨリ將來ス其狀茅一種

ニ同ク花黯紫色ズワヒラヒシ紫莖ノ如シ中心黄葉アリテ老茸

タリ

○茅五種小打黎秃埒莫ハ葉謁瑤尔蘭杜ノ原野又

餘蘭土ノ地方處々山中ニ生ス苗高ク一咫或ハ一

掌半莖葉共々小ニメ柔軟花密著セス葉醜黄色根

ハ細ソク黑色ヲ帶硬シ香モ亦重ク前諸種ト同シ

正恭曰打黎秃埒莫ハ唐松草種類ノ總稱ナリ

茅一種大^{フキト}打黎秃埒莫和名唐松草處々山野ニ自

生ス莖直立ノ高ク二尺許ニ至ル線稜アリ每節

傍枝ヲ分叉シ一枝ニ極一極三葉一葉ニ尖狭長

嫩綠色背淡シ秋ニ至リ莖頭枝ヲ分テ白花ヲ著

ス葉短ク觀ルニ堪ズ又一種黄花アリ黃唐松ト

云是亦原野下濕地ニ生ス葉形同ケレ下狹上

潤根黄色是物印曼ノ打立郭秃埒莫末玉烏斯葛

烏列ウレ按アヒ趨ク祿ル速ソク亞ア烏ウ秃ト斯ス質チ力カ亞ア秃トナリ

茅二種ハ其形狀常ノ唐松草ニ近シ然レ其産地

ト花トヲ異ニス按スルニ本書五種共ニ七八月
ニ花アリ時トメ遅速アリトアレハ彼國ノ七八
月ハ吾邦ノ五六月ニ當ルコレニ遅速アリト云
ハ春秋ノ兩種ヲ槩メ云ナラン唐松草ハ花ヲニ
多シ春舊根ヨリ苗ヲ生シ高サ一尺許圓莖ニノ
細ク線後ナク紫黑色ヲ帶フ葉短小三四月莖端
花ヲ開ク狀剪裁松葉ノ如クノ白色可愛花謝メ
葉青黄色亦花葉ノ如シ後小青莢ヲ結フ後アリ
根亦黄色ナリ

茅三種ハ大唐松ト云莖葉最モ長大ナリ是物印
曼ノ打立郭秃琦莫。拿那田設。亞翅乙列。覆力臘。悉
釋亞秃ナリ
茅四種ハ紫唐松ト云紫花ノ者ナリ莖葉唐松草
ヨリ柔軟差厚シ又白色帶紫ノモノナリ共ニ稀
品ナリ物印曼ノ打立郭秃琦莫。末玉烏斯。斯達莫
爾斯。彪兒彪樂斯。先質爾斯ナリ
茅五種小打黎秃琦莫ハ深山唐松ト云野刈日光
山中ニ産一莖直立唐松草ニ同シテ淡綠色葉ハ

唐松草ヨリ狭長莖頂ニ花ヲ著ス物印曼ノ打立
郭亮埒莫布樂天設覆黎斯論救斯質思謁亮按救斯
質思ナリ今斯ニ四圖ヲ舉テ考證ニ備フ

性効 大打黎亮埒莫ハ中等ノ熱ニ人乾燥ニ似タリ

主療 此物業ハ蔬菜トナシテ食スレハ少シク腹中

ヲ攪擾ノ緩和ヲナス○根ヲ水煎シタルモノハ腹

ヲ攪擾スルノ葉ヨリモ強ク下利ヲ催ス○地和思

谷里込斯ノ説ニ葉ヲ搗キ經久潰瘍ニ傳テ能愈ス

合列釋斯ハ侵蝕ノ功ナクノ能燥ストイヘリ

附考 此草根浴湯トナシテ虱ヲ殺ス○世人此物

ノ花葉根ヲ連子室屋閣中ニ懸テ小兒諸惡疾及

妖術ヲ辟除ス○又此ヲ同ク連子蒸餾シ露水ヲ

取り木綿ニ浸シ金瘡ニ貼テ能愈又潰瘍ニ良也

或此葉一味ヲ用テ及自然汁ヲ取り傳スルモノ亦

妙ナリ○賣藥家ハ此根ヲスルトニリスコワイ黑噴草ニ偽リ貨賣ス

竭犂鼓箇莫

今書一圖
物印四圖

一名兌兌缺兒奇兒

兌兌缺兒奇兒同謁兒鐸樂

烏屈左熱亞瑪沙烏屈箇祿字同葛線箇兒奇兒同歛木

的兒樂里意太捌祿未樂伊亞巴歛未的兒列拂部黎亞

剝兒姪留禿葛莫別謁葛布訥斯亞勸葛布左容同葛布

屈的斯同箇犂達力容同箇力容同末兒末力的斯同

干沓力斯同歛繆斯的兒樂局

和名ヤブケマン

漢名紫葢

布立羅斯ハ羅甸ニテ歛木力亞一名葛布訥斯ト云

第四章

竭犂設箇莫

一名兌兌缺兒奇兒

名義 竭犂設箇莫 爾業竭 杜兌兌缺兒 同 謁兒 鐸樂

烏屈 亞爾瑪沙 烏屈箇 祿字 同 葛線箇 兒 奇兒 同 歟木

的兒 樂意太 捌祿未 樂伊 斯已 歟未 的兒 列 拂即 黎亞

剝兒 妳留 禿葛 莫別 謁葛 布訥 斯大 厄勸 葛布 尼容 同 葛布

尼的 斯同 箇犂 達力 容同 箇力 容同 末兒 末力的 斯同

干沓 力斯 同 歟繆 斯的 兒樂 局藥

和名 ヤブケマン

漢名 紫葺

布立 羅斯 羅甸 二 歟末 力亞 一名 葛布 訥斯 卜云

地煙草ノ義

附考 意太里亞ノ土俗ハ歟木斯^{「ヒモステル」}的兒^{「トル」}訥^{「ノ」}トイフ今業謁^{「ケレ」}理爾蘭^{「セイ」}杜ノ地方ニテハ翳兒^{「ヒール」}鐸羅^{「ドロー」}屈^{「ク」}トイフ此名却テ竭^{「ケレ」}犂^{「レイ」}設^{「セ」}箇^{「コ」}莫^{「ム」}又兒^{「ドイ」}忽^{「コン」}缺^{「ケレ」}兒^{「ル」}苛^{「ヘ」}兒^{「ル」}ノ正名ヨリモ能通ゼリ

此草^{「ドイ」}独^{「トイ」}乙^{「ツ」}都^{「ド」}ニテ翳兒^{「ヒール」}鐸羅^{「ドロー」}屈^{「ク」}ト云羅^{「ロ」}甸^{「ド」}ニテ歟^{「ヒ」}繆^{「ム」}斯^{「ス」}的兒^{「トル」}樂^{「ラ」}又歟^{「ヒ」}末^{「ム」}力^{「ル」}亞^{「ア」}ト云厄^{「エ」}勒^{「レ」}齊^{「シ」}亞^{「ア」}ニテ葛^{「カ」}布^{「ブ」}訥^{「ノ」}斯^{「ス」}トイフ共ニ皆此自然汁ヲ目ニ滴スレハ淚ヲ流スコト眼目ニ煙^{「エン」}源^{「エン」}名^{「ノ」}ノ入タルニ齊^{「シ」}レキ故ナ

リ

正恭曰マブケニ一^{「ヒ」}名紫^{「シ」}華^{「キ」}曼^{「マン」}江^{「カン」}列^{「リ」}ニヤブゼリトイフ大和本草ニハノゼリト云テ堇菜ニ充テリ非ナリ堇菜ハ食用ノ苜^{「モウ」}ナリノゼリハ紫堇ナリ青箱ノ附録陶朱術救荒本草ノ地錦苗モ亦此物ナリ處々陰地ニ生ス秋後舊根ヨリ苗ヲ生ス形状ハ能人ノ知トコロノモノナリ根ハ小塊アリテ蜘蛛ノ状ノ如シ越後ニテハ地藏ノ豆ト云小兒採ラ灸食フ

○此草品類多シド独ド度ド涅ド烏ド斯ドノ未ド夕ド説ド示ドガドルドモ
ノ各ド七ド種ドヲ左ドニ列ドス

第一種 業ド謁ド理ド爾ド蘭ド社ドノ竭ド犂ド設ド箇ド莫ド

一名白花ド翳ド兒ド鐸ド羅ド屈ド

郭ド留ド識ド烏ド斯ド羅ド別ド兒ドニ先生ドノ説ドニハ此草尋常ノ

竭ド犂ド設ド箇ド莫ドノ葉ドヨリモ潤ドクシテ白花ナリトイ

ヘリ又羅ド別ド兒ドノ説ドニ和蘭地方處々ニ多クナレ

ヲ生ス殊ニ部ド樂ド旁ド土ドニ於ドテハ曠野ノ傍ナル林

中ニ生ス又諸ド厄ド利ド亞ドニハ穀田中ニ生ス故ドニ箇

兒ド穉ド亞ド里ドト名ツク其莖長ク屈曲シテ細毛多ク

樹籬ニ附テ生ス全体ノ形状尋常ノ竭ド犂ド設ド箇ド莫ド

ト同シ子ハ黒色ニメ光アリ

正ド恭ド曰ド物ド印ド曼ドノ類ド未ド力ド亞ド彌ド兒ド樸ド沙ド字ド祿ド列ド亞ド兒ド

樸ドノ圖ドヲ舉ドテ參考ニ備フ

第二種 黃ド花ド竭ド犂ド設ド箇ド莫ド

羅ド別ド兒ド曰ド此草暖國ノ山ニ生又此地ニ見ルド稀

ナリ故ニ人好テ園圃中ニ移栽ス其花開クド尋

常ノ竭ド犂ド設ド箇ド莫ドヨリモ遲シ七八月小黃花ヲ開

葉延胡索及白屈菜ニ似テ稀疏灰白色ナリ莖
 ニ著テ生ス莖高サ一掌半根ハ鬚蕪シテ鬚多ク
 根ニ似タリ子莖
 中ニアリテ圓扁黒光マリテ又延胡索及白屈菜
 子ニ似タリ但少キノ是ハ阿質烏斯カ所謂
 葛布訥斯一名設力鐸尼烏莫字樂古密的斯ナリ
 或説ニ哈列釋斯ノ箇犂當カ斯ナリト故ニ能ク
 病犂名箇ヲ治ス味ハ尋常ノ藥見鐸羅屈ニ異相
 似タリ

正恭曰黄花竭犂設箇莫ハ其形狀甚ク黃華曼ニ
 近シ花戸ニ百十鳥ト称ス然レ此物其大毒ナル
 ナリ以テ江列ニハ蛇人參ト上列ニテ蛇殺勞
 列ニテトコエヨボリト云フ故ニ擬免シ難シ此物
 好テ石崖縫間ニ生ス秋後苗ヲ生シ莖葉紫莖ニ
 似テ稍白色ヲ帶フコレヲ按ハ臭氣甚シ花紫莖
 ニ似テ一莖ニ黄色ナリ證類本草言童童黃上化者害
 人ト一即是ナリ物類變ノ圖ニ黄花ノモノニ
 種アリ一ハ欸末力亞悉力救和沙字祿列留的脛ト

云一ハ款末カ亞。陶兒塊根沙字濃黃色列悉花カリ訥ト云

今此二圖ヲ奉テ參考ニ備フ

第三種 白花竭ゲレイセコム犂設箇莫

或人曰字陸標線ヨリ必斯留格耶ト留格ハ行ク道

ニ一種ノ醫兒鐸羅屈フエールドロークアリ白花ヲ開ク形状ハ第

二種ト同シ

正泰曰本邦一種黃牽曼ノ白花ナル者アリ此物甚相

近シ然トモ是亦毒アリ故ニ擬免レ難シ

第四種 直立小醫兒鐸羅屈スガスラケレイマールドローク

羅別兒ロベール曰蘭蚪ランドゥ匱古ノ諸列稀ニ一種ノ竭犂設箇

莫ラ産ス其状甚小ニシテ茎直生高サ一掌

許小葉附著稍ナールノ拿兒ナール姪デケル幼兒ハル奇兒ハルニ相似クアリ茎

葉長ニ白色ヲ帶フ根ハ小ニメ味苦シ○郭留識クワリウシ

烏斯ウス異草譜第六卷三十一章曰此草拂拂即察伊斯察伊斯把

泥亞ニ出ツ其莖高サ一咫許透明ニメ軟ニ尋常

竭犂設箇莫ノ如シ然レ稍勁ク直生シテ葉附著

大葉ハ軟弱ニメ薄ク狭ク缺刻毛様ヲナス尋常

ノ者ヨリ白色ナリ莖末穗ヲナシテ小花攢簇攢簇ス

紫色ヲ帶フ穂モ亦尋常ノ者ヨリ小ニノ花密著
不根ハ細ナ小ナリ全草ノ味苦シ伊斯把泥亞ノ
人ハ羅甸ノ悉姪カ質斯的兒質亞ニ充ツ土俗ハ
即チ捌禄未兒樂又捌樂未那ノ名名ヲ以テ通稱
ス

正恭曰是物印曼ノ款ホカリ亞款兒哈カ新未訥思的
稱乙覆カ亞ナルベシ故ニ彼圖ヲ以テコレヲ補フ

第五種 晏生

第五種 晏生小兒鐸羅屈

前ノ第四種ノ子ヲ和蘭地方ノ園中ニ蒔ケ其

茎地ニ偃ス花鮮紫色子扁クシテ黄色ヲ帶フ

第六種 甘第亞ノ竭犂設箇莫

郭留識烏斯曰一種甘第亞ヨリ將來スル所ノ子

ヲ種テ生スル者アリ此草尋常ノ者ヨリ大ニメ

茎ニ多液ヲ含ミ稜アリテ柔軟地ニ生ル葉小ニ

ノ毛様ヲナスヲ第四種ノ如クニメ勁ハシ七月

比茎不花ヲ出ス或ハ早ク出ルモアヲ長穂ヲナ

シ甚繁密ニノ下垂ス尋常ノ者ヨリ白色ニシテ

穂末灰白色ノ汚点アリ花後子ヲ結テ尋常ノ者

ト同シ熟スレハ速ニ落テ翌年萌芽ヲ発ス

第七種 率黎玄ノ竭ゲ犁レイ設セ箇コ莫

葛カ覓ミ樂ラク律リツ烏ウ斯スノ説ニ此草前種ヨリ柔軟ナリト

イヘリ此種子別爾那兒ニ迹ス思シ捌パ留リウ沓カ釋シツ斯スト云ヘ

ル醫生始テ厄入多ノ地ヨリ設兒セ的テ犁レイ斯スト云ヘ

ル草ノヨシニテ將來セリ此物經年ノ子ヲ種ヘ

テ能生ス又コレヲ種蒔スルニ十年ニノ生セス

翌年ニ至リ芽ヲ發スルノアリ故ニコレヲ種ニ
ルニ上中ニ深キ孔ヲナシ其内ニ子ヲ埋ムバシ
如此スレハコレニ先チテ生スル草ヲ摘ミ取
テモ其年ノ内ノミナラズ翌年或ハ三年ヲ越テ
芽ヲ生スルノアリ又他草ニ如此ナルモノ間
コレアリ

總説 此草殺ヲ病タル後ノ田圃又園中ニ多生ス一
差軟弱ニ細ク多節ニノ膝ノ如ク小枝多シ物ニ
倚ラサレハ他立シカタシ 故ニ常ニ物ニ添テ生ス

葉ハ莖ヲ周リテ互生シ甚ニ細ニノ圓ニ鋸齒アリ
缺刻アリテ胡妥葉ノ如シ莖葉俱ニ白綠色花ハ莖
頂ニアリテ穂ヲナシ紫赤色五月ノ初ヨリ季夏ニ
至ル即チ採收シ乾シ貯フベシ花後莢ヲ結フ小ニ
ノ圓ノ内ニ細子ヲ含ム根ハ細クノ深ク土中ニ入
ル

附考 此子夏ノ圓ニメ暗綠色ナル者ヲ採收ムハ
シ全草ハ春ニ採ルバシ其功最モ強シ自然汁ヲ
収ルモ亦其時ヲ喪トス

性効 此草世人ハ性熱ナリト雖也ト雖也ト全ク然ラ
ス却テ清涼ニメ微燥ヲ兼テ而メ閑達シ體中不潔
ノ液ヲ小便ヨリ驅逐ス

主療

疥癬此物及皮膚

不潔ノ諸瘡或ハ微毒ヲ治ス

何則肝脾ノ不潔及閑塞ヲ除キ周身ノ血ヲ蕩滌ス
又四日熱ヲ治ス○此草ノ自然汁ヲ以テ舍利別ニ
製シ或ハ煎汁トナシテ前ノ諸症ニ用ユ最功アリ
又蒸露トナシテ用ユルモ亦妙ナリ○疥癬ニ牛乳
ヲ以テ煎服シテ甚功アリ春末ヨリ六月ニ至テテ

レヲ用ユベシ○捌鳥留斯謁及淫託曰膽汁様ノ液
ヲ大ニ通利シ肝臟ノ閑塞經久不愈モノヲ療ス又
胃ヲ強壯ニシ大便ヲ通ス○地和思谷里迦斯曰自
然汁ヲトリ脂類ヲ如テ倒睫ヲ治ス其倒毛ヲ拔去
テコレヲ貼スベシ何則此汁ハ能ク毛ノ生スルヲ
拒ムカ故ナリ謁及淫託ノ託ニハ麥田中ニ生スル
ヲ長トス

正恭曰紫葢ハ本草ニ唐太宗天寶單方ヲ引テ唯
大人脱肛ヲ治スルノミ其他ノ功用ヲ擧ズ

附考

謁及淫託ノ種類ハ凡テ人身諸病ヲ療ス

ルノ良薬ニノ先輩コレヲ良品生植ノ中ニ列ス

玉函涅斯愈斯歌曰柔白ノ人春時此草ノ自然汁

ヲ取り舍利別謁列屈緇亞力亞ノ製劑及塊子ヲ製

ス○哈列釋斯布立釋斯ノ説ニ自然汁ヲ目中ニ

滴スレハ視神經ヲ刺傷シ淚眼ヲ致ス故ニ醫兒

鐸羅屈又葛布訥斯ノ名ヲ待タリ○或人説ニ此

草胃ヲ強シ大便ヲ快利ス大便快通セシメント

欲セハ乾ケル者ヲ貯テ毗百葛刺斯桂酒ナルニ

テ潤シ用ユ胃ヲ強セントスルニハ酒ニ水ヲ加

ヘテ服ス○婦人ハ自然汁ヲ取テ毛髮ヲ長セシ

ト生ゼサラシム○此草ニ斯此葛斯別壳居竭莫

別兒薑百的兒設紅毛葱缺兒香等ヲ合メ粘稠

諸液ヲ消化シ膽汁敗黑病ノ諸液ヲ驅逐ス○燻

盛熱及疫熱ニ此子油ヲ取り鳩尾及動脈上ニ塗

テ甚良ナリ

黄花竭犂設箇莫羅別兒曰此物能未熟液ヲ釀

成稀釋シテ小便ヨリ驅逐スルノ尋常ノ者ヨ

ルノ良薬ニノ先筆コレヲ良品生植ノ中ニ列ス

玉函涅斯覓斯歌曰柔白ノ人春時此草ノ自然汁

ヲ取り舍利別謁列屈緇亞力亞ノ製劑及地子ヲ製

ス○哈列釋斯布立釋斯ノ説ニ自然汁ヲ目中ニ

滴スレハ視神經ヲ刺傷シ淚眼ヲ致ス故ニ醫兒

鐸羅屬又葛布訥斯ノ名ヲ得タリ○或人説ニ此

ハ一取ス○新入ハ自然代ニ取スニ當テ来ソハ

ノ且多カラシム又鼻上兩眉間ニ塗テ眉毛ヲ長

クシ相接セシム又毛ヲ抜テ此汁ヲ塗レハ再々

ハ生ゼサラシム○此草ニ斯此葛斯別壳居竭莫

別兒薑百的兒設紅毛芥念缺兒香茅ヲ合メ粘稠

諸液ヲ消化シ膽汁敗黑病ノ諸液ヲ驅逐ス○燉

盛熱及疫熱ニ此子油ヲ取り鳩尾及動脈上ニ塗

テ甚良ナリ

黄花竭ゲール掣設ゲイセ茵莫コム 羅別兒ロバ曰此物能未熟液ヲ釀

成稀釋シテ小便ヨリ驅逐スルヲ尋常ノ者ヨ

リ勝レリ故ニ水腫ニ最モ功アリ又諸内臓ヲ強
クスル一見斯歇カ竭ゲ犂レ設セ菌コ莫ムノ條ニ説ケルカ
如シ又病及腹痛ヲ治スル一甚速ナリ然レ尋常
ノ者ヨリ甚稀ナルニ由テ人最モ貴重ス

白花竭ゲ犂レ設セ菌コ莫ム 按護乙兒樂喇曰此物意太里

亞ニ産ス小便ヲ利スルニ甚功アリ又大便ヲ利

シ且諸臓及胃ヲ強ス○此草單服スルニ害ナシ

且服シ難カラズ然レ其功ヲ助ケンカ爲ニ梅那

蛇減訶子野羊乳乾葡萄等ヲ加ヘ用ス○五月ニ

採收シ乾シ末トナシ蜜水ニテ用レ不レ大便ヲ通

ス○此草水二十四錢ヲ以テ煎シ訶子梅那葉ヲ

加ヘ服メ膽汁様ノ諸液ヲ驅逐ス○膽汁敗黒病

ヲ驅逐スルニハ此草ノ自然汁ニ平竭ゲ兒ル箇コ祿ロ乙

鐸ノ自然汁ニ合シ砂糖ヲ加ヘ舍利別トナシ用

ス○此根味苦疫熱及諸毒ニ共テ甚良ナリ汗ヲ

發シ小水ヲ利シ黄疽ヲ治ス○此子ヲ服メ經久

泄瀉ヲ治ス○此莖乾シ末トナシ頭痛ヲ治ス又

浸淫病ヲ燥シ且蕩滌ス○自然汁ヲ取り眼胞ニ

塗テ赤腫ヲ除ク。○此物ノ自然汁ニ羊蹄ノ自然
汁ヲ加ヘ醋及蜜少許ヲ合シ塗テ疥癬及皮膚ノ
諸瘡ヲ除ク。○此草ノ蒸露ハ微毒ノ人ニ功驗アリ
下劑ヲ用テ後此物ニ底野迦ヲ加テ過服ス梅
ヲ覆テ汗ヲ發スベシ能ク瘀血ヲ蕩滌ス此ル爲
ナリ又疫熱ヲ瘳ス甚功アリ。○此草ノ自然汁一
錢トリス錫率樂根三分錢ノ一ヲ過湯ニテ服シ吐ヲ取
リ水腫ヲ治ス。○自然汁口中ニ含テ牙疳ヲ瘳シ
又齧齒ヲ治ス。○玉函溼斯トリス歎曰希局ニ此草

ノ舍利別アリ前ノ諸症ヲ瘳ス。○竭トリス犂設トリス茵トリス莫トリス丸
モ亦前ノ諸症ヲ治ス又此自然汁ニ訶子トリス蘆薈トリス
葛木トリス左トリスヲ加ヘ丸トナシ肝臟及身體ヲ蕩滌ス

撰脩 缺

附考 意太里亞ノ諸醫ハ狹葉ノ者ヲ稱譽スコレ
ヲトリス孚トリス木トリス斯トリス的トリス兒トリス鐸トリストイフ即真醫兒鐸羅屈トリスノ義ナ
リ是竭犂設茵莫ノ狹葉ニメ香色白カラガル者
ヲ撰ム又潤葉アリ或ハ葉短促或ハ能ミタル者
アリ又花紫碧色ノモノアリ。○製鍊家コレヲ油

及ヒ他ノ製劑ニ造リ用ント欲セハ茎葉花実共
ニ其新鮮ノ者ヲ撰用スベシ經久ノ者ハ功力薄

斯布立禿 本書一圖

第五章 斯布立禿

竭犂設箇莫別種

名義 斯布立禿

百姓斯哈兒力那些 羅甸

今世抹質玉留斯等ノ諸本草家此草ヲ斯布立禿ト
名ツケ而ノ箇犂沓力斯箇祿乙鐸ナリト以爲ヘリ
既ニ哈列稱斯力單味能毒篇第十一卷箇犂沓力斯
鳥ノ主治ノ下ニ論セリ然レ予按スルニ箇犂沓力
斯トイヘル草ハ即前章ノ箇犂達力容ニシテ歟末
力耶一名竭犂設箇莫是ナリ○此草ハ古説ニ布力
稜斯ノ葛布訥斯布力知兒ト名ツクル者ナリ其他

第一種

ノ人ハ百姫斯哈兒カ那些トイヘリ何則前章ノ竭
犁設箇莫ヲ布立様斯ハ葛布訥斯亞兒的樂ト称メ
彼書第二十五卷十三章ニ二種ノ葛布訥斯ヲ舉メ
リ曰第一種ハ百姫斯哈兒カ那些トイフ是丙涅字
天^ニ鶏脚草^トノ義ナリ此草古壁及樹籬ニ生ス葉綠色
枝細カニ分レテ紫花ヲ開ク第二種ハ圓圃或ハ野
邊麥田中ニ生ス形状共ニ第一種ト甚相似ト稍
叢生ス葉甚薄ク軟胡荽葉ニ似テ灰色紫花ヲ開ク
ト是竭犁設箇莫ナリ

總說 此草樹籬曠野及古壁ニ生ス軟弱ナル小草ナ
レ氏竭犁設箇莫ヨリハ高ク至テ細キ小茎ヲ生シ
小葉附者ス葉邊鋸齒ナク細ナル鬚蔓ヲ出ス鈎
ヲリテ物ニ纏フ茎末小白花ヲ開ク微赤ヲ帶フ花
後小莢ヲ結フ内細子アリ根ハ細メ竭犁設箇莫ノ
如クニメ深ク土中ニ入ル全草綠色ニメ微白ヲ帶
ルコト竭犁設箇莫ノ如ク味モ亦相似タリ生時花
時モ亦同シ

性効主療 共ニ前種ト同シ猶諸書ニ載スルカコト

シ〇布立標斯モ亦前種ニ功同シトイヘリ而ノ其

第一種ノ下ニ曰自然汁眼目昏暗ヲ治ス故ニ眼病

諸症ヲ治スル藥劑中ニ入ル又此草ヲ以テ目ニ塗

レハ目ヲ明ニス〇抹質玉留斯曰此草腹痛及疝ニ

甚良ナリ生鮮ナルヲ用ユ或ハ乾シ搗末シ酒ニテ

數日連服ス

第一種掘辣左烏莫 本書一圖

第六章 第一種掘辣左烏莫

名義 掘辣左烏莫 羅甸〇厄 掘辣左容 厄勒 掘辣左和

意太 禄斯 秀留 莫悉 箇左 亞 羅 禄 屈 秀 禄 地 屈 留 亞 太

里亞 斯 秀 兒 建 斯 那 別 兒 熱 爾 瑪 斯 秀 兒 劫 斯 爾 兒 諸 厄

亞 屈 姪 悉 兀 屈 涅 拂 却 必 箇 姪 悉 救 和 那 伊 斯 把 必 箇

別 屈 姪 悉 兀 屈 涅 拂 却 必 箇 姪 悉 救 和 那 伊 斯 把 必 箇

姪 兒 兀 禄 烏 同 葛 辣 百 乙 稱 設 郭 別 謁 偉 魯 花 兒 斯 別

吉 業 謁 羅 吉 爾 蘭 土 偉 魯 花 兒 斯 別 吉 卜 名 兀 八 其 實 鸛 嘴 似 夕 爾 以

テ 此 種 類 ノ 總 稱 ト ス 名 義 ニ 舉 ル 諸 名 ハ 皆 同 又 羅 義 ニ シ テ 鸛 嘴 草 ト 翻 大

旬ニ救留乙那力斯鶴嘴草トモ称シ或ハ稜斯留
 莫救留乙斯トモイフ又亞久斯樹斯壳力斯トイフ
 其他ノ百禄左質斯質力葛掘辣訥掘弄和鳥悉那斯
 壳留莫謁悉那斯壳留莫等ノ諸名ハ皆訛称スルモ
 ノナリ

正恭曰掘辣左鳥莫ハ和名風露草ノ種類ニシテ
 牻牛兒ノ属ナリ風露草ハ苗高六七寸葉形大抵
 毛莖及石龍苽ニ似テ稍薄ク微毛茸アリ然トモ
 缺刻ノ多少淺深等ノ異アリテ其状ハ様ナラス

三四月ノ頃根際ノ葉間小莖ヲ出シ三四花ヲ著
 ス單瓣梅花ノ如シ後小莢ヲ結フ其状ノ嘴ノ如
 クナルヲ以テ此物ノ種類トスルナリ今本者ニ
 舉ル所ノ第一種掘辣左鳥莫ハ櫻風露ニ近シ状
 櫻花ニ似テ鮮紅色ナル者ナリ然レ第一種ハ巨
 圓ナル塊根アリテ的壳シカタシ第二種ハ和名
 ゲンノセウコ第ニ章ノ下ニ詳ニス第ニ種ハ姬
 風露ナリ江列伊吹山ノ絶頂ニアリ葉細缺刻アリ
 花小ニメ紫色ナリ第ニ章ノ圖ニ合ス第ニ種

ハ真ノ瓠牛兒ナリ第九章ノ下ニ詳ニス第五章
ハ郡内風露一花青碧色ナリ第六種ハ紅風露
其花鮮紅ニノ可愛第七種ハ和産未詳第八種ハ
大風露葉大ニシテ缺刻スクナシ

○今此條ニ説トコロノ第一種傳粵花兒斯別吉ハ
羅甸ニ攝棘居烏莫納別兒率莫ト称シ又攝棘居烏
莫皮兒樸率莫トモイフ是其根圓塊ヲナスノ義也

○地和思谷里迭斯ノ説ニハ二種ヲ舉ク第一種ハ
根塊ヲナシ又一種ハ葉末留物類ニ似タルモノナリ

今此章ニ於テハ第一種ノミヲ記ス

附考 郭留識烏斯ノ異草譜第五卷十一章ニ塊根

攝棘居烏莫二種ヲ舉ク

○第一種 攝棘居烏莫皮兒樸率莫

正恭曰皮兒樸率莫ハ根圓球ヲナレテコレニ細

鬚ヲ多著スルヲ云フ

○第二種 攝棘居烏莫訥譯率莫

正恭曰訥譯率莫ハ根塊節ヲナスモノヲ云フ

總說 此草斯刺忽居亞亞爾拔居印及其他東方ノ諸

國荒蕪ノ地ニ生ス独^レジ都^レ蘭^レ杜^レニハ下^レ種^セカレハ
生^セス其^レ莖^細クシテ圓^ク少^ク枝^{アリ}テ一^根ヨリ
叢^生ス葉^花花^涅字^亮毛^莖石^龍ニ似^テ多^岐缺^裂アリ
又^ア亞^ア涅^子木^涅和^名一^ノ類^ニ似^テ大^ナリ夏^月枝^頂ニ
花^ヲ出^ス鮮^紅色^ニノ小^羅茲^建斯^花ニ相^似タリ花
後^狭長^{ナル}尖^刺ヲ結^フ狀^鶴及^鶴嘴^ニ似^タリ根^ハ
巨^圓ナ^ル塊^{アリ}少^ク鬚^{アリ}

附考 第一種 搗辣 左烏皮兒 樸率 莫

此草 茅那瑪 尔加 多シ其根塊球ヲナシ上ニ至

テ甚^細長^{ナル}鬚^少クアリ莖^高サ一^尺半^節アリ
根^節共^ニ微^赤ヲ帶^フ每^節二^葉ヲ出^ス長^キ小^莖
ノ先^ニ附^キ分^レテ五^岐ヲナス葉^邊鋸^齒アリ葉
ノ本^ノ節^{ヨリ}五^尖ノ小^葉ヲ出^シ莖^頂ニ花^{アリ}
羅^茲塊^ノ類^ノ如^ク小^莖ノ頂^ニ攢^簇シ五^出紫^赤
色^其狀^青花^儔粵^花兒^斯別^吉ノ花^ニ似^テ小^ナリ
○ 茅二種 搗辣 左烏 莫訥 譯 率 莫
此草 斯刺 忽 亞 產^ス其^葉根^際ヨリ出^フ硬^ノ
深^缺刻^{アリ}テ五^岐ヲナス葉^間二^三莖^ヲ出^ス高

サ一尺許軟ニメ灰白微紫ヲ帶フ節膝ノ如ク每
節二葉相對ス此葉三歧ヲナス節中ヨリ小長茎
ヲ出シ二花擲著ク花五出花瓣亦少缺刻アリテ
未留物^{トリス}花ノ如シ紫色ニメ微暗色ノ縷アリ中
心赤キ心葉アリ葉頭分裂シテ五歧ヲナス花後
變シテ長嘴様ノ状ヲナシ内ニ子ヲ含ミ熟スレ
ハ自裂ス根塊アリテ閉節ノ如シテ鬚根アリ
五月ニ花開キ終夏絶ハズ秋ニ至リ實ヲ結フ此
草茎ノ本ニ鬆疏ナル節アリ九月十月ノ比ハ殊

根上ニ多シ或ハ枝ニモ有之其芽一種ト異ナル

所ハ郭留識鳥斯ノ圖ニ依テ詳ナリ此草ハ原來

布樂的亞鳥ヨリ郭留識鳥斯へ圖ニ送リレ所ノ

モノナリ

性効 傳^{トリス}粵^エ花^ル兒^ス斯^ス別^ス吉^スノ種類ハ其性温ナリ根ヲ以

テ要トス

主療 地^ス和^ス思^ス谷^ス里^ス迭^ス斯^ス曰此根食品トナシテ良ナリ

又子宮潰瘍ヲ消スル酒ニテ一錢ヲ服ス○布^ス立^ス糕^ス

斯^ス曰此根症ニ從テ用エレハ氣カラ再復スルコト

是妙ナリ勞瘵ヲ治スルニ此物一錢酒四十八錢ヲ以テ服スル一日二次

附考

斯刺忽尼亞國ノ婦人流水ヲ以テ此草ヲ煎

シ額ヲ洗ヒ滓ヲ取テ額ニ貼シ後其滓ヲ前ニ汲

タル處ノ流水中ニ棄テ、頭痛ヲ治スルコト妙

ナリ○此根汁ハ耳病ヲ治ス○此子胡椒沒藥ニ

合シテ服スレハ箇祿莫綿後兒斯項領ノ枉ヲ治

ス

第二種 掘棘左烏莫 本書 一圖

第七章

第二種 掘棘左烏莫

名義

掘棘左烏莫 箇留莫 彌釋莫 羅百斯 箇留莫 彌釋

斯同

沙烏 攸霏 猶子 熱爾瑪 斯葛兒 堙兒 葛樂烏 柁同

虛度 姪必 掘恩

拂即 兒忿 字柁 爾蘭杜

和名 ゲンノセウコ

漢名 牻牛兒一種

按ニ此草前説地和思谷里迭斯ノ第二種ノ掘棘左烏莫其葉末留物ニ似タルトイヘル者是ナリ

附考

翁加里亞人ハ兀力亞箇列莫ト棘不是レ備

粵花兒斯那掘兒 鶴爪草ノ義ナリ

○百斯箇留莫獨釋斯トバスココトモトビニスハ即トクイヘンテト兌ト念ト字ト悉ト鳩ト脚ト草トノ義
ナリ是ト一種草ノ名ニト巴爾西亞ニ出ツ物シテ
亞細亞諸洲處々ニ生ス末卷ノ附録ト亞木ト總ト莫トノ
條ニ於テコレヲ記ス

總說

此草熱爾瑪屋亞ノ地ノミニアラズ他邦處々
道傍不耕ノ地ニ皆有之其葉圓クコレヲ摩スルニ
柔軟ナリト小末留物ト葉ニ似テ小サク白毛茸アリ
葉辺鋸齒アリ莖長サ一咫或ハ二咫許細クシテ又
微毛アリ地ニ安生ス葉ハ莖ヲ覆フ夏月莖頭小花

ヲ開ク微紫色花後小莢ヲ結フ尖ニノ鶴頭ノ如シ
先硬ノ刺ノ如シ根ハ細シテ鬚多シノ
又一種ト掘辣ト屋ト烏ト莫トノ種類ニシテ葛兒ト設ト和樂ト力ト烏ト
斯ヨリ抹質玉留斯ニ送ルモノアリ此草蒙ト亮ト卑ト爾ト
カ意ト爾ト斯トノ地處々ニ自生ス其莖節ヲナシテ柔毛
茸アリ枝多分テ地ニ安生ス末留物ノ如ク葉亦似
タリ然レ其莖稍長シ莖頂小花ヲ開ク紫赤色其狀
長シ花後長尖刺實ヲ結フ鶴嘴ニ似タリ根細クシ
テ長シ

正恭曰ゲンノセウエ一名梅鉢草處々原野ニ多
 シ莖軟弱ニメ直立セズ地ニ蔓テ横ニ繁行ス紫
 黒ク帯テ葉互生ス形石龍苳ニ似テ圓ク缺刻淺
 毛茸アリテ光澤ナク黒斑點アリ葉間花アリ
 五瓣ニメ單瓣梅花ノ如ク淡紫色又深紅色或ハ
 白花モアリ實ハ尖テ稍鳥嘴ニ似タリ熟スレハ
 莢迸裂シ上ヘ反テ五尖ニナル此物下痢ヲ止ル
 ニ効驗アルヲ以テ驗ノ證據ト名ルヨシナリ是
 土佐ノ民俗ノ方ニシテ香川太冲ハ牛扁コレヲ

九ト名ツケテ用ヒタリ然レ牛扁ニ充ルハ非ナ
 リ藥用ニハ白花ノ者ヲ長トス是亦牛兒ノ一
 種ナリ

附考 獨度濕鳥斯ノ此章ニ於テ葛兒設樂カ鳥斯

ヲリ抹質玉留斯ニ送ルトイフモノハ是羅別兒
 ノ所謂搦練屋鳥莫末樂箇乙姪斯トイフ者ニメ
 卽末留物亞屈質荷葛刺按別吉葵樣鶴嘴トイヘ
 ルノ義ナリ此草蒙尓尓力意爾斯ノ城郭ノ辺

及街中二三里外内ノ地ニ多シ其草莖葉柔軟ニ
 ノ地ニ安生スル^ト末留^ト物ノ如ク長クシテ
 色ナリ花ハ第一種ヨリモ大ニ淡紅色花後
 様ノ實ヲ結フ然レ短シ根ハ紫莖ノ如シ

○圓葉斯的煙偉粵花兒斯別吉

法備烏斯箇留莫那ハコレヲ掘練^ラ居烏莫亞兒^{アル}的^ラ
 留莫撒吉撒質列^レ祿屯^ニ地覆力烏莫^ト稱ス其形状
 兒念^ト孚^ト杪^トニ彷彿タリ根黃色葉小莖アリテ圓ク
 光アリテ糙滑ナラス但白毛茸覆ヘリ圓圓クメ
 破裂アリ莖赤色ニシテ白ク長ク一尺許地ニ
 安生シ花葉ヲ著ス前種ヨリ小ナリ花初赤シテ
 後淺青蓮色ニ變大後短キ嘴樣ノ莢ヲ結ト小子
 アリ開裂スレハ子落ラ粗糙

性効主療 地和思谷里迭斯曰此物古昔ハ嘗テ藥用

ニ供スルナシ今世ノ醫家腹中絞痛腸鳴ヲ治シ

且諸浴劑ニ用テ最モ良ナリトイヘリ

附考 兒愈字ハ腎痛ヲ療シ結石ヲ治ス又能ク

金瘡ヲ治ス蒸露トナシテ服用スベシ ○布立糅

斯曰此草白酒ヲ以テ飲メハ婦人崩血ヲ止ム

第三種攝棘尾鳥莫 本書 一圖

第八章 第三種 攝棘尾鳥莫 祿部列托子箇祿シ鐸

名義 劣別兒達 羅祿別兒質奇兒拔 同劣布列托子葛

樂鳥禿 熱爾瑪 悉葛兒天葛樂鳥禿 同 缺列印斯箇兒

物兒子 同 祿部列托子箇祿シ鐸 業謁埕 爾蘭社

和名ヒノフウロ 漢名拖牛兒一種

柳兒カ鳥斯ハ奇兒拔祿別兒質亞那ト云フ我輩ハ

攝棘尾鳥莫祿別兒質亞釋莫トイフ

或人ハ此草ヲ以テ地和思谷里迭斯ノ第三種ノ悉

姪力質斯トス何者彼カ厄勒齊亞本草ニ曰第三種

悉姪力質斯ハ古壁及葡萄圃ノ邊ニ生ニ根際ヨリ
 多ク葉ヲ生ス状胡蔓葉ノ如ク茎一咫許軟弱滑澤
 ニシテ白色ヲ帶フ又微赤ヲ帶ルモアリ花赤色ニ
 ノ味苦粘氣ヲ帶フ古ノ本草家葛樂的法斯ハコレ
 ヲ倭樂郭廳亞ト名ツクトアリ祿部列托子箇祿ト
 鐸モ其葉缺兒奇而ニ甚近ク又胡蔓葉ニモ差相似
 タリ然レ其枝莖花実全ク異ナリ混同ス可ラス

附考

祿部列托子箇祿ト鐸ハ熱爾瑪尼亞ニテハ
 二種アリトイヘリ而メ彼因ノ方言ニ部留物兒

子ト云フ即部婁鐸箇祿ト鐸ノ義ナリコレヲ羅
 甸ニ算救ト納力亞ト云フ一種ハ全綠色ナリ彼
 人コレヲ物ト部令ト北生トス一種ハ赤色ナリコ
 レヲ綿令ト杜生トス
 算救ト乙納力亞ノ名ハ即チ部婁鐸箇祿ト鐸ノ義
 又部婁鐸縛兒ト的血根ノ意ニメ此草ノ一名目
 ナリ是葛榮年付ト疑トラクハ葛樂按發兒ト斯ニ作
 年付ト不トノ種類ナルト知ベシ熱爾瑪尼亞
 斯ト兒建數納別ト而ト名ツク又哈樂質亞題一名

護的斯哈納ト神惠草ト稱ス翁加里亞人ハ法里

鳥刺部ト云フ是葛榮ト僊ト付ト禿ト鴉脚草ト義ナリ

其葉薄ノ缺刻アルライフナリ是故ニ掘棘ト居ト鳥

莫箇力ト按ト姪力ト覆立鳥莫ト名ツクト次條ノ真ノ偉

粵花兒ト斯別ト言ノ別種トス

△正恭曰熱爾瑪ト居ト人ト祿部ト列ト托ト子ト箇ト祿ト乙ト鐸トニ

二種アリトノ其一種全綠色ノ者ト北生トスト

イフハ直ニ此条トエトルト林奈斯ノ説ノ掘棘ト居ト

鳥莫祿別兒ト質ト垂ト釋ト莫ト即トチト祿別兒ト子ト箇ト祿ト乙ト鐸トナ

リ此草改羅巴洲ノ北方石地ニ産スルノミナラ

ス又彼別ノ正中及南方垣墻砂石荒蕪ノ地ニモ

コレアリ紫謁堉爾蘭杜ノ各處ニコレヲ將來ス

是一種ノ小草ナリ葉鱗様ニ三裂シ又齊列ナラ

ス五ニ分裂ス滑沢又糙淡或ハ微赤ヲ帯フ葉ハ

平尖ニノ毛茸アリ五瓣ノ花ヲ發ス淺青蓮色又

白花モアリ全草臭氣アリテ山羊ニ似タリ其性

他ノ種類ヨリ勝レリトアル是ナリ又一種

赤色ノ者ヲ壯生トストイフハ是彼説ノ算救ト乙

涅烏莫即下部要鐸缺歷烏力屈偉卑花兒斯別吉
是茅十一章ノ掘棘屋烏莫蒙達釋莫
後章ノ下ニ於ラ辨スベシ

總說 此草古壁及垣墻ノ傍古屋枯木根株等ノ邊陰
濕ノ處ニ生ス莖高サ一尺半許直立シテ圓ク節ア
リ大抵微赤ヲ帶テ微毛茸アリ每節葉ヲ生ス葉ハ
缺刻鋸齒アリテ去而歷缺兒奇而又彌兒カ斯葉ニ
似テ小ク微赤ヲ帶フ微毛茸アル最モ缺兒奇
ニ似タリ四月ヨリ季夏ニ至テ莖頂小花ヲ開ク五

瓣紫色花後尖莢ヲ結フ鶴嘴ノ如シ根鬚多シ冬ヲ
經テモ凋ニズ青色ニノ寒ヲ畏レズ香氣重シテ佳
ナラス

性効 性微清涼ニシテ淨除シ且收斂ヲ兼ヌ

主療 金瘡及乳房陰部ノ潰瘍ニ最モ良ナリ又諸出

血ヲ止メ下血ヲ療ス○地和思答里透斯コレヲ莖

三種悉姪カ質斯ノ條ニ説テ曰此草諸出血及金瘡

ニ貼メ能ク瘡スト

附考 偉卑花兒斯別吉ノ諸種類ハ金瘡ニ用テ最

モ神授ノ功驗アルヲ以テ獲督攝納ト神惠車ト
稱シ今時ノ醫專ラ稱讚シ用エルナリ是我輩ノ
祿部列レ杞子ツ茵コ祿ロヒイ鐸ドノ種類ヲイフナリ○銀工
外科コレヲロ邏斯ノ諸症ニ用テ功アリ○ト獨トヒ都
蘭ラ工ドノ收人祿部列レ杞子ツ茵コ祿ロヒイ鐸ドノ一種赤色ナ
ル者ヲ採テ水煎シ諸獸類ニ飲シメテ尿血ヲ止
ム故ニ部ト毒ト鐸ド茵コ祿ロヒイ鐸ドト名ツク此物功カ最ニ勝レリトス又此根水煎ノ
服スレハ下血ヲ止ム○精神驚怖シ易キ者此根
ヲ服シテ能神氣ヲ鎮ム○ブレカク癩病及ヒ結石腎痛ヲ

療ス又人心ヲシテ悅懌ナラシメ心志沈重ヲ治
ス奇効アリ○潜思勤學ノ人心中鬱結頭腦重キ
等ノ諸症ニ此自然汁ヲ朝暮ニ服メ頭腦中ノ疾
ヲ除キ且強壯ナラシム○少年ノ時ヨリ日々此
自然汁ヲ服スレハ長生ナラシメ且諸疾病ヲ除
ク人ヲメ神志沈重憂鬱セカラシメ且智ヲ益ス
○此草及葉ヲ長服セント欲セハ乾シ末トナシ
用エベシ○高墜打撲此根ノ自然汁ヲ服メ能ク
凝血ヲ解ク○打撲音腫ニ自然汁ヲ以テ軟膏ヲ

製レ用ユ乳房硬腫ニ亦良ナリ○身體斑痕黑痣
ニ葉ノ自然汁ヲ絞リ服ス又雀斑ヲ除クニハ内
服外用共ニスベシ此草多用レハ皮膚清潔滑澤
ナラシム○花モ亦前症ヲ治ス○此草ノ蒸露ヲ
以テ洗フ片ハ支節困難ケイラクケイヲ治ス又飲服ノ痘瘡微
毒ノ熱ヲ解ス○此草心脾ノ動氣ヲ除ク其部ニ
貼レテ甚効アリ或ハ油ニ製シシレテ塗ル○瘍
腫ニ此子ヲ以テ鷄子白ト同煮テ貼スレハ速ニ
消ス

△正恭曰林奈斯ノ説ニ此草外部損傷ニ名譽ノ
良薬トス糊劑トナシ又蒸薬トナシテ外貼スレ
ハ殊ニ功アリ或ハ水ヲ以テ用エル片ハ暹斯病名
大ニ熾熱スル者ニ與テ腫ヲ消ス又水ニ浸シ或
ハ酒ニ浸シテ唇裂及乳房ノ裂タルヲ治ス是レ
血ヲ止ルカ為ナリ或ハ敗血病及カシケルニ用テ甚ク
貴重セリトイヘリ

第九章 一圖

第九章 第四 | 攝棘左鳥莫

名義 攝棘左鳥莫 羅甸○厄 傳專花兒斯別吉 業錫堙
爾蘭杜

諸邦ノ稱呼ハ第六
章名義ノ下ニ載ス

和産未詳

漢名 攝牛兒

此物業錫堙爾蘭杜ニ專ラ單稱スル所ノ本原ノ傳
專花兒斯別吉ナリ是其刺莢ヲ結フ「ワイユハールスベキ 鶴嘴ニ似
ルヲ以テナリ

法歴カ鳥斯告兒述斯ハ率必稱莫ノ名ヲ附接ス是
安生ノ義ナリ故ニ独ニ都ニテ箇祿ヒ扁姪傳專花
コロイペンラ
リヤクシテ

児斯別吉ト云フ他ノ諸種ト分クニカ為ナリ然レ
第二ノ兎忽付杓モ亦地ニ布ラ安生ス故ニ此説穩
ナラズ

傳粵花児斯別吉ノ種類ヲ攝録左鳥莫ニ充タルハ
布立糴斯ノ説ナリ而ノ彼書第二十六卷十一章ニ
此草ノ呂類ヲ擧タル下ニ攝録左鳥莫ハ彌兒カ斯
又迷兒杓犂斯トモ名ツク其形失鳩達ニ似テ葉小
サク莖短ク圓シ香味最モ愛スベシト見ヘタリ然
レ此草ヲ厄勅奇豆ノ彌兒カ斯トノ傳粵花児斯別

吉ニ充ルハ未夕考察セサルモノナリ

附考麝氣傳粵花児斯別吉

布立糴斯ノ彌兒カ斯ナリ羅甸ニ祿斯杓劣莫失
谷森亞久斯鐵木斯曼達尋常和弗飛失納劣莫尋常攝録左鳥
莫木斯曼鐵糾莫トイフ佛郎察ニテハ別郭姪失
兀屈涅線旦杓壁繆斯郭トイフ

○尋常各香傳粵花児斯別吉

羅別而ハナレヲ布立糴斯ノ彌兒カ斯ナリトイ

ヘリ

△正恭曰林檎斯ノ併説スル所ノ三種ノ掘辣^{トケ}斤^ト
 烏^ウ莫^モアリ其一ハ掘辣^{トケ}・禄^{ロク}木^キ釋^{シユ}莫^モト云フ即邏瑪^{ロマ}
 ノ産ナリ小茎數差ニノ花五^イアリ葉ハ鱗^{リン}様ニ
 ナ缺刻^{ケツ}アリ花茎根際ヨリ出ツ其二ハ掘辣^{トケ}・尖^{セン}
 鳩^{トウ}達^{ダツ}劣^{セツ}莫^モトイフ細葉ノ者ナリ小茎數花ニシテ
 花五^イ葉^{エフ}鱗^{リン}様ニノ缺刻淺シ茎ヨリ小枝ヲ發ス
 其三ハ掘辣^{トケ}・木^キ斯^ス憂^ウ絀^{セツ}莫^モトイフ芳香ノ者ナリ
 小茎數花ニメ花五^イアリ葉鱗^{リン}様ニノ缺刻アリ
 此三種ハ共ニ其葉樹葉ノ状ニシテ

野生^{キョウ}独^{ドク}而^ニ歷^レ缺^{ケツ}兒^ニ奇^キ身^ニニ似^ニタリ其一ハ邏瑪ノ石
 地ニ生ス花茎根際ヨリ生シ多枝ヲ分叉ス其全
 茎ナキニ依テ二種ノ者ト異ナリ其二ハ一種ノ
 野^ノ草^{クサ}ニノ政^{テイ}邏^ロ巴^バ諸^{シヨ}列^{レツ}我^ガカ地方^{トコロ}布^フ禄^{ロク}幸^{コウ}温^{オン}ノ砂
 土堤傍或ハ路旁沙石アル圃中ニ多ク生ス其花
 醜^{ウシ}赤^{セキ}色^{シキ}ナリ或人保兒^{ホウニ}歷^レ莫^モノ林中ニテ白花ノ者
 ノ觀^ミタリ彼處ニハ多品類アリ大ナルモアリ又
 委^ウ生^シノ茎ニ尺許ノ長サナルモアリ然^シモ大抵ハ
 甚^シ矮^チ小^コニメ低^シコレヲ鶴^{カズ}嘴^ヅ又^{マタ}鶴^{カズ}首^{クビ}ト名^ナクルハ

其ニ香氣ナシ

子莢ノ状甚似タルニ由テナリ或ハ花ニ星点
ルモアリ其他ニハナシ其三八芳香ナルヲ標的
トス歷反土ニ自生ス独乙都蘭土ニモ偶自生ア
リト雖元發而歷兒君ハ甚稀品ノ者ニノ他邦ノ
産ト考究セリ其後名譽アル我爾的兒ハ業謁垣
尔蘭土ノ内葛榮年撲兒屋ノ田圃ノ堤ニ於テ見
タリト按ニ祿末釋莫ハ附考ノ無香偉粵花兒斯
別吉ナリ失鳩達劣莫ハ本條ノ真偉粵花兒斯別
吉ト木斯ト莫トハ附考ノ爵氣偉粵花兒斯別
ノ一種ニノ第ナ一章第ナ七攝辣屋烏莫ナリ

吉ナリ本條本原ノ攝辣屋烏莫ハ和産未詳按ニ
周憲王救荒本草曰瓶牛兒苗又名鬪牛兒苗生田
野中就地拖秧而生莖蔓細弱其莖紅紫色葉似蓆
萎葉瘦細而稀疏間五瓣小紫花結青膏莢兒上
有一嘴甚尖銳如細錐子狀小兒取以為鬪戲葉味
微苦救饑採葉燂熱水浸去苦味淘淨油鹽調食
是ハ其形状甚能相合セリ又伊吹山ノ姫風露モ
亦相近

總說

此草平地道傍及曠野圃畔乾燥ノ砂地ニ多ク

自生ス湿地ヲ惡ム莖葉共ニ地ニ安生シ甚繁衍ス
葉ハ狹長ニメ薄ク鋸齒多ク岐アリテ胡荽葉ノ如
ニメ小ナリ一莖ニ附著ス莖長ノ枝ノ如シ赤色微
毛茸アリ莖頂ニ小ニメ潤ガレル冠狀ヲナシ夏ヲ
終ルニテ小花ヲ開キ微曲リ撓ミタル小莖ノ上ニ
六七花攢簇ス小ニシテ赤色五出花後小珠ヲ結フ
尖ヲ嘴ノ如ク其本ニ各囊狀ノモノアリテ内ニ長
小子ヲ含ム根ハ白色柔軟ニシテ細シ深ク地中ニ
入ル葉ハ冬ニ至テ凋ニス

附考 藟氣 偉 粵 花 兒 斯 別 吉

羅別爾曰此草兒忽付亮ニ似タリ他ノ種類ニ比スハ六
品ナリ莖軟弱ニメ一小根ヨリ叢生ス毛茸アリ葉間中間
綠色野胡蘿蔔地榆又失鳩達和名ドクゼリニ似テ白印花
兒葉ノ如クニ羽翼狀ヲナス莖頂ニ小紫花ヲ開
ク花謝ノ嘴ノ如キ莢ヲ結フ狀屈曲シテ鸛頭ノ
如シ又細長鍼ニ似タリ故ニ俗ニ亞久斯アキス米斯葛ミスカ
達トイフ是藟氣アル鍼ト云フ義ナリコレヲ手
ニテ按トキハ香甘ノ藟ノ如シ朝夕ハ最モ甚シ

○尋常無香ノイニル傳ス身ス花兒ス斯別ス吉キ

此草前種ニ全ク相似テ香氣ナキノ葉ハ前種

ヨリ小ニメ茎赤色ヲ帶フ花モ差相似テ紫赤色

ナリ○此一種白花ノ者アリ按ト土物ト爾邊トノ地方

沙地ニ多シ前種ニ甚相似テ美麗ナル小白花ヲ

関ク

性効主療 今世其功カラ詳ニスルモノナシ然トモ

微清涼ニシテ燥且收斂ヲ兼ヌ故ニ金瘡出血ヲ止

メ諸瘡ノ壞膿ヲ防ク

附考 麝氣ヲル者ハ利尿ニ甚効アリ

△正恭曰林奈斯ノ説ニ「モ」木斯「カ」莫「ム」ハ其性最モ

酸收ナルヲ以テ醫藥ニ供ス是以金瘡ノ良藥ト

ス或ハ驅除ノ功用勝レタルカ故ニ

ルテラ記セリ

ク 「ト」 「シ」 「テ」 「キ」 「ク」 「ト」 「モ」 「ト」 「モ」 「ト」 「モ」

第十章

本書二圖
物印六圖

第十章

第五攝辣斤烏莫

昔花薄的兒部蔓莫

第六全

赤花薄的兒部蔓莫

名義

攝辣斤烏莫拔達樂悉和乙姪斯羅甸○厄

二種共ニ通ノ攝辣斤烏莫拔達樂悉和乙姪斯ト称

ス是薄的兒部蔓莫樣偉奧花兒斯別吉ノ義ナリ其

攝薄的兒部蔓莫毛莖石龍ニ似テ花實ハ偉奧花兒

斯別吉ト同シキヲ以テナリ

第五攝辣斤烏莫拔達樂悉和乙姪斯布力繆莫

甸羅

和名クニナイフウロ

漢名牻牛兒一種

是其青花ナルモノナリ今人ハ羅甸ニ樂縵久留斯。

果劣歷鳥斯ト称ス是音薄的兒部蔓莫ノ義ナリ又

蘇拉悉鳥斯ハ熱爾瑪左亞語ニテ護知哈納尕ト呼

フ

第六種一極辣厄鳥莫拔達樂悉和乙姪斯亞兒的劣

莫羅

和名ベニフウロ

全前

是其赤花ナルモノナリ今コレヲ羅甸ニ樂縵久留

斯劣別兒ト称ス是亦赤暴的兒部蔓莫ノ義ナリ又

羅甸ニ亞久斯木斯葛達ト称ス塊根備粵花兒斯別

吉ト同名ナリ其形状花色相似タルヲ以テナリ

附考 郭留識鳥斯及諸本草家ノ所說ノ前種ニ相

近キ種類五品總說ノ下ニ舉之

總說

此草兩種共ニ野生ニシテ森林曠地ニ生ス山地ヨ

リハ平地ニ多シ園圃ニ栽テモ亦繁茂ス

○第五種青暴的兒部蔓莫ハ圓莖微毛アリテ叢生

直立ス葉ハ深缺刻アリテ邊鋸齒アリ野生暴的兒

部蔓莫石龍ニ甚相似タリ根際ヨリ上赤色ニシテ

夏月茎頭花アリ暴的兒部蔓莫ニ似テ青色花後小

莢ヲ結フ中心細刺ヲ出ス鶴嘴ニ似タリ内ニ子ア

根ハ微巨ク鬚多ク縮著ス

○第六種赤蔓的兒部蔓莫ハ前種ニ相似テ葉小ナ

リ花全ク鮮紅色或ハ芬芳齷ノ如キモノアリ根ハ

繁延シテ鬚多シ

性効主療 此草二種共ニ醫藥ニ供スルナリナシ○欬

托悉烏斯曰此青花ノ者ハ金瘡ヲ愈ス一最正功驗

附考 熱爾瑪屋亞ニ所謂護督掘納姪ノ名義ハ独

シ都蘭土ニ於テ青花薄的兒部蔓莫ヲ諸般ノ病

ニ用テ神授ノ功驗アルヲ以テ名ツクルナリ即

前ノ芽八章ノ附考ニ説トコロナリ

今爰ニ附録スル所ノ郭留識烏斯羅別兒等ノ諸

品モ青花薄的兒部蔓莫ノ缺乏ニ備テ金瘡損傷

ニ甚功アルモノナリ

備粵花兒斯別吉ノ別種

○第一種 暗赤花備粵花兒斯別吉

羅甸ニコレヲ掘^ト辣^ラ屋^ニ烏^ム莫^ム拔^バ連^ラ樂^レ悉^シ和^ハ乙^イ姪^デ斯^ス字^フ
祿^ロ列^レ彪^ロ兒^ル祿^ロト称^ス斯^ス低^ル爾^ル末^ニ而^ル屈^ク土^トノ山中森林
ノ傍ニ生ス一根叢生シテ高^ク一尺半^ニ茎^ノ勁^ククメ
節^ノアリ綠色ニメ血色ノ斑点^{アリ}アリ微毛^{アリ}テ粗
糙^ニ一二枝^ヲ分^テ。^{六月ニ}茎^ノ頭^ニ每^節小長^ク茎^ヲ出^シ上^ニニ
花^ヲ開^ク五^瓣ニメ鋸^齒アリ他^ノ偉^ク粵^ク花^ノ兒^ル斯^ス別
舌^ニ異^ナナリ暗^赤色ニメ微^黒ヲ帶^フ中心^ニ藁^マリ
ル藁^マリ内^ニ小^刺ヲ出^ス花^後尖^{タル}莢^中ニ灰^褐
子^{アリ}熟^{スレ}ハ莢^自カラ開^テ卷^縮ス根^際ヨリ

葉多ク叢生ス大ニノ柔軟粗糙ナリ葉邊纒條多ク甚ク本條ニ似タリ葉附ノ處ニテ五六ノ深缺刻アリテ葉邊ニモ亦鋸齒アリ又枝附ノ節コトニ小葉ヲ著ス根際ノ葉ヨリハ小ナリ或ハ缺刻ノ處ニ黒点アルモノアリ根大ニノ甚ク巨ク赤色節アリテ細根ヲ別テ年々苗ヲ生ノ繁茂ス國中ニ栽ルモノハ五月ニ花アリ何ノ頃ヨリカ此種子業謁垣爾蘭社ニ渡テ今最ニ多シ荷斯天祿以吉ニ於テハ野生ノ者モ五月ニ花アリ

△正恭曰是物印曼ノ攝辣屋烏莫拔達樂悉和シ姪斯設乙兒發斯質力斯ナリ林奈斯ハコレヲ攝辣屋烏莫設乙兒發質訶莫トイフ共ニ森偉粵花兒斯別義ノ義ナリ都姑兒濕復兒督ハ攝辣屋烏莫拔達樂悉和シ姪斯覆立和亞骨屋質トイフ是烏頭葉偉粵花兒斯別吉ノ義ナリ今物印曼ノ圖ヲ舉テ參考ニ備フ

○第二種 紫赤花偉粵花兒斯別吉
郭留識烏斯コレヲ羅甸ニ攝辣屋烏莫拔達樂悉

和乙姪斯亞兒的留莫未釋斯ト稱ス此草モ亦斯
 低爾末而屈土及翁加里亞ノ高山巖石上ニ生ス
 一根叢生ノ長小莖ヲ出シ葉アリ潤葉化淫草
 石龍ニ似テ粗糙皺文アリ缺刻深ク鋸齒アリ味
 聚斂ニノ舌ヲ燥シ後ニ微温ナルカ如シ莖高サ
 一尺半許硬ノ圓ク節アリテ多枝ヲ分ツ枝ノ各
 ニ小葉ヲ著スコレハ缺刻鋸齒スクナシ七八月
 莖頭小長莖ヲ抽テ花アリ五瓣葉謁堉爾蘭杜ノ
 園圃中ニ栽ル所ノ拔達樂悉和乙姪斯ニ甚相似

タリ但小ニノ青色ナラズ紫赤色中心十葉一刺
 フ出ス花謝シテ長嘴様ノ如ク屈撓セス直立ス
 其本五囊アリテ子滿ツ熟スレハ自裂シ他ノ諸
 種ト同シ根ハ前ノ諸種ニ甚似タリト雖地中
 ニ入テ深カラス土上ニ隆起ス内赤色ニメ巨塊
 ラナス經年ノモノハ巨大ニ至リ細根土中ニ固
 著ス園中ニ栽ルハ五月花アリ

△正泰曰是物印曼ノ掘辣尼烏莫拔達樂悉和乙
 姪斯字列劣部落斯質力亞悉ナリナリ林奈斯ハ掘
 花未係理

辣^ラ尾^ニ鳥^ウ莫^ム斯^ス質^チカ^リ亞^ア細^シ莫^ムトイフ即^ト掘^ゲ斯^ス的^テ鬣^レ布^ト香^ト
偉^ヱ粵^エ花^ハ兒^ル斯^ス別^ベ吉^キノ義^ニノ花^ニ條^ニ理^ルノル^ライ^ン
ナリ今物印曼ノ圖ヲ舉テ參攷ニ備フ

○第三種 深紫中心白花偉粵花兒斯別吉

羅^ロ別^ベ兒^ルコレヲ掘^ゲ辣^ラ尾^ニ鳥^ウ莫^ム歟^ス久^キ莫^ム字^フ祿^ロ列^レカ^リ比^ヒ
鐸^ダ彪^{ヒウ}兒^ル彪^{ヒウ}蘭^{ラン}的^テ迷^ミ地^チ和^ワ干^{カン}直^チ干^{カン}的^テト稱^ス其^シ形^シ狀^ト撒^サ
尾^ニ缺^ケ兒^ル變^ヘ豆^ト菜^{サイ}〇^ムニ似^シテ葉^エ黑^ク点^{テン}多^クシ初^シ夏^カ花^ハヲ
開^ク深^シ紫^シ色^ニノ中^ニ心^ニ白^クク^リ而^レリ甚^シ愛^ススベシ茎^ニ
一^ニ尺^ノ許^ノ傍^ニ枝^{アリ}テ根^ニ長^シ郭^ク留^{リウ}識^シ鳥^ウ斯^スハ此^ノ子^ノ業^ニ

謁^ケ埤^ヒ爾^ニ蘭^ニ社^ニニ將^シ來^スル所^ノ始^ラ審^ニセストイ

ヘリ

△正^ニ恭^ニ日^ヲ予^ニ弱^ク冠^ノ時^ニ或^シ人^ノ園^中ニテ蛇^ノ目^ノ風^露
ト云^フモノヲ見^タリ其^ノ紅^シ紫^シ色^ニシテ中^ニ心^ニ白^シ甚^シ

奇^ニ品^{ナリ}蓋^{シテ}此^ノ種^ノ類^{ナル}ベシ

○第四種 薄^ク的^ニ兒^ル部^ニ葉^ニ莫^ム葉^ノ黃^ク花^ニ偉^ク粵^ク花^ニ兒^ル斯^ス

別^ベ吉^キ

獨^ニ己^ニ都^ト蘭^ニ土^ニニ全^ク前^ノ種^ノ類^ニテシテ但^{シテ}其^ノ花^ノ莖^ニ色^ニ
ナル而已

△正恭曰此物林奈斯ハ掘辣尼烏莫字刺聰莫ト
 イフ即黃花偉粵花兒斯別吉ノ義ナリ其葉薄花
 的而苗緑シ鐸ノ如ク缺刻多ク根ニ球アリ千七
 百六十年ニ碩學ノ昆兒曼釋斯ナル者異邦ヨリ
 此花ヲ觀出セリ小冠狀ノ黃花多ク簇著シ蜘蛛
 ノ狀ノ如シトイヘリ又物印曼ノ圖ニ黃花ノ者
 二種ヲ載タリ一ハ掘辣尼烏莫亞兒儉質烏莫亞
 而撒釋莫ト云ニハ掘辣尼烏莫弊末禿姬斯字陸
 列把而立度斯禿里斯劣部力斯能達質斯ト云フ
 曉紅色

其名義花色ト相合セズ今彼圖ヲ擧テ後賢ノ訂

正ヲ俟ツ

○第五種小大嘴偉粵花兒斯別吉

郭留識烏斯コレヲ羅甸ニ掘辣尼烏莫撒刺滿質
 先設祿斯達樂絀莫ト稱ス撒刺滿加ニ産ス而メ
 其草小ニノ嘴甚大ナルヲ以テ名ツク

△正恭曰物印曼ノ圖ニ大嘴ノ者二種アリ一ハ
 掘辣尼烏莫亞弗利加釋莫訥郭絀和蕙斯字陸列
 劣部緑亞涅木涅斯覆立和按救斯質和列トイフ

二ハ「掘辣尾鳥莫亞」アモ留莫モ和度劣莫ハドトイフ又林シ

奈斯ノ説ニモ其莢最勝レテ長嘴ノ者二種アリ

政邏巴州ノ南方ニ生ス一ハ「掘辣尾鳥莫屈劣」

釋莫ト云即チ葛犖涅別吉ナリ二ハ「掘辣尾鳥莫」

悉箇尾鳥莫ト云即チ兀還禿別吉ナリ其莢

ノ長出シタルヲ以テ「私即察ニ別古」ハク「亞救」アキウ「屈流」クリュウト名

ツク伊斯紀尾亞ニテハ「亞救」アキウ「屈流」クリュウトイフ是レ

拿而姓箇緑乙禿ニ鐵草トノ義ナリ屈劣乙釋莫ハ

甘丹亞ニ鳥ヨリ来セリ悉箇尾鳥莫

ハ「薊如」アキウ「匱古」ク及布緑ニ線ノ枯燥曠野ニ生ス拔鳥

飛釋斯ハ「罰而」ハク立設兒ニ蘭土ニ生スト記シタレ

合而ハク「壘兒」アキウハ「斯味」アキウ「縷兒」アキウノ内ニテ尋得タリト

イヘリ其莢刺ノ長ヲ五拊指ト定ム谷留莫那ハ

三拊指ナリトス拔鳥飛釋斯ハ其長ヲ大指ト次

指トヲ展タルホドナリトイヘリ此二種ヲ辨別

スルニカ「煙兒」アキウハ特其葉ノ鱗様ナルト刻ヲル

トヲ以テ辨スルノミナラズ葛犖涅別吉ハ直生

シ兀還禿別吉ハ安生スルヲ以テナリ拔鳥飛釋

斯ノ所謂長嘴ノ者ハ葉細ニ分裂シ長ク四尺許
 云トアリ按ニ物印曼ノ一ハ其莢嘴ノ如シ
 雖ニ花莖根共ニ異状ノモノナリ恐ラクハ此物
 種類ニハアラサルベシ其二ハ林奈斯ノ屈劣シ
 釋莫ニノ即チ次條第十一章ノ附考第三種掘棘
 左鳥莫古列質久莫。按钮莫。弊木杳姪斯ナレベシ
 此條ニ説トコロハ林奈斯ノ悉箇左鳥莫ナラン
 又物印曼ノ二圖ハ爰ニ舉テ後賢ノ高鑒ヲ俟ツ

第十一章 本書二圖

第十一章 第七掘棘左鳥莫 葛棘按合兒斯

第八全 部蔓鐸縛兒的而

名義 欵托悉鳥斯又爰ニ二種ノ傳粵花兒斯別吉ヲ

舉ク

○第七 掘棘左鳥莫屈劣乙納設羅

欵托悉鳥斯ハコレヲ葛棘左托合兒斯ト稱ス即チ

業謁埤尔蘭杜ニハ葛棘按合兒斯鶴頭草ト譯ス

和産未詳 漢名掘牛兒一種

正恭曰林奈斯ノ掘棘左鳥莫。夫鳩達劣莫ニメ

真ノ傳粵花兒斯別吉ノ一種ナリ即チ第九卷第
四、掘棘尾鳥莫ノ條下ニコレヲ説ク

○茅八 掘棘尾鳥莫蒙達釋莫羅

業錫堉尔蘭杜ニコレヲ山傳粵花兒斯別吉ト譯ス

山中ニ生スルヲ以テナリ歟花悉鳥斯ハ部留壳物

兒子ト名ツク是其根赤シテ血ノ如ク且血病ニ用

テ功アルヲ以テナリ業錫堉尔蘭杜ノ人コレヲ譯

シテ部婁鐸鐸兒的而血根トト稱ス

和名オホフウロ 漢名牻牛兒一種

△此恭曰林奈斯ノ説ニ掘棘尾鳥莫算救乙涅鳥

莫ハ即チ部婁度缺血色壘鳥力属傳粵花兒斯別吉ノ

義ナリ是郭留識鳥斯ノ稱スルトコロナリ此草

歐邏巴ノ樹陰乾燥ノ野ニ生ス又南方ノ山地ニ

アリ荷斯天祿以吉ノ荆棘ノ地或ハ溪叢ノ曠野

ニ生ス其茎枝多ク節アリ上ハ糙滑向陽ノ處ハ

赤色又淺青蓮色葉ハ五裂ニメ滑澤又三裂アリ

或單葉ニ裂ニ分レタルモアリ糙滑ニメ面綠色

背白色花ハ甚大ニメ殆ト野薔薇ノ如シ色赤レ

子莢ハ自ラ卷縮ス根ハ濃赤色ニノ其性收斂ス
トアリ是茅八章ゴブ列レ子コ蔕コ乙イ鐸ドノ一種ト
スベシ

總說 茅七カ葛カ按レ合ハ兒ル斯スハ曠野及樹籬園庭又澁ノ
辺ニ生ス葉缺刻鋸齒多ク茎毛茸アリ根際ヨリ上
赤色ナルト前種ニ同シ夏月花ヲ著ス紫色莢ヲ出
スカライキホフト鶴頭ノ如ク長ノ嘴ノ如シ根中心白色外皮黃
色ヲ帶フ

○茅八ゴブ部ル鐸ド縹ウ兒ル的テ而ルハ独ニ郁ル蘭ト土ノ山中及ヒ

石地、生ス其形狀前種ト全ク同メ花莖根トモニ
大ナリ其枝細ク微毛アリテ葉薄ク深缺刻アリテ
或ラ夫夏月茎頂紫花ヲ開ク花後莢ヲ結フ又鶴頭ニ
似タリ根ハ内外共ニ黃赤色或ハ栗殼色ノモノアリ
性効主療 欬シ乾シ悉ク烏ス斯ル曰ク茅八ゴブ部ル鐸ド縹ウ兒ル的テ而ル根
ハ崩血ヲ止ルノニ其他ク用ルトナシ

附考 郭留識烏斯羅別兒等カ記スルトコロノ部
鐸ド縹ウ兒ル的テ而ルノ別種ヲ爰ニ附ス

○第一種 攝辣屋烏莫弊末禿姪斯羅

弊末禿姪斯ハ達樂救斯カレラ部留子物見子ト

祢シ羅別兒ハ部婁鐸鐸兒的而血根トイフ又

羅甸ニ攝辣屋烏莫弊末禿姪斯辣地設列布質力根

設ト祢ス郭留識烏斯曰達樂救斯ノ部留子物見女

子ハ荷斯天祿以吉及翁加里亞ノ山林高處ニ生

ス又拂郎察ノ森中ニ多シ一根叢生シテ節多ク

枝アリ毛茸アリ向日ノ處紫赤色每節兩葉對生

シ小長莖ヲ附着ス狀兒念附禿葉ニ微々似タリ

根條ノ葉ハ分裂シテ五岐ヲナシ每岐又分レラ

兩小岐ヲナス微毛アリテ葉面綠色背爾細色味

舌ヲ燥カスカ如シ莖梢ノ節ヨリ小長莖ヲ出シ

花ヲ著ス五月ヨリ夏ヲ終マテアリ他ノ儂卑花

兒斯別吉ノ花ヨリモ大ナリ五瓣ニノ牡生悉斯

細斯和名天人類花ノ如ク鮮紅色十葉アリ花後五

後嘴様ノ莢ヲ結フ本ニ小囊狀ノモノアリ其膨

脹セル中ニ子アルト他ノ種類ト同シ子熟スレ

ハ莢聲アリテ自カラ裂テ莖ヘ卷縮スルト他ノ

種類ニ異ナラス根巨クガ赤色微鬚アリコレラ
年々土中ニ分テ裁レハ繁茂シテ母根ヨリハ巨
大ニメ多鬚ナルモアリ

○第一種ハ掘棘尾鳥莫弊末禿婁斯亞而的劣莫

羅

布孽屈別謁鄉ニ行ク道ニ鈕欽別兒屈山アリ此

處ニ一種ノ者ヲ出ス葉ハ拔達棘悉和乙婁斯ニ

似タリ牧野及陰地ニ生ス

○第二種 掘棘尾鳥莫古列質久莫按鈕莫弊末

甘茅亞

一年生

禿婁斯羅

羅別兒又此草ノ一種ヲ説ケリコレラ甘茅亞ノ

葛孽涅別吉又異邦ノ葛孽涅別吉トイフ此草原

来甘茅亞ヨリ將來ス彼國ノ地屬達莫禿斯ノ東

子タル間ヨリ取出セリ一根叢生メ茎ハ大紅色

高サ一尺半許節アリテ百兒悉葛力亞墨記草

テノ節ノ如シ葉缺刻アリテ白磨兒別悉和名イノ

クワ又勿釋茶麻留物野西瓜和ノ如クハレニ

深赤色ノ文理アリ花紫碧色ニメ大サ塊根葛孽

涅別吉ノ如シ形色モ亦相似タリ花後嘴様ノ英
ラ生大内ニ子ヲ含ム他ノ種類ヨリモ英大ナリ
法備烏斯格留莫那ノ説ニ此種類意表里亞ニ多
生ストイヘリ

○茅四種 楯棘左烏莫亞彪留莫格力按姪力覆

立烏莫羅

格留莫那ノ説ニハ羅別兒ノ楯棘左烏莫設列質
久莫ト差混同ストイヘリ何者初生ノ葉能相似
多リ其他ノ葉ハ甚濶ク葉ニ傍フ葉ハ胡荽葉ニ

同シ微毛茸アリ香気ヨシシ芬香偉粵ル花兒ス斯別吉

ノ如シ小莖ハ赤色莖節アリ赤赤色鬚アリ其

間ニ莖ヲ抽テ高サ一尺半許粗糙ニノ粘気アリ

五ニ分レタル中ヨリ一膜ヲ垂レ四五ノ心葉ヲ

次ニ醜紫碧色五瓣花ヲ開テ各五ノ粗糙ナル小

莖ヲ著ス一塊節保保テ上銳尖然ニ刺戟セス

実ハ鳥長嘴ノ如ク上ヨリ下ニテ巨ク五ノ薄ク

廻リタルモノ分ル

或人ノ考ニハ前ノ諸草ヲ以テ部葉鐸縛兒的的面

ニ充タリ然レハ第十章ノ第六掘辣屋烏莫
ノ一種トナスベシ真ノ部「グ」葉鐸「ド」縛兒「ワ」的「ル」而ハ秋ニ
至レハ全草根共ニ深紅色ニナルモノナリ

5 三卷本一冊の 頁79-86

439-1

