



獨度涅槃鳥斯草水譜

初稿本

洋学文庫
文庫 8
F 5
5



初編才二套

十二章ヨリ 草綿
二十章と

筆耕清書成

共四冊

□ 獨度温身斯

遠西草木譜 初編 第三中

哈納欲立烏莫一圖

附考第一種以物印曼哈納欲立烏莫乙烏斯按救斯和部是瓦二圖

第二種

第三種

第四種

第五種

第六種

第七種

第八種

第九種

以上

九圖

二圖
三圖
四圖
五圖
六圖
七圖
八圖
九圖

第十二章

哈納欲立容

名義 哈納欲立鳥莫羅

厄勒齊亞ニテ布褥ノ充物ヲ哈納欲論云フ此物哈納欲立容ト稱スルハ其葉柔軟ニシテ布褥ノ用ニ供スルカ故ナリ 割鳥留斯謁及涅託モ亦同説ナリ

○布立穉斯ノ著書第二十七卷十章ニ此草ヲ以テ

葛莫設論ト名ク然レ予按スルニ布立穉斯ノ説ハ

葛莫吉斯乙論ニシテ即チ小谷寸一名低谷寸ナリ葛

莫設論ニアラス彼書中ヲ熟讀スベシ然レ布立穉

斯ノ此物ヲ以テ小谷寸ニ充タルハ柔軟ナル白毛

アリテ谷寸ニ似タルカ故ナリ全ク其理ナキニモ

アラズ故ニ其他假稱多シ既ニ布立穉斯ノ著書第

二十四卷十五章ニハ此物ヲ羅甸ニ先屯久留斯

久留斯ハ絹帛類ノ裁餘腕子ヲ云フ又ト云厄勒齊

亞語ニ設歷末質斯ト云フ謬ナリ又羅甸ニ亞而備

鳥莫ト云フ是レ白草ノ義ナリ此羅甸干土白色ナ

ルヲ以テナリ

總説

此草抄即察及ヒ納爾暴念ノ海濱ニ近キ曠地

ニアリ茎高サ一掌許細クメ枝アリ小葉附著ス形
楮圓ニメ茎葉共ニ柔軟白毛蒙茸タリ採テ鳥獸ノ
毳毛或ハ綿ニ代テ布褥枕中ノ用ニ供スベシ六月
ニ茎頂小蕾ヲ発ス「アハ」亞苛「ハ」邏「子」涅ニ似タリ黄花ヲ開ク
金黄色ニメ光アリ後實熟ス根ハ堅シテ四方へ繁
衍ス

附考羅別兒曰此物甚夕美好有益ノ稀品ニシテ
谷「コ」寸「ツ」ノ他ニコレニ如クモノナシ其花心及ヒ根
ノ餘ハ他ノ綿類ヨリ最ニ勝レリ其子ハ三稜ナル

小殼ニメ形稍長ク白色ヲ帶フ又七月ニ花アル
モノアリ「ハ」即察人ハ倏兒「ハ」別亞「ア」谷「コ」東「ト」トイフ別而
陸「ガ」居「ル」鳥斯ノ説ニ真ノ哈納「ハ」欲「カ」立「リ」鳥莫「ム」ハ甘笋「カ」亞「ア」ノ
諸島ニ多ク生ス密姪「シ」而「ル」蘭「ラン」上海「ド」ノ汀辺ニアリト
イヘリ

郭留識「ク」鳥斯「ウ」羅別兒「ロ」ニ先生ノ記セル所ノ種類ヲ
爰ニ擧ク

○第一種 亞墨利加ノ哈納欲立鳥莫
其茎巨クメ高サ二尺許白毛多シテ布褥ノ用ニ

供スベシ狹葉茎ヲ順次ナク周リテ附著ス長サ
一指許葉面綠色ニメ甚光澤アリ背蘭細色莖頭
多枝ヲ分チ花多ク簇著ス鳥糞ニ似テ銀白色ノ
鱗砌ヲナスヲ瓦ヲ覆カ如シ花開ケハ葩中黃色
ニメ尋常ノ者ト同ク絮トナリテ飛散ス中ニ子
アリ根ハ小指ノ大ニシテ黑色細鬚多ク土中ニ
傍生シテ年々新芽ヲ生ス其初生全ク毳毛及綿
ノ如シ花ハ夏ニ至ルニテコレアリ〇又一種此
草ニ甚似タルモノアリ郭留識鳥斯コレヲ亞兒

掘^ゲ乙^イ祿^ロ箇^コ覓^ント名ツク銀白色ノ莖アルヲ以テナ
リ

正恭曰林柰斯ノ所謂哈納欲立烏莫^{ハガナクハクム}乙莫部^{ムムベ}カ葛

卽^ニ莫^ム質^{シツ}缺^{ケル}而建^{ケン}斯^スナリ業^ノ謁^{トク}埵^ト尔^ニ蘭^{ラン}杜^トニ悉^シ久^ク備^ビ掘^ゲ

度^ト邏^ロ屈^ケ部^ベ萋^シ莫^ム鱗^{リン}砌^チ欲^ク立^リ烏^ウ莫^ムヲ度^ト邏^ロ屈^ケ部^ベ萋^シ莫^ムト

名^ナツ^ハフ軟^ニ弱^ニ草^ニニメ葉^ハ披^ヒ鍼^シ様^ニニメ毳^ニ毛^{アリ}

茎^ヲ周^クテ鱗^砌アル萋^ヲ著^ス状^ハ狹^ニ葉^ノ鼠^ノ麴^草

ニ似^タリ細^ニ密^ニ小^ニ枝^ヲ分^チ葉^ノ側^ニ毳^毛アリト

アリ是^ハ物^ノ印^ニ曼^ノ哈^ガ納^ナ欲^ク立^リ烏^ウ莫^ム末^ニ乙^イ烏^ウ斯^ス按^ニ救^ス斯^ス

微大

狹

禿^ト和^ヲ部^ゴ龍^ロ兀^ゴ覆^ホ立^リ和^ヲナリ今彼圖ヲ以テ補^フ之^ヲ

○第二種 布洛的亞鳥^ハノ哈納^ハ欲^ハ立^リ鳥^ム莫^ム

郭留識鳥斯又種ヲ説ク此草茎高サ一掌徑餘ニ
ノ或ハ直立シ或ハ地ニ安生ス圓ノ莖毛アリ葉
互生シ柔軟ニメ繭細色本潤ク末尖ル茎頂ニ多
ク小株ヲ著ス白色ニメ中ニ黄毛アリ根巨クシ
テ黧白色少鬚アリ是レ独度涅鳥斯ノ本編ニ載
スル所ノ小比刺兀^ケニ似タリ

正恭曰是物^印曼^ノ哈^ハ納^ハ欲^ハ立^リ鳥^ム莫^ム末^ニ烏^ハ斯^ハ亞^ハ而^ル
微大

的^ハ劣^ム莫^ムナリ今彼圖ヲ以テ補^フ之^ヲ
別種

○第三種 全ノ一種

郭留識鳥斯又前條ノ一種ヲ説ケリ此草一茎ニ
ノ枝四方へ垂テ繁衍ス葉潤シテ柔軟繭細色枝
節ノ葉間ヨリ五六蕾ヲ簇著ス黄ニメ微繭細色
ヲ帶タル花ヲ發ス甚毛茸アリ根八年コトニ枯
ル然^レ氏子熟^シノ自^ラ地ニ落^テ苗ヲ生^ス穀田ノ蒞
タルアトニ生ス

正恭曰物^印曼^ノ哈^ハ納^ハ發^ハ立^リ鳥^ム莫^ム刺^ハ質^ハ覆^ハ立^リ鳥^ム莫^ム亞^ハ
潤葉

墨利加釋莫^{ノリカミ}是ナリ今彼圖ヲ以テ補フ之ヲ
亞墨利加産

○第四種 山哈納欲立烏莫^{ベルタガナハナクハム}

コレヲ白花發設附土^{ハクセフツ}ト名ツク其形狀最モ小^{ケイテヒ}必
陸設而歷ニ甚似夕リ

△正恭曰物印曼ノ哈納欲立烏莫^{カガナハナクハム}蒙達釋莫^{モンダシヤクハム}字陸列^{シラ}
カンネド于地度是ナリ今彼圖ヲ以テ補フ之ヲ

○第五種 紅花山哈納欲立烏莫^{ロフスルハルガナハナクハム}

羅別兒コレヲ哈納欲立烏莫^{カガナハナクハム}蒙達釋莫^{モンダシヤクハム}彪兒彪列^{ヒウエヒウレ}
烏莫ト名ツク其形狀此書ノ小^{ケイテヒ}必陸設而歷ノ第

一圖二同シ

△正恭曰物印曼ノ哈納欲立烏莫^{カガナハナクハム}蒙達釋莫^{モンダシヤクハム}字陸列^{シラ}
赤部陸是ナリ本編圖ト稍異ナリト雖比暫彼圖
ヲ載テ後考ニ備フ

○第六種 印葛兒那香別兒屈哈納欲立烏莫^{インカエルナナトベルゲガガナハナクハム}

羅甸ニテ哈納欲立烏莫^{カガナハナクハム}蒙達釋莫^{モンダシヤクハム}率亞歇劣便斯^{ソウアセハルベシ}
ト称ス其形狀小^{ケイテヒ}撒陸設而刺^{サカセル}ノ第二圖ニ大ニ同シ

△正恭曰此物形狀小^{ケイテヒ}撒陸設而刺^{サカセル}ノ第二圖ニ同シ
トアレハ林余斯第四十一種^{ハヤクシ}哈納欲立烏莫^{カガナハナクハム}地^チ和^ワ

以久莫^ニノ即独度涅烏斯ノ小撒陸設而刺ナリ
且此條ニ率^ニ亞^ハ歌^ハ劣^ハ便^ス斯ノ接名アレハ林奈斯言
其花美麗薔薇色トアルニ的當セリ爰ニ物印曼
哈納欲立烏慕蒙達釋莫^ニ陸列^ニ祿^ニ地^ニ和^ニ列^ニノ圖
ヲ舉テ考證ニ備フ後條ト參考スベシ

○第七種 薄訥尼印國福斯的和箇論

羅別爾說ニ哈納欲立烏莫ノ一種ナリ前諸種ヨ
リ大ニノ黄花ヲ開モノナリ

△正恭曰物印曼ノ哈納欲立烏莫留的烏莫谷末亞烏

列亞ナルヘシ彼圖ヲ載テ後考ニ備フ

○第八種 亞而百斯國哈納發立烏莫

郭留識烏斯ノ說ニ一種ノ小草ニノ高サ一咫許
ニ過ズ葉ハ地ニ安テ蔓延ス甚夕小必祿設而歷
ノ如シ面糙淡背繭細色ニモ毳毛ノ如シ味苦メ
燥ナリ莖葉共ニ毛茸覆ヘリ其莖ノ最高ノ處ニ
五六葉及ヒ多葉濶カリテ毛茸多ク他ノ毛茸ト
異ナリ其中心ヨリ四五箇或ハ多ノ刷毛樣ノ蕾
ヲ發シ哈納欲立烏莫ノ如キ黄花ヲ開ク其中間

ニ黒毛茸回旋ス是其多ノ鍼眼中ヨリ發出スル
ナリ根ハ巨ノ黒ク黧白色ノ鬚アリ熱爾瑪屈亞
ニ「ラ喲而部留綿ト云是抹質和留斯ノ第二歷應禿
ト地應ナリ又哈納欲立烏莫篤樂及ト云是縛而
簾哈辣斯ノ義ナリ又末天否刺斯トイフ
△正恭曰林奈斯ノ哈納欲立烏莫亞而必釋莫ナリ
此草蠟皮亞及雪際亞ノ山谷ヨリ出タリ其状小
必陸設而歷ニ甚近シコレヲカ姪兒ハ牝花ノ三
ナリト究メタリキコレヲ又蕪亦徵亞ノ亞而百

斯山ヨリ出タリシヲ合爾歷兒先生ニ由テ究盡
スレハ其辨ハ牝花ナレ氏中心ニハ牝牡二種ア
ルヲ見出セリト見ヘタリ是物印曼ノ哈納欲
立烏莫。覓地烏莫葛必細立斯。屈微カ斯ナルベシ
彼圖ヲ載テ後考ニ備フ牝花牡花ノ説ハ予カ著
ス所ノ倒生啓微ニ於テ辨之
○凡テ流兒箇祿乙鐸拿掘兒箇祿乙鐸及ヒ其他
羣毛様ノ諸草ハ其性質ヲ以テ共ニ哈納欲立烏
莫ニ附屬スベキモノナリ

性効 微シク收斂シ且燥スノ性アリ

附考 凡テ「哈納發立烏莫」ノ諸草ハ最モ能身体ノ

諸液ヲ稠厚ニシ且燥スノ効アリ味微鹹海濱ノ産ハ最

氏鹹ニメ苦ヲ帶フ香竄ニメ愛スベシ稍黃斯の

葛斯カス又「謁歷莫孛」ノ脂ニ似タリ故ニ諸粘稠液ヨ

リ發スル瘍瘡ヲ燥ス

主療 此葉ヲ取り木味ナル酒ヲ以テ服スレハ赤痢

ヲ治ス

他用

附考 羅別兒曰此草ノ枝ヲ燭心ニ用テ能燃ヘ甚

明ナリ何則此物能ク油及ヒ脂肪ヲ噲引スルカ

為ナリ

地和思谷里迭斯曰葉ハ烏毳綿ノ類ニ代テ布褥

ノ用ニ充ツト是独度涅烏斯ト同説ナリ

通志卷之...

增補

林奈斯第三種元斯悉
乙必鳥莫吸兒率即莫
今以物印曼之圖補之

第十三章 谷寸コツシ 一名暴莫縛而歷ボウモクワレレ箇祿コロ乙イ鐸ド

名義 兀斯ゴス悉必烏莫シヒウム 羅甸谷寸ロヂンコツシ 業謁コト 谷コト 禿ト 涅ネ 意イ 谷コト 東トシ

○ 語厄利亞ゴリヤ 拔烏バウ 莫縛ムワク 而歷ニレ 歷レ 亞ア 瑪マ 亞ア 而ニ 兀ゴ 鉞ドシ 伊イ 斯ス 巴バ

和名トウワタ 漢名草綿

此草厄勒齊亞ニ吉斯乙キセイイ弄ニト云又兀斯悉必容ゴスシヒコト云
羅甸ト同稱ナリ藥舖ニ薄莫拔ボムバ吉斯樂キスラク釋兀谷シキゴ紕莫キム
ナト、稱ス又意太里亞ニテ拔莫拔バムバ及亞ア氏シ稱ス○
得和弗樂思トフラクシ紕斯ノ書第四卷九章ニ隄陸斯テイロクス嶋ニ綿
ヲ生スル一種樹ヲ産ストアリテ奇品ノ物トス然

氏今ハ独乙都人トキニドト暴莫縛而歷ボウモクワレレト稱シ此物ノ綿ヲ採
用ス是古人ノ未タ知ラサリシ所ニメ今ニ至テ覈
著タルモノナリ○彼書ニ又曰或人ノ説ニ隄陸斯テイロクス
嶋ニ毳毛ヲ生スル木アリ其葉葡萄ニ似テ小サク
實ヲ結ル大サ果ノ如シ実中綿ヲ含ム熟スレハ自
裂ス其綿ヲ採テ以テ綿布及哆羅呢トシヤヲ織ルベシト
又同書中ニ厄勒齊亞語ニ葛兒崩姪ケルボンデ和烏田ワウテントイヘ
ルコトアリ故ニ人此物実アラズメ樹上ニ綿ヲ懸
垂スルモノト思ヘリ既ニ彼書中ニ実ヲ結ル大サ

果ノ如シトアリ又次ノ布立稜斯ノ説ニ依テモ知
ベシ宜ク和鳥田ノ語ヲ除クベシ。布立稜斯ノ書
第十九卷一章ニ曰阨入多ト亞臘皮亞ノ堺ニ一種
ノ灌木ヲ産ス兀斯悉必容ト名ク今通ノ吉斯乙弄
ト呼フ故ニ此綿ヲ以テ造ル所ノ哆羅呢綿布ヲ吉
斯乙立那トイフ此樹小灌木ニメ実ノ状胡桃ニ似
タリ実中ヨリ綿ヲ繰出ス柔軟潔白大約綿様ノ諸
品ニ於テハ天下コレニ勝レルモノアラズ阨入多
ノ僧此物ニテ織レル衣ヲ以テ最上ノ品トス

總説 得和弗樂思絀斯曰此草亞細亞州中ノ三ニテ
ラス亞弗利加及亞臘皮亞ノ海中隄陸斯嶋ニモ多
コレヲ栽ユ而メ歐邏巴諸洲或ハ地中海ノ諸嶋ニ
モ亦コレヲ傳ヘ勉テ幸ニ種植スルヲ得タリ故
ニ馬兒太甘茅亞及其他南方溫暖ノ諸國ニハ最モ
多クコレヲ栽テ推メ知ルベシト其莖高サ一尺五
寸許ニメ小灌木ニ類ス葉潤メ三尖鋸齒缺刻アリ
テ葡萄及亞而舌亞葉ニ彷彿タリ然レ小ニメ柔軟
繭細色ナリコレヲ布褥枕中ニ入レハ最モ良ナリ

花黄ニ中心紫色ナリ花後小圓実ヲ結フ形小果
ノ如ニメ馬兜鈴ニ似タリ熟スレハ自裂メ中子ヲ
束著ス毛様雪白色ニメ甚柔軟ナリ自裂スルノ時
摘取り聚テ絲ヲ造リ衣服ニ製ス子ハ長シテ味佳
ナリ根ハ小ニメ鬚アリ

附考此谷寸箇祿乙鐸ハ意太里亞ノ属葛洛部カ
印ノ布令悉捌列乙吉ト鳥立印又邏瑪ノ近邦式
吸達荷古失亞吸的兒薄等ニ多ク種子ヲ栽ユ蔣
テ後ニ三四月ニメ最モ長大ニ至ル亞細亞洲ノ

地方ニテハ半年ヲ保ツテ能ハス何則五六月ニ
種子ヲ下シ九月ニ蒔取ル毎年新ニ種子ヲ下ス
ナリ甘笋亞ノ農民ノ説ニ凡種子ヲ下スノ前ニ
子ヲ豕糞及牛糞中ニ浸ス一三日ニメ蔣此ノ如
スル片ハ生スル一速ニ且繁茂シ易ク綿ヲ得ル
一多ク又寒氣ニ堪ユトイヘリ今玩草家異邦ヨ
リ移メ栽ルト雖モ寒地ニ於テハ甚宜シカラズ
寒氣スクナキ中帶ノ地ニテハ實ノ結フ一多シ

○厄勒齊亞國及悉乙百兒率彘玄番末斯等ノ婦

人谷寸ヲ精擇スルニ鐵杵長サ一尺巨サ二指許
ナルヲ以テ其實ヲ壓搾スルトキハ其綿中ヨリ
圓ノ堅實ナル核自ラ分離ノ迸出ス或ハ紡車ヲ
用ユルモアリ

○華乙路ノ谷寸

阨入多國ノ産ニシテ箇禿涅莫設及亞児ト称ス
別尔陸居烏斯ハコレヲ兀斯悉必烏莫百斂涅ト
イヒ布禄斯百児曷尔必釋斯ハ兀斯悉必烏莫亞
児撲列烏莫トイフ凡テ人コレヲ暴莫谷寸ト称
木本

ス灌木様ニメ毎年枯レス園庭中ノミナラス各
處ニ於テモコレヲ見タリ其幹高サ一丈五尺許
木本ニシテ枝アリ実及綿ハ小谷寸ノ如ニシテ
大ナリ然レ彼地ニテハ纖維ニ供スルナシ但
亞臘皮亞國ニ於テハ暴莫谷寸ヲ取テ一種ノ細
密布帛ニ織テコレヲ用ユ説撒ト名ツク或人ハ
古人備乙斯率莫ニ充タリ又別尔陸居烏斯ノ
説ニ印度及亞臘皮亞ノ谷寸ハ其子巨大ニシテ
黒ク十或ハ十二簇著ス亞細亞諸洲各處ニコレ

アリ有益ノ物ト謂フベシト又東西印度ノ諸方
ニ縛而暴綿ノ別種アリ今世此草ヲ知ルモノ稀
ナリ

△正恭曰此書本編ニハ谷寸一名暴莫縛而歷箇
禄乙鐸ト称シ兀斯悉乙必烏莫樸莫拔吉斯
乙弄ノ三名一物トナシテ唯一種ヲ舉ク附考ニ
於テハ革乙路ノ谷寸其他ニ亞臘皮亞及印度諸
邦ノモノ三種ヲ舉ク然レ其說未ク精審ナラス
林奈斯ノ說ヲ閱スレハ二類ニ別テリ兀斯悉乙

必烏莫ハ一名革寸即チ本條ト称シ灌木ニ收ム
樸莫拔吉斯ハ一名革ト古暴莫ト称シ喬木ニ收
ム其種類差異ナリ然レ吉斯乙弄ノ名ハ兩種ノ
毎條各此名ヲ兼称ス又東壁ノ本草ヲ考ルニ木
綿有ニ種似木者名古貝似草者名古終トアリコ
レヲ典籍便覽廣東新語ニハ木綿草綿ト別テリ
今按スルニ本草ノ古貝ハ革ト古ノ音訛ニメ或
ハ吉貝劫貝ニモ作ル是即チ樸莫拔吉斯一名革
ト古暴莫ナリ業謁埵尔蘭杜ニ鈍斯暴莫ト翻ス

ト名ツク麻刺拔^ルニテ^ハ胙耶落^ル又^ハ胙耶^ト称シ專
ラ本邦へ齎来ス是便覽新語ニ所謂木綿ナリ此
物東印度ノ産ニメ本邦及和蘭ノ地方ニテハ長
シ難キモノナリ是此書末卷ノ附録印度及異邦
産第二十六章把^ル末立^ル釋^ル莫^ムノ條ニ郭^ル留^ル識^ル烏^ス斯
ノ刺^ラ居^ニ翕^ハ樂^ラ亞^{アル}兒^ボ樸^ル兒^ル百^レ列^グ屈^カ那^ナト称スルモノ
ナリ彼條ニ於テコレヲ辨ズベシ古^ク終^ハ谷^寸ノ
音訛ニメ本條ノ兀^ゴ斯^ス悉^シ乙^イ必^ピ烏^ウ莫^ム便覽新語ニ所
謂草綿ナリ林柰斯ノ說ニ兀^ゴ斯^ス悉^シ乙^イ必^ピ烏^ウ莫^ムハ一

種ノ灌木ニメ此種類多雄葉ニメ重萼アリ外三
ニ分レ子莢四室中ニ去毛ヲ以テ子ヲ纏繞セリ
花ハ五瓣ニシテ薔薇ニ似タリ實基ヲ圍テ聚繚
ス品類五種ヲ擧ク

○第一種ハ兀^ゴ斯^ス悉^シ乙^イ必^ピ烏^ウ莫^ム倭兒^ル拔^バ設^セ烏^ウ莫^ムト云
即チ革^カ寸^ツ箇^コ祿^ロ乙^イ鐸^ドノ義ナリ又^ハ低^ラ革^カ寸^ツト云フ其
葉五缺裂ニメ背腺條アリ茎草生ニメ低ク地ニ
安生^スコレヲ尋^グ常^シ革^カ寸^ツトス原来ハ亞^ラ臘^ラ皮^シ亞^ラ巴
兒^ラ西^ラ亞^ラヨリ出テ地中海ノ諸嶋ニ至リ意太里亞

亞墨利加ノ諸邦ニ種子ヲ傳テ遍ク蕃殖セリ此
草^カ靴^ツ綿^トス^トヲ生ス葉野味^{ネイ}印^シ脛^ゲ兒^ド度^ドノ如ク白色
柔軟毛茸アリ黄花ヲ著ス中心淺青蓮色實ハ小
果ノ如ク又胡桃ニ似タリ圓メ尖アリ内ニ白毛
毛アリテ茶褐色ノ小圓子アリ胡椒ヨリハ大ナ
リ白色髓脂アリ實ヲ開剖スレハ三四五瓣ニ分
裂又毛ハ一萼ノ内ニ保ツ子ハ藥用ニ供スベ
シ緩和ノ劑ナリ咳嗽胸病ニ飲劑トメ用ユ又能
吐血下血ヲ療ス此子ヲ搾壓メ油ヲ取レハ巴且

杏ノ如シ又埒^ム莫^ム畢^ム鳥^ム斯^ムノ説ニ東印度ノ諸嶋ニ
一種ノ大ナル^カ革^ツ寸^シ暴^ム莫^ムヲ産ス高サ人立ニ等シ
タニ三年ヲ保ツベシコレヲ以テ絲ニ造リ織テ
布トナストイヘリ又諸嶋中ニ生スルハ尋^ゲ常^シ革^カ
寸^シノ印度^シ廝^ス當^シ及^シ榜^シ葛^シ刺^シノ海辺ニ毎年多コレ
ヲ種蒔シ顆ク運送ス是レ革^カ兔^ト涅^レ麗^レ華^レ天^レ布^レ帛^レニ
織ベキカ爲ナリ箇^コ碌^シ曼^シ姪^シ尔^シニハ殊ニ多シ此物
高サ三四尺ニ過サルモノヲ指テ暴^ボ莫^ム樹^ツト称
スル子不審^フ独^ド乙^ツ都^ツニ於テ革^カ寸^シ暴^ム莫^ム縛^ル而^ルト称ス

ルハ是獸毛ト別ンカ為ナレ氏此名稱モ亦穩ナ
ラスアル必釋スノ説ニハ革寸暴莫ノ綿ハ厄入
多ニテ箇禿涅莫設及亞兒ト名ツケコレヲ織テ
細密ナル麗華天トス亞臘皮亞人ハ説撒ト名ツ
クコレニ攄テ考レハ業謁垓尔蘭社ノ語ニ翻ス
レハ翁印令精密布ト云フ革寸ノ外ニモ王侯
ノ服飾及ヒ假屋ヲ飾ル惟慢ノ類バ通メ此名ヲ
稱スルト見ヘタリ此令檢ヲ織一ハ東方諸国ニ
於テコレヲ見タリ甚草麻ニ似タルモノナリコ

此条下甚審明竹草以糸概之

レヲ倭部烈僊ノ必斯托答ト名ツク然氏華尔特
吾數人ハ决丹ト称ス是亞臘皮亞ニテ箇東或ハ
起原ス東方諸国ノ民ハ絲綱網紐等ニ造ルモノ
ヲ總ノ箇東ト称スルナリ當時ニ於テハ革兔涅
麗華天ト謂フナリト是本編ノ谷寸時珍所謂似
草之本綿ニメ今ノ草綿ナリ和名キワタ又唐綿
ト云此物始テ大和室来村ニ栽タリ故ニ世俗コ
レヲ室来綿トイフ今来ハ諸国ニ栽テ專ラ世民

ルハ是獸毛ト別ニカ為ナレ氏此名稱モ亦穩ナ
ラスアル必釋斯ノ説ニハ革寸暴莫ノ綿ハ厄入
多ニテ箇糸涅莫設及亞兒ト名ツケコレヲ織テ
細密ナル麗華天トス亞臘皮亞人ハ説撒ト名ツ
クコレニ攄テ考レハ業謁垓尔蘭杜ノ語ニ翻ス
レハ翁印令捻精密布ト云フ革寸ノ外ニモ王侯
ノ服飾及ヒ假屋ヲ飾ル惟慢ノ類ハ通メ此名ヲ
称スルト見ヘタリ此令捻ヲ織テハ東方諸国ニ
於テコレヲ見タリ甚草麻ニ似タルモノナリコ

レヲ倭部烈僊ノ必斯拏答ト名ツク然氏革尔特
吾數人ハ缺丹ト称ス是亞臘皮亞ニテ箇東或ハ
箇糸トイフニ依レリ即今ノ革寸ノ称呼ヨリ
起原ス東方諸国ノ民ハ絲綱網紐等ニ造ルモノ
ヲ總ノ箇東ト称スルナリ當時ニ於テハ革兔涅
麗華天ト謂フナリト是本編ノ谷寸時珍所謂似
草之木綿ニメ今ノ草綿ナリ和名キワタ又唐綿
ト云此物始テ大和室来村ニ裁タリ故ニ世俗コ
レヲ室来綿トイフ今来ハ諸国ニ裁テ專ラ世民

ヲ利又此物始テ本邦ニ来ルハ桓武天皇延暦十
八年七月崑崙人将来シテ同十九年四月庚辰綿
種ヲ紀伊淡路河波讚岐伊豫土佐及太宰府等ノ
諸国ニ植ル一菅公類聚國史ニ載タレレ其後綿
種絶シニ依テ本綿ナルヤ草綿ナルヤ未審其後
文祿年中ニ異国ヨリ来ル一大和本草ニ見ヘ夕
レレ其出處ヲ記サズ國史實錄第七十三卷ニ後
陽成院慶長元年丙申垂船流来于土佐桂濱カシハニ宇羅
戸湊ウロト辺之濱南蠻商賈往来之船被甚風觸而槓摧ケ

檣折免溺死者僅漂泊于此國守長曾我部元親憐
之レ與糴米酒肴議增田長盛檢船中之物ヲ而悉獻ス秀
吉トアリ文祿五年ニメ慶長ト改元アレハ此時
ノ一ナルベシ其頃ヨリメ普ク天下ニ布ケリ唐
山ニテハ宋末ニ始テ南蕃ヨリ江南ニ入一時珍
說ニ見ヘ夕リ今本邦栽ル所ノ草綿ト形状大抵
相合ス然レ本編及ヒ本草ニハ葉三尖トアレレ其
此地ニ栽ルハ五尖ニモ三尖ニモナルナリ背ニ
腺條ナキヲ以テ第五種拔兒拔田說ト別ツベシ

其實本編ニ於テモ小果ノ如シト云時珍ハ結子
如桃ト云々リ故ニ羣芳譜ニ花桃ト云松江府志
ニ花鈴子ト云和俗ニハ是ヲモト云又實中ニ
綿ナキモノアリ是ヲ松江府志ニ僵囊ト名ク
○第二種ハ兀斯悉シイ必ピ烏莫ウ亞ア兒ル樸ボ列レ烏莫ウト云
即チ暴莫ボ華カ寸ツノ義ナリ葉五花尖披鍼様ニシテ
掌ノ如シ幹ハ灌木様ニメ高シ是亞爾ア必ピ釋シ斯スノ
圖說ニ著ス所ニメ厄入多ノ園中ニ偶有之然此
彼地ニテハ前種ノ如ク此綿ヲ用ルモノナシ西

齊里亞及ヒ矢乙布埒斯ニ於テハ多蕃殖シ顆々
將來ス此ニ属スル媽爾達ニテモ其国人ノ長々
ル者コレヲ種蒔メ蕃殖セシメ亦多運送ス苛斯
令及鳥斯ハ華カ乙路ノ水樋ノ傍ニ於テ稀品ノ華
寸暴莫ツヲ見タリ葉紫赤色ノ枝ニ附著シ長大ニ
至レハ五花尖ニメ深ク分レタリ上一葉下ニ葉
ハ最モ長シ林柰斯其小葉ノ截裂スル所ノ葉辺
ヲ顕微鏡ヲ以テ見ル片ハ悉ク鈍稜アリ篤鳥兒
涅子覆ホ兒ル督トノ說ニハ若シコレヲ辨別セント欲セ

ハ其花ノ暗青蓮色ナルヲ以テ徴スベシ又布留
缺^{ケツ}濕^{シツ}督^{トク}ノ説ニ埒^ハ莫^ム畢^ヒ烏^ウ斯^スノ潤^{ジュン}葉^{エフ}革^{カク}寸^シ暴^{ボウ}莫^ムハ葉
ノ大^{オホ}サ一尺許ニメ五花尖ニ分裂シ麻刺拔^{マサヒキ}尔^ニ
久^{キウ}去^コ把^ハ力^{リキ}質^{シツ}及^キヒ未^ミ度^ト辣^{ラク}斯^スノ草^{クサ}生^シ革^{カク}寸^シモ共々皆
原来ノ革^{カク}寸^シ暴^{ボウ}綿^{メン}ナリト雖^モ氏^シ其土地産處培養^シ
由^ヨテ差別アルヲ辨知スベシ食^シカ百^{ヒャク}斯^スノ東方
ニハ此物ヲ家屋ノ傍ニ栽^キヘ葉ハ蔬菜ノ如ク煮
テ食用トシ綿ハ尋^{ゲン}常^{ジョウ}革^{カク}寸^シノ如ク維織ノ用トス
又麻刺拔^{マサヒキ}爾^ニノ産ニ其幹高サ一丈二尺許ノ稀品

ヲ得タリ其实尋常革^{カク}寸^シヨリ圓長ニメ三稜ナリ
阮^ニ入^ル多人ハ綿ヲ取テ金瘡ノ用ニ供シ苧麻ニ代
用ス又燒灰シテ出血ヲ止ムトアリ按スルニ此
物ハ即チ附考ノ革^{カク}寸^シ路^ロノ谷^コ寸^シ蓋^{カシ}シ谷^コ寸^シノ經年
ノ者ナリ埒^ハ莫^ム畢^ヒ烏^ウ斯^スノ説ニ東印度ノ諸嶋ニ高
サ人立ニ等シク二三年ヲ保ツト言ル是ナリ谷^コ
寸^シハ原来亞臘皮亞巴兒西亞等ノ暖帶ノ地産ナ
リコレヲ意太里亞及亞墨利加諸洲正帶ノ地方
ニ移シテモ亦能蕃殖シ一年ニメ花実ヲ結フト

雖氏冬寒ニ堪ヘスメ終ニ枯凋シ年々ニ種蒔ス
暖帶熱國ノ地ニ於テハ數年ヲ經テ長大ニ至ル
ト見ヘタリ茄番椒等ノ類モ亦然ナリ布留缺涅
樹ノ土地産處培養ニ由ルト言ヘルト徴スベシ
是暴莫谷寸ト称スベキモノ也然氏漢人ノ所謂
木綿ニハアラス

○第三種ハ兀斯悉ヒ必烏莫吸兒率即莫ト云フ
即子粗糙革寸ノ義ナリ其葉五缺裂背腺條アリ
枝及葉茎共ニ粗糙ニモ毛茸アリ西印度ヨリ来

ス所ニノ佳品ノモノナリ篤烏兒涅覆兒禿布留
缺涅質烏斯ハ灌木様革寸暴莫ト称ス拔尔撲烏
姪鳴ニ産ス人是ヲ暹羅革寸ト名ツク昔子ヲ結
ブ今西印度ニ繁殖スル所ノ細密革寸ハ諸厄利
亞及松即察ヨリ西印度へ輸送スル所ノモノナ
リ歷反土ニ生スルモノヨリ稍大ナリ或ハ其土
地ノ培養ニ由テ其形状及葉ヲ異ニスルナリ最
細革寸ハ牙賣加ニ産ス又一種此處ヨリ低シテ
妥生スル灌木様革寸暴莫ヲ見出セリ其大サ桃

又榛ノ如シ又一ハ標ノ高サナルヲ見出セリ伯
西兎及亞墨利加ノ諸洲ニ産ス彼処ニ自生ノ者
ト見ヘタリ人コレヲ度ルニ十度ニ當ルアリ此
ハ原来革寸暴莫ヨリモ最モ勝レテ高大ナル者
ナリ實モ如何ニモ大ニ綿モ如何ニテ粗糲ニ生
スルナリ爰ニアル處ノ低革寸ハ諸嶋中ニ生ス
ル所ノ高サ人立ノ如クナルモノニメ全世界ニ
蕃殖スル所ノモノナリ支那ニ於テモ專ラ紐メ
絲ニ造ルモノナリト今爰ニ細密革寸ト云フハ

附考別爾陸居鳥斯ノ説ニ印度及亞臘皮亞ノ谷
寸トイヘルモノナルベシ是亦草綿ノ一種ナリ
○第四種ハ兀斯悉乙必烏莫列立及和率莫ト云
即チ護知乘斯的革寸暴莫巫祝木綿ノ義ナリ然
レ其異常ナル接名辞ハ論スルナシ其葉三缺
裂ニメ背一腺條アリ枝ニ黒斑点アリ是今來ノ
奇種ナリ灌木ニメ枝ニ細密ナル毛茸アリ葉基
ニモ黒斑点アリ葉心臟様ニメ三ニ深裂ス實熟
スレハ五ニ缺裂メ尖銳ナリ中心ニ一腺條アリ

印度ニ産ス布留缺涅質鳥斯ハ布陸霏田設ヨリ
始テ出タルヲ爰ニ移シタルナリト是レ附考ノ
東西印度ノ縛而暴綿ノ別種ナルモノ歟然レ其
形状ヲ記サレハ確定シ難シ

○第五種ハ兀斯悉ヒ必鳥莫拔兒拔田設ト云フ
即チ拔兒拔度斯嶋革寸暴莫ノ義ナリ其葉三凸
ニノ鋸齒ナシ背ニ三腺條アリ布留缺涅質鳥斯
ハ其幹灌木様ナルヲ以テ第一種低草生革寸掘
活斯ニ充タリ林柰斯ハ葉心ノ背ニ三腺條アル

ヲ以テ尋常革寸ニ充テス當ニ異種ナルモノト
ス彼末章ニ出ル葉ノ三裂スルト云モノハ拔兒拔
度斯或ハ西印度ノ地方ニ於テ子ヨリ分婉スル
一疑ナリ而メ一二年ノ後ニ南亞墨利加西印度
ノ海濱ノ地及ヒ我地方クロキノ諸地ニ革寸圃
ヲ始テ墾シ其処ニ美好精密ノ革寸ヲ分婉スル
一莫ニ天幸ト謂ベシ但歷及ヒ土ニ於テハ率カ納
臆謁斯設欬樸及別爾備說ノ革寸ノ價高辣斯撒
鳥寫ヨリモ一倍セリ又斯強兒納ヨリモ四倍セ

リ千七百五十三年ヨリ千七百七十年ニ至マテ
率カ納^ナ覓ヨリ此地ニ運送スル^ナ六萬八百^モ苞^モ田^モ
一^モ苞^モ田^モハ一貫五百目ナ
レハ一億二千貫ニ當ル
餘ナリト是亦草綿ノ一
種ナリ

性効 **主療** 金瘡出血ニ谷寸燒灰トナシ傳ス猶紙灰
ヲ用ユルガコトシ○子核咳嗽呼吸促迫ヲ療シ又
淫情ヲ催ス是レ大ニ精液ヲ益スカ為ナリ○実ヲ
壓榨シ油ヲ取り雀斑ヲ除キ皮膚ノ斑點ヲ去ル

附考 谷寸ヲ火中ニ投シ燒薰シテ鼻中ニ嗅入ス

レハ婦人子宮衝逆困難ヲ救フ○襪爾襪里亞人
ハ金瘡及潰瘍ヲ蕩滌スルニ谷寸ヲ酒ニ浸シテ
蘸^ハ熨ス○厄入多人ハ金瘡潰瘍ニ綿^{ホツシモソ}撒糸ヲ用ズ
暴莫谷寸ヲ取テコレヲ用ユ此物ハ小灌木ノ者
ヨリハ細密ナリ○又コレヲ用テ血ヲ止ム○此
物ノ子ハ胸部諸冒寒ニ與テ良ナリ○厄入多ノ
地ニテハ此物ノ子ヲ水ニ浸シ其稠粘水液ヲ取
テ諸焮熱及諸毒物ノ腸胃ヲ浸蝕スルヲ治ス○
又此ノ暴莫谷寸ヲ用テ胸中冒寒傷冷毒ノ酷烈

鹹液ヨリ發スル所ノ咳嗽ニ用ユ○或人ノ考ニ
此物赤痢ヲ治スルヲ以テ地和思谷里迭斯ノ哈
納發立烏莫トス○谷寸箇祿乙鐸根ハ肝腎ニ臟
ニ良ナリ然氏胃ト頭腦ノ諸病ニハ宜シカラズ

第十四章 溜兒箇祿乙鐸 一名比刺兀

名義 今時ノ本草家ハ比刺兀ト稱ス或ハ亦撒陸設
而刺ト云フ別ニ一種撒陸設而刺アリ本條ニ於テ
說ベシ或人ハ哈納發立烏莫ノ一種ナルヲ以テ直
ニ哈納發立容ト稱ス熱爾瑪尼亞ノ人ハ溜兒葛樂
烏禿ト稱ス布立釋斯ハ乙莫撒亞ト名ツク彼書第
二十四卷十九章ニ曰苛兒拔乙莫撒亞ハ繭細色ノ
草ニシテ其形邏設末列印^香迷迭ニ似テ枝茂リ蒼樣ノ
モノヲ生シ後其傍ヨリ又蒼樣ノモノヲ出ス故ニ

コレヲ「イ莫撒亞ア」「イ兒羅斯ス」一名恩ト名ツク是レ其
新花老花ノ爲ニ壓迫セラレ、カ故ニ自ラ花傍ヨ
リ長茎ヲ抽テ其末ニ復花ヲ著スルナリ其老花ヨ
リ超出スルヲ以テ禮節ナキ實ト云フノ義ナリ○
此草茎軟毛茸アリテ稍谷寸ニ近シ今コレヲ三種
ニ分ツ第一種第二種ハ共ニ大溜兒箇祿乙鐸ナリ
第三種ハ小溜兒箇祿乙鐸ナリ

附考 業謁埜爾蘭社ニ於テハ縷兒箇祿乙鐸ト云
又邏度覓立損箇祿乙鐸ト云フ赤痢ヲ療スルカ

故ナリ此病ヲ熱爾瑪尼亞ニテハ劣列「ル列レ」又碌禿縷「ル禿ル」
兒ト云フ

總說 凡此草好テ不毛ノ沙地ニ生ス空墜森林荒田
等ニモ亦コレアリ五月ヨリ八月ニ至テ花アリ摘
テ布褥ノ用ニ供ス

○第一種大溜兒箇祿乙鐸ハ高サ一咫許或ハ尚長
スルモアリ三四茎ヲ出ス葉狹長花茎共ニ柔毛ア
リテ蜘蛛ノ網ヲ繞フガ如シ花ハ茎頂ニ生ス醵黃
色初花ノ傍ヨリ小長茎ヲ抽テ又其茎頂ニ花ヲ生

又後絮トナリ風ニ隨テ飛フ根ハ鬚多シテ細毛ノ如シ

○第二種大溜兒リョウニ箇コ祿ロ乙イ鐸トハ莖葉共ニ繭細色ニメ柔毛多ク形狀全ク第一種ニ似タリ但花莖頂ニ著セス莖傍ノ葉後ニ固著スルヲ異トスルノミ花絮トナリ飛散スル一亦第一種ト同シ

○第三種小溜兒リョウニ箇コ祿ロ乙イ鐸トハ其形狀第一種ニ同ク莖葉柔毛アリ花莖頂ニ著ス然レ稍低クメ小ナリ

附考 最小溜兒リョウニ箇コ祿ロ乙イ鐸ト

羅別兒ラベニコレヲ哈納發立烏莫カハナハツウモ未ミ尼ニ繆ミウ莫モト称ス花

ハ亞ア苛カ羅ラ涅ニ青キョウニ似テ莖頂ニ附著ス

△正恭曰此物ハ十二章ノ附考第四種山ヤマ哈納發

立タテ烏ウ莫モナリ

○熱爾瑪尼亞ノ溜兒リョウニ箇コ祿ロ乙イ鐸ト

羅甸ラテンニ比刺ヒサ兀ゴ熱ニ爾ル瑪マ尼ニ加カ亞ア爾ル的テ樂ラ設セ君キミ去キ莫モ覆フ

立タテ亞ア孚フ陸ロ加カ杏ダト名ツク花ハ葉ニ密著ス

△正恭曰此物第十二章ノ附考第一種亞墨利加

ノ哈納發立烏莫ナルベシ

○諸厄利亞長葉溜兒箇祿乙鐸

羅別兒コレヲ哈納發立烏莫諸厄利亞久莫覆立和

論及和列ト称ス抹質玉留斯ハ第二種歷恩禿剝

地容ニ充ツ誤ナリ

△正恭曰物印曼ニ長葉ノ者ニ種アリ一ハ哈納

發立烏莫留的烏莫谷末亞烏列亞ト云フ第十二

言ノ附考薄訥屈印ノ福斯的和箇論ニ近シニハ

哈納發立烏莫刺質覆立烏莫亞墨利加釋莫ト云

フ全ノ附考第三種布洛的亞鳥ノ一種ニシテ共

ニ其葉長大ナリ前條ノニ圖ニ撮テ考ベシ

性効其性燥ニメ微シク聚斂ノ功アリ

附考其草ヲ以テ兩石ノ中間ニ夾ニ相磨スル片

ハ熱スルモノナリ是性燥ナルヲ微スベシ○

一説ニ諸異類敢テコレニ觸ル、トナシ

主療諸ノ癌及ヒ乳癌ニ此草ノ蒸露ヲ用ユ最功ア

リ何則癌ノ隱匿セルモノ潰ントスルヲ禦ク日々

木綿布ニ浸シ貼スベシ或ハ曼斯窩耳杜葉ニ此蒸

露ヲ浸シ貼ス癌ヲ驅逐スルニ大ニ益アリ

附考

西諸厄利亞ノ農民此草ヲ搗キ油ニ浸シ煮

テ打撲青腫ヲ治スト羅別兒ノ說ナリ○布令悉

捌列乙吉ニテハ此草ノ自然汁ヲ酒ト乳汁トニ

和メ喉風ヲ治ス甚功アリ何則羅別兒ノ說ニ此

病ヲ患フル者此藥ヲ服メ死スル者ナシ若此病

ニシテ此藥ヲ服サレハ死スルモノト知ベシ

此根ヲ煎服スルモ亦佳ナリトイヘリ

第十五章

大撒陸設而刺

名義

撒陸設而刺

意太里亞。伊
斯把尼亞。

拿掘而箇録乙鐸業
堙爾

杜蘭

今世ノ本草家コレヲ撒陸設而刺ト称ス然レ氏大小

二種アリ故ニ次條ト別ンガ為ニ撒陸設而刺末玉

兎ト称ス或人ハ亞烏カリ刺繆カスト名ツク鼠耳

ノ義ナリ然レ氏真ノ繆乙線窩耳ニ非ス

附考

或人ノ說ニ此拿掘而箇録乙鐸ヲ以テ洛久

納ノ福陸斯質鳥莫トス拂郎察人ハ和列乙而歷

姪^デ樂^ラ禿^ト和^ヲ烏^ウ蕪^ソ烏^ウカ^カ斯^スト^ト称^ス又^又哇^ワ斂^シ人^ニハ^ハ撒^ハ而^ル苛^ヘ兒^ル的^ト又^又苛^ヘ而^ル苛^ヘ兒^ル的^トト^ト云^ク意^イ太^タ里^リ亞^ヤ人^ニハ^ハ百^ハ陸^ロ悉^シ納^ナト^ト云^ク諸^シ厄^エ利^リ亞^ヤ人^ニハ^ハ木^モ烏^ウ設^セ謁^エ亞^ヤ列^レト^ト云^ク

△正恭曰「福陸斯^{フク}實^シ烏^ウ莫^ムハ^ハ第^{ダイ}四^シ卷^{クワン}二^ニ十^{ジュウ}六^{ロク}章^{シヤウ}第^{ダイ}十^{シウ}

九^ク卷^{クワン}三^{サン}章^{シヤウ}四^シ章^{シヤウ}ノ^ノ條^{ジョウ}ニ^ニ於^キテ^テ參^{サン}考^{コウ}ス^スベ^ベシ^シ拂^{フキ}郎^{ロウ}察^{サツ}諸^{シヨ}

厄^エ利^リ亞^ヤ名^ナハ^ハ鼠^{ネズ}耳^{ミミ}ノ^ノ義^ギナ^ナリ^リ哇^ワ斂^シ意^イ太^タ里^リ亞^ヤ名^ナハ^ハ撒^ハ

陸^ロ設^セ而^ル刺^シノ^ノ訛^シナル^ルベ^ベシ^シ按^アニ^ニ撒^ハ陸^ロ設^セ而^ル刺^シハ^ハ毛^{モウ}刺^シ

アル^ルノ^ノ意^イナ^ナリ^リ又^又拿^ナ掘^ゲ而^ル箇^コ祿^{ロク}乙^イ鐸^{トク}ニ^ニ同^{ドウ}名^{メイ}アリ^リ本

條^{ジョウ}ノ^ノ拿^ナ掘^ゲ而^ルハ^ハ釘^{テイ}ヲ^ヲイ^イフ^フ其^キ毛^{モウ}刺^シアル^ルヲ^ヲ云^クフ^フ欵^{ケン}又

葛^カ離^リ和^ワ琵琶^ヒ而^ル刺^シ達^{タク}モ^モ拿^ナ掘^ゲ而^ル箇^コ祿^{ロク}乙^イ鐸^{トク}ノ^ノ名^{メイ}アリ^リコ

レ^レハ^ハ其^キ根^{コン}ノ^ノ香^{カウ}拿^ナ掘^ゲ而^ル香^{カウ}ニ^ニ似^シタル^ルカ^カ故^コナ^ナリ^リ若^{ニク}同

ケ^ケレ^レ氏^シ物^{ブツ}異^イナ^ナリ

總說 此草熱爾瑪^{ニルマ}居^キ亞^ヤ業^{ヤク}謁^{エツ}埜^ヤ爾^{ニル}蘭^{ラン}杜^トノ^ノ高^{カウ}阜^フ土^ト堤^{テイ}及

曠^{クワン}野^ヤ陸^{ロク}田^{テン}等^{トウ}ニ^ニモ^モ亦^{オク}コ^コレ^レアリ^リ細^{サイ}莖^{セイ}毛^{モウ}刺^シアリ^リテ^テ地^チニ

蔓^{マン}延^{エン}ス^ス處^チ々^々ニ^ニ細^{サイ}鬚^ス根^{コン}ヲ^ヲ傍^{ボウ}生^{セイ}ス^ス葉^{エフ}長^{チヤウ}濶^{クワク}ニ^ニメ^メ大^{ダイ}ナ^ナラ

ス^ス毛^{モウ}茸^{キョウ}アリ^リ面^{メン}綠^{リョク}色^{シキ}ニ^ニメ^メ背^{ハイ}白^{ハク}ヲ^ヲ帶^{タイ}フ^フ春^{チュウ}ヨ^ヨリ^リ季^キ夏^カニ


至^シテ^テ花^カアリ^リ小^{コウ}莖^{セイ}頂^{テイ}ニ^ニ發^{ハツ}ス^ス黃^{ワウ}色^{シキ}ニ^ニメ^メ發^{ハツ}霏^ヒ吉^{キツ}斯^シ箇^コ祿^{ロク}

乙^イ鐸^{トク}ノ^ノ類^{レイ}ニ^ニ似^シテ^テ稍^{シヤウ}小^{コウ}ナ^ナリ^リ後^{コウ}絮^ソト^ト為^ステ^テ風^{フウ}ニ^ニ隨^ズテ

飛散ス其絮毛ノ本ニ子アリ根ハ長サ一指許ニシテ鬚多シ

△正恭曰撒祿設而刺ハ林奈斯ノ説ニ負辣矢鳥
莫ノ第六種ニ収メ即チ撒祿設而刺一名繆乙線
窩耳ト称ス葉楮圓ニノ鋸齒ナク背ニ毛刺アリ
葉間ヨリ一花莖ヲ出メ安生ス政邏巴諸洲及業
謁埵爾蘭杜ノ乾燥沙地ノ原野ニ生スコレヲ尋
常ノ繆乙線窩耳ト名ツク是其葉毛茸多ヲ以テ
ナリ諸洲ノ方言皆是鼠耳ノ義ナリ然氏哇歛語

ニ苛而苛的ト云ハ羅甸語ノ撒陸設而刺我カ地
方ニ拿掘而箇祿乙鐸ト云ニ同シ兀鳥按ノ説ニ
從ハハ此地ニ生スルハ亞兒卑數ノ者ヨリ高シ
一拇指半ナリト然氏最小ナル草ニモアラズ是ハ
我カ近傍ノ沙堤ニテ多見タリ其細莖ヲ生スル
長サ五寸許其末ニ粗穉ナル黒毛刺茸ヲ發シ
小花ヲ保ツ内黄色ニメ外赤色又淺青蓮ヲ帶フ
又兀尔的尔ノ説ハ者斯蘭杜ノ原野曠豁ナル森
中ヨリ此物ノ異常ナルヲ見出シタリト又涅法

ノ海上諸嶋ヨリモ見出シタリ  ノ説ニ此産
處ヲ辨スル₁甚詳ナリ枯燥ノ地ニ於テハ小草
ニメ葉ナキ一花小茎ヲ出ス肥土牧地及滋潤ノ
地ニ於テハ最長大ニ至ル各茎ノ末ニ三四花ヲ
著ス或ハ亦其枝ニ小狹葉ヲ生シ或其葉両辺滑
澤ニメ下ニ多白毛茸アリト見ヘタリ按スルニ
林奈斯ノ説トコロハ其大旨独度涅烏斯ノ説ニ
依テ記セリ然レ兀尔的尔ノ説ヲ舉タルヨリ以
下ノ文ハ別種ノ物ト思ハル今独度涅烏斯ノ圖

説ニ就テ考ルニ撒陸設而刺_ラハ花黄色ニメ負辣_ラ
矢烏莫_△ニ似テ稍小ナリトハアレ_レ其形状全ク
負辣矢烏莫_△ノ種類ニアラス又附考ニ載スル所
ノ諸種ハ唯西齊里亚ノ撒祿設而刺_ラノ三稍本條
ニ近ケレ_レ其他ハ負辣矢烏莫_△ノ種類也又物印
曼_レニハ亞烏カ_△又刺繆カ_△スノ第一圖ヲ舉一名和_ラ
列_レ乙而歷_レ姪_△蘇烏カ_△スト云テ林奈斯ノ負辣矢烏
莫_△一名撒陸設而刺_ラト是ニ執テ考レハ負辣矢_△
烏莫_△ノ種類ニモ亦繆乙線窩耳_△ノ名アルヲ以テ

附考中ニモ亦負辣矢鳥莫ノ種属ヲ混同セシカ
終ニ後世ノ本草家真ノ撒陸設而刺ヲ知ラスノ
物印曼ノ第一圖亞鳥カリ久刺繆カリスヲ以テ撒陸
設而刺ニ充テ負辣矢鳥莫ノ種類ニ属セシ者ナ
ルベシ故ニ物印曼ノ圖ヲ擧テ參考ニ備フ

附考大撒陸設而刺ノ別種

凡各處ニ於テ聞ク所ノ大撒陸設而刺ト称スル
モノヲ記ス

○第一 小冠狀大撒陸設而刺

合備烏斯谷留莫納ノ撒陸設而刺末玉兒俞莫別
而立翕辣ト称スルモノナリ此草亞彪倫ノ中ニ
多生ス其茎尋常ノ者ヨリ長ク高サ三尺許本滑
澤ニメ末ハ花ニ至一テ毛茸多ク綠色ニメ直立
圓ニメ中空常葉ヨリモ最小ナル三葉ヲ以テ周
圍ス根ハ巨メ白鬚根多ク附著ス葉ハ初短ク漸
ニシテ長シ面綠色ニメ毛茸多繭細色ナリ背ハ
微白ヲ帶テ毛茸ナシ花ハ冠狀ヲナシテ一處ニ
附著大サ堀劣物和名羽衣草花ノ如シ其他ハ負辣矢

鳥莫ト同シ全体ニ白汁アリテ乳ノ如シ甚苦カ
ラス子ハ絮トナツテ謝散ス

△正恭曰此物ハ林奈斯ノ負辣矢鳥莫ノ第十種
布樂木見率莫又掘苦諾悉ノ名ヲ接ス是其根形
ニ因テ名ク其葉楷同ニ微鋸齒アリ花茎小枝
ヲ生シ頂ニ花ヲ發ス是大繆乙線窩耳ナリ止波
里或ハ歐邏巴ニ産ス又劣斯蘭土ニ稀呂アリ其
鼠耳ニ似タルヲ以テ依蘭地ニ於テ斯名ツケタ
ルナリ屈脉令君其根葉ノ際ヨリ一尺ヨリ二三

尺ニ至ル花茎ヲ發スルヲ見出セリ其後發爾歷
兒君ハ蘇赤微亞ニ於テ其高サニ尺許一茎直立
シテ頂ニ穗ヲナシ細黃花ヲ發シ茎附ノ滑澤ナ
ル青葶ノ中ニ薊狀ヲナスヲ見出シタリトアリ
是物印曼ノ亞鳥カリ久刺繆カス一名橄陸設而刺
末玉兒謁列郭達ナリ今彼圖ヲ以テ補之ヲ

○第二 繆細色橄陸設而刺

谷留莫納ノ說ニ此物ト鳥立印ノ巖石上ニ生ス
乳汁ノ如キ白液ヲ含ム根ハ黑色ニメ黃色ナル

クロキ ヲ覆ヘリ葉ハ圓ニメ四五葉ヲ著ス初生ハ
圓ク漸ニ措圓ニメ狹長ニ至ル少シククロキアリ
甚夕厚メ繭細色ノ毛茸ヲ覆ヒ鼠及獸類ノ耳ニ
似タリ茎ノ高サ一尺許圓ノ毛茸アリ葉間少ク
傍枝ヲ生ス茎頭濃毛茸ノ蒼様ノ者ヲ生シ黄花
ヲナス子ハ絮トナツテ飛散ス此物味苦カラズ
メ燥ナリ且尋常繆乙線窩耳ノ如ク物ニ粘著ス
ルナシ但繭細色ナルノミ後ニハ子殻ニ葉ノ
附タルノミ

△正恭曰此物林奈斯ノ負辣矢烏莫ノ第一種印
葛^カ耨^ミ莫^ム又掘^キ離^リ斯^ス共ニ繭細^ノ名ヲ接ス其葉披針
様蒙茸トノ微鋸齒アリ花ハ一茎一花蘇亦微亞
及度那鳥ノ高山ニ生ス故ニ郭留識鳥斯ハ山^バ癸^ハ
霏^ヒ吉斯^ス箇^コ祿^コ乙鐸^ト名ツク其巨キ根際ヨリ繭細
色ノ一尺許トアルモノ是ナリ前ニ舉ル所ノ物
印曼ノ第一圖ハ此物ト同種ニメ唯繭細色ナラ
ガルモノ也此草ノ形状ハ和名ウグサ一名フジ
サハキクニ近シ蘭山子ノ説ニ本草陸草類狗舌

草ニ充ツ初生地ニ塌テ生ス其葉狹長ニノ蒿昔
葉ニ似テ厚ク茎葉共ニ白毛アリテ絮ノ如シ四
月ノ頃一茎ヲ抽テ内空ニメ茎末ニ四五花ヲ著
シ小葉互生ス花大サ錢ノ如ク花心共ニ黄色後
トナツテ飛散ス原來ハ水草ナレト陸地ニモ生
スコレハ白毛少ナシ山生ノモノハ苗小ニシテ
白毛ナシ此自然汁ヲ絞テ飲メハ能骨髄ヲ治ス
故ニウグサト名クルヨシ大和本州ニ見ヘタリ
此物ハ一茎一花ナレト或人ノ説ニ枯燥ノ地ニ

於テハ小草ニメ葉ノナキ一花小茎ヲ出ス肥土
牧地及滋潤ノ地ニ於テハ最長長大ニ至ル各茎
ノ末ニ三四花ヲ著ス或ハ亦其枝ニ小狹葉ヲ生
シ或ハ其葉兩辺滑澤ニメ下ニ多白毛茸アリト
アレハ決メ狗舌草ナルベシ

○第三 甘笋亞ノ繆乙線窩耳

羅甸ニコレヲ亞烏力久刺繆劣斯。說列質葛ト称
ス葉ハ羅別兒ノ按遮而立斯。歷救未能撒ノ如ニ
シテ但綠色厚ク尖リ毛茸アリ中心ノ茎側ヨリ

撓ニタル柔荑ヲ安生シ陸絀斯悉立蝮察ノ如キ
 小花ヲ著ス蜜蠟色後小莢ヲ結フ圓曲シテ茶褐
 色毛茸アリテ狀小鼠耳ノ如シ故ニ繆乙鮮窩耳
 ト稱ス子ハ腎臟ニ似タリ又亞烏カリ久刺歷トカ
 斯ト云フ是保鮮窩耳兔耳トノ義ナリ根小ニメ
 黄色味甘殆ト甘草ニ似タリ後ニ微シク辛熱ノ
 氣アリ故ニ此草ノ蒸露ヲ以テ勝レリトス
 △正恭曰此物林奈斯ノ「負辣矢烏莫」ノ第七種「
 備烏莫」又的惟翁喇兒共ニ疑ハノ名ヲ接スル者
シキ義

ナリ其葉全ク秋長ニメ橢圓傍荑ヲ發ス一荑數
 花ヲ著ス歐邏巴ノ南北諸洲ニアリ是物印曼ノ
 亞烏カリ久刺繆劣斯ト黎按土斯列片斯ナリ故ニ
 彼圖ヲ舉テ補之ヲ

○第四 撒陸設而刺悉立另達

拿掘而箇碌乙鐸ノ莢ヲナスモノ也或人ノ說ニ
 三種アリトス第一種ハ葉濶シテ宜ニ適ス長小
 莢ヲナス第二種ハ捌碌孛矢亞莖ノ如シ第三種
 ハ的斯建斯箇碌乙鐸莖ノ如シ共ニ別種トスル

モノナリ

○第五 西齊里亞ノ橄陸設而刺

羅別兒ノ説ニ此物地ニ附テ叢生ス其葉尋常ノ者ヨリ大ニメ美好ナリ厚メ黖白色毛茸アリテ
蠶絲ヲ纏フカ如シ白色可愛茎方ニメ高一尺許
三四節アリ其花ハ未_レ目撃根ハ堅シテ木ノ如ク
鬚多シ

性効 此物性微熱ニメ燥又淨除ニメ収斂ヲ兼タリ

附考 羅別兒曰此全草性聚斂ニメ微温ヲ兼又故

ニ自然汁或ハ煎汁トナシ鋼鐵小カヲ燒キ通紅
ニシテ淬ス片ハ堅硬ニメ能ク金石ヲ切ルベシ

主療 大_{ゴトテ}拿掘_{ゲル}而箇_コ禄_ロ乙_イ鐸_トハ泄瀉及赤痢ヲ止ム斯ノ

如キ諸症ニハ甚驗アリ○又諸損傷ニ貼メ甚功アリ
或ハ損傷茶劑中ニ加入ス○腸中ノ閃屈セルニ
此草水煎メ用ユ最_モ功アリ其病未經_レ日_ヲモノ日々
服スル片ハ速ニ功アリ○耳痛ニ此草自然汁ヲ滴
メ其痛ヲ避ル○拔_バ布_フ質_ヲ斯_ト達_ト薩_サ兒_ニ述_ス斯ノ説ニハ肝
臟ノ病ニ甚効アリ何則此草ノ蒸露ハ肝臟ノ閉塞

ヲ開達シ能其病ヲ愈ス○同説ニ附骨疽ニ最モ効
アリ此蒸露ニ玫瑰蜜シ悉ル而苛ヘ兒ル掘ゲ歷ビ的テ蜜ノ陀陀僧類沒茶
各十六錢水九十六錢ヲ合メ大陽ニ曝ス一三日調
和メ收貯フ

附考此物能ク結石腎痛及ヒ其他腎膀胱ノ諸病
ヲ治ス○懸壅ニ漱藥トナシテ良功アリ○哇カ飲カ
及ハ独ル尋ル屈クノ人ハ此草ヲ舍利別ニ造リ咳嗽勞
瘵及肺臟ノ病ヲ治ス○金瘡ニ此葉乾シ末トナ
シ摻テ能癒ス○此草食用トナシテ能目ヲ明ニ

シ赤眼淚出ヲ治ス

第十六章

小撒陸設而刺

小拿掘而箇祿乙鐸

名義 歷恩禿ト地烏莫密涅留由莫同捌而刺地烏

莫同此草二種アリ共ニ歷恩禿ト地烏莫ニ充ツ厄

勒齊亞ニハ名祿多シ〇地和思谷里迭斯曰歷恩禿

ト地烏莫ハ一種ノ小草ニメ高廿二指許葉狹ノ長

廿二三指毛茸アリ根際ニ至テ毛茸愈多シテ白色

ヲ帶フ莖頂蒼ヲ結フ鍼眼アリテ紫碧花ヲ開ク甚

濡毛多シ子視ヘカタシ根ハ小ナリト此說ニ拠ル

片ハ抹質玉留斯ノ說トコロノ第二種小拿掘而箇

祿乙鐸ニ甚近シ○布立祿斯ノ書第十六卷八章ニ
 又歷恩禿ト地烏莫ト名ツクル一種草アリ又亞
 犁烏斯ノ書第七卷ニ説トコロノ物モ共ニ是次章
 ニ載スル歷恩禿百達龍ニ本條ト同シカラス○
 哈歷禿斯及謁及涅託ハ歷恩禿ト地烏莫ノハハ少
 シモ擧ズ和カ拔悉烏斯ハ歷恩禿百達龍一名歷恩
 禿ト地烏莫トス阿質烏斯ハ歷恩禿ト地烏莫根ノ
 功カヲ記スニ歷恩禿百達龍ノ功ヲ擧タリ彼兩人
 ハ的ニ歷恩禿百達龍ヲ歷恩禿ト地烏莫ニ充タリ

○第一種 撒陸設而刺未訥兒

今コレヲ小拿掘而箇録乙鐸一名小繆乙線窩耳ト

云或人ハ哈納發立容ノ種類トノ山哈納發立烏莫

ト云フ又比刺兀及斯の葛斯矢禿カ那鼠麴ノ如キ

モ共ニ柔毛茸覆フテ齒細色ナルヲ其形状ニ於テ

ハ全ク相近シト雖氏此物ヲ以テ真トスベシ

△正恭曰林奈斯ノ説ニハ此物ヲ以テ哈納發立

鳥莫ノ第四十一種ニ收ノ地和以人莫ニ室ノ名

ヲ附接スコレヲ業謁堉爾蘭社ニ的物謁噓入屈

度邏屈部葉莫ト稱ス此草小花茎ノ直立スル者

ヲ取り其茎葉ヲ裁切シ土塊中ニ混和シ置片ハ

小ナル茎ヲ發ス其雄花ノ者ノミヲ以テスレハ

圓シテ色美麗ナリ其單瓣雌花ノ者ヲ以テスレ

ハ花美ナラズメ狹長ナリ其葉初ハ圓ナレ氏後

延長ス斯ノ如ノ性質何處ニモアリ故ニ二室ノ

名ヲ附接セリ而ノ独度涅烏斯ノ小撒陸設而刺

トシ又哈納發立烏莫蒙達釋莫字陸列祿氏地和

列ト稱ス今コレヲ劣乙掘葛的呵禿ト云ハ松郎

粗繼 掘葛的呵禿 脚

察ノ批度姪葛禿ノ名ニ由ル也又諳厄利亞人ハ
久度物調度一名葛東物調度ト云コレヲ熟尔瑪
尼亞ニ微線縛而ト祿ス是曠野ノ中ニ綿ノ如ニ
繁衍スルヲ云ナリ此名義ハ諳厄利亞語ヲ以テ
基原トス然レ此物ハ總テ哈納發立烏莫ノ中ニ
属スベシ羅甸ニ撒祿設而刺ト云ハ鼠耳ニ似夕
ルヲ以テナレレ小ノ名ヲ附接メ負辣悉烏莫ノ
種類ト分別スル也又其花浅青蓮色薔薇色點紅
白色又斑アルモアリ共ニ茶劑中ニ供スヘシト

云ヘリ然則撒陸設而刺ニ大小ノ接名ヲ以テ分
ツト雖レ自ラ一種ノ物ニ非ス前ノ十二章ノ附
考第六種ノ下ヲ併考スヘシ
○第二種 歷國禿ト地烏莫抹質玉立
是抹質玉留斯ノ拿掘而箇祿之鐸ノ一種トスル所
ノ者ナリ

總說 第一種ハ熟尔瑪尼亞業謁埜尔蘭社ニ最多シ
山頂丘阜高燥ノ地ニ生ス大撒祿設而刺ヨリモ白
色柔軟ナリ葉ハ繭細色ニメ細毛覆フ六七月ノ頃

葉間小茎ヲ抽テ茎頭五六花ヲ攢簇ス車輻状ノ如シ或ハ白或ハ紫赤或ハ黯紫色品類多シ根ハ細メ鬚アリ深ク土中ニ入ル

第二種ハ意太里亞ト熱爾瑪居亞ノ間亞爾卑斯山又苛祿那ノ屬拔爾丟斯山等ノ如キ地ニ生ス是レ抹質玉留斯ノ説トコロニメ其状前種ニ甚相似テ其葉狹長ニメ粗糲毛茸アリテ微繭細色長サ二指指横徑茎粗糲ニメ高サ三四指許茎頂ニ蒼様ノ者濶ガリ著ス花発スル片ハ紫碧ニメ微黯色其中ニ

鍼眼アリ根ハ前種ニ同シ

附考 撒陸設而刺及歷恩禿ト地烏莫ノ種類

○發設附土ハ是山哈納發立烏莫ノ白花ノ者也其状小撒陸設而刺ニ甚近シ又山哈納發立烏莫ノ紅花ノ者ハ独度涅烏斯ノ此章ノ第一圖ニ同シ印葛兒那禿別兒屈哈納發立烏莫ハ全ノ第二圖ニ同シ

△正恭曰上文ニ所説ノ三種ハ哈納發立烏莫ノ附考第四第五第六種ノ下ニ辨ズ

○鬣武聞附土義ナリ獅脚ノ羅甸ニ歷恩禿ト地烏莫ト
イフ葉狹長ニメ細毛小ニメ繭細色末尖アリテ
哈納癸立烏莫及斯的葛思矢禿加那鼠麴ヨリモ
葉潤シコレヲ独度涅烏斯ハ抹質玉留斯ノ歷恩
禿ト地烏莫ト称セリ

○羅別而前ニ所説ノ諳厄利亞ノ溜兒箇祿乙鐸
ハ抹質玉留斯ノ第二歷恩禿ト地烏莫トハ別種
ニアラス

△正恭曰此説ニ拠レハ歷恩禿ト地烏莫トハ椒祿

設而刺ニアラス地和思谷里迭斯及抹質玉留斯

ノ所説ニメ亦約舌草ナルベシ

○羅別兒ノ小歷恩禿ト地烏莫トハ一茎高サ三掌
許葉ハ山哈納癸立烏莫ト全ク相同ノ黧白色毛
茸厚ク覆ヘリ小花茎頂ニ著ス醜黄色又山哈納
癸立烏莫ニ似タリ根ハ小ニメ木ノ如シ而ノ此
圖ヲ摹ク

○甘茅亞ノ歷恩禿ト地烏莫トハ郭留識烏斯ニ贈
トコロニシテ二名ニ分テリ或ハ歷恩禿ト地烏
莫設列質葛甘茅亞ト名ツケ又葛達南説谷兒拙

悉シ氏名ク一種ノ小草ニメ儻ハ狹葉物謁及部烈
狹葉ノ種類ナラン初生根ヨリ柔軟毛茸アル
車前ノ種類ナラン初生根ヨリ柔軟毛茸アル
狹葉ヲ発シ三腺條ニメ側ニ苧麻ノ如キ毛ヲ著
又其間ヨリ粗糲ナル短小軟荖ヲ生ス節アリ白
茸ヲナス中心ニ鍼眼ニル小花ヲ著ス共ニ小荖
ニ斜著ス其状鳥類及獅子ノ爪ノ如シ根ハ茶褐
色ニシテ鱗砌ヲナシ毛鬚アリテ漸ニ尖レリ歴
恩ト秃ト地鳥莫ハ又百斯歴和尼斯ト名ク是即鬣新
武聞附土獅脚トノ義ニメ或人ハ亞而式未而歷レ

トス葛達南説ハ本編彼條ニ於テコレヲ記ス○
今此ノ小拿掘而箇録乙鐸ノ功用ヲ考ルニ葛思
秃兒迹蘭的ノ説ニ地和思谷里迭斯ノ歷恩秃ト
地鳥莫ノ功ナリ而メ其他ハ葛達南説ノ功ヲ記
セリ予輩ノ此功用ヲ定メタルハ唯コレヲ貼シ
テ小瘡及瘍腫ヲ消除スルノミ又此物ヲ頸ニ懸
テ淫情ヲ催スコレニ依テ葛達南説ノ名アル
ヲ知ルベシ

性効 **主療** 凡テ此諸草ヲ藥用ニ供スルト無シト雖

氏亦コレニ乾燥ニシテ聚斂ノ性アル者ナリ

△正恭曰林奈斯リナウスノ説ニ此草舍利別ニ造リ小児

胸病及咳嗽ノ冒寒傷冷毒ヨリ発スル者ニ與テ

功驗アリ又劣斯蘭スランド土人ハコレヲ内服外用シテ

止痛ノ劑トストイヘリ

第十七章 歷應禿百達龍

名義 歷應禿百達龍 厄勒樂百由莫甸 擗把苛兒久留
莫同 設綿歷和釋莫同 百斯歷和屈釋斯 同部劣末力
亞同

厄勒齊亞人ノ歷應禿百達龍ト云 獅葉ノ義チリ布
立釋斯モ同称ス亞彪犁烏斯ノ歷恩禿ト地容ハ前
章ノ物ヲ云別ツベシ

意太里亞ニハ歷應禿百達龍ト称ス柳爾力烏斯ノ
說ニハ藥局及採藥師ハ擗達列和屈斯ト云フ即擗

立ニカテウ 脚ノ義ナリ又同名ノ物アリ羅甸ニ亞而式未而歷
ト云コレト異ナリ○厄勒齊亞國ニ異称多シ

附考 歷應禿百達龍ニ同名アリ貨而縛兒的而延

索ニモ亦此名アリ又木使ノ種類及ヒ亞而式未
而歷ニモ百斯歷和屈釋斯又鬣武聞附土ノ名ア
リ○布立釋斯ノ歷應禿ト地烏莫ハ独度涅烏斯
ハ此物トス又歷烏說和弄一名杜離百禿弄此称
ス

總說 此草曠野田圃及ヒ穀田ニ生ス意太里亞或ハ

ト鳥カリア^ポ禿斯葛那^カ甘第亞^カ及ヒ東南ノ諸嶋ニ最多
シ葉潤ノ菘ノ如ク缺裂アリ莖高サ一咫許尚稍高
キモアリ多枝ヲ分チ末ニ微赤色ノ花アリ後莢ヲ
結フ中ニ子アリ失^シ説^ル兎^ノ大巢菜^ノ子ニ甚相似タリ
根ハ大ニメ塊ヲナス^ト蕪菁^ノ如ニシテ皮黒色ナ
リ百^パ篤^ト塙^ト斯^ト別^ル而^ル陸^ロ屈^ニ鳥^ウ斯^トハ冬花ヲ開ト云ヘリ

附考全ノ別種

此草地和思谷里迭斯ノ^レ歷^レ應^ト禿^ト百^パ達^ト龍^トニ其根實
甚相似タリ然^レ花葉大ニ異ナリ此國ニ種子ヲ

蒔^レハ長キニ嫩葉ヲ出シ葉辺卷縮ス然^レ花長セ
ズシテ枯ル厄勒齊亞及ヒ^レ亞^レ歷^トノ^レ近傍ニ生ス
彼地ニテハ^レ亞^レ斯^ト刺^ト部^トト云フ其大ナル根ヲ取り
末トナシ衣類ノ汚点ヲ除ク

性効哈^ガ列^レ釋^ス曰^ク第三度ノ^レ燥^ニメ^レ温^且消化ノ功アリ

主療地和思谷里迭斯ノ^レ説^ニ蛇^ノ腹^酒ヒ^テ根^根酒^ニ

既服ス瘵ハ速ニ其痛ヲ除ク又腰部痛風ニ水鏡法

ニ用テ功アリ

附考 布立糝斯ノ歴應禿ト地烏莫ハ即チ此物ニシテ枯瘦ノ原野ニ生ス根ハ下利ヲ止メ又身体中ニ膽汁多キ症ニ四錢目ヲ蜜水ニテ服スレハ能コレヲ驅除ス又此子ヲ奠メ服スルハ危懼困難ノ惡夢ヲ見セシム

第十八章

大倏立和禿祿撒容

名義

倏立和禿祿撒烏莫羅斯箇児撒烏劣斯全倏立

和禿祿撒容

厄勒齊亞斯箇児撒烏祿斯全嵩涅聞鐸業謁

蘭此草大小ノ二種アリ其大ナル者ヲ此章ニ拳ク

小ナル者ハ次章ニ説ク其大ナル者ニ種アリ共ニ

業謁垓爾蘭杜ニ缺烈孛禿箇祿乙鐸ト云フ○此ニ

倏立和禿祿撒容ト名タル太陽ニ向テ花アルノ謂

ニアラス夏日暑ノ時ニ當テ花アルカ故ナリ何者

厄勒齊亞ニテ太陽ヲ倏立和斯ト云フ旋轉シ来ル

ヲ禿祿百ト云フ是大陽赤道ヲ去ル一最モ遠ニ至
レハ再復赤道ニ旋轉シ来ルノ時夏日ノ暑ニ當テ
花アルヲ以テ即チ右ノ語ヲ連綴シテ倏立和禿祿
撒容ト名ツタルナリ是大陽歸来又大陽旋轉ナト
言フノ義ナリ○斯箇兒撒烏祿斯ト名ツタルハ其
末鈎曲ノ鬚尾ニ似タルガ爲ナリ○柳尔立烏斯ノ
說ニ採藥家ハ倏兒拔于吉カト称ス即チ缺烈孚禿
箇祿乙鐸緞草トノ義ナリ

附考大倏立和禿祿撒烏莫ハ業謁埵尔蘭杜ニテ

ハ缺烈孚禿箇祿乙鐸ト称ス是其花ノ状茎ノ外
方ニ鈎曲シテ鰓及鬚ノ尾ニ似タルヲ以テ名ツ
ク又細小綠色ナル子狹長ニ密著ス是吸兒斯
ニ似タリ因テ名ツク然モ其他ノ數名ハ厄勒齊
亞ノ倏立和禿祿撒容ヨリ出ルトコロニモ皆是
大陽旋轉ノ義ナリ或ハコレヲ禿兒涅索ルト云
モノ多シ別而陸尼烏斯ハコレヲ甘第亞ニテ倏
立和郭祿達ト名ツク或ハ苛兒劣葛力亞ト名ク
ク是武辣點箇祿乙鐸疣贅草ノ義ナリ○此草一

夕ヒ園圃中ニ種蒔スレハ年々ニ自生ス伊斯把
尼亞ノ地ニ多シ土人秃兒涅索爾薄樸又秃兒那
索爾薄復ト云フ○今世ノ本草家ハ種々ノ草ニ
倭立和秃祿撒烏莫ノ名ヲ記セリ其他ノ物ニ於
テハ孚陸斯索立斯向日倭兒拔索爾斯低質亞立
斯全上ノ一種歟倭立和斯箇撒烏莫大戟甘遂ノ類索爾設規莫
金盞花秃カト立烏莫未詳等ノ諸名ヲ以テ代用ス
即チ皆太陽歸來ノ義ナリ

○第一 大倭立和秃祿撒容

○第二 倭生大倭立和秃祿撒容

總說 第一種ハ意太里亞拂郎察ノ諸洲陸田曠野ノ
肥地ニ生ス又蘭虯匱古ノ曠豁ノ地ニ生ス其莖直
立シテ圓ク微毛茸アリテ白色ヲ帶ヒ枝ヲ分生ス
葉ハ潤シテ拔悉立孔羅勒ノ如ニメ且長シ粗糲ニ
シテ白色微毛アリ初夏花アリ白色ニメ齊列ニ莖
ニ連著シ漸々ニ開ク莖末ニ至リ圓ニメ少シク鈎
曲シテ蟹尾ニ似タリ根ハ細クシテ堅ク木ノ如シ
○第二種ハ倭生ノ者ニメ拂郎察ノ地蒙秃百爾立

意見斯ノ辺ニ生ス前種ニ似テ茎直生セス地ニ布
テ生ス其葉稍小ナリ花亦初夏ニアリ

附考 妄生大倏立和禿祿撒容ハ独度涅烏斯ノ爰
ニ畧説セルニ因テ郭留識烏斯ノ詳説ヲ擧ク是
ヲ羅甸ニ倏立和禿祿撒烏莫率撒釋莫ト称ス即
妄生太陽旋轉草ノ義ナリ布立祿斯ノ倏立和斯
箇撒烏莫又苛而劣葛カ亞ハ是ナリ其形状第一
種ニ最ニ相似タレ氏小ナリ是其茎軟ニメ微毛
茸アリテ地ニ妄テ生スル力為ナリ葉形色味共

ニ相似タレ氏拔悉立孔羅勒ヨリモ小ナリ枝末

鈎曲シテ蟹尾ニ似タリ小白花齊列ニ連著スル
一亦第一種ノ如シ花後子ヲ結フ第一種ノ如ク
四ニ分列スル一ナシ又四子附著スル一ナシ但
一子ノミニメ間亦ニ子併合スルモアリ第一種
ヨリモ大ニメ狹長黦白色細小茎ニ著メ小莢ヲ
覆フ根ハ小ニシテ外黒色冬ニ至テ枯ル子自落
メ翼年嫩苗ヲ生ス伊斯把尼亞ノ地方撒刺滿加
ノ辺ニ多シ田圃及ヒ瓜類ヲ種ル地ニアリ八月

末ヨリ九月ニ至テ花アリ子續テ熟ス

性効 捌鳥留斯^ハ謁^キ及^キ涅託ノ説ノ如ク其性温ニノ燥

且淨除ノ功アリ

附考 第二種ノ性効第一種ト同シ是其性相近キ

力故ナリ

主療 身体粘液及膽汁様液ヲ驅除スルニ此草一握

ヲ水煎シテ服用ス一箇ノ良下劑ナリ○蟹ノ咬傷

ヲ治スルニ此草酒ヲ以テ服シ或ハ外貼ス○地^和

思^コ谷^リ迭^ダ斯^ス曰四日熟ノ癸セント欲スル前ニ此草

子四粒酒ニテ服スル寸ハ發セス又三日熟ニハ三粒ヲ服スト或人ノ説ナリ

附考 此全草及子ハ疣贅及諸頑硬腫瘍浸淫諸瘡

ヲ療ス此子ヲ搗キ赤瘤疣贅肉刺ニ貼シテ能乾

燥セシム○痛風關節損傷ニ葉ヲ搗キ貼ス甚効

アリ又コレヲ腹部ニ貼スレハ經水ヲ通シ胎ヲ

墮ス○布^立立^糝斯^ノ説ニ和^カ印^天ク^ロキ^ノ法ニ

ニ四日熟ヲ治スルニ此草ヲ以テ體ヲ繞フ^一四

廻スル片ハ其病愈ベシトイヘリ果^メ其言ノ如

シ三日熱ニハ三回スベシ自カラ手ヲ以テ繞フ
ベシ〇小兒冒寒傷冷毒及ヒ諸瘍ニ葉ヲ搗キ貼
シテ良ナリ

〇第二種ノ性効モ亦第一種ト同シ是其性相近
キカ故ナリ

妨害

附考此草妊婦及後嗣ヲ求ル婦人妄ニ用ルコト
勿レ但ニ墮胎セシムルノミナラス且受胎ヲ妨
ク

第十九章 小倏立和禿祿撒容

名義 倏立和禿祿撒烏莫把流莫 倏立和禿祿撒容

厄勒禿兒涅索爾 拂郎 齊亞

羅甸厄勒齊亞ノ二名共ニ 小倏立和禿祿撒容ノ義

ナリ阿質烏斯ノ書第三卷十四章ニ質加箇郭久莫

ト名ツク布立稜斯ノ書第二十二卷二十一章ニモ

亦斯名ツケタリ或人ハコレヲモ亦「斯箇兒撒和烏

祿斯」ト称ス今時ノ人ハコレヲ「苛兒方葛」カ「亞」ト云

フ前條ニ同シ「拂郎察人」ノ「禿兒涅索爾」トイフモ亦

枝多シ葉ハ大倏立和禿祿撒容ト同シカラス稍

小「吉」カ「斯」線蒼ニ似テ又「那屈禿悉」嗑「姪」竜ニ似タ

リ柔軟ニメ繭細色ヲ帶フ花ハ小ニメ黄色相集

リテ葡萄状ヲ為シ子ナクシテ謝スカ「矢釋斯」草

等ノ花ノ如ク花ヨリ子ヲ得ル「ナシ」枝葉間陷

凹處ヨリ別ニ小長茎ヲ出シ莢ヲ結ヒ下垂ス其

状三室ニメ「質」遮末而留斯「大戟」甘ノ實ニ似テ且

粗糙ニメ黒色ヲ帶ヒタル灰白色ノ子アリ熟ス

レハ自ラ裂テ子飛出スル「亦」カ「矢釋斯」質遮末

而留斯ノ如シ根ハ冬枯ル子落テ年々ニ苗ヲ生
ス伊斯把尼亞及蘭虬匱古ノ地ニハ甚多シ業謁
埵爾蘭杜及荷斯天祿以吉ノ物夜念ノ地ニハ種
蒔スト雖比長スルナシ又意太里亞ノ樸祿古
念及亞部劣粗ノ辺ニモ亦コレアリ蘭虬匱古ノ
野人ハ九月ノ比子熟スルヲ收取テ商人医家ニ
鬻テ大ニ利ヲ得ルナリ

○羅別而ノ小缺烈孚禿箇祿乙鐸

此草弘郎察ノ汚泥ノ地及ヒ流水ノ傍ニアリ其

嵩涅聞鐸ノ義ナリ

附考郭留識烏斯ハコレヲ倭立和禿祿撒烏莫密

稱斯質カ箇郭久莫ト名ツク每莢三子ヲ含ムカ

故ナリ○布立稌斯ノ考ニハ谷里迭斯ノ斯箇見

撒和乙姪斯トス葛斯質而利印ノ伊斯把尼亞ニテ

ハ禿兒那索爾ト云拂郎察人ハ禿兒涅索爾ト呼

フ是嵩涅聞鐸ノ義ニ因テ名ツケタルナリ又羅

甸ニ倭兒拔郭立質亞トイフ

○伊斯把尼亞ヨリ此草ヲ以テ染タル緇布ヲ出

スコレモ亦禿兒ト涅ル索ル列ル又禿兒ト那ル索ル尔ト名ツク

總說此草意太里亞ニ多シ葡萄及膽八樹下ニ生ス

地和思谷里迭斯ノ説ニハ汚泥ノ地ニ生スト云ヘ

リ独ド比都ツ国ニハ最稀ナリ野生ナシ其葉大ゴ倭立リ和

禿ト祿ロ撒セ容ヨニ甚相似タリ但緑色ニメ微黒色ヲ帶フ

夏月花アリ黄色ナリ後實ヲ結フ三子相簇リテ状

縛ワ而ル孛フ斯ス覓メ而ル拈ク大大戟戟甘甘ニ似テ小茎アリテ下垂ス

九月ニ子熟ス根ハ少シク鬚アリ

附考郭留識烏斯曰此物一茎直立ノ高サ一尺許

茎細シテ弱シ地ニ妄生ス葉ハ圓シテ全コト大大缺缺

列列孛孛禿禿箇箇祿祿乙乙鐸鐸ニ似タレ凡其小ナル一三分ノ

一ナリ數多シ花モ亦相似テ甚短ク微曲ニシテ

疎著ス葉間ヨリ下垂スル一禿兒ト涅ル索ル尔ルノ如シ

根ハ小ニシテ極ナシ今此國ニ移栽ルニ生スル

コト甚稀ナリ

性効主療腹中諸蛇蟲アル症ニ此子ニ硝石イ卑卑索索布布

缺兒ケ斯スヲ調合シ水ヲ以テ服用スル圓或ハ扁濶ナ

ル諸蟲ヲ下ス○地和思谷里迭斯ノ説ニ疣贅及ヒ

其他肉々隆起スル症ニ此草ニ鹽ヲ交ヘ貼スレハ能コレヲ除去ス

附考 此草ハ連接スル癌及其他浸蝕諸惡瘡ニ用テ最モ功アリ○頭瘡ニ此葉薔薇油ニ浸シ頂上ニ塗テ速ニ其痛ヲ止ム○蟹咬傷ニモ亦良ナリ

他用 松郎察國ニハ此草汁ヲ以テ木棉ヲ染成シ乾ス片ハ紫色ヲナス此布ヲ以テ業謁垓尔蘭杜及ヒ松郎察ニ於テ食時ノ終ニ肉汁菜羹及果實ノ類ヲ供スル凡上ニコレヲ鋪テ紅紫色ノ色ヲ添テ美觀

ナラシム布立稜斯ノ書第二十一卷八章ニ此事ヲ舉テ此物一種ノ紫色ヲ成テヲ載タリ此事古人ハ知ル者ナシ

附考 世人ノ説ニ「禿兒涅索尔」ヲ鮮紫色及青蓮色ヲ染成ステ此液汁ニ酒ヲ混和スルナリト或ハ又桂酒膏藥及其他ノ藥劑中ニ入テ赤色ナラシム○又此草ノ液ヲ以テ紙布及哆囉呢ニ塗レハ鮮緑ニシテ先輝アラシム其後速ニ鮮青色及青蓮色ニ変スルナリ○伊斯把尼亞ヨリ將來スル所

ノ約布モ此草ノ液汁ヲ灌テ青蓮色ニナス者ナ
リ掛郎察ヨリ出ルモノト同物ナリ○此草ヲ以
テ蟻穴ヲ塞ケハ蟻出ルヲ能ハズシテ悉ク死ス
又蟻ノ居スル穴ニ此草ヲ束子塞ケハ出ルヲ能
ハズシテ亦死ス此草ヲ以テ一度蟲ヲ撫レハ即
死ス

第二十章 斯箇兒撒和乙姪斯

名義 斯箇兒撒烏斯 羅甸

地和思谷里迭斯ハ唯其一種ヲ説ケリ然氏今來ハ其種類アルヲ知ル故ニ此章ニ三種ヲ挙ク

第一種ハ谷里迭斯ノ書ニ斯箇兒撒和乙姪スト称シ即チ真ノ者トス故ニ予ハコレヲ以テ第一種ト

ス何則彼説ニ此草一種ノ小草ニノ葉少ナク子スコレウ暨尾ニ似タリト云ヘリ布立ブ立糝斯ハ厄勒齊亞語ニテ

斯箇兒撒翁スコレウ乙姪斯ト称ス羅甸ニ斯箇兒撒烏斯倏

兒ル拔バト云即チ彼書第二卷十五章ニ斯箇兒撒烏斯倏兒拔スコレウハスコレウ蠶尾草ノ義ニシテ其子蠶尾ニ似且蠶咬傷

ヲ治スルヲ以テ名ツクトイヘリ○又別ニ同名ノモノアリ是テ耆和テ學樂思ス紕斯ノテ溼捌パナリ彼條ニ於

テ辨スベシ 第二種ハ抹質玉留斯ノ斯箇兒撒和乙姪スナリ是

谷里迭斯ノ第一種ト同シカラズ何則此草葉少ナカラズ甚繁密ナリ或人コレヲテ的歷比烏莫ムニ充ツ

諸本草其泉モコレハニ從フ

第三種ハ是モ亦同名ナリ此草其茎末ノ枝梢鈎曲
シテ大條立和禿祿撒烏莫ノ枝ニ似タルカ故ナリ
○此草諸本草家ノ説ニ繆乙線窩耳ノ種類ニ充レ
氏非ナリ其葉对生セサルノミナラズ根モ亦大サ
一指許ニ至ラス故ニ充リ難シ

附考 羅別兒ノ亞鳥カリ久辣繆カスニ斯箇兒撒和
乙姪斯ノ名ヲ附接スル者ハ郭留莫那及葛思把
兒拔烏吸釋斯等ノ考ニハ謁失烏莫未屈繆莫ニ
近シ皮屈六斯ノ一種ナリ○郭留莫那ノ記ス所

ノ小封茲東竭ハ彼ト同種ニノ其他ハ斯箇兒撒
和乙姪斯ノ種属ナルモノナリ○耆和子樂思絀
斯ノ斯箇兒撒烏斯一名斯箇兒撒和ハ独度涅烏
斯ハコレヲ別條ニ説ケリ第二十六卷二十一章
ニ説ケリ又諸本草家各異説アリテ或ハ斯得建姪葛
立トシ独度涅烏斯ノ第一種ノ葛立トシ或ハ部
列莫ノ一種トス此物二種アリテ亦蟹尾ニ似タ
リ故ニ碩學ノ郭留識烏斯ハ斯箇兒撒和乙姪斯
ノ品類トス詳ニ部列莫ノ條ニ於テコレヲ説ベ

總說第一種ハ拂郎察ノ辺蘭虬匱古ノ山地高燥ノ
 處膽八樹下ニアリ又圃中ニ七種蒔ス弱茎小ニメ
 低ク高サ五寸或ハ一咫許一方ニ傾キ或ハ地ニ妥
 生ス直立スルハ稀ナリ葉狹長ニメ差潤ク數多カ
 ラズ細莖ヲ抽テ夏ノ始ヨリ末ニ至テ花アリ金黃
 色隨テ實熟ス狀豌豆山蠶豆大巢菜ノ花ニ似テ稍
 小莢ハ相對ス粗糙ニメ毛茸アリ節アリ勾曲シテ
 蟹尾ノ如シ中子アリ根ハ細シ

附考 独度涅烏斯ノ所謂第一種ナル者ハ諸本草
 家コレヲ斯箇兒撒和乙姪斯覆立和皮布歷烏カ
 ト称ス羅別兒ハ独乙都ニ於テ癸線窩耳ノ名ヲ
 接ス故ニコレヲ羅甸ニ斯箇兒撒和乙姪斯列扁
 斯覆立和皮布歷烏カト称ス其節間ヨリ出テ形
 潤葉皮布歷烏劣莫^南茶^胡ノ葉ニ似テ軟韌ニシテ
 勁カラズ故ニ此名アリ而シテ羅別兒ノ説ト独度
 涅烏斯ノ説ト相合セリ即チ羅別兒曰此草斯箇
 兒撒翁箇^ル禄乙鐸^コト名ルハ莢中三子ヲ結ヒ毛茸

アリテコレヲ覆ヒ卷縮ノ稍蟹尾ニ似タリ其茎
長サ一掌半或ハ高サ一尺許ニシテ地ニ安生ス節
ヨリ葉ヲ出ス一猶前説ノコトシ蒙秃卑尔カ意
尔斯ノ近山枯燥ノ地及ヒ瞻八樹下ニ多生ス然
氏他處ニテハ但園中ニアルノミ乃チ合備鳥斯
谷留莫那ノ考ハ斯箇児撒和乙姪皮布歷烏カ覆
立和ノ種類ハ谷里迭斯ノ真ノ郭利覓嫩ニ充ベ
キ也是必莖和字樂思絀斯ノ郭利覓嫩ハ布立祿
斯ノ郭利覓嫩ヨリモ多シ

○第二種ハ抹質玉留斯ノ説ニ拂即察ノ地葡萄圃
ノ辺ニ生ス其茎叢生シ葉多ク莖ヲ拵テ生ス其葉
枝ノ本ニ著キ大抵三葉攢著ス中心ノ葉ハ左右ヨ
リ大ナリ且長大畧馬齒莧葉ニ似タリ夏ノ初ヨリ
茎梢小黄花ヲ開キ季夏ニ至テ細莢ヲ結フ其莢亦
節アリ先尖テ蟹尾ノ如ク鈎曲ス中子ヲ含ム哈歷
哈ニ似タリ根ハ小ニシテ細シ

〔附考〕斯箇児撒和乙姪斯未訥児字六列深救刺力
ハ羅別児ノ稱スル所ニシテ独度涅烏斯ノ第二種

ト状相似テ唯黄色ノ一花ヲ開キ一莢ヲ結フノ
ミナリ独尔^ト孺^ル屈ニ於テ見タリト其草甚小ナリ
○第三種ハ曠野穀田草莽ノ地或ハ葡萄ノ生スル
處及ヒ流水中ニ生ス湿地ニ生スルハ愈長大ナリ
燥地ニ生スルハ愈軟弱ニシテ毛多シ此草當時ノ人
能知ル所ノモノナリ茎微稜アリテ其葉稀疏綠色
狭長ニシテ半指徑許茎葉共ニ糙濇ニシテ毛茸アリ四
月ヨリ季夏ニ至テ茎梢枝末共ニ盤旋メ花ヲ著ス
狀蟹尾ノ如シ花五瓣青色ヲ帶テ中辺微黄ニシテ

野生^ル葛^カ覓^ニ姪^デ犂^ス斯^ニ似テ稍小ク其色亦淡シ花漸々
ニ代謝ス根ハ小ニシテ鬚多シ

附考獨度涅烏斯カ此章ニ説トコロノ第三種斯
箇^コ兒^ル撇^ビ和^イ乙^ス姪^スハ流水ノ近傍ニ生ス其葉通常
ノ楊^ヤニ甚似タリ而シテ縷^ニ乙^イ線^{セン}窩^ヲ耳^ルノ種類ニ近シ
故ニ羅別兒^ニハ妄^コ生^イ縷^ニ乙^イ線^{セン}窩^ヲ耳^ルト称セリ獨度涅
烏斯ハ何ニ拠テカ縷^ニ乙^イ線^{セン}窩^ヲ耳^ルノ種類トセズメ
斯箇兒撇和乙姪斯ノ條ニ收ムルヤ
○斯箇兒撇和乙姪斯ノ別種

羅別爾ノ繆乙線窩耳ノ下ニ半妥半直ノ別種ト
スルモノハ是独度涅烏斯ノ第三種ノ斯箇兒撒
和乙姪斯ナリ其花天藍色ニノ愛スベク花實ノ
茎梢旋轉シテ蟹尾ニ似タリ故ニ蟹尾草ト称ス
根鬚多シテ繁延ス茎長サ一尺許多ク小枝ヲ分
チ半ハ地ニ妥生シ半ハ直立ス柔毛茸アリ子巨
些而倏乙而葉ノ如シ此草水傍及曠野ニ生ス藥
局ニテハ繆乙線窩耳ノ名ヲ通称ス其鼠耳ノ細
毛アルニ似タルヲ以テ鼠耳ト称スル充レリト

雖凡其花鈎曲シテ蟹尾ニ似タルヲ以テ蟹尾草
ト名ルモ亦可ナラスヤ獨度涅烏斯ノ本條ノ種
類ニ収ル一是衆人ノ視ル所指サス所ナリ
○斯箇兒撒和乙姪斯。歷枚未訥沙義ナリ
羅別爾ノ名ル所ナリ此草蘭虬匱古ノ穀田中ヨ
リ見出セリ稀ナルモノナリ根ハ鬚多シテ二三
茎ヲ生ス細メ直立ス高サ一尺許或ハ一掌半茎
頭莢ヲ結フ末彎曲シテ翕屈吏古胡蘆ノ莢ヨ
リモ圓メ狹シ稍蟹尾ノ彎曲セルニ似タリ花ハ

黄色ニメ小ナリ他ノ品類ト同シ葉ハ復掘爾附
土又質カ彌留斯葉蕪葉ニ似テ稍小ナリ茎下ヨ
リ地上ヲ離テ直立シ各對生シテ肋骨狀ヲナス
○斯的而洛歷救未訥沙

谷兒糾率斯ノ亞兒糾祿ト名ツクル者ナリ葉ハ
前種ノ如シト羅別爾ハ記セリ花ハ洛莫布沙那
ニ相近シ少シク曲タル莢中ニ小黑子アリ一小
莖ノ上ニ星狀ニ附著セリ味ハ穀類ノ如シ意尔
蘭太ニ於テハ甚尊テ斯的而洛星ト名ツク而

房中飲劑ニ用ユル也我輩ハ知ラサルナリ

○亞烏カリ辣繆カ斯ニ羅別爾斯箇兒撒和乙姪
斯ト接名スルモノハ郭留莫那及ヒ葛思把兒按
烏吸釋斯等ノ考ニハ謁失烏莫未屈繆莫ニ近ニ
イヘリ皮屈六斯ノ一種ナリ

○小封茲東竭ノ種類ヲ以テ郭留莫那ハ斯箇兒
撒和乙姪斯ノ種類中ナリトシテ記セリ

○得和不樂思糾斯ノ斯箇兒撒和乙姪斯ハ独度
涅烏斯ハコレヲ別條ニ説ケリ

第二十六卷二十一章斯得呢建姪

部列莫ノ條
ニ説ケリ

又諸本草家異説アリテ或ハ斯得建

姪葛立トシ或ハ独度涅烏斯ノ第一種ノ葛立ト

シ或ハ部列莫金雀ノ一種トス何則部列莫ノ類

二種アリ是亦スルヒ尾ニ似タリ故ニ碩學ノ郭留識

烏斯スモ斯箇ル兎ビ和フ姪スノ品類トス詳ニ部列

莫ノ條ニ載ス

性効主療 第一種ハ地和思谷里迭斯ノ説ニ螫ノ螫

傷ニ貼ノ甚功アリ或ハ關節損傷ニ貼ス


附考 此草ヲ以テ螫ニ礙スレハ失気昏倒ス其半

死ノ者ヲ白花エ謁ル而レ歷ボ薄劣斯ス 白花アリニ草ノ根

ヲ以テ之ニ觸レハ即活ス其一名銀蘭一名銀蘭ヲ解スルコト

知ベシ〇第一種皮布レ歷レ烏ウ劣劣莫モ葉ノ者ヲ金瘡藥

劑ニ充ツ



6

6 86-97

