

遠西草木譜
十

洋学文庫

文庫8

F 6

10



新刻

末筆耕未成

遠西草木譜

從子卅一章

五三十五章

十

第一種

大斯百煙箇祿乙鐸



本草綱目卷之六

第三章 大斯百煙箇祿乙鐸

三

種二第

鐸^ド乙^イ祿^ロ箇^コ煙^{エン}百^{ヒャク}斯^ス大^{ダイ}



第三十一章

大^{ダイ}斯^ス百^{ヒャク}煙^{エン}箇^コ祿^ロ乙^イ鐸^ド

名義今爰ニ二種ヲ舉ク其葉形及ヒ名稱相近ニ第

一種ハ真物ナリ第二種ハ別謁屈斯久乙莫ナリ

○第一種 大^{ダイ}斯^ス百^{ヒャク}煙^{エン}箇^コ祿^ロ乙^イ鐸^ド

斯^ス屈^ク祿^ロ歛^{ケン}樂^{ラク}力^リ亞^ア末^マ玉^ユ兒^ル 甸^{ケン}密^ミ兒^ル列^レ木^モ兒^ル備^ビ亞^ア同^{トウ}苛^カ兒^ル

樂^{ラク}力^リ亞^ア同^{トウ}葛^カ斯^ス禿^ト蘭^{ラン}救^ク樂^{ラク} 同^{トウ}部^ブ樂^{ラク}雲^{ウン}物^{モノ}兒^ル子^ツ熱^{ネツ}爾^ニ瑪^マ撒^サ

烏^ウ兒^ル物^{モノ}兒^ル子^ツ同^{トウ}兀^ゴ祿^ロ弗^フ斯^ス苛^カ乙^イ屈^ク物^{モノ}兒^ル箋^{セン}葛^カ樂^{ラク}烏^ウ禿^ト同^{トウ}

兀^ゴ犖^ロ禿^ト斯^ス百^{ヒャク}煙^{エン}箇^コ祿^ロ乙^イ鐸^ド 獨^{ドク}乙^イ兀^ゴ犖^ロ禿^ト吉^キ力^リ乙^イ兒^ル箇^コ祿^ロ

乙^イ鐸^ド 爾^ニ業^{ゲツ}謁^{トク}堙^{トク} 斯^ス屈^ク祿^ロ蒲^ホ力^リ亞^ア 意^イ太^{タイ}斯^ス屈^ク祿^ロ歛^{ケン}樂^{ラク}乙^イ列^レ郎^{ロウ}

察

和名ヒナノウス

漢名山玄參

羅甸ニ通ノ斯屈祿歟樂力亞ト稱ス是レ吉力乙兒
 箇祿乙鐸ノ義ナリ而メコレニ末玉兒大ノ稱ヲ附
 接スルハ是レ小斯百煙箇祿乙鐸ト別タニカ爲ナ
 リ或人コレヲ哈列和布悉斯ニ充ツ的當ナラス哈
 列和布悉斯ハ香氣アリ此草ハ香氣ナシ其他尚異
 ナル處多シ

○第二種

別謁屈斯久乙莫業謁送深秃シト按秃アト尼斯ニス箇祿乙鐸コロイト

柳爾力烏斯曰此草拂郎察ニテ設掘乙謁ト稱ス

或人コレヲ別秃ベト尼ニ葛亞カア苦窪クワ質力シツ斯ト名ツク是レ

水別秃ベト尼ニノ義ナリ但真ノ別秃ベト尼ニニ差相似タルノ

ミ又缺ケ蠡レイ覓メイ嫩ニンニ充ル説アリ然シ地チ和思カス谷里迭コリテ斯

ハ缺ケ蠡レイ覓メイ嫩ニンノ葉ハ物謁モノ及部厲アベ前マエ車クルマニ似タリトイヘ

ハ此物ニハ非ルナリ

附考別謁屈斯久乙莫ハ絀兒シユル涅留斯ノ缺ケ蠡レイ覓メイ嫩ニン

歇爾地爾紮督ノ的兒邊達力亞ナリ是の元綿的
印ト功ヲ同スルカ故ナリ達樂救斯ハ和設乙末
斯禿留莫亞兒的留莫ト名ツク

○大斯百煙箇祿乙鐸ハ世ニ著シク甚名譽アル
草ナリ爰ニ其種類ヲ漏セリ今其遺漏ヲ補フハ說

總說ノ後
ニ舉ク

總說第一種ハ曠野空塹森林ノ中ニ生ス苗高サ一
尺半許方莖直立暗紫色ニメ微黒ヲ帶フ內空ナリ
每節二葉對生シ濶メハ尖ル葉邊鋸齒アリテ大踏

的歛類蕁麻 葉ニ似テ稍ハク黒シテコレヲ撫ルニ刺
ナシ七八月枝梢小花ヲ開ク暗紫色狀小兜ニ似ク
リ大サ亦大踏の的歛ニ同シ花後子ヲ結フ形圓シテ
頭尖銳甚小ナリ根ハ小塊多ク且節アリテ白色ヲ
帶フ傍生メ深ク地中ニ入ラス根四方ヘ引蔓シテ
嫩苗ヲ生ス

△正恭曰ヒナノウスハ江州ニテスキノサキト
稱ス江戸ニハ道灌山及飛鳥山邊ニ多アリ苗高
五尺許方莖ニメ葉對生ス胡麻葉ニ似テ細鋸齒

アリ秋莖末數花ヲ著ス大サ三分許春白ノ狀ノ如シ故ニ離ノ臼ト名ツク紫黑色實ハ圓クシテ尖リ中ニ小黑子アリ根巨ク長二三寸多攢簇シテ稍天門冬ニ似タリ堅ノ木根ノ如シ世人コレヲ玄參トス非ナリ是本草原始ノ山玄參ナリ玄參ハ形狀大抵相同シト雖ニ葉長ミアリテ色アサク花淡黄色又黄色モアリ根堅カラス白色ニシテコレヲ刻ハ黑色ニ變シ潤アリ是レ一種ノモノナリ

○第二種ハ湟池河邊水ノ傍ニ生ス燥地ニ於テハ未見之莖葉花實共ニ第一種ニ甚似タリ然ニ其狀稍大ニノ根ニ塊ナク細鬚多シ

附考 小寤ケイヂワイ的兒ト別ベ禿ト尼ニトイフモノアリ龍リウ同ノ名

醫多瑪斯片涅トマラスペンチ及ヒ獨爾弄屈ドウルラクノ楊貌佛通ヤンモフツウノ兩家ノ園中ニアリ尋常寤的兒ケイヂワイ別禿尼ベトニニ比スレハ小ナルヲ四分ノ一ナリ

○大斯百煙コトラスペン箇祿コロク乙鐸イドクノ種類即チ碩學ノ葛祿留カクロム斯郭留識スグロウシ烏斯ウスノ書中ニ說トコロノモノテリ

第一種

干乘ノ大斯百煙箇祿乙鐸

羅甸ニコレヲ斯屈祿歛樂力亞設列質葛ト稱ス

初生葉地ニ塌シテ生ス差斯葛備烏設和名松葉

ニ似タリ後一莖ヲ抽テ方莖内空高廿二尺餘綠

色ニノ稜紫色ヲ帶フ或ハ太陽ニ向フ處悉ク紫

色ナルモアリ莖ノ本ハ大葉圍リ著キ多ク齒刻

アリテ對生ス莖ニ生スル葉ハ翼ノ如ク化歛蕨

及ヒ化涅子カ莫覓建斯葉ノ如キ齒刻アリテ尚亦

多ノ齒刻分テリ莖ノ半バヨリ末ニ至テ枝ノ節

ヨリ別一方ナル小葉ヲ著ス其枝又

小枝ヲ分ニ花ヲ著ス其狀小囊莢ヲナシ中空ニ

シテ尋常大斯百煙箇祿乙鐸ノ花ニ稍相似タリ

色黃ニノ綠ヲ帶フ六瓣ニノ下瓣甚小少シク外

反ス左右ノ瓣ハ稍長メ上ノ方微紫ヲ帶フ上ノ

二瓣ハ最大ニノ微ク外反シ色紫黑ヲ帶フ中心

短黃蓋ヲ出ス根ノ大サ一拇指ノ如ク巨キ鬚ヲ

分チ白色ナリ或人コレヲ留達悉劉斯的力斯ト

イフ

第二種

干乘ノ大斯百煙箇祿乙鐸ノ別種

羅甸ユレヲ斯屈祿歛樂力亞設列質葛設君沓ト

稱ス苗高サ二三尺許方莖紫黑色コレニ葉齊列

ナラズシテ長キ小莖ニ附著ス狀踏的歛類葉

ニ稍似タリ然レ軟滑ニ刺傷セズ葉面暗綠色

ニメ光澤アリ背ハ光澤ナシ莖ヨリ短小枝ヲ出

ス四稜ニメ他ノ品類ヨリハ甚小ナリ末ニ小萼

ヲ出ス分裂シテ五尖ヲナス内花アリ四瓣ニメ

最上ノ瓣ハ分テ兩ハヲナシ上ヘ反張ス最下ノ

裂

瓣ハ下垂シテ唇ノマク其他ノ二瓣ハ各左右ニ

出ツ花後小莢ヲ結フ其先分レ尖テ兩岐ヲナス

ニ似タリ内細子アリテ尋常大斯百煙箇祿乙鐸

子ニ似タリ大抵枚條ニ似タリト雖レ根塊ナク

微臭アリ

第三種 大斯百煙箇祿乙鐸ノ別種

葛覓樂律烏斯ノ説トコロニメ羅甸ニコレヲ斯

屈祿歛樂力亞百列屈力那ト稱ス尋常大斯百煙

箇祿乙鐸ニ似テ但根ニ塊ナキノミ

性効二種共ニ性燥ニノ温ナリ

主療第一種ハ腺ノ硬腫羅甸斯禿留覓ヲ治ス○痔

瘡疼痛ニ甚良ナリ或人ハ此草ヲ項ニ懸テモ亦能

治ストイヘリ然レ予未夕親試セス又一説ニ此草

根鹽氣ナキ酪ニ和シ陰濕ノ地ニ安スル一十五日

ニノ取出ニ微火ニ煮瀝テ滓ヲ去リ腺腫及ヒ痔

疾ニ塗テ奇効ヲ得ルトイヘリ

第二種ハ葉淨除ノ功アリ故ニ經久臭穢ノ潰瘍ニ

甚功アリ汁ヲ取り蜂ハニ合シ煮テ用ユベシ

附考或ハ別謁屈斯クモ乙莫ムノ子ヲ搗キ蜜ニ和シ

膏ノ如ニノ額上ニ貼シ涙眼ヲ除ク○此草ノ自

然汁硫黃硝石ヲ和シ耳中ニ滴メ耳痛ヲ止ム○

地和思谷里迭斯ケイ缺イ蠡ム覓ム奴ム莫ムノ全草根ヲ連子

絞リ自然汁ヲ取り飲服スレハ吐血ヲ治ス甚功

アリ又泄瀉及赤帶下ヲ清涼ニシ且止ム又衄血

ヲ止ム○其葉金瘡ニ傳テ瘳ス一妙ナリ○升鍊

家ニ別謁屈斯クモ久乙莫ム及ヒ大斯ゴト百煙ペ箇シ祿コ乙鐸ロヲ

多用ユ○五月中旬此全草ノ蒸露ヲ滴一疣目及

ヒ諸息肉ヲ除ク木綿ニ浸シテコレヲ貼ニ且毎服三十二錢朝夕ニコレヲ用ユ

葉狹

大箇奶薩



本草綱目卷之六

第三章 箇奶薩

二百廿五

中 間

薩奶箇臭



潤 葉

薩奶箇大



最ノモト小ノチ

箇ノ奶ノ薩ノ



中ノ間ノ

箇ノ奶ノ薩ノ香ノ芳ノ



第三十二章 箇奶薩

〔名義〕箇奶薩羅甸○厄

布力糴斯ハ久尼樂兀トイヒ得和鐸留斯ハ刹

力葛力亞又彪力葛力亞トイフ又布蟠兒力烏莫ヲ

モ彪力葛力亞ト雖氏別物ナリ是ハ弗祿乙箇祿乙

鐸ナリ藥局ニテハコレヲ知ルモノナシ

得和孛樂思紉斯ハ牝生牝生ノ二種ヲ説ケリ地和

思谷里迭斯ハ兩種ノ間ニ中間ノ一種ヲ加ヘタリ

然氏後世ノ本草家彼ハ此ヲ以テ真トシ此ハ彼ヲ

以テ真トス故ニ今辨別スルヲ難シ

○第一種 大箇奶薩

印低旭莫羅甸密力達力斯同姪力亞力烏莫同苛部力

歛哈同孛樂屈木薩同繆斯的祿斯同必薩同契訖設

末質質斯厄勤沓乃斯同達那悉容同苛乙箇斯同乙

斯蟠斯同第訖斯木斯同部列蒲屈禿訖斯同亞訖烏

備亞斯同苛姪密亞斯同以兒發彪兒竭樂同伊斯把

大箇奶薩ハ狹葉濶葉ノ二種アリ得和孛樂思同紉斯

ハコレニ牝生ノ稱ヲ附接ス諸本草家ノ説ニ大箇

奶薩ノ第二種ヲ地和思谷里迭斯ノ拔葛里斯ニ充
ツ是稍相似タルヲ以テナリ然レ真ニアラス

△正恭曰大箇奶薩ハ狹葉潤葉ノ二種トモニ天
名精ニ近シ天名精ハ秋後葉地ニ塌メ生シ狀煙
草葉ニ似テ小ク毛茸アリテ皺文多シ故ニ綱目
ニ一名皺面草ト名ツクコレヲ摘メハ臭氣アリ
因テ豕首蕘顛等ノ名アリ本邦ニテハ猪屎草ト
イフ夏ニ至リ條ヲ抽テ高二三尺ニ至リ小葉互
生ス秋葉間ニ荅様ノ花アリ圓小ナル蒂アリテ

花淡黄色實ハ絮ニ似テ人衣ニ粘ス是潤葉箇奶
薩ニ似タリ又一種小葉ノ者アリ莖葉ニ細ク
ノ花狀相同シ心狹葉箇奶薩ニ似タリ且本草天
名精ノ主治ヲ併考スルニ功用稍相同シ恐ラク
ハ一種ノ者ナルヘシ

○第二種 中間箇奶薩

丟兒物兒子熱爾瑪動鐸兒物兒子同斯樂低葛樂烏

禿別謁莫斯

中間箇奶薩モ亦香臭ノ二種アリ臭氣アルヲ斯珍

建姪ケニデ箇コ奶チイ薩サト云ヒ香重カラズシテ頗蜂蜜ノ氣アル者ヲ蜜香箇ホミク奶チイ薩サト云フ

△正恭曰此物形狀旋覆花和名小輕ニ近似ス然レ本草旋覆花ノ主治ヲ併考スルニ功用同シカラス疑ラクハ唯其葉形ノ稍相似タルノミニ自ラ別種ノ物ナルベシ

○第三種 小箇ケチ奶コ薩チイサ

捌パ尼ニ容ヨ羅ロ力リ拔バ訥ネ質シ斯ス 同

得テ和ラ孚フ樂ラ思ス紉ヒ斯スハ牝メ生イ箇コ奶チイ薩サトス此書ニ圖スル

ハ最モト小コ箇コ奶チイ薩サナリ小箇ケチ奶コ薩チイサハ稍大ニノ芳香アリ故ニ芳香箇ケチ奶コ薩チイサト名クルモノナリ

附考此草種類多シ其狀ノ大小葉ノ潤狹鋸齒ノ

有無或ハ芳香或ハ臭氣アルモノ又ハ毛茸アリテ繭細色ナル等ノ異アリ皆一種類ノモノナリ郭留識クワリウシ烏斯及ヒ羅別兒ロベール等ノ諸家多ク其品類ヲ舉ク斯ヲ審ニセハ一書ヲナスベシ而ノ好事ノ士ヲシテ大ニ有益ナラシタルヲアラン

○依ヒト加カ得テノ箇コ奶チイ薩サ

是依ト加得カ婦人方ノ中ニコ箇コ奶チイ薩サト名ツクル
モノナリ然レ此條ニ稱スルモノト同シカラス
即チ前ニ記セルアム亞ム莫ム部ム祿ム悉ム耶ムナルベシ其形狀
稍相近シ

總說第一種コ大コ箇コ奶チイ薩サハ狹葉潤葉ノ二種アリ狹葉
ノ者ハ真ノコ箇コ奶チイ薩サトス南方海濱ノ諸國勿チ釋チ茶チノ
海岸及ヒロ邏ロ瑪マノフ陸ロ楞ロ遮チ尹チ拂チ郎チ察チノナ那ル而ル暴ロ念チ蒙ロ
ト秃ト百ル爾ル利リ爾ル斯スノ道傍ニ最多シ好テ葡萄圃ノ邊ニ
生スク郭ク留ル識シ烏ウ斯スノ說ニハイ伊イ斯ス巴バ爾ル亞アニテハハ發ハ歛レ

的ア亞ア繆ム而ル拭シ亞ア或ハ暴ロ念チ立リ數ス匍ブ念チ等ニ生ストイヘ
リ苗高サ三尺許或ハコレヨリ過クルモノアリ根
際ヨリ數莖ヲ分ト木ト樣ニメ莖圓シ葉繁密ニシテ
黃綠色狹長ニメ膽八樹葉ノ如ク大サコレニ倍ス
秋莖頂互ニ小莖ヲ出シ一花ヲ著ス黃色エ謁エ力リ竭ロ弄ロ
苦菜 一種 花ニ似タリ後絮トナリ風ニ隨テ飛散ス絮ノ
本ニ細子アリ小ニメハ法ハ比ヒ屈ク斯ス箇コ祿ロ乙イ鐸ドノノ黃瓜菜子
ニ似タリ根巨大ニメ少ク鬚アリ冬ヲ經テ枯レス
此草微シク芬芳ニシテ重シ細毛アリテ糙濇且粘

氣ヲ帶フ又潤葉ノ者ハ真ノ箇コ奶チイ薩サノ別種トス處
處曠豁ノ地古壁ノ傍及ヒ石地ニ生ス葉潤クスレ
烏ウ的テ兒ル部グ萋ム莫ム和名櫻葉ニ似テ最モ小コニメ黒色カ
帶コレヲ撫ルニ毛茸多クメ軟ナリ莖ヲ抽テ高サ
三四尺圓メ莖葉トモニ毛茸アリ末小枝ヲ分チ枝
頭ニ小長花ヲ開キ車輻狀ヲナス初黄色後微紫ヲ
帶フ終夏アリ後又絮トナリ風ニ隨テ飛散ス根ハ
四方へ繁衍メ嫩芽ヲ生ス此亦香重シト雖モ甚夕
臭カラズ且粘氣モナシ

○第二種中間箇コ奶チイ薩サモ亦香臭ノ二種アリ惡臭ア
ルモノ斯ス珍チン建ケン姪デ箇コ奶チイ薩サナリ流水止水ノ傍好テ下
濕ノ地ニ生ス葉長シテ潤サ一拇指横徑莖圓クメ
直立シ高サ二尺許ニ至ル白毛茸多ク香重クシテ
惡臭アリ夏月枝頂花ヲ著ス葛カ密ミ兒ル列レ花ニ似タリ
唯稍大ニメ瓣黄色ナルヲ異トス花後絮トナリテ
飛散ス根鬚多シ又香氣アルモノ蜜香箇コ奶チイ薩サナリ
和蘭ノ下濕ノ地亞爾杜乙斯アルトイノ海界ノ瀦水ノ處ニ
多コレアリ粗大ニメ莖巨ク堅ニ線稜アリ内空ナ

リ莖末ニ至テ枝ヲ分チ葉鋸齒深シテ缺刻ノ如ク
多ク莖ヲ圍テ附著ス總テ繭細色ノ柔毛茸アリ夏
月黄花アリ後絮トナリテ飛散ス前種ニ比スレハ
香重カラス稍蜂蜜ニ似タリ根ハ鬚ニメ黒色ナリ
○第三種小箇奶薩セキチコチイサ是モ亦最小ト小トノ二種アリ
最小ノモノヲ又牝生箇奶薩メイラケシコチイサト稱ス處處水傍下濕
ノ地ニ生ス一種ノ小草ニメ高サ一尺許總テ毛茸
アリテ繭細色香氣別種ノ者ト同シ葉モ至テ小ナ
リ夏月花アリ狀葛蜜兒列カミル及列印花兒インハルノ荅ニ似テ

中等ナリ黄色微黒ヲ帶フ又長絮トナリ風ニ隨テ
飛散ス根細シ其小ナル者ハ芳香箇奶薩ネリケテコチイサト稱ス伊
斯巴尼亞ノ禿列鐸拂郎察トルノ那爾暴念ナールボウチンノ邊ニ多シ
コレハ前種ニ異ナリテ一種ノ者ナリ一莖直立高
サ一尺半又ハ過ルモノモアリ軟枝ヲ生シ毛茸ア
リテ糙濇ス粘氣アリ葉カ那力耶ナリヤニ似テ毛茸又粘
氣アリ秋枝ノ側ニ花ヲ附著ス細小ニメ黄色又絮
トナリテ飛散ス根ハ細シ前ノ諸種ヨリハ香氣佳
ナリ

性効箇コ奶チイ薩サノ種類ハ總テ性熱ニメ燥ナリ然トモ中間ト最小ノ者トハ功力少シク劣レリ

主療地ヂ和思谷里迭斯コリデス曰此葉酒ニテ服メ經水ヲ催シ死胎ヲ下シ淋瀝ヲ療シ黃疸及ヒ赤痢ヲ治ス○醋ニテ服スレハ癩癩ヲ治ス○此葉水煎シ浴湯トナシテ子宮病ヲ治ス○此草ノ自然汁油ニ和シ身體ニ擦テヲ去ル又頭上ニ塗テ頭痛ヲ療ス○此草蛇ヲ避ク其處ニ置キ或ハコレヲ燒薰スベシ又蚊ヲ避ク且其香氣アルヲ以テ蚤ヲ殺ス○



地和思谷里迭斯及ヒ哈列釋斯ノ說ニ此葉蛇咬ノ膿潰腫起スルモノニ貼ス最モ功アリ

附考箇コ奶チイ薩サ薰燒シ或ハ各處ニ置テ諸毒蟲及ヒ穢汚ノ諸蟲蠅蚊ノ類ヲ避除ス○葉搗爛シ蜘蛛及ヒ毒蛇咬傷ニ貼ス又金創及諸寒腫ニ貼ス○穀類中ニ藏置テ葛蘭姪兒カランシデルス斯ス類類ヲ防拒ス○葉搗爛シ足心ニ貼メ下血及泄瀉ヲ止ム○伊斯巴爾亞ニ於テ一老婦此草根ヲ酒ニテ服シテ疥癬ヲ治ス○小箇コ奶チイ薩サ葉頭部ニ貼メ頭痛ヲ治シ謔語

ヲ止ム○郭留識烏斯曰皮膚疥癬ヲ治スルニ伊
斯把尼亞國ノ一老婦箇奶薩根ヲ酒ニテ飲服セ
シメリ又一僧徒此草ノ根葉ヲ採リ膏ニ造リテ
コレヲ用ユ


撰脩凡藥用ニハ大箇奶薩コチイサ芳香箇奶薩コチイサノ二種ヲ撰
用スベシ中間最小ノ種類ハ用ユルニ堪ヘス功力
稍劣レリ

妨害缺

附考此草妊婦ニ用ユルヲ勿レ其液子宮ニ入ル

片ハ墮胎セシム又野牛及羊コレヲ食ヘハ甚害
アリ少ク食スト雖正必大渴ヲ發シ終ニ死ニ至
ラシム

封^カ茲^ツ東^ト謁^ダ



本草綱目卷之二十一

第三十三章 封茲東謁

三十一

本草綱目卷之二十一

三十一

三言



第三十三章 封茲東竭

名義 鄰救亞葛尼斯 旬蟠訥屈祿斯速厄勤蟠訥屈祿

斯損 同 厥茲舜件 尼亞熱爾瑪 封茲東竭 業謁堙 歛救亞姪

百兒祿 伊亞 鄰救亞地葛涅 里亞 蘭救謁姪悉尹 拂

察 福扮姪斯屯 竭 語厄苛乙耶蟠古 別謁 莫斯

亞彪犁烏斯ノ書ヲ閱スルニ異稱多シ厄勒齊亞ニ

弗力及亞苛覓尼容斯布列尼容斯布列涅容葛拔兒

樂質容葛拔兒力容箇力木斯百乙兒及斯列烏古力

和斯等ノ名アリ又羅甸ニ葛尼南救亞覓說鐸尼葛

蒙馬學不譜卷三

第三十三章 封茲東竭

三言

ト云フ○布力糝斯ハ蟠訥屈祿斯速斯ト名ツケ二種ニ別ツ然レ第一種ハ地和思谷里迭斯ノ書中ノ弼屈祿斯ノ條ヲ翻ノ載タリ是本條ニアラス和斯線東竭ナリ第二種ハ彼說ニ小刺ヲ出ストアレハ本條ナルヲ明ケシ○阿質烏斯ノ說ニハ蟠訥屈祿師莫トカ木尼烏莫トヲ一種ノ草トス是哈列穉斯カ單味能毒編ノ說ト吻合ス又和力拔悉烏斯及ヒ捌烏留斯謁及涅託等ハカ木尼烏莫一名列木尼烏莫ヲ詳ニ說タレレ蟠訥屈祿斯損ノ名ハ著ハサズ

○龍姪禮質烏斯ハ此草ヲ味兒姪物謁姪一名哈樂斯絀莫トス然レ味兒姪物謁姪ト達莫覓物謁姪トトハ裁試ムルニ差異ナルモノナリ此書第三卷二十八章ニ詳ナリ

〔附考〕近來ノ本草家封茲東竭ノ品類ヲ分ツ然レ今通常ノ封茲東竭ハ大小ノ二種アル而已即チ獨度涅烏斯カ其出處ニ由テ大小アリト云モノ是ナリ

○小封茲東竭 此草拂郎察ノ蘭中匱古ノ地方

麋惡ノ瘠地ニ生ス高サ一掌半或一尺許ナリ
羅別兒ローベルコレヲ蘭蚪ランコウ匱古ノ小封ホシ茲東竭ゾトシト稱ス即
業謁カシ埵爾蘭杜ノ本草家ノ所謂甘第亞封ホシ茲東竭ゾトシ
ノ一種ナリ

○大封ゾトシ茲東竭ゾトシ 羅別兒ローベル曰翁爾ウニル辣辣及把丟亞バトウアノ
地方ニハ最大物謁ゾトシ姪シヨリハ多ク生ス其高サモ
亦同カラズ脚葉ハ潤シテ綠色地上ニ垂ル花ハ
枯白色年ニ由テ花莖ヲ生セサルトアリ又園圃
及樹籬ノ傍等ノ陰地ニ生スルハ花アルト稀ナ

リ
○最大封ゾトシ茲東竭ゾトシ 羅別兒ローベル曰又最高封ホシ茲東竭ゾトシト
名ツクコレヲ羅甸ニ蟠訥パンネ屈祿斯クツク師莫末シママ吉悉キシ稱
莫ト稱ス予コレヲ業謁埵爾蘭杜ノ園中ニテ見
タリ前種ト同クメ葉花子共ニ他種ヨリモ二倍
ス

總說 此草沙地荒地或ハ道傍下濕ノ地ニモ亦コレ
アリ葉長潤小ニメ軟ナリコレヲ撫ルニ滑澤ニメ
柔毛茸覆ヘリ初生ハ葉叢生ス二三ケテテ莖ヲ

抽ス故ニ地和思谷里迭斯ハ花莖ナト言フ誤ナ
リ莖高サ一尺半圓クメ稍繭細色六七月ニ多枝ヲ
分チ花排列ス赤色ニメ紫黒ヲ帶フ後一花コトニ
四子簇生ス人衣ニ著スル一牛房子ノ如シ四子中
間ニ一小刺ヲ出ス堅利根ハ直ニメ巨大深ク土中
ニ入ル然レ地ニ由テ形狀ヲ異ニス故ニ獨乙都
生スルヨリ甚大ニメ葉潤キモノアリ或ハ小ニシ
テ低ク或ハ葉狹キモアリ其低シテ葉狹モノヲ甘
第亞ノ封茲東竭ト云フ

附考

封茲東竭子ハ甚小ニメ毛刺アル殼中ニア
リ其殼能人衣ニ著一竜茅草及竊衣ヨリモ甚シ
根ハ形色粘氣共ニ瓦兒縛兒的兒ニ似タリ其香
氣人ヲシテ眠ヲ催セシム○玉函涅斯達力烏斯
ノ説ニハ白花ノ者アリトイヘリ

性効

根葉共ニ中等ノ寒ニメ稍軟和ノ功アリ

主療

地和思谷里迭斯曰此草酒ニ煮テ服スレハ大
便ヲ通ス○此葉ヲ老豕ノ股ニ和シ貼スレハ毛髮
脱落ヲ治ス是レ火熱及酷厲液ニ由テ發スル者ナ

リ羅甸ニコレヲ亞落閉濕耶ト云又火傷ヲ治ス○
 地和思谷里迭斯曰能犬咬傷ヲ治スト然其全質
 ヲ審ニセザルニ由テ何ノ理アリテ其功アリト云
 一ヲ知ラス○此根熱灰中ニ煨シ痔ヲ療シ痛ヲ
 止ム

附考 封茲東竭ノ火傷ヲ治スルハ婦人等モ能

知トコロナリ是能清涼ニシ且燥シ痛ヲ止メ其
 満溢ノ毒ヲ禦クカ爲ナリ便チ溶化セル膏ニ合
 シ熱處ニ滴ス○其性緩和ニメ粘滑ナルカ故ニ

能大便ヲ通ス宜ク酒煎シテ冷服スベシ○此草
 其香氣ニ由テ眠ヲ催ス近世意太里亞及ヒ諸邦
 ニ於テ酷厲ニメ稀涼ナル胃寒傷冷毒ニ多用ユ
 是清涼ヨリハ大ニ稠密ノ功アリ○此葉能ク大
 便ヲ通ス酒煎メ用ユ又油ト鹽トヲ水ニ入レ煎
 シ用ユ○新鮮ナル葉ヲ採リ金療膿潰骨ヲ損傷
 スル者ニ貼メ良効アリ其葉自然汁モ亦功アリ
 ○自然汁及ヒ蒸露水癩毒ヨリ來ル所ノ小瘡及
 潰瘡ヲ治ス○葛覓樂律烏斯曰內痔ノ痛ヲ止ム

ルニ此根ヲ水ニ調和セル小麥粉ニ包裹シ熱灰
 中ニ煨シ後取出シ粉ヲ去リ其根ヲ以テ率樸悉
 禿離九子名醫學寶鑑ニ見ヘタリニ代用ス○封茲東竭丸ホシヅトシゲ 亞
 列吉算姪兒達樂兒力亞釋斯此ノ九子ヲ用テ腹
 痛ヲ和ク又其他斯ノ如キノ類証ヲ治ス其後藥
 局ニ傳テコレヲ造リ必輪姪蟾訥屈祿斯撒ト名
 ツク此物根皮一味ヲ丸ス此九子三分錢ノ半ヲ
 鋪後二時我國ノ一時也ニ用ユ能人ヲメ眠ラシメ胃
 寒傷冷毒ノ諸症ヲ治ス

禿斯羅禿件窩



第三十四章 窩件禿羅斯禿

名義 謁烏弗樂悉亞羅謁乙謁部力古禿里亞亞烏件

禿祿斯禿熱爾瑪亞莫部祿斯葛別謁莫斯

和名コ、メグサ伊吹山漢名未詳

此草古來ヨリ謁烏弗樂悉亞ト稱ス伊斯把尼亞及

意太里亞拂郎察ノ人モ皆コレニ充ツ近世ノ本草

家ハ謁烏弗祿設乙涅ト呼フ又一種謁烏弗祿設乙

嫩トイフモノアリ即チ和斯線東謁第二十一章ナリ

或人說ニ本條ヲ和許樂力斯又和弗達兒密葛ト云

共ニ眼目草ノ義ナリ是眼目ニ功アルカ故ナリ

附考 此物又葛榮兒窩謁ノ名アリ是明目ノ義ナ

リ古ノ本草家ハ謁烏弗祿設乙涅ノ名ヲ稱セス

ノ唯彌屈祿斯設トノニ稱ス布立稱稱ノ說ニ是

厄勒齊亞名ニノ酒ニ浸メ飲シムレハ心意ヲ果

ニシムルカ故ナリト高亦二百年以來今ニ至ラ

謁烏弗祿悉亞又謁烏弗祿設乙涅ノ名ヲ稱ス熱

尔瑪尼亞及業謁控尔蘭社ニ窩件禿羅斯禿ト云

フハ眼目昏暗淚眼等ヲ治スルカ故ナリ諸厄利

亞^ニ謁^シ謁^部力^屈亮^トイフハ是

總說 此草枯瘦セサル草莽ノ地ニアリ然レ間亦荒

地曠野及レ道傍ニモ生スルイアリ小草ニメ^{高サ}茎^高為

一掌徑茎細シテ弱シ微黒色ヲ帶フ枝多ク^{対生}対生^{ハ九月}アリ

亞^ア屈^ク斯^ス建^ン斯^ス具^具ノ如シ葉最^小小ニメ^辺辺^鋸鋸^齒アリ^花花^{アリ}アリ

白色ニメ黄及レ紫赤色ノ點アリ花時其全草ヲ採

テ乾シ收メ貯フベシ根ハ細シテ鬚多シ

附考 瘠地及陰地ヲ好ム又下濕及曠野ニ生ス此

物根ヨリ嫩苗ヲ生ス子ヲ蔕^テ蔕^テ生セス和蘭地方

ニ生スルハ一尺半許ノモノアリ

羅別兒 曰此草瘠地ニ生シ小ニメ高サ一掌徑甚

愛スベシ^ハ哈^シ蔓^シ姪^ル兒^ル鄰^ルヨリモ^形形狀^小小ニメ^葉葉^皺皺^文文

アリ且小白花ヲ開ク黄紫ノ斑點アルモノヲ佳

トス

性効 性熱ニメ燥ナリ然レ熱ヨリハ燥ナルイ^類類^シシ

附考 味苦ク燥ニメ過ナリ

主療 此草眼科ノ要藥ニメ尊ラコレヲ用ユ或ハ單

服シ或ハ方劑ニ配合メ視カラ益シ眼疾ヲ除ク最

經久ノ症ヲ療ス此物搗キ末トシ茴香子及肉豆蔻
膜薄シテ佳者ヲ加ヘ砂糖ヲ合メ能ク混和セシメ毎
朝一匕空心ニ冷酒ニテ送下ス最長久服スベシ○

明目酒

亞兒訥兒述斯比兒樂訥烏亞釋斯曰此草

十月ニ收取シ酒ニ造リ服スルトキハ老人ヲシテ
再復壯年ノ視力ニ復セシム故ニ眼目翳膜及赤熱
ノ水液滴出スル等ノ諸症ヲ治ス

附考眼目昏暗淚眼及冒寒傷冷毒ヨリ發スルノ

症眼目一切諸病ニ内服外用シテ最長奇効アリ
○眼目諸疾ニ葉乾シ末トナシ鷄子黃ニ和シ服
ス或ハ蘆薈ヲ合シ茴香馬鞭草ノ蒸露ヲ以テ服
ス尤妙ナリ○眼目ヲ明カニスルニ此草ヲ久ク
酒ニ浸シ服ス或ハ細末ヲ酒ニテ服ス甚妙ナリ
然レ一説ニ酒ヲ用ヒスノ細末ヲ單服シ或ハ煎
汁ヲ服スルハ明目酒ヨリモ勝レリトス何者酒
ハ其蒸氣頭腦ニ滿溢シ葛達兒カタル歛ヒニ眵淚鼻膿等ヲ
發ス若シ酒ニテ用ニト欲セハ茴香蒸露或ハ沙

經久ノ症ヲ療ス此物搗キ末トシ茴香子及肉豆蔻
膜薄シテ佳者ヲ加ヘ砂糖ヲ合メ能ク混和セシメ毎
朝一匕空心ニ冷酒ニテ送下ス最長久服スベシ○
亞兒訶兒述斯比兒樂訶烏亞釋斯曰此草
十月ニ收取シ酒ニ造リ服スルトキハ老人ヲシテ
再復壯年ノ視力ニ復セシム故ニ眼目翳膜及赤熱
ノ水液滴出スル等ノ諸症ヲ治ス

附考眼目昏暗淚眼及冒寒傷冷毒ヨリ發スルノ

症眼目一切諸病ニ内服外用シテ最長奇効アリ
○眼目諸疾ニ葉乾シ末トナシ鷄子黃ニ和シ服
ス或ハ蘆薈ヲ合シ茴香馬鞭草ノ蒸露ヲ以テ服
ス尤妙ナリ○眼目ヲ明カニスルニ此草ヲ久ク
酒ニ浸シ服ス或ハ細末ヲ酒ニテ服ス甚妙ナリ
然レ一説ニ酒ヲ用ヒスノ細末ヲ單服シ或ハ煎
汁ヲ服スルハ明目酒ヨリモ勝レリトス何者酒
ハ其蒸氣頭腦ニ滿溢シ葛達兒カタール歛ヒシノ眵淚鼻膿等ヲ
發ス若シ酒ニテ用ニト欲セハ茴香蒸露或ハ沙

糖ヲ和シテ其性ヲ緩和スベシロバ羅別兒ノ説ニ蘓亦齊ニ於テ一友人胃寒傷冷毒ヲ壓迫シテ少シク淚眼ヲ患フ明目酒ヲ用ユルヲ三月許ニメ兩眼明ヲ失セリ故ニ酒ニテ用ユルヲ禁ス而メ胃寒傷冷毒ノ熱ニ屬スルモノヨリ寒ニ屬スルモノニ用ユルヲ佳トス又或人ノ説ニ世人稱譽スル所ノ明目酒ハ眼目ヲ療スルヨリハ害アルヲ大ナリト言ヘリ○ア亞兒訥兒ル述斯比兒ル樂訥烏ク亞ア穉斯スハ一老夫ノ久シク明ヲ失シタリシヲ此

草ノ生葉或ハ乾葉ヲ飲食及ヒ諸物ニ和メ服食シ全愈シタリ

追附此物久服メ明ヲ失スル者舊ニ復シ昏暗ノ者眼鏡ヲ廢スル者少カラズ且肥人ノ粘液多キ者ニ屢益アリ細末一錢酒ヲ以テ空心ニ服ス數月ニメ一切眼疾ヲ治ス又方此物茴香各十六錢肉豆蔻膜三分錢ノ一冰糖適宜ヲ加ヘ散藥トシ用ユ○眼目昏暗及其他諸症ニ此草水或ハ酒ニ煎シ外貼ス又自然汁蒸露水共ニ妙ナリ○健忘

ヲ治ス強記シテ忘レサラシム甚良功アリ○黃
 疸ヲ治ス此物礪砂少許ヲ加ヘ水ニ浸ス一宿
 能混和シ其水ヲ服ス甚功アリ○癩毒ヲ治ス此
 草莖葉根ヲ連子酒ニ浸シ服ス又水煎シ浴湯ト
 ナシテ其輕症ヲ發汗セシム○齒痛蝕齒治ス
 全草燒灰シ淋汁トナシ温テ嗽クベシ○鼻香臭
 ヲ聞サル者初發ニ自然汁ヲ鼻中ニ塗ル大ニ功
 ヲ著ス又口瘡ヲ治ス○金瘡難治ノ症又胸脇痛
 ヲ治ス此葉油ニ浸シ太陽ニ晒ス一本邦ノ時半時ニ

當ル許滓ヲ去リコレヲ塗ルベシ○婦人愁鬱シテ
 顔色好カラサル者此花酒煎シテ服ス追附ノ一
 十五章ヨリ條ハ第三
 爰ニ附入ス

妨害 缺

附考 前ニ明目酒ノ熱ヨリ發スル眼目諸病ニ害
 アルヲ説ケリ最ニ精神衰弱ノ人ニ害アリト
 知ベシ

第二種

高窩件禿羅斯禿



第三十五章 第二種窩件禿羅斯禿

名義 謁烏弗樂悉亞兒的樂ト稱ス是即チ第二

今通ノ謁烏弗樂悉亞兒的樂ト稱ス是即チ第二

種窩件禿羅斯禿ノ義ナリ然レ真ノ窩件禿羅斯禿

ニ全ク相似ス唯一莖數ヲ分ツノミ又窩件禿羅斯

禿哈樂斯ニモ近カラズ此物ハ根ヨリ特立スルノ

ミニメ彼カ如ク叢生セス又節モ高カラス何ニ由

テ此名アルヲ知ラス

總說 此物下濕ノ地ニ生ス乾燥ノ地ニハ絶テ生セ

ス間牧地陰處ニコレアリ苗高一尺或ハ尺許莖圓

シテ多枝ヲ分チ對生スルヲ翼ノ如シ葉小ニメ狹

長尖リテ下へ彎曲ス七月頃葉間小花ヲ著シ數月

ヲ保ツ赤色ヲ帶フ根ハ鬚アリテ四方へ蔓延ス

性効 主療共ニ未詳

遠西草木譜卷之二

遠西草木譜卷之二終

三百六十二

