





梅里杉田先生譯

# 濟生三方

醫者戒  
附刻

安政丙辰年再刻

理貫人天言

確今古穎機





# 橐囊鴻術儀

## 集

嘉永紀元冬象山平啓題

中澤俊仰書



凡例

一原書ハ「エ」ニシリテオシ。トチキムト題シ。内科施治  
 人準則ヲ説ケル者ニシテ。故ノ遠西亭漏生名國ノ國  
 政參議侍醫兼別爾里印名地大學校ノ教頭扶歇蘭度  
 人著ス所ナリ。其鏤版彼紀元一千八百三十六年ニ  
 シテ。和蘭人哈傑滿名コレヲ譯行セルハ彼紀元一千  
 八百三十八年ニアリ。實ニ我天保九年戊戌ナリ。其  
 病門十三類ヲ分チ。更ニ婦人病小兒病ヲ舉ゲ。而シ  
 テ其藥劑方書ニ至ルマデ。議論簡明道理通暢ナル  
 了。予ガ見ル所ヲ以テスレバ。漢土西洋ノ醫書中。其



說ノ確實ナル。未此書ノ如キ者アラズ。蓋斯人五十年間自試験スル所ニ本ツキテ以テ。其說ヲ建ル所ナリト云。今譯述スル所ノ者ハ則原本卷末ノ一篇ニシテ。刺絡阿片吐藥ノ三方ヲ論スル者ナリ。但此三方ハ醫ノ方法中。其用最廣ク其力最大ナル者ニシテ。其性能ト應用トヲ辨明スルハ實ニ醫家ノ急務ナリ。故ニ今先此一篇ヲ抄譯シ。濟生三方ト題シテ副刷ニ屬シ。コレヲ同志ニ頒ツ又附刻スル所ノ醫戒ハ則亦原本ノ最末ニ載セタル一篇ニシテ。醫ノ宜ク守ルベキ所ノ警戒數條ヲ舉グ。是蓋醫タル

者各自能熟知スル所ナルヘシト雖。亦以テ作者致意ノ至リヲ見ルニ足ル。全篇繙譯ノゴトキハ未速ニ業ヲ卒ヘ易カラズ。將ニ他日ヲ待テ世ニ問ハムトス。一書中病名藥名等。漢名ノ對譯スベキ者アレハコレヲ用井。其無キ者ハ務メテ先輩所定ノ譯名ヲ襲用ス。若夫先輩ノ譯定ナキ者ハ。原語ノ意ニ據テ竊ニ新譯ヲ下ス者アリ。又原本自註アル者ハ。或ハ一字ヲ低シテ且自註曰ノ字ヲ冒シ。或ハ分テ兩行トナシ文中ニコレヲ插ス。但予カ按スル所ニ係ル者ハ。



必<sup>ク</sup>按ノ字ヲ冒ス。

一藥品秤量「ゲレイン」<sup>レ</sup>「スクルペル」ノ如キハ。先輩所製ノ字ヲ襲用シテ「ト云ヒ」<sup>レ</sup>「ト云フ」<sup>レ</sup>。是本邦ノ量ヲ舉グレバ一釐七毛三弗ト云ヒ。三分四釐七毛ト云フガ如ク。冗長ナルヲ免レザルヲ以テナリ。又「ポンド」<sup>レ</sup>「オンス」<sup>レ</sup>「ダラクマ」ノ如キハ。分釐毛弗ノ差ヲ論ゼズシテ可ナリ。故ニ直<sup>チ</sup>ニ百錢ト云ヒ八錢ト云ヒ一錢ト云フ。亦看者ニ便スル所ナリ。

一西洋時刻ヲ定ムル法。固ヨリ本邦ト異ニシテ。晝夜平等時ヲ以テ常用トス。其一時ハ即我春秋分ノ時ノ半時ニ當ル。今我一時ト錯過セム<sup>ト</sup>ヲ恐ル、ガ為ニ。譯シテ一小時ト云フ。半小時ト云ヒ四分小時ト云フガ如キハ。一小時ノ半。一小時ノ四分一ヲ謂フナリ。又其一小時ヲ六十分スル者ヲ分ト云ヒ。一分ヲ六十分スル者ヲ秒ト云フ。今幾分時幾秒時ト譯ス。看者以テ幾分小時ト混スル<sup>ト</sup>ナカレ。

一譯法ニ音譯義譯直譯對譯等ノ別アル<sup>ト</sup>ハ。先輩已論辨スル所ナルヲ以テ。今復此ニ贅セズ。但原本文章雄偉正大ニシテ。予ガ函莽拙劣能其深意ヲ通達スル<sup>ト</sup>ヲ得ズ。只務メテ原文ニ因循シテ以テ譯字



ヲ下スノミ。看者其陋ヲ嗤フヲナク。譯ニ就テ以テ  
 原文ノ意ヲ索メバ。我術ニ於テ小補ナキニアラジ。  
 嘉永二年己酉三月

杉田信成卿

識

濟生三方總目

表目

卷上

總論

刺絡第一

必其一妊娠

何其二月經方絶之時期

卷中其三勞瘵之素質

其四卒厥之素質

其五出血



其六震盪

其七多血因地處狹隘者

卷中

阿片第二

必見之症

本能

功理

主治

應用

齊主局處焮衝

神經熱及室扶斯

主間歇熱

瘧

創後之神經症

精神錯亂

咳及胸患

痢

尿崩

毒傳染毒

分利使皮膚活發



異常組織

姑息之能

危害

卷下

吐藥第三

功理

其一局發之功

其二沉發之功

主治 禁忌

起吐之術

各異應用目畢

熱性熱

間歇熱

傳染熱

咽焮衝 搭樓

肺焮衝

頰面羅斯

鴛口瘡

咳

百日咳



肺勞

喘塞 窒塞聖京

痢 霍亂

痿麻質諸病

精神錯亂

卒厥 麻痺

初生假死

小兒諸病

服毒

濟生三方總目畢

濟生三方卷上

若狹

杉田信成卿

譯

總論

醫ニ三方アリテ百藥ノ長ヲナス。猶軍ニ將校アリテ以テ士卒ヲ指揮スルガゴトシ。三方トハ何ゾ。刺絡。阿片。吐藥。是ナリ。此三者ハ即醫術ノ基本ナル三療法ヲ成立スル者ニシテ。一ハ消熱ノ功ヲ奏シ。一ハ淨腹ノ績ヲ底シ。一ハ興奮ノ勳ヲ建ツ。正ニ是活體ノ大綱ナル三系ヲ制ス





ルナリ。即刺絡ハ刺衝ノ一系ヲ侵シ。吐藥ハ補給ノ一系ヲ襲ヒ。阿片ハ知覺ノ一系ヲ制ス。共ニ皆直チニ生活ヲ制スル者ニシテ。千百ノ醫藥中。其功力ノ迅疾的切ナルヲ。此三者ニ如ク者ナシ。實ニコレヲ三將軍ト稱スベシ。蓋此三者ハ皆能生ヲ與ヘ。又能死ヲ與フ。而シテ病將ニ分利セムトスルノ際ニ當テ。其勝敗ヲ一決セシム。醫ノ幸福名譽。特ニ此三方ノ運用ニ係ル。又此三者ハ皆各別ニ其カラ逞スル者ニシテ。他藥ノコレニ代フベキ者ナシ。

凡此三方ヲ運用スルヲ知レル者ハ即コレヲ良醫ト謂フベシ。然レ氏多クハ一方ニ僻シテ三者兼備ノ醫少シ。或ハ吐藥ヲ用井ルニ熟スルモ。刺絡ヲ用井ルヲ知ラズ。或ハ刺絡ニ熟スルモ。吐藥ト阿片トヲ應用スルヲ知ラザルガ如シ。軍醫論中ニ論ズル又吾輩生レシ日ヨリ。今ニ至ルマデ。正ニ是三方各異ニ世ニ行ハル。時限ニシテ。何レノ時ニアリテモ。三方ノ世ニ行ハレザルヲナシ。故ニ醫術ノ盛衰沿革ヲ論スルハ。三方常ニ相繼テ勢ヲ逞スルヲ。猶帝王相繼テ位ニ即タガゴトシ。蓋今ヨリ五十年前ハ。刺絡最勢ヲ逞セシガ。次テ吐藥ノ世トナリシ。又コレニ次テ

ト謂フベシ。然レ氏多クハ一方ニ僻シテ三者兼備ノ醫少シ。或ハ吐藥ヲ用井ルニ熟スルモ。刺絡ヲ用井ルヲ知ラズ。或ハ刺絡ニ熟スルモ。吐藥ト阿片トヲ應用スルヲ知ラザルガ如シ。軍醫論中ニ論ズル又吾輩生レシ日ヨリ。今ニ至ルマデ。正ニ是三方各異ニ世ニ行ハル。時限ニシテ。何レノ時ニアリテモ。三方ノ世ニ行ハレザルヲナシ。故ニ醫術ノ盛衰沿革ヲ論スルハ。三方常ニ相繼テ勢ヲ逞スルヲ。猶帝王相繼テ位ニ即タガゴトシ。蓋今ヨリ五十年前ハ。刺絡最勢ヲ逞セシガ。次テ吐藥ノ世トナリシ。又コレニ次テ



阿片威ヲ擅ニスル世トナレリ。而シテ當今ハ刺絡方ニ祚ヲ踐ムノ初トス。

自註ニ曰ク。予ガ此論。敢テ世ノ一方ニ僻スル徒ヲ譏ルニ非ズ。然ク三方相繼テ醫治ノ風ヲ變スルハ。其原實ニ自然ノ理。流行ノ勢ニ因レリ。然レモ又此ニ庸醫ノ自試驗セズシテ。一ニ流風ニ僻スル誤ナキ一能ハズ。予曩ニ既ニ予ガ軍疫論中ニ論ゼリ。又含電汎シテハム名ノ新發熱病論中ニ載セテ云。嘗治ヲ行フ際。自然ノ勢ニ因テ病性變革シ。從前堅持ノ治法ヲ改メテ。一新法ヲ行ハザルトテ得ザリシトゾ。

但此三方其性能各異ニシテ。コレヲ行ハムニハ。必三様各異特應ノ症候ヲ期シ。斷然トシテ彼此替換スルコトヲ得ズ。或ハ彼此誤錯スルキハ。能シテ生命ヲ殞スニ至ルコトアリ。是ヲ以テ予今此三將軍ハ性情威勢ヲ詳論シ。各其適應ノ地位ヲ舉ゲ。特ニ其コレヲ錯雜シ易ク誤用シ易ク措棄シ易キ諸症ヲ論載シ。且其偉勲世ニ未知ラレザル所ノ適症ヲ知ラシムトス。豈筆ヲ勞スルノ功ナシト曰ハムヤ。



刺絡第一

美瑟曰。人之生在其血。

夫刺絡ハ生命ノ一部ヲ奪ヒ。生カノ勢ヲ殊ニ其本源ニ減殺スルノ力。他ノ諸藥ノ上ニアル。固ヨリ論ヲ待タズ。予今ヨリ二十五年前。説ヲ建テ、曰ク。血ハ本自生活シテ。帝ニ刺衝物タルノミナラズ。直ニ生命ノ一部流動ノ生器ナリト。當時此論ヲ排斥スル者多カリシガ。今ニ至テ人々皆其然ルヲ信ゼリ。

予深ク古賢ノ言ヲ信ス。曰ク。人之生在其血ト。夫血ハ猶母ノゴトシ。造成化育ノ力此ニ舍シ。身中凡百ノ生器是ヨリ生ズ。凡流體ナケレバ生ナシ。生アル所ノ者ハ必流體ヨリ成ル。初生ヨリ死ニ至ルマテ。唯流體造成化育ノ功ノミ。血ナケレバ神經以テ生活セズ。腦髓亦以テ生活セズ。而シテ神經ナシト雖。心臟血液能獨生活スルヲ得ルナリ。然レバ生活ヲ減殺スルハ。刺絡ノ第一本能ナリ。故ニ諸病血中ニ生カ充溢スル者ニ在テハ。刺絡ヲ以テ一大藥トス。其症ハ則所謂焮衝性諸病是ナリ。是故ニ熱性諸病應時ニ刺絡ヲ行ヘバ。能焮衝ノ萌芽ヲ除キ。又全身若クハ局部ノ焮衝既ニ發スルモ。一回若クハ數



回ノ刺絡ニ因テ。其症全ク除キ。以テ生命ヲ救全スル  
ヲ得ルナリ。

然レビ其第二能モ亦以テ小ナリト謂フベカラズ。即  
纖維ヲ弛緩シ兼テ痙及纖維ノ牽縮ヲ除クノ能是ナ  
リ。此能アルヲ以テ帝ニ真焮衝ニ功アルノミナラズ。  
諸病將ニ焮衝セムトスル徴アル者ニ用井テ一大藥  
トス。例スルニ神經病。痙攣。搐掣。神經熱及攣急ニ因ス  
ル泄血閉止按ニ經閉等等ノ如シ。又能病ノ分利ヲ進メ  
瘡疹ノ發出ヲ催ス。○此能及第一能ハ共ニ泄ス所ノ  
血量ト泄法ノ遲速ニ關ルト大ナリ。其故ハ生力減衰

ト纖維弛緩ノ大小ハ。特ニ瀉泄ノ遲速ニ關ルヲ以テ  
ナリ。  
其第三能ハ則瀉泄ノ能ニシテ。血量ヲ減少スルニア  
リ。此能又別ニ一途ニシテ自上ノ二能ト異リ。○夫多  
血ト稱スル者。本臆察ノ命名ニ非ズ。實ニ血量ノ過多  
ナルニ在リテ。是ニ由テ能無數ノ病ヲ萌發ス。故ニ焮  
衝ノ候ナキ症トイヘ氏。單ニ血ヲ泄シ其量ヲ減スル  
ニ因テ能一大勲ヲ奏スルナリ。○此能ハ其泄ス所ノ  
部ト泄ス時ノ遲速トニ關ラズ。要唯適合ノ量ニアル  
ノミ。



其第四能ハ則誘導ノ能是ナリ。局處ノ血積及他ノ諸症ニ於テ。極メテ闕クベカラザルノ策トス。此能ハ特ニ其泄ス所ノ部ニ闕ルト大ナリ。○近世ノ論ニ。刺絡ハ泄瀉ノ部ニ闕ラズト謂ヘル者アリ。然レモ若胸脇痛ニ施ス所ノ刺絡ノ功ヲ舉ゲ示サバ。即其說ノ非ヲ悟ルベシ。夫胸脇痛ニ刺絡ヲ行フニ方テ。コレヲ足ニ施セバ寸功ヲ見ズ。コレヲ患ナキ方ノ肘ニ施セバ又功ナク。或ハ却テ病ヲシテ險重ナラシム。而シテ若コレヲ患アル方ノ肘ニ施セバ。立ニ其偉勲ヲ顯ス者ハ何ゾヤ。○又予カ歷驗スル所ニ據ルニ。肘ニ刺絡スレ

バ其功力月經ヲ遏止シ。墮胎ヲ預防ス。而シテ足ニ刺絡スレバ。却テ月經ヲ催シ。墮胎ヲ促ス。以テ刺絡ノ功其部位ニ闕ルトヲ證スベシ。今ノ世刺絡ノ焮衝及他ノ焮衝性諸病ニ大功アルトハ。普ク人ノ知ル所ナレバ。此ニ其說ヲ舉グルト須タズ。但コレヲ焮衝ナキ多血病及諸慢性病ニ。誘法ト為シテ施シ。特ニ諸病ノ預防法ト為シテ。寶方タルトヲ知ル者少シ。今此ニ其廣用ヲ說示セムトス。是予ガ此篇ヲ著スノ本旨ナリ。夫古賢刺絡ヲ施シテ。鴻勲ヲ建テシ所ノ諸症。近世ニ



至テハ。コレヲ遺レテ復行ハザル者少シトセズ。豈人間ノ一害ニ非ザラムヤ。

近二十年来心臟ノ病甚増セリ。其原因ヲ繹ヌルニ。悲憂哀痛等ノ精神ヲ傷ル事故ハ。固ヨリ其本因ナリ。然レモ其第二因ハ。必近時流行ノ譎説ニヨリテ刺絡ヲ措置スルニアルベシ。其故ハ其他ノ心病ヲ起スベキ天損情感ノ諸因ハ。古ヨリ在ル所ニシテ。久キ喪亂彼ノ三十年及七年ノ兵災ニ於ルガ如キモ。仍息ムト無カリシニ。心病ハ特ニ近世ノ如ク多カラザリシヲ以テナリ。予ガ第二因ト謂フ者ハ。新發ノ因ニシテ。他ノ

諸因ヲシテ。特ニ心臟ニカラ逞セシムベキ者ナリ。往昔ハ凡身體ヲ勞動シ。精神ヲ感傷シ。情意ヲ奮發シ。身軀ヲ灼熱スル等ノ事アリテ。血液沸騰シ。心臟ニ流注スル症アレバ。直ニ預防刺絡ヲ行ヒ。以テ諸惡症ノ萌發ヲ預防シ。血ヲ心臟ヨリ他部ニ誘導スルヲ以テ。常則トナセリ。悲夫。二十年来此法終ニ廢ス。而シテ人々訛説ヲ信シ。是等ノ諸症ニ刺絡ヲ行フコトナク。遂ニ全ク預防刺絡ヲ廢シ。且却テ衰弱ヲ懼レ。更ニ葡萄酒火酒。催熱ノ藥等ヲ與フルヲ常習トスルニ至ル。嗟此刺絡ヲ懈ルノ害如何ゾヤ。今夫血其量ヲ減ゼズ。又其力



ヲ折カズシテ。而シテ其沸漲ヲ縱ニスル片ハ終ニ心  
臟ヲ膨張開大シ。或ハ其質ヲ變ゼシムルニ至ルヲ無  
シト謂フベケムヤ。

次ニ列載スル所ノ諸症ハ。予ガ多年歷驗スル所ニ據  
レバ。刺絡極メテ功アリテ闕クベカラズ。コレヲ怠慢  
スレバ甚危シ。悲夫其刺絡ヲ怠ルニ因テ治シ難キノ  
險症ニ陷ルモノ。予屢見ル所ナリ。蓋世醫未是等ノ諸  
症ニ刺絡ノ然ク缺クベカラザルヲ知ラザル者ア  
ルニ由ルナリ。

其一妊娠

妊婦其第二三月ニ於テ諸般ノ症ヲ得ル片ハ肘ニ刺  
絡シ。臨月分挽ノ前ニ至テ足ニ刺絡スルハ古賢ノ定  
法ナリ。○然ルニ神經樣醫風起リ。次テ陰性醫風行ハ  
レ。醫復刺絡ヲ用井ザルニ至ル。是ニ於テカ古昔ノ良  
習廢絶シ。妊婦ヲ以テ陰性トシ。刺絡ハ母ノ為ニモ胎  
兒ノ為ニモ害アルベシト謂フニ至レリ。  
予ガ律トスル所ハ此說ニ反セリ。而シテ予ハ常ニコ  
レニ從ヒテ幸福ヲ得シヲ多シ。其律トイフハ則凡妊  
婦ハ重生ノ體ニシテ製血ノ機補給ノ能共ニ増盛シ  
而シテ平素ノ泄血閉止ス。故ニ多血陽性ノ體トス



妊婦ニ刺絡ヲ行フベキ時ニアリ。此時ニ於テハ。刺絡實ニ無雙ノ藥。必要ノ法ニシテ。以テ將來ノ大危害ヲ防グベシ。

其一ハ第二月。第三月。第四月。是ナリ。此時ニ於テ劇キ諸症。大頭痛。劇齒痛。嘔吐。眩暈。卒倒。咳嗽。胸窄等ヲ發シ。或ハ墮胎ノ前候ナル腹痛。背痛。下肢衰弱。子宮及膀胱ノ部ニ血液激進スルノ候ヲ發スル氏ハ則刺絡ノ主治トス。○夫此時ニ在テハ。常癖ノ泄血閉止シ。而シテ胎兒未多ク母血ヲ資用セザルヲ以テ。常ニ多血ニ至リ易シ。是等ノ諸症アリテ別ニ衰弱ノ候ナキ氏ハ予

常ニ刺絡ヲ行フ。特ニコレヲ肘ニ行フ。其故ハ足ニ刺絡スレバ墮胎ヲ催ス。アアルヲ以テナリ。然レモ肘ニ刺絡スレバ帝ニ墮胎ノ恐ナキ人言ナラス。或ハ其候アルモ能コレヲ預防スルヲ得ルナリ。予此法ヲ行ヒテ劇症嘔吐諸藥功ナキ者ヲ治スルヲ幾回ナルヲ知ラズ。因テ胎前ノ諸症ハ刺絡ノ主治トス。特ニ其二ハ臨月。是ナリ。凡任婦多液質ニシテ衰弱血虛ノ候ナキ者ハ。分挽ノ少シキ前ヲ刺絡ノ主治トス。特ニコレヲ足ニ行フ。此際刺絡ヲ行ヘバ二般ノ利アリ。其一ハ分挽ヲシテ易カラシム。夫分挽ノ前努痛久時ニ



シテ體軀疲憊スル者。予足上ノ刺絡ヲ以テ頓ニ其瘕  
 性努痛ヲ除キ。容易ニ分挽ヲ得セシムル一幾回ナル  
 ヲ知ラス。○其二ハ分挽ノ際。或ハ分挽後ノ諸惡症險  
 候ヲ預防スル一ヲ得ベシ其惡症險候トハ産間産後  
 卒厥ニ因テ頓ニ死スル者ト過度ノ脱血及痔熱等ヲ  
 謂フナリ夫分挽ノ妙機ハコレヲ劇甚ノ創傷ニ比ス  
 ベシ。其故ハ疼痛傷裂脱血情感兼至至ル一。猶創傷ニ  
 於ルガ如クナレバナリ。而シテ其誘發ノ症ハ則熱ナ  
 リ凡外科大手術ヲ行フノ前ニ於テ患者衰弱ノ候ナ  
 キ者ハ必刺絡ヲ行フヲ以テ定法トス。是將來ノ劇厥

衝及其他ノ諸險症ヲ防グガ為ナリ。内醫手術ノ如キ。  
 尚且術前ノ刺絡ヲ必要トス。○嗚呼分挽ノ機已ニ外  
 傷ニ同クシテ。而シテ療法特異ヲシメムト欲スルハ  
 何ゾヤ。其ハ月經方絶之時期  
 夫健全強壯ノ妊婦。産間或ハ産後卒厥ニ罹リ。或ハ搗  
 掣ヲ兼子。或ハ搗掣ナク。或ハ脱血ナク或ハ脱血中及  
 脱血後ニ頓ニ死スル者アリ。恐ルベキノ一症トス。此  
 ノ如キ症ハ予ガ歴驗スル所。多クハ少壯多血ノ婦人  
 ニアリテ。衰老ノ婦人ニハ稀ナリ。特ニ分挽前刺絡ヲ  
 怠レル者ニ多シ。然レバ此ノ如キ卒厥ハ。精力虚憊ス



ルヨリ發スルニ非ズシテ。劇甚ノ興奮ニ因テ。血ノ脉管ニ充盈セル者。卒ニ腦ニ聚流スルヨリ來ルヲ疑フヘカラス。故ニ予ハ此諸症ヲ預防スルニ。産前少時ニ於テ刺絡ヲ行フヲ以テ無雙ノ良法トス。屢試驗スルニ刺絡ヲ施セル者ニ於テハ。未曾惡症ヲ發スルヲアルヲ見ズ。

其二月經方絶之時期

刺絡ヲ以テ大害ヲ防キ得ベクシテ。世人間コレヲ怠ル者。妊娠ニ次テハ此時期トス。○夫月經ノ遏止シテ來ラザルハ。年老生機衰弱シ血ノ製造減スルニ由ル

ト謂フ者アリト雖。是全ク然ラス。唯生殖ノ機ト生殖ノ器具ノ廢死スルニ由リ。而シテ全身ノ生機ト血液ノ製造トハ。依然トシテ壯盛ナルヲ得ルナリ。故ニ或ハ月經方ニ絶スル頃ニ至テ。身體始メテ強實ヲ得ル者アリ。○然ク此時期ニ於テ身體多液トナリ。分利ノ器ハ却テ靜止スルヨリ。諸危症ヲ發スルヲアルナリ。然レバ月經絶止シテ後。全身ノ生機再平均ヲ得ルニ至ルマデハ。是ヲ婦人ノ生機一變スルノ期ト謂フベシ。然レバ其平均ヲ得ルハ。營ニ補給分泌ノ二機偏勝ナク。諸液ノ分配更ニ一新ノ道路ヲ得ルニ在ル



ノミナラズ。全身ノ生力特ニ其補給ノ力調理スルニ在ルナリ。其故ハ補給ノ力今ハ其寓ヲ失フヲ以テ。動レバ病性ノ補給ヲ致ス。一アレバナリ。是ニ由リテ此時期ハ諸般ノ險症ヲ發スルヲ多シ。其症ヲ源ヌルニ皆二因ヨリ生ス。一ハ血液各部ニ聚積スルニ因ル。即頭。胸。胃及他ノ腹臟ニ血積ヲ生シ。子宮出血。内部溢血。吐血。咳血。痔。神經諸症等ヲ發スルガ如シ。一ハ補給力常ニ及シ分泌機病ヲ得ルニ因ル。即硬結腫ヲ發シ。或ハ曾患ノ硬結腫癌ニ變シ。皮膚病。潰瘍。依窟。篤。水腫等ヲ發スルガ如シ。

此時期ノ無雙ノ療法ニシテ。且右ノ諸症ノ預防法ハ。則其不平ヲ調均シ。多血ヲ減少シ。且其貴部ニ聚レルヲ誘導シ。分泌器ノ缺ケタルヲ他ノ新泄ニ因テ補充セシムルニアリ。

右ノ療法ヲ行ハムト欲セバ。先其體質ヲ察シテ過度ノ衰弱ナキ者ニハ。六個月ゴトニ適量ノ刺絡ヲ行ヒ。又性多液ニシテ從前經血多カリシ婦人ニハ。三個月ゴトニ刺絡ヲ行ヒ。局處ノ血積及病患アル者ニハ。八週ゴトニ十個若クハ十六個ノ吸角ヲ行フベシ。蓋吸角ノ誘法ハ。此時期ニ於テ屢偉功ヲ奏ス。是毛細管ヲ



開達シテ。其病ノ取トナレルヲ除ケバナリ。而シテ又  
 淡薄ノ食餌ヲ常用セシメ。毎日身體ヲ運動セシメ。且  
 四週ゴトニ四日若クハ六日ノ間清涼下劑ヲ與ヘ。或  
 ハ毎朝四十八錢乃至八十錢ノ「セドリ」セル水ヲ服セ  
 シムルヲ最良トス。按ニ「セトリ」ハ「礦泉」ノ名其水  
 硫酸加爾基及硫酸曹達  
 ト云。ハ若夫兼テ危險頑固ノ症及血積ノ候。眩暈卒厥  
 ノ前徵。喘息皮病。依窠篤等ノ如キ症アラバ。打膿法ヲ  
 行フヲ要トス。  
 右ノ療法ヲ行ヒテ。月經停止ノ時期ヲ距レテ漸遠ク。  
 多血ノ候漸退クニ隨テ。瀉血法モ亦漸其數ヲ減シ。月

經止ムノ後一年若クハ二年三年ニシテ全ク刺絡ヲ  
 止ムベシ。但多血ノ婦人ニハ月經止ミテヨリ極老ニ  
 至ルマデ毎歲一度必瀉血ヲ要スル者アリ。  
 右ノ法ニ據リ特ニ屢瀉血ヲ行ヘバ能ク此年行ノ諸危  
 症ヲ預防シ硬結腫常ニ此時ニ至リテ癌ニ變スルヲ  
 禦クベキヲ予固クコレヲ保證ス。  
 其三勞瘵之素質  
 勞瘵ノ素質ニニアリハ虚性ト曰ヒ一ハ實性又焮  
 衝性ト曰フ其虚性ノ者ニ於テハ肺弛弱シ血管ノ全  
 系虚衰ノ候ヲ呈スナリ此症ハ粘液ヲ咯出スルヲ頻



數ニシテ。其量モ亦漸増加ス。此症ノ真肺勞ニ陥ルヲ  
 預防スル要領ハ。強壯法ニシテ即。依蘭苔幾那等ヲ連  
 用スルニアリ。瀉血法ノ如キハ必害アリテ。徒ニ其真  
 肺勞ニ陥ルヲ促スベシ。然レモ其實性ノ者ニ在テハ。  
 肺將ニ焮衝セムトスル症。及刺衝セラル、狀。或ハ結  
 節ヲ生スル候アリテ。血管全系ノ刺衝機旺盛ス。其徵  
 ハ則兩頰紅ニシテ粗ヘルガ如ク。或ハ熱シ。兩手モ亦  
 熱シ。脉常ニ刺衝セラレ。或ハ胸中刺痛ヲ覺エ。呼吸短  
 喘シテ乾咳出デ。或ハ動レバ咳血出デ。及發熱スルヲ  
 以テ知ルベシ。此症ニ在テハ生命ヲ保全シ。真肺勞ニ

陥ルヲ預防スル無ニノ方ハ。則寒涼ノ攝養ヲ行ヒ。屢  
 少量ノ刺絡ヲ行フニアリ。○十六歳以上二十五歳ニ  
 至ルマデハ。極メテ肺勞ニ罹リ易キ險時ナリ予ハ次  
 ノ法ヲ以テ屢。此危險ノ時ヲ保タシムルヲ得タリ。  
 其法ハ二個月三個月或ハ四個月コトニ適宜ノ刺絡  
 ヲ行フ。但一回ノ血量四十八錢ヨリ六十四錢ヲ過ル  
 下無シ。而シテ兩臂ニ打膿法ヲ施シ。或ハ第芟答利斯  
 葉ヲ貼シ。内服ニハ唯乳清乳汁。點失刺。藪加列。勿留。護  
 勃爾。拉。藪。茅根等ノ新絞汁。或ハ越幾斯。胡瓜汁。少量ノ  
 第芟答利斯等ヲ用井ルノミ。○凡此症ニ於テ瀉血ノ



必要ナルハ。婦人肺勞ノ素質アル者ヲ見テ知ルベシ。其故ハ婦人月經通スル間ハ十分ノ素質アリト雖。肺勞ヲ發スルニ至ラズ。其月經遏止スル時ニ至テ。肺勞方ニ其勢ヲ逞シ。患者終ニ斃ル、者多ケレバナリ。

其四卒厥之素質

凡體軀肥胖シ。頸短クシテ太ク。頭顱過大ナル人ハ。天然ニ卒厥ノ素質アリ。故ニ此ノ如キ人四五十歳ニ至レバ。卒厥ノ前徵ヲ發ス。其症ハ則眩暈頭重耳鳴嗜眠健忘等ナリ。又右ノ如キ骨格ナキモ。老年ニ至リ依窟篤痔等ヲ患ヒ。遂ニ卒厥ノ素因トナル者アリ。或ハ又

是等ノ病ナキモ。老年ニ至レバ皮表ノ脉管縮窄。或ハ漸骨ニ化スルニ因テ。血多ク内部ニ聚積シ或ハ腦中ニ壓入シ。遂ニ卒厥ヲ致ストアリ。○右ノ諸症ニ於テ卒厥ノ前候既ニ見レ兼テ多血ノ候アルキハ。其未發ヲ預防シ以テ生命ヲ保全スル最大良法ハ。屢清涼下劑ヲ與ヘ。打膿法ヲ施シ。時時刺絡ヲ行フニアリ。其刺絡ハ一回ハ臂ニ行ヒ。一回ハ足ニ行フヲ良トス。又凡刺絡ヲ行フ時限ハ第十一月我九頃頃雪始メテ降ル頃ト。第五六月我三四頃頃新暖始メテ来ル頃頃ヲ佳トス。是良能正ニ刺絡ヲ要スル時ナリ。其故ハ新寒ノ時ハ皮表



ノ脉絡收縮シ。大氣ノ重力増加スルヲ以テ。血腦中ニ鬱積シ易ク。又新暖ノ時ハ。血俄ニ沸漲スルヲ以テ。亦腦中血積ヲ起シ易ケレバナリ。此新暖ノ時ハ即古人ノ薔薇花開ク時ト稱スル者ナリ。

自註ニ曰ク。此ニ用井ル清涼下劑諸種ノ中。弁布ノ發明ニテ眩暈ニ稱用シ後屢予カ試験セル一方アリ。其功勝テ稱スベカラズ。其方剥屈訶烏篤脂純精酒石各半錢研末混和シ。每宵臨卧ニ服スル一三三夕。此方管眩暈ヲ治スルノミナラズ。總テ老年卒厥ノ預防藥トシ。毎月二三日連用シテ大功アリ蓋老

内年ノ卒厥ニハ。慢性依窟篤合併スル者多クレバナリ。○又若痔血ノ前候アル者ニハ。硫黄乳十片乃至十五片ヲ加スヘシ。

予ガ試験ニ。此症アル老人毎歲刺絡ヲ行ヒテ。八十歳ニ至リ尚健ナル者アリ。凡年齒ノ邵高ハ則刺絡ノ一主徴トスベキナリ。故ニ少壯ノ時刺絡ヲ要セザル者モ。年老レバ刺絡ヲ行スベキ症ヲ發ス。今コレニ其理ヲ詳説スベシ。夫年老レバ衰弱ヲ為スヲ以テ。強壯藥ヲ與スベシト謂フハ。是庸醫ノ通説ナリ。是殊ニ然ラズ。多血性ノ人穀化ノ機健全ナル者ハ。極老ニ至ルマ



テモ血ノ製造盛ナリ。然ルニ年老レバ脉管縮小シ。細  
 脉管及毛細管ノ動力減衰スルヲ以テ。血齊ク分布ス  
 ルヲ得ズ。却テ局處ノ血積ヲ生シ。特ニ腦血積ヲ致  
 シ易シ。是ニ於テ剩餘ノ血始メテ危殆ノ萌蘖トナル  
 ナリ。○故ニ少壯ノ時ハ刺絡ヲ要セザル人モ。五六十年  
 歳ニ至リテヨリ。毎歳刺絡スベキ者多シ。醫宜ク意ヲ  
 用井テコレヲ察シ。衰弱血虚ノ表狀。皮色ノ灰白。肢體  
 ノ瘦癯等ニ因テ。惑ヲ取ルヲ勿レ。卒厥既ニ發スル時  
 ニ於ルモ亦然リ。右ノ如ク外表衰弱ノ候アル人。却テ  
 内部多血ノ者アリ。然ルガ如キハ。唯其脉實且力アリ

テ緊ナルノミヲ以テ。刺絡ノ主治ヲ診決スベシ。予嘗  
 一患者ヲ療ス。年七十二歳。體軀瘦削。色澤灰白。卒厥ニ  
 罹リテ倒仆シ。言語動作共ニ廢ス。但其脉ハ則實ナリ。  
 予乃先血九十六錢ヲ瀉スルニ佳候ナク。血復出テズ。  
 是ニ於テ更ニ一臂ノ脉ヲ刺シテ。血百十二錢ヲ瀉ス。  
 前後併セテ二百八錢ノ血ヲ奪テ。而シテ後言語始メ  
 テ復シ。精神始メテ覺メ。嚙下始メテ成リ。遂ニ全治ス  
 ルヲ得タリ。

其五出血

凡出血ノ諸症ニ逢テハ。衰弱常ニ其因ヲ為シ。或ハ否



ザルモ。其出ル所ノ血以テ刺絡ニ代フベシト謂ヒテ。更ニ刺絡ヲ行ハザルハ。是庸醫ノ通病ナリ。殊ニ知ラズ出血亦多血ト脉機強盛トニ由ル者アルヲ。又知ラズ刺絡ノ血ハ病ニ由テ發スル徐緩ノ出血ト其功全ク異ルヲ。又遂ニ知ラズ泄出スベキ血肺ヨリ出ルヨリハ。臂上ノ静脈ヨリ出ルノ勝レルヲ。○諸部出血中。刺絡ヲ要スル者ハ。肺出血ヲ以テ最第一トス。夫肺ハ身體中最多量ノ血ヲ受クル部ニシテ。又甚毀傷シ易ク。傷スレバ極メテ復シ難キ者ナリ。然レバ予ハ謂フニ。凡血肺ヨリ出ル者ハ。假令其量僅少ナルモ。

必刺絡ヲ行フベシ。唯血質既ニ溶解シ。將ニ腐敗ニ陥ラムトスル者ト。肺已ニ潰瘍ヲ為ス者トハ。刺絡ヲ禁ズベキトス。其他ハ皆先輕量ノ刺絡ヲ行フヲ以テ十全ノ法トス。大抵是ニ由テ出血全ク止ム。或ハ止マサルモ。他藥ノ服用ヲ便ニシ。且其功ヲ完スルヲ得ベシ。況コレニ由テ出血アル部ノ焮衝ヲ預防シ。百般ノ危害ヲ未萌ニ祛クニ於テヤ。曾出ル血閉ル子宮出血亦刺絡ヲ以テ無二ノ治法ト為スベキ症アリ。或ハ否ザルモ。他藥ニ兼テ缺クベカラザルノ法トス。殊ニ多血ノ婦人月經方絶ノ時期ニ於テ。子宮出血



ヲ發スルガ如キハ。屢臂ニ刺絡スルヲ以テ。無二ノ良法トス。  
 痔血尿血吐血ノ三症ハ。刺絡ヲ要スル上ノ二症ヨリ少シ。然レモ若多血性ノ者。或ハ曾患ノ出血閉止スル者ニハ。又刺絡ヲ必須トスル者アリ。

其六震盪

更ニ危險ノ一症アリ。即打撲墜落等ニ因テ。身體各部劇ク動揺ヲ受クル者是ナリ。此症ニ於テハ常ニ一二ノ臓器局處ノ衰弱ヲ受ケ。是ニ由テ其部ノ脉管膨脹シ。血此ニ鬱積シ。或ハ溢出シテ蜂房腠裏ニ瀦留シ。或

ハ其外ニ溢流ス。其腠理外ニ溢流スル者ハ。則咳血尿血子宮出血等ナリ。外ハ心ノ血ハ異於他血也。此大也。此理ニ因リテ。劇キ動揺ノ後ニハ。或ハ腦焮衝。肺焮衝。腎焮衝等ヲ發スルナリ。其固有ノ徵候ハ。陰性陽性ノ徵相合併スルニアリ。即弛弱セル脉管中ニ血瀦留鬱滯シ。此局處ニ多血ニ因テ刺衝増加シ。温熱發生シ。遂ニ焮衝ヲ致ス者ナリ。此症ハ内部ノ真狀ヲ察シ難キヲ以テ。從來誤察ヲ經タル者多シ。即陰性醫風行ハルル時ノ如キ。震盪後ノ諸症。或ハ焮衝性ノ者モ。亦皆コレヲ衰弱ト謂ヒテ。刺衝藥ノミヲ用井テ。瀉血ヲ行フ



一無カリシナリ。是ヲ以テ患者即死セザル片ハ。必其  
 臟ノ慢性焮衝ニ罹リ。竟ニ羸瘦ヲ以テ斃ル。若夫コノ  
 兩性焮衝ヲ療スル無二ノ法ハ。減祛ト興奮トノ二法  
 ヲ兼子行フニアリ。是病陰陽兩性ヲ兼ヌルヲ以テナ  
 リ。其減祛ノ法ハ。則刺絡ヲ行フテ速ニ局處ノ血積ヲ  
 除クニアリ。刺絡既ニ足ラバ。速ニ冷罨ヲ行ヒ。内用ニ  
 ハ。焮衝ノ候アル間ハ寒涼藥ヲ與ヘ。焮衝全ク退クキ  
 ハ。直ニ亞爾尼加花泡劑ヲ與フベシ。此藥ハ震盪後ノ  
 滯血溢液ヲ速ニ吸收セシムルノ異功アリ。此大功ハ。  
 多年ノ試驗ヲ經テ百中誤ナキ一。民間ニテ此草ヲハ。

ル。コ。ロ。イ。ド。陸草ノ義

ト名ツクルヲ以テモ知ルベシ。

或ハ劇動ノ後焮衝ノ候ナク。唯各部ニ慢性ノ患ヲ貽  
 ストアリ。即チ是液毛細管中ニ潑留シ。或ハ其部ノ蜂房  
 腠裏又ハ巴連舍馬中ニ溢スル者ト知ルベシ。夫  
 血液臟質中ニ溢スルハ。然ク顯著ノ一症ナル  
 ニ。今ニ至ルマデコレヲ詳論スル者ナシ。夫劇動ノ後  
 液外表ノ部ニ溢スレバ。數週或ハ數月ノ間消散セ  
 ズ。或ハ又此部ヨリ彼部ニ移ルトアリ。譬ヘバ肩胛ヨ  
 リ指端ニ轉スル等ノ如シ。或ハ又其造質變性シ。硬結  
 膿潰等ノ症ヲ致ストアル片ハ。其内部ニ於ルモ亦此

多血因地處狹隘者

本草綱目



ノ如キノ變アルベキ一固ヨリ當然ナリ。試験ニ據ルニ。劇キ動搖ノ後ニ肝肺脾等各臟ニ。經久ノ壓重劇痛等ヲ發シ。數月治セズ。諸藥功ナク。竟ニ肺胃或ハ腸ノ自然出血按ニ咳血吐血下血ニ因テ。始メテ全治スル者アリ。又此ノ如キ局處ノ蓄積潴留ヨリ。遂ニ不治ノ壅塞硬結潰膿及其他諸種ノ病患ヲ發スル者更ニ多シ。右ノ諸症。其急性慢性ヲ論ゼズ。動搖後直ニ刺絡ヲ行ヘバ。全クコレヲ預防スル一ヲ得ベシ。

其七多血因地處狹隘者

此ニ舉グル者ハ。血液ノ製造健良ニシテ。而シテ體器

ノ失常ニ因テ。自由ニ運行スベキ地處ヲ失ヘル諸症ヲ謂フナリ。○即脊椎愈著スル人ノ如シ。是ニ因テ孟蓋ト胸腔トノ間狹隘ヲ為シ。大動脈モ亦脊椎ニ沿フテ下ルヲ以テ。共ニ勾曲シ。血ノ運行障礙セラレテ此ヲ聚積シ。心臟ノ近傍ニ外沸ス。故ニ此ノ如キ不具ノ患者ハ。痔或ハ胸或ハ頭ニ血液聚積スル等ノ症アリ。其因全ク血ノ運處狹隘ナルニ因ル。此症ニアリテ其患害ヲ輕クシ。危殆ヲ預防スル無ニメ法ハ。屢輕量ノ刺絡ヲ行フニアリ。又本經ノ素因全ク醜黙ニ取天稟ニ因テ四肢ノ大小常ヲ失スル者モ。亦此ノ如キ



諸症ニ罹リ易シ。○譬へば脚甚短キ者ノ如キ。常ニ頭  
 胸ノ血積ニ罹リ易シ。○又卒厥ノ素因。全ク頸短ク頭  
 大ニ肢體矮小ナルニ由ル者多シ。○又幼兒頭中ニ血  
 積ヲ致シ易キハ。全ク頭ノ大<sup>ナ</sup>其體ニ準ゼザルニ因ル。  
 ○又常ニ内部ノ血積ニ罹リ易キ者。其因唯皮表ノ靜  
 脉管。細小ニ過グルニヨル者アリ。  
 又大肢ヲ割去スル者。或ハ動脈腫ヲ療スル等ニ因テ。  
 大動脈ヲ結紮スル者ハ。血液運行ノ道路减小スルヲ  
 以テ。前症ニ罹リ易シ。  
 右ノ諸症ニ於テハ。其體軀ノ形質已ニ瀉血ニ宜キ徵

アリ。故ニ若瀉血スベキ症アラバ。必コレヲ行フヲ要  
 トス。是一大預防法ナリ

濟生三方卷上終

濟生三方 卷上 終 天眞軒 濟生三方 卷上 終



Blank page with vertical lines for text.

濟生三方卷中

若狹

杉田信成卿

譯

阿片第二

阿片第二... 物埵耳曰。サクテ。アゲンチヒユス。エスト。オピウム。シムバ。ヘ口。...



此ニ論スル者ハ。第二將軍ニシテ。即阿片是ナリ。此藥ハ其力甚大ニシテ。靈妙非常其能甚奧微ニシテ。悟ルベカラズ。天地モ此草ノ成熟ニ當テハ。コレニ冠ヲ賦與ス。○吾輩之ヲ將軍ト呼フ一寔ニ理アリ。何トナレバ。此藥悉將軍ノ性ヲ具スルヲ以テナリ。此物ハ其力能生命ノ本源。身軀ノ深奧ニ達シ。其功能生殺ヲ擅ニシ。病將ニ變セムトスルノ際ニ當テ。投施機ニ中レバ能生ヲ救フベク。機ヲ誤レバ能死ヲ致スベシ。而シテ此功特此藥ニ在リテ。他藥ノ以テ代フベキ者ナシ。故ニ從來醫家ノ世ニ於テ。王トナリ帝トナリテ。能人ヲ

利シ。又能人ヲ害セシナリ。受マズ。是ニ於テ。百病古賢物埒耳。其「オピオチイ」書ニ言ヘル。寔ニ萬世不刊ト謂フベシ。曰ク。サクヲ。ヒタエ。アシコヲ。シルモムス。ペクテ。アゲンチビス。エスト。オピウム。シムバ。ヘロ。カロンチス。イン。マニ。イムペリチ。○阿片ハ是一把ノ兩刃カ。コレヲ良エニ托スレバ則貴靈ノ天資。コレヲ庸手ニ假セバ則暴殺ノ苛毒ナリ。○嗚呼如何ゾコレヲ良エニノミ托シテ。コレヲ庸手ニ奪フトテ得ベケムヤ。阿片ノ史ハ即是醫ノ史ナリ。○夫古往今來醫術ノ盛



衰阿片常ニコレニ從ハサルヲ無シ。或ハ天賦ノ靈藥ト貴バレテ。盛ニ世ニ用井ラレ。或ハ恐レテ拋棄セラ。然レ氏其缺クベカラザルヲ以テ。復再舉ゲ用井ラ。大醫先生瓦列奴斯。舍電汎。忽弗滿物耳。忽共ニハ極メテ此藥ヲ貴ビ。此藥ナカリセバ。醫ヲ行フベカラズト謂ヘリ。○近世ニ至テモ。人皆阿片ヲ以テ各病ヲ治スベシト謂ヒ。醫各腰ニ阿片ノ瓶子ヲ帶スルニ至レリ。此時ニ至テハ。百千ノ醫藥皆其伍ヲ退キテ。阿片獨戰ヲ擅ニス。然レバ阿片實ニ醫術ノ長トナリ。醫法モ亦大ニコレガ為ニ變革ヲ受ケタリ。是ニ於テカ百病

ノ原性ヲ論シテ。皆陰性ト為スニ至レリ。凡此ニ偏セザレバ。必彼ニ僻スルハ。世間百事ノ常ニシテ。阿片ニ於ルモ亦然リ。夫然ク大ニ阿片ヲ愛重セシニヨリ。又從テ誤用モ多カリシカバ。近年マデ阿片ヲ以テ人ヲ害セシノモ亦多カリシナリ。コレニ加フルニ。庸醫阿片ノ真功ヲ知ラザルノ蒙昧ヨリ。今ハ人人大ニ阿片ヲ懼ル、ニ至レリ。是ニ於テカ醫術貴靈ノ一藥ヲ失ヒ。幾多ノ患者必當無二ノ救途ヲ喪フニ至ル。

即今ハ正ニ是此兩偏ヲ衡平シ。正中ヲ索メ得テ。以テ



古來貴靈ノ一藥ヲシテ。再其真知遇ヲ得セシムベキ  
ノ時ナリ。故ニ今此篇ヲ著スハ。人ヲシテ阿片ノカラ  
確知セシメ。且コレニ不易ノ範則ヲ立テ。又兼子テ少  
年醫輩ヲシテ。コレガ權衡ヲ得テ以テ誤用ノ過ナク。  
必當ノ症ニ於テコレヲ施サシメムト願フノミ。此  
ニハ死生利害。悉其本能ヲ知り。其主治ヲ定メ。且其必  
須ノ諸症ヲ明辨スルノ三件ニアリ。

夫藥ノ本能ヲ知り。其真性ヲ定ムルハ。是第一ノ要務  
ナリ。○凡各病皆其本性アリテ。然モ人身活機ノ内ニ

在リ。而シテ各藥ノ功能亦然リ。夫一藥ノ能ハ。即是人  
作ノ病ナレバ。其真性ヲ問ハシ。亦必其藥力ニ因テ發  
スル所ノ生機ノ變換ニアルベシ。然レバ一藥ノ本能  
ヲ舉ゲムニハ。次ノ件件ヲ察スルニアリ。即先其藥全  
身ニ如何ノ變ヲ起スカ。又其力如何カ各系ニ達スル  
カ。又特ニ何レノ系ニ達スルカトイフヲ明ニシ。特  
ニ其正能ト奇能トヲ辨スルニアリ。○此ニハ唯阿片  
曾テ功ヲ奏セシ所ノ病名ヲ舉グルノミヲ以テ。足レ  
リトスベカラズ。是唯試驗ノ學ヲ博ムルノミ。又舍密  
術ヲ以テ其質ヲ分解スルモ。亦未足レリトスベカラ



ズ。其故ハ藥ノ能力。常ニ必人身特生ノ區域ニ屬スルヲ以テナリ。又彼ノ一家ノ理論ノ如キハ。固ヨリ從フベカラズ。是其建議ノ風。東西アルニ從テ。常ニ向背ナキヲ得ザレバナリ。○然レバ藥ノ本能ヲ定ムルニハ。唯其生體上ニ於テスルハ。功ヲ以テ憑據トスベシ。特ニ其功人ノ耳目ノ及ブベキ所ニ在ル者ニ據ルベシトス。○蓋又特ニ其能ノ直發。真正確實ナル者ニ據ルベクシテ。其藥ヲ用井タル後ニ發スル所ノ百般ノ諸症ヲ槩取スベカラズ。此ノ如キハ猶忽沒越阿巴智醫流名ノ為ス所ノゴトシ。必真功ノ外。更ニ偶發ニシテ。

唯其患者ノミニ在ル所ノ諸因。及内外偶發ノ諸感。力ヲ併セテ其藥ノ能ヲ變ゼザルヲ得ズ。

然レ方今ノ業宜シノ經驗ニ就テ。阿片ノ直發。真正確實ノ能能即正ト。迂回偶發ノ能能即奇ト。ヲ辨スルニアル

ベシ。

大哉區域難哉辨議。夫百千年来阿片ノ試驗極メテ多ケレバ。今コレニ因テ其本能ヲ知ルハ。人或ハ看テ以テ容易トスベシ。是特ニ然ラズ。其故ハ幾多ノ試驗中。其功能特ニ其患者ノ天稟ニ因ル者。病ニ由テ變易セラル抗拒ニ因ル者。地方病性流行病性ニ由テ生機大ニ



變スルニ因ル者。習癖ニ因ル者。即東方諸國ニ於ルガ如キ。及試者ノ意ニ因ル者トヲ辨識スルヲ要スレバナリ。特ニ驗者ノ眼鏡ニ由テ真象大ニ變シ。コレニ因テ幾多ノ妄論僻說世ニ出ヅルニ至レリ。今予此無數ノ試験。及予ガ多年ノ實驗中ニ於テ。其最信ズベキ者ヲ舉ゲ定メムトス。特ニ近世グロウ貌樂運ウツ名ノ治術大ニ此ニ益アリ。盖貌樂運ノ治術ハ。從來阿片ヲ人ニ用井タル最弘最大ノ試験ト謂フベキナリ。必見之症。今阿片ヲ以テ生體ニ觸レシムル片ハ。其觸ル、下ノ

内面外面ヨリスルヲ論ゼズ。必次ノ症ヲ發ス。第一脉興奮シ。實トナリカヲ得ル。○此功ハ用後直ニ發スル者ニシテ。且必見ノ症トス。其ヲシテ疾トナラシムルガ如キハ。一定ノ功ヲラズ。生カノ強弱ニ從テ異ナリ。健全ノ時ニ於テハ脉稍疾トナルヲ以テ常トス。生カ増盛ノ時ニ於テモ亦然リ。然レモ若衰弱ノ為ニ脉既ニ疾ヲナス者ニ於テハ。阿片能コレヲ除キ。其ヲシテ徐ナラシメ。且齊ナラシム。又多量ニ用井レバ。脉ヲ徐トナシテ。猶卒厥ノ脉ノ如クナラシム。第二血沸漲ス。○其徵ハ則脉實トナリ。諸脉管膨脹シ。



新ニ血積ヲ起スヲ以テ知ルナリ。此症ハ常ニ頭ニ發シ。肺ニ發シ。或ハ彼此ノ素因アル部ニ發シ。動レハ出血ヲ致シ。或ハ焮衝ヲ發セシム。

夫此血液沸漲ハ。阿片固有ノ能ニシテ。特ニコレヲ標示セザルヲ得ズ。古人モコレヲ血液稀釋ト名ツケ。阿片ノ本能ト謂ヒシナリ。而シテ此功ハ實ニ每發必見ノ者ニシテ。大衰弱血虛ノ患者ト雖脉必實大ヲナス。是實ニ人為ノ多血。假虛ノ多血ナリ。蓋阿片ヲ用井テ後。頭部血積ノ危害ヲ致シ易ク。或ハ又血溶解シ。生體ノ和合分潰シ易キハコレガ為ナリ。

第三生温增加ス。○是血液沸漲。運行増進ノ必。由テ致ス所ニシテ。又阿片必見ノ功ナリ。  
第四神經系。特ニ腦直ニ強ク。侵制セラレ。特ニ其力制抑セラレ。知覺ノ機減衰ス。是ニ因テ麻醉。嗜眠。昏睡等ヲ發シ。又局處ニ用井テ其部ノ知覺ヲ奪ヒ。麻痺セシメ。痙及痛ヲ祛ク。或ハ又内服ノ後。却テ神氣爽快ヲ為シ。腦神活發シ。或ハ終ニ譫妄狂躁ヲ起ス。一アリ。然レモ。是一時ノ興奮ニ由テ致ス所ナルガ故ニ。速ニ復虛衰ニ陷ルナリ。而シテ此功極メテ確實ナラズ。或ハ其量ニ關リ。或ハ患者ノ性ニ關ル。蓋其理一ニハ。人身抗



拒ノ力奮起シテ。阿片ノ猛毒ヲ防ガムトシ。以テ常ヲ失スルニ因テ。外表ニ神經諸症ヲ呈スト雖。終ニ阿片ノ麻毒勝ヲ得ルニ至ルノ由テ致ス所ニ係リ。又一ニハ。阿片ノ力能ク血ヲ催進シテ腦ニ入ラシムルヲ以テ。此血腦ヲ刺衝シテ其運機ヲ増進セシムルヲ猶其他ノ腦中血積腦焮衝等ノ諸症ニ於ルガコトキニ由テ致ス所ナリ。凡ク毒活體ヲ侵スノ本力ヲ確知セムト欲セバ。其局處ノ功ヲ見ルヲ最要トス。而シテ阿片局發ノ功ハ。常ニ覺機ヲ抑制スルニアリ。即コレヲ腸ニ用井レバ。其運機ヲ休歇セシメ。皮表ニ施セバ痛及癢ヲ

鎮止スルヲ以テ知ルベシ。但其皮ニ施スハ。表皮ヲ剥セザル部ニ施スヲ謂フナリ。若夫表皮剝離セル部ハ。外物コレニ觸レテ必輕痛ヲ起セバナリ。持ニ脂類ハ此力多シ。自注ニ曰ク。阿片ノ純真ノ功ヲ知ラムト欲セバ。唯宜クコレニ慣レザル人ニ用井テ知ルベシ。譬へバ度兒格及東方諸州ノ人ノ如キ。及和蘭人モ久服シテコレニ慣ル者ニ在テハ。生體既ニ阿片ニ慣レテ。其刺衝ニ感スルヲ少ク。以テ一種ノ病性ヲ為スニ因テ。阿片ノ功亦從テ變セザルヲ得ズ。度兒格



ノ人阿片ヲ用井テ其驍勇ヲ増スハ其理蓋阿片消  
 長二極ノカニ因ルナリ。即其消極トイフ者ハ阿片  
 麻醉ノカニ由リテ危ヲ輕シ己ヲ忘レシムルノ功  
 ヲ謂ヒ其長極下イフ者ハ血腦ト心トニ進入スル  
 勢ニ因テ精カト勇氣トヲシテ共ニ増盛セシムル  
 ノ功ヲ謂フナリ。○又和蘭ニ在テモ久ク阿片ヲ過  
 用スル者ニ於テハ多量ヲ服シテ唯己ノ痛楚ヲ忘  
 レ病ノ身ニ在ルヲ知ラザルニ至リ。是ニ因テ精神  
 爽快ヲ得ルノミニシテ他ノ症ヲ發セザル者多シ。  
 第五大便閉止シ咽乾燥ス。是内服ノ後消食管及其分

泌管局處ノ麻痺ヲ受クルニ因ル。○即是腸ノ麻痺腸  
 ノ眠ナリ。  
 第六皮表ノ分泌増進シ汗出ツ。○是阿片興奮ノ力其  
 動脈ノ運機ヲ催進スル功。及中心ヨリ外表ニ發越ス  
 ル功ト。又其鎮靖ノ力皮膚ノ痙攣ヲ弛ムル功。及尿管  
 ロヲ開達スル功ト。一併シテ此機ヲ發スルニ係ル。蓋  
 阿片常ニ釀膿ヲ進メ。又熱病ニ用井テ屢粟疹ヲ發シ  
 紫斑ヲ發シ。及鷺口瘡ヲ發セシムルハ此能ニ因ルナ  
 リ。  
 第七以上論載スル所ノ外。更ニ陰部ト尿管トニカラ



致シ。二器ノ機能ヲ増盛セシム。此功殆ト必見ト稱スベシ。但特ニ陰部ニ於テ顯著トス。即淫褻ノ夢想陰莖ノ勃起精液ノ漏泄等ヲ發スルヲ以テ知ルベシ。其泄尿ヲ増進スルモ亦屢驗スル所ナリト雖。未以テ必見ト稱スベカラズ。且果シテ泌尿ヲ増進スルカ。抑刺衝ノ力唯泄尿ヲ促スノミナルカ未疑ヲ免レザル所ナリ。第八多量ニ用井或ハ久服スレバ血溶解シ生體ノ和合分潰シ腐敗シ寒壞疽ヲ發シ死後速ニ腐壞ス。○此カハ阿片ノ奇能トイヘド。多量ニ服スル間或ハ服後自註ニ曰ク即阿片中毒若クハ久ク過用スル後ニ於テ必見ノ症

トス。凡熱病ニ多量ノ阿片ヲ與フレバ。必腐敗熱ニ變シ。炊衝ニ用井レバ寒壞疽ニ陷ラシム。又慢性病ニ於ルモ阿片ヲ連用スルノ後ハ體質溶解セムトシ。及出血シ易キノ症ヲ發スルナリ。彼ノ都兒格人ノ如キモ。過服ノ後ニハ遂ニ底野迦病ヲ發ス。其症ハ則過大ノ出血ヲ發シテ。漸衰死スルニ至ルナリ。又此症ニテ死セル屍ノ速ニ腐敗スルハ。亦必見ノ一事ナリ。此力ニ於テハ阿片實ニ電ニ同ト謂フベシ。其故ハ雷震ノ人屍亦其腐敗速ナルヲ以テナリ。

本能

本能

十



夫然ク阿片ノ功ヲ詳察スレバ。興奮ノ力ニ兼子テ鎮  
靖ノ功ヲ具ヘ。活發ノ勢ニ兼子テ剋殺ノ威ヲ具フル  
一。寔ニ特異無比ニシテ驚異スベキ者ナリ。是蓋此藥  
ノ他藥ニ異ナル所ニシテ。又施治ノ際ニ於テ此藥ノ  
特拔貴重ナル所ナリ。○覺機ト神經生トヲ抑制シ或  
ハ全ク之ヲ奪除シ而シテ却テ心臟ノ刺衝機及血生  
即機性造育ノ源生ヲ興奮シ且之ヲ強盛ナラシメ是  
ト共ニ身中ノ生機ヲ増盛催促シ遂ニ動化ノ亢極ニ  
至ラシメ造成ノ力ヲ消滅シ及舍密ノ分解ヲ催起ス  
ル。是此靈藥ノ真性ニシテ。即其本能ナリ。○衰弱ニ因

テ脈沈メル者ヲ速ニ興奮シ實トナラシメ又衰弱ニ  
因テ脈疾トナル者ヲ遲トナラシメ劇キ血積ヲ發  
シ或ハ焮衝ヲ起サシメ。又寒壞疽溶潰過炭化腐敗ヲ  
起ス下極メテ速ナルハ。是皆此本能ヨリ出ヅル所ナ  
リ。其機轉ハ轉ハ疾ニシテ或ハ轉ハ遲ニシテ或ハ  
然レバ阿片ハ真ニ一大強心藥ニシテ。予コレニ過グ  
ル者アルヲ知ラズ。○蓋其能實ニ衝突直入スル者  
ニシテ。途ヲ彼此ニ假リ。良能ノ對抗ヲ待テ而シテ後  
見ル者ニアラズ。即生力極メテ虛憊セル患者ニ試







スベカラズ。其故ハ阿片ノ能更ニ深遠ニ達スルヲ以テナリ。夫阿片ノ力ハ其興奮ノ功ト共ニ直ニ生命ノ源ヲ侵シ。活體舍密ノ和合ヲ制シ。其刺衝大過ハ又兼子テ生活大過トナリ。生機ヲシテ自然ノ限界ヲ踰エシムルニ至ル。即阿片ノ力能速ニ腐敗ヲ致シ。寒壞疽ヲ生シ。溶解ヲ促スヲ以テコレヲ證スベシ。

夫阿片ニ興奮ノ功能アリテ。特ニ生活ノ元運ヲ奮發スルハ固ヨリ其本能ナリ。而シテ鎮靖ノ功亦等ク確ナリ。此功ハ尋常ノ説ノ如ク。刺衝大過ノ所由ナル竒道ノ能ニ非ズシテ。特立ナル一猶興奮ノ能ノゴトク。

而シテ直ニ神經ヲ制スル者ナリ。即局處ニ用井テ緩和止痛鎮痙ノ功ヲ奏シ。或ハ全ク其部ノ機能ヲ阻遏スルヲ以テコレヲ證スベシ。故ニ予ハ謂ヘラク。吾輩貯フル所ノ百藥中其能峻烈直入兼子テ多性ニシテ生機ノ全系ニ達シ特ニ生力ノ本源ニ達スル一阿片ノ如キハ未コレアラズト○凡阿片ヲ用井ル者ハ是生死ノ權ヲ掌握スル人ナリ。而シテ其生ト死ト相界スル一毫髮ノ如シ。信我舍電汎ノ言。曰ク。阿片ナカリセバ醫術至ラズシテ且完力ラザラムト。



功理

阿片ノ功然ク驚異スベク。且ニ箇相及ノカヲ具ヘ他藥中コレニ類スル者ナキ。如何シテ其理ヲ窮メム。是推理ノ各家疑ヲ抱ク所ナリ。

此一問ハ數百年來醫家ヲシテ。心ヲ費シ神ヲ勞セシムルノ一事ナリ。是蓋皇天理家ニ擬スルノ一謎ニシテ。極メテ尤大可學ノ一事ナリ。而シテ從來コレヲ猜セムトテ。建立セラル論議極メテ多シ。悉コレヲ舉ゲムニハ。實ニ倦ムベキノ事ナリト雖。亦以テ人智ノ漸明ナルト。理學ノ漸闡クルトヲ觀ルベク。又此靈藥生體

ノ深源ニ感應スル者ナルガ故ニ。以テ兼テ古來生機ヲ説ケル本論ノ沿革ヲ觀ルニ足ル。

其説ノ最古キ者ハ。人身ノ生氣原「レ」ヘン「ス」阿片ニ

由テ枷鎖セラレ。恰魅セララル、カ如シト。自注ニ曰大

ヘリ。ラハ名阿片ノ功ヲ説キテ尚ホ曰ク生氣此藥ニヨリテ表ヨリ驅逐セラレ最裏ニ聚積スト○コ

レニ次テ瓦列奴斯名ノ寒温説起レリ。其説ハ阿片ヲ

以テ寒性ノ物トナス。故ニ又常ニ芳辛藥ヲ加ヘ用井

タリ。○次ニ悉兒彪斯名ノ説起レリ。此人本舍密ヲ以

テ萬物ノ理ヲ論辨ス。而シテ阿片ニ於ル亦一種ノ揮

發硫黃氣アリテ。其功力皆コレニ舍ルト謂ヘリ。○歌



爾蒙突ト名ハ人ハ阿片ノ功ヲ其亞爾カ加歐斯ス按ニ萬物ヲ生シ諸機ヲ發スラカニ達スト謂ヒコレヲ以テ其効驗ヲ辨明セリ。  
 ○醫家更ニ器械ノ學ヲ執ル者アリ。阿片ノ能ヲ論シテ其細小管ヲ過塞スルニ因ルト謂ヘリ。○コレニ次テ又一説アリ。博ク世ニ傳ヘテ久ク醫家ノ通論タリキ。其説ハ則阿片ノ功唯其血ヲ沸漲セシムルニ在リト云。名指弗フ毘ビ堙チ免ル忽弗フ滿マ名ノ如キモ殆此説ニ左袒セリ。○此ヨリ後神經系ノ學更ニ精微ニ入り。且其生機ニ交渉スルノ大ナル一ヲ闡發ス。法兒列爾ル名ノ大發明ヲ以テ。知覺刺衝ノ二機大ニ相異ナル一ヲ詳ニ

セシヨリ。生理ト病理ノ二學亦一變シ。神經性病理解學起リ。コレニ從テ阿片ノ功ヲ説ク一亦一革シ。説者皆阿片ノ功ヲ以テ專ラ神經ニ達スト謂ヘリ。鳩盧連ル名ノ如キ最然リ。自註ニ曰佛郎西ノ學者貌拉傑ル名ノ尚其レ○近世ニ至テ二説アリ。共ニ記載スルニ足ル。其一ハ留リ散ハ忽弗フ滿マ名ノ發明ニ出ツハ自註ニ曰弗フ毘ビ堙チ免ル忽弗フ滿マコノ後ル一五十年ノ人ナリ看者或曰凡細脉管及其ハ混ルセム一ヲ恐ル故ニコレヲ辨ズ。曰凡細脉管及其末稍ハ心臟及大脉管ニ比スレバ刺衝機劣弱ナリ。故ニ阿片ノ刺戟ニ因テ其刺衝機ヲ失フ。心ト大管ヨリ速ナリ。コレニ因テ細管中血液ノ運行妨礙セラレ。



此抗拒ニ因テ心臟ノ對抗却テ増盛スト云。其二ハ彼ノ貌樂運ノ説ニシテ。世人ノ多ク知ル所ナリ。其説ニ阿片ハ活體ノ全系ヲ刺衝スルヲ最強ク最疾ニシテ。而シテ其力速ニ消散ス。故ニ其能始メハ劇ク全身ノ刺衝ヲ起シ。次テ速ニ生カラ耗竭セシムルヲ極メテ甚シ。此衰耗ハ即竒道ノ衰弱ナリト云。○更ニ迄今ノ説アリ。理學ノ一派ト刺里帝突按ニ天地充實スル所越列幾的兒麻窟。本トシ。再舍密ノ論ニ近ツケリ。

當今ノ諸家ハ。槩阿片ノ功ヲ以テ活體ノ全系ヲ刺衝スル者トナシ。其麻醉ノ能ハ過度ノ刺衝竒道ノ衰弱ニ由ルト謂ヘリ。然レモ予ハ此ニ二件ノ疑問アリ。其一ハ則別ニ揮發ニシテ持ニ血管ヲ興奮スルヲ全ク彼ノ如キ藥アリ。即麝香アム。諸模尼亞ア。葛私多カ。儂ト。謨等ハ。是ナリ。此等ノ藥然ク阿片ノ如ク麻醉ノ能アラザルハ何ゾヤ。其二ハ則更ニ麻醉ノ藥アリ。毫モ血管系ヲ刺衝スルヲナク。脈ヲ變スルヲナク。温ヲ變スルヲナク。或ハ却テ脈ヲ遲ナラシメ。然ク心臟ノ機能ヲ減殺シテ。而シテ最劇麻酔ノ能ヲ呈スハ何ゾヤ。○此ニ件ニ由



テ考フルニ。麻醉分ハモト特立ノ物ニシテ。敢テ心臓  
 血管ヲ刺衝スルカニ關ラズ。特ニ神經系ニ直達シテ  
 コレヲ鎮壓抑制スル者ニシテ。固ヨリ過度ノ刺衝ニ  
 由ラザルヲ明ナリ。而シテ阿片亦明ニ此麻分ヲ含有  
 ス。其證左ノ如シ。第一阿片特異ノ香是ナリ。此香ハ則  
 菲<sup>ヒ</sup>脛<sup>オス</sup>沙<sup>シヤ</sup>密<sup>ミ</sup>曼<sup>マン</sup>陀<sup>タ</sup>羅<sup>ラ</sup>華<sup>ワ</sup>及<sup>及</sup>他<sup>他</sup>ノ麻<sup>マ</sup>毒<sup>ドク</sup>アル草<sup>クサ</sup>類<sup>レイ</sup>ノ香<sup>カ</sup>ニ同<sup>トウ</sup>シ  
 シテ。此香アレバ毎ニ麻分アルヲ知ルベシ。次ニ阿  
 片局處ノ鎮靖力是ナリ。夫阿片ハ外敷シテ亦止痛鎮  
 靖ノ功アリ。而シテ毫モ血管系ヲ興奮スルヲナシ。特  
 ニ多量ニ久ク外用スレバ。毫モ血管ヲ興奮セズ。唯神

經ノ交感ニ由テ腦ニ達シ。麻醉ノ症ヲ發セシム。是予  
 嘗<sup>チ</sup>夏日阿片ノ大塊ヲ握持シテ。自試驗セル所ナリ。註自  
ニ曰或ハ阿片ノ能ヲ以テ全ク葡萄酒ノ能ニ同ト云者アリ然レモ最強ノ亞爾箇魁未曾テ此功アラズ又  
 單ニコレヲ顛顛ニ敷キテ睡ヲ生ゼシム。自註ニ曰予  
方アリ神經性患者ノ不寐ニ毎夕コレヲ兩顛顛ニ貼  
セシメ以テ此苦患ヲ免レシム其方菲脛硬膏四錢ニ  
阿片一刃又内服ノ時其胃ニ達スルニ方テ直チニ胃ノ  
ヲ和ス  
 局處ノ覺機ト神經機トヲ奪ヒ。食思消化力及蠕動機  
 ヲ除却シ。又灌腸藥ニ和シ用井テ直チニ腸ノ蠕動機ヲ  
 除却ス。次ニ阿片ノ蒸氣ハ即其單純ノ麻分ノミニニシ  
 テ。而シテ能ク麻醉ノ能ヲ致ス。即阿片水アタクオノ如シ。



此物單ニ揮發ノ蒸氣ヲ含ミ。舍密術ヲ以テモ亦コレヲ檢出スベカラズ。而シテ眼焮衝ニ用井テ能ク軟和ノ功ヲ奏ス。次ニ又其水製越幾斯ハ。麻酔止痛鎮靖ノ功アリテ。而シテ血管系ヲ興奮セザル。恰非膈沙密曼陀羅華等ノ單純麻藥ノ如クニシテ。其脂製越幾斯ハ却テ興奮ノ功ヲ致ス等ヲ以テコレヲ觀レバ。則阿片ニ一個ノ麻分アリテ。此分ハ脉管血液ヲ興奮スル。ナク。能カラ呈ス。明ナリ。况阿片ニ消石等ノ消焮藥ヲ加フレバ。能ク其催熱ノ力ヲ奪フベクシテ。而シテ鎮靖ノ力ハ異ナラザルニ於テヲヤ。

然レバ阿片ニ鎮靖興奮ノ二力各異ニ存スル。疑ナシ。而シテ其功理ヲ原子ムニハ。次ノ如ク説クヲ以テ真且純ト謂フベシ。阿片ニ二分アリテ特異精密ニ和合ス。其一ハ麻分ニシテ專ラ神經系ニカラ致シ。其一ハ興奮分ニシテ專ラ血管系ニカラ致ス。コレヲ證スルニ。唯有カノ麻藥ヲ舉ゲテ以テ足レリトスベシ。乃此二分各異ニ特立シ。其麻酔ノ功未必シモ興奮ノ功ニ率ハザル。一ヲ知ルベシ。若夫二功唯一ノ刺衝力ニ出ヅル。其ハ必互ニ相率ハザル。一ヲ得ズ。曼陀羅華ハ阿片ニ亞テ最強ノ麻藥トス。而シテ屢獸ニ與ヘテ試驗



スルニ毫毛脉ト血管系トヲ興奮スルナシ。第<sup>チ</sup>莖<sup>キ</sup>答<sup>タ</sup>利<sup>リ</sup>斯<sup>ス</sup>ハ却テ脉ヲ鎮靖シ。莖<sup>チ</sup>莖<sup>キ</sup>ハコレニ反シテ稍<sup>シ</sup>脉ヲ興奮ス。而シテ青酸ハ知覺ノ全機ヲ殲滅シ。毫毛心ト血管トヲ興奮スルナシ。○麻藥ノ功然ク差異アルニ由レバ。予ハ謂フニ。以テ生體ノ原力ナル知覺刺衝ノ二機各異ナルヲ證スルニ足ルト。

予今此ニ舍密<sup>セ</sup>加<sup>カ</sup>ニ就テ。阿片ハ如何ノ成分ヨリ成レルカヲ問ハムトス。庶幾クハ其諸種ノ功理ヲ究ムルニ足ラムカ。○古昔ノ舍密家ハ阿片ヲ水。葡萄酒或ハ

燒酒ニ溶解シ。其溶クル者ト溶ケザル者トヲ分チテ足レリトス。而シテ其水ニ溶クル者<sup>エキ</sup>ス<sup>ク</sup>ラ<sup>ク</sup>又<sup>シ</sup>シ<sup>テ</sup>ハ<sup>ハ</sup>功<sup>カ</sup>力<sup>リ</sup>稍<sup>シ</sup>弱<sup>ク</sup>シト雖<sup>モ</sup>尚<sup>ホ</sup>麻<sup>マ</sup>醉<sup>スイ</sup>ノ能<sup>ナ</sup>アリテ而シテ<sup>シ</sup>絶<sup>ズ</sup>エ<sup>テ</sup>催<sup>ク</sup>熱<sup>ネツ</sup>ノ能<sup>ナ</sup>シ。故ニ其催熱ノ能ハ哈爾斯<sup>ハ</sup>性<sup>セイ</sup>ニシテ水ニ溶ケザル部ニアリトス。是ヲ以テ醫家。血ノ興奮及<sup>シ</sup>激衝ヲ懼ルベキ症ニハ。水製阿片ヲ用井タリ。近時ノ舍密家ハ其學大ニ進ミ。更ニ造化ノ秘奧ニ入ルベキノ新途ヲ啓キ。又其カラ阿片ニ試ミ。檢査精詳ヲ究メテ。其窒素。炭素。水素ヨリ成レルヲ發明シ。又其近成分ハ四ノリト云。即<sup>チ</sup>模<sup>モ</sup>兒<sup>ニ</sup>彪<sup>ヒョウ</sup>母<sup>ボ</sup>。默<sup>モク</sup>格<sup>カク</sup>紐<sup>ニウ</sup>母<sup>ボ</sup>。那<sup>ナ</sup>耳<sup>ニ</sup>格<sup>カク</sup>



智澀及越幾斯分是ナリ。自註ニ曰予ハ謂フニ此越幾  
斯分蓋無能ノ物ニ非ザルベシ  
シ而シテ世ノ舍密家總テ此分ヲ輕視シ特ニ吾輩ノ未  
於テハ輕スルニ過ギタリ要スルニ輕シハ吾輩ノ未  
知ルヨリ寧須檢分ノ名ヲ命スルヲ勝レリトス  
レ氏其功ト性トヲ論スルニ至テハ諸家一定セズ唯  
模兒彪母ハ單用シテ功少キ一疑フベカラズ此物功  
ヲ致サムニハ必先一個ノ酸ニ和スルヲ要ス而シ  
テ其酸ニ和セル者ハ其功殆阿片ニ同ク過用シテ死  
ニ至ラシムベシ又其那耳格智澀即樂斯澀ニ至テ  
ハ或ハ大能アリト謂ヒ或ハ能少シト謂ヘリ又那耳  
格智澀即樂斯澀ハ興奮ノ功ヲ奏シ模兒彪母ハ鎮靖ノ能ヲ致

スト云説未確定セザル所ナリ更ニ越幾斯分アリ雪  
際亞國ノ舍密家名度別兒窟宋名ノ説ニ此物ハ阿片  
中最カアル者ナルベシト言ヘルハ頗ナリ  
舍密家然ク検査ヲ究メテ而シテ醫家ノ得ル所何モ  
ノゾ  
○單模兒彪母既ニ阿片ニ非ズ默格紐母亦阿片  
ニ非ズ那耳格智澀亦阿片ニ非ズ越幾斯分亦阿片ニ  
非ズ舍密ノ巨擘窩兒斐拉名モ亦言ヘルガ如ク阿片  
ノ能ハ此四分ノ和合ヨリ出ヅ予ハ更ニコレニ次言  
ヲ加フ曰其和合成立全ク特異ニシテ而シテ舍密ノ  
分離ニ因テ破潰ス然レバ醫家ノ宜ク記スベキ所次



ノ如シ。凡阿片ヲ用井ムト欲スル者ハ宜ク直チニ阿片ヲ用井ルベシ。○然ルキハ阿片含ム所ノ諸分ヲ用井ル一疑ナク。特ニ其特異機性ノ和合ニ於テ用井ル一ヲ得ルナリ。蓋此和合ハ萬物成立ノ源ニシテ其基本ノ存スル所ナリ。

醫家ニ在テハ古昔ノ二方却テ要緊ナリトス。即揮發溶液及水製溶液ニシテ。甲ヲ「チンク」ト名ツケ。乙ヲ「エキ」スタラク「チム」。アクオ「シム」ト名ツケ。○甲ハ麻醉ニ兼子テ血積ヲ起シ。心臟ノ機力ヲ増進シ。乙ハ麻醉ノ能アリテ。催熱ノ力甚少シ。○此二種ノ別

ハ試驗ニ據リテ確定セル所ニシテ。施治ノ際ニ方テ要緊ノ事件ナリ。即鎮靖ノ力ニ兼子テ興奮ノ力ヲ要スル症ニハ。甲ヲ用井。又單ニ鎮靖ノ功ヲ要シテ興奮沸血ノ力ヲ懼ルハ者ニハ。乙ヲ用井ル等ナリ。

舍密學ニ於テモ亦右ノ區別ヲ切要トス。其故ハ其水ニ溶クル者ハ單ニ麻醉ノ力ヲ致シ。燒酒ニ溶クル者ハ。麻力ノ外更ニ興奮ヲカアルヲ以テ。其興奮ノ力ハ麻力トハ自異ナルヲ明ナレバナリ。而シテ甲ハ則黙格紐母酸模兒彪母ト。越幾斯分ノニニシテ。乙ハ則純模兒彪母及那耳格智涅ナリ。



予更ニ予カ検査ノ論ヲ舉グ。看者以テ贅トナスコ勿  
レ。○夫刺衝機ハ膏、其名覺機ト異ナルノミナラズ實  
ニ覺機トハ別ニシテ。特ニ存シ。自其機能ノ源ヲ有ス。  
而シテ神經ノカニ由テ感動變易セララル、ト雖本神  
經ノカニ賴テ而シテ起ル者ニ非ザルナリ。○此論ニ  
至テハ。法兒列爾名ノ說理アリト謂フベシ。而シテコ  
レヲ證セムニハ。唯心臟ヲ細檢シ。其壯大ノカニ比ス  
レバ神經甚少キヲ見テ知ルベシ。又胚胎初成ノ時心  
ノ部ニ鼓動スル一點ヲ生シ。此點神經ナシト雖能張

縮スルヲ見テ悟ルベシ。自註ニ曰。予尚ニ證ヲ舉ゲテ  
テ生體ニ固有スルカナル器械性ノ刺衝物ヲ其ハ神經ヲ斷  
セル後。舍密性或ハ器械性ノ刺衝物ヲ其ハ神經ヲ斷  
收縮振盪ヲ起シシムベキ由リ。其ニハ特ニ筋纖維ニ  
未悟ラザル所ニシテ。即動運ノ力。陸續スル者ニ在テ  
常ニ疲困セザルヲ以テ。譬ハ心ノ縮張ノ如シ。若夫  
神經ニ關ル諸機ハ。必疲困セザルヲ以テ。譬ハ心ノ縮張ノ如シ。若夫  
以テ。亦刺衝機ノ特異ニシテ。其部ニ舍リ。且自但其機  
面復スルノ固有カナルヲ證スルニ。舍リ。且自但其機  
能ヲ明辨セムガ為ニ。宜ク刺衝機及刺衝系ヲ統攝ス  
ベシ。故ニ予ハコレヲ血生及血管系ト名ツク。蓋此中  
ニ生活スル所ノ物ハ。本血ナルガ故ナリ。夫血ハ主ナ  
リ。血ノ為ニシテ心アリ。又血行アリ。彼ノ常論ニ所謂  
心ノ為ニ血アルニハ非ズ。○血ハ生ノ源ニシテ。又其



伴ナリ。神經ハ然ラス。神經ハ血ニ由テ始メテ其生ヲ得ルナリ。夫流體ハ凝體ニ先タツテ成ル。凡生アル者必流體ヨリ成ル。是帝ニ其初成ノ時ノミナラズ。其存スルノ間常ニ然リ。然レバ血ト血管系トハ彼ノ機性生活ノ源ニシテ。即造育生活ノ本ナリ。故ニ血ハ生ノ材ニシテ。神經ハ生ノエナリ。○是ヲ以テ外感ノ感受モ亦常ニ只神經系ニノミ係リ。特ニ神經ニ頼テ而シテ起リ。然ク唯奇道ノ感傳ニ由テノミ血生ニ傳フル者ニ非ズ。能直ニ血ニ傳ヘ特ニ其和合ト其生トニ感スル。猶其直ニ神經ニ感スルガゴトクナリ。予コレ

ヲ證スルニ。近ク刺絡ノ功ヲ以テス。夫刺絡ハ直ニ血ノ和合ヲ變セシムル。固ヨリ論ナシ。温モ亦然リ。夫温ハ直ニ血ノ沸漲ヲ進メ。血管ノ生ヲ増盛スル。未曾<sup>テ</sup>神經系ノ援ヲ得テ而シテ始メテ然ルニアラス。○阿片亦然ク一齊ニ直ニ神經ト血トニ力ヲ達シ。瞬間ニ血ノ生力ヲ壯盛ス。即服後直ニ顯著ノ沸漲ヲ呈ス。ヲ以テ知ルベク。又心ノ機能増盛スルニ由リ且直ニ血ヨリ成ル所ノ產物。即釀膿等ノ健運ニ由テ悟ルベク。及生機總テ亢盛シ。コレニ因テ血速ニ溶解腐敗ニ進ム等ヲ以テ明ラムベシ。○吾輩今日生力ノ名ヲ以



テ理會スル所。往日ニ比スレバ唯更ニ大ニ更ニ廣ク  
ラムヲ要スルノミ。見ズヤ植物ハ亦生活ノ機性體  
ニシテ。神經ナシト雖。然モ生カアルト刺衝機アリテ  
存スルノ明ナルヲ。又見ズヤ各自神經ナシト雖。諸  
種來觸ノ物。能ク其生カラ増上セシメ。或ハ抑制シ。或ハ  
枯死セシムルニ至ルヲ。是乃今時ノ試驗ニ因テ知  
ル所ナリ。而シテ又若キ植生即動物内生ノ基ナリト  
不フ。豈非ナラムヤ。血管ノ主ニ血ニ在リ。木  
約シテコレヲ言ハ。阿片ノ能ハ。他藥ノ如ク刺衝興  
奮等ヲ以テ説明スベキ者ニ非ズ。猶造化ノ重器ナル

温光越列幾等ノ如ク直ニ功ヲ生カニ致シ。其諸支諸  
流ニ入り生カニ透徹シテ。其内ニ充在ス。而シテ特ニ  
生活ノ機性造育ノ力。即其本源造成ノ勢ヲ増盛。却  
テ知覺ノカラ抑制ス。

主治

阿片ノ本能已ニ明ナルナリ。其應用ノ主治亦自明ナ  
リ。即左ノ如シ。  
癩。神經性症。即覺機常ヲ失ヒ。増進スル者。詳ニコレヲ  
言ハ。血管系ト血生トノ生カ。虚衰スル者。○但此症  
ハ其全身ニ在ルト。局處ニ在ルトニ論ナク。又其急性



ト慢性トニ論ナシ。

神経系ノ興奮愈盛ニ。心ト血管系トノ生力。即生活本  
系ノカナル者。愈沈衰シ約シテコレヲ言ハバ。生力實  
ニ虚衰スルヲ愈多ケレバ。阿片愈適應シ。愈合當ス。是  
實ニ阿片ノ一大勲ニシテ。コレニ因テ能急劇ノ危篤  
ヲ防ク所ナリ。例スルニ惡性痘寒壞疽及窒扶斯ニ於  
ルガ如シ。

是故ニ先脱液。或ハ今為ノ瀉血。及腸胃ノ泄出ニ因テ。  
身體虚衰セル者ニハ。阿片愈適應ス。其ハコレニ因  
故ニ神経系ノ興奮ヲ鎮靖シ。其不整ノ機能ヲ整理シ。

此分沁ノ病亦。瘰ヲ除キ。特ニ痛ヲ止メ。心及機性生活ノ  
此ニ屬ス。カヲ壯盛ニス。○是即吾輩阿片ヲ用井ルニ當テ。專率  
由スル所ナリ。

特異ニ分テコレヲ言ハバ。疼痛發汗スベキ症總テ中  
心ヨリ周圍ニ血行ヲ進ムベキノ症。腸ノ泄出衰憊ヲ  
致スベキ者等。是ナリ。

主治已ニ明ナレバ。其禁忌亦隨テ知ルベシ。第一多血  
及炊衝是ナリ。○凡刺絡主治ノ症尚在ル間ハ。阿片ハ  
懼ルベキノ苛毒ナリ。其故ハ。阿片ハ血積ヲ増サシム  
ルヲ尤劇ク。特ニ頭腦ニ進メ。且炊衝性ノ刺戟ヲ増盛



スレバナリ。○諸熱病其初起ニ於テハ必常ニ焮衝ノ性ヲ具ス。故ニ阿片ハ禁ズベシ。若誤テコレヲ用井ル氏ハ其熱皆窒扶斯ニ變スルナリ。是貌樂運ノ醫流世ニ盛ナル間吾輩屢見聞スル所ニシテ予ハ則予ガ入為神經熱論中ニ説キタリ。

第二胃中汚物鬱滯スル症是ナリ。此症アレバ阿片適應セザルノミナラズ其汚物ヲ留滞セシムルニ因テ害アリ。

第三血質甚溶解シ腐敗ニ傾ク症是ナリ。此症ハ阿片ニ因テ益増進ス。

應用

此偉大ノカヲ各病各症ニ應用スルヲ論スルハ固ヨリ予ガ敢望ム所ニ非ズ。若コレヲ為サムト欲セバ。須一部ノ原病學ヲ著ス。トヲ要スベシ。其故ハ凡有ノ病患上ノ主治ヲ以テ言ハシ。阿片ヲ施スベカラザル者ナキヲ以テナリ。○故ニ予今唯阿片ノ應用持異無雙ナル諸症其應用疑フベクシテ精詳ノ辨識ヲ要スル諸症及當今世人未其應用ヲ明知セザル諸症ノヲ列舉ス。

局處焮衝

應用 局處焮衝 共



阿片ノ功其最ナル者ハ局處焮衝ナリ是蓋當今幾多ノ消熱醫流當ニ掉頭スベキ所ナリ。○然レモ是實ニ然リ。而シテ予ハ謂フニ焮衝ニ阿片ヲ應用スルハ是今ノ醫術。往日ニ勝ル所ニシテ。又醫ノ良巧ヲ見ルベキ所ナリ。○夫局處ノ焮衝ニ全身及局處ノ瀉血ヲ行ヒ。又他ノ消焮諸藥ヲ用非テ後。屢其諸症未全ク除カザルトアリ。或ハ一たび減退スルモ。再強劇ニ發スル下亦屢コレアリ。譬ハ脇胸痛ニ於ル刺疼。咳嗽。短息ノ如シ。而シテ其脉ハ則疾ニシテ熱ヲ帶ブルト雖小ニシテ復刺絡ヲ行フベキニ非ズ。此症ニ於テハ消焮ノ

治法ニ因テ血ト血管系トノ所患ハ全ク除キ。唯焮衝部ノ神経系ノ刺衝ノミ尚残留スル者ナリ。此刺衝ハ即増進覺機ニシテ。或ハ又痙ト名ツク。而シテ多量ノ刺絡ヲ以テ衰弱ヲ致スニ因テ。愈強盛ヲナスベシ。故ニ此時ニ於テ更ニ瀉血ヲ行ハバ。疼痛及局處ノ諸症益增長ス。此症ニ在テハ阿片ヲ以テ無雙ノ神藥トス。此藥一晝夜間ニ能ク焮衝ノ殘餘ヲ一掃ス。蓋此藥此ニ要須ナルニカヲ併有スルト。他藥ノナキ所ナルニ由テ然リ。即一ニハ其焮衝セル部ノ増進覺機即痙ヲ消除シ。一ニハ衰弱シテ機能廢絶セル血管ヲ興奮シ。コ



レニ因テ其部ノ機能ヲシテ。滲出潑留セル血ヲ吸收シ。毎ニ必須ナル局處及全身ノ分利機ヲ完成スルニ適セシム。但此二件ハ消燼療法ヲ連用スレバ。愈險惡ニ進マザルヲ得ザル者ナリ。

胸脇痛即肺燼衝ノ痛アル者ニ在テ。右ノ症ニ遇フト特ニ多シ。而シテ阿片ノ用法度ニ適スルキハ。患者ノ血ヲ費スル甚少シ。或ハ唯阿片ノ以テ生命ヲ救フベキナリ。但其症ヲ診決スル極メテ難シ。蓋良工ノ良工タル所。是ニ於テ見ルベシ。其故ハ此症若阿片ヲ誤用スルキハ。其大害又測ルベカラズ。彼ノ貌樂運

ノ醫流行ハル。時ノ如キ。先刺絡ヲ行ノヲ須タズ。始ヨリ直ニ阿片ヲ用井ルヲ常トス。然ルキハ其痛ハ能止ムト雖。煩悶除カズ。燼衝又消散セズ。或ハ變シテ寒壞疽トナリ死ニ陥リ。或ハ硬結膿潰ニ變ズ。故ニ患者一旦輕快ヲ得ルヲ覺エ。醫亦阿片ノ功ヲ稱讚スト雖。却テ知ラズ。患者已ニ將死ノ胚胎ヲ抱キテ。早晚肺勞ニ陥ルヲ。○阿片ノ危険ナルハ。然ク一時痛ヲ止メ。病苦ヲ除クガ為ナリ。コレニ因テ醫モ患者モ輕快ヲ得ルト謂ヒ。又コレニ因テ有力ナル藥ヲ投スベキノ時日ヲ間過スルニ至ル



故ニ先適應ノ瀉血ヲ行ヒ。適應ノ消焮法ヲ施シテ後。胸中ノ刺疼退カズ。或ハ一タビ退クモ必再發シ。或ハ其勢更ニ劇ク。芫青膏亦功ナク其脉ハ則小ニシテ軟。復刺絡ヲ行フベカラザルニ至テ。方ニ阿片ヲ施スヘキノ良期トス。是概第五日第六日ニ在リ此時ニ方テハ阿片一匁ヲ抱歇兒散トナシ。臨卧ニ與フレバ一夜間ニ能焮衝ノ殘餘ヲ厭絶シ。局處及全身ノ分利尚整ハザル者ヲ完成ス。或ハ又此症ニ予ガ屢試用シテ峻功ヲ取レル所ノ加汞劑ヲ與フベシ。蓋此汞ハ焮衝ノ遺症ナル淋發ノ凝留ヲ疏解シ。且吸収セシムルノ能

アルニ因ル。

其方

甘汞 六匁

阿片 一匁

白糖 二錢

右研和シ六包ニ分チ。二小時或ハ三小時ゴトニ一包ヲ與フ。

右ノ症ヲ完治スルニ。唯此散劑ヲ連用スル一晝夜乃至二晝夜兼子テ祛痰飲ヲ温服セシムルノミヲ以テ足ル一多シ。即疼痛消除シ。呼吸緩解シ。痰出テ汗發



シ。而シテ熱狀ノ脉鎮靖ス。

單純焮衝様癩麻質性胸脇痛ノ初起ニ於ル。亦唯其臂

ニ峻カノ刺絡按ニ七八十錢ヲ行ヒ。而シテ後直チニ

拈歌兒散一服ヲ與フルノミヲ以テ完治スルヲ多シ。

予曾心焮衝ノ一症ヲ見タリ。醫已ニ多量ノ刺絡ヲ行

ヒ。復血ヲ瀉スベカラザルニ至リ。而シテ心悸強劇煩

悶死セムトシテ止マズ。老利兒結兒斯水亦功ナシ。予

乃阿片ヲ與ヘテ速ニ此殘患ヲ掃除スルヲ得タリ。

但諸焮衝病ニ阿片ヲ用井ルニ方テ。宜ク子細ニ其脉

ニ注意スベシ。コレ阿片ノ當否ヲ決スベキ確徵ナリ。

故ニ上ニ既ニ説ケルカ如ク。脉其カト緊トヲ失ハザ

ル間ハ。此藥ヲ與フベカラザルヲ固ヨリ論ナシ。又已

ニ用井ルノ後モ。子細ニ脉ヲ檢點スベシ。若其脉再緊

トナリ疾トナラバ。コレ血ノ焮衝狀ノ殘餘アリテ。阿

片ニ因テ再興奮セララル、ノ證ナリ。然ルキハ阿片ヲ

用井ルヲ尚早キニ過ギタリ。寧阿片ヲ止メテ萘脛沙

密ミシ老利兒結兒斯水チキ第芟答利斯等催熱ノカナキ麻藥

ヲ用井ルニ如カズ。

諸他部ノ局處焮衝亦右ノ規則ニ從フベシ。○即腹部

諸臟ノ焮衝。肝焮衝。脾焮衝。胃焮衝等ニ於ルカ如シ。特



ニ胃焮衝ニ於テハ其部ノ覺機ト神經交感トノ大ナルニ因テ病神經性ヲ得ルヲ甚大ニシテ患者本焮衝ノ為ニハ死セズ却テコレニ因テ發起スル全身ノ神經痙ニ因テ死スルヲ多キヲ以テ阿片獨無二ノ救生藥タルヲ最多シ○吾輩屢急性霍亂ニ於テ同症ヲ見ルヲ多シ又亞細亞霍亂ノ治法ハ總テ劇症胃焮衝ノ治法ニ異ナルヲナシ即適宜ノ瀉血ヲ行ヒテ後阿片ニ甘汞ヲ加ヘ粘滑ノ油劑ニ伍シ用井ルヲ無二ノ救途トス○又腸焮衝焮衝性吐糞ニ於テ適宜ノ瀉血ヲ行ヒテ後焮衝ノ神經性殘患ニ因テ腸攣縮シ大便閉

止シテ通セザル時ハコレヲ通利セシムルニハ甘汞ニ阿片ヲ加ヘ用井温浴法ヲ行フニ如クナシ或ハ峻下藥ヲ要スル者アリ此時ニ方テモ亦阿片ヲ加フベキヲ多シ近時頑固ノ吐糞ニ巴豆油ヲ用井テ功ナク阿片ヲ加ヘテ始メテ利セシマアリ○膀胱焮衝焮衝性尿閉ニ於ルモ亦然リ若夫瀉血功ナク測胞子及利尿藥其勲ヲ顯サバル片ハ則阿片能尿ヲ利セシムベシ  
咽焮衝特ニ格摟癰ハ又宜ク注意スベキノ一症ナリ諸種ノ咽焮衝特ニ格摟癰ニ於テ醫宜ク銘記スベキ



ノ一事ハ已ニ適宜ノ消焮法ヲ行ヒ。血ノ刺衝已ニ除  
 キテ後。神經ノ焮衝尚留マル者アリ。即嚙噐及聲噐ニ  
 於テ痙性ノ患狀殘留シ。其患嚙噐ニアレバ嚙下困難  
 除カズ。聲噐ニアレバ呼吸困難除カザル。猶焮衝尚  
 存スル時ノゴトシ。而シテ此患能終ニ死ヲ致ス。ア  
 リ。○此時ニ至ラハ。消焮法ヲ連用スルモ亦寸功ナシ。  
 是此症ノ焮衝ニ非ズシテ。其殘患ノ痙ナルヲ以テナ  
 リ。故ニ唯阿片。或ハ他ノ有カナル鎮痙藥ヲ用井。頸圍  
 ニ芫青膏ヲ貼シ。或ハ鎮痙軟和人琶布ヲ施ス等。始メ  
 テ功ヲ奏スベシ。○特ニ格樓痺ニ於テハ。世醫或ハ單

ニ焮衝ニ注意シ。消焮ノ法ノミヲ固執スル。ア  
 リ。○因テ患者遂ニ治セズ。若夫此時ニ至テ。阿片或ハ  
 麝香ヲ與フレバ。速ニ殘患ヲ一掃シ。窒塞ノ危害ヲ消  
 除シ。以テ生命ヲ救フ。トヲ得ルナリ。○世醫格樓痺ヲ  
 論シテ。或ハ焮衝性トナシ。或ハ痙性トナス。蓋其藥ノ  
 功ニ因テ言フ所ニシテ。共ニ理ナキニ非ズ。其故ハ此  
 病其本性ト初起トニ於テハ。固ヨリ焮衝性ニシテ。唯  
 消焮ノ藥ノミヲ以テ能治スル。ト多シト雖。亦其焮衝  
 期。屢速ニ痙性神經性期ニ變スル。トアリテ。此期ニ至  
 テハ。唯有力ノ鎮痙藥ノミ能コレヲ救フ。トヲ得レバ



ナリ。腦焮衝亦全ク前則ニ從テ療スルヲ要トス。特ニ此症ニ於テハ。阿片ヲ以テ特異治腦ノ藥トナスベシ。夫此症ニ適宜ノ瀉血ヲ行ヒ。寒菴ヲ施シ。清涼下劑ヲ與ヘテ後。麻酔醒メズ。或ハ譫妄息マズ。其脉復瀉血ヲ行フベカラサルキハ是焮衝已ニ腦ノ神經性患状ニ變スル者ニシテ或ハ腦中已ニ洩<sup>イ</sup>ヒヲ滲出スル<sup>ル</sup>アルヘシ。此時ニ至テハ唯阿片ヨク此殘患ヲ除キ得ベシ。但其洩<sup>イ</sup>ヒハ滲漏アルベキ者ニハ更ニ甘汞ヲ加フルヲ要トス。○近世ノ諸家此病ヲ療スルニ多クハ單ニ消

焮法ヲ執リテ阿片ヲ遺忘セリ。予近日阿片ノ耽飲譫妄ニ良功アルニヨリテ。再<sup>ヒ</sup>其腦焮衝ヲ治スルノ利用ヲ興復スル<sup>ル</sup>ヲ得タリ。但予深ク自喜フ<sup>ノ</sup>シナラズ。又深ク世人ノ予ガ説ヲ以テ新奇トナス<sup>ル</sup>ヲ怪ムナリ。其故ハ腦焮衝其本性神經性ナル者及血ノ焮衝已ニ消除スル者ニ阿片ヲ用井ルハ。往昔ヨリ明知ヒル一事ニシテ名工巨擘ハ既ニ稱用セル所ナルヲ以テナリ。右ノ規則ニ率ヒ用井テ。阿片ノ眼焮衝ニ偉勲アル<sup>ル</sup>ハ。當今世人ノ普ク知ル所ナリ。



神經熱及窒扶斯

右ニ説ク所ニ據リテ。又阿片ノ神經熱及窒扶斯ニ利  
 アルヲ知ルベシ。○夫神經熱ハ其因必シモ腦焮衝  
 ナルニ非ズト雖。又其腦ト神經系トノ所患ヲ兼子ザ  
 ルハ少シ。而シテ其腦本病ノ中心トナルヲ猶心臟ノ  
 焮衝熱ニ於ルガ如シ。○凡局處ノ刺衝アレバ則血積  
 ヲ生シ易シ。今此病ニ於ルモ亦然リ。然レモ血積ト焮  
 衝トハ尚霄壤ノ懸隔アリテ。且其血積常ニ副症ニシ  
 テ本症ニハ非ザルナリ。○但阿片ヲ用井ムト欲スル  
 ニ方テハ。血積亦甚大ニ恐ルベキノ一症ナリ。故ニ此

症ニ於テ。腦ト神經系トノ神經性所患ヲ治セムニハ  
 阿片ヲ以テ適應トナスト雖。若コレニ兼子テ腦ニ血  
 積アルカ。或ハ焮衝アルキハ。其害亦甚大ナリ。而シテ  
 阿片ノ力。唯此病ノ昏睡及卒厥ニ陷ルヲ促スベキノ  
 一。其證ハ則彼ノ顔樂運ノ醫流行ハル、間吾輩屢哀  
 ムベキノ諸症ヲ目撃セルヲ以テ知ルベシ。○當今ハ  
 世人顔樂運流ノ害アルヲ懼ル、ヨリ。遂ニ阿片ノ功  
 用ヲ遺忘スルニ至レリ。故ニ予今此ニコレヲ辨明シ。  
 阿片ヲシテ其本分ノ聲價ヲ得セシメムト欲スルナ  
 リ。



神經熱ニ阿片最良功アリテ必要闕クベカラザルノ  
症四ツアリ。

其一・神經熱其初ヨリ單純神經性ナル者即虛衰ノ熱  
ニシテ。精カヲ過勞シ。交媾手淫ヲ過行シ。若クハ過飲  
等ニヨリテ發シ。或ハ既ニ神經性ナル人ニ發シ。或ハ  
毫モ燼衝ノ候ナキ者。是ナリ。此症ニ於テハ少シク瀉  
劑ヲ用井テ後。直ニ阿片ヲ與フベクシテ。更ニ他藥ヲ  
要セザルヲ多シ。當今阿片ヲ耽飲譫妄ニ稱用スルハ。  
其理亦此ニアルナリ。○又一種ノ神經熱アリ。特ニ少  
年脆弱神經性ノ人ニ發ス。大抵患者大ニ疲レ。其脉刺

衝セララル、状アリ。而シテ唯輕キ譫妄アルヲミニシ  
テ。別ニ局處ノ患状ナク。又脉ニ燼衝ノ候ナク。又頭部  
ニ血積ノ徵ナキ者ナリ。此症ニ於テハ。消火ノ諸藥稍  
功ヲ奏スト雖。熱ト譫妄トハ稽留シテ八月ヨリ十四  
日ニ至ル。此ニハ唯其消燼ノ湯液ニ少量ノ阿片チキ丁幾  
ヲ加フルヲ以テ足レリトス。コレニ由テ熱譫妄共ニ  
速ニ消ス。

其二・已ニ適宜ノ瀉血ヲ行ヒ寒菴ヲ施シ。下藥ヲ用井  
テ後。血積ノ徵除クト雖。譫妄尚止マズ。或ハ却テ狂躁  
ニ變スル者アリ。是純然タル神經性ノ者トス。阿片以



テコレヲ完治スルニ足ル。但甘汞ヲ加フルト前方ノ如クニシテ更ニ良ナリ。

予嘗阿片ヲ以テ予ノ同僚ヲ救ヒシトアリ。當時ノ喜遂ニ忘ルベカラス。予ガコレヲ診スル時ハ劇症窒扶斯ノ第七日ニアリ。脈小ニシテ殆數フベカラズ。昏睡醒メズ。譫妄シ。又筋惕アリ。瀉血寒菴下劑甘汞已ニ多量ニコレヲ施セリト云フ。予乃前方ノ如ク阿片甘汞ノ和劑ヲ與フ。六服ノ後脈稍徐トナリ。且大ニ顯レ。瘕症消除シ。頭部輕キヲ覺エ分利始メテ起リ。遂ニ全治スルヲ得タリ。○此ノ如キ治例予悉コレヲ舉ゲム

ニハ其幾許ナルヲ知ラス。又ヤ人立及夫不樂其三室扶斯。其初發ヨリ泄瀉痢霍亂等ヲ兼子發シ。コレヲ因テ已ニ血ヲ腦ヨリ誘導スルヲ得タリト雖又其生力耗竭シ。真虛ニ因テ死スベキノ恐愈多キ者アリ。此症ニ於テ其泄利ヲ遏ヌ。腸ノ刺衝ヲ鎮靖シ。以テ性命ヲ救フニ於テハ阿片ヲ以テ無二ノ藥トス。○千八百六年及千八百七年文化三年及四年ニ於テ李漏生國名ニ流行セル軍中疫ハ實ニ窒扶斯ノ瀉下ニ合併セル者ニシテ。唯阿片ノミヲ以テ能コレヲ救フヲ得タリ。



其四。生力全ク耗竭シ。保生法「インチカチオヒタリス」按ニ唯生ヲ保ツヲ主ト  
ラ云フ療法。主治ノ候顯レ。有カノ神經藥及興奮藥ヲ與  
 フレバ。其脉沈小ニシテ疾ナル者興復スルヲ得ザ  
 ル症是ナリ。此時ニ在テハ他ノ刺衝藥ニ阿片液ヲ加  
 へ。少量ニ屢用井ルヲ以テ最大良法トス。

此症ニ於テハ。阿片能ク一夜間ニ其小疾ノ脉ヲ鎮靖シ。  
 實ニシテ且ッカアラシメ。謔妄ヲ鎮メ。神識ヲ醒起シ。虚  
 衰セシムルノ泄出ヲ遏止シ。以テ望外ノ變革ヲ致ス  
 一。實ニコレヲ貴靈ノ天資ト稱スルニ足レリ。  
 然リト雖。凡、神經熱ヲ療スルニ方テハ宜ク先下藥ヲ

用井テ。頭腦ヨリ導降シ。而シテ後始メテ阿片ヲ與フ  
 べシ。切ニ其早キニ失スルヲ勿レ。

間歇熱

阿片ノ功又間歇熱ニ於テ最モ昭明ナリ。特ニ惡性間歇  
 熱ニ於テ著シ。此病ニ於テハ。實ニ阿片ヲ無二ノ救生  
 藥ト稱スベシ。而シテ吾輩阿片ノ此カラ知リテヨリ。  
 始メテ能ク此病ヲ治スト言フヲ得ルナリ。蓋シ此カラ  
 發明セシハ。實ニ留斃「ホドク」忽弗「ホドク」滿「ホドク」名「ホドク」ニ在リ。夫間歇熱阿片  
 ヲ施スベキノ症ハ。其發作ゴトニ卒厥昏睡等。生命危  
 殆ノ症ヲ兼子發シ。太抵第二發或ハ第三發ニシテ死



ニ至ル者ナリ。此症ニ於テハ。阿片ニ般ノ方ヲ以テ能  
 生命ヲ救全ス。即其一ハ此卒厥ノ發作中ニ用井ルニ  
 在リ。凡刺絡ヲ以テ此卒厥ヲ救ハムト欲スル者ハ甚  
 惑ヘリ。此症ハ全ク痙攣ヨリ他ナクシテ。而シテ能ク  
 レヲ除キ。其厥症ヲ復セシムルコトヲ得ルハ。特阿片ノ  
 ミナリ。其二ハ發作ヲ防止スルガ為ニ用井ルニ在リ。  
 此發作ハ即間歇熱ノ發動ニシテ。コレヲ預防シ。務メ  
 テ速ニ熱ヲ遏止スレハ即病全ク治ス。然レモ此發動  
 ヲ遏止スルニハ。次方ヲ施スヨリ的切ナルハナシ。其  
 方ハ則發作ノ間時ニ於テ。新ニ研末セル黃藥那ハ錢

ヲ與ヘ其終服ニ阿片一以ヲ加ヘテ。次ノ發作前ニコ  
 レヲ與フ。此方ハ總テ頑固ノ間歇熱ヲ截スル最確ノ  
 方ト稱スベシ。

痙

痙性神經病ニ阿片ノ一大藥タルコトハ。世人ノ普ク知  
 レル所ニシテ。又常ニ多ク此症ニ施用ス。故ニ庸醫ト  
 雖。痙ノ名ヲ聞ケハ阿片ノ名ヲ舉ゲザル者ナシ。而シ  
 テ大不幸正ニ其中ニ在リ。其故ハ痙ニ阿片能クコレヲ  
 救フベキ者ト。阿片能クコレヲ害シ。能ク死ニ至ラシムベ  
 キ者アリテ。其差別膏ニ膏壤ノミナラサルヲ以テナ



リ。○蓋能コレヲ辨識シ。且コレニ注意スル者幾人ゾヤ。故ニ予此ニコレヲ説カザルヲ得ズ。

阿片ヲ用井ムト欲スルニ方テ。宜ク辨明スベキノ症三ッアリ。其一ハ則其瘕多血或ハ頭腦血積ヲ兼子。或ハ焮衝性ヲ兼子。或ハ單ニ焮衝ニ因テ發スル者。其二ハ則瘕胃腸汚物ヲ兼ヌル者。或ハコレニ因テ發スル者。其三ハ則瘕右等ノ合併症ナク。單純神經性ノ者是ナリ。其第一症ハ少年ノ人ニ多ク。特ニ小兒生齒ノ時ニ發スル症ニシテ。阿片能其瘕ヲ増進シ。或ハ卒厥ヲ發シテ死ニ至ラシムベシ。此症ハ必先瀉血ヲ行ヒ。消焮

誘導ノ藥ヲ施シテ。其血積ヲ掃除スルヲ要トス。大抵

此法ニ因テ瘕全ク治スルノ多シ。按ニ世ニ所謂小兒驚風ハ蓋此類ナル

バ若夫右ノ方法ヲ施セ氏。瘕尚留連スル者ハ。始メテ

阿片ノ施用ヲ許スベシ。然レ氏仍先無熱ノ鎮瘕藥即

菲<sup>コオス</sup>脛<sup>シヤ</sup>沙<sup>シ</sup>密<sup>シ</sup>老<sup>ラウ</sup>利<sup>リ</sup>兒<sup>ル</sup>結<sup>ケ</sup>爾<sup>ル</sup>斯<sup>ス</sup>水<sup>ス</sup>。亞<sup>ア</sup>鉛<sup>ン</sup>等<sup>ト</sup>ヲ與<sup>フ</sup>ハ。其功ヲ奏セ

ザル時ニ至ラ。始メテ阿片ヲ用井ルヲ以テ勝レリト

ス。○其第二症ニ於ルモ亦阿片功ナクシテ害アルベ

シ。此症ハ宜ク先吐下藥ヲ以テ胃腸ヲ淨滌スベシ。大

抵コレニ因テ瘕ヲ鎮ムルニ足ル。而シテ若瘕尚止マ

ザル片ハ。始メテ阿片ヲ與フベシ。○其第三症ハ則阿



片適應ノ症ニシテ。其神經性ノ痙攣真ノ衰弱ニ因シ。或ハ曩ニ瀉血ヲ行ヒ。若クハ下劑ヲ與フル等ニ由テ。患者衰弱スルヲ愈甚ケレバ。阿片愈適應ス。要スルニ。其脉愈小愈軟愈虚ナレバ。阿片愈宜トス。但單純依私的里性ノ痙攣ニ於テ宜ク更ニ注意スベキハ。依私的里ノ患者屢阿片ヲ嫌惡スル異癖アルヲ以テ。常ニ菲臘沙密葛斯突樓謨等ノ調和劑ヲ加ヘ用井ルニ在リ。舍電汎名ノ製劑。其意盖此ニ在リ。又古人ノ稱用セル底野迦及密篤利達多等皆阿片ニ芳辛ノ諸藥ヲ加フルモ同理ナリ。

但予ガ久ク試驗スル所ニ據ルニ。神經性ノ劇症痙攣。特ニ其腹部或ハ脊椎及肋間神經ニ根據スル者ニ於テハ。阿片ヲ内用スルヨリハ。灌腸藥トシ行フテ。其功更ニ峻ナリトス。

創後之神經症

更ニ創傷ノ刺衝アリ。此ニコレヲ辨論セザルヲ得ズ。○大創大失血ノ後或ハ多量ノ瀉血ノ後。患者痙性トナリ。全身強直シ。死セルガ如キ者。或ハ右ノ原因ノ後。第二三日ニ於テ疼痛極メテ劇ク。脉及其他ノ症狀。神經性痙性ヲ呈シ。嫩衝ノ色鮮活ナラズ。其膿却テ稀



水トナラムト欲スル者ニハ。阿片實ニ無二ノ救生藥ニシテ。能速ニ其全症ヲ變革セシムルヲ得ルナリ。是此藥一併ニ能痛ヲ緩メ。瘧ヲ除キ生カヲ增加シ。且其固有ノカヲ以テ。特ニ脈管系ト其造育機トヲ興奮シ。焮衝ト化膿ノ機ヲ旺盛セシムルニ因ル。

近日予子宮截開法ヲ行ヘル患者ニ於テ。阿片ノ此力ヲ證スルヲ得タリ。予ガ診セルハ手術後第五日ニシテ。患婦頗衰弱セリ。其手術ハ破漿後三十六小時ニ於テ行ヒ。瓦拉歇名ノ快手ニ因テ六分時ニ術ヲ完了ス。但術前二度術後一度刺絡ヲ行ヒ。而シテ内服ニハ

李歇里ノ飽和劑ヲ用井。兼子テ菲臘沙密越名ト名利兒結爾斯水トヲ隔次ニ用井タリ。術後第五日ニ至テ疼痛極メテ劇ク。恰陣痛ノ如ク。患婦號叫スルニ至ル。脈進テ百三十五動ニ至リ且小ナリ。而シテ兩手冷エ。粘汗出デ創ノ焮衝鮮活ナラズ。乃阿片液一滴鎮瘧液二滴ヲ取テ。一小時ゴトニコレヲ服セシム。一二時ノ後疼痛退キ。脈復シ減スルヲ二十動。創縁鮮活ニ焮衝シ。分泌ノ液濃稠ヲナシ。コレヨリシテ快復ノ良機發成シ。遂ニ全治スルヲ得タリ。創後ノ牙關緊急及全身強直ニ於テ。阿片無二ノ救生



藥タル一ハ。醫家普ク知ル所ニシテ。復予ガ言ヲ待タズ。此症ニ於テハ阿片ノ神經痙ヲ鎮靖スルカ。最驚讚スベキ所ナリ。但此ニハ全身ノ神經覺機痙攣ノ為ニ縮閉シ。阿片ノ麻力亦輒功ヲ顯サヅルニ至ル。故ニ此症ニハ能極木量ヲ用井テ害ナシ。然レド其痙已ニ鎮靖スルキハ。覺機常度ニ復シ。阿片ニ抵抗スルノ機能再顯ル。○此症ニ於テモ。亦多量ノ阿片ヲ灌腸藥トシテ用井ルヲ峻功アリトス。特ニ牙關緊急スル者ニ於テハ。灌腸藥ノ外。他道ナシ。其量ハ則每一回阿片液四錢。或ハ八錢ニ至ルヘシ。

精神錯亂

阿片ノ功精神錯亂ニ於ル甚。一定セズ。或ハ迅疾的切驚クベク。或ハ毎ニ其功ナク。或ハ又大害ヲ致ス。アリ。○故ニ其症ヲ辨別シ。其當否ヲ察定スルヲ必要トス。○其況則ト謂フベキハ。凡精神ノ所患。單純神經性ニシテ。真ノ衰弱ヲ兼子。或ハ衰弱ニ因テ發スル者ナルキハ。阿片愈功ヲ奏スベシ。例スルニ精神錯亂過飲或ハ過房ニ因スル者。即振揚譫妄依私的里性ノ者。如シ。然レド若多血ノ候アルカ。或ハ其腦陽性燃衝様



ニ興奮セラル、カ。或ハ黑膽質ノ人ニ多キガ如ク。病ノ本因。腦ト神経系トニ在ラズシテ。却テ腹部諸臓ノ壅塞鬱蓄ニ在ル片ハ。阿片只害アリテ益ナン。但其有形ノ因既ニ除キテ後病。單純神経性トナリテ留連スル片ハ。阿片能功ヲ奏スベシ。○又神経性謔妄ニ阿片ヲ用井ルハ。内服スルヨリハ。灌腸藥トシテ用井テ其功勝ルコト多シ。

咳及胸患ニ其因ハ。或ハ大等ノ咳トシテ咳ト胸患トハ。亦阿片ヲ施スニ方テ。宜ク明辨スベキノ一症ナリ。○夫諸種ノ咳。或ハ諸種ノ肺勞。阿片ニ因

テ治スルコト固ヨリ多シ。然レモ又阿片ニ因テ却テ險重シ。或ハコレニ因テ始メテ真ノ肺嗽衝ニ至リ。遂ニ真肺勞ニ陥ルコト更ニ多シ。其理蓋胸患ニ性各異ナルニ因ルナリ。而シテ其各異ヲ辨識スルハ。即醫ノ術ナリ。若夫其咳嗽衝性ノ者ナルカ。或ハ肺ノ嗽衝若クハ血積ニ因スルカ。或ハ否ザルモ是等ノ症状ニ兼ヌル片ハ。阿片常ニ害アルベシ。聖京咳ニ於ルモ亦然リ。其嗽衝状ノ刺衝ヲ兼ヌル間ハ。阿片常ニ害アリ。又腸胃性ノ咳ハ。唯吐藥ヲ以テノミ治スベクシテ。阿片ニ因テハ必險重ス。若夫其咳單純神経性ナルカ。或ハ痙性



ナル片ハ。阿片ヲ除クノ外更ニ的切ノ藥ナシ。唯一服ノ抱歌兒散。臨卧ニコレヲ與ヘテ能其症ヲ一掃ス。又百日咳ノ第二期。神經性ノ時ニ至テハ。阿片ヲ以テ主藥ノ一トナス。又肺勞ノ一種。其初起ヨリ單純神經性ニシテ。肺ト神經全系トノ覺機亢進スルヨリ發スル者アリ。此症ニ於テハ。肺及全身ノ覺機ヲ鎮降スルヲ以テ最要トス。故ニ驢乳。依蘭苔漿。沙列布。温浴法。毛布衣等ヲ用サルノ外。更ニ阿片ヲ兼子用井テ。能其咳ヲ減シ。諸症ヲ除クヲ得ベシ。其

劑ニ阿片ヲ應用スルハ。又精細ヲ要スルノ一事ナリ。○夫此症ニ於ル。亦其各症ヲ明辨スルヲ最要トス。凡膽液性。或ハ焮衝性ノ劑ニ阿片ヲ用井ムト欲スル者ハ。多クハ患者ヲ藥死スベシ。然レモ單純癩麻質性ノ劑ニ於テハ。阿片ヲ無ニノ救生藥トス。千七百九十二年我寬政四年野戰ニ。李漏生國ノ陣中。流行セシ所ノ癩麻質性劑ノ如キハ。濕冷ニ因テ發シ。其勢極メテ猖獗ニシテ。當時ノ常法ナリシ大黃末ヲ以テ療セシノ間。既ニ幾千人ヲ斃セシガ。阿片ヲ用井ルニ至テ始メテ治シ。遂ニ全ク除クヲ得タリ。○但此症ニ於テモ亦



宜ク先<sup>ツ</sup>伊<sup>イ</sup>百<sup>ハ</sup>加<sup>カ</sup>格<sup>コ</sup>安<sup>ア</sup>那<sup>ナ</sup>ノ吐劑ヲ與ヘ。而シテ後阿片ヲ施スベシ。但<sup>レ</sup>一回ニ全量ヲ與フル<sup>ト</sup>ナカルベシ。宜ク粘液或ハ乳劑ニ和シテ。少量ニ屢與フルヲ要トスベシ。否ザレバ動<sup>キ</sup>レハ頓ニ利ヲ過閉スル<sup>ト</sup>アリテ最危シ。要スル所唯粘液及血ノ分利増進スル者ヲ徐ニ減少シ。且其痙攣ニテ大便ヲ停止スルヲ除クニアリ。コレ上法ヲ以テ最能<sup>ク</sup>達スベキ所ナリ。

尿崩

尿崩ニ於ル其症狀又痢ニ同キ所アリ。コレ此病又尿痢ノ名アル所ナリ。何トナレバ此症ニ於ルモ亦其近

因腎ノ機能病ヲ得テ興奮シ遂ニ搐搦性ヲナスニ在

リテ。又其蜜尿ニ於テハ補給力<sub>分泌機</sub>舍密機性一種特異ノ

變ヲ得テ。尿中常有ノ塩ヲ生セズ。却テ糖ヲ生スルニ

因レバナリ。○夫此近因ヲ治セムニハ阿片實ニ主藥

タリ但其遠因幾般アリテ。或ハ全ク近因ニ反セル<sup>ト</sup>

アレバ。預諸般ノ藥ヲ施ス<sup>ト</sup>ヲ要シ。又コレニ因テ全

治ヲ得ル<sup>ト</sup>アリ。○若夫多血血積。病毒轉移腹部壅塞

等ノ原因アラザルカ。或ハコレ有ルモ已ニ除キテ後。

尿崩尚留連スル片ハ。宜ク單ニ尿崩ノミヲ主治シ。腎

ノ特異ノ興奮ト。其分泌ノ乖戾トヲ復スルヲ主トス



ベシ。此ニハ阿片ヲ一大主藥トス。是此藥此症ニ現存  
 スル所ノ兩件ノ主治ヲ兼ヌルヲ以テナリ。即一ニハ  
 局・慶ノ神經興奮ヲ除キ一ニハ強ク皮表ニ導キ蒸氣  
 ヲ催進シ以テ患部ノ病機ヲ誘導シ且コレニ對衝ス。  
 故ニ此ニハ肉食ニ兼子テ阿片ヲ用井ルヲ必當ノ主  
 藥トス。但大量連服スルヲ要トス。是屢予ガ親驗スル  
 所ナリ。宍兒連落兒樂蒲拉涅共ニ等亦其試說アリ。風  
 私多斯名亦其尿崩篇中ニ阿片ヲ稱讚セリ。主スルニ  
 毒及傳染毒ヲ防グノ力。又阿片ノ功中顯明ノ一事ナ  
 リ。

毒 傳染毒

古人謂ヘラク。阿片ハ能毒及傳染毒ヲ拒グノ力アリ  
 ト。彼ノ密多里達篤ト名ツクル製劑ハ阿片ニ芳辛ノ  
 藥ヲ和スルト猶底野迦ノゴトキ者ナリ。ホレト五名地  
 ン王トトリダテストイヘル者。毒ヲ防グガ為ニ毎日  
 コレヲ用井シヨリ。遂ニ此名ヲ得タリ。又「マルキユス。ア  
 ウレリウス帝ハ常ニ底野迦ヲ用井タリ。  
 夫神經ノ知覺少シク痴鈍ヲナセバ能毒及傳染毒ノ  
 カヲ減スト云フノ說理ナキニアラズ。蓋毒ノ感傳ス  
 ルハ生體ノ感受機ニ關リ。感受機ハ則知覺ノ敏鈍ニ



關ルヲ以テナリ。依ト<sup>ボ</sup>昆<sup>ト</sup>堙<sup>ト</sup>兒<sup>ト</sup>性<sup>ト</sup>依<sup>ト</sup>斯<sup>ト</sup>的<sup>ト</sup>里<sup>ト</sup>性<sup>ト</sup>ノ人<sup>ト</sup>ハ其  
覺機特異ニ内部ニ引縮スルガ故ニ。外感ニ應スベキ  
ノ感受機衰弱シ。コレニ因テ傳染病流行病ニ罹ル  
少キモ亦一顯證ナリ。

但毒ニ二種アリ生毒<sup>傳染毒</sup>死毒是ナリ。是宜ク辨識ス  
ベキ所ナリ。

其生毒ニ於テハ阿片唯二般ノ應用アリ。其一ハ其神  
經ヲ痴鈍ニシ神經力<sup>按ニ即</sup>衰弱セシムルノ能ナ  
リ。其二ハ其汗ヲ發シ毒ヲ揮散驅逐スルノ力ナリ。○  
但古昔ノ醫輩ハ阿片ノ血行ヲ増進シ熱ヲ起シ<sup>火衝</sup>

ヲ催スノカヲ詳察セザリシナリ。コレニ因テ誤用極  
ノテ多ク世ニ大不幸ヲ播セリ。蓋其說ニ急性諸熱病  
皆傳染毒ノ致ス所ナルヲ以テ。宜クコレヲ驅散スベ  
シト謂ヒテ。普ク阿片ヲ用井タルガ故ニ。諸種ノ熱病  
多クハ惡性腐敗性ニ變シ。粟疹紫斑ヲ兼ヌルニ至ラ  
ザル者殆少シ。  
急性傳染毒ニ於テハ阿片然ク常ニ大害アルベシ。但  
其傳染ノ初ニ於テハ抱<sup>ド</sup>歌<sup>ル</sup>兒<sup>ル</sup>散一服ヲ服シテ温覆發  
汗シ能ク一晝夜ニシテ其病ノ萌芽ヲ刈リ盡ス<sup>一</sup>アル  
ノミ。



慢性傳染毒ニ於テハ然ラズ。此ニハ阿片ノ血ヲ興奮シ。皮表ニ導達シ。揮散セシムルノ大能。最善ク適應シ。此症ニ於テ屢生體ノ抗拒缺乏スル者ヲ補フヲ得ベシ。

慢性傳染毒中第一黴毒ヲ論ゼザルヲ得ズ。幾多ノ試験ニ據ルニ。黴毒ノ殘患。水銀功ナキ者ニハ。阿片ヲ以テ峻藥トナスベシ。千七百八十年我安永九年ヨリ千七百八十五年我天明五年ニ至ル間。英吉利ニテ汞ヲ用井ズ。單ニ阿片ヲ以テ黴毒ヲ治スルノ說ヲ唱ヘ。且多ク其試說ヲ刊行セリ。夫然ク單ニ阿片ヲ以テ黴毒ノ諸症

ヲ消除シ得ル。固ヨリ疑フベキニ非ズ。別爾那兒度ベルナル名ノ治黴秘方ハ。阿片ト亞爾加里トヲ以テ製スル者ニシテ。其功亦著シ。予ガ親驗スル所。及諸家ノ驗說ニ據テ考フルニ。汞ノ特異黴毒ヲ殺スノ力ハ。阿片ノ能得テ代ルベキ所ニ非ズト雖。黴毒ニ因テ發スル所ノ諸症。生體ノ抗拒。及病毒ノ分利ト排泄トハ。阿片ノ力ヲ以テ能クコレヲ催進調理スルヲ得ルナリ。傳染ノ第二期。炊衝ノ狀除キテ後。阿片ヲ加ヘ用井テ。著ク汞ノ力ヲ強進スルヲ得ルハ。予ガ屢驗スル所ナリ。經久黴毒。特ニ屢汞ヲ誤用シテ變性セル者ニ於テハ。阿



片ニ昇汞ヲ伍シ用井テ峻功アル。迴ニ單昇汞ヲ用井ルニ勝レリ。此時ニ於テ昇汞ヲ用井ムト欲セバ阿片實ニ缺クベカラザル者ニシテ。啻ニ汞ノ調和藥タルノミナラズ。更ニ汞ノ一大助藥タリ。コレニ因テ啻ニ此苛厲ノ礦ノ力ナル胃中灼熱。胃瘵。惡心。疝痛。下利等ノ危症ヲ防グベキノミナラズ。大ニ汞ノ黴毒ヲ揮散驅除スルノ功カヲ增加シ。特ニ毒ヲ再育スルノ機ヲ滅盡スベシ。是此症ヲ療スルノ正鵠ナリ。又兼子テ阿片ノ皮表ニ導達スルカ大ニ利アリ。此功ハ汞ニハ全ク無キ所ニシテ。特ニ衰弱遲鈍ノ患者ニ於テ。能有

利ノ發汗分利ノ泌別ヲ致ス所ナリ。ハ新發ノ黴毒阿片ノ此功ヲ詳明シ。且其應用ヲ理會セシメムカ為ニ予今此ニ此病ノ然ク變性隱伏セル狀態ノ内情ヲ辨說セザルヲ得ズ。此症ハ則世人或ハ經久黴毒ト名ヅケ。或ハ變性黴毒假扮黴毒等ト名ヅケ。又續發黴毒或ハ第二黴毒ト名ヅクル者ニシテ。近世最多ク。且幾多ノ人ヲシテ。其生ヲ苦マシムル所ノ者ナリ。蓋此症常ニ同一ノ性ナルニ非ズ。屢甚異ナル者アリ。第一其毒尚現存スルト毒ヲ再育スルカノミ存スルトヲ。辨識スルヲ要トス。



毒已ニ殲キテ而シテ毒ヲ再育スルカノミ生體ニ存  
 スルヲアリ。是微毒ニ承テ用井テ。其諸症纔ニ消スレ  
 バ輒足レリトシ。更ニ連用セズシテ治法尙未完ナル  
 者ニ最多キ所ナリ。○蓋此再育ノ力ハ專ラ神經ノ所有  
 ニシテ。猶諸種各異ノ自然分泌ノゴトシ。○然レバコ  
 レヲ除カムニハ。有力ノ神經藥ヲ必要トシ。特ニ阿片  
 ラ以テ特驗ノ藥トナシ。又承ノ良佐トナスベシ。○或  
 ハ又其毒隱伏蟄睡セル者アリ。是治後經久ニシテ毒  
 再發スル者アルヲ見テ知ルベク。又他ノ諸感ニ比シ  
 テ知ルベシ。即温素ノ如キ。能顯レ或ハ能潛ミテ體中

ニ存スルヲ得。又狂犬毒ノ如キ。數月乃至數年間體  
 中ニ潛伏スルヲ得ルヲ以テコレヲ證スベシ。○此  
 時ニ方テ其揮發鑽透刺衝ノ功ヲ以テ。此睡毒ヲ醒覺  
 興奮シ以テ。分利ノ經營ヲ受ケシムル者ハ。阿片ヲ舍  
 テ何ソヤ。又慢性痙攣アリテ。毒ヲ縛住鎖閉スル者ア  
 リ。此時ニ方テ能ク此痙ヲ除キ。毒ヲシテ發動スルヲ  
 得セシムル者ハ。阿片ヲ舍テ何ゾヤ。  
 又毒已ニ久ヲ經テ。深ク生體ニ侵入シ。恰生體ニ瘡合  
 化同スル者アリ。○此時ニ方テ深ク生體ノ纖細部ニ  
 入り。其ヲシテ遍ク一新ノ抗拒ヲ起サシムル者ハ。阿



片ヲ舍テ何ゾヤ。

更ニ一症アリ。近日最多シ其症ニ於ル其毒已ニ徴ナ  
ラズ。久ク汞ヲ誤用スルニ因テ。其本性ヲ失フト雖未  
完ク殲滅セズ。却テ一個新發ノ病機ヲ生ジ。全ク特異  
ノ惡液トナレル者ナリ。此症別ニ命名ナシ。恐クハ嗣  
生。徴毒トモ命ズベシ。此症單ニ汞ノミヲ以テハ。已復  
治スベカラサル者ナリ。或ハ又過量無法ニ汞ヲ用井  
ルニ因テ。患者實ニ汞毒ヲ得ル者アリ。右ノ諸症ニ於  
テハ。阿片ノ興奮鑽徹シテ。分利ヲ進メ。特ニ皮表ノ分  
利ヲ催進スルノ力必當ナリ。

右説ク所ノ各異諸症。其見徴ニ至テハ。蓋屢辨シ難ク。  
或ハ全ク辨スベカラザルナリ。故ニ尋常コレヲ統  
稱シテ續發徴毒。或ハ變性徴毒トイフ。然レモ是等ノ  
症。塗擦法。吐涎法。共ニ功ナキ者ニ於テ。昇汞ニ阿片ヲ  
加ヘ用井テ全治スルナリ。予ガ屢親驗スル  
所ナリ。

若夫其病果シテ汞病ナルハ。汞能コレヲ治スルナ  
ラ得サルベシ。又コレヲ以テ其汞病ナルナリ。察知ス  
ヘシ。此ニハ唯硫黃能全治ヲ遂グルナリ。但  
阿片ハ又其良佐トナスベシ。



是ニ由テ。予又阿片理家毒按ニ即上ニ所謂死毒ニテ專ラ金石ノ毒ヲ謂フヲ解スルノカラ擧ゲザルヲ得ス。理家毒トハ特ニ礦性ノ毒ニシテ。汞毒。鉛毒及砒毒ヲ謂フナリ。凡是等ノ毒。已ニ局處按ニ腸ニニカラ奮テ後第二道ナル血管全系ニ遷移スルハ。阿片ヲ以テ隊長トナスベシ。鉛毒ニ於テハ先第一道ヲ掃滌シテ後阿片ヲ以テ主藥トナスハ世ニ知ル所ナリ。又慢性ノ汞毒砒毒ニ於ルモ亦同。但此ニハ舍密化調ノ大藥ナル硫黃ヲ兼用スルヲ要トス。又阿片流涎ヲ防グイカ。其理蓋亦此ニ基ク。此力ニ由テ汞ニ伍用シテ能流涎ヲ預防シ。又其已ニ來

レル者ヲ治ス。但此力ハ其理又其皮表ニ導達シ汗ヲ發シ。コレニ由テ誘導對衝スルノ能ニ關ルトアリ。即次條ニコレヲ辨明スベシ。蝮蛇咬等ノ動物毒ニ阿片ノ功アルハ亦專。其速ニ汗ヲ發シ。分利ヲ起スニ由ル。

分利 使皮膚活發

皮膚ノ全系ニ分利ヲ進メ活發セシメ其病性ノ泌別ヲ起サシムルハ實ニ阿片ノ特異秀拔ノ力ナリ。此力ハ次ノ二症ニ於テ最彰明ナリ。

其一ハ痘ナリ。若夫惡性神經性痘見點後第五日或ハ



第六日三於テ釀膿成ラズ却テ水様稀膿ニ變セムト  
欲シ。痘實セズ。或ハ惡色ニシテ寒壞疽ニ陷ラムトシ。  
生力沈衰シ。窒扶斯性熱甚シキ氏ハ其痘ノ釀膿ヲ進  
メ。分利ヲ完成シ。以テ患者ヲ救フニ於テハ其功阿片  
ヨリ峻ナルハナシ。是予ガ少壯ノ時屢實驗セル所ナ  
リ。持ニ多ク千七百八十六年天明「ウエイマル」地名ニ流  
行セル惡性痘ニ於テ試驗セリ。○蓋此ニハ阿片二般  
ノ能ヲ以テ能其勲ヲ致ス者ナリ。即一ハ其鎮靖ノ能  
ヲ以テ。全身皮膚ノ痛楚。患者ヲシテ衰憊セシムル者  
ヲ除キ。一ハ其興奮ノ能ヲ以テ。其既ニ半ハ死セルノ

皮膚ニ。有力ノ分利機ヲ催進スルニ在リ。○其二ハ寒  
壞疽ナリ。特ニ老人ノ皮膚ニ局發シテ。前發ノ焮衝ナ  
キ死壞ナリ。此症ハ單ニ造育ノ生力不足ナルニ因ス  
ル者ニシテ。諸ノ試驗ニ由ルニ。阿片實ニ無二ノ救藥  
ナリ。  
阿片ニ釀膿ヲ進メ。良膿ヲ造成スル異功アリ。故ニ凡  
膿ヲ進ムベキ諸症ニコレヲ用井テ大利アリ。  
但阿片ヲ用井テ。啻汗ヲ發スルノミナラズ。形狀不定  
ノ疹ヲ發シ。特ニ粟疹狀ノ疹ヲ發シ。以テ分利ニ至ル  
トアリ。特ニ隱伏依窩篤アル患者ニ於テ。予屢驗スル



所ナリ。是慢性諸病。特ニ神經病ニ於テ宜ク注意スベキノ要件ナリ。凡、神經諸病。尋常見テ無形ノ因ヨリ發スト為ス者。却テ有形ノ因ニシテ。病毒神經ニ固著シ。其整齊ノ機能ヲ妨グルニ因テ發スル者多ケレバナリ。今一例ヲ舉グ餘ハ類推スベシ。

一男子歳壯。六年来。膝痛ニ罹リテ蹇跛ス。偶、刺ヲ患ヒテ阿片ヲ用井ザルヲ得ザルニ至ル。已ニシテ強ク發汗シ。全身ニ疹ヲ發シ。膝疾隨テ除キ。爾後行歩常ニ復スルヲ得タリ。○此症蓋、癩麻質毒ノ膝ニ轉セル者ニシテ。此毒阿片ニ因テ誘動セラレ。疹トナリテ皮膚ヨリ分利シ去レル者ナリ。

異常組織

諸種ノ外部瘰肉ニ於テ阿片ノ功亦甚偉ナリ。特ニ腔内瘰肉。鼻痔。聽道瘰肉等ニ久ク外敷スレバ。漸ニシテ凋萎シ。遂ニ全治スルニ至ル。蓋、此局處ノ治力ハ。醫宜ク諸種ノ類症ニ試用スベキ所ナリ。

姑息之能

阿片姑息ノ能力ハ常ニコレヲ副能ト為スト雖、屢本事トナルヲアリテ。然、モ其力他ノ諸麻藥ニ超絶ス。今コレヲ說テ以テ此篇ヲ終ヘムトス。○何ヲカ姑息ノ

異常組織 姑息之能 五十四



能ト謂フ苦痛ヲ軟和シ意思ヲ鎮靖興奮シ且死ヲ輕易ニスルノ能是ナリ。○夫不治必死ノ症ニ於テハ生命實ニ痛苦ノ羈絆ニシテ其死スルニ方ッテモ尚且幾多ノ苦ヲ受クルヲ免レザル者多シ。此時ニ於テハ阿片ノ此一能亦多トスルニ足レリ。況ヤ其生ヲ勸慰スルヲ。阿片ニ如ク者ナキニ於テヤ。○故ニ予ハ謂ヘラク。阿片假令更ニ一個ノ他能ナキモ。此一事實ニ天ノ貴賚ト稱スルニ足ルト。○  
 千百ノ醫藥中。痛苦ヲ鎮メ。然モ久クコレヲ消除セシムルヲ。阿片ノ如キ者ハアラズ。予ガ療スル所ノ患者。

宵ニ阿片ヲ服シ。詰且ニ至テ全ク症ヲ改メ。言語態容ヲ一新スル者。予ガ驗スル所嘗ニ百回ノミナラズ。而シテ其功持留スルヲ。常ニ一晝夜ニ至ル。  
 予今其症ノ一二ヲ舉ゲムニ。肺勞ノ患者。已ニ其回生ニ望ナク。煩悶ト大氣ノ缺損ニ因テ。漸消耗スルガ如キ。不治ノ癩病。日夜痛楚ヲ受クルガ如キ。胸水ノ患者。久ク死悶ヲ受クルガ如キ等是ナリ。○此症ニ遇テハ。阿片ナクンバ誰カ醫タルヲ願ハムヤ。此ノ如キ患者。阿片ニ因テ其狂迷ヲ免ル者。幾許ナルヲ知ラズ。蓋阿片ノコレヲ救フハ。嘗ニ其身體ノ痛楚ヲ除ク



ノミニアラズ。更ニ精神ニ一異ノカタヲ與ヘ且ツコレヲ  
弊起シテ自安息セシムルニ在リ。

此鎮靖ノカ最昭然タルハ其險症ニ於テ死ヲ易クシ。  
令終ヲ得セシムルニ在リ。若夫醫已ニ其命緒ヲ繫ク  
一能ハザルニ至テハ。此一事實ニ亦醫ノ仁術ニシテ  
且其好福ナリ。此時ニ方テハ阿片膏ニ將死ノ痛苦ヲ  
除ク人ニ至ナラズ。更ニ死スベキノ勇トカトヲ與ヘ其  
意思ヲシテ魂魄歸スル所アルノ理ニ安ンゼシム。  
予ガ實驗スル所固ヨリ多シト雖。今此ニ近日驗スル  
所ノ一症ヲ舉ゲテ他ヲ類推セシム。

一男子。已ニ久ク胸病ニ罹リ。肺ニ膿囊ヲ生ジ。正ニ死  
ニ瀕セリ。將死ノ苦悶極メテ劇ク。窒塞ノ恐休ハ時ト  
ク。遂ニ真ノ狂迷ニ陥リ。其狀態殆傍觀スルニ堪ヘザ  
ルニ至ル。○乃其午牌ヨリ。每一小時ニ阿片半匁ヲ服  
セシム。三小時ノ後患者安息シ。二匁ヲ服シテ後睡ニ  
就キ。數時間安眠シ。詰旦睡醒メテ意思爽快。痛ナク悶  
ナク。精神又強壯鎮靖シ。其親眷ニ向テ徐ニ別ヲ告ゲ。  
更ニ己ノ福ヲ語り。又幾多ノ良戒ヲ遺シ。而シテ再睡  
ニ就キ。睡中ニ生ヲ畢ハレリ。

危害



阿片ノ危害ニ於テハ。予更ニ此ニ一言セザルコトヲ得  
 ズ。嘆スベシ其危害甚大ニシテ。阿片ノ世ニ害アル其  
 世ニ利アルト未以テ大小ヲ定ムベカラズ。然レモ是  
 刺絡ニ於ルモ火藥ニ於ルモ亦然リ。凡<sup>ッ</sup>天地間ノ大威  
 大カアル者。皆然ラザルハナシ。譬ヘバ火ノ如シ。凡<sup>ッ</sup>物  
 世ニ利スルノ力愈大ナレバ。其世ニ害スルノ力亦愈  
 大ナリ。豈其誤用ノ害アルヲ以テ。コレヲ無キニ如カ  
 スト謂フベケムヤ。  
 其危険ノ第一最大ナル者ハ。其殄殺ノ力ニアラズシ  
 テ。却テ其誑誘ノ力ニアリ。○阿片ヲ多量ニ服スレバ。

疼痛煩悶。痙攣及其他ノ苦惱等。實ニ良能救援ヲ呼喚  
 スル所ノ音容ナル者ヲ鎮靖シ。更ニ意志ヲ強クシ。想  
 像ヲ盛ニシ。精神ヲ勇壯ナラシメ。コレニ由テ患者ト  
 醫ト共ニ其真状ヲ察スルコトヲ得ズ。又其危篤ヲ悟ル  
 コトヲ得ズシテ。輕忽ニ望ヲ養ヒ。是ヲ以テ有カノ救援  
 必<sup>ト</sup>須ニシテ。尚<sup>ホ</sup>其濟ルヲ希フベキノ時。日ヲ錯過スル  
 ニ至ル。  
 其第二ノ危険ハ。則卒厥狀ノ腦患ナリ。○此害特ニ一  
 歳ノ小兒ニ於テ最大ナリ。予今阿片ヲ禁戒セムト欲  
 スルモ。筆其意ヲ盡スコト能ハズ。此ニハ一滴ノ阿片液。



已ニ過強ノ量トナスベシ。只危篤ノ極。必須ノ症。譬へ  
 バ大瀉下。精カヲ耗竭スル者ノ如キ。始メテ阿片ヲ與  
 フベシ。但、仍灌腸藥トナスヲ以テ勝レリトス。若夫内  
 服ニハ。一滴ヲ砂糖ニ研和シ。四分シテ其一ヲ與フル  
 ヲ以テ適量トス。

其第三ハ。陽性焮衝ニ於テ焮衝ヲ増進シ。膿潰ヲ促シ  
 或ハ寒壞疽ニ變セシムルニ在リ。

其第四ハ。胃腸ノ汚物ヲ澁閉シ。腹部諸臟ノ閉塞硬結  
 ヲ致シ。且門脈系ニ血ノ蓄積ヲ増加スルニ在リ。

其第五ハ。血ノ溶解腐敗ヲ増進シ。崩汗ヲ促シ。粟疹紫  
 斑。驚口瘡ヲ起スニ在リ。諸熱病ニ於テ投施時ニ適ハ

ズ。或ハ其量過大。或ハ其服用過久ナレバ。此害ヲ招キ  
 易シ。特ニ腸胃熱ニ於テハ最然リ。

其第六ハ。習慣ニ在リ。○凡經久病。阿片ヲ連用スレバ。  
 終ニコレニ習慣シテ。常日ノ必須トナリ。病已ニ治ス

ルノ後モ。仍<sup>ホ</sup>全身ノ覺機ヲ興奮シテ。健康活發ノ度ニ  
 至ラシメ。以テ形體ト精神トヲシテ。日用ニ足ラシム

ルガ為ニ。不缺ノ要藥トナルニ至ル。猶燒酒家ノ終  
 ニ燒酒ニ習慣シテ。日常ノ必須トナルニ至ルガゴト

シ。而シテ其由テ致ス所ハ。則毎ニ其量ヲ加フルニア  
 齊三三六



リ。是所謂阿片癖ニシテ。全ク耽飲ノ癖ニ同。而シテ其  
 所發ノ症ハ則神經ノ衰弱常ニ増加シ。諸部振戰シ。消  
 食カト補給カト共ニ廢絶シ。終ニ振惕譫妄ヲ發シ。神  
 識五神共ニ遲鈍シ。出血ヲ發シ。血溶解シ。勞瘵ヲ致ス  
 等ナリ。

其第六ノ腎虧ニ至ル。○凡ク入寐時ノ不安定ハ此ノ  
 長ク林ニ眼胃熱ニ外マハ最然ル  
 大庭ハ其量過大也ハ其眼眼盛入ヤノハ此害ヲ味チ  
 濟生三方卷中終ニ至ル結續ニ外マ外此部ニ至ルハ

濟生三方卷下

若狹

杉田信成卿

譯

吐藥第三

依ト加得曰。シク井ト。モヘン。ゴム。エスト。モ一ハ。

夫吐藥ヲ説クハ。即天為ノ醫藥ヲ説クナリ。○夫吐ハ  
 常有ノ一症ニシテ。良能コレニ因テ病状ノ初候ヲ現  
 ス所ナリ。又吐ハ最要ノ自然機ニシテ。病初病間良能  
 コレニ因テ屢病ヲ除ク所ノ者ナリ。  
 然リト雖。其症狀最猛烈ニシテ。且最自然ニ反戾セル



機能ノ一ニシテ。全ク逆ナル一事。常ニ入ル、ノ門口ヨリ出スナリ。宛是生體ノ地震ニシテ。猶無機性界ニ火山ノ迸裂アルガゴトシ。

生體ノ最内神經交感ノ中心。又兼子テ生體補給機ノ中央第一貴要ノ門口。廢物方ニ我ニ化成シ我生ノ初徴ヲ受クル外處ニ於テ。一個ノ顛覆ヲ發ス。即是搐掣狀ノ震動ニシテ。横膈及呼吸諸器ニ猛劇搐掣ノ運動ヲ起シ。又機性生活ノ中心ナル心臟ヲ侵襲シ。神經ノ全系ニ透徹シテ其最末ニマデ至リ。又覺機ノ中心ナル精神ニ徹シテ。嘔ト名ツクル所ノ一種新發唯此時

ニノ顯レ。特異固有ニシテ痛マズ。然レ氏痛ニ比スレバ更ニ苦悶ニシテ。饑狀ニ類シ。却テ饑ノ反對ナル感動ヲ覺エシメ。尚且知覺敏銳ナル人ニ在テハ。劇キ神經諸症昏倒。冷汗。痙攣。搐掣等ヲ發ス。而シテ兼テ一個ノ泄出ヲ起シ。啻ニ胃中有ル所ノ物ノミナラズ。更ニ又遠隔部ノ物ヲ泄出シ。且諸他部ノ分泌ヲ催進シ。肝皮膚腸ノ内面。氣管及腎ノ分泌ヲ催進ス。夫此ノ如キノ妙機古ヨリ醫ヲシテ注意セシムベキノ一事ナリ。乃古昔ヨリ醫家コレヲ知り。且コレヲ催起シテ。醫術ノ要藥トナセシナリ。



古昔ハ吐藥ノ益ト用トラ説クニ。只水法器學ノ理ヲ以テ推究セシガ。千七百年間我元祿ヨリ政ニ至ル頃寬九盧連秩卒突ト悉シ喝カ歇ハ魯ル斯突ト魯ル等共ニ名ニ出デ、其功カヲ説クニ。多ク第ナ那カ密シ以按ニ舍密及器學等ノ如キ普通ノ理學ヲ辨明スベカラザル妙機ヲ云温光生等ノ區域ニ共ニ屬ス第那ノ理ヲ以テシ。瘵ヲ鎮メ。機能ヲ變換シ。熱毒ヲ除キ。膽液分泌ヲ匡正スル藥トシ用井夕リ。然ルニ不幸ニシテ其使用。度ニ過ギタリ。是ニ於テ腸胃家カノストリノ世トナレル。ヤハ入ニ去テハ陳次テ貌樂運名出テ、ヨリ。其門徒皆吐藥ノ用ヲ全ク廢シ。唯過食ノ後。汚物胃ニ存在スル症ノミニ用井夕

リ。又總テ吐藥ハ只減衰ノ能アリト謂ヘリ。ヤハ其由嗚呼人ノ一端ニ偏シ易ク。改革ヲ好ミ。且扞格ヲ好ミ。特ニ實驗ヲ卑視スルヨリ。醫術其良藥ノ一ヲ失フニ至ル。歎ゼザルベケムヤ。又水法器學ノ説ヲ辨駁シテ。コレニ抵敵スルノ門流ナルニ。却テ吐藥ヲ以テ單ニ水法ノ理ニ本ヅケル泄藥トナシ。自學一等ヲ進ムト謂ヒテ。却テ太隘ニ陷ルニ至ル。豈怪マザルベケムヤ。右ノ流弊ヨリ。凡ツ吐藥ヲ説ク者ハ。皆コレヲ腸胃家ノ流トシ。其説ヲ以テ。粗朴ニシテ學醫ノ取ルベカラザ



ル所トナスニ至ル。却テ知ラズ。斯突魯<sup>名</sup>ノ如キ者。既ニ腸胃家流ノ法ニ於テ。單ニ泄出ノミヲ以テ基本トナサミルヲ。又知ラズ。幾多伶俐ノ腸胃家。其泄藥ヲ用井ルニ當テ。器學ノ目的ヲ捨テ、多ク第那密ノ能ヲ達セシムルヲ。而シテ且其良能ヲ察知スルニ於テハ。却テ其腸胃家ヲ憫歎スル所ノ興奮說家ヨリモ實ニ卓越ナルヲ。又本器學ノ能ハ。勝テ世人再吐藥ノ用ヲ叙ムル。夫而シテ真終ニ偽ニ勝テ。世人再吐藥ノ用ヲ叙ムル。猶刺絡ニ於ルガゴトシ。然レモ又他ノ一端ニ偏シテ。吐藥ヲ視テ其能專第那密ニ原ヅク者トナシ。其泄

出ノ能ヲ算セズ。以テ單ニ神經刺衝藥トナシ。コレヲ誤用スルニ至レリ。而シテ當今ハ下ノ二流共ニ吐藥ヲ廢セリ。其一ハ則貌樓賽斯<sup>名</sup>ノ流ニシテ。只焮衝ヲ準視シ。偏ニ放血ヲ主トス。其二ハ則哈溼滿<sup>名</sup>ノ忽没<sup>モ</sup>越阿巴智<sup>名</sup>醫流ニシテ。只時ヲ待ツヲ主トシ。諸有力ノ藥ヲ棄擲ス。此二流共ニ吐藥ノ施用ヲ以テ。良能ヲ妨グル者トナシ。或ハ最危ノ藥トナシテ。コレヲ禁戒セリ。是ニ於テ當今ハ此ニハ只試驗ニ本ヅキテ吐藥ヲ施シ。屢過量ニコレヲ投シ。彼ニハ全ク之ヲ廢シテ無用トシ。危險トシ棄擲シテ用井ズ。豈驚異スベキノ醫



風ナラズヤ。

自註ニ曰。今ヲ距ル一久カラズ。一名家ノ説ニ。凡吐藥ハ毒ヲ服スルノ後ヨリ外。與フベカラズト言ヘリ。

予三十五年前言ヘル一アリ。是當今ニ在テモ尚悲ムベキノ一事ナルヲ以テ。今再此ニコレヲ舉ゲザルベシト得ズ。其主イハ其二ハ。因テ人聞悲夫。古賢ノ試験ニ由テ確定セル療法。今少年經驗ナキ輩ノ筆端ニ由テ非斥セラレ。コレニ因テ人聞久ク良藥ヲ失フニ至ル一。吾輩此時ニ方テ豈黙止

スベケムヤ。宜ク彼此ノ家言ニ偏スル一ナクシテ。大聲ニ其謬誤ヲ辨明シ。多年來良能己ニ示セル所ノ真理ヲ説示スベシ。是造化ノ臣タル職ニ背カサル所ナリ。○凡文學ノ世ニ於テ舊弊ヲ一洗セムニハ。必劇キ顛覆ナキ一ヲ得ズト雖。若夫人間従前所定ノ真理。コレト共ニ埋没セムトスルニ至テハ。宜クコレヲ風濤ノ中ヨリ援ヒ。以テ後世ニ傳ヘ。後ノ人ヲシテ。再新ニコレヲ探索スル一ヲ免レシムベシ。

嗚呼蒼天吾ヲシテ學館ノ僻巷迷路ニ落ル一ナク。吾



術ノ定理ヲ錯ラシムル一カレ。

夫世人ノ誤。全ク吐藥ノ功ヲ偏視スルニ在リ。即甲ハ吐藥ヲ視テ單ニ有形ノ物ヲ泄スノ藥トナシ。乙ハ則單ニ刺衝興奮ノ藥ト謂フニ在リ。蓋此二說宜ク併セ取テ以テ始メテ完成ノ理ヲ得ベキ所ナリ。是豈帝ニ吐藥ニ於テノミ然ラハヤ。凡醫治ノ間病因ヲ原究シ。藥能ヲ辨明スルニ方テ。常ニ兩端ノ中ヲ取ルベキ一極メテ多シ。乃予ハ醫治ノ說ニ於テ。常ニコレヲ以テ律トナセシナリ。故ニ今考索ヲ措キ。實驗ニ就テ。先吐藥ノ功理ヲ論明

シ。次ニ又經驗ニ據テ。其主治ヲ舉ゲ。特ニ施用ノ基本タルベキ徵候ヲ列示シ。次ニ吐藥適應ノ諸症。必當ノ諸症。無二ノ救生藥タル所ノ諸症ヲ舉ゲ。更ニ吐藥有害ノ諸症。殄殺ノ毒物トナルベキ諸症ヲ開載シ。而シテ後施用ノ適法。吐ヲ起スノ術ヲ論明ス。蓋其係ル所少小ナラズ。

功理

吐藥ノ功二般アリ。曰局發曰汎發是ナリ。

其一局發之功

局發ノ功又二般アリ。一ハ則泄出。一ハ則神經ヲ刺衝



シ良能ヲ變換スル是ナリ。○其泄出ノ功ヲ論セバ。則  
 此藥帝ニ胃中存在スル所ノ物ヲ泄シ去ルノミナラ  
 ズ。又十二指腸中有ル所ノ物ヲ泄シ。其力更ニ膽胞膽  
 道及肝ニ及デ。其内含蓄スル所ノ膽汁。一ハ刺衝ニ由  
 リ一ハ壓搾ニ由テ胃中ニ流出ス。然レバ其泄出ハ固  
 ヲリ下藥ヲ以テ得ベカラザル所ニシテ。又吐藥ノ特  
 ニ膽液病ニ偉勲アル所ナリ。豈帝是ノミナラムヤ吐  
 藥泄出ノ力又肺ト氣道トニ達ス。夫吐ノ劇キ振動ニ  
 ヲリ。且コレニ兼子タル横膈及肋筋ノ痙性收縮ニヨ  
 リテ。氣道ニ積滯セル粘液膿或ハ淋發ノ凝固物。恰壓

搾セラル。ガ如ク泄出シ去リ。コレニ因テ肺大ニ鬱  
 滯ヲ免レ。或ハ患者コレニ因テ其死ヲ免ル。一アル  
 ニ至ル。コレ我輩幼兒ノ胸腔粘液。呼吸室塞。格樓痲肺  
 勞等ニ於テ屢親驗スル所ナリ。又吐藥ヲ以テハ帝ニ  
 有形ノ物。粘液。膽汁。汚物等ヲ泄スノミナラズ。纖微ノ  
 病毒コレニ因テ泄出スル。一ヲ得ルナリ。是傳深熱ノ  
 初期ニ於ル吐藥ノ功カラ見テ知ルベシ。  
 而シテ其局處ノ神經ヲ刺衝スル能亦貴重ナル。一泄  
 出ノ能ニ減セズ。此能ニ由テ胃肝及近傍ノ神經太陽  
 叢ノ全系ノ機能ヲ變換シ。其部ノ痙樣ノ状態ヲ除キ。



其分泌ヲ改メテ。康平ニ復セシム。吐藥ノ帝ニ其存在  
セル膽汁粘液。酸液等ヲ泄スノミナラズ。兼子テ又其  
再生ヲ防ギ。汚物ノ来源ヲ塞グハ。正ニ此能ニ因ルナ  
リ。

其二汎發之功

此功ハ胃神經及上腹神經ノ交感ニ在リ。而シテ此神  
經他人神經全系ト交感スルヲ甚遠ク且大ナルヲ以  
テ。此功又甚貴重ニシテ。能諸系ニ透徹スルヲ得ル  
ナリ。此功コレヲ分テ三様トス。曰興奮曰誘導對衝  
瘕曰分泌。及収ヲ催進スル是ナリ。

其興奮ノ功ハ。特ニ肺ト心トノ機ヲ直ニ奮起スルニ  
在リ。是假死ノ症狀及麻痺。卒厥及窒塞腦麻痺等ニ用  
井テ能。生活ヲ喚起スル所ナリ。

其對衝ノ功。即對衝誘導鎮瘕ノ能。亦特拔顯著ノ者ナ  
リ。蓋其對衝スル部ノ貴重ナルト腦ニ次ギ。生體ノ諸  
部ト交感スル神經節系ノ中心ナルヲ以テ。生體ノ各  
部其感應ヲ受ケザル處ナキニ因ルガ故ナリ。然レバ  
吐藥ハ諸種ノ瘕攣ニ用井テ鎮瘕ノ貴藥ナリ。即顛癩  
間歇熱。瘕喘息。百日咳等ニ於ルガ如シ。特ニ諸種ノ精  
神病。其因罷勞ニ由ル者ニ於テ偉功アリ。或ハ輕量ニ



施スキモ尚能非常ノ妙功ヲ呈ス一多シ。其分泌ヲ催ス能ハ皮膚ノ機ヲ催進スルニ於テ最著シ。其儂麻質病發疹病ヲ除クノ功ハ是ニヨルナリ。又腎氣管唾腺ノ分泌ヲ増進ス。而シテ更ニ水脈ノ吸収ヲ催進スル功アリ。亦以テ小ナリトスベカラズ。是水腫ヲ治シ。關節水腫陰囊水腫ヲ祛キ。又局處ノ蓄水ヲ分消スルノ勲ヲ以テ見ルベシ。

主治 禁忌

其主治ノ最ナル者ハ「ホミ」云々。ホミ云々。キュラ云々ニシテ。且依<sup>ホ</sup>ト<sup>カ</sup>加<sup>ラ</sup>得<sup>ル</sup>ノ言ナリ。曰「シ」ク井ド。モヘン云々。エス

トモ一へ。譯シテコレヲ言ハシ。良能若有害ノ物ヲ泄サムガ為ニ吐ヲ欲シ吐ヲ催シ或ハ已ニ吐ヲ起ス片ハ即是吐藥ノ主治ニシテコンヲ催進スルハ醫ノ要務ナリ。若夫急ラバ罪ナシト謂フベカラズ。但宜ノ輕慢ニ看過スベカラズ。良能ノ吐ヲ欲スル故ハ其因實ニ汚物胃ニ聚ルニ由ルヲ察スベシ。是所謂汚物上逆ナリ。其候ハ則兼子テ汚物積滯ノ徵アルヲ以テ知ルベシ。故ニ吐藥ハ唯此兼併ノ徵アル片ノミ用井ルベシトス。

何トナレバ則吐ヲ欲シ或ハ吐スル者。其因汚物ノ積



滯ニ關カラザル一多シ。或ハ胃ニ燃衝性ノ症アリテ。其刺衝機亢進スルニ因リ。或ハ神經性ニシテ其覺機亢進スルニ因リ。或ハ唯交感ノ胃症ニシテ。其吐ヲ欲セシムルノ刺衝胃中ニ在ラズシテ却テ遠隔ノ部ニ在ル一多シ。譬ヘバ吐ノ因。肝。脾。膝。腎腎中腦水。腦ニ結石腦振動在ル者ノコトシ。

是等ノ諸症ニ於テハ。吐藥無用ニ屬スルノミナラス。或ハ患害ヲ致ス。特ニ胃燃衝ニ於ルガ如キハ。吐藥殄殺ノ毒トナルナリ。右主治ノ外。尚次ヲ視的ヲ以テ吐藥ヲ施スベキ一ア

リ即單ニ有力ノ神經藥トシテ興奮誘導ノタメ。及分利吸收ヲ促スタメニ。精神錯亂。痙攣。痲質等ニ用井ルガ如シ。但別ニ吐藥禁忌ノ症アル者ニハ施スベカラザルハ固ヨリ論ナシ。

吐藥ノ禁忌ハ燃衝ナリ。特ニ胃燃衝ヲ最甚シトス。此症ニ與フレバ。吐藥正ニ毒トナリテ直ニ患者ヲ殺スベシ。又噎ニ胃燃衝ノミナラズ。其他各臟ノ真燃衝亦吐藥ノ禁忌トナス。其故ハ吐藥ハ單ニ燃衝ノ刺衝ヲ増シ。其ヲシテ危險ニ進マシムルヲ以テナリ。然レモ予願クハ看者注意セム一ヲ。予カ説ク所ノ者ハ真燃



衝ナリ。何トナレバ諸般ノ焮衝様症。必シモ皆吐藥ヲ  
 禁スルニ非ズ。特ニ近世謬惑ノ見ヲ以テ。吐藥ヲ廢ス  
 ルガ為ニ。予ハ此ニコレヲ救ハザルコトヲ得ズ。凡胃ノ  
 痙攣ヲ見テ。總テコレヲ焮衝ト名ヅクルハ。是近時ノ  
 通弊ナリ。然レモ胃ノ痙攣。或ハ其痛最甚シキ者モ。其  
 因積滯ノ汚物ニ在ル者ハ。予屢一回ノ吐藥ヲ以テ直  
 ニ掃除スルコトヲ得タリ。又羅斯性ノ焮衝ノ如キハ。吐  
 藥ヲ禁忌セザルノミナラズ。却テ有力ノ藥トナスベ  
 キナリ。然レバ施治ハ律トナスベキハ左ノ如シ。若夫熱劇ク  
 然レバ施治ハ律トナスベキハ左ノ如シ。若夫熱劇ク

舌赤ク且燥キ。渴甚シクシテ。患者胃部ニ熯クガ如キ  
 劇痛ヲ覺エ及嘔下スル者悉吐出スルキハ。吐藥與フ  
 ベカラズ。是真ノ胃焮衝ノ候ナリ。  
 右禁忌ノ外更ニ一症アリ。大便閉止コレナリ。此症ア  
 ル者ハ吐藥與フベカラズ。其故ハ此症ニハ吐藥帝劇  
 甚ノ運動ヲ起シ。却テ痙攣ヲ興奮シ。頭ト胸トニ危險  
 ノ血積ヲ致シ易キノミナラズ。更ニ便閉ヲ増進シ。且  
 絶エス及戻ノ蠕動機ヲ起シ。或ハ吐糞ヲ發セシムベ  
 キヲ以テナリ。然レバ此症アル者ニハ。吐藥ヲ用井ル  
 ノ前。豫先灌腸法ヲ以テ。瀉下ヲ取ルベキナリ。



更ニ貌<sup>ブ</sup>癡<sup>ク</sup>窟<sup>ク</sup>妊<sup>レ</sup>娠<sup>ニ</sup>。經<sup>レ</sup>期<sup>アリ</sup>。通<sup>レ</sup>常<sup>以テ</sup>吐<sup>レ</sup>藥<sup>ノ</sup>禁<sup>忌トナ</sup>ス。予ハ則<sup>レ</sup>謂<sup>ヘラク</sup>。此<sup>レ</sup>症<sup>ニ</sup>逢<sup>テハ</sup>。先<sup>ッ</sup>緩<sup>下</sup>藥<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>其<sup>レ</sup>治<sup>ノ</sup>能<sup>否ヲ</sup>試<sup>ミ</sup>。以<sup>テ</sup>吐<sup>レ</sup>藥<sup>ヲ</sup>姑<sup>閣</sup>スルハ可<sup>ナリ</sup>。然<sup>レ</sup>モ若<sup>ク</sup>其<sup>レ</sup>症<sup>劇</sup>甚<sup>ニシテ</sup>。患<sup>者ノ</sup>生<sup>命一</sup>吐<sup>レ</sup>藥<sup>ニ</sup>係<sup>ル</sup>片<sup>ハ</sup>。是<sup>レ</sup>最<sup>大ノ</sup>危<sup>險ナリ</sup>。以<sup>テ</sup>最<sup>難ノ</sup>事<sup>ヲ</sup>權<sup>スルニ</sup>足<sup>ル</sup>。何<sup>ゾ</sup>吐<sup>レ</sup>藥<sup>ヲ</sup>止<sup>ム</sup>ベ<sup>ケム</sup>ヤ。又<sup>モ</sup>貌<sup>ブ</sup>癡<sup>ク</sup>窟<sup>ク</sup>ノ如<sup>キハ</sup>精<sup>好ノ</sup>貌<sup>ヲ</sup>。癡<sup>窟</sup>帶<sup>ヲ</sup>施<sup>シ</sup>。且<sup>ツ</sup>吐<sup>ニ</sup>臨<sup>テ</sup>手<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>コ<sup>レ</sup>ヲ扶<sup>持</sup>スル<sup>ル</sup>。片<sup>ハ</sup>腸<sup>ノ</sup>大<sup>ニ</sup>脱<sup>出</sup>スル<sup>ヲ</sup>防<sup>ク</sup>テ足<sup>ル</sup>ベ<sup>シ</sup>。予<sup>更ニ</sup>此<sup>ニ</sup>一<sup>戒ヲ</sup>加<sup>フ</sup>。凡<sup>ク</sup>怒<sup>ニ</sup>由<sup>テ</sup>劇<sup>ク</sup>。精<sup>神ヲ</sup>興<sup>奮</sup>ス<sup>ル</sup>者<sup>ハ</sup>直<sup>ニ</sup>吐<sup>レ</sup>藥<sup>ヲ</sup>用<sup>井</sup>ル<sup>ヲ</sup>勿<sup>レ</sup>更<sup>ニ</sup>膽<sup>汁ノ</sup>沸<sup>溢</sup>ヲ進<sup>ム</sup>ベ<sup>シ</sup>。○此<sup>レ</sup>時<sup>ニ</sup>吐<sup>レ</sup>藥<sup>ヲ</sup>用<sup>井</sup>レ<sup>バ</sup>。極<sup>メテ</sup>危<sup>險ノ</sup>症<sup>ヲ</sup>發<sup>ス</sup>。宜<sup>ク</sup>先<sup>ッ</sup>清<sup>涼</sup>鎮<sup>靖</sup>ノ藥<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>コ<sup>レ</sup>ヲ鎮<sup>靖</sup>シ。而<sup>シテ</sup>劇<sup>キ</sup>神<sup>經ノ</sup>刺<sup>衝</sup>退<sup>テ</sup>後<sup>吐</sup>藥<sup>ヲ</sup>與<sup>フ</sup>ベ<sup>シ</sup>。

起吐之術

幾<sup>多ノ</sup>藥<sup>石ニ</sup>於<sup>テ</sup>。功<sup>力</sup>其<sup>レ</sup>用<sup>法ニ</sup>關<sup>ル</sup>者<sup>吐</sup>藥<sup>ヨリ</sup>甚<sup>多</sup>キ<sup>ハナシ</sup>。吾<sup>輩</sup>屢<sup>聞ク</sup>吐<sup>レ</sup>藥<sup>或ハ</sup>功<sup>ヲ</sup>奏<sup>セズ</sup>。或<sup>ハ</sup>劇<sup>症ヲ</sup>發<sup>スト</sup>。是<sup>ニ</sup>由<sup>テ</sup>此<sup>レ</sup>貴<sup>靈</sup>ノ藥<sup>醫ノ</sup>嫌<sup>疑ヲ</sup>招<sup>クニ</sup>至<sup>ル</sup>。是<sup>レ</sup>益<sup>其</sup>用<sup>法ヲ</sup>詳<sup>識</sup>セ<sup>ザルニ</sup>由<sup>ルナリ</sup>。然<sup>ク</sup>其<sup>レ</sup>功<sup>力</sup>定<sup>度ナキハ</sup>。唯<sup>吐</sup>藥<sup>ヲ</sup>一<sup>次ニ</sup>與<sup>フル</sup>ノ習<sup>ニ</sup>由<sup>ルナリ</sup>。是<sup>レ</sup>往<sup>昔ノ</sup>弊<sup>ニシテ</sup>。今<sup>モ</sup>仍<sup>其</sup>非<sup>ヲ</sup>悟<sup>ラサ</sup>



ル者アリ。夫吐藥ノ功ノ強弱ハ。胃ノ刺衝機ト汚物ノ  
 上逆ニ多少アルニ由ル。而シテ其多少ノ度ハ。豫コレ  
 ヲ量定スベカラズ。是ヲ以テ同量ノ吐藥。一回ハ劇キ  
 抵抗ヲ起シ。一回ハ毫毛抵抗ヲ起ス。ナキナリ。  
 其第一ノ法ハ。則凡吐藥ヲ用井ルニ頓服セシメズ常  
 ニ數服トナシテ用井ルニ在ルナリ。此ノ如クスレバ  
 兩般ノ利アリ。即チ一ハ其初服ノ藥。解凝ノ功ヲ奏シ。汚  
 物ヲシテ泄出シ易カラシメ。一ハ其功カラ精測スル  
 一ヲ得ルヲ以テ。過強過弱ニ失スルノ恐ナキナリ。故  
 ニ其與フベキ全量ヲ四分シテ。四分小時ゴトニ其一

ヲ與ヘ。以テ吐ヲ起スニ至ルベシ。而シテ後待ツ一  
 小時。其間若吐スル一三回ナラザルモ。更既服ノ量  
 ノ一半ヲ與フベシ。○飲液ノ服法又兼子テ緊要ナリ。  
 服後速ニ多量ノ飲液ヲ服スレバ。吐藥ヲ稀解シテ其  
 功ヲ弱クシ。又強ク胃ヲ膨脹シテ吐シ難カラシメ。却  
 テ煩悶ヲ起サシム。故ニ其最良法ハ。初服ノ間嘔ヲ發  
 スル前ニハ。總テ飲液ヲ禁シ。嘔ヲ發スルニ至テ。始メ  
 テ加密列茶一小碗ヲ與ヘ。毎回ノ吐後ニ又一碗ヲ與  
 フベシ。若夫極メテ吐シ難キノ人ニ在テハ。更ニ温湯  
 ニ牛酪少許ヲ加ヘ用井ルヲ要トス。



吐ハ少キモ必三回アルベシ方ニ以テ足レリトス。要スルニ膽液出ヅルヲ以テ限トス。唯是ノミ以テ胃ヲ淨滌セルノ候トナスベシ。

但吐藥ヲ頓服セシムベキ症ニアリ。其一ハ則胃大ニ麻痺セル者。即窒扶斯ノ諸種ニ於ルガ如キ。及精神錯亂粘液過多等ナリ。其二ハ則毒ヲ服スル後ナリ。是速ニコレヲ泄出スルヲ要スルガ故ナリ。其三ハ則下利アル症ナリ。コレ少量ノ吐藥却テ瀉下シ。病ヲ進ムベキヲ恐アレバナリ。三四ヤセヤセカハ更強ク量吐藥ヲ用井ルニ當テ。其量ニ注意スベキノミナラズ。

更ニ其藥ヲ擇ブ。緊要ナリ。其故ハ各種ノ吐藥各其副能アリテ。醫コレヲ注意スルヲ要スレバナリ。吐酒石ハ其鑽透ノカ最強シ。但他ノ礮性諸藥ノ如ク。生體ヲ侵ス。亦最強シ。而シテ兼子テ瀉下ノ功アリ。故ニ麻痺ノ患者。或ハ膠稠ノ粘液。或ハ便秘ノ癖アル人ニ適應ス。而シテ銳敏嬌柔ノ人。及已ニ下利アル症ニハコレヲ禁ス。○伊百加格安那ハ兼子テ鎮靖ノ能アリテ。鑽徹ノカハ弱シ。而シテ又大便ヲ過ム。故ニ銳敏ノ人。痙攣ノ癖アル人。及下利アル症ニ適當ス。○海葱醋蜜ハ粘液ヲ解クノカ最強ク。且輕ク吐ヲ進ム。故ニ



膠稠ノ粘液ニ適應ス。○故ニ予ハ此三品ヲ合用シテ。以テ鎮痙解粘。鑽徹ノ能ヲ併セ。此ヲ以テ彼ヲ助クルヲ最良ノ法トス。即催吐飲ヲ作ルニ次方ノ如ク。以テコレヲ常用ス

伊百加格安那根末 一刃

吐酒石 半ハ

海葱醋蜜

覆盆子舍利別 各四錢

淨水ハ錢

右和シテ四分小時ゴトニ一食匙。小兒ハ一茶匙ヲ

與フ吐スルヲ以テ度トス。

吐藥ヲ應用スルニ方テ。尚注意スベキ一件アリ。適當

ノ豫備ト兼症ノ注意トニ在ルナリ。此一件蓋最要ノ

事ニシテ。コレニ注意セザルキハ。或ハ藥其功ナク。或

ハ却テ害アリテ。危險ノ症ヲ發スルニ至ル。此ハ次

ノ數條ヲ分ツヲ以テ必要トス。

其一汚物動カズ。汚物尚甚粘膠ニシテ固著シ。多ク粘

液ヲ以テ包裹ス。其徵ハ則舌不潔ノ苔アレバ燥キテ

且固ク剥シ難ク。惡心嘔氣共ニナシ。此症ニ向テ豫備

ノ方法ヲ行ハズ。直ニ吐藥ヲ與フル片ハ。徒ニ患者ヲ



疲憊セシメ劇キ惡心嘔吐ヲ發セシム然レモ有害ノ  
 物ヲ吐ク一ナキガ故ニ毫モ益ナシ此ニハ先解疑ノ  
 藥ヲ與フルヲ要トス其藥ハ則礪砂下利ノ或ハ巴恐アルカ  
ル者ニ或ハ孕鯨酒石便秘ノ是ナリ與フ而シテ若輕  
 キ瀉下アリテ汚物ノ徵消除スル片ハ吐藥ヲ用井ズ  
 シテ可ナリ若夫上部ニ上逆スルノ候及汚物溶解ノ  
 候増加スル片ハ乃吐藥ヲ與フベシ必多量ノ吐ヲ得  
 べシ其二前症ニ及スル者即上逆已ニ甚シキ者其徵ハ則  
 舌苔厚クシテ潤口且剥シ易ク吐ヲ欲スル一甚シク

或ハ巴ニ吐スル是ナリ此症宜ク直ニ吐藥ヲ與フベ  
 シ但謹慎シテ施ス一ヲ要トス其故ハ此症ニ於テハ  
 或ハ劇吐日レ發スル一アルヲ以テナリ故ニ宜  
 ク吐酒石ヲ禁ズベシ伊百加格安那至五片ヲ取リ海  
 葱醋蜜ヲ和シ四分小時ゴトニコレヲ與ヘ以テ快吐  
 ヲ得ルニ至ル  
 其三多血脉實ニシテ強熱性熱焮衝性ノ素質ナリ此  
 症ニ向テ豫備ノ方法ヲ施サス直ニ吐藥ヲ與フレバ  
 必大害ヲナス即頭ト胸トニ劇キ血積ヲ致シ或ハ血  
 管破裂シテ出血ヲ起ス此症ハ宜ク先適宜ノ刺絡ヲ



行ヒテ血ノ過多ヲ除クベシ。以テ此危害ヲ防グベシ。其四瘧性ハ症アル者。患者性甚刺衝シ易ク神經性ニシテ瘧攣暈倒ヲ發シ易ク。胃部甚痛ミ煩悶ヲ兼ヌ。此症ニハ吐藥動レバ劇キ瘧攣ヲ起シ。或ハ又劇吐ヲ發ス。宜ク先神經系ノ所患ヲ鎮靖シ。或ハ吐藥ニ兼子テ鎮靖ノ法ヲ行フベシ。即先胃部ニ鎮瘧ノ塗擦藥ヲ施シ。麻醉ノ毳布ヲ貼シ内又鎮瘧ノ藥ヲ服セシメ。且催吐飲中ニ菲臘沙密越幾斯或ハ葛斯突儂母一二匹ヲ加フベシ。其五患者下利アリテ。而シテ上部ニ上逆スル諸候亦

悉在ル者。此症ニハ吐藥瀉下シテ而シテ其下利ヲ増進シ。胃ノ汚物ハ却テ除カザルノ恐アリ。吐酒石ハ特ニ此恐多シ。故ニ宜ク先礪砂ヲ取テ。亞辣比亞護母ノ乳劑ニ和シ與ヘ。而シテ後伊百加格安那ヲ頓服セシムベシ。

此症ハ又屢劇キ窒扶斯性熱ニ於テ發シ。胃ノ大麻痺ヲ兼ヌ。然ルガ如キハ危篤ノ症狀ニシテ。コレヲ療スルハ醫術中最難ノ事ニ屬ス。其症ハ則患者病ノ第八日第九日第十日ニ於テ極メテ衰弱シ。昏睡或ハ他ノ神經症アリテ。兼子テ舌苔極メテ厚ク。初發ニ泄藥ヲ



多嘔氣乾嘔煩悶シ。更ニ下利水ノ如ク。或ハ溶崩性ニシテ止マス。○此症ニ於テハ吐藥缺クベカラズ或ハ以テ無ニノ救途トナスベシ。然レモ若吐セズシテ下泄スル片ハ。愈溶崩下利ヲ増シコレニ由テ患者ヲシテ更ニ危險ニ進マシム。恐ルベキ一最甚シ。○此症ニハ宜ク先其大ニ下利シ易キ性ヲ遏塞シ。胃ノ興奮機ヲ回復セシムベシ。其法ハ則先適量ノ阿片ヲ伊百加格安那ニ和シ與ヘ胃部ニ芳香ノ酒慰劑ヲ施シ。漿粉ノ灌腸劑ニ阿片ヲ加ヘ施シ。而シテ後伊百加格安那一刀ヲ頓服セシムルニアリ。此法ニ由テ予屢危險ヲ

救ヒ。痊復ノ門ヲ得セシムルヲ得タリ。○又芫青膏ヲ胃部ニ貼シテ。能其廢死セル刺衝機ヲ奮起セシム。予嘗驗スルニ。患者吐藥ヲ服スル後四小時間功ヲ見ズ。芫青膏泡ヲ起スニ至テ。而シテ吐始メテ起ル者アリ。予更ニ一言ヲ以テ世醫ヲ戒ム。凡吐已ニ畢ルハ。世醫以テ吐藥ノ能畢ルト為ス。是蓋然ラズ。凡吐其功ヲ完セムニハ。患者吐後ニ必大便數行ヲ得ルヲ要トス。其故ハ胃ノ収縮ニ因テ。汚物ノ一部又十二指腸中ニ下リ。更ニ又肝ヨリ膽液ヲ十二指腸ニ泌出スルヲ以テ



ナリ。此諸物着下ニ由テ泄レ去ラザルハ。吐藥ノ功  
完カラスシテ。病輕快ヲ得サルベシ。故ニ吐後自下ナ  
キ者ニハ。必輕キ下藥ヲ與フベシ。

吐藥ヲ用井テ後或ハ劇吐レハシベレハシテ發スルトアリ。今  
此ニ一言ヲ以テコレヲ論ズ。夫劇吐止ミ難キヲ致ス  
ノ故ハ。常ニ豫備ノ法ヲ怠ルニ因リ。或ハ藥量過多ナ  
ルニ因ル。其症ハ則患者吐シテ止マズ。或ハ危篤ニ至  
ルトアリ。其所由ノ途三。即一ハ胃嫩衝ヲ發スルニ由  
リ。一ハ吐血ヲ發スルニ由リ。一ハ大ニ精力ヲ衰耗ス  
ルニ由ルナリ。但幸ニシテ此ニ無ニ必應ノ藥アリ。即

先多ク粘滑ノ飲液ヲ與ヘ。次ニ李歇里飲ヲ與フベシ。  
但混沸散ヲ禁ズ。是已ニ刺衝セラル、胃ヲシテ更ニ  
刺衝ヲ受ケシムルヲ以テナリ。宜ク飽和ノ者ヲ與フ  
ベシ。次方ノ如シ。

炭酸剥篤亞斯 二錢

新絞橙汁 適宜。飽充ヲ以テ度トナス

默栗薩水 二十四錢

橙花舍利別 八錢

右和シ。半小時ゴトニ一食匙ヲ與フ。

兼テ薄荷葉ヲ酒ニ煮テ菴劑トナシ。胃部ニ施スベシ。

各異應用 熱性熱 十九



各異應用

今曩ニ説ケルガ如ク。吐藥特應ノ病。世ニ吐藥ノ功ヲ  
明知セザル病。及其投施ヲ詳ニセザル病ヲ列舉シ。且  
予ガ親ク試験セル所ニ據テ。考證セル者ヲ開載ス。

熱性熱

諸熱病ニ於テ。其刺衝ノ始マル處。即熱ノ刺衝ノ由テ  
出ル處。正ニ是病ノ中心タルハ。上腹部及交感神經ノ  
神經叢ニ在ルナリ。是熱ノ初發ニ兼發スル感觸ト。食  
思及消食力ノ速ニ缺失スルト。惡寒ノ其部ヨリ發生  
スルトヲ以テ明ナリ。此神經感觸ノ特異固有ナル。今

ニ至ルマデ。人其妙機ヲ詳ニセザル所ニシテ。而シテ  
此ニカラ達スルト亦特異無雙ナル者ハ。吐藥ニ如ク  
ハナシ。○故ニ吐藥ハ普通ノ治熱藥トシテ。其初發ニ  
於テ熱ノ刺衝ヲ消去シ。共ニ熱ヲ驅除スルガ為ニ用  
井ル。理ナキニ非ズ。或ハ少量ニコレヲ用井テ。吐ニ  
至ラシメザルモ。其功已ニ貴重ト謂フベシ。耶默斯ノ  
驅熱散及安質謨尼ノ酸化物ハ。熱ヲ除クガ為ニ人々  
試用シテ其能ヲ知ル所ナリ

又一種ノ熱アリ。此胃腸ノ所患刺衝ノ強度ヲ得ルノ  
ミナラズ。胃腸分泌スル所ノ諸液腐敗ノ性ヲ得ルニ



至リ。啻其初起ニ於テ然ルノミナラズ。病經過スル間。常ニ此所患アリテ。諸他ノ苦惱ノ本源トナリ。然ク其病ニ此一種ノ性ヲ得セシム。吾輩コレヲ腸胃熱ト名ヅク。但此熱ハ或ハコレヲ論定シテ有リト謂ヒ。或ハ又無シト為スト雖。共ニ理論上ノ爭議ニシテ。此ニコレヲ辨明スルニ足ラズ。唯實事ヲ以テ曰ハシ。此ニ熱アリ。胃腸ノ所患及液腐敗ノ徵其病ノ主症トナリ。吐下藥ノ外他ノ救方ナク其強盛ノ度ニ至ルモ仍此二藥ヲ舍テハ生命ヲ救フベキ者ナシ。此症ニ於テ吐藥ノ主治ノ最ナル者ハ亦良能ノ音容

ニシテ。即吐ヲ欲シ吐ヲ好ムニ在リ。ホミヲホミ。舌ヲモラシ。是ナリ。故ニ患者熱ノ初起ニ於テ惡心アルカ。或ハ已ニ吐シ。舌苔黄色或ハ赭色。味惡ムベキヲ覺ユル者ニ遇テ。吐藥ヲ急ル者ハ。是良能ニ重過ヲ犯スナリ。而シテ不幸ノ患者。コレヲ重ク償ハザルヲ得ズ。然レバ良能吐泄ヲ欲シ。已ニコレヲ催スニ方テハ。醫此時ヲ失フヲナク。吐藥ヲ用井ルヲ緊要ナリ。依ト氏ノ言寔ニ理アリ。シク井ド。モヘン。ヂム。エスト。モ一ハ。嗚呼此時ニ於テ吐藥ヲ急ルハ。後再コレヲ償フベカラザルヲ甚多シ。又應時ニ吐藥ヲ施セバ。能ク其病



ヲ初起ニ驅除スベクシテ。而シテ此時ニコレヲ怠レバ。病ヲシテ經久且重難ナラシメ。或ハ時ニ不治ニ陥ラシム。是誠ニ恐ルベキノ一事。予コレヲ少年醫輩ニ諭サムト欲スレ氏筆其意ヲ盡スル能ハズ。又下藥ヲ以テ吐藥ニ代フベシトスル勿レ。下藥未必シモ吐藥ノ能<sub>レ</sub>泄ス所ノ物ヲ泄サズ。予嘗<sub>レ</sub>驗スルニ。食物化セズシテ残留セル者。十四日間下藥ヲ連用シテ仍<sub>レ</sub>胃ニ留マリ。爾後一吐藥ヲ以テ始メテ泄出スルヲ得タリ。又其物若敗性有害ノ物ナルハ。務メテ恐レテ最近ノ途ヨリ泄ス。是患者ノ為ニ大益アル所ナリ。若

夫腸ヲ經テ泄ル。時ハ。長遠ノ途ヲ經ル。故ニ其刺衝ニ因リ。衰憊ニ因リ。吸收ニ因リテ。患者ニ大害ヲ致スベキナリ。吐藥更ニ貴重スベキ一能アリ。即<sub>チ</sub>其力能<sub>レ</sub>胃及肝ノ神經系。分泌系ニ變換ヲ起シ。其機能ヲ一新シテ。胃腸汚物ノ本源ヲ過塞ス。是下藥ヲ以テヨク得ベキ所ニ非ズ。但<sub>レ</sub>一回ノ吐常ニ以テ足レリトスベカラズ。屢ニ二三回ノ吐ヲ要スルコトアリコレヲ要スルニ。良能若上逆ノ候ヲ呈ス片ハ。毎回必吐藥ヲ施スベキナリ。



但腸胃熱ニ於テ醫宜ク其合併ト性情トヲ察スベシ。即其質ヲ以テ分テバ。積滯熱。膽液熱。粘液熱。蟲熱トイフ。其容ヲ以テ分テバ。焮衝性。神經性。腐敗性トイフナリ。

焮衝ハ其汎發ト局發トニ論ナク。各種ノ腸胃熱ニ合シ易シ。而シテ常ニ先適當ノ藥ヲ以テコレヲ除クヲ要トス。而シテ後始メテ吐藥ヲ與スベキナリ。神經性。腐敗性ノ合併ニ於テハ。宜ク注意シテ生カヲ扶住シ。兼テ壯神興奮強壯防腐ノ藥ヲ與フベシ。單純ノ積滯熱。食物化セザルニ因ル者ハ。通常吐藥下

藥ノミヲ以テ足レリトス。胆液熱ハ焮衝性ヲ兼子易ク。且其澹液甚苛厲ナル者アルヲ以テ。宜ク細心ニコレヲ療スベシ。其膽液ノ苛厲ナル者ハ。峻性ノ吐藥ヲ禁シ。特ニ全量頓服ヲ戒メ。兼子テ稀釋ノ飲液ヲ與フベシ。

粘液熱ハ常ニ消食器ノ癡鈍ナル性ヲ兼ヌ。故ニ有力ナル解凝透徹ノ藥ヲ兼用スベシ。蟲熱ニ於ル亦吐藥ヲ施スベキ症アリ。即或ハ蟲胃ニ上游セル者ヲ泄ス為ニシ。或ハ諸般ノ蟲症ヲ除キ。兼發ノ所患ヲ治スルガ為ニス。例スルニ蟲熱脇肋ニ劇



疾ヲ發シテ。胸脇焮衝ニ疑似スル者ノ如シ。是多ク有ル所ノ症ニシテ。屢一吐藥ヲ以テ直ニコレヲ掃除スルヲ得ルナリ。

予更ニ此ニ施治ノ一訣ヲ附ス。凡腸胃熱ニ於テ横膈上<sup>胸項</sup>ニ交感ノ所患アル者ハ多クハ上逆ノ候ニシテ。吐藥ノ主治トナスベキナリ。

間歇熱

間歇熱ノ本相ト其固有ノ源委ハ予ガ考證スル所及其純真ノ諸症ニ據レバ。上腹神經ト肋間對神經ト中ニ在ルナリ。コレニ因テ又吐藥ノ偉功アル理ヲ辨明

スベシ。而シテ其偉功アルハ。又其病源此ニ在ルノ一證ナリ。間歇熱發作ノ前ニ當テ。一吐藥ヲ與ヘ。能コレヲ防止スルヲ得ルハ。コレ人々屢驗スル所ナリ。又單純間歇熱。特ニ春熱ノ如キハ。唯吐藥ヲ施シ。其間斷砂ヲ與フルノミニテ。全治スル者多シ。其劇度ニ於テ幾那ヲ要スル者ニ至テモ。先吐藥ヲ施スル必要ナリ。然ルハ患者幾那ニ堪ヘ易クシテ。服後熱速ニ退クノ利アリ。予嘗驗スルニ。間歇熱ニ幾那ヲ與ヘ。或ハ更ニ消化シ易キノ規尼<sup>規尼</sup>ヲ用井テ。而シテ熱退カズ。却テ劇盛ヲナシ。發作ノ期來ルヲ早ク。其間歇ノ間仍病



候ヲナス者アリ。此時幾那ヲ止メ吐藥ヲ與フレバ。症  
狀一變シ。再幾那ヲ施スニ其功雄偉ニシテ。熱速ニ去  
リ。病完ク治スルヲ得ルナリ。  
近日予吐藥ノ此非常ノ能ヲ驗スルヲ得タリ。一老  
人去年險重ノ黃疸ヲ患ヒ。治シテ後再病ム。其症ハ則  
不寐ニシテ食思ナク。煩悶シ。呼吸困難。脉間歇シ。大便  
定次ナク。熱屢發ス。然レ氏亦定期ナシ。眼中黃色ヲ帶  
フ。右ノ諸症三週ノ間稽留シテ後急ニ瘦削シ。衰弱疲  
憊甚シ。其服スル所ノ藥ハ。則解疑ノ越幾斯ト礪砂ナ  
リ。而シテ瘦削ノ後ハ熱發作スルヲ毎夕ニシテ。定期

ヲ有チ。且間歇熱流行ノ時ナルヲ以テ。醫乃規尼溼ヲ  
與フ。初ハ毎日六ハ。次ニ増テ八ハニ至ル。然レ氏規尼  
溼ノ量ヲ増スゴトニ。熱勢亦旺盛シ。遂ニコレヲ止メ  
ザルヲ得ザルニ至ル。是ニ於テ吐藥ノ主治ナルヲ  
ヲ知り。乃チ吐酒石二ハヲ與フ。吐スルヲ四回。更ニ下利  
數行。共ニ多量ノ膽汁ト粘液トヲ泄ス。爾後熱全ク消  
シ。煩悶痞塞及咳嗽共ニ去リ。食思再復シ。安眠シ。容色  
常ニ復ス。是ヨリシテ痊復ノ端トナリ。終ニ完ク治ス。  
是吐藥ノカラ以テ聚積セル膽汁ヲ泄シ。肝系ノ機能  
ヲ匡正シ。其分利泌別ヲ變理セルニ因ルヲ明ナリ。



予今嘗屢驗スル所ノ吐藥ノ一能ヲ記ス。夫間歇熱不齊ニ發シ。明著ノ間歇ヲナサス。定期ナク。却テ熱性熱ニ類スル<sub>ト</sub>アリ。此症ニハ宜ク吐藥ヲ施スベシ。以テ其熱ヲ齊整間歇熱トナス<sub>ト</sub>得ベシ。而シテ後幾那ヲ以テ速ニコレヲ治スル<sub>ト</sub>得ルナリ。

傳染熱

夫熱性傳染毒ノ始メテ其カラ發シ。及始メテ感染スルハ。胃及上腹神經ニ於テスル<sub>ト</sub>。疑フベカラズ。其傳染ノ毒。カラ顯スノ初候ハ。常ニ吐及其他ノ腸胃性ノ症狀ナルヲ以テ見ルベシ。例スルニ痘瘡麻疹及傳染

室扶斯ニ於ルカ如シ。然レハ傳染ノ初ニ於テ吐藥ヲ施スベキノ理固ヨリ明ナリ。コレニ因テ。一ニハ尚其毒ノ一部ヲ泄シ去ルベク。一ニハ其カト其増息ノ機トヲ初起ニ變換スル<sub>ト</sub>得ベシ。此理ニ由テ予ハ屢傳染熱初起ノ時ニ吐藥ヲ用井テ。能其病ヲ減少スル<sub>ト</sub>得タリ。或ハ寒性ノ傳染料ルニ室扶斯性ナルベキ者モ。亦吐藥ヲ以テコレヲ除ク<sub>ト</sub>得タリ。若夫毒已ニ感染シ。カラ發スルニ至リ。良能コレヲ皮表ニ分利セム<sub>ト</sub>欲シ。或ハ發疹熱ニ於ルガ如キハ。是吐藥ヲ禁戒スベキ所ナリ。夫然ク已ニ發熱ノ期ニ至リ或



ハ疹已ニ皮表ニ現ル、ニ至テハ。吐藥ノカニテ内部ニ猛劇ノ變換ヲ起シ。對衝ヲ起ス。是皮膚ノ分利ヲ妨礙スル所ニシテ。其危害測ルベカラズ。是亦嘗予カ親驗スル所ナリ。故ニ此症ニ於テハ。兼子テ腸胃汚物ノ候アリテ。然モ其劇盛ナル。吐藥ヲ止ムベカラザル者ニ非ザレバ。コレヲ施スベカラズ。

然レモ是等ノ傳染性發疹熱。貽後病ノ時期ニ至テハ。再吐藥ヲ要スル。アリ。然ルニ世人此ニ注意スル者少シ。故ニ予コレヲ辨明セザル。得ズ。特ニ麻疹ノ後屢殘留スル所ノ咳嗽ハ。肺中停留スル所ノ刺衝由

テ致ス所ニシテ。極メテ結節ヲ生シ易シ。此咳ヲ除クニハ。予ハ吐藥ヲ以テ最貴ノ藥トナスナリ。此ニ予ガ驗スル所ノ一症ヲ舉ク。是吐藥ノ功最彰明ナル者ナリ。一女子歳十二。麻疹ヲ患ヒテ已ニ痊エ。病ノ第十四日。熱已ニ止ミ。食思稍復スル者。今再食思ヲ失ヒ。咳再劇盛ヲナシ。呼吸困難ニシテ衰弱愈増シ。睡安カラズ。頭痛ヲ發シ。且大便秘閉ス。下藥ヲ與フルニ又其驗少シ。是ニ於テ予乃吐藥ヲ與フ。多量ノ粘液及膽汁ヲ吐スル。六回。此時ヨリ自然ニ分利ノ下利ヲ發シ。數日連瀉四五行。咳乃止ミ。食思生シ。精力復シ。速



ニ全愈ヲ得タリ。

咽焮衝 搭樓痺

諸種ノ咽焮衝ニ於ル予が見ル所ニ據レバ吐藥ヲ以テ最驗ノ藥。普通ノ方トス。而シテ其咽中ノ神經。及粘膜ニ最強ノ對衝トナル。特異適應ニシテ。焮衝性ノ刺戟ト鬱蓄トヲ分利セシムル。亦最速ナリ。若夫嚙下ノ困難ナルハ吐藥ノ施用ヲ禁ズルニ足ラズ。其故ハ嚙下シ難キノ患者吐スル。極メテ易キヲ以テナリ。但純真咽焮衝ノ劇度ノ。吐藥ヲ禁ズベシトス。是瀉血ヲ要スルノ症ナリ。

次ニ舉グル諸症ニ於テハ吐藥實ニ特應ニシテ其功勝テ稱スベカラズ。

其一腸胃性咽焮衝即咽焮衝其初起ヨリシテ腸胃性ノ候ヲ兼子。舌苔アリテ味惡ムベク。惡心シ吐セムト欲シ。或ハ吐スル者是ナリ此症ニ於テハ咽焮衝ハ唯腸胃汚物上逆ノ標症ニシテコレヲ治スルニハ唯吐藥ノミヲ以テ足レリトス。コレニ因テ咽焮衝ノ諸徵直ニ消ス若クハ險劇ノ症ト雖治セザル。ナシ其二搭樓痺此症ニ於ル亦吐藥ノ大勲ヲ見ルベシ。予ガ驗スル所ニ據レバ特ニ次ノ二期ニ於テ著シ



一、則其初期ニアリ。若人アリ。一藥ヲ以テ能格摟癩ノ將發ヲ防グヲ得ルト言ヒ或ハ其既發ヲ除クト言フ片ハ予知ル是必吐藥ナルヲ予親コレヲ驗スル一數回。今一例ヲ舉ゲテ其他ヲ類推セシム。  
一兒三歳健強多液。北東ノ風ニ逢テ胃寒シ。三日間熱ヲ得テ咳ヲ兼子。毎夜第三時鼓我ハニ當テ。劇キ瘵咳ヲ發シ。呼吸窒塞セムト欲シ。其聲吠ユルガ如シ。醫見テ以テ密兒ミル拉爾ラ喘息ノ發作トナシ。麝香甘汞ヲ隔次ニ用井タリ。病ハ第四日。予始メテコレヲ診ス脉實ニシテ數瘵咳間トク呼吸ノ窘迫或ハ強ク或ハ輕シ。頭所

患ナク。其他平康ニシテ食思又未全ク廢セズ。但古不潔ナルノミ。予其呼吸器ノ發歇スル瘵癩ヲ見テ。乃格摟癩ノ初起ナルヲ察シ。直ニ常用ノ吐藥ヲ與フ其方

吐酒石 一匁

伊百加格安那根末 一匁

海葱醋蜜

覆盆子舍利別各四錢

淨水 八錢

四分小時ゴトニ。一茶匙ヲ與ヘテ吐スルニ至ル。



多量ノ粘液ヲ吐スル。三回ニシテ咳乃止ミ。十四時  
間安眠醒メズ。且汗ヲ得ル。多シ。翌朝ニ至テ。咳嗽及  
呼吸困難共ニ退除シ。分利始メテ起リ。格擣癆ノ初起  
完ク治ス。

二ハ則其末期ニアリ。即滲出既ニ成リ。又既ニ溶解シ。  
但未<sup>タ</sup>泄出ヲ得ザル者ニシテ。窒塞ノ症漸増シ。呼吸喘  
鳴スルヲ以テコレヲ察ス。此時ニ於テハ。吐藥能其粘  
靱膜様ノ物ヲ泄シ。呼吸器ヲ淨滌スルノ偉功アリ。即  
一例ヲ舉ゲテコレヲ證ス。發熱スル感<sup>ハ</sup>具<sup>テ</sup>ハ  
一兒二歳。屢冒寒ニ罹ルノ外健康ナリ。其格擣癆ニ罹

ルノ第二日午後。予コレヲ診ス。窒塞ノ症已ニ甚シク。  
咳嗽吠ユルガ如ク。呼吸吹笛ノ如ク。常ニ好テ頭ヲ擡  
起シ。頸ヲ延長ス。脈百二十動。乃項ニ八個ノ水蛭ヲ貼  
シ。一小時ゴトニ甘汞ヲ與ヘ。且醋ヲ以テ灌腸藥トス。  
水蛭吸ヒ畢リ。甘汞亦八ハ用井テ後。大便數行ニシ  
テ。病大ニ輕快ヲ得タリ。翌午脈減シテ九十動ニ至ル。  
但呼吸尚喘鳴シ。聲亦嘎ス。乃更ニ水蛭二條ヲ貼シ。而  
シテ後前方ノ吐藥ヲ作り。四分小時ゴトニコレヲ與  
フ。次テ後全ク輕快ヲ得タリ。乃炭酸<sup>ホット</sup>忽篤<sup>ト</sup>亞斯<sup>ス</sup>一刃淨  
水八錢。滿那舍利別四錢。安質<sup>アチ</sup>母尼<sup>モニ</sup>酒二十滴。和劑ヲ



作テ。二小時コトニ一茶匙ヲ與ヘ。以テ全治スルニ至ル。  
 其三耳腺咽焮衝此症ハ唯流行ニ因テノミ發スル頸病ニシテ。其初ハ本唯耳腺ト顎下腺ニ舍ルト雖劇盛ノ度ニ至テハ。咽内ノ腺ト粘膜トヲ浸シ。而シテ極メテ窒塞シ易ク。或ハ全ク牙關緊閉ス。此時ニ至テハ。又吐藥缺クベカラズシテ其主藥トナリ。又時トシテハ。無雙ノ救生藥トナスベキナリ。其輕症ノ如キハ。尚消火催汗ノ藥ヲ以テ治スベシ。是其病危險ナラズ。多ク粘膜腺質ノ涎乙様焮衝ニ屬スルナリ。若夫上ニ説ケ

ルガ如キ劇症ニ逢テハ。是等ノ藥能救フベキ所ニ非ズ。瀉血。甘汞。光青膏ノ如キモ。多クハ無益ニ屬シ。唯吐藥ノミ以テ窒塞ノ危險ヲ除クベシ。今亦一例ヲ舉ゲテコレヲ證ス。

一婦人歳二十六。此症ニ罹リテ其勢劇盛ナリ。嚙ニ耳腺ノミナラズ。顎下腺舌下腺亦大ニ腫起シ。僅ニ涓滴ヲ嚙下スベク。呼吸甚難ク。顎亦緊閉シ。上下ノ齒僅ニ相開クヲ得ベク。遂ニ真ノ牙關緊急ニ至レリ。正ニ是病ノ第九日ナリ。其既ニ行フ所ノ方法ハ。刺絡水蛭。光青膏。汞劑。芭布。擦藥等ニシテ。共ニ驗ナク。熱劇クシ



テ退カズ。是ニ至テ吐藥ノ外。更ニ他ノ救助スベキノ  
 藥ナシ然レバ其試用極メテ危険ナリ。何トナレバ咽  
 顎共ニ既ニ緊閉セルヲ以テ。吐藥ノ功ニ因テ上逆ヲ  
 起シ。汚物ヲ上部ニ送出スルニ方テ。口既ニ通ズベキ  
 ノ路ナケレバ。患者室死セムトスルノ恐アルヲ以テ  
 ナリ。然レバコレヲ試用セザルヲ得ズ。乃チコレヲ與  
 フルニ。其功驚異スルニ堪ヘタリ。咽顎等ノ部緊閉シ  
 テ。外ヨリ内ニ入ルヲ容サミル者。内ヨリ外ニ出ヅル  
 ニ當テハ。豁然トシテ開通シ。吐スルヲ三四。多量ノ汚  
 物ヲ排出シ。牙關緊急頓ニ止ミ。腺腫ノ緊張スル者又

減シ。嚙下亦成リ。爾後數日ニシテ全ク治ス。  
 此病ヲ預防スルカ為ニ。吐藥ノ能又勝テ稱スベカラ  
 ズ。嘗此病流行セシトアリ。嬰兒モ亦コレヲ免ル。一  
 能ハズ。予其初起ニ於テ吐藥ヲ與フルニ。病竟ニ旺セ  
 ズ。速ニ全愈スルヲ得タリ。  
 其四腐敗性咽焮衝此症ハ極メテ危険ナレバ。幸ニ稀  
 ニシテ。我邦<sup>寺瀨</sup>ニテハ。常ニ唯惡性ノ「ロードホレキ」  
 ニ兼發スルヲアルノミ。其症タル咽焮衝ノ初發ニ兼  
 子テ。又腐敗ノ候ヲ現ス者ナリ。而シテ吐藥ハ特ニ初  
 發ニコレヲ用井テ其君藥トス。

肺焮衝

世二



其五寒壞性口焮衝此症ニ於テハ予ハ直ニ吐藥ヲ以テ最大最速ノ神藥トス予屢驗スルニ諸種ノ泄瀉消焮ノ藥功ナキ時ニ方テ一吐藥能此惡ムヘキノ病ヲ掃滌スル一ヲ得タリ。

要スルニ咽焮衝ノ諸種ニ於テ消焮鎮痙ノ方法ヲ施スノ後病退カズ且窒塞ノ恐アル者ニハ吐藥ヲ以テ最良無二ノ救藥トナスベシ。

肺焮衝

此ニ一種ノ肺焮衝アリ刺絡功ナク消石功ナク阿片亦功ナク羌青及其他ノ諸藥皆功ナク唯吐藥ノ此

諸藥ノ後ニ用井テ能無二ノ救生藥タル者アリ予ガ親ク見ル所ニ據レバ往昔ハ諸種ノ肺焮衝ニ醫唯刺絡ノミヲ用井他ノ藥アル一ヲ知ラズ次テ後阿片及其他ノ刺衝藥ノミヲ用井又次テ後水埴甘汞ノミヲ用井タリ然レバ此三時限中此三種ノ療法ヲ以テハ治スベカラズ唯吐藥ヲ以テノミ治スベキ者アツ是實驗ヲ以テ知ル所ナリ彼ノ近世有名ナル百悉藥見人ノ療法ナル者ハ肺焮衝ニ吐酒石ヲ用井テ先吐ヲ起シ次ニ適宜ノ下利ヲ發セシムル者ニシテ是四十年前斯格羅埴兒秩卒突斯突魯李屈的兒人名ニ等ノ既







シハベシ。然レモ此腸胃ノ候。又其始ヨリ真焮衝ニ合併スル一アリ。其兩性孰カ多キニ從テ。或ハ焮衝様腸胃性肺焮衝ト名ヅク。或ハ腸胃様焮衝性肺焮衝ト名ヅク。此症

ニ在テハ。脉實ニシテ緊渴甚シク。尿赤クシテ火ノ如ク。肌熱亦多シ。此症ハ宜ク先瀉血ヲ行ヒ。兼子テ消焮ノ治法ヲ施シ。焮衝ノ性ヲ消除スベシ。而シテ後始メテ疏腸ノ方ヲ處スベキナリ。故ニ汚物上逆ノ候ニ兼子テ。脉緊ニシテ實患者少壯ニシテ天賦多血ナル者ハ宜ク先臂ニ刺絡ヲ行ヒ。而シテ後始メテ吐藥ヲ與フベシ。或ハ又吐藥ヲ用井テ後焮衝ノ性始メテ現ル者アリ。瀉血ヲ吐後ニ行フベキ症トス。

予此ニ亦予ガ實驗中ヨリ一症ヲ引テコレヲ證ス。一



婦人歳三十五。劇性熱。胸脇ノ刺疼ニ罹リ。兼子テ乾  
 咳シ。呼吸短ニシテ窘窄。頭痛劇ク。汚物ノ候アリテ。其  
 脉ハ實且緊。乃其臂ニ多量ノ刺絡ヲ行フ。而シテ大便  
 ナキガ故ニ。芒硝。安質。母尼酒。緩和越列屈。去兒「エ」。  
 去兒「エ」。以テ。密吉斯。去兒「エ」ヲ製シ與フ。刺絡ノ後。痛暫  
 減ズ。然レモ再新ニ劇盛ス。翌日。昨ニ比スレバ。脉更ニ  
 實ニシテ。更ニ疾。但緊ナラズ。頭痛劇ク。乾咳増シ。肋骨  
 ノ縁。及肝部ノ痛處。脹起シ。コレニ觸レテ。痛アリ。是肝  
 モ亦共ニ焮衝ヲ受ケル。明ナリ。又兼子テ惡心シ。舌  
 苔。赭黃ニシテ。剥シ易シ。是ニ於テ。焮衝性腸胃性ト合

併セルヲ明知シ。且其脉仍實ナルヲ以テ。更ニ刺絡シ  
 テ。二吸角ノ血ヲ泄ス。其血復。焮衝皮ヲ結バズ。爾後胸  
 痛少シク減シ。惡心却テ増シ吐セムト欲スルニ至ル  
 乃吐酒石伊百加格安那ノ吐藥ヲ造リ。今ケテコレヲ  
 與フ。多量ノ膽汁粘液ヲ吐スル。三四ニシテ。痛ト熱  
 ト大ニ減シ。脉曩ニ一分時間。一百一十動ナル者。今ハ  
 則減シテ九十動ニ至リ。此時ヨリシテ。日ゴトニ輕快  
 ヲ得。緩下藥ヲ連用シテ。全治スルヲ得タリ。  
 但腸胃性ノ徵候常ニ然ク。明著ナルニ非ズ。又隱伏假  
 扮ノ腸胃性肺焮衝アリ。醫宜ク注意セザルベカラズ。



此症ニ於テハ。腸胃性ノ徵候未曾然ク顯著ナラズシ  
 テ。而シテ其内部ノ状態ハ則前症ニ同キナリ。則其病  
 候疑フベシト雖。宜ク先其缺乏セル候ヲ定ムベシ。肺  
 焮衝ノ大劇痛最強悶共ニ現存シテ而シテ。脈ハ則焮  
 衝ノ状ナク。諸症亦一連稽留ノ者ナシ。乃其病前ノ諸  
 候。譬ヘバ忿怒悲憂消食機ノ虧損等ニ參考シ。且其胃  
 部ノ壓重緊張ト。舌上ノ見徵及顔ノ黄色等ヨリ。其真  
 状ヲ察スルニ足ルベシ。特ニ其苦悶ハ。屢隱伏腸胃性  
 ハ主徵タルナリ。醫宜ク注意スベキ所ナリ。此苦悶  
 ハ此症ニ於テ最劇ノ度ニ至ルナリ。但焮衝性ノ苦

悶ト錯過スルナク。既ニ其苦悶腸胃性ノ候ナルキ  
 ハ。吐藥ヲ必須トス。若夫疑似決シ難キノ症ニ在テハ。  
 宜ク試刺絡ヲ行フベシ。其症若真ニ焮衝性ナルキハ。  
 少シク血ヲ泄スノ後。既ニ輕快ヲ得ベシ。乃宜ク多量  
 ノ血ヲ放スベシ。若夫否ズシテ單純腸胃性ナルキハ。  
 帝ニ輕快ヲ得ザルノミナラズ。却テ痛ヲ増盛セシム  
 ベシ。乃直ニ其脈ヲ遏閉シ。果シテ其症ノ腸胃性ナル  
 ナラ信ズ。或ハ又刺絡間。刺絡後ニ於テ。頓ニ上逆ノ候  
 ラ顯シ。汚物疏解シ。自膽汁ヲ吐スル者アリ。宜ク速ニ  
 吐藥ヲ與フベシ。其功必偉大ナリ。○又其初起ヨリシ



テ其真性ヲ誤察シ。屢無益ニ血ヲ瀉シ。而シテ胸患退  
 カズ。熱尚稽留シ。胸脇疼痛。呼吸困難。更ニ腸胃症ノ候  
 アリテ。初ヨリ消除セズ。脉已ニ復瀉血スベカラザル  
 者アリ。此症亦前症ノ一類ニシテ。既ニ遲慢スト雖吐  
 藥尚能無二ノ全功ヲ収ムルナリ。

右ニ舉グル者ノ如キ。前ニ已ニ吐藥ヲ怠慢シテ。後尚  
 コレヲ要スルノ症ニ於テ。特ニ吐藥ノ肺焮衝ニ大勲  
 アリテ。然モ闕クベカラザルトテ證明スベシ。予施治  
 ノ際屢此症ヲ親驗セリ。特ニ當今ハ世醫多ク焮衝ノ  
 瀉ヲ準視シテ。瀉血ヲ主トスルヲ以テ。腸胃性ヲ遺忘

スルコト多シ。予今此ニ一例ヲ引テコレヲ證ス。  
 一婦人歳三十。肺焮衝ニ罹リテ其諸候完ク備ル。醫乃  
 刺絡ヲ行ヒ。水蛭ヲ貼シ。緩下藥及其他ノ消焮諸藥ヲ  
 投ス。其劇症ハ則減ズト雖其主症ハ未曾減セズ。予カ  
 コレヲ診セルハ。病ノ第八日ニアリ熱劇ク。瘧咳止マ  
 ズ。呼吸困難。特ニ煩悶間ナク。或ハ時ニ昏倒シ。衰憊甚  
 シク。頭痛謔言アリテ。其脉ハ則疾ニシテ小且軟。尿混  
 濁シ。舌苔黃赭。兼子テ瀉下水ノ如ク。疲憊將ニ極マラ  
 ムトス。此症宜ク速ニ處方ヲ決スベシ。何トナレバ患  
 者ノ性命既ニ殘燈ノ如クニシテ。復時ヲ湏ツベカラ



ザルヲ以テナリ。而シテ其脈ノ小ナルト。尿ノ混濁ナルト。又咳ナクシテ能ク吸氣スルヲ得ルトニ由テ。眞煩悶咳嗽呼吸不利ノ眞ノ肺嫩衝ニ關ラザルヲ察ス。又時ニ經血正ニ來ル。其生カノ沈衰セルヲ明ナリ。而シテ其過多ノ瀉下。愈生カヲ費耗スベキヲ以テ。コレヲ減過スルヲ最要ナリ。乃先少量ノ抱歌兒散ヲ與。且粘滑ノ灌腸ヲ施ス。爾後安歇スルヲ六小時然レ。再劇キ煩悶ヲ起シ。脇肋刺痛シ。惡心シ。脈極メテ小疾ニシテ間歇ス。更ニ昏倒頭旋ヲ發シ。大便自利シテ省セズ。是ニ於テ鎮痙藥功ナク。胸部ノ重難却テ更ニ

増加シ。特ニ煩悶ト惡心トヲ以テ。胃部ニ尚刺衝物殘留シテ。胸痛ト神經症トノ稽留スル主因トナルヲ決シ。即吐藥ノ主治ナルヲ知リ。且吐藥ノヨク此危險ノ症ヲ救フベキヲ量定ス。但其生カ最耗竭シ。兼子テ瀉下アルニ方テハ。吐藥極メテ危殆ニシテ其應否疑フベシ。若夫吐セズシテ瀉下スルガ如キ氏ハ。其衰憊ヲ倍シテ死ニ至ラシムベシ。是ニ於テ吐藥ノ前一二時ニ於テ。先少量ノ抱歌兒散ヲ與ヘ。以テ其瀉下ヲ防キ。而シテ後十分時ゴトニ。伊百加格安那六瓜ヲ與フ。四服ノ後。多量ノ膽樣粘液ヲ吐スルヲ三回。次テ後



安眠スルヲ數時醒メテ後呼吸全ク障礙ナク。煩悶刺  
 痛共ニ除ク。次日熱微ニシテ胸頭共ニ患ナク。唯衰弱  
 アリテ。且、瀉下シ易キノ癖アルノミ。要スルニ危險ノ  
 症數時間ニ除キ。爾後痊愈復日ヲ逐テ障礙ナキヲ得  
 タリ。

更ニ二症アリ。予此ニコレヲ舉ゲザルヲ得ズ。是啻  
 ニ少年ノ醫ヲシテ切ニ此症ニ注意セシメ。且吐藥ノ  
 貴重ヲ知ラシムル為ノミナラズ。此二症ニ於テハ一  
 回ノ吐藥啻ニ患者ノ命ヲ救フタミナラズ。更ニ醫ノ  
 英名幸福ノ基礎ヲ安ケルヲ以テナリ。尚、陳書此症

予カ同學ノ一友。學校ヲ出テ、他國ノ大都ニ至リ。將  
 ニ其術ヲ試ミムトス。其都ニ著シテ後久カラズ。請ハ  
 レテ一大家ニ至ル。其主人十日來熱性胸病ニ罹リ。其  
 都中第一ノ醫ニ托シテ救治セシム。尚且新來ノ外藩  
 醫ヲ引テ其術如何ヲ試ミムトス。刺絡發泡消焮藥和  
 胸藥等。既ニコレヲ行ヒテ驗ナシ。患者昏睡シテ醒メ  
 ズ。呼吸喘鳴シ。胸中苦悶甚シク。熱劇ク。殆死ニ瀕セリ。  
 予ガ友ハ始メ「ゴッヂンゲン」地名ヨリ來リ。嘗テ李屈的兒名  
 ノ學校ニ學ビ。所謂腸胃性肺焮衝ヲ習ヒ得タリ。乃其  
 患者ヲ診スルニ。此危險ノ症ニ兼子テ屢嘔氣シ。吐セ



ムト欲シ。舌苔厚クシテ剥シ易ク。色赭色。胃部膨脹シ。患者自其手ヲ胃部ニ致ス。是ニ於テ汚物ノ蓄積尚存スルヲ察シ。乃吐藥ヲ命ズ。患者膽汁様ノ汚物ヲ泄ス。其甚多ク。次テ救全スルヲ得タリ。是ヨリ後此醫ノ英名其全都ニ流傳シ。久カラズシテ都人皆其醫ヲ求メ神醫トシテ貴ブニ至レリ。

其第二症ハ。正ニ是特拔貴重ノ女君ノ患フル所ナリ。其症ハ則肺焮衝ニ兼子テ粟疹ヲ發シ。病已ニ十一日ヲ經タリ。其侍醫已ニ應症ノ諸藥ヲ用井盡シテ功ナシ。危險既ニ極マリ人復治ヲ望マザルニ至ル。偶外藩

ノ醫アリ。請ハレテ詣リ診シ。其死ニ瀕スルノ衰耗ニ管セズ。吐藥ヲ與フ。患者吐シテ後佳候次テ顯ル。而シテ此一吐藥。其醫ヲシテ侍醫ノ官ヲ得セシメタリ。予更一論アリ。是予ガ數回ノ試驗ニヨリテ確定セル所ナリ。凡諸種ノ肺焮衝。胸痛ノ有無ヲ論セズ。其焮衝ノ度。刺絡ヲ要スルニ至ラザル者ハ。吐酒石ヲ舍テ更ニ確更ニ速更ニ完ノ藥ナシ。是蓋安質母尼ノ力。此症ニ於テ必當缺クベカラザルニ因ルナリ。其用法ハ則每一小時ニ半ムヲ以テ足レリトス。然ル氏ハ其初服ノ量ハ吐ヲ起シ。次後ハ則輕ク通利ヲ起シ。汗ヲ發シ



痰ヲ出ス。故ニ此症必要ノ事件。悉此藥ノ能スル所ニ在リテ。此藥ノミヲ以テ能。此病ヲ全治スルヲ多シ。前章說ク所ハ。啻ニ腸胃性肺焮衝ニ於テ然ルノミナラズ。又聖京性。痺麻質性ノ肺焮衝ニ於ルモ亦然リ。蓋此ニハ其泄出ノ力。適應スルニ非ズ。却テ其上腹諸臟ヲ刺戟シテ。恰胸臟ニ對衝スルノ能。特異ニ其熱ヲ奏スルナリ。

當今ハ肺焮衝ニ甘汞ヲ用井ルヲ極メテ多シ。若夫吐藥ヲ以テ甘汞ニ代フルヲ得バ。其人ニ利スルヲ豈淺小ナラムヤ。

顔面羅斯

羅斯ノ諸種共ニ吐下藥ヲ以テ其主藥トナス。特ニ顔面羅斯ニ於テハ。吐藥ヲ以テ真ノ特應ノ藥ト稱スベシ。此病ノ第三期ニ至ル者ハ。極メテ猛劇ニシシ。性命ヲ殞スニ至ル者アリ。コレ世醫ノ知ル所ナリ。夫熱最劇盛ニシテ。煩悶譫言シ。或ハ劇キ狂躁ヲ發スルニ至テハ。是羅斯已ニ腦中ニ散蔓セル候ナリ。此時ニ至テモ。吐藥ハ尚無二ノ救生藥タルナリ。予屢驗スルニ。此症瀉血功ナキ者ニ。吐藥ヲ用井テ屢。駿速ノ勲ヲ奏スル者多シ。故ニ宜ク勇進シテ吐藥ヲ行フベシ。血積ア



ルカ如キ者モコレヲ恐ル、一勿レ。若夫一田ニシテ  
是ラザル者ハ。宜ク再コレヲ行フベシ。

驚口瘡

驚口瘡ハ特ニ吐藥ヲ要スルノ一病ナリ。蓋此病タル  
粘膜ノ機錯過セルニ因シテ。常ニ胃ノ分利機ノ失常  
ヲ兼子。然ク増息シテ胃中ニ及ヒ易シ。幼兒ニ在テハ  
常ニ輕キ下藥ヲ以テ足レリトス。然レモ若病頑固ナ  
ルニ至テハ。吐藥ヲ以テ最良最速ノ藥トナス。大人ノ  
驚口瘡ニ於ルモ亦然リ。

咳

此ニ咳ノ一種アリ。吾輩コレヲ胃咳ト名ヅク。其症々  
ル腸胃ノ機乖戾セル候ト。汚物鬱蓄ノ徵トヲ兼子。舌  
不潔ニシテ食思ナク。惡心アル等ニシテ。其本因實ニ  
腸胃系ニ捨ル者ナリ。此症ニ於テハ腸胃藥。解凝藥。緩  
下藥ヲ適應トシ。特ニ吐藥ヲ以テ最良治咳ノ藥トナ  
ス。世醫或ハ省セズ。數月間徒ニ尋常ノ聖京藥ヲ與フ  
ルヲナス。而シテ唯一吐藥以テコノ症ヲ除クニ足  
ル。

百日咳

夫百日咳ノ病タル。固ヨリ煽衝性ニ非ズシテ。又腸胃



性ニ非ズ。是上腹神經及肺神經ノ傳染性痙樣神經病ナルヲ。四十年前予已ニ予ガ痘瘡及小兒病論中ニ論著セリ。此病其初起ニ於テハ尚熱ト嗽衝性トヲ兼ヌルト雖。經過ノ際必其本性ヲ顯シ。痙性神經性トナルナリ。但常ニ其部ノ粘液分泌ノ機ヲ特異ニ侵シ。其分利ヲ増シ且稠厚ナラシム。此期ニ至テハ吐藥兩般ノ能ヲ以テ能。其主藥トナルナリ。即一ニハ有力ノ對衝トナリテ其痙性ヲ鎮靖シ。二ニハ鬱蓄セル粘膠液ヲ排泄スルノ良藥トナリ。且其分泌機ヲ改正ス。是蓋經驗ヲ以テ確定セル所ナリ。然ク此症ニ吐藥ヲ用井レ

バ毎回ノ吐後數日ノ間其症必輕快シ。發作減少ス。而シテ予ガ驗スル所ニ據レバ其始適應ノ鎮痙藥衝皮藥ヲ用井テ後吐藥ヲ與フルキハ其治甚易クシテ且速ナリ。

肺勞

英吉利人列乙獨肺勞ニ吐藥ノ能ヲ稱讚スト雖吐藥固ヨリ肺勞ヲ治スルノ藥ニ非ズ。特ニ其嗽衝性ノ症及其嗽衝期ニ於ル。或ハ血咳ノ素因アル者ニ於テハ共ニ大害ヲ致スベシ然レ氏ニ症アリ吐藥ヲ與フベシ。其一ハ則膿樣ノ肺勞嗽衝ノ徵ナク痰咯出シ難ク

肺勞喘息室塞聖藥



コレニ因テ熱ト煩悶ト共ニ増ス者ニ在リ。此症ニハ  
 屢吐藥ヲ施シテ。大ニ輕快ヲ致スベシ。其二ハ粘液性  
 肺勞ニシテ。其本因腹部ニ在リテ。消食系ノ乖戾ト其  
 鬱蓄トヨリ發スル者ナリ。是猶胃咳ニ於ルガゴトシ。  
 胃咳亦能。竟ニ粘液勞ヲ致ス。多シ。此症ニ於テハ。予  
 數回ノ吐藥ヲ以テ偉勲ヲ建シ。多シ。詳ニ予ガ曩著  
 七ル肺勞治則中ニ論載セリ。

喘息 窒塞聖藥

夫喘息ハ最治シ難キノ一病ニシテ。屢危險ニ至ル  
 アルハ。世醫ノ能知ル所ナリ。此病ニ於テハ吐藥亦他

ノ諸藥ニ超絶ス。其濕性粘液樣ノ症ニ在テハ。時時吐  
 藥ヲ與フレバ。假令全治ヲ得ザルモ。大ニ其發作ヲ輕  
 快スルヲ得ルナリ。又其乾性痙樣ノ症ニ在テハ。予  
 ガ知ル所ノ諸藥中。吐藥ヲ以テ功力最大ノ者トス。特  
 ニ間歇性ノ喘息。其發作劇甚ニシテ。瞬間ニ危篤ニ陷  
 ラシムル者ノ如キハ。實ニ吐藥ヲ以テ無雙ノ救生藥  
 トナスベシ。予ガ驗スル所ニ據レバ。此險症麝香阿片  
 ヲ用井テ功ナキ者ト雖。尚吐藥ヲ以テ完ク其痙ヲ鎮  
 靖シ。回復ヲ致サシムルヲ得ルナリ。

吐藥ノ此能ハ。窒塞聖藥即肺麻痺ニ於ルモ亦適應ス。



此症ハ其因卒厥ニ異ナラズ。唯卒厥ハ腦神經麻痺ヲ受ケ。此症ハ肺神經麻痺ヲ受クルヲ以テ異ナリトスルノミ。故ニ窒塞ノ危険甚シク。呼吸喘鳴スルニ至テモ。惱神ト覺機トハ常ニ所患ナキナリ。此症先刺絡ヲ行ヒテ後吐藥ヲ與フレバ。其功偉大ニシテ或ハ無ニノ救生藥トナルヲアヤ。

痢 霍亂

夫痢ヲ療スルニ方テ。其初起ニ於テ伊百加格安那ノ吐藥ヲ用井ルハ。是治療ノ要法ナリ。予ガ驗スル所。初起ニ此吐藥ヲ施シ。次ニ亞辣比亞護母ノ粘液ニ少量

ノ阿片ヲ加ヘ與フルノミヲ以テ。全治ヲ得ル者幾何ヲ知ラズ。且予ガ見ル所ニ據レバ。初起ニ施セル吐藥ノ功。大ニ他藥ヲ用井易カラシメ。其全治ヲ速ナラシム而シテ若コレヲ怠ルキハ。次後最良ノ藥ヲ與フルモ。其功然ク速ナルヲ得ズ。但此ニハ常ニ伊百加格安那ヲ施用スベシ。是此藥固ヨリ下利ヲ遏ムル能アリテ。少量ニコレヲ與フル片モ。尚能此功ヲ呈スヲ以テナリ。

霍亂ニ於ル又吐藥ヲ必要トスル症アリ。夫霍亂ノ療法。鎮痙藥ヲ以テ務メテ速ニ其過度ノ泄出ヲ遏止ス



ルヲ常則トス。然レモ或ハ治シテ後惡心飲食不化。膽汁樣汚物ノ候。殘留スル者アリ。是膽汁聚積仍存スルカ。或ハ再。生ズルノ候ナリ。此時ニ於テハ適宜ノ吐藥ヲ施スヲ以テ最良法トス。

儂麻質諸病

吐藥ノ功儂麻質ニ於ル。予未ダ多ク試驗セズ。蓋此病他藥ノ能治スベキ者多クシテ。且務メテ胃及消食諸器ヲ衝動セシメザルヲ欲スルヲ以テナリ。然レモ他人ノ試驗ニ據リテ。吐藥ノ實ニ儂麻質ニ峻功アルヲ信ズ。但宜ク先他藥ヲ試ミテ。其力及バザルニ至テ

吐藥ヲ與フベシ。是吐藥ハ貴要ノ消食系ヲ克制スル下甚シキヲ以テナリ。

精神錯亂

凡有形ノ能ヲ以テ精神錯亂ヲ治スルノ諸藥中。灌水法ニ次テハ吐藥ヲ以テ最有力ノ者トス。此藥能腦ノ機能乖戾セル者ニ。有力ノ對衝ヲ致ス。而シテ其腦ノ所患。特ニ黑膽病ニ於ルカ如ク。上腹神經及腹神經ノ機能廢絶スル者ニ兼子。且此腹部ノ機能廢止セル者。精神病ノ一大因タルヲ顯明ナルモ。吐藥ヲ以テ腹神經ヲ烈ク興奮シ。其機能ヲ復セシメ。コレニ因テ腦ノ



機能ヲ調正スル一。是其主法ニシテ。且其功偉大ナリ。  
 又胃ノ固有ノ覺機アリ。世人コレヲ説ク者少シ。予ハ  
 コレヲ胃神ト名ヅク。是饑ニ因テ現レ。食思ニ於テ更  
 ニ著ク。嘔ニ於テ最顯明ナル知覺ニシテ。其感應甚大  
 ナリ。何トナレバ饑ノ感觸タル。最劇ノ知覺ニシテ。其  
 甚シキニ至テハ。能ク全身ニ交感スルヲ以テナリ。是蓋  
 必然ラサル一ヲ得ズ。凡人類ノ世ニ滅絶セザル。世界  
 中生類ノ滅盡セザル。唯此胃神ト色欲ノ二者ニ因ル  
 ヲ以テナリ。然レバ此神ヲ興奮スルハ。錯亂セル人ヲ  
 シテ再已ニ復セシメ。再世ニ親交スル一ヲ得セシム

ルノ一大藥タリ。是此患者ニ饑法ヲ施シテ大功アル  
 所ナリ。而シテ嘔モ亦此神ノ知覺スル所ニシテ。恰饑  
 ニ反スト雖其能ニ至テハ則同。夫不幸ニシテ此病ニ  
 罹ル者。繆泄兒ミウゼイニノ時ヨリ以來。此法ヲ以テ治スル者  
 幾何カヤ。

又予ガ試験ヲ以テ其實ニ然ル一ヲ證スルニ足ル。啗  
 ニ黑膽病ノミナラズ。狂躁甚シキ症ニ於ルモ。吐藥ノ  
 勲實ニ大ナリ。耽飲譫妄ニ於ルモ亦然リ。更ニ自殺狂  
 アリ。予カ驗スル所ニ據レバ。毎回吐藥ヲ與フルノ後  
 自殺ノ念消除シ。其間瓦辣秩阿刺ト中和塩トヲ用井



テ全治スル者一ナラズ。

卒厥ノ麻痺

卒厥ノ發スルニ方テ。脈仍實。顔仍赤ニシテ刺絡必要ノ候アル者ニ於テハ。吐藥ヲ施スベカラズト雖。若シニ此候ナキ者ニ在テハ。吐藥實ニ有カノ刺戟興奮藥トナルノミナラズ。或ハ無ニノ回生藥タルコトアリ。然レモ若シ其施用。法ニ協ハザルハ。常ニ患者ニ大害ヲ致スノ虞ナラズ。亦以テ其死ヲ促スベシ。故ニ今此ニ其適應ノ症ヲ開列ス。

其一。卒厥其因單純腸胃性ナル者。譬へバ過食ノ後ニ

發シテ。惡心。吐。舌苔等アル者ノ如シ。此症ニハ吐藥ヲ以テ其根治ノ藥トナス。但脈實ニシテ多血ナル患者ニ在テハ。吐藥ヲ與フルノ前宜ク刺絡ヲ行フベシ。其二。多血卒厥。此症ニ於テ刺絡ヲ施ス後。脈鎮靖スト雖。其厥症ト昏睡ト共ニ醒復セザル者ハ。吐藥ヲ行フベシ。

其三。神經性卒厥。即沕乙様卒厥。此症ハ其初發ヨリ脈小ニシテ弱。顔紅ナラズ。盈張セズ。却テ萎衰スル者ナリ。此症初ヨリ直ニ吐藥ヲ行フベシ。

右卒厥ニ説ク所。亦以テ痺ニ準ズベシ。痺ニ吐藥ヲ施



シテ。有カノ活發ヲ致セシ。既ニ多シ。

初生假死

吐藥ハ予カ試験ニ據レバ。初生兒ノ生ヲ喚起シ。其衰弱沈伏セルヲ進行セシムルノ貴藥ナリ。蓋此ニハ要スル所呼吸ノ機ト血ノ運行トヲ一回催起スルニアルヲ以テナリ。而シテ直ニ横膈胸筋心肺ヲ興奮シ。其能恰器學ノ理ニ於テスルガ如キハ。吐藥ノ刺衝ニ如クモノナシ。又且其諸症多クハ胸臈ノ機能沈伏スルヨリ發シ。コレニ因テ致ス所ノ窒塞ハ。正ニ是粘液ノ充塞ノミニシテ。幼弱ノ嬰兒コレヲ排泄スルヲ能ハザ

ルニ因ルナリ。則所謂假死ハ即窒死ノミ然レバ其粘液ノ氣道ニ充塞セル者ヲ排祛盪滌スルハ。吐藥ヲ以テスルノ外實ニ他方ナシ。然ルニ嬰兒ノ生ヲ喚起スル諸藥中。世醫此一大藥ヲ數ヘズ。予豈異ザルヲ得ムヤ。

予今一例ヲ舉ゲテコレヲ證ス。是予ガ親ク驗シテ以テ其功ヲ確知セル所ナリ。一婦人兒ヲ産ム。二回共ニ兒體強實ナレバ。其生ル。片既ニ死セルガ如ク。又叫バズ。或ハ纔ニ嘔聲アリテ。呼吸知ルベカラズ。少間ニシテ竟ニ死ス。共ニ醫ニ謀リテ浴法。吹氣。摩擦。洗藥



等興奮ノ諸法ヲ行フト雖驗ナシ其第三産ニ至テモ亦然ラムトテ恐レ遂ニ予ヲ請テコレヲ謀ル予乃其因呼吸ノ障遏ニ在ルトヲ察シ宜ク吐藥ヲ施スベキ症ナルヲ決シ豫コレヲ備ヘテ以テ待ツ其分挽極メテ易ク見亦安全ナリト雖亦前見ノ如ク初唯弱キ頃聲ヲ聞クノミ又叫ハス且呼吸ナシ予乃兒ヲ温湯中ニ安カシメ海葱醋蜜一茶匙ニ伊百加格安那一瓜ヲ加ヘテ飲マシメ更ニ寒密列茶少許ヲ注入ス爾後六分時ニシテ再前劑ヲ與フ果シテ快吐ヲ發シ多量ノ粘液ヲ泄出ス次テ後呱呱叫喚シ呼吸初メテ起リ終

ニ救フトテ得タリ而シテ此兒即今健強ノ一男子トナレリ。此痘外ニ如藥ヲ用キテ全愈スル者幾何ヤト獨嬰兒ニ於ルノミナラズ大人ノ假死ニ於ル亦吐藥ヲ施スベキ症アリ世醫コレヲ遺ル者多シ夫前章既ニ説ケルガ如ク近ク心肺ノ傍ニ有力ノ刺衝ヲ起シ以テ其機能ヲ興奮スルノミナラズ又肺中ノ充塞ヲ排開スルノ功アルヲ以テ患者能ク嚥ム者ニハ宜ク速ニ吐酒石ノ吐劑ヲ與ヘ嚥ム一能ハザル者ニハコレヲ靜脈ニ注入スベシ。

小兒諸病



啞科ノ諸藥中予ガ見ル所ヲ以テスレバ吐藥ヲ以テ最第一トス夫小兒ニ於ル病毒上腹部ニ在リテ且有形物ナルト最多シ又其上腹神經ノ一系能病ヲ成シ又病ヲ治スルノ大感應アリテ各種ノ此系ニ感スルノ力能全身ニ達シテ其功極メテ速ナリ又小兒ハ大人ニ比スレバ吐スルト甚易シ此數件ハ是予ガ屢親驗スル所ナリ若夫吐藥ヲ以テ小兒ノ病ヲ治スル者ヲ列舉セバ以テ一帙ノ書ヲ成スベシ小兒ノ劇盛熱予其初起ニ於テ吐藥ヲ用井テ全治スル者幾何ヲ知ラズ又吐藥ヲ以テ小兒ノ胸患咽病ヲ除キ劇甚頑強

ノ咳ヲ鎮メ吐ヲ治シ泄瀉ヲ遏メ痢様ノ症ヲ治シ或ハ瘧等ノ如キモ其因上腹神經ニ在ル者ハ吐藥ヲ以テ全治スルト幾何ヲ知ラズ而シテ予カ經驗ヲ以テ定ムル所ノ準則ハ左ノ如シ凡小兒特ニ其一歳ノ間熱アリテ食思ナク舌不潔ナル者特ニ兼子テ吐噎氣及吐ヲ欲スル狀アル者ニハ吐藥ヲ與フルトヲ怠ルベカラズ此症アル者ニハ吐藥ヲ以テ瀉益ヲ成スベク或ハ能全治スルトヲ得ベシ若其初ニコレヲ怠レバ後他藥ヲ以テコレヲ償フベカラズ復吐藥ヲ施スト雖及バザルト多シ又咳或ハ呼吸困難等ノ症アル



モ亦以テ恐懼スベカラズ。此等ノ症又吐藥ヲ以テ全治スルコトヲ得ルナリ。

但一症アリ。吐藥ヲ禁ズベシ。即小兒熱アルニ兼子テ。昏睡状ノ症アル者是ナリ。此症ニ於テハ。腦中血積アルカ。或ハ焮衝性頭水ノ初候アルナリ。此症ニハ吐藥大害ヲ致ス。

其他ハ吐ノ劇動及コレニ兼子テ發スベキ頭部血積等ヲ恐レテ。吐藥ヲ停止スルコトナカレ。小兒ハ大人ニ比スレバ吐スルコト甚易シ。然モ愈幼ナレバ愈易シ。但シ吐ヲ起スルコト三四回若ハ四回ヲ超ユルコトナカレ。又

輕キ吐藥兼子テ解粘鎮痙ノ能アル者ヲ擇用スベシ。此ニハ吐藥ノ選擇ニ關ルコト多シ。凡歲最幼ナル者。既ニ吐ヲ欲スル候アルキハ。四分小時ゴトニ海葱醋蜜一茶匙ヲ把リ。寒密列茶ニテ送下スルヲ以テ足レリトス。更ニ大ナル兒ニ在テハ。海葱醋蜜ニ伊百加格安那ヲ加フルヲ良トス。蓋海葱醋蜜ハ粘ヲ解クノ能アリテ。常ニ大ニ吐シ易カラシム。若夫更ニ長セル兒ニ在テハ。少量ノ吐酒石ヲ加ヘテ。稍刺衝ノ力ヲ増加セシムベシ。但泄瀉セムトスルノ前徵アル者ニハコレヲ禁ズ。是吐酒石ノ性瀉シ易キヲ以テナリ。幼兒ノ吐



藥例スルニ次方ノ如シ。

伊百加格安那根末一刃

海葱醋蜜

覆盆子舍利別

淨水各四錢

右和シ。四分小時ゴトニ一茶匙ヲ與ヘ。吐ヲ發スルニ至ル。若既ニ吐スト雖尚足ラザル者ハ。半小時ノ後更ニ一茶匙ヲ與フ。此方一歳ノ兒ニ與ヘテ最良トス。更ニ長ゼル者ニハ。吐酒石四分ハノ一ヲ加フベシ。

服毒

夫毒口ヨリ入ル者。再コレヲ口ヨリ出サシムルハ。是最近ノ道路ニシテ。各人ノ能思ヒ到ル所ナリ。而シテ醫者速ニコレヲ診スルヲ得毒尚胃ニ現存スルヲ察スベキナリ。直ニ吐ヲ催起スル。是諸種ノ服毒ヲ療スルニ方テ。直ニ良能ヲ擬スルノ術ナリ。但此ニ一般ノ症ヲ分別スベシ。若夫服スル所ノ毒苛厲腐蝕ノ性ナル片ハ。吐スルヲ既ニ猛劇ニシテ。唯多ク乳汁及油ヲ與ヘテ。其吐ヲ扶クルヲ以テ足レリトス。然レモ或ハ全ク吐ナク。或ハ唯微シク吐セムトスルノ候ヲ現ス者アリ。是特ニ麻毒ヲ服スルノ後ニ於テ然リ。此



症ニハ。宜ク吐藥ヲ與フベシ。特ニ吐酒石ヲ以テ最良トス。但麻毒。為ニ胃ノ麻痺已ニ甚シク。吐酒石亦功ナキ者アリ。宜ク更ニ強キ者ヲ與フベシ。亞鉛礬是ナリ。○夫胃唧筒ゴキョウノ如キ。此等ノ症ニ用井テ能吐藥ニ換フベキヤ否。後入宜ク試験スベシ。但予ガ考フル所ヲ以テスレバ。毒已ニ胃ノ裏面ト其皺間ニ固著スルガ如キハ。胃ノ收縮ノ自然ニ因テ泄出スル者コレヲ器具ノ吸出ニ比スレバ。更ニ易ク且完カルベシ。

醫戒總目

總括

- 其一對病者之戒
- 其二對世間之戒
- 其三對同道之戒







ズ。更ニ名譽ヲサエモ擲テ。其最貴ノ目的ニ從事スベシ。目的トハ何ゾ。他ノ性命健康ヲ救全スルノ一途ノミ。然レバ醫術ハ仁ヲ體スルノ貴術ニシテ。コレヲ行ハムニハ。其意ヲ誠ニシ。世ノ普ク貴ブ所ノ者按ニ安逸ヲ利益等ヲ謂ヲ藐視スルヲ要ス。故ニ唯、純正篤行ノ人ノミ以テ醫タルヲ得ベク。又唯若キ醫ノミ其業ニ於テ幸福ヲ見ルベキナリ。何トナレバ則唯若キ醫ノミ其胸中。其世ニ在ル所ノ目的ヲ知り。自遙ニ尋常苦樂ノ外ニ超絶スルヲ覺ユルヲ以テナリ。○其心ヲ純正ニ

シ。其徳ヲ世ニ行ヒ。務メテ博クコレヲ施スハ。是醫ノ世ニ在ル所ノ目的ナリ。嗚呼醫ノ業ヲ舍テハ。何レノ處ニカ更ニコレヲ達シ易キノ地アラムヤ。何トナレバ醫ノ業タル。此目的ヲ達スベキ機會極メテ多ク。又且コレヲ行ハザルヲ得ザレバナリ。俱コレヲ達スルニハ。必盡私利ヲ捐テハ。道ニ從フニ非ザレバ能ハザルノミ。○故ニ醫ノ業務タル。宜ク中心誠意ニ發シテ。而シテ其行フ所。思フ所ト相協フヲ要スベシ。其宜ク行フベキ所ノ事ハ。樂テコレヲ行ヒ。表行中心ト一致スルヲ得テ。而シテ始メテ其幸福ヲ望ムベシ。



○嗚呼庸醫或ハ名利ヲ以テ其勞ノ目的トナス者アリ。是已ニ悖リ已ノ職ニ反スルナリ。然レバ身ヲ終フルマデ其願フ所ヲ得ズ。其勞ヲ酬ユルヲ得ズ。遂ニ其業ノ已ニ酬イザルヲ以テ。其業ヲ卑賤トスルニ至ル。嗚呼コレ自其真賞ヲ悟ラザルニ由ルノミ。

以上數句ノ議論能醫家脩身ノ學ヲ盡スニ足ル。但醫家別ニ脩身ノ學アルニ非ズ。唯其行聖賢行フ所ノ如キヲ得ルヲ以テ。醫ノ最良ノ行トス。而シテ其律トナシテ醫ノ常ニ守ルベキ者次ノ如シ。凡汝ノ術ヲ行スニ方テハ宜クコレヲ以テ汝ノ業ノ最大目的ヲ達スルヲ務ムベシ。目的トハ何ゾ他ノ生命ヲ保全シ他ノ健康ヲ回復シ他ノ痛苦ヲ緩解スル是ナリ。○此一

律ハ是吾輩常ニ胸中ニ銘記スベキ所ニシテ。術ヲ施スニ方テ。假令險難ノ際ニ臨ムトモ。此律ニ從テ以テ大道ヲ失ハザルヲ得ベシ。○今此律ヲ以テ本トシ。次ニ醫家ノ警戒ヲ開列ス。其戒三アリ。即病者ニ對スル戒。世間ニ對スル戒。同道ニ對スル戒。是ナリ。



其一對病者之戒

醫其術ヲ行フニ方テ。宜ク唯病者ヲ視ルベシ。切ニ其  
 貧富大小ヲ顧ルヲナカレ。凡痛苦最甚シク性命最危  
 キ者。コレヲ第一等ノ病者トス。其他ハ醫ノ思フ所ニ  
 任セテ可ナリ。世醫或ハ病者ノ勢位ト貧富トニ隨テ  
 コレヲ輕重スル者アリ。是未醫治ノ最美重賞ヲ知ラ  
 ザルナリ。予深クコレヲ憐ム。夫一握ノ黄金モコレヲ  
 貧士雙眼ノ感涙ニ比セバ何物ゾ。細ニ察セヨ。彼ハ貧  
 士ハ醫ニ謝セムト欲スルニ言ナク。酬イムト欲スル  
 ニ物ナケレバ。唯一身ヲ醫ニ委子テ。自終身不脱ノ負

債者ト謂フ者ナリ。若夫富戸ハ自家ノ金玉ヲ以テ其  
 性命ヲ買得シ。更ニ復醫ニ謝スベキノ理ナシト謂ヘ  
 リ。却テ知ラズ自感戴ノ深意ナキキハ。貴貨モ其價ニ  
 値ラザルヲ。又知ラズ此感戴ノ情ナキキハ。醫ノ勲  
 勞モ工人傭夫ノ勞ニ類スルヲ。夫貧人病ニ罹リ。故  
 舊モ悉コレヲ捐ツルニ至テ。醫持コレガ為ニ無二ノ  
 友タルヲ屢コレアリ。此時ニ至テハ。病者ノ醫ヲ視ル  
 ヲ。實ニ菩薩ニ遇フガ如シ。醫是ニ於テカ其仁愛ノ情  
 ヲ以テ。病者ノ望ヲ既ニ消スルニ興シ。又其回生ノ術  
 ヲ以テ。活發ノカヲ血中ニ注入スベシ。







未術ヲ盡サルヲ悟ルモ。祇悔憐ノ意ヲ生スルノ  
こ。感恨止ミ難キノ苦惱ヲ起ス。ナシ。其故ハ當時能  
為シ得ベキ所ノ術ヲ盡セルヲ以テナリ。但切ニ輕浮  
ヲ謹ミ。草率ヲ戒メ。虚飾ヲ去リ。特ニ己ノ固執スル所  
ニ僻シ。或ハ試験ヲ好ムノ心ヲ止メ。以テ宜ク行フベ  
キ所ヲ行ヒ。其職ヲ虚セザルヲ要スベシ。若否ズシ  
テ妄行セバ。必<sub>ズ</sub>後來遺憾忍ビ難キノ苦ヲ受クベシ。  
但才能ト學術ノ二件ヲ以テハ。未<sub>ズ</sub>足レリトスベカラ  
ス。醫ノ業タル其素行ニ關ルヲ亦大ナリ。蓋其世人ニ  
容ラレ。其信任ヲ得ルハ。專<sub>ニ</sub>素行ニ由ルナリ。何トナレ

バ醫ノ學術ハ。世人ノ能測リ知ル所ニ非ザルガ故ニ。  
必先<sub>ニ</sub>其素行ヲ以テ醫ヲ品セザルヲ得ザレバナリ。  
故ニ學術超絶ナラズト雖。唯其素行ニヨリテ洪福ヲ  
享クルヲ得ベク。又才學特技ノ醫ト雖。素行正シカ  
ラザルハ。終ニ世ニ知ラレズ。或ハ却テ粗工庸手ノ  
名ヲ得ルヲアリ。然レバ醫タル者。其容止亦宜ク其業  
ノ貴重ナルニ協フヲ要トス。○其大目ヲ舉ゲテコ  
レヲ曰ハシ。誠實友愛端正ニシテ虚飾ナク。輕淡ニシ  
テ俚褻ナラズ。其言行共ニ輕浮ナラズ。瑣細輕淺ノ事  
故ハ率<sub>ニ</sub>輒許容シ。而シテ法令ヲ出スニ方テハ。堅執シ



醫 丹  
テ許サズ。言一タビ發シテ而シテ改メズ。憐恤周至ニ  
シテ思慮清淨ニ。其話説甚多カラズ。又沈黙ニ過ギズ。  
而シテ特ニ新聞奇説ヲ誇張スルコトナク。常ニ病者ノ  
ミニ注意シ。細事ト雖謹慎シテ遺ルコトナク。看人及  
病室有ル所ノ諸件ニ意ヲ用井。其姿態鄙俚ナラズ。浮  
華ナラズ。又倨傲ナラズ。必安静沈深ニシテ。志意動キ  
易カラザルヲ要トス。其故ハ唯此安静沈深ノ態。以テ  
病者ノ信任ヲ得ベキヲ以テナリ。○醫或ハ時様ノ服  
飾ヲ用井。或ハ奇詭ノ説ヲ唱へ。或ハ誇誕夫ノ賣藥者  
流ヲ學テ。以テ聞達ヲ求ムル者アリ。是特ニ當今少壯

醫輩ノ通病ナリ。然レ凡聞ヲ求ムルハ信ヲ得ルト大ニ異ニシテ。聞ヲ  
求メテ却テ信ヲ得ルヲ妨グルコトアリ。而シテ唯信以  
テ永久ノ福ヲ得ベシ。夫聞ヲ得レバ能其人ヲシテ一  
時ニ顯揚セシメ。或ハ大ニ其業ヲ盛ニス。ト雖。世人新  
奇ニ趨ルノ情忽ニ止ムルハ。顯譽盛業隨テ衰廢スル  
コト。猶虹霓ノ頓ニ消スルガゴトシ。而シテ沈靜誠實更  
メズレテ勉ムル者ハ。却テ久ク世ニ顯レザルコトアリ。  
是他ナシ。久シテ後始メテ貞固ノ人ノ信愛ヲ得レバ  
ナリ。但コレニ因テ又後來永久ノ幸福ヲ願フベシ。



病者ノ信ヲ致スニ必要ナルノ一事ハ經驗日記ノ著作ナリ。歎スベシ。當今壯年ノ醫輩。多クハ怠リテコレヲ行ハズ。○日暮テ萬籟靜息シ。精神鎮靖ナルニ方テ。醫宜ク再病者晝間ノ症狀ヲ追想シ。其病ノ經過ノ間切要ナル所ノ症狀ヲ筆記シ。其變換ヲ録シ。又其發病ノ因治療ノ法等。已ノ考案ヲ載セ。其投施セルノ藥劑ヲ記シ。再諸件ヲ熟察スベシ。○但此業ハ毎夕ノ定課トナシテ。一夕モコレヲ行ハザルコトナカルベシ。○夫夜間靜寂ノ時ニ於テ。病者ノ症狀及治法等ヲ熟考スレバ。晝間騷擾ノ際思フ所ト異ニシテ。更ニ一新ノ考

案ヲ得ルコト鮮カラズ。蓋夜間靜寂ノ時ハ。我が内生按ニ消食呼呼吸行等ノ機ヲ總稱シテ内生ト謂フ又コレニ對シテ言語動作意識等ノ機ヲ外生ト謂フトリ。寤覺スル時ナレバ。其考索スル所。此時ニ於テ始メテ深ク我が内生ニ透徹シ。真智ノ區域ニ入ルコトヲ得ルナリ。其故ハ凡事我カ最内ニ感徹シ。我コレヲ知ラザルキモ。心常ニコレヲ思フ按ニ夢寐ノ中ニモコトガ如キニ至テ。始メテ我其事ニ全熟シ。コレニ因テ大發明ヲ得ルニ至ルヲ以テナリ。○人曾奈端西洋古昔ノ星學家ノ名ニ向テ。君何ヲ以テ其異常ノ大發明ヲ得シヤト問ヒケレバ。答ヘテ我常ニコレヲ思フノミト曰ヘルトゾ。



肢體ノ勤勞ハ假令<sup>レ</sup>黽勉ヲ極ムト雖唯是ノミヲ以テ  
 ハ良<sup>ク</sup>五ノ地ニ到リ難シ。唯其事ヲ意識ノ最内ニ記刻  
 スルノ後始メテ良エトナルベキナリ。凡<sup>レ</sup>療法善ク其  
 病ニ應セムニハ必一病ゴトニ新ニ其治法ヲ考定ス  
 ルヲ要トス。一治法ニシテ而シテ能ク通シテ數病  
 者ニ應スル者ハ未<sup>ダ</sup>コレアラズ。漸<sup>ク</sup>ニ其治法ヲ考定ス  
 故ニ予ハ此日課ヲ以テ啻ニ信ヲ得ルノ良策トナス  
 大<sup>ニ</sup>テ大<sup>ニ</sup>テ醫術ヲ行フニ於テ其術ニ大且全ヲ欲ス  
 ル者缺クベカラザルノ要務トス。古昔ノ名醫<sup>ハ</sup>爾法  
 歌弗<sup>レ</sup>毘堙<sup>ル</sup>兒<sup>ハ</sup>忽弗<sup>レ</sup>滿<sup>ル</sup>斯<sup>ハ</sup>突魯<sup>ル</sup>連<sup>ル</sup>等<sup>ハ</sup>皆此日課ヲ行

ヒ。且其鴻益アルヲ稱ス。以テコレヲ證スベシ。○此  
 業更ニ大益アリ。其故ハ此課ヲ行フノ間自積テ一部  
 ノ經驗書ヲ得ベクシテ其集ムル所皆己ノ親驗スル  
 所ナルヲ以テ自其行フ所ノ治法ヲ顧ミ其建議ト治  
 法ト年ヲ經テ漸改マルヲ回想シ大發明ヲ得ルヲ  
 アレバナリ。尚且病者ニ在テハ其利益最大ナリ。何ト  
 ナレバ數歳ノ後ニ至テモ醫病者ノ曾患<sup>テ</sup>フル所ノ病  
 ヲ審檢シ其體質ヲ詳明シ且彼此ノ症狀ニ於テ偉功  
 アリシ藥材ヲ詳記スルヲ得レバナリ。是蓋病者ニ  
 利アルヲ淺小ナラズ。



病者ヲ診問スルモ亦一ノ要件ナリ。○若夫單ニ病者  
 ヲ一看スルヲ以テコレヲ診問ト名ヅケ。其數幾回ヲ  
 數ヘテ以テ醫家用心ノ疏密ヲ論ゼバ。醫診問スルノ  
 間ハ幾時ニシテ可ナラムカ。○古賢森墨爾滿曰ク噫  
 喜頭腦ハ足ノ如ク疾走スルヲ得ズト。疾キヲ得ハ  
ルモ考按ハ走ルガ如ク夫此ノ如ク行走問候スルハ。  
速ナルヲ得ザルヲ云猶平時ノ存問ノ如シ。何ゾ治術ニ利アラムヤ。○若夫  
 病者ヲ診問スルノ真訣ハ。宜ク安静徐緩ニシテ精神  
 ヲ鎮定シ。其間太速ナルベカラズ。醫病家ニ在ル間ハ。  
 必始終病室ニアリテ。專病者ノ症狀及其所為ニ注意

スベシ。診問此ノ如キノ法ヲ得テ始メテ其目的ニ協  
 フヲ得。特ニ二般ノ利アリ。即其一ハ是ニヨリテ醫  
 ノ用心ノ切ナルヲ病者ニ知ラシメ。以テ其信任ヲ  
 得ベキニアリ。其二ハコレニ因テ醫ト病者ト親交始  
 メテ密ナルコトヲ得テ。一種未審ノ交感ヲ此ニ生シ。  
 病者ハ醫ヲ信スルヲ最深ク。醫ハ病者ヲ察スルヲ最  
 至ルヲ得ベキナリ。○此交感ハ實ニ特異ノ精神力  
 ニシテ。此感ヲ生シテ後始メテ病者固有ノ性ト。其内  
 部ノ状態トヲ察スルヲ得ベク。又其病患ヲ除カム  
 ガ為ニ。良能實ニ如何ノ藥ヲ要スルカトイフヲ知



ルベク。又此間患者ノ心思フ所ノ事。直ニ醫ノ心ニ徹スルコトヲ得ルナリ。○夫此ノ如キ診問ハ。一回ト雖尋常急卒ノ診問數回ニ勝ルコト多シ。特ニ慢性病ノ如キハ。頻數ニ診問スレバ。醫其病狀ニ見慣レテ。却テ明辨詳察ヲ妨グルコトアリ。是所謂樹木ヲ數ヘ盡クシテ林ヲ見ザルノ理ナリ。此時ニ於テハ。診問ノ日ヲ延ブルコト一二日ナルヲ最良ノ法トス。コレニ因テ視ル所一新ヲ得。前日曾省セザリシ事件モ。今ハ詳明ナルコトヲ得ルナリ。○但少壯ノ醫。或ハ自尊大ニシテ屢診問セザル者アリ。コレ戒メザルベカラズ。總テ病候ヲ明知

シ。且病者ノ信ヲ失ハザルガ為ニハ。屢病者ヲ看ルヲ以テ第一ノ要務トナス。○唯無益ニ屢診シテ病者ニ厭苦ノ意ヲ生セシメ。或ハ却テ醫ノ鄭重ニ過グルヲ誇ラシムルニ至ルコトアリ。是宜ク警ムベキ所ナリ。帝ニ病ヲ治スルノミナラズ。不治ノ病ニ值テ其生命ヲ保全シ其痛苦ヲ緩解スルハ。是醫ノ職ニシテ又其一大勲勞ナリ。然ルニ醫或ハ其治スベカラザルヲ診決スル片ハ。勇進ノ意ヲ失ヒテ。遂ニ病者ヲ怠慢シ。或ハ棄テ、省ミザル者アリ。是惑ノ大ナル者ナリ。此症ニ於テ醫既ニ其術ヲ施ス所ナキ片ハ。醫ヲ要スル所



ナシト雖。豈人ニシテコレヲ憐マザルベケムヤ夫痛  
 苦甚シキ者ト雖。治スベキノ望アルキハ。亦コレニ堪  
 へ易シ。然レモ既ニ治スベキノ望ナク。劇痛苦悶堪へ  
 難キノ患者ニ於テハ。是醫ノ宜ク友愛憐恤スベキノ  
 最大ナル者ナリ。此時ニ於テ病者ヲシテ其生ヲ厭フ  
 ニ至ラザラシメ。其將ニ消セムトスルノ望ヲ増息セ  
 シメ。假令其生ヲ救ハザルモ。コレヲ慰スルハ是仁ノ  
 大ナル者ナリ。况病既ニ危険ヲ極ムト雖。吾輩未其救  
 フベカラザルコトヲ必スベカラズ。經過ノ間或ハ體機  
 一變シ。或ハ外物ノ變換ニ因テ病機改革シ。再一方ヲ

行ヒテコレヲ救フベキニ至ルコトアルニ於テヲヤ。○  
 故ニ予ハ次ノ二句ヲ以テ醫ヲ行フノ間必要ノ一律  
 ト人。曰ク望ヲ失フコトナカレ。勇ヲ失フコトナカレ。夫望  
 ハ慮ヲ生ゼシメ。精神ニ新案新試ノ工夫ヲ起サシム。  
 是ニ因テ能ハザルノ事ヲ成サシムルコトアリ。凡人  
 既ニ望ナケレバ復思ハズ一意任從シ。精神萎死スル  
 ハ是其必由テ致ス所ナリ。乃病者ハ必死ヲ免レズ。其  
 故ハ救フ者先死セルヲ以テナリ。○故ニ病者正ニ死  
 スル時ニ方テモ。醫未棄テ去ルベカラズ。假令コレヲ  
 救ヒ得ザルモ。其苦惱ヲ減シ。安ジテ死ニ就カシムル



トヲ得ルキハ。コレヲ德惠ト謂ハザルベケムヤ。  
夫人ノ生ヲ保全シ。務メテコレヲ長カラシムルハ是  
醫ノ最大目的ナリ。故ニ凡ソノ生ヲ短縮スル所ノ事  
ハ醫タル者誓テコレヲ為サズルナリ。○此一事蓋輕  
ズベカラザルノ要務ナリ。醫宜ク毫釐モコレヲ犯ス  
ベカラズ。若夫輕忽ナルキハ其禍災測ルベカラズ。然  
レモ世醫コレヲ戒ムルコト未能。嚴ト密トヲ極メザル  
ナリ。○若夫不治ノ病ヲ得テ苦惱スル者自死ヲ願フ  
ガゴトキ。或ハ妊婦ノ病危殆ニ至ラムト欲スルガ如  
キニ遇テハ善人ノ胸中ト雖。此不幸ノ患者ヲシテ少

時モ早ク。此苦惱ヲ免レシメ。或ハ其胎兒ノ命ヲ以テ。  
母ノ安全ニ充テムコト。是帝ニ不仁ニアラサルノミナ  
ラズ。亦醫ノ職タル所ナラムト謂フニ至ルベシ。○此  
言頗理アルニ似タリト雖。是實ハ謊言ナリ。而シテ此  
言ニ從フ者ハ極メテ殘毒可罪ノ徒トス。何トナレバ  
此言ニ據レバ。全ク醫ノ本體ヲ失フヲ以テノ故ナリ。  
夫醫ハ生命ヲ保全スル一事ノ外ニ為スベキノ事ナ  
ク。又敢為スコトヲ得ベカラズ。而シテ其為ス所ノコト能  
人ノ為ニ幸福タルベキカ。或ハ不幸タルベキカ。或ハ  
其事貴ブベキカ。或ハ賤ムベキカトイフハ。是醫ノ關



リ知ル所ニアラザルナリ。醫若一タビ前議ヲ許可スルガ如キハ。其由テ致ス所恐ルベク。且醫ハ世間最險ノ人トナスベキニ至ル。其故ハ醫若一タビ此戒ヲ破リ。其死ヲ促スヲ以テ必要トナスヲアルキハ。其他病ヲ療スルニ方テモ。亦人命ヲ貴シトセザルニ至ルベキヲ以テナリ。

但、醫ニ其術ヲ以テスルノミナラズ。言ヲ以テモ亦能患者ノ命ヲ短縮スルヲアリ。而シテ醫固ヨリ故ニコレヲ為スニ非ズト雖。或ハ知ラズシテ死ヲ促スニ至ルヲアリ。故ニ常ニコレヲ戒慎シ。凡患者ヲ畏縮セシ

メ。其勇ヲ減スルノ事件ハ。悉コレヲ忌避スルヲ。是醫ノ貴靈ナル職務ナリ。故ニ凡病者ノタメニ有害ニシテ。或ハ其命ヲ短縮ヤシムベキノ事ハ。毫髮モ醫ヨリコレヲ出スベカラズ。其言語及其體格姿態必精爽ナルヲ要スベシ。夫病者自死生ヲ疑フニ至テハ。醫ヲ見テ以テ己ノ死生ヲ決セムト欲シ。醫ノ眼光如何醫ノ容姿如何ヲ見テ。以テ其判決スル所ヲ察スルナリ。而シテ恐悶驚ノ三者ハ。最危ノ殄毒ニシテ。直ニ生力ヲ萎憊セシムルヲハ。是必定ノ一事ナリ。又望ト勇トハ。最大活潑ノ藥ニシテ。其力或ハ能諸藥ニ超絶シ。若



コレナキハ。最良ノ藥ト雖其力ヲ失フ。是亦必定  
 ハ一事ナリ。故ニ醫宜ク患者ヲシテ望ト勇トヲ失ハ  
 ザラシムルヲ務メ。寧其病ヲ輕易ニシ。諸ノ危険ヲ  
 掩匿シ。若危険愈増スニ至テハ。愈其勇ヲ顯シ。特ニ疑  
 惑決シ難キノコアルニ方テハ。其内情ヲ現ス。ナカ  
 ルベシ。若夫日後醫ノ病ヲ視ル。輕キニ過グルトナ  
 シ。或ハ診察ヲ誤レリトスルノ責ヲ塞ガムガ為ニハ。  
 醫宜ク患者ノ親眷ニ一封ノ書ヲ贈リ。以テ病ノ真態  
 ヲ明告スベシ。特ニ輕忽怠リ易キ者ニ在テハ。病ヲ記  
 スル。輕カラムヨリハ。寧重カルベシ。○醫或ハ病者

ニ其病ノ險ナルヲ告ゲ。或ハ其當ニ死スベキヲ告ゲ  
 テ匿サズル者アリ。豈惡ムベキノ甚シキナラズヤ。又  
 病者ノ親眷醫ニ向テ其生死ヲ詰問スルガ如キハ。豈  
 コレヲ乘ハズト謂フベケムヤ。凡豫生死ヲトスルハ  
 醫ノ關リ知ル所ニアラズ。人亦コレヲ醫ニ問フ。ヲ  
 得ベカラズ。夫死ヲ告グルヲ死ヲ與フルト名ヅク。醫  
 モト生ヲ保全スルノ業ニシテ。安ゾ死ヲ與フルヲ  
 為スベケムヤ。○若夫患者尚理スベキノ事アルヲ以  
 テ名トシ。其病ノ真態ヲ知ラムヲ求ムルモ。醫未直  
 ニ其生望ヲ絶タシムベカラズ。予嘗ニ病者ヲ知ル。名



醫モ其懇求ノ切ナルガタメニ動カサレ。遂ニ其病ノ  
 不治ナルヲ告グ爾後日ナラズレテ病者自盡セリ。  
 帝ニ生命ノミナラズ。更ニ貴ブベキ所ノ名譽ト雖患  
 者ノ生命危殆ナルニ至テハ。醫コレヲ此ニ賭セザル  
 ヲ得ズ。此ニ一條ノ險途アリ。是蓋醫術中最難ノ事  
 ニ屬シ。真智ニ非ザルヨリハ迷誤シ易ク。唯最貴ノ真  
 理ヲ思フ者ノミ。能誤ラザルヲ得ベシ。其險途ト云  
 ハ。即醫ノ心謂ヘラク。病者ヲ救フベキ藥唯一アリ。而  
 シテ其應否疑フベク。試用危険ナリ。若夫此藥適應セ  
 ザルニ至テハ。人其罪ヲ悉醫ニ歸スベシ。真理ニ晦キ

者ハ則曰ハム。其コレヲ殺セルガ如クナラシメムヨ  
 リハ寧病者ノ自死スルニ如カズト。而シテ其救生ノ  
 試験ヲ怠ルベシ。然レモ真正ノ醫ハ唯患者ノ有益ヲ  
 思フノミニシテ。其他ヲ省ミズ。乃謂ラク。醫若其譽ヲ  
 貴ブ。病者ノ性命ヨリモ重キハ。是即私利ヲ思フ  
 ニシテ。醫術ノ本意ニ悖ルヲ甚シ。又謂ラク凡療法其  
 當否ヲ顧ミテ。而シテ後ニ施スベキ者ニ非ズ。唯其目  
 的ノ在ル所ニ隨フノミ。故ニ唯其職ト情意トノ可否  
 スル所ニ隨ヒ。成否如何ニ至テハ。醫ノコレヲ憂フベ  
 キ所ニ非ズト。乃此一藥ヲ用井テ以テ病者ノ救否ヲ



試ハルコト亦難カラズ。而シテ其適應スルニ至テハ。其好意ノ勞大勲ヲ呈シ。又不幸ニシテ病者死スルニ方テハ。更ニ大ナル功勲ヲ得ルナリ。何トナレバ此時ニ於テハ。醫其病者ニ無上ノ寶ヲ贈レルヲ以テナリ。而シテ世人其醫ヲ誇ルコト愈多ケレバ。醫ノ意内自其常人ニ卓越スルヲ知ルコト亦愈多シ。此ノ如キ時ハ。世人ノ褒賞ヲ得ルニ比スレバ。其中心ノ喜賞ニ大ナリ。○凡<sup>レ</sup>醫病ヲ療スルニ方テハ。世人ノ謬論惑説ヲ受クルコト免レズ。故ニ且ク豫病者ト醫ト其一半ヲ負フベシト定ムベシ。其當否ト世評トハ醫コレヲ如何トモ

スベカラズ。故ニ始メヨリ其毀譽ニ關ルコトナカルベシ。但コレヲ良醫ニ問ハミ。彼應汝ニ説クベシ。其療法當ラザルノ症ニ於テハ。其術ヲ盡シ勞ヲ致ス。適中セル症ニ比スレバ更ニ多ク。又コレニ因テ中情ノ忠ヲ盡ス。更ニ大ナルコトヲ。○施術ノ際。醫ノ能スベキ所ノコトハ。唯自其職ニ負カザルヲ知ルノ一事ノミ。而シテ是既ニ以テ足レリトスベシ。誰カ能<sup>レ</sup>此重賞ヲ奪フコトヲ得ムヤ。若夫世人此意ヲ省セズ。誤テ詆謗スル者アルモ。醫自別ニ重賞ノ在ルアリ。豈憂フルニ足ラムヤ



凡醫ニ其施治ヲシテ艱難ナラシム。且其業ヲシテ勞煩ナラシムル者ハ有形ノ病ニ在ルヨリハ却テ人ノ意思各異ナルニ在ル者多シ。○諸般ノ謬見其智愚ノ差別性質天稟其他百般ノ事故相聚リテ以テ善事ヲ妨グルコト多シ。是ニ於テ醫又通俗ノオナキコトヲ得ズ。但醫ノ業タル此ノ如キ際ニ會フコト最多シ。故ニ稍其素質アル者ハ直ニ此學ヲ了得スベシ。○人ヲ知リ情ヲ察シ機ヲ觀ルハ即此學ノ師ナリ。以テ百般ノ妨礙ヲ破リ其目的ヲ達スルニ足ルベシ。其律ノ如キハコレヲ舉グルコトヲ得ズ。假令コレヲ舉グルモ亦實ニ益

ナシ。其コレヲ湏ツ者ノ如キニ至テハコレアルモ必利スルコトナカルベシ。○唯此ニ病者ノ大類ヲ舉グ。即恐懼スル者。輕忽ナル者。信任スル者。不信ナル者。順從スル者。遲疑スル者。多説スル者。狐疑スル者。半醫トイフベキ者。是ナリ。○其狐疑ト半醫トノ二ハ最治ヲ行ヒ難シ。其故ハ此患者其思フ所ヲ告ゲズ。又良策ヲ受クルコトヲ好マズ。却テ自其治策ヲ醫ニ商ラハトシ。或ハ藥方ノ如キモ亦自増減スルニ至ルヲ以テナリ。○此ノ如キ患者ニ遇テ汎則トナスベキハ當其病ノミナラズ。病因等ノ説ニ至ルマデ全クコレヲ醫ニ依托



セシメ更ニコレニ關ルナカラシムルニアリ。  
 藥方ヲ記スルノ一事又最重ノ務ニシテ醫ノ常ニコ  
 レヲ忽ニシ易キ所ナリ。此一事ハ醫診察ヲ畢リテ後  
 最終ノ商量ニシテ又日後醫ノ見解如何施術如何ト  
 イフコノ一證トナルベシ。○若夫輕忽ニシテ誤寫ア  
 ル氏ハ以テ病者ニ禍ヲ来シ醫ニ毀ヲ招クコトアリ。○  
 故ニ此一務ハ宜ク精神ヲ奮起シ最大詳密ヲ加ヘテ  
 行フベキノ事トス。而シテ醫タル者宜ク不易ノ律ト  
 ナスベキ者左ノ如シ。凡藥方ハ記シテ後必コレヲ再  
 讀スベシ。按ニ彼邦ノ醫診察ヲ畢リテ後方書ヲ作リ  
テコレヲ病家ニ與ヘ以テコレヲ藥舖ニ致

レ其藥ヲ購ハシムルコトヲ常習トス  
 危險ノ藥ハコレヲ患者ニ授與スベカラズ或ハ授ク  
 ルモ其量生命ノ危害トナラザルヲ以テ限トス。墾子  
 ニ阿片四錢或ハ八錢ヲ盛レル者予嘗コレヲ病者ノ  
 室ニ見タリ恐ルベキノ甚シキ者ナリ。若夫不幸ノ事  
 アラバ其誰カコレヲ為ス者ゾ。豈醫ノ過ニ非ズト謂  
 ハムヤ。  
 凡醫タル者祕方ヲ鬻クベカラズ。若夫患者コレヲ醫  
 ニ商ルモ醫コレヲ許スベカラズ。蓋醫已ニ其方ヲ知  
 ラズシテ如何ゾ其良否ヲ判決スルコトヲ得ベケムヤ。

醫方

本草綱目



若夫齊ク大目的ニ協ヒ。又害ナキ片ハ。貴價ノ藥ヲ舍  
 テ賤價ノ藥ヲ擇ビ。他邦ノ藥ヲ舍テ國産ノ藥ヲ擇ブ  
 ベシ。○務メテ病者ノ費ヲ減シ。無益ニコレヲ増ス  
 ナカラシムルハ。又病者ノ苦勞ヲ省キ。即病ヲ輕カラ  
 シムルノ一事ニシテ。且國ノ出費ヲ減スルハ。其臣夕  
 ル者ノ職ト謂フベシ。夫ノ貧窮ノ病者ニ向テ此用心  
 ヲ怠リ。已ニコレニ生命ヲ與ヘテ。而シテ其以テ生ス  
 ベキ所ノ資ヲ奪フガ如キハ。殘毒惡ムニ堪ヘタルノ  
 一事ナリ。ハレハ。貴價ノ藥ヲ用ルルハ。其  
 此一事ニ於テハ。醫管ニ好意ヲ用井ルノミナラス。温

柔ヲ以テ病者ノ貧ニ注意スルモ。又其病者ニ大惠  
 ヲ施スベシ。但貧民已ニ其貧ヲ明告スル者ハ。是國ノ  
 公惠ヲ受クベキ者ナルガ故ニ。醫コレニ惠ムニ由ナ  
 シ。但辱貧トイフベキ者アリ。是甚憐ムベキノ倫ナリ。  
 即其健全ナルノ日ニ在テハ。尚酸辛ニ堪フベクシテ。  
 而シテ病患ニ遇フテハ。則資ニ乏ク。實ニ貧ナリト雖。  
 コレヲ明告スルヲ欲ヒザル者是ナリ。○其コレヲ  
 知ル者ハ。殆<sup>ト</sup>醫ノミニシテ。而シテ醫又能此不幸ヲ救  
 フヲ得ベシ。持ニコレヲ救フテ。而シテ貧士ヲシテ  
 其救ハル。コヲ知ラシメザルヲ得ルモ。是實ニ

醫書 丹 廿 天眞樓藏板



一大惠ナリ。○予此ニ唯一策ヲ舉グ。醫コレニ因テ能  
 其費ヲ減スルコトヲ得。又徒施スルニ非ザルヲ以テ。病  
 者ヲシテ貧民ノ類ニ入ラシメザルコトヲ得ルナリ。其  
 策ハ則先藥舖ノ稍善ヲ好ミ。且貧ナラザル者ニ會約  
 シ。方記上某ノ記號アル者ニ於テハ。利息ヲ捐テ、藥  
 ヲ嚮クベキコトヲ定ムルニ在リ。コレニ因テ能。病者ノ  
 費ヲ減ズルコト。三分一若クハ半ニ至ルベシ。○此策  
 ヲ行ヘバ。以テ艱辛ヲ救ヒ。能表聞ヲ完シ。且其衷情ヲ  
 達スベシ。○夫唯此ノ如キコトヲ得テ始メテ。コトヲ真  
 惠ト謂フベシ。○凡惠ヲ施スハ。其施スル方ニ關ルコト

大ナリ。幸ナル哉。醫ノ業ニ於ル能然ク惠ヲ施シ。管ニ  
 右手ノ為ス所。左手ハコレヲ知ラザルノミナラス。窮  
 士貧民ヲシテ其德惠ノ由テ來ル所ヲ知ラズシテ。只  
 コレヲ天資ニ歸セシムルヲ得ルコト。夫唯此ノ如クニ  
 シテ。而シテ其惠ヲ受クル者モ。コレヲ施ス者モ。共ニ  
 其本旨ヲ達スベシ。

其二對世間之戒

世情ノ亡ニ關ルノ重キハ。醫ニ於ルヨリ甚シキハナ  
 シ。蓋醫ハ民中ノ一人ニシテ。民聲皆醫ヲ可否セムト  
 欲ス。故ニ醫宜ク民聲ヲ得ルコトヲ務ムベシ。而シテ其



コレヲ得ベキノ方策ヲ怠ルベカラズ。夫ノ少壯ノ醫  
 輩世ノ容否ヲ藐視シ。俗慮ノ外ニ超絶スト謂ヒテ。以  
 テ自尊大スルガ如キハ。是虚飾無實ノ尊ナリ。若夫智  
 者真正ノ尊大ハ。其目的ヲ達スルヲ最完キニアリ。然  
 レモ其目的ヲ求ムル者ハ亦其方策ヲ望マザルヲ  
 得ズ。夫醫ノ本目的ハ病ヲ治スルニ在リ。而シテ醫其  
 術ヲ行スル機會ヲ得ルヲ愈多クシテ。其目的ヲ達ス  
 ルヲ亦愈完シテ。以テ世ニ德惠ヲ施スヲ得ベシ。然  
 レモ其施術ノ機會ヲ得ルノ多カラムヲ欲セバ。世  
 人ノ好意ヲ得ルヲ以テ最要トス。故ニコレヲ得ルヲ

ヲ務メ。又コレヲ失ハザルヲ勤ムルハ。又實ニ醫ノ  
 常ニ守ルベキ所ノ一戒ナリ。世ノ間ニ其能ク其  
 其學術特技ナルカ。或ハ特異ノ幸福ニ因テ醫大ニ世  
 ニ顯レ。齊民コレヲ非議スルモ。尚擇舉セラル、一固  
 ヲリ無キ所ニ非ズト雖。是希有ノ一事ナリ。通常醫ノ  
 世ニ顯ル、ハ。漸世ノ好評ヲ得。世人ヲシテ竟ニ其最  
 貴ノ寶ナル生命健康ヲ以テ。コレヲ己ニ托スルニ至  
 ラシムルニ在リ。  
 其良策ハ則帝其病者ニ信ヲ盡シ。細心ニコレヲ看察  
 スルノミナラズ。剛毅方正ニシテ節適。素行篤信ニシ



テ沈静ナルヲ。前條説ク所ノ如ク。言語思慮共ニ禮節アリテ。伶俐端正。且其侶ヲ擇テ交リ。常ニ實事ニ於ルノミナラズ。亦更ニ見聞ニ注意スベシ。○特ニ少壯ノ醫ハ。宜ク知ルベシ。醫ハ世人ノ共ニ注目スル所ナルヲ。夫各人若其病ハニ方テハ。必身ヲ醫ニ托セザルヲ得ズ。故ニ常時醫ノ能否ヲ詳知セムヲ欲スルハ。固ヨリ當然ノ事ナリ。故ニ各人醫ヲ可否セムト欲スルモ亦宜ナリ。○夫ハ其異ノ幸。一因テ醫大ニ世醫ハ齊民ニ遇スル所ノ業ニシテ。世間ニ其朋匹ヲ求ムベキ者ニアラズ。周通ハ即醫ノ基本ナリ。而シテ意

思偏ナラズ。素行僻ナラザルハ是其大幸ナリ。○故ニ醫ハ交友ヲ擇ビ。特深ノ誼ヲ締スベカラズ。却テ其業ノ唯人ノミヲ視テ足レルコトヲ幸トスベシ。○若夫講説著作ヲ以テ。健康ヲ保テ疾患ヲ治スルノ方ヲ弘メ。謬惑ヲ解キ是正ヲ勸ムルヲ勉ムルハ。是須要ノ一事ナリ。而シテ少年ノ醫世ニ裨益ヲ致シ。且其名ヲ顯シ。以テ世ノ良聞信任ヲ得ルガ為ニ。實ニコレ的確ニシテ稱スベキノ道ナリ。○但宜ク細心注意シテ此ニ從事スベシ。夫ノ世人久慣ノ惑ヲ解キ。舊習ノ謬ヲ辨ズルガ如キモ。其説苛刻ナルキハ。徒ニ世ノ嫌



疑ヲ招キテ。其事ヲ改正スルヲナリ。空ク惡ミヲ取ル  
ト多キヲ以テナリ。凡、輕佻ト失口トハ。少壯醫輩ニ在テ最危ノ性ナリ。此  
性ハ醫ニ於テ最害アリテ。且其職ノ本體ニ戾レル者  
ナリ。何トナレバ世人醫ニ向テハ。已ニ其赤裸ヲ露呈  
セザルヲ得ズ。又他人未曾知ラザル所ノ禁忌密事  
ト雖。コレヲ醫ニ明サズルヲ得ザレバナリ。然レバ  
世人多クハ好テ魯鈍ノ醫ニ任托シ。輕佻失口ノ徒ヲ  
嫌忌スルナリ。○夫ノ輕佻ノ長舌ヲ以テ。不解ノ仇敵  
ヲ招ク者幾許ゾヤ。○凡、人實害ヲ惡ムヨリハ毀嘲ヲ

惡ムヲ甚シ。

沈黙ハ醫ノ第一必須ノ性ナルベシ。其故ハ醫ノ業々  
ル。最密ノ禁秘ヲ聞キ。最辱ノ懺悔ヲ聞カザルヲ得  
ザレバナリ。而シテ又コレニ由テ單ニ病者ノ福ノミ  
ナラズ。一家ノ福悉醫ノ掌握ニ在ルガ故ニ。其信任ヲ  
欺負シ。コレヲ他ニ漏泄スルハ。コレ最闇愚ト謂フベ  
シ。但、宜ク實事ヲ謹戒スベキノミナラズ。宜ク更ニ表  
見ヲ忌避スベシ。故ニ務メテ他ノ病者ノ事ヲ説カズ。  
又其問ヲ受クルモ簡短不定ヲ以テコレニ答ヘ。且  
其家人ノ話説ニ交ルヲ最稀ナルヲ佳トス



醫更ニ博徒酒客蕩子ノ名ヲ避クベシ。是等ノ性全ク其業ニ反戾セルガ故ニ。必世ノ信ヲ失フニ至ルベシ。奕ハ以テ病者ヲ鄭重スルノ意ヲ奪ヒ。酒ハ醫ノ智ヲ奪ヒ。嫖ハ其性ノ純トヲ奪フ。是皆醫ノ必須ノ性ナリ。

故ニ醫ハ娶リテ而シテ善ク家ヲ修ムルヲ以テ利アリトス。コレニ因テ營ニ多ク婦人ノ信ヲ得ベキノミナラズ。更ニ又幾多ノ虚誇ト譴責トヲ塞グベシ。凡利ヲ好ムノ表見ハ。醫ノ宜ク忌避スベキ所ナリ。此一事能醫ヲシテ卑劣ナラシメ。無媒ノ病者ヲ驚愕セ

シメ。以テ富ヨリモ更ニ貴キノ譽ヲ失フニ至ラシム。其ニ對同道之戒

此戒ニ般アリ。一ハ常時ニ於テコレヲ守ルベク。一ハ共ニ病者ヲ療スルノ時ニ於テコレヲ守ルベシ。其常時ノ戒ハ彼此相敬スルヲ以テ第一ノ律トス。若夫然ルヲ能ハザルモ。必能相忍ブヲ要スベシ。夫人ヲ議スルハ最難ノ事ナリ。而シテ醫ヲ議スルヲ極難トス。然レバ世人醫ノ巧拙ヲ議スル。尚且コレヲ允シ難シ。醫已ニ其術ノ難キヲ知り。又コレヲ議スルノ難キヲ知テ。而シテ其同道ヲ詆謗シ。復コレヲ愛惜セズ。



恭敬セズ。更ニ其過失ヲ標舉シ。他ヲ卑シテ而シテ已  
 ヲ尊重セシメムト欲スルハ。惡ムベキノ一事ナリ。  
 蓋予深ク自戒ムト雖。予ガ心ニ感スル所。筆未コレヲ  
 盡ス。能ハズ。凡同道ヲ卑スル者ハ。即其道ヲ卑スル  
 ナリ。而シテ又已レヲ卑スルナリ。○夫世人醫ノ過失ヲ  
 知ル。愈多ク。醫ヲ疑フ。愈多ケレバ。又總テ醫術ニ  
 信ヲ減スル。愈多カルベシ。而シテ普ク醫ニ信ヲ減  
 スルヨリ。又各名ノ醫ニ信ヲ減スベシ。故ニ又其他醫  
 ヲ詆謗スルノ醫ニ於ルモ亦然リ。又且醫ノ良否ヲ論  
 シ。其過失ヲ摘舉スルハ。固ヨリ世人ノ好ム所ニ非ズ。

醫自コレヲ題起シ。毀訾ノ端ヲ啓クニ非ザレバ。誰カ  
 此ニ嗷嗷タラムヤ。故ニ一醫若他醫ヲ毀訾レコレニ  
 因テ已レヲ貴重ナラシメムト欲スルキハ。唯其無智短  
 見ニシテ徒ニ私利ヲ思フノ弊ヲ露スノミ。○又人ノ  
 短ヲ言ハザルハ聖賢ノ明戒ニシテ。他ノ過ヲ舉グル  
 ハ一ノ凶徳ナリ。故ニ醫若他醫ヲ賤辱スルキハ。思慮  
 アル者ハ却テ其醫ヲ卑ムベシ。何トナレバ。其辱ヲ受  
 クルノ醫ハ唯醫タルノ拙ヲ露スノミ。而シテ其コレ  
 ヲ辱ムルノ醫ハ。人タルノ道ヲ失フヲ以テナリ。嗚呼  
 其道ヲ失ハムヨリハ。寧其術ニ拙キノ尚勝ルニ如カ



ズト謂ハザラムヤ。○又諺ニ曰ク。人ヲ量ルニ尺ヲ以  
 テスレバ。人又將ニ其尺ヲ以テ汝ヲ量ラムトスト。凡  
 人ヲ汚辱シテ憐マザルキハ。人ノ汝ニ於ルモ亦將ニ  
 然ラハトス。是至公ノ定理ナリ。○故ニ言行恭敬ニシ  
 テ思慮温厚ナルハ。各人ノ美飾ナリ。特ニ少年ノ醫ハ。  
 コレニ因テ又良友ヲ得。且明誨ヲ聞キ。然ク表行ノミ  
 ナラズ。更ニ其學術ニ於ルモ。亦大ニ進益スル所アル  
 ベシ。○又醫術ハ未。其完成確實ノ度ニ到ラザルコト遠シ。故ニ  
 諸般各異ノ療法ニ於テ。其當否ヲ審決スルコトヲ得ズ。

又此ニ博通不易ノ律書ナク。各人自己ノ見ヲ以テ生  
 機ヲ講明シ。治法ヲ建立スルコト固ヨリ自在ナリ。唯其  
 智慮ト經驗トニ悖ラザルヲ要スルノミ。又病ヲ療ス  
 ルニ方テ。諸般各異ノ方ヲ以テ。能其目的ヲ達スベク。  
 一見シテ相反セルノ方法モ。コレヲ病者ニ施スキハ。  
 生機ノ抵抗ニ因テ。能同一ノ目的ニ協フコト。是各人ノ  
 知ル所ナリ。蓋生體ノ良能ハ。吾術ノ如ク狹隘ナル者  
 ニ非ザルニ因テ然リ。否ザレバ甲ノ藥コレヲ乙ノ藥  
 ノ後ニ用井テ。如何ゾ適應スルコトヲ得テ。而シテ能良  
 驗ヲ奏セムヤ。○要スルニ唯實驗ト。其コレヨリ得ル



所ノ法則ノミ。實ニ施治ノ際無二ノ真ニシテ又無二ノ常ナリ。故ニ醫生體ノ外物及藥石ニ感應スル所ノ恒性ヲ經驗スルヲ愈久ク愈切ニシテ。又外物藥石ノカヲ商量シ。且コレヲ應用スルヲ愈熟スレバ。其術ニ於テ愈完シ。○然レバ各人各其流アリテ。診察ノ法亦各其自得ノ者アリ。少年ノ醫ハ特ニ其最新最完ノ時ニ遇ヒ。且其學フ所條理正シキヲ得ルヲ以テ幸福ト為スベシ。但、他獨自真理ヲ知ルト謂フベカラズ。又宜ク他ノ說ニ敬從シ。特ニ老年經驗ニ熟スルノ醫ヲ敬スベシ。凡、各人自百事ヲ知レリト謂フ者ハ。正ニ是

纔ニ學術ノ門ニ入レル者ニシテ。其疑慮ヲ起シ。知ラザルヲ以テ知ラズト為スニ至テ。始メテ進學ノ確徵。又其無二ノ良策トス。是宜ク少年醫輩ノ常ニ思フベキ所ナリ。

少年醫輩ノ老醫ニ於テ宜ク敬重スベキ所ノ事件ハ。則其經驗ノ煉磨。其觀察ノ習熟。其巧技ノ廣博確實。其真正必要ノ幹事ト無實假虛ノ枝末トヲ分別スルノ見解。其施治ノ巧妙。其汎則ヲ以テ各異ノ病者ニ配合スルノ術。蓋、術ハ經驗ノ本體ニシテ學テコレヲ兼子得ベカラズ。唯習熟ニ因テ得ベキノミ。テ其各異ノ病者各異ノ症狀ヲ細別スルノ術。其藥石



ヲ辨識シ。且其微妙特異ノ性ヲ審察スルノ學。及其百  
 事ニ於テ合處應時ヲ察シ。適度ヲ定ムルノ工夫ニア  
 ルベシ。少年ノ醫宜ク禮ヲ守リ學ヲ好ミ。且聞ヲ愛シ  
 テ。以テ其信任友愛ヲ得ム。ヲ務メ。又險難ノ場ニ至  
 テハ。コレニ商議シ。コレト周旋シテ。以テ其學術ヲ進  
 マシムルヲ得ベキノミナラズ。又少年必須ノ扶掖  
 ヲ得ベキナリ。○但老醫ノ少年輩ニ於テ宜ク愛賞ス  
 ベキ所ノ者ハ。則其所見ノ清新ナル。其造化ト技術ト  
 ヲ觀察スル。下ノ最新ナル。其精力ノ壯盛ナル。其學ヲ  
 好ムト。其真ヲ求ムルト。其黽勉勤勞スルト。其善意ノ

勤勉。及其學術條理アル等ニアルベシ。又宜ク思フベ  
 シ。他亦應ニ此路ヨリ進ムベカリシ。ヲ。而シテ又其  
 初學ノ難カリシ。ヲ。幾許ナルヲ顧想スベシ。故ニ好意  
 ヲ以テコレニ遇シ。愛スルヲ慈父ノ如クニシ。其經驗  
 ノ寶ヲ頒チ與ヘ。而シテ其信從畏憚ナキノ時ニ於テ。  
 徐ニ其過失ヲ省セシメ。且コレヲ寬宥シ。又コレヲ世  
 人ニ掩フベシ。特ニ共ニ病ヲ療シ。及商議ノ時ニ於テ  
 ハ。細心注意シテ愛護ノ意ヲ加フベシ。何トナレバ。此  
 ニハ少年輩ノ幸福實ニ老師ノ一言ニ關ルヲ多キヲ  
 以テナリ。



又醫術ニ於テハ。毫髮ノ情景能其事態ヲ變レ。且輕重  
 ヲ革メシムルハ。是必定ノ一事ナリ。故ニ他醫ノ治法  
 可否ヲ審決セムニハ。直ニ其症ニ臨ミ。當時諸般ノ情  
 景ヲ目觀スルニ非ザレバ能ハザル所ナリ。  
 然レバ醫若其同道ヲ論斥スルキハ。則其智慮ノ足ラ  
 ザルト。好意ナキトヲ露シ。或ハ更ニ惡意アルコトヲ露  
 スナリ故ニ世人若醫ニ向テ前醫治法ノ當否ヲ問フ  
 キニ方テモ。純正ノ醫ハ宜ク説クベシ。醫術ニ於テハ  
 其現症ヲ詳認スルニ非ザレハ。絶エテ其法ノ當否ヲ  
 論ズベカラザルコトヲ。若夫然ク逃避スルコト能ハザル

キハ。宜ク説テ前醫ノ良ニ歸スベシ。是蓋難カラザル  
 所ナリ。夫此ノ如クニシテ醫能已ヲ敬シ。又其術ヲ敬  
 スルコトヲ得ベシ。  
 其第二ノ戒即病者ニ對スル同道ノ戒ニ於テハ。先其  
 會同商議ノ事情ヲ論セザルコトヲ得ズ。  
 總テ治法ノ商議ハ。其必利アリヤ否。疑フベキ所ナリ。  
 特ニ會同ノ伴侶多キキハ。最然リ。若夫其説皆同キキ  
 ハ。幾多ヲ總合スルモ益ナク。又其説實ニ異ナルキハ。  
 却テ迷惑ヲ生シ易ク。治法未完ヲナシ易ク。特ニ動  
 バ意氣愛憎ノ此ニ混シ易キが故ニ。コレニ因テ或ハ



病者ト治法トヲ鄭重スルノ意減少シ。且良醫ニ在テ  
 モ其紛紛ノ多説ニ眩シテ。其意專ナラズ且完カラザ  
 ルヲ致スニアリ。是最惡ノ一事ナリ。然レモ亦商議  
 ヲ要用トシ。或ハ必須トスルノ症アリ。即其病甚合併  
 シ且頑強ニシテ。醫ユ、ニ疑ヲ生スルカ。或ハ患者迷  
 ヲ取リテ醫ヲ信ゼザルニ至ルカ。或ハ其治法應否疑  
 フベク試用危険ナルカ。又ハ醫ノ心ニ鄭重ヲ取リテ。  
 自信任シ難キ者等ナリ。  
 但商議實ニ病者ノ利トナラムニハ。次ノ如クナルヲ  
 必要トス。

會同ノ數ハ多カラザルヲ良トス。大抵二人ニシテ足  
 レリ。多キモ三人ニ過グベカラズ。其醫ハ則固ヨリ仇  
 敵ト聲鳴スル者ナラザルベシ。又頑強不服ノ徒ナラ  
 ズ。又一流ニ僻スルノ輩ナラザルベシ。而シテ共ニ皆  
 經驗ニ熟シテ其業完成シ。且能他人ノ説ヲ了解シ。其  
 意ヲ會得スルノ性アル者ヲ取ルベシ。  
 其專議スベキ所ノ事ハ則其病ノ徵候原因性情ニシ  
 テ。次ニ其治則ヲ建ツルニアリ。但其方法ヲ處スルニ  
 至テハ。會議者ノ關ルベキ所ニアラズ。必コレヲ本醫  
 ニ任ズベシ。



凡會議ノ醫常ニ基本トナスベキハ。唯一ニ病者ノ安  
 全ヲ思ヒテ。他事ヲ顧ミズ。自己持異ノ性ト。其學術ト  
 ヲシテ。共ニ此一目的ニ湊合セシムルニ在リ。凡醫輩  
 商議スルニ方テ。此大本ヲ遺忘スルコトナキハ。復爭  
 論毀訾誤解等ヲ生スルコトナクシテ。商議常ニ能ク病  
 者ノ利トナルベシ。彼ノ衆醫會議スルモ。只互ニ病者  
 ノ信ヲ奪ハムコトヲ務メ。曾托ノ醫ニ疑ヲ生セシメ。且  
 互ニ相容ルコトナク。只各其說ヲ主張スルガ如キハ。  
 コレ此大本ヲ忘ルニ因ルナリ。○故ニ其商議ハ。初  
 メ病者ヲシテ聞カシムルコトナク。議定テ後其能解ス

ベキ所ノ事ヲ聞カシムベシ。若夫商議ノ為ニ招カレ  
 ル所ノ醫家。従前ノ療法ヲ以テ錯レリト謂フモ。コレ  
 ヲ病者ニ知ラシムルガ如キハ。是極メテ愚昧ニシテ。  
 又病者ノ為ニ殘毒ナルノ一事ナリ。○其商議スルニ  
 方テハ。醫各恭敬シテ其考按ヲ告ゲ。且コレヲ證明ス  
 ベシ。而シテ其說互ニ相合セザル所アラバ。各其私ヲ  
 捨テ扞格ヲ舍キ。務メテ己ノ說ヲ明辨シ。且他ノ論ヲ  
 翫味シ。或ハコレニ順從シ。或ハ從フコト能ハザルハ。  
 コレヲ論シテ能ク他ヲシテ己ノ論ニ從ハシムベシ。○  
 蓋其爭議ヲ起スノ因。唯其見解ノ異ナルト。語言ノ別

世二  
 天眞婁反



ナルトニ在ルト多シ。特ニ當令ハ最此誤多シ。唯宜ク其説ヲ以テ他醫ノ言ニ譯スベシ。乃其異議ヲ消スルニ足ル。○若夫彼ニ特愛ノ藥アリテ。且病者ノ害ニ至ラザル者ハ。宜クコレヲ許從スベシ。以テ其私説ヲ主張スルノ癖ナキコトヲ明スニ足ルベク。又其大頭目ニ於テ彼ノ已ニ從フコトヲ冀フベシ。○然レモ若其考按或ハ治法終ニ相合同スベカラザルハ。唯コレヲ病者ノ擇ニ任スルノ外ニ他途ナシ。宜ク病者ニ問ヒテ。其最信任セル醫ノ治法ニ從ハシムベシ。○又病者其依托ノ醫ヲ舍テ竊ニ他醫ニ商ル者アリ。錯

レリト謂フベシ。而シテ其醫此時ニ於テ病者ト商議シ。且其ヲシテ前醫ニ疑ヲ起サシメ。以テ己ノ術ヲ售ラハト欲スル者アリ。最惡ムベシ。○純正ノ醫ハ蓋此ノ如キコトヲ得ズ。若夫病者竊ニ醫ニ商ルニ方テハ。宜ク先病者ノ請已ニ違ヘルコトヲ知ラシメ。且直ニ依托ノ醫ニ問ヒテ其療法ノ説ヲ聞クニ非ザレハ。終ニ其當否ヲ論ズベカラザルコトヲ明スベシ。但醫ノ宜ク禁戒スベキ所ノ一事ナリ。即只其病論治法ヲ以テ患者ニ告グルニ在リ。是關係スル所ナキニ似テ而シテ否ズ。醫ノ心固ヨリ惡意アルニ非ズト雖。コレニ因テ能



病者ノ心ニ迷惑疑貳ヲ起シ。依托ノ醫ニ困難不快ヲ致スベシ。然レド醫實ニ病者ノ誤治ヲ受クルヲ知ルキハ。彼ノ醫術ノ最大目的ナル病者ノ救済アリ。何ゾ同道ヲ愛惜スルニ暇アラハヤ。乃宜ク其大目的ニ從事スベシ。而シテ病者ノ生命危険ナルニ於テハ。遲疑スルヲナク直ニ其宜ク行フベキ所ヲ行フベシ。前醫若思慮正平ナルキハ。如何ゾ敢テコレヲ惡マムヤ。若夫其症危険ナラザル者ハ。宜ク前醫ヲ招キテ商議ヲ行フベシ。又病者他ノ事故ヲ以テ商議ヲ欲セザルキハ。醫宜ク病者ニ告グルヲナク。竊ニ書ヲ前醫ニ贈

リテ。更ニ勝レルノ治法ヲ告グベシ。コレニ因テ醫病者ニ對シ。且同道ニ對スルノ職ヲ併セ全シ。此ヲ害スルヲナクシテ。而シテ又能彼ヲ救フベシ。○又病者既ニ前醫ヲ信ゼズ。改メテ特ニ他醫ニ托セムヲ決スルニ方テハ。醫復コレヲ辭スベカラズ。前醫亦コレヲ惡ムベカラズ。凡ソ人ノ信任ハ自恣ニシテ。感戴スベキ者ナルガ故ナリ。但此時ニ於テハ宜ク敬愛ノ意ヲ失フヲナク君子當行ノ事ヲ行フベシ。

若夫病者一醫ヨリ他醫ニ轉ズルキハ。常ニ其轉ズルノ故ヲ告グルガ為ニ。從前ノ惡候ヲ枚舉スベシ。而シ



テ醫或ハコレヲ從前治法ノ不良ニ因ルト説ク者アリ。是哀ムベキノ一事ナリ。純正ノ醫ハ益然ラズ。是等ノ事。當ニ同道ニ對シテ不敬ナルノミナラズ。又病者ノ為ニ殘忍ナルコトヲ知ル。其故ハ病者若其實ニ然ルコトヲ聞カバ。當其徒ニ時ヲ失ヒ。勞ヲ致スコトヲ悔ルノミナラズ。又其病ヲシテ更ニ險惡難治ニ進マレメシコトヲ悲ムベキヲ以テナリ。然レバ有心ノ人ニシテ。而シテ如何ゾ是等ノ事ヲ病者ニ告ゲ。以テ其餘年ヲ苦惱セシムルコトヲ得ムヤ。故ニ此ノ如キ件ニ至テハ。其同道ニ對スルノ職ヲ舍タモ。尚病者ニ對スルノ職ヲ

以テ前醫ノ治法ヲ可允シ。病者ノコレヲ疑フ者ハ。務メテコレヲ辯解シ。治ノ中ラザルヲ以テ他ノ事故ニ歸セシムベシ。

醫戒終



杉田先生著述刊行書目

解體新書 鷓齊先生譯

全五冊

同重訂

鷓齊先生譯  
大槻盤水先生重訂

全十三冊

眼科新書 錦腸先生譯

全六冊

瘍科新選

錦腸先生譯

全五冊

外科要方 錦腸先生閱

全一冊

備荒草木圖

錦腸先生閱

全三冊

濟生三方 梅里先生譯

全四冊

濟生備考

梅里先生述 初輯

二冊

嘉永三年庚戌三月刻成

京都寺町通松原下町

勝村 治右衛門

萬延二年辛酉孟春再刻

大坂心齋橋北江二丁目

秋田屋 太右衛門

江戶日本橋通二丁目

山城屋 佐兵衛

江戶淺草茅町二丁目

須原屋 伊八

發行書林



