



青溪先生医譚

乳岩

癭瘤

金瘡

破傷濕并風濕

缺唇

痔漏

舌疽

癩疔

癰毒

鎖陰并鎖肛

鎖吻

失榮

淋漏

産后諸症
瘰癧

流注
瘰癧証

主月脇先生醫譚

乳山岩

和洲五條某者母乳山岩ヲ患フ初メ見ルニ核ノ大ク梅核ノ
如ク腋下ニ塊アリ麻菜ヲ服サシ凡ソ二時許ニメ割核ノ
重サ六錢五分扱八日目ニ発熱且大腫痛ヲナス因テ越
水附ニ轉ズ是乃破傷濕六七貼ニメ甚効アリ又乳ノ
廻ニ赤色ヲナシ腋下亦同色龙手腫氣ヲ生ズ是即
流注ノ証ニメ越水附ノ場ニ金瘡并ニ諸瘡瘍
共ニ如此ノ証アリ全ク外襲ノ事也皆主之凡ソ

上瘰癧大腫ヲオモ
ハ破傷濕ナリ処
ヲ轉メ赤色ヲ為
者ハ流注ナリ
乳山岩ハ腋下凝
ヨリハ胸背へ引
強ク凝者ハ患
兆ナリ
治療之后ハ不日
結核スルアリ免
痛治后ハ患人ニ
手ヲ止メズ凝ヲ
トカスヨウニスベシ

破傷濕ニ越ホ附ヲ用テ古人未茂手段也ヨク々究理ス
ベシ

又右ノ証ニ似テ紛レ易キ証アリ即纏腰瓜之此症ハ腋下及ヒ
腰ノ辺ニ赤色行雲ノ如シ横ニ纏ス其赤色ノ暈ノ中小
瘡數多生ジ瘡頭黄色ニメ膿氣アルガ如シシカレドモ
膿ハナシ水氣ナリ且瘡痛ムイナク肉中深ク疼或中ノ
疼者ナリ是破傷濕トハ別ナリ荆防敗毒ノ行ク処也乳
岩ノ治療中ニ托々此証ヲ発ル也或既温ヲ発ル者モアリ
其変証甚多シ尽ク述ベガタレ

乳岩初取テ平愈ス今年又再発ス其形及肉ノ大ヲ杏ノ如シ

根ヲ結ビ三角針ヲ以テ四五処刺シ蜜陀條ヲサス四五日ニ
腐リ取レルナリ此等ノ事一定ノ術ニ非ス臨機應変イ也
術変化不言是必再発スル者也難治ト知ルベシ都テ及肉
再発ノ者ハ不治トス

乳岩療后風当スルト動氣ナド発リ心下痞鞭不能モノハ
多虚状ノ者ナリ証ニ隨テ意ヲ用ベキ也柴胡姜桂半

浮杯ノ場合モアリ

乳岩ヲ患フル婦人經行ナキヨフニナレハ療治六々敷也經行凡
時ハ安シ妊娠スレバ核卒カニ大キクナルナリ
乳岩ニ散聚湯ヲ試切スルニ夏枯草ノ精汁ニメ煎服スレバ

甚ヨク應スル者ナリ或碎岩散兼用メ可也

乳岩再発スル者ハ凡ソ百日許ニメ聚ル者也或一年モ聚ル
モアリ或三年五年八九年ニメ再発スル者モアリ其三年
五年ニメ再発スル者ハ散聚湯碎岩散ノ美常ニ能用
ユレハ再患ノ無キ者ニ然ニ再発スレバ兼用ト保剛ノ不及
者ナリ

乳癭大坂ノ一婦人乳癭ヲ患フ其源ヲ尋ルニ五年以前
乳癭ヲ患ヒタシク治セズ遂ニ漏トナリ衆医療スレモ効
ナシ麻沸ヲカケ切開クニ漏ノ中ニ皮ヲ生ズ尿道ノ如ク成
テアリ凡ソ乳癭ハ乳癭ノ治術拙ヨク癭ト成ナリ且患

者ノ誤ナヨリ成ル者アリ何レモ失治ノ者ヨリ成ルト知ルベシ

癭瘻

江州ノ一僧八月下旬末テ診ヲ請フ耳下ヨリ觀骨ニカケ
下ハ腮ニ及ブ其大寸如椗耳下ハ堅硬ニメ觀骨ノ方ハ
ヤシ軟也先生云是附骨ニテ運轉セズ不治即チ

脂瘻ト云々

粉瘻 背脊顔ニ多或首筋等ニ多シ

脂瘻 手足ニ多シ肉浅ク筋多キ処ニ生ス

肉瘻 耳ノ前后肩井ノ辺ニ多ク出ル聚テ生ルナリ

血瘡 骨瘡

面部等凡テ上部ニ多シ皮至テ薄キモノ
無常処而無運轉膜ト骨トノ間ニ酸瘡液
ノ聚リ生スル者也次第ニ長大ニ成ルニ隨テ骨
モユガム者變化多端也

石瘡

希ナリ 二証共ニ消長アリ氣ヲ付見ルベシ

氣瘡

氣瘡ハ手ヲ下スベカラズ難治也然レ凡以湯液治
者間有之

髮瘡

此ハ別物ニ非ズ失張肉瘡ニモ毛髮ノ延シト
歎メ旋環メ有者ナリ

血瘡此ハ瘡ノ内ニ血充滿メ動脈アル者也根本ヲ麻糸

ニテ緊扎シ金瘡針ニ鼠脚錠ヲ添テ其穴ニ刺ナリ
尤モ針ヨリ大ナル錠ヲカスベシ五日程間ヲヘテ又二
錠程刺セバ腐茶ノ膿眩モ無キナリ又一日程モノ又二
三錠モカス三條ヨリ以上ハ刺ベカラズ若膿眩ノ無人ハ
五六條モ刺スベシ丈モ能々見定テ后ニスベシ右ハ糸ヲ毎
日シムレハ自然ト血ノ通ヒ乏クナリテ瘡駈黒色ニナリ堅
クナル也毒條ヲカスニモ動脈ナキ処ヲ見定テ刺スベシ
若動脈或血脈ニカス時ハ至テ膿眩甚キ者ナリ初ヨ
リ終迄糸許ニテ仕上ル也肉中ニ瘡ノ根脚ノ肉殘ル
時ハ必具切タル跡ヨリ又醜肉スル者アリ此ハ破歎ニ扱

毒ヲ貼ス此肉中根脚ヲ見合テ採取ル一手術口授
ニテ得ガタキ一アリ黃連解毒其外証ニ隨テ用某ス
ルナリ預防其眩眩

骨癰ハ額又ハ頬辺ニ多生ズル之或臂膝杯ニ生スル者モ
アリ是骨薄膜トノ間ニ瘰癧液溜リ凝スル昔年釋
府之儒生顔及ビ項ニ瓦堅癰刺取之實如石ナリ

先生曰今年江別日片邑泉者眼胞ニ李子ノ如キ者出ヅ
是石癰也

浪華ノ妓女如此骨癰觀骨ニ生ズ先生ロヨリ針ニ

上齧ノ根ヨリ内へ刺シ大ニ瘰癧液ヲ出セ此觀骨ノ高キ
ハ素ノ如シ即チ手術ヲ以テ平ニ押附枕木綿ヲ以テ巻
木綿ヲシテ置テ數十日ニメ愈然レト又年大癰ヲ包シ
故愈テ后モ皮垂カガリ顔ユガミアリ是ニ一奇方數月用
テ顔顔古ニ復シ一々年許ニメ再ヒ美婦人ト成ル
妙可歎可稱 具項一人紀州海土郡ヨリ同

症ノ骨癰ノ婦人末ル同術ニテ全ク愈
癰ヲ治セント欲セバ飽迄贅肉ヲ取尽スベシ不煎則后
日及シ花瘡トナル也世ニ癰ヲ誤治メ及花スル者多シ皆
具始贅肉取尽サザル故ナリ

肉瘤大抵八十流
之者ニテ消散スレ
肉瘤ニ似テ非ナル
者根脚浮テセテ
運轉ス何レ運轉
スレハ多クハナレル
スレ也

肉瘤ハ腐菜ヲ以テ取レハ多クハ反肉スル也切斷ノ見縫ニ
肉瘤ヲ取タルヲ以テ可究理併シ出ルニヨルナリ贅肉ヲ
取尽セバ則忽腐菜ヲ止ムベシ膏ヲ左変ニ以テ生肉
見ル赤色ニハ破敵ヲ貼スル内トイユ氏生肉ト贅肉ト
ノ色見別難シ已ニ愈ント欲セハ以消瘡散ヲ煉菜毎
日可予如竜眼肉大者ハ三服ス愈テ后ト魚肝羊肝
許可令服之不然ハ毒不尽而后起脹スル者也考
フベシ膏ハ丸突ヲ付スベシ

腐菜ニテ肉瘤ヲ治スルニ贅肉ノ中ニハナシタル膿眩モ無ク
レ此贅肉取尽テ出肉ノ界ニ至レハ甚膿眩強ニ考

フベシ此時手術甚難シ

小兒胎瘡ニ証アリ神至不循環メ溜ル故ニ針スルトキハ
唯清水ノミ出ツ翼日見之則又溜ル二日目ヨリ容
熱メ脱シ三四日ニメ死スル者也此症ハ背骨ノ上或腰
尾ノ辺ニ出ル者ナリ蘭人ノ説トヤシモ相違ナシ多
ク脊髓ニ附テ生ル者ナリ又ヤシ下ニ生ル者モアリ
又出生ノ内ヨリ既ニ出テ大ナル者アリ或出生二三
日ニメ出ル者有其一証ナリ此症ニ青蛇ヲ教日傳レハ
ヨク消散メ愈ル也

目上痛常掩目見ルイ能ハズ手ヲ以テ拳之ハ眼能

以刀割テ出具核核大如桃以法縫傳茶如款唇
全煎者三人

眼胞菌毒即麻茶ヲ服シ白色ノ者凝テ肉如シ
如此者四塊ヲ出ス勿論出シキハニ碎ケルニ后燒耐温
メテ洗ヒ縫フニ針ハルカム付ナリ是ハ痛ヲ止早ク愈
ス効アル故ナリ縫タル上ヲ無名異卵白ニテ付ル五
六日過テニ番ヲ貼ス

又同証ニ多クハ上胞ノ内ニ生メ漸々大ニナリ胞ヲメ高ク
瘤ノ如ナル迄大ナル者ハ田螺ノ如シ目モ壓面メ赤キ也
甚眼目痛ヲナス者ナリ胞ヲ反テ視レハ裏ニアルヲ小反

鉄ニテ切ナリ内ヨリ粉脂ノ如キモ出能絞リ出スベシ又
ナル者ハ反ニ拘ラズ矢張上ヨリ切り跡ハ白雲
氣痛時ニ依テ消長スル者ナリ且動アル者ニメ少痛
アル者ナリ出血メ死スル者ナリ手ヲ付ベカラズ

大和五條ニ近瘡出色淡紅斷リロバカ落スベシト思ヒ女
ク某ヲ子テ竊ニ親妻ヲ呼ヒ不治ノ証ナルヲ告グ不月
ニ隣家ニ行ヤク血出紙ヲ以拭之暫クメ如飛泉精
氣大脱頓死ス

顔言曰氣瘡ハ耳
下及頰辺又ハ咽
喉ノ左右ニ多ク
生氣瘻氣瘻也
大抵同物也誤
針スレハ出血ノ不
止者ナリ也

金瘡

金創ヲ洗フニ燒酎ニテ先創ノ四辺ヲ洗エ支ヨリ創ヲ洗
フヨウニスベシ縫ハ半分位ニメ指スベシ長ク刺片ハ愈イ
遅レニ三日指療け尽ル片ハ取ニ佳ナリ
膏サ糸ニカブル人アリ此ニ尤實縫ヲ用ント欲ハ鷄子白
ヲヤシ煉交貼スベシ又紫雲ニ代ルモ佳也又右証
ニハ前衝モ用ヒ難シ故ニ紫雲ニ決勝ヲ煉交前衝ニ代
用也又紫雲ニ卵白ヲ煉交テ可也如此患者ハ白雲
ニテモカブルナリ

金創家眼中黄色ヲアラハス者ハ血虛ノ徵也又曰吧逆
テ上へ通ル者ハ乾姜黃連黃芩人參一能慮ス
ル者ナリ

頭ノ疾ハ縫ヲ用ヒカルガヨシ若用ル片ハ隨分浅クサス
ベシ又膿出ルヲ奇方アレ氏今ハ用ヘステキステイヒヲ用
眼胞ノ疾ハ前衝ヲ用ル片ハ麒麟血ヲ末トシ加フベシ
頭ノ疾ハ手早ク洗縫ベシ若腦杯ニ創アリテ燒酎腦
中ニ入レハ必ス膿ニナル也心得ベシ若腦中膿ナル者ハ
異変ノ一蜂起シ不可救ナリ
咽喉氣道ヲ疾シタル者治ヲ得ル一モアレ氏半方モ創

氣道ハ前ニアリ
食道ハ后ニアリ

アレハ終ニハ泉下ノ客トナル食道ノ疾ハ半分位ノ疾ナ
レハ隨分治スルナリ

都テ腹部ノ疾ヲ療スルニ膈膜ヨリ上ノ疾ハ難ト知ルベシ
然レモ淺疾ハ不苦亦膈ヨリ下ノ疾ハ腸ヲ下出ルモ治
スル也

鉄炮茶ハ能腐ラス者也創口初ハ乾涸シテ后ニ腐
ルナリ

金創家ニ上盛ニメ創ヨリ下冷或麻痺スル者創神
至ニ懸ルト知ルベシ燒耐ハ瘀血ヲ去リ新血ヲ生ス
ル効アリ

陽至ノ創ハ治シ易ク陰至ノ創ハ難治且屈伸ニ害
アリ若シ氣血不順トナリ麻痺ノ難屈伸者圭
求附ヲ与フベシ神至ヲ運ス者ハ圭求附ニシク者
ナシ專ラ氣ヲ運ラス也氣能運レハ血以テ隨テ循
ル氣血復セサル者ハ与フベカラズ血脱ノ者ニ求附劑
ヲ投レハ陰負陽勝スル故也

突創ハ一寸以上ノ者縫フベシ一寸以下者不可縫

膿痂ハ縫ヲ用ルニ必貼膏スベカラズ金創油塗テ可也

腸出者移時ハ硬而難入以燒耐ヨク洗ヘハ乃速ニ易
入縫腸ニハ可緩否則腐大メ大便出

箭創鎗創ノ治法突創ト同シ能洗ヒ貼雞卵丸塞ニ
輕者貼前衝重者用波留丸牟

鐵炮疾ハ以燒耐洗之以丸突維深入之四五日為膿々
尽則愈鉄炮創ハ手段手術多キ者也倉卒ニ述尽シ
難シ

鉄炮ノ玉不出片ハ其俣置ベシ若不取片不苦又四五日
モ過ル片ハ破レ肉腐テ膿ニナリ其時ニ探レハ玉出ル
モアリ紐ハ四五本モ太クメ指ベシ

諸瘡三四日ヲ経タル瘡ハ燒耐ニテ洗ヒ或縫ナドスル
片ハ后必破傷湿ス変ヲ生ス

咽喉ノ瘀血氣道ニ流レ入テ氣道塞リ氣絶ルテアリ

是ハ急ニ手術ヲ以テ能吐サシムベシ縫終テ后モ亦ヒ氣
喉ニ血流テアリ其術ヲ行ハ能治スル者ナリ

手足ノ瘀動血脉ニ当リ出血スル寸世医二三寸モ上ヲ
扎レヒ血イヨク出テ止ガルテアリ思フニ委中尺澤
ヨリ血ヲ取ルニ上ヲ扎レバ能出ル也是ヲ以テ以理ヲ
考フベシ

凡全創出血ヲ止ルソノ理ヲ究テ其動脈ヲ知片ハ不止
ニナシ

裏三テ吐滿
スル者ハ承氣ヲ
与フ金匱ニ云
症為病胸滿
口禁卧不著
席脚車急心
心斷齒大承
氣一主之

破傷爪ハ血氣
不和ヨリクル者
ナリ丸大膿后
ハ油断スベラス

破傷濕并爪濕

先醒曰破傷濕ハ至テ難治ノ者也角弓反張多クハ不
治也始項背拘急戰慄スル者輕症也葛根一無患子
虎杖莖豆淋酒言語寔澁反張ハ重証如聖散ヲ用能
ク應ル者ナリ是奇中ノ奇鍼治ノ術ナリ此法親炙
メ可見 合谷元

破傷風ニテ角弓反張スル者ニハ如聖散ヲ用テ効アリ此
方ハ余程毒強キ者ニ用ユ

破傷濕具名證治準繩ニ見タリ然ル予カ用ル処ノ
方ハ異ナリ今証ニ逢フ毎ニ越水附ニ虎杖莖ヲ加

用ルヨリ外神方ナシ荆防敗毒ニ虎杖莖用ル証モ間々
アリ


缺唇

缺唇ハ小児ノ腹時居カニ悪キ故其児ノ爪ニテ切者ト
シル治療ヲスル片先缺ニテ切り尤ヨリ始ルラ法トス然ラカ
レハ手術施シ難シ切様ハ表ノ皮ヨリ裏ノ皮ヲ深ク切ラ
術トス先創ノ真中ヨリ縫ヒ初テ上ト下トヲ縫ベシ隨
分手早ク縫スベシ手間ドレバ腫出テ肉ノ合加減アリテ見合
縫直スベシ鼻ノ内迄切レタル縫ニ糸ノ兩頭ニ針ヲツケ
一本ハ軟骨エカケテ縫ヒニツキレノ者ハ左右ノ内何レカ
比方ヨリ易シ因テ針ヲ鼻ノ下ノ軟骨ヘスクヒ針ニ
カケ縫ヘハ左右エエガムコナシ心得ベシ

小児缺唇ハ小針細糸ニ縫フベシ麻沸ハ不用四歳ヨリハ一
歳用ユベシ先通例ハ八歳以上ノ者ニ用ユ或ハ恐レ或
痛苦ニミタカキ者ハサシ用ユナリ大人ニハニギ位
用ユ切ロニ蟾蛛ヲ燒酎ニテトキ付ベシ縫終テ裏ノ方
ノ切ロハハルサシラ凍土上ニハ無名異上品ヲ雞子白ニ
テトキ付ナリ或決勝ヲ交合モアリ

痔漏

痔漏ヲ割テ出血不止決勝ニテモ無効如何トスベカラザル
証ニ硫黄ノ油ニテ麒麟血ヲトキ患処ニ貼シ内茶四物加牛
皮消一ヲ与レバ能止ル者ナリ血ヲ止ル一ハ何レトモ手術ニ
アル也

麻疹后ニ痔漏或瘰癧ヲ患ル者甚多シ是ヲク萌ノアル者
疹毒ニ依テ一時ニ発スル者ト見ユ予先年此証ヲ治メリ
皆疹后五六日ニメ発シタリ故皆解毒劑ヲ用テ効ヲ得リ
翻花痔  以肉堅キ者ハ善証也如圖反花ヲナス

口痔

一婦人五十余右頬
内重衣ニ生ヌ根ハ
細ノ如圖上ハ大ナリ
切レハ出血不止トテ



線ニテ
札
落
タル后
金鎖ト黄連ト
色紫色ニ細絡
ニトフニアリ
左右ニ一宛アレハ

トイハ凡滑ニメ管アリテ膿汁出ル者ハ腐菜或切トリテ
毛煎又何程形大イナリト恐ル、一ナカレ最其強弱ヲ計テ
治ヲ施スベシ

鼻痔大ナル者且難取者ハ二度モ三度ニモ切ベシ其内ニ矢張
セツトシテ刺スベシ辛黄清肺飲

鼻痔ノ反花シタル者穴ヨリ外エ出テ長大ニナリタル者是
ヲウカツニ切片ハ出血不止ナリ故鐵錐膏ヲ紙ニ貼メ其
根ヲ卷キ其上ヨリ糸ヲカケテシクタトメ切ナリ速切ントス
ル片ハ出血又而メ其根ヲ取ベシ又鼻痔初起ハ探リ鉄ヲ
切り毛引ニヒツカケテ取ベシ而メ跡へセツトシテ用テ紙ヲ

深キ漏ナレハ先ツ
一ツ仕舞テ或一
月二月ヘテスベシ
免角脱スルナリ
抜糸ヲサスハ
ヨクシ落穴ヲ探リ
刺スベシ免角ニ
重皮ノ中ヘ刺ス
者ナリ左スレハ
直腸迄モユクナ
リ氣ヲ付ベシ

條トシ又ニツケ刺ヘシ出血不止者ハ決勝ヲ塗刺スベシ大
抵七日位ニ取尽ル者ナリ跡ハ白雲可也最碯砂散毎度
刺入テ可也

痔漏肛門ノ辺一面ニ腐トイハレ一度ニ切分ケス幾度ニモ
切ベシ一度ニ切断スレハ変証ナリ難シ緩々スレハ誤ルイ
ナシ凡テ何ニテモ漏穴アル者ハ探リニテ能ク探ル也穴ノ
接テ有マ否マヲ見ベシ糸ニテ扎リ切ラバ痛モ過ナシ
織月カニテ切ハ痛モナシ速ナレハ出血メ止難キナリ有
能ク可考

疣痔ノ反花アリ形数子ノ如ク赤シ肛門ノ口ニアリ腸痔ト

相似タリ門生云腸痔ナリト 先生曰是症疣痔ノ

反花ナリ切取テ愈 糸ニテ扎リ置
切ベシ過ナシ

痔漏氣虚メ新肉難生者雞卵丸突ヲ貼スベシ

腸痔ハ用人參養榮一考飯膠艾一或三黃ニ地黄一

治療メ取痔后ハ以調和煎ヲ使蒸之脱血甚者傳
血散四物加牛皮消一全之

痔漏ナドノ大患ヲ療メ后始終凡寒ヲ堅ク慎ムベシ否ハ

風湿瘡口ヨリ襲入テ破傷湿ホノ大患ヲ免ル也予已ニ

二三人瘡病ヲ免セシトスル者ニ會ヘリ

痔漏ヲ切テ后疼痛ヲ免スル者ハ丸突ニ乳没ヲ加ヘ貼ス

痔漏竈ノ仕様一日ニ二度ニモ及フ者ナレハ常ニ心ヲ付
ケ奥ニ生肉ノ生シタ先ヲ突萌サヌヨウニ漸々引加減
塩梅スベシ腫物ノ維モ同^心得^身一ナリ

べし

附牙瘡齒齦^ノ齦^ノ齦^ノ
ナリ^ノ肉^ノ状^ニ生^ス不^治
治^ス者^ナリ^ハ凡^テ反^肉
肉^ハ蒂^大ナル^者ハ
不^治小^者間^々治^知
知^{アル}ナリ

舌瘡^ニ牙齦^ニ齦^ニ
ナリ^付者^ハ甚^難治^ナ
ナリ^腐甚^キモ^ハ
舌^ヲ半^分モ^切キ^テ
アリ

舌疽

腮^ノ后^咽喉^ノ前^軟肉^ノ間^ニ生^ス初^ヨリ^反肉^状ヲ^ナシ

舌疽附牙瘡口瘡ハ口科ニモ不治ノ者ナリ然レモ舌疽ハ

近年子夫ノ數人ヲ救フイラ得タリ附牙瘡齒齦ノ二証

ニ至テハ未タ治法ヲ得ズ何レ腐菜ノイニハアラス清解

劑ニテ治スル一ニヲ得タリ

上腭漏^{一名}齒^ヲ切^テ出^血不^止ニ決^勝ヲ^付綿^ヲ以^テ指^ニ

テ押^ヘハ止^ルナリ然レモ久ク押^ヘイル故ニ一方ヲ製メ止^ル

具方ア、クワカルシスニ硫黄枯礬ノ末ヲ少シ加^ヘ攪^セテ

ロニ合^シシムレハ甚^タ止^ルナリ

一人上腭漏アリ膿水ヲ常ニ貯^フ是ヲ推^セバ膿^出ツ鯨

探ヲサシテ視ルニ漏内ニ入ル一七八歩至方甘露飲ニヨシ
牙漏上脛二種アリ齒齧ニ穴アリ膿出ルモノ漏ハ何ニテモ其
穴ヲ切抜サレハ愈ヌモノナリ殊ニ口中ハ靈液アル処故甚
愈易シサシ刺タル位ニハ忽チ愈シニウ故ニ廣ク切抜
ヨウニスベシ此手術親炙メ可見筆ヲ尽シカタク
口瘡ハ上脛ノサシ眞ニ生テ瘡状ヲナスラ云凡テ反肉ノ形
アリ

一婦人五十余歳舌疽ニメ舌傍サシ強ク反肉ノ形アリテ
齒根ノ辺腐リ及タリ先生モ已ニ治期ヲ失セル故ニ辞
セラレシニ病人強テ講治故ニ具反肉アル処へセツトシラ

付具反肉ヲ抜テ竹筴黃連湯ヲ用ヒ舌疽ノ黃葉
金一兩一歩煎セシニ具身泉下ニ趣カンイヲ忍レ忍ヒ難
キヲ忍テ治ラ愛ク其日數ヲ計ニ七旬ニ至リテ具治ヲ
告ク口中ヲ視ルニ尽ク毒尽テ其跡ノミアリ含茶ハ口ウ
ガワトル是妙ナリ

紀列日高郡文右衛門者患舌疽有年先生曰是レ不治
ノ者ナリ先可予黃連一或竹筴後以昆布浸水舌上ニ
ヲキ以燒鏝慰之數回如此スル一ニ三日ニメ后服黃葉
一二劑病勢サシ衰フ
舌疽上軟ナル者ハ瘡毒母ヨリ来ル堅固ナル者眞ノ舌疽

眞ノ舌疽ハ堅凝
メアル如剪切具
跡ハ阿仙茶ヲツ
ケ上ニ昆布ヲシキ
燒鏝ヲアテル一
數回毎日如此
云ニ不徹ハ眞ニア
ツ
舌疽ト云アリ

徽毒ヨリ来リ
其症舌腫舌尖
或舌傍ヨリ嚴
シク腐込者也
甚者ハ半分モ
腐ルナリ咽疳
解毒ニニ粉前
ヲツヨクカケテ
愈膿ニツリテ
アルハ齒齦ニツク
下地ナリ

輕ナル者治レ易シ以見法口傳アリ

舌疽因テ梅毒而発者具瘡形凹陷而易治真ノ舌疽
ハ心及肉ノ勢アリ治療ハ深ク穿潰メ上腐肉者腐
肉切テセツトシテ塗又薑菜中ハ菜豆煎ロウヲ含
ム

懸癩風ハ齒ノ根ニ生ス漸ニ腐リテ齦骨ニ及フ甚臭
キ者ナリ世俗ニ云フ齒藥ハ涼膈犀地甘露人中白
セツトシ

蛙喉ハ懸垂ノ長クナルヲ云色常ヨリモヤシ白シ一日ニ
二寸モ長スル也冰硼散ヲ付テ消シタリ一ツハ扎テ取リ

疼包ハ皮薄メ
フワクシタル者
ナリ針斗ニテハ
敗液又溜ナリ
故ニ剪切テ溜
ラヌヨウニスベシ

舌當ハ木舌ノ如ク腫テ堅ク及肉状ノ如ク甚稀ナリ硬キ

所ニ針メ血ヲトリ金鎖ヒ竹茹黃連一

木舌ハ硬キ所ニ針メ血ヲトリ金鎖ヒラ付竹茹黃連一

重舌ハ舌ノ下ニツツ小カキ舌ノ如キ者ヲ生ルナリ疼包ニ似

リト雖疼包ハ大ニメ腫下腫タル如キ者ナリ何レハ缺ニテ

切り金鎖ヒラ吹甘露欠ヲ服メ愈ユ

吻瘡ハ吻ニ生ル瘡ヲ云是モ一種ノ者凡云ハ八味逍遙

散ニヨロシ

癩疔

癩疔ノ水ヲ抜テ世医ノ能知ナリ然レモ唯一時ノ快ヲ得
ノミ全効ナシ且世醫ハ管針ヲ以テ水ヲトル是拙ト言
フベシ長崎ニテ蘭人ノ教ル所皆管針ナリ予之ヲ
治ルニ一術アリ先罽丸ノ処在ヲ見究メ其刺ベキ処
ヲ能見定テ七針ヲ下ス其針ニ添テ糸毛引ヲ入
テ針ヲ抜溜水ヲ去レ然ラザレハ運轉ス針口ヲ失ヌ扱
具ノ溜水尽テ后无突糸ヲカシ遊奕ヲ蓋ヒ膿ニナル迄水
氣溜凡糸ノ抜ガルヲ要トス糸ニ糸ヲ付刺込テ先

刺セガル前十日モ烏頭ヲ用ヒ十分水氣溜リシキ
針ヲ下スベシ扱治ヲ施メ后一兩日経ル内ニ大熱謔語
ヲ発シ囊腫初ニ倍ス驚馬ベカラス其時清肝滲湿湯ナ
ド用レバ其熱解スル者ナリ又ハ小柴胡加石竜胆用ル
トモアリ扱囊腫嫩痛メ膿ニナルヲ窺テ又毛引ヲ以
テ糸ニソヘテ入膿ヲ去ル也膿尽テ后又糸ヲ刺置
尤針メ后ハ囊癰ノ治法ニ隨ヒ清肝滲湿ト轉
ベシ凡五六十日ニメ内膜化メ全愈
癩疔療メ膿ニ成ニテ欲ルキ必大熱スル者ナリ此トキ
余茶無効滲湿ト用レバ熱オムルナリ又烏頭

血水交り出ル皮
膜ノ血ガ囊中
ノ血ガ可分別
針ロヨリ黒腐
ニナルハ必狂癩ヲ
発ルナリ三合復
命一主之

湯ヲ用ハ其毒ヲ動ス為ナリ

癩

癩疔ヲ刺テ清水出ル者ハ膿シ易シ治療得効ナリ
血水交り出ルハ必針ロヨリ黒腐ニナル者ナリ若シ

囊黒腐トナル者ハ甚六ヶ敷大患ナリ

癩

癩疔ニ針セントスルハ先畢丸ヲ遠ク離レテ刺片ハ出水
スルヲサシ側ヲ刺片ハ水出ルヲサシ張囊ヲ引上テ裏
ノ上ヨリ水ヲトルナリ

癩

癩疔是ヲ試ルニ莖ノ本横骨ノ側是ヲ按スルニ尻アル者
指ヲ入テ深クナル者ハ囊ヲ按セバ囊中ノ水腸
中ニ入ル故囊緊縮ルナリ即腸ノ出ル者ナリ大ニ

即阳狐疔也
小兒五苓散牡丹
湯ニテ治スル
大人ハ大ニテ又
追ニテ治セズ

変スレハ囊ヨリ大便出ル者ナリ是ハ謾ニ針スベカラズ
即腸疔ナリ誤ルヘカラス可慎々々

癰毒

下疳瘡ヲ患テ陰莖ニ凝結ル者アリ乱刺メ血ヲ取
中黄ヲ貼スベシ或麻葉ヲ用ヒ切トルモアリ凡テ麻沸
ヲ用ル者先初半浮ノ灸ヲ用ヒテ心下ヲスカシテ
用フベシ

癰毒ノ薰蒸ハ毒ノ猛烈ヲ折ク者ニメ全効ヲ得ル

ヲ難シ

先生曰梅毒膿水尽テ后久ク肌肉ヲ生ゼザル者ハ蒜ヲ
摺為泥患處ニ貼シ其上ヲ燒金ニテ徐々ニ慰スベシ
若蒜無片ハ葱白ニ代ルモ亦可ナリ附骨疽治ヲ

施メ后毒尽テ愈ント欲スレモ愈カル者ハ陽虛ナリ
附子一牧ヲ末トシ瘡上ニ布テ其上ニ艾炙ス陽氣ヲ
助クベシ

癰毒ニテ耳下ナドニ凝結シ破敵ノ美ヲ付テ一向膿潰
セズ腐ラシメヨク止ル者アリ若ヤシク凝ル者ハ金蜜
陀鉢ナドヲ刺置漸々ニ取ルヘシ

癰毒強ク頭上ニ凝ル者或浮腫ナドアリテ頭痛スル者
圭支加苓朮附細辛防瓜一ニ消毒葛根苓朮附
ナドモヨシ

同証山牛湯ニ天石應鐘ニ奇効アリ

鎖陰并鎖肛鎖吻

鎖陰ハ人ニ依テ皆異ナル者ナリ先麻沸ヲ用テ剪カ
以テ尿道ノ下ヨリ切或一皮アルアリ或奥ニ薄皮有
モアリ或尿道ノ如キハ小穴モアリ其穴ニ羽ニ重ノ小
カキ囊ニ大豆ヲ入次第ニツメ三時許置引出ス内ヨリ
皮皆出タリ具ヲ切テ治タリ

浪華ノ一婦ヲ療セシハ是ハ一皮キリ指ニテ探リシニ奥ニ
膜アリ初指一本ニテ破リ支ヨリ二本三本ニテ明タリ膏
兼ヲ付ニ膿質ニ白雲ヲ塗カシ置ナリ尿道ト肛

門トハ薄皮一重ニテ隔ル故ニ暴卒ニ術ヲ施セバ誤
チアル者ナリ能氣ヲ沈メテ療スベシ

鎖陰モ鎖肛ノ如クも鍼ヲ以テ切開クベシ何レ指三本位モ
入ル様ニナルベシ剪開テ指ヲ二本位入テヨク探リ明レ
ハ隨分穴大キクナル者ナリ是モ具子宮迄モツミリイ
ルハ六ヶ敷ナリ余程手練セガハ治療出来ヌ者ナリ
是ハ尿道ニ導水管ヲカシテ肛ノ方ヘモ大キ鯨篋ヲ
指入置具尿道ヲ切誤ラシテ恐ルノミ失張切ル
内ニ具指タル者動揺サスベシ跡ハ膿質ニ破敵ヲ
塗刺置ベシ尿道ハ濡肉故隨分ト氣ヲ付ベシ

鎖肛ハ菊堅ヨリ小孔自アル者ハ治レ易シ陰門ノ下ノ端
 ニ小孔アリテ糞汁出ル者ハ肛門中へ小サキヒ針ヲ入
 立ツニ切事セ方手指ニ本位入程ニメ横ニモサシサキ
 兔角陰門ノ方へヒ針ノユガニヌヨウニ氣ヲ付刺ベシ何
 レ孔ノ塞リ易キ者故ニ指ヲ入テヨク探リ膏ハ破敵
 入ルナリ且男子ハ陰囊杯ノ下或會陰ノ辺ニ小孔出
 来テ屎汁出ル者アリ此ハ曲リ探リヲ次第ニ
 肛門ノ方へ切ユクナリ左様ニスレバ下ヨリ肉上テ愈痔
 漏愈形ノ如クナルヲナリ女子ハ陰門杯ニ左様ニ
 ナルアリ是モ男子ト同様ニメ切ユクベシ右ノ如ク治

尚毒アラハ楯
 皮劑可ナリ
 金瘡ノ治法
 ニ隨テ可ナリ

療スルニ次第ニ探リ片ベシ肛門ノ処エユクニ故ニ無孔
 者ヨリ治療ノ便ナリ世医鎖肛ヲ治療スルト語レハ
 其口ヒ針ヲ刺テ紐ヲ入ルノミニテ切開キ孔ヲ大ニセザル
 故悉ク治ル者少シ女子モ陰門ト肛門トノ隔膜マフ
 レテ支ヨリ糞出ル者ハ不治ナリ結毒ニテ唇口ヲ上
 下ヨリ鎖ス者アリ中ニ細キ穴アリ漸々米二三粒介
 言語ホニ碑ルハナシ此ヲ療スルニ茶線ニテ兩ノ火
 海ヲ札リ切り蒸ヲ付テ愈合ヤウニ鍵ニテ后髮際
 ニ引シメヲケリ日々蒸ヲ貼テ三十日許ニメ愈タリ
 或箱口伝

駢指釋府ノ者ヲ療ス右ノ足小指一本ニシテ爪ニツ
アリ切之ハ骨別レテ二岐ナリ切タルハ白雲ニ決勝
貼ス翌日ヨリ白雲ヲ貼ス后流注メ疵口ヨリ血水出
テ甲大ニ腫タリ先生無名脂ト中指ノ間一鍼ノ丸
突維ヲ入甲ノ腫タル処鋒疾ハ失張白雲ナリ赤ハ
越ホ附是ヲ切ニハ手且共ニ四五歩程脚へ切込ベシ
丸ナクンバ長肉ニ隨ヒ本ノ通りニナル者ナリ或ハ
常並ノ如ク切ニハ釣ニテカケヲクモ佳ナラン乎

失采

先生嘗塾生ニ語テ曰失采委中毒氣癩ノ如キハ至テ
難治ニメ予モ未タ見スルナシ又治術ノ如何此ス
ベキトヤシ子ガ軍具狀ト症候トラヨク知テ病ヲ誤
ルト勿レ予今ノ医ヲ視ルニ其難治ナルヲ不知メ危ニ
臨テ救ワレガルヲ見テ初テ誤ナルヲ覺ヘ厚顔ニメ
具拙ヲ掩ヒサルト間々多シ予二十二三歳以前和及
五條馭医工果在者丸ノ頭下ニ瘤狀ノ如キ者ヲ見シ
一人連レ来リテ治ラヒト篤シ診后竊ニ連ル者ニ云
此人ノ病所謂氣瘻ニメ古来ヨリ是レ治ル人ナシ恐ク
ハ后ニ出血メ死ニ至ルベシ早ク連歸リ竊ニ家人ニ告

テ病者ニ聞スナカレハ從者大ニ驚焉古来ヨリ
不治ニメ先生又治術ナシレハ天下ニ治ル者ナシト后
二三日ヲ経テ出血メ死ス

予嘗テ失榮ノ大ナル者ニ猛并録丹水茶トナシ用タレハ
瞑眩劇シク苦楚ニ堪ヘズ然レハ失榮ハ九分減タ
リ故ニ患者ニ瞑眩ニ堪難ヲ忍テ二三劑ヲ尽セハ
其瞑眩緩ムニ隨ヒ失榮又本ノ如ク大腫メ遂ニ死
シタリ

和州一婦人来リ治ラセフ先生曰是失榮ニメ古今
不治ノ者ナリ予未タ治法ヲ得スト固辭ス患者強

テ治ヲ請テ歸ラス故得ト是ヲ診スルニ未タ及花
ニモ及ハズ然レハ口開キ難メ飲食ニ害アリト云故ニ
五宝丹一劑ヲ作り黃連解毒ヲ十貼許リ与ヘ
飯ラシム三四日ヲヘテ死ス

淋漏

世ニ懸癰ト称スル者多クハ淋漏ニ真ノ懸癰ハ稀ナ
リ淋毒尿道ニ塞リ遂ニ膿ヲナシ會阴ノ辺ニ潰テ
后水ヲヤシワ、漏ルナリ尻或陽囊ヨリモ漏ル、者
アリ然レハ大半ハ阴茎へ出ルナリ阴茎一向通セサル
ニ至テハ難治ナリ是ヲ治ニ六枝穴アル者ハ先枝穴へ
往ヲサシ愈スベシ枝穴愈メ后本管ヲ治ルニ先便
通毎ニ指ニテ押へ小便ノ浅ナルヲ以テ要トス小便
終リテ后ハ又其餘瀝ヲ絞リ出スベシヤシニテモ溜レハ愈

カヌル也服茶ハ大牡加葱消去兼用ス

一人甚難治ノ淋漏アリ導水尿管ヲ以テ小水ヲ通スル
一凡五十日許ニメ其口愈タリ

播摩ノ人此症ヲ患フ甚難治ニメ龜頭ハ一向小水
通セズ色々療治スルモ不愈無摠會阴ノ辺へ穴ヲ
アケ夫ヨリ小水トルヨフニメ返シタリ又阴囊ト茎ト
ノ間ニ穴ヲアケ歸シタルモアリ毎日三四度モ小水溜ル
片ハ則具術ヲ施メ小水ヲ通シ取ベシ
會阴打撲ニメ小便閉スル者ニハ仲呂丸佳ナリ時ニ男
子會阴ヲ打テ其腫尿管ヲ塞テ小水通ル

不能呼吸促迫シ仲呂丸ニテサシ緩メリ然レ凡一日ラ
経テ又如前呼吸促迫メ苦ム此ニ臨テハ利水劑ニテハ
効ナシ因テ予小腹ヲ刺テ通セシメタリ此術先賢未
嘗ノ術輕易ノ言ニ非ス敬而可思可慎不可誤

先生語テ曰任脉ヲヨケ横骨ヨリ上一寸五分二寸程上ラ
刺シ糸毛引ニテ水ヲ取跡ハ丸突紐ヲ入置

石淋ハ會阴ニ滯ル者ニ非ス陰莖中ニ生スル者ナリ又ハ
龜頭ノロニ石アル者多ク下ヨリ切開キ出スベシ若陰
莖ノ裡ノ方ヨリ切開キ石採取者ハ其疾愈ヘス手
段ハ鶴ノ羽ノ大ナル管ノ中ヲ又キ管ニ作りハルカムラ

塗リ尿道ニ刺入レ戸井メ愈ス手段スルコアリ

石淋ハ龜頭ヘノ通路セミクナツテ遂ニ石ヲ結ヒタル者ナリ
大ナルハ枇杷ノ核ノ如ナリアリ中ナル者ハ大豆ノ如ク小ナル
者ハ麦ノ如シ推出ス寸ハ前ニヨル者ナリ龜頭ノ辺ニ
押シ移ル片ハ口ヲ廣ケルト隨分出ル者ナリ妄リニ
切り出片ハ縫合メ后小水道小クナツテ通路宜シ
カラズ夫故大抵ニテハ切ラス道口迄コ又者ハ陰莖ノ
下ノ方ヨリ横ニ切出スナリ具ロニ小水出ル片ハ愈ルイ
ナシ故ニ師家ニ一奇方アリ具小水ヲ洩ラサス全ク
愈スナリ

又婦人ニモ石淋アリ溺道廣キ故小サキ石ハ出ルナリ
鹿城先生一婦人ヲ療ゼシハ其大サ如餅大ニメ出難シ
故ニ石ノ中穴ヲ穿テ碎テ出セシト云ト稱スベシ又一
婦人釋山ノ産諸士ノ娘是亦石淋ヲ患ルト七年
其石大サ如茶碗重サ七十三匁アリ

治淋疾ニ小解毒ニ芩朮草加倍膿淋ハ大解ヲ羊紙一
枚ニ包ム程ノ大劑ニメ水一升六合ヲ八合ニ煎シ一日ニ
用ヒ尽ス血淋痛甚難堪者芍朮甘草一ニ芩
朮草加倍スルナリ煎法如常或猪苓湯加將
淋疾痛ニ甚ク荏苒トメ十八日ニ至ル猪苓湯ニ應鐘

丸兼用スヤシモ効アラズ因テ雞穀應鐘ヲ与テ効
アリ淋ノ治法甚ク多シ尽ク不可勝言茲ニ畧ス

白胎赤
是症病ノ徵
ナリ

戰慄ハ柔
症ノ下地ナリ

産后戰慄之
奇方当故四逆
加吳茱萸生姜
附子

産后諸証

産后瘧病初起腮ヨリタカクナリ言諸寒是決シテ兩
手ヲ握リ反張スルナリ破傷瓜ト全ク同シ肩張
リテ后反張ス至方小續命一或葛根一証ニ隨ヒ
撰用スベシ又剛瘧アリ葛根一姜朮瘧アリ十
全大補一加附子荆芥ノ姜治方多シ合谷ニ針メ傳
へ難キ一アリ常ニ産后ノ証ニ疑アリテ明論ヲ聞
ス師門ニ入テ始テ寤然タリ

産后瘧病胞衣不可内ニ脱シ三度位迄ハ治法ヲ能
ス六治ル者ナリ前日戰慄ヲ脱シ今日ハ甚氣分ヨシ

産後血虚而床ラ
アクルーナラス辱守房
中又妊娠スル症

アリ以症ニ
青羽霜トメ
一日三分程用ユ
妙ナリ

言テ起居ヲ慎ミズ風ニ当リ杯スル者ハ又前日発ル時
氣ニ必発ル者ナリ何レ調養メ慎シニガル者ハ必不治
ナリ

方荆芥沈香一泊夫藍甚効ナリ

産后戦慄ノ証必輕易ニスルイ勿レ五六発スル者ハ
彼令戦慄止トイエ氏諸証蜂起メ救フト不能ニ
至ル治療アリ産后戦慄ノ証ニ於テハ世医皆ナ
誤ナリ青洲此証ニ於テ治法論説卓然タリ實ニ
可謂窮理

産后症病キクリクトメ手振フ者口禁者治ス又口

ヲ開者ハ不治口禁ノ者ハ忽然トメ愈ル奇術アリ
先年終田邑ニ疫病アリ先生門人下村中川兩
人ヲ遣シ療スレモ不治即先生趣之行一奇術而
安シ処握ノ手忽チ開ク所謂左右合谷ニ針ス后
髮際ニモ鍼ス浅クスベシ合谷ハ掌中へ通スベシを
鐵鍼ヲ用ユ

産后戦慄ハ血氣不和邪氣虚ニ乘メ致スルナリ以
調護ヲ失スル故ナリ先具不和ノ血ヲ主トス戦慄四
五発難治ノ兆ト知ルベシ先四五発ノ内早ク荆芥
沉香一ヲ与フベシ十全大補加荆炮姜或依証加香

附子イアリ十全大補一此方千金ニ産后心腹痛ヲ治
ル法知ニ出タリ千金方ニ芍藥黃芪一トアリ白朮ヲ
白芷ニ作ル恐クハ誤ナラン産后ノ心腹痛ヲ能治ス何レ
産后ノ熱戦ハ凡テ荆芥ヲ加フベシ

産后小水自利スル者ハ神至ノ循環セザル故ナリ遺尿門
ノ參芪加附子湯ヲ与フベシ方中ノ益智ヲ倍スルナリ
又一奇方也鳥一羽腸ヲ去リ紅花人參各一兩ヲツメ燒
テ性ヲ存シ未トシ酒ニテ下ス予此方ヲ与テ數人ヲ
治ス

産后血熱心胸ニ迫テ痛者ニ失笑散ヲ用ユベシ實

証ノ者ニハ三浮心或袖實ノ霜効アリ且心胸ニ迫ル
者虵與ヲ兼ル者有甚難治

産后暴浮スル者アリ胃風湯効アリ二三行ナル者ニハ
速効アリ十三行ニ及フ者ニ与フベシ効アリトイフモ
下利止ムイモ亦二三日遲レ具内心下痞鞭スル証ハ日
草浮心ニ轉スベシ

産后血暈早ク補虚湯加附子炮姜荆芥ヲ用テ治
スルナリ香附子ハ一夜童便ニ侵シ明日干レ用ユ是品
製時又此証ニ童便許吞シム効ナリ又洎支藍ニ分
ヨリ三分追瀉ト煎シ用テ立効ニ止ムイ効ナリニ番煎

難産ニメ腹ヲ
強ク按シタル者ハ
子宮ニ腫ラ生
メ産后血塊ノ
ヨフニ腫レルナリ

ハ渣ヒニ用ユ

産后ニ子宮腫テ血塊ノ如キ者アリ謾リニ桃承或牡丹
湯ナドノ破血劑ヲ以テスベカラス十補加銀花或益母
草用テ佳ナリ能消腫ナリ

産后血虚舌赤ク爛テ痛ニハ八物一ニ加鹿胎霜ヲ治フ
ナリ

産后下血不止者鹿胎霜ヲ白湯ニテ送下スレハ止クナリ
ナリ

産后痛ニ沉香天麻一ヲ与フベシ
子宮脱ヲ入ルニ薄荷ヲ湯ニ浸レ子宮ヘ當テ蒸テ

后手術ニテ能入ト云リ交接ノ時出血スル者ニハ医王
方中鹿胎霜ヲ加ヘテ治ルモノナリ

流注 治法詳方笈

凡腫物流注狀ヲ見ス者ハ因テ論セス越本附ヲ与ヘテ
佳ナリ正宗ニ言フ流注ハ甚稀ナリ何レ流注ノ狀ヲ見
ス具身体へ瘡痂アル故氣ヲ付テ見ルベシ正宗ノ説
トハ大ニ異ナリ

一人腋下漫腫メ手ヲ以テ按ニサレ痛アリ折節先生和
刈吉野竹林院ノ頼ニ應メ考ラレシ跡ニテ熟生争
競ノ診メ曰是痞癰ナラシト大牡ヲ投ス后先生診曰
是流注ナリト具疔足ヲ視ルニ果メ疵アリ因テ越

本附ニ紫丸ヲ強クカケテヨシセハケルモ出テ腰痛肩
背へ凝疔手ニ疵アリ右ノ手足追凝アル者是流注也
虚脱狀ニハ參芪ニ本附ノ劑ニ宜シ

瘰癧

瘰癧ハ初登ニ夏枯草煎或海藻トヲ用テ消スル者也
若丈レニテモ消散セヌ者ハヒ針ヲ刺テ拔紐ヲサシ
置ナリ若瘰癧浮タル者ハ麻菜ヲ用テ瘰癧ノ核ヲ拔
取ルテモアリ

賈氏曰瘰癧ニ夏枯草煎ヲ用テ黒物ヲ下ス者能効ア
ルナリ吐血下血スレハ后服止ム一劑ヲ一日ニ用ユレハ食
氣一日モ無者ナリ故ニ止ムテ不得ノ二日ニ用ユルモア
リ具凝堅キ者ハ弥應スルナリ膏ニテモ貼シ初起ハ

効アレハ治ラ歷テ久クナル者ハ効ナキヨウニ思ハル也
瘰癧ノ治法甚難シ輕易ノ一ニ非ヌ妄ニ云ベカラス後ノ
賢者ヲ待ツ

襍証

三木附

葛根木附ハ血ノ閉メ廻ラサル故ニ血弥凝ル者ナリ血ノ凝滞ヲ行ス功アリ故痛強ク掌急ホニヨシ

桂木附ハ毒トゲテ氣廻ラザルナリ氣循ラ又所ヲ循ス功アリ故ニ麻痺瘰結毒ニヨシ

越水附 水腫ノ溜滞ヲ解シ循ス功アリ故ニ風濕痛

風熱痛ニヨシ考フベシ

桂木附ハ氣血俱ニ凝滞メ兎角血ト氣ト閉メ不迴ニナリ或痛ム証モアリ或不痛メ与ル目的モアリ其不痛

痿弱ニ木附ヲ用腹中痞滿シメクル者ハ奏効ノ兆ナリ大抵十日メニ紫丸ヲ以テ

メ如此目標アルハ予結毒ナトニテ頑肉トナルヲ考ルニ人身中ニ血ト氣トノ廻リサヘヨケレハ頑肉トナルイナシ然ルニ頑肉トナルハ血氣ノ凝滞メ循ラサル故ナリ先結毒ノ者ニ圭木附ヲ与ヘ菜カノ不及処ハ缺ニテ割棄シ破敵ナトヲ貼シ頑肉ヲサトリ氣ト血トヲ復ルキハ全キ人トナルナリ宜シク是ヲ考フベシ予家処謂ニ木附子ノ附子ハ代鳥獸奏効多シ

痿弱ハ血氣不和ヨリメ氣ノトジテ循ラザル者ナリ故痛痒ハ甚シク凡舉動ナリ難シ治術ハ血ヲ和シムルヲ循ラス様ニスベシ桂木附ヨシ

具痞滿ノ集ル
者ヲ下スベシをスル
ハ木附ノ廻リ大ニ
吉紫をヲ用ル
緊要ナリ

亦急ノ証痛
ムモノハ馬駉一

亦急ハ痿弱ト反セリ此ハ氣ノ暢ナルヨリ発スル者也拳

動ハヤシナレバ痛痒知ナルイアリ又痛痒能覚伝ハ

凡亦急ノ甚モアリテ動クイ不能アリ此症腹部

拘攣メ痛処ニ引者ナリニ証俱ニ種々変証アリ伝ハ

凡大抵氣ト血トヨリ来ル者ナリ亦急ニハ芍甘附

佳ナリ

結毒ナトニ圭木附ニ消毒ヲ子テ漸々瘦羸メ結毒治

セズ此ハ毒アル凡血氣俱ニ虚スルモノナリ攻較手ニ不堪

メ肉不生ガ故ニ血ヲ生シ肉ヲ生ル方奇良附一葉独一

ノ葉子フベシ必効アリ梅毒約言杯專ラ此意ヲ言テ

アレ凡当芍散ノ姜許ニ圭木附杯ノ行処知ルイナシ

可謂其一ヲ知テ具ニヲ知ラスト

当飯芍散ノ腹候脘傍ニ拘攣アリテ痛ミ右ヲ按

セバ左へ移リ左ヲ按セバ右へ移リ其痛心下或ハ背セハ

推ニ徹スルリ

日草乾姜一ハ毒心下へ迫リ自汗盜汗スルヲ治ス又胸

中痛ヲナシ左ニ卧セバ左痛右ニ卧セバ右痛ホノ証ヲ見ス

者ヲ治ス皆トク心胸へ迫ルノ所致ナリ宜此方ヲ子スシ

氣上へ迫リ咳喘シ汗多ク出ル証ガ涎モ吐スル者アリ世

医此方ノ汗ヲ治ルイヲ知ルナリ此方ノ能汗ヲ治ノ処以

身無汗發汗
出前頸而還
氣逆緩者柴
胡姜桂一

咽中乾燥吐逆
者作日中于姜
一与之先生因以
吹用此方也

ハ氣逆盛ニメ毒内ヨリ外榮スル故ナリ

小兒頓ニ陰莖腫大ニナル者アリ先生檮木一ヲ子へ火吹筒

ヲ以テ頓ニ陰莖腫ヲ吹シメタレハ愈タリ此術本草ノ

附方ニ出ツ

先生曰凡瘍腫塊動氣アリテ年ニ應スル者針スベカ

ラズ

消渴病七味白朮散ニ瓜呂根知母麥門ヲ加へ黃連解

毒散ヲ兼用メ食禁ヲ能シ食養ニ六連根常食

ハ飯ノ上湯ヲ三椀ツ、用置前方ヲ久服スレハ能愈

ト云ヘリ上焦渴下焦渴アリ是ヲ能察メ治スレ

不食癯ニ枳肝枝脾一柴胡ヲ倍シ稜莪ヲ加へ辰砂散

或ハ左金丸兼ヲ兼テ効アリテ其他奇方ナリ

小兒遺毒ニテ陰囊腐爛スル者蔓朱砂荅一味ヲ煎

洗イ内ニ大解ヲ投スレハ愈ト云ナリ

畜血下利ノ証ニ瘀血ヲ逐フ劑ヲ用ユベカラスメヨキ証

アリ腹候及舌候杯ニテ考ヘシ証ヲ知ラズメ強テ確^明黃

劑ヲ投ズレハ直ニ死至ル此証ニ千金黃土一ニ黃連解毒

ヲ兼用メ効アリ畜血下利ノ証桃承ノ証ノミニアラ

ズ傷寒ニモ下血ノ証桃承ニモ限ラズ精ク可見

傷寒初起ヨリ
多汗ノ者アリ
強ク発汗スベシ
若漏テ不止者ハ
益元一ヲ用ニシレ
自止一如ナリ

傷寒多汗増寒衣被ヲ近クレハ汗漏テ不止又衣被

ヲ去レバ増寒忍ベカラス数日不止者アリ世医是ニ柴桂

一柴胡姜桂一或圭支加黄芪一杯ヲ与ヘテ不愈

メ謔語シ飲食不進終ニ死ニ至ル者アリ此証ニ連

アリ内熱甚メ如坎者越脾湯ニ宜シ后世所謂表

虚メ多汗者此病必自汗斑ヲ見ス陶節菴温経

一益元一ヲ与フレハ汗出テ諸証愈

石羔ハ有清寒
解之能故配石
作消散也

婦人乳腫痛スル者ヲ治スルニ吉益東洞葛根加吉更一

ヲ以テスレハ其方意不可諭ナリ予常ニ葛根加石桔

ヲ与ルニ甚効アリ然レハ亦不穩モ同シ其不然ヲ以テ是

大青龍配石
者癸解也

レヲ用レハ石羔ヲ用モ佳ナラシ乎且和解一ノ方中ニ葛

根加石羔ノ配アリ予嘗據是

委中毒ノ秋ハ委中漫腫シ疼痛忍ヘカラスノ后黒ク腐

リ悪汁出テ膿ニハナラス膝既ナト次第ニ腕肉ノ骨尖

ル者ハ委中毒ノ微也時毒ナトニテ委中漫腫シ痛ム

者アリ世ニ是ヲ見テ動モスレハ委中毒杯ト云者アリ

此症ハ腕肉ナトハ決クナク及テ膝既ナトノ腫ル者ナリ

忽々ニ看過ヘカラスハ物湯主之

風眼ノ初起ハ眼胞腫レテ疼痛忍ベカラス既痛劇ク寒

熱往来スル者ナリ此時早ク治ヲ施セハヨク愈ト云ヘリ

風眼張破テ出血不止者犀角地黄一三黃浮心一兼用メ
治ル者ナリ又出血止テ后痛ミ猶不止者ハ通明也

友人先生ニ問曰七八歳ノ女頓ニ兩足痿弱ニ立一能ハズ
右足心ニ指跃ノ如キ水泡幾ツモ生メ火傷ノ如ク是ヲ刺
ニ泔水ヲ出テ暫時ニ口飲リ泡外紅暈アリ推之ニ微
痛ノ麻痺風ノ如クハ麻痺爪ノ如ク非ス舌色眼中
腹中脉状飲食杯無異衆医手ヲ束子名状スル一
一医敗毒劑ヲ与ヘ破敵ヲ貼ス經一日再診スルニ五指
跃腫レテ黯色ナリ按之硬シ水泡前日ニ比スレハ足附ニ
及ニテ浮腫ス先生答曰予嘗テ大人ノ如ク者ヲ治ス

尤痿弱ノ甚シキ者ナリ凡水泡ハ血氣不循ノ所致也麻
風ノ水泡モ亦異ナラズ皆氣ノ循ラガルヨリ如此敗毒劑ハ
為標治具痿弱ヲ治スベシ桂朮附ニ紫丸兼用十日ノ
間ニ一度ニ之ヲ攻テ可ナリ

燥屎大便不通ノ証ニ蜜煎導硝黃ノ美用ヒテ無効衆
医手ヲ束テ如何トスベカラザル証ニ一奇術アリ烟管
ノ吹口ニ油ヲ塗直ニ腸ヘサシ右燥屎ヲ突碎ケバ次
弟ニ濕来リテヨク通スルナリ如此ノ証ニ右ノ術ヲ施
メ兩三人ヲ治ス又滌腸ノ方アリ
及鼻傷ヲ治ルニ内烏啄一紫丸兼用ス咬処ハ柿漆ヲ

ヌリ又痛甚シキ者豕耕散加雄黃ツクベシ痛立ルニ止ム
ナリ然レハトシ腫ヲ発スルアリ又中黃ニ雄黃煉交セ
咬ルニ貼ス

反鼻傷ノ劇証ニナツテハ一身腫ラナシ呼吸息迫已ニ死
トス此症ニハ針ニテ具咬タル方ノ岐ラサス清水出テ乃
愈ユ此法毎ニ行テ驗アリト又毒劇キ者ハ紫金錠
ヲ用ユベシ石解反鼻毒若四支厥者四逆一兼用ス

小兒解顛ヲ治ルニ具初起ナレハ急ニ葛水附ニ紫丸兼用
攻之テ可也予已ニ數人ヲ治ルニ効アリ大ナルニ至テハ

針刺ニ及ハズ茶カモ逢セズ七八歳已前一人治ラ講タリ
頭顛已ニ解シ目上竅シ殆ト救ベカラス故ニ治ツ拒メ
ハ強テ針セシヲ予予辭テ曰今針刺不可致者也若
是ニ針スレバ反テ命期ヲ促ス某曰ク医ヲ數人轉レハ皆ナ
不治ハ先生モシ刺テ治スルヲ得ハ吾幸ナリ若不治
凡亦何ゾ恨ミン故ニ予遂ニ針ス深サ寸許ニメ清玲瓏
タル者所謂逆出シ勢小減ストイハ脱狀漸々々出ツ
故ニ歸ラシム后二三日ニメ遂ニ死スト云々

解顛ハ二三歳迄ニ多シ神至ノ病ニメ頭次第ニ大ニナル
者ナリ初起搐搦ヲ發シ愈テ后十四五日ノ内ニ大閉ノ

辺ニ青筋ハリテ三ツノナアダ開キタルハ不治ナリ初起ニ
葛根水附紫丸ヲ兼用セシメヨ但シ又背マ腰ナドニ解顛
ノ様ニ玲瓏タル水気アリテ腫ルハ者アリ矢張解顛ト同
レ者ナリ

解顛ハ心神至病也小児二三歳ノ頃急驚風ノ如クニメ
癡搗シ愈テ后二三日モタキ天庭ハ青筋高ク出テ
又ヤク馭腫ルハ氣味アル者ハ必解顛ノ徴ナリ早ク葛
根水附ニ紫丸ヲ以テ下スベシヲコレテハ不治ナリ必氣ヲ
付ベシ凡テ針杯不可入鍼ヲ入テ見ルニ清液出ル者而
以症ハ必手足痿弱スル者ナリ

諸ノ痛症者血氣凝滯スルナリ金創杯ニテ痛ハ血氣ノ
廻ラヌ故ナリ行氣サスレハ則止ムナリ天刑杯ニテ痛症同シ
毒ニ閉ラレテ氣廻ラヌ故ナリ

洎丈覺ハ多胸中ノ毒ヲ解ス血虚ニメ謔語スル者ニ与フ
レハ了然トメ爽ナリ金創或産后自七分至一錢

臟毒ノ看法ハ先肛門ヲ開キ見ルニ内蝕メ甚廣クナリテ
赤小豆ノ如キ者ヲ下ス甚臭氣アル者ハ真ノ臟毒ナリ
甚シキニ至テハ反花スルナリ先不治ノ者ト見ユ以症ニ
一術アリテ治スル者ヲ得タリ幾利須
而留

没食子能胸中ノ膠痰ヲオク者ナリ小青竜或ハ麻馬脾

風ノ主菜香甘石杯ニ配シ投レハ十貼ニ過ズメ効アリ若
十貼ニ効ヲミヌ者ハ不應ナリ不可與ナリ

甘录丸ノ効ハ甚緩ナル者ニテ能解毒スル者ナリ毒ヲ解
シ尽ス程ノ効ハナシ長服スルニ非レハ効ヲ得ルヲ難シ然レ

虚状ノ者ニ長服スルハ腫癢ルヲアリ油断スベカラズ
虚状ニテ腫ヲ癢レハ毒堪ヘス故ニ遂ニ命ヲ損ズ

龍花瘡ハ腐菜ニテ先一度ハ治レ氏先難治ナリ先年一男
子臉骨ノ辺ニ血瘡アリシヲ医治ヲ誤テ羊面反花

セリ予腐菜ニテ切タレ氏眼胞ニ至テハ眼ヲ失セシ
ヲ恐レテ意ノ終ニ術ヲ施サス其ヨクトレテ殆ト常ノ眼

異ナラズ治タリ然レ又兩年ヲ歷テ彼ノ眼胞ヨリ又
女シ反花セリ次第ニ弥蔓ス因テ右ノ術ニテ又治シタレ
氏五六歳ヲヘテ又癢シ遂ニ死ス

反花瘡ヲ視ルニ篋ニテ肉ヲコサゲテ見レバ忽チ血ヲ出スヤシ
破レハ忽チ出血スルナリ他ノ症ナレハ決メ血不出反花瘡癢
ル処ニ因テ生肉ノ処追トリ尽ス愈是切斷スル術也

腐菜ノ瞑眩ハ大ニ口中燥舌上黄黑胎ヲ生シ水ヲ好ム
者ナリ飲食不進惡寒癢熱ノ証ヲ癢スルナリ
甚ハ煩渴煩悶ヲ癢シ毒心下ニ迫テ遂ニ命ヲ損

ズル者ナリ油断スベカラズ早ク黄連解毒加菜豆
或石連甘草加菜豆湯杯ヲ手強ク用ユベシ且冷
水ヲ用屢漱テ可ナリ

凡胸腹及臟腑ニ近キ腐骨疽ノ萎ニハ鉗ヲ刺スベカラズ脱証ヲ見スナリ

眼胞及唇四ニ塊アル者ハ内ヨリ取ベシ是先生ノ一術ナリ

橘皮土黄一ハ癬瘡ヲ治スルニ甚妙ナリ一人小創ヲ患テ

瘡兩三ノ小寸キ疥出テ痒痛忍ベカラズ搔ケバ出

血スル者アリ 諸治効ナシ予此方ヲ与フルイ七八貼ニ

メ愈タリ

小児生ナカラシメ足ソリカエリ地ヲ踏イ不能者ハ之治ル幼

穉ナルキハ術ヲ施メハ不治ナリ逆序先七八歳ケルニ

及ニテ治ヲ施スベシ治術ハ先板ヲ以テ足底ノ形ヲツ

クリ足底ニアテ具大指ノ間ヨリ木綿ヲトリ結ビ膝下

（引付ルナリ具常足ノ形チニ成ヲ以テ要ハ一日ニ兩

三度ブランドニテ蒸シ引モドシ強テ步行サスベシ急ニ効

ヲトルイヲ欲スルイ勿レ譬ハ樹木ヲ撓ニ急ニスレハ撓ガ

タシ緩ニスレハ意ノ如クナルハ同シ此者世ニ間々アリ術

施シ難シ一ユ夫アルイナリ

凡腫物膿ヲ能推出スベシ不然ハ又大ニ腐ル者ナリ又

腫物引テ重テ痛ヲ発ルハ再ヒ膿ヲナスナリ
走馬疔ハ不治也云々去ル酉六月八日小兒走馬疔ヲ
患エ具ノ腐已ニ靨ニ及ビ齒脱スル一三四枚先投之以
芦薈消疔飲加味清胃散加犀角日二十貼ヲ尽ス
兼用人中白散不日メ愈エ具后漸齒生ス

天刑ヲ治セント欲セバ先其難治ノ証ヲ知ルベシ手ノ肌膚
潤沢ナク枯燥メ光アル者又眼中黄ニシテ精神ナ
ク或又血ヲ帯ル者合苦脱肉スル者此難治ナリ口服
啗斜スル者アリ又灸治出血温泉ノ灸皆効ナシ

温泉ニ浴スル者輕病モ難治ニ至ル出血ハ予是レヲ
誠ニ已ニ暈倒ニ至ル迄出血セシ者アレハ又本ニ及リ
テ益ナシ反テ脱状ニ及フ者ナリ

婦人久シク敗瘡ヲ患ヘテ諸藥無効者ニ桃承ヲ灸ヘ桃
花散ヲ兼用メ甚ヨク應ルナリ又桃仁油ヲ患處ニ
貼スル佳ナリ

腐菜ヲ用ルニ其贅肉ノ分ヲ知ラサレ治ヲ誤ル一受
シ其分ヲ能知テ治ヲ施スベシ此ヲ知ル法坐肉ニ鍼
ヲ下セバ其血シホクト出テ飛且鮮血ニ非スヨク患
ヲ用ヒテ具機ヲ発スベシ

取蟾蛛法蝦蟆ノ生タル者ヲカラ鍋ニ入武火ニ登セ漸々
油出ルナリ出尽タル寸火ヲ下シ皮骨ヲ去リ油ヲ取ナリ
正宗ノ取法甚不便ナリ

乾牛丸 治遺溺

右一味糊丸久年下利足跗時々水氣ヲ生ル者此方
ヲ子ヘテ愈ユ昼寐ナドメ居ル中ニモ漏出ス者ヲ二三
人治シタリ云

黒子大ニ尖起スル者ハ毒ニ不可取間々反花スル者ナリ
ヨク黒子ノ根肉ヲ取尽セバ不再発一病人十五年以
前腐菜ニテ取之漸々反花メ如榴実未テ治ヲ

乞フカラアンスヲ付テ后衝ヲ貼ス假令治ス凡亦反
花セントス皮薄キ処故輕キ腐菜ヲ貼ス 甚大切ニ心得
ベシ

因火傷足ノ指四指皆屈而不伸愈付タリ先生乃チ
麻葉ヲ用テ四指ヲ切伸シ白雲ヲ付テ丸木ヲ足甲
ヨリ四指ヲ結付テ置ナリ后生肉赤クナリテハ反肉
ス青蛇ヲ貼メ愈

火傷ニメ膝臂ナド引付タル者チヨト見レハ蚕度凡ニ上
ニ上テ浮タリ六ヶ布ナリ龍鬚頂刀ニテ先皮ヲ去リ
和ラカニ手ヲ以テ引時ハ蚕度ハ自ラ伸ナリ

腸痔ノ病者アリ一日五六行モ下血メ血液枯燥メ大
瘦タリ此節近辺ニ痢疾ヲ病故皆痢疾ノ治
療ヲナス弟子ハ魚肉ヲ堅ク禁ス先生魚肉ハ
免メ食セシム先生門人ニ謂テ曰常ニ病証ヲ究
明スベシト云ハ是カ為ナリ諸医皆ウトキ故此ノ如キ
見誤ルイ多シ且病血ヲ下ス者ハ臍肉ヲ禁セズ
膿ヲ下ス者ハ堅ク禁スベシ

足ノ甲ニ附骨疽ヲ患テ時々自然ト出血スル者アリ是
足ノ甲陽明經ニテ多血ノ処故ニ出血スル者アリ医
タルモノ不可不知

癩疾ニテ毒肩背ニ発ル者深シ故ニ難治ナリ又肩
肉脱スル者ハ難治也又口眼喎斜スル者ハ治療ニ
メ終身迄固凝者ナリ

諸腫物ヨク膿ヲ出スニシカズ上愈テ膜隔テ内ニ瘀
液滞リ又々膿カヘル者ナリ能ク推出スベシ大夏
ナリ腫物重テ痛ヲ発ル者ハ膿カヘル者ナリ

婦人陰中腫レ痛ミ陰門ノ口肉腫硬クメ指ヲサユハ
振ヒ倒レ不堪痛者アリ絶テ交合杯ハナラザル者也
此症ニハ涼榮浮火ヲ用テ洗陰散ヲ以テ屢洗
テ愈タリ

銀ニ瘡ヲ生大ナ桃実ノ如クニ痛アリ衆医割テ血ヲ
出ス一杯許如此スルイ数度ニ消シ又旧ノ如ク
食スルイナラズ

先生某線ヲカケ置テ十五日ニメ落タリ血モ多不出
伝是牙痔ノ大ナル者ナリ

繭唇ハ上唇ニ黒ク高クニユノ状ニ似タリ故ニ名ク腫テ
痛ヲナス切レハ出血メ不止是モ疔ノ一種ナリ黃連

解毒棒皮巴豆ヲスリ交貼メ効アリ

婦人尿道破裂シタルハ甚難シ先生モ三度追縫タレ
未タ全ク旧ノ如クナラズ伝ヘリを淋毒ニテ破レシ伝ヘ疑フ

ヘシ又産ニテ破レシ者アリ此ハ先深鍼ヲカケ強クヒキ揚
ケ置テ縫也道寸水管ヲ尿道ニサシヲキ細カニ縫フ小
水ノ湿ヌル故ニ小水ノ度毎ニ無明異ヲ貼スベシ

治火傷痕法付斑點メ后痕高クナル者アリ此ハ全ク最
初ノ治方アシキ故ナリ先披針ヲ以テ乱刺メ拔毒
ヲシキ大玄杯ヲ蓋膏ニメ三四日置ハ自然ト一皮腐
リテ若下ニ又一皮點黥アルキハ又拔毒ヲシキ破敵ヲ
貼ス下メ黒ミトリ尽ス后愈膏ヲ貼スルナリ此病ハ
深キ者ニ非ス然シ此モ治不治アリ黒クダシ高ナル
治シ易シ地並ニメ紫色ナルト黒色ナルハ不治

鼠毒創 薰藥法 綿實 一錢 蒲黃 一分 右二味 薰創

又方 犀角 璣珀 躑躅

右三味 細末 白芷根煎汁ニテ送下 此方 疔鼠創 久
フメ不愈時々 発熱 譫語者 主之

白雲 疔新多ル者ニ用ユ 火傷ニ 牡蛎ヲ加フ

大赤 專ラ 火傷湯澆ニヨシ

前衝 金瘡ニ貼ス 何レ新疔ニヨシ 肉ヲ長スルナリ

大玄 疔突破敵ノ輕キ処又肩或腰足ノ痛ニ貼メヨシ

決勝 今用ハ 血竭 六錢 硫黃 四錢

摧兇 腐肉アルニヨシ 治用廣シ

破敵 同断

遊奕 蓋膏也 散凝血

臍風 古名ナレト 實ハ破傷 濕ナリ 荏苒トメ 一年モニ

年モ愈カルアリ 或突出メ 高ク腫モアリ 或腐リ入

腸迄モ腐ル者アリ 治方常ノ破傷 濕ト同シ 然シ

高ク腫テ 水フクレノ如ク有ハ 青蛇アトハ 疔突或紫雲

纏蛇毒ハ 風毒ヨリ 末ル状ヲ以テ 名ツタナリ 或腰ヲホク

纏ヒアリ 或脊ヲ纏アリ 調氣ヲ与テ 効アリ 紫田魚用

ヨシ 畢竟 外肉ニテ 内ハカ入フ子ハ 恐ル 故ニ 初ニ 発

散解毒ノ類宜

天蛇毒一名蛇咬毒 此ノ間ヨリ濕入テ腫痛ヲナス倍ニツクハラミ伝

指ノ腹ヨリ痛出ツ

甲ヨリ痛出ツ

代指疽ハ指ノ本腫レテ痛ヲナス倍ニ本ヅク伝

癰疽ハ指先腫テ痛ヲナス倍ニ指ス、キ伝皆治法同シ

甲疽ハ天蛇毒ニ似タレト疾痛甚シ或痒痛ヲナシ或熱痛ヲナス昼夜寢食セザルニ至ル膏ハ破敵後毒ヲ

ク治ス

溺死ハ心下臆中アタリニ暖ニリアリ或呼吸如線通ス

ルモノハ生スルナリ凡水ヲヨク吐カセ活ヲ入ナリ面赤色ニ

ナル者ハ夫ヲ仰ケニ卧セ臍上ニ食塩ヲヲキ艾灸ヲ大クメ
姓スベシ次第ニ熱ヲ覺レハ治スルナリ茶ハ茯苓ヨリ何レ
利水ノコナリ

癰キリール先腐テ后肉腐ル者ナリ毛孔粟ノ如クツブト

出テ按之寸ハ毛孔ヨリ膿シクト出テ的トシ瘡敗去

文字ニ切割灸ス先毒ノ爵結シタル処ヲ早ク切開

キ膿血ヲ出ス是癰ヲ療スルニ先鋒ノ一術ナリ

陰狐疝 小腹迫上リ或差引ノアルニ芍甘附ヨシ又此

証ニメ水ヲ取アリ併ナガラ中ニ膜アリ夫ヲ維テ腐

ラシ取ラ子ハ再発スルナリ此親灸メ知ルベシ妄リニナ

スベカラズ

師ノ白市場村某去冬十月頃ヨリ在病漸々虚脱ニ夜
半頃ヨリ眠醒ヲ催ス片ハ盗汗出四肢羸瘦故ニ二医
見之為虚勞施治則効ナシ故ニ乞治診之脈微細羸
瘦骨立伝ベキ様ナレバ虚勞ノ微ナシ能見レハ腎肉
漫腫脱スル中ニ肉厚ク見ル故之ヲ按セバ乱腐甚
即敗液流注ナリ故ニ刺之膿出ル一三升餘神効内
托ヲ与ヘ一回ニ差ル一ヲ得タリ凡医ノ病ヲ探ル一甚ダ
恐ルベキ者ナリ全軀虚勞ノ舌ハ赤色ニナリ薄クナル
ガ真ノ虚勞ノ舌候ナリ夫ヲ知ラス漫リニ虚勞伝ハ非ナリ

倍ニ氣腫伝者多ク腮ニ生ス潰テ膿ヲ流シ又口開テ膿
イデズ如此スル一六七度モアルナリ桃承ニ杜仲ヲ加テ二
十貼ニメ治タリ

青筋ハ筋筋ノ卒カニ肩ニ凝テ氣絶スルヲ云三稜針ニテ
三四推ノ辺ヲ刺スニ血出カル者ナリ其時抜針ニテ深
ク切ハ出ル者ナリ前ノ三稜針ニテ刺タル穴ヨリモ皆血
出ルナリ一處開爵ハ百絹ミナ刺ス伝是ナリ凡テ暴
発ノ病ハ皆刺絡スルガヨシ刺絡ノ法書別ニアリ
腎囊風ハ經行ノ時具婦ニ交レバ此瘡ヲ生ス伝禁殺
生曰經行ノ時交合ヲナセバ具兒必癩トナルアリ失張

此意也或昔蓄滿メ陰時ヨリ背脊迄モ生ルアリ或周身
瘡ルモアリ肌表ノ毒也内藥楮苓接骨木一或若
腦散土大黃蒸付ベシ

阿片此水ヲ取法 糸囊花則罌粟花々落テ后穀
ニ小刀ヲ以テ四五筋破リ置白膿出竹篋ニテ取日ニ
一度二日程ニ取ナリ

主治喘息或遺尿一切息迫ノ証ニ用テ妙毎日二
重許粟粒ノ大ナ不可大過瞑眩甚シ

製礮砂法 二十年モ輕タル馬ノ尿ノ桶ヲ見ク粘滯
リアル也支レヲ取テ日ニ于シ直ニ水ヲ入レ升露罐ニテ

取ベシ其后茶碗ニ入上ヨリ蓋ヲメ泥封シ霜月ニ至テ
陰地ニ埋メ末三月ニ出スベシ上へ氷ル者アリ乃礮砂ナリ

虎杖根ハ凝血ヲ散ス虎杖茎ハ破傷風灸火ヲ治ス

嘔吐ノ劇症世医ノ所難ナリ隨証曼苓一或伏竜肝煎
難奏効者吾師福井氏常ニ愁之自作一奇方名
之曰

三聖湯即主治啓胸膈之鬱氣止嘔吐噦能進飲

食尤治嘔吐之聖劑也

紅花 煨椰子 香附子

右三味水煎或隨証加茯苓陰乾葉蘭宜冷服此

湯奏奇効

天保二年卯歲十月下旬

比賢寫



