



2

彌布涅兒列布羅奇驗方

列布羅治法

古今列布羅癩病性ノ治法第百般一ナラス今予カ見ル
 如ラ以テスレハ坎治法ヲ分ツテ三網トナス一モ当レ
 リトス〇オ一網預防治方オニ網究理治法オ三網妙効治
 方是ナリ

預防治法

其一法ハ凡ソ体中ニ在ル邪毒坎病人原因トナリテ坎ノ
 如干患害ヲ催起スル所以ノ者ヲ駆除スルニ在リ〇其オ
 ニ法ハ患者ノ衆ヲ致シ健康ヲ催促ス所以ノ処置ニ在リ



洋学文庫
 文庫8
 F 22
 2



○其亦三ハ浴湯或ハ蒸氣浴ヲ以テ患者ノ表圍ヲ清淨ニシ表發蒸氣ヲメ常ノ如クナラシメ鮮屑及ヒ痂ノ如ク者ヲ緩和シ以テ其表圍ノ体負ヲメ常ノ如クナラシムルニ○列布羅ノ輕症末夕是シキ原因アリテ体中ニ根柢スルニ非ル者ハ尤モ此ノ預防治法ニ因テ良能ノカヲ扶助スル寸ハ自ラ愈ユ

究理治法ヲ論ス

以治法ハ一ハ病理學ノ則ニ從テ之ヲ治スルノニ○若シ坚硬不消化ノ食養或ハ右部ノ分離機ヲ失スル等ニ因テ腸胃中汚物ヲ生シ此ニ因テ更衣不可者或ハ門脈中血液

運行ヲ妨害セル者ハ浮下劑ヲ施ス可シ体負稍刺衝性ニ傾ク者ハ清涼劑ヲ用ヒ之ニ反メ運行急慢ニ屋スル者ハ刺戟真奮ノ劑ヲ用フニ即チ大黃藥刺巴芩苓藜蘆等是ニ或ハ甘汞ヲ加フルモ可ナリ○古人此病ニ浮血ヲ施ス法アリ然レ氏此法ハ刺絡或ハ水蛭角法ヲ論セス皆不當ナリトス○若シ其患者ノ体負傍奈ノ諸症ニ激衝性ヲ帯ヒ果メ浮血ノ正的確露ス者ハ止ムヲ得ス慎戒シテ更ニ從フ可シ

○撰生法ヲ膜ハ食養ヲ節ニシ以テ補給ノ機能ヲ助ケ血液ノ混合製造ヲメ常ニ復セシム

、慎ムカ

蓋シ此病ノ本色ハ專ラ血質ノ不良ナルニ因テ体質常ノ如クナラサルヲ以テナリ○故ニ媒毒性キリール病シケウルボイクク痲癬等ノ如ク諸症ニ用フルノ劑ハ皆以テ此病ニ的施ス可シ○ウイルラニ氏曰レブラニクリカンスニ於テハ「レ」プヲ治スル尋常ノ劑ハ大抵其効ラナスヲ稀ナリ而メ此症ニ於テハ常ニ滋養ノ根生ヲ施シ身体ノ運動ヲ節ニシ幾那礦酸海水浴等ヲ用フルヲ尤モ的當ナリ○ウイルラニ氏ノ此病ヲ論スル大抵此ノ治法ヲ推シテ知ルヘシ而メ常ニシケウルボイクク質ヲ以テ其目的トナセルニ似タリ

奇効治法

或曰列布羅ハ全体中ニ隱惹スル一種得テ探索スヘカラサル原由ニ因テ発ス故ニ其因ヲ生スル所以ト其本色ト得テ知ルヘカラスト又曰此病ハ癩癩性ノ媒毒癩様及ヒ百九此ノ如キト諸病ノ如ク一種奇効ノ治法アリテ尋常究理治法ヲ以テ決シテ治スヘカラスト今此説ニ從テ試シ奇効劑ノ尤モ顯著ニメ列布羅ノ為ニ一種ノ能力ヲ具有スルカ如キ者尤ニ揭示ス其試験ノ如キハ或ハ大ナル奇効ヲ奏シ或ハ稍否ラサル者アリ○奇効劑ハ内服外用ヲ論セス是數極メテ許多ナリ此レ

此病ヲ療スル者預防法ニ從テ其原因ヲ除キ或ハ究理治
法ニ由テ其治ヲ施スト虽氏嘗テ其効ヲ見サル寸ハ宜リ
此劑ヲ撰用スヘキアリ而メ之ヲ撰用スルト甚々難シト
ス蓋シ医家ノ所見各異ニメ從來ノ經驗或ハ異同アリ且
ツ術者甲ハ称用スル劑乙ハ以テ否ト為シ乙ノ奇効スル
如ハ甲ノ廢棄スル如ナルヲ以テ奇効劑ノ撰用極メテ。夏
ニメ未タ一定ノ規則アルトナシ
○古人此病ニ於テ峻下劑ヲ称用ス殊ニ黑蘘芦白蘘芦ヲ
称用ス○加羅蔑兒药刺巴芦荅等ニナ此等ニ克ツヘシ○
蓋シ下劑ハ只ニ快ヲ一收ニ取ルニ足ルト虽氏未タ十全

ノ快復ヲ致スヲ能ハス○蓋シ患者腸管ヲ清淨ニ表圍ノ
患腸管ニ引導ス
○安貞護扭製劑及ヒ尋常安貞護扭ニ硫黄硝ヲ加ヘタル
劑ヲ單用シ或ハ複用シ并ニ微々効ヲ奏シ或ハ全ク効ナ
シ但シシニヒウセエン、インピシアテールハ此劑偉効
アリ
○水銀製劑或ハ大ニ称用シ或ハ大ニ毀損ス但此劑セレ
マンフニ良劑タレレプラニ効ナシ猛汞ヲ燒酒ニ溶化
シ「プラノ秘業トシ大ニ賞譽スレ氏此劑只媒毒性ノ諸
病ニ効アルノニ其他水銀劑ヲコムハイクチーニ用ヒン

ト欲セハ飲劑及ヒ安貞謨担製劑ヲ伍用スヘシ

○礦酸「プラニ称用ス此酸」シケウルホイタノデイケラ

シ「レットズ」ニ緊要タレ氏硝石酸海塩酸ヲ以テ

プラノ奇効ヲト為シ難シ

○羅屈塩殊ニ整乙典埜羅屈製劑ルウサルアフ各人毎貳其峻効アルヲ実験ス

用法 十滴ヨリ三十滴至日ニ三次

ホウレ止及ヒ「アリソ」各人ノ亜尔鮮下幾古尔扶蘭斯ニ

テ頑固ノ症ニ称用ス「ロイス」名地ノ町ノ病院ニ於テ亜尔鮮

下幾去兒甘朮芫菁下幾去尔ヲ拔撰ニ必用ス

○安多羅古加里ホルヘイス各人ニ大ニ称譽スレ

プラニ次方ヲ専用ス

安多羅古加里ニ或ハ廣屈涅失亜或ハケムナム

オニ「カラ」デニ或ハ金硫黄或ハ「ベン」セ

スルアトブニ右調勻分テ三包トシ二十四時間ニ

用尽ス

右劑ヲ以テ全身或ハ局部ニ於テ抗拒ヲ顕スニテ持重ス

ヘシ

○論者曰安多羅古加里ハ「ラ制伏ニ安貞謨担ハ「ラ制伏ス蓋シ此ニ個ノ者相合メ「ラプラ」ノ原因タレハナ

リ
○古人此病ニ蝮ヲ称用セリ而メ用法モ又一ナラス○或ハ子肉ヲ未トシ或ハ煮テ羹汁トナシ与フ蝮皮ヲ以テ或ハ幼雞ヲ養畜シ患者ヲメ其雞肉ヲ食ハシム○當時以用ナシ

○荒菁丁莖去尔他ノ頑固ナル皮戸病ニ於ケル如クニタ以テロフラノ奇効劑トセリ○ウイルラン氏及ヒハルコレフル氏ハ之ヲ用テ其効ヲ未タ見ス○ヒートツトライレ及ヒクレーン氏ハ此劑ヲ以テロブラノ有力劑トセリ或ハ頑固ノ症ニ之ヲ用テテ四週ヨリ六週ニ至テ全治ス

ルヲ見ル○其用法ハ四滴ヨリ五滴ニ至ルニテ緩和ノ藥汁ニ和メ与ヘ漸次ニ進テ十滴ヨリ十五滴ニ至ル○然レモ漫リニ其量ヲ増シ或ハ忘意ニ之ニ久服セシムル日勿レ蓋シ此劑ハヨク飲食消化機ヲ害シ且ツ諸般ノ患害ヲ生スルヲアレハナリ

○草木中ニモ亦ヨリ列布羅ニ効アル物諸品アリ即チササハリルラ瑞香皮榆皮リスラスニコニス等是ナリ○予カ著某ノ昏ニ從ヘハ榆皮一ヲヨリ十ニヲコテ煎劑トシ内服セシメ其滓ヲ取り更ニ菜汁ヲ搾リ之ヲ以テ患部ヲ洗ヒ竟ニロブラノ全治ヲ致セルヲアリ

○胡瓜及ニアウキルケニ新鮮ナル者或ハ酢ニ浸出シ用テ「レ」プラニ奇効劑トス或ハ此草ノ実及ニ葉ノ煎劑ヲ用フルコアリ

○ウイルラン氏ハ白蘂芦黒蘂芦根下發去兎ヲ輕量下利セケルニテ用テ良効ヲ得ルコアリ
シリクト氏曰「レ」ワ羊泉ハ「レ」プラニ奇効ヲ具フ

○用法

ワ羊泉一コ 煎メ一ヒノ液ヲ取り日ニワ羊泉ニコノ量ヲチフ竟ニ進テ日ニ一ヒヲ服スル至ル外用此洗汁ヲ以テ洗滌劑トス用テ八日ニ至ルハ効ヲ見ル

○脆弱知覺シ易キ人ハ此草ニ由テ心悸動困悶眩暈等ヲ發スルコアル然レモ此症ハ其量ヲ減スレハ自ラ愈ニ或ハ同時ニ揮發下發去兎飲料トナシチフレハヨク此草ニ堪エルトコト得○此草ヲ以テ患者世三人ヲ療シ其世一人ヲ全治セリ
○外用劑モ亦万種アリ今其大綱ヲ左ニ揭示ス榆皮洗滌劑水銀膏及ニ硫黄膏十五ヨリ猪脂四コニ和シ毎夜患部ニ擦劑トシ毎朝石鹼温水若クハ羅偏稀水ヲ以テ清滌ス同時ニ硫黄ヲ以テ製スル里没那埜若クハ野菜莖煎汁ヲ内服セシム○此劑ニ由テ結痂自ラ解脱ニ皮膚潤澤ヲ

生之痒モ亦隨テ自ラ散ス○療法損害ナリ十二日ヨリ百
九日ニ至ル○時トメハ輕キ變動ヲ生ス○又景仗ニ從テ
水銀諸薬及ヒ他ノ礦物ノ軟化膏ヲ伍用スヘシ
○浴法モ亦療術ノ一ナリ以テ皮膚ヲ清淨ニシ蒸氣ヲ催
進ス○病癢未タ大ニ侵襲セズ或ハ其景况浴法ヲ希望セ
ハ才一温浴法洗滌法蒸湯法蒸氣浴ホヲ試ミ尔后硫黄泉
及ヒ硫黄ヲ以テ製シタル浴湯羅俣浴湯水浴等ヲ用フヘ
シ蓋シ海水浴ハ最初温ニメ浴シ尔后海中ニ於テ浴スヘ
シ○夏ニ當テ痂ノ進襲スルヲ防カニ為ニ反復數回浴法
ヲ施スヘシ○バターノ水「ブラ」ニ峻効ヲ備フ飲劑并ニ

浴湯トシ用フ○曾テ患者八十二人此法ヲ行フ其内五十
二人愈フ二十四人稍快ヲ得タリ○尔他古今称用シ来ル
外系ヲ左ニ掲示ス
明礬 硫黄 硝石 生石灰 石胆 胆 葦藁
人尿 熊胆 菴蓐 白百合球
右ノ諸系ヲ實驗スルニ「ブラ」ニ於テ其驗ナシ
○其酷厉性或ハ其他腐爛侵蝕ノ諸系及ヒ芫菁膏ホ亦取
トメ施用ヲ要ス○外見ヲ飾ラニ為ニ此ノ如キ諸系ヲ施
スノ后皮膚其腐爛侵蝕ヲ被リ其部ニ於テ新タニ皮膚ヲ
崩起シ而メ竟ニ「ブラ」ノ真症ヲ次クナリ

○身体ヲ清淨ニシ戒慎シ作業ヲ適宜ニ十分ニ保持スルニ由テロアラヲ克制スルアリ○自然良能医業ヲ須スル以此病ヲ復良スルアリ

○著者總テ經久諸病ヲ以テ「ベルブ」トシ「英収水泡状痛状鮮屑状腫物状」ホノ諸状ニ隨テ單復ニ分ツ○其單ナル者ハ深ク身体諸器機ニ根柢シ而メ皮膚ニ異性ノ「テイスカラ」ニ「ラ」ヲ發ス○其復ナル者ハ「ベルベ」ナセ他ノ「テイスカラ」ニ「ゴ」ト相合メ發ス便チ「シカ」ニ「セ」梅毒性癩病性羅斯性木節腫性ホノ「ベルベ」フ是ナリ

○「ベルベ」フノ近因ハ一種ノ「テイスカラ」ニ「ヨリ」来ル一

異變動ナリ故ニ他ノ「テイスカラ」ノ如ク妙効業ヲ望ム○安多羅古加里ノ「ベルベ」フニ於ル硫黄ノ「スカ」ニ「セ」水銀ノ瘰癧性安負膜担ノ「レ」フロセ伊遠尔膜ノ「カルキヤマ」テ「セ」テイ「スカ」ラ「シ」ニ於ルカ如キ各種ノ「テイスカラ」シ「シ」ノ妙効業ト一般ナルカ故ニホリアリ氏安多羅古加里ノ「ヘル」ヘスノ妙効タルヲ諸ノ「コム」アリセアニ「シ」エ「ニ」ヘセ「ル」ル医家トセントス

○安多羅古加里「ヨ」ル「エ」ン「カル」キハ石炭ト醫典埜加里ト溶化セル者ナリ「轔」色石炭ヲ用フ「黒」色石灰ハ用テ「ス」

○製法

○新製ノ警典埵加里セテ極末ノ石炭ユクヲ取りテ
メス混合燦化シ火ヨリ下ニブラセハテトヲ温メタ
ル小白ニ入レルヲセハラト末詳單ニ極末同等ノ軟ニ
至ルニテ研广シ一ヲ容ノ硝子壘ヲ温メ固密ニ收メ貯
フ

○硫化安多羅古加里ヲエリテラコリテハニ
製法前法中硫黄半ヲ加ヘ褐色加里トス製法上ニ同
シ

○安多羅古加里ハ軟ニメ純潔ナル散末ナリ其味酷厉羅
僣盧ノ如ク舌上ニ點メ燒カ如ク煤臭アリ○大氣ニ触レ

テ湿ヲ引ク然レモ流動スルニ至ラス乾淨ノ氣ニ逢ハ再
セ温ヲ復シ隨テ又羅僣様ノ呆ヲ失ス

亞兒箇ルニ投メ些少溶解シ蒸溜水ニハ甚ヨク溶解ス○
精密ニ製シタル品ハ溶解シテ其液同ホノ秤量アリ其液
ヲ蒸餾スルニ其色ヲ失ハス若シ其色ヲ失スルハ製造精
ニナラサルカ故ナリ

○効能ハ健康ノ人ニ一日ニ三美汁ト極メ安多羅古加里
十ムヲ十時ニ存テ而後血液大ニ表皮ニ烈流シ恰モ灼カ
如ク脉速關節怠慢夜ニ及テ大ニ汗淋漓晨ニ徹ス而メ大
ニ浮下スルヲ兩回皮戸兩日ヲ経テ尚湿润セリ

○用法 経久皮戸病ヲ患ヘ消食機損害ナキ者ニハ后方
ヲチフ

○其方 安多羅古加里 三々 甘草 五々

○右混和 一貼ト為ス一日ニ三貼或ハ四貼ヲ与フ
或ハ患者ニ与フテ即夜先ツ起熱シ次テ脉実ニメ速ニ全
身発汗ヲ皮表灼カ如キヲ覺フ○又患者ニ由テ五日或ハ
七日十四日二十五日甚シキハ五十日ニ至テ上ノ諸症ヲ
発スルコトアリ○発汗多分湿ナレト又少シニ冷ナルアリ
○其汗始メ数時ニ限ル終ニ終夜発スルニ至ル然レト曾
テ衰弱ヲ顯ハサス却テ健康ヲ促ス○発汗后猶局部ニ温

汗或ハ冷汗ヲ余ス其經過ノ間一定セス○多分此汗皮病
ヲ俱フル部或ハ腋手ノ下頸肩尻陰部ホニ発ス○大抵病毒
分利尽ルニ至ルマテ經過ス○全身ノ発汗局部ノ発汗共
ニ糸カノ致ス如ナリ○夜汗始テ発スルヤ忽チベルチ、
セフレラレシ廣大ニナリ赤色増進シ病毒分泌旺盛シ痒
ヲ覺テ班ヲ発ス患者或ハ子トテ羅私ニ羅リシカンセノ
患者ハシカシセ羅私ニ羅リ或ハ患者ニ於テ痒甚シリ毎
朝消散ス所謂ヒケルス羅リ○局部抗拒ノ經過一定セス
ト虽レ其夜毎ニ痒減シ隨テ赤色分泌共ニ減少ス患者
ハ一日ヲ経テレイテハニヲ得タリ

○全身及ヒ局部ノ抗拒ヘルベテセノ病毒ヲ駆除セス何
トナレハ熱ナキカ故ナリ」スヘシニ」及ヒ一種ノ變動ニ
由テ明症スル熱ヲ発セン為ニ安多羅古加里ヲ持久シ便
チ運営ヲ盛ニシ十分ノ発汗ヲ得ルニ至ル
○オ一變動ハ「医業ノ全身各部ノ発汗ヲ催進スル如ノ衝
動ナリ

○オニ」スヘシセンハ「医業ニ由テ発シタル熱ナリ」○熱様
抗拒ノ経過ノ間「ベルベルス」惡候ヲ顯ハシ總テ之ニ層ス
ル諸症較著ニ増劇ス○解熱ノ后患者ノ症候頗良ニナリ
快復日ヲ追テ進ム○クレ」ニ氏以此ノ全身各部ノ惡候ヲ

以テ快復ス確徴トス○總体ノ變動大甚ニ過ハ、安多羅
古加里ヲ停止スルニ至ラス○抗拒ヲ挺發スル最初ニ於
テ消食機ヲ廢ス而メ后然ラス○順序ノ脈ヲ變動ノ終期
及ヒテ「シカシ」ノ快復ヲ徴ス「テイ」スカラシ」ハ「元素
変性ヲ素トスル者ナリ

○硫化安多羅古加里 其効安多羅古加里ヨリ迅速ナリ
然レ氏安多羅古加里ハ其上位ニ抽ニス何トナレハ緩徐
ノ効カ彼ノ迅速驗ヲ一時ニ顯ハスニ優レハナリ

○良善ノ摂生ヲ保持スレハ弱年ノ徒頗良ノ形況ヲ得ル
ニ從テ七月ヲ経テ快復ヲ得四十五十令ノ輩ハ兩年ヲ経

テ其域ニ至ル〇以径久療法効ヲ医薬ニ假ラサルモ亦ヨ
ク疾病ヲ快復シ又ヨリ医薬ノ効カラメ逞シカラシムル
ノ之ニ
〇此其
〇其
〇其
〇其
〇其
〇其
〇其
〇其

警典埕加里

製法

生石灰三勺 剥莖垂私ニ勺 雨水十六勺
右生石灰トホトアストヲ合シ鐵壺ニ内レ水ヲ加ヘ火ニ
上セ木棍ヲ以テ手ヲ留メス攪セ煮ルヲ四分收此液小許
ヲ分テ取り淨過シ試ニ酸果ノ液ヲ之ニ加フルニ滾動ス
ルハ垂尔加里塩未タ純粹ナラサル候トス故ニ右ノ液ニ
生石灰少許ヲ加ヘテ鈍烈トナシ滾動セサルニ至ルニ
又ホトアスヲ温湯ニ溶シタル液ヲ以テ其液ニ加フルニ
濁ルハ石炭過多ニメ液中ニ混和スルニ酸ヲ加フレモ滾

動スルヲ是少ク又ホトアスヲ加フレ氏濁ラサルハ此液
銳烈上好ナル候トス硝子ノ漏斗ニ布片ヲ重子シテ是ニ
右液ヲ浮内テ硝中壺中ニ滲漏セシメ終ニ少シ絞リコシ
其液ヲ火ニ上セ水氣ヲ蒸散ニ減メ八分ノ量トナシ是ヲ
大ナル硝子壺ニ移シ入レ固封メ静定ニ清澄トナルニ至
テ其壺ヲ去テ硝子壺ニ收メ硝子壺ニテ固封シ貯蓄小箱
○固性硝石 ホトアスノ代用ニ遊童ニ於テ水ニ四一火ニ
製法 硝石ニ至テ愈火ヲ増シ少シモ炯氣ナキヲ度トス放
甘鍋ヲ火ニ上セ漸ク火ヲ加ヘ精製消石ノ末ヲ投メ熔ニ
是ニ木炭ヲ通紅ナル小片若クハ其細末ヲ以テ少許宛投

スレハ爆声ヲ発メ焚燒ス數ニ是ヲ投メ少シモ焚ス消石
凝固スルニ至テ愈火ヲ増シ少シモ炯氣ナキヲ度トス放
冷スレハ硝石ニ含メル塩尽ク燒化メ白綠色ノアルカリ
塩トナリ氣ニ觸レハ速ニ溶解ス是ヲ沸湯ニ熔シ火ニ上
セ煮熬メ乾固ノ白塩ト為ス之ヲ又粗末トナシ壺ニ入レ
烈火ニ上セ通紅ニ至ラシムレハ白色トナル是レ固性硝
石ナリ

○生石灰

製法

石灰ニ水適宜ヲ加ヘ煉リ壺ニ入レ燒テ二時許大氣ニ觸

硫酸

レサラシムルヲ要ス

試ニスワールシルニ投スルニ沸騰セサル者

ハ上好ノ品トス

Handwritten text in Japanese, likely describing the properties and uses of sulfuric acid. The text is written in vertical columns and is somewhat faded and difficult to read in detail.

