


四春

七

西垣文庫
文庫10
6514
2



伊左エツ



Faint red seal impression on the left page.

Faint red seal impression on the left page.

Handwritten blue characters on the right page, possibly reading '御座' (Gyōza).

6214
S

西垣文庫



新刊萬病回春卷之七

廉集

太醫院醫官金谿雲林龔廷賢子才

編輯

醫官同邑胡廷訓

慈谿羅國望

弟醫官廷器

姪 懋官同校

金陵書坊對峰周曰校刊行

小兒科

凡小兒病宜先觀形症神色

然後察脉

假如肝之為病則面青心之為病則

面赤脾之為病則面黃肺之為病則

面白腎之為病則面黑先要分別五

臟形症次看稟受盈虧胎氣虛實明

其標本而治之無不可者

三關脈紋主病歌

紫熱紅傷寒 青驚白是疳
黑時因中惡 黃即因脾端

又

青色大小曲 人驚併四足

赤色大小曲 水火飛食撲

紫色大小曲 傷米麵魚肉

黑色大小曲 脾風微作搐

手指脈紋八段錦

Y 魚刺形主驚風痰熱

| 懸針形主傷風泄瀉積熱

《 水字形主食積咳嗽驚疳

乙 乙字形主肝病驚風

虫 蟲形主疳蟲大腸積積

环 環形主疳積吐逆

珠 珠形主死

虎口三關脈紋圖



風關第一節寅位

氣關第二節卯位

命關第三節辰位

虎口又手處是也

小兒至三歲以上乃用一指按寸關尺三部當以六七至為率添則為熱減則為寒浮洪風盛數則多驚沉遲為虛沉實為積

小兒脈法總歌

小兒有病須憑脈 一指三關定息數
遲冷數執古今傳 浮風沉積當先識
左手迎主外証 右手氣口主內疾

外候風寒暑濕侵 內候乳食痰積致
洪緊無汗是傷寒 浮緩傷風有汗液
浮洪多是風執盛 沉細元因乳食積
沉緊腹中痛不休 弦緊喉間作氣急
緊促之時疹痘生 緊數之際驚風至
虛軟慢驚作瘵癎 緊實風癎發搐搦
軟而細者為疳蟲 牢而實者因便閉
脈乳大小便中血 虛瀉有氣兼驚悸
滑主露濕冷所傷 弦急客忤君須記
大小不勻為惡候 二至為脫三至卒
五至為虛四至損 六至平和曰無疾
七至八至病尤輕 九至十至病勢極
十一至死無疑 此訣萬中無一失

小兒死候歌

眼生赤脈貫瞳人 顴門腫起又作坑
指甲黑色鼻乾燥 鴉聲忽作肚青筋

虛舌出口咬牙齒 目多直視不轉睛
魚口氣急啼不得 蛇蟲既出死形真
手足攣搐驚過節 靈丹十救一無生
魚目定睛夜死 面青唇黑晝亡
啼而不哭是痛 哭而不啼是驚
咬前不安是煩 噬唾不定是燥

急驚

急驚風症牙關緊急壯熱涎潮
牽顫動唇口眉眼昏引口中熱氣頰赤
唇紅二便閉結脈浮洪數緊此內有
實寒熱外挾風邪當截風定搐若痰熱
尚作仍微下之痰熱既泄急宜調養
胃氣指定而痰熱必退即
宜調補脾氣此大法也

急驚屬肝風邪痰執有餘之症也
症也治宜解表敗毒散主之若急
驚肚腹腫脹震砂丸萬應丸之類

敗毒散

治急驚風初起發熱手足搐
切感胃風寒頭疼發熱咳嗽喘急鼻
塞聲重及瘡疹欲出發搐並宜服之

人參 羌活 獨活 柴胡

前胡 茯苓 桔梗 去芦

川芎 枳殼 天麻 去毒 炒

全蝎 姜蚕 白附子 煨

地骨皮 甘草 減半

右劉生姜三片水煎服

○靈砂丸 治小兒風痰驚積

南星 半夏 巴豆 去殼 酒浸 乾 三次各五錢

全蝎 朱砂 為衣 各三錢

姜蚕 輕粉 少許

右為末水和丸如黍米大每三次三

丸如驚風金銀湯下其餘姜湯下

○龍腦安神丸 專治大人小兒驚風癲

語並古強久不瘳者及傷寒大熱不

解久無汗者大人服一丸井花水調

雄黃四五分送下或細嚼或研下小

兒一歲已下者四之一二三歲三之

一四五歲已上者二之一神效

烏犀角 朱砂 飛過 人參 去芦

地骨皮 麥門冬 桑白皮 各二

甘草 麝香 馬牙硝 二分

右各為末分兩秤停合為一處煉蜜

為丸每兩作十丸金箔四太張為衣

陰乾磁器內放用黃蠟作蓋恐泄腦

麝之氣此方百發百中

○千金散 治小兒一切痰喘急慢驚風

全蝎 姜蚕 朱砂 四分

牛黃 冰片 黃連 各二

天麻 膽星 甘草 各二

右為末每用五七厘薄荷燈心金銀

煎湯不拘時調下

○保生錠 治小兒急慢驚風痰涎壅盛

胎驚內疳多啼夜間恍惚不

寧久患癩癩咳嗽發熱夏月中暑

發搐皆治常服鎮驚安神寧心

牛黃 三錢 天竺黃 辰砂 各一兩

雄黃 三錢 麝香 五分 片腦 五分

琥珀 一兩 珍珠 五錢 大赭石 三錢 煨七次

蛇含石 三錢 煨七次 金銀箔 各四帖

天麻 防風 甘草

茯苓 去皮 人參 各三錢 姜蚕

血竭 各五錢 遠志 去心 陳皮

牛膽 兩 南星 各一兩

右為細末用米粉糊為錠辰砂為衣用薄荷湯化下

○大聖奪命金丹 治小兒急慢驚風癲

惡及初生疳風撮口著紫胎驚胎疳疔關緊急驚風痰熱搐搦顛反引驚視昏悶不醒但是切驚風危惡緊急之症並皆治之其效如神其他驚藥俱不及此真起死回生之良劑也楊繩兩傳

天麻 炮 全蝎 去毒 姜蚕 炒

膽星 防風 去芦 羌活

白附子 炮 茯神 去皮 川芎

遠志 心 去 桔梗 去芦 石菖蒲

半夏 姜製 人參 去芦 白朮 去芦

茯苓 去皮 酸棗仁 炒 荊穗

細辛 各五錢 川烏 炮去皮 烏蛇尾 酒浸炙

大赤足蜈蚣 二條 薄荷 甘草 炙

沉香 犀角 羚羊角

辰砂 水飛 珍珠 琥珀 各三錢

天竺黃 一兩 牛黃 一錢 雄黃

麝香 各一錢 金箔 三十片 銀箔 四十片

右為末姜汁打糊為丸如芡實大朱砂為衣每服一丸用金銀同薄荷煎湯研化不拘時服

一 小兒潮熱發搐痰涎上壅手足指冷申酉時危臆青色隱白用補中益氣湯調補脾肺六味丸滋養肝腎而痊

二方見
補益

一 小兒三歲因驚搐發熱痰盛久服
抱龍丸等藥面色或赤或青此心肝
二 經血虛風熱生痰也用六味丸滋
腎生血用六君柴胡升麻調補脾胃
而安二方俱見補益



慢驚症因病後或吐瀉或藥餌傷損脾
胃肢體逆冷口鼻氣微手足瘳瘳昏
睡靈臍此脾虛生風無陽之症也

慢驚屬脾中氣虛損不足之病也慢驚者除症也治宜固裏

醒脾散治小兒吐瀉不止作慢驚

人參去毒 白朮去毒 白茯苓去皮

木香去毒 全蝎去毒 天麻

白附子煨 姜查炒各等分 甘草炙減半

右劉生姜三片棗一枚水煎溫服

一方去天麻姜蚕加南星泡半夏泡

陳倉米二百粒煎服累効

○黃芪湯治小兒慢驚風之神藥也

黃芪二錢蜜水炒 人參一錢

炙甘草五分 加白芍一錢炒

右劉一劑水煎食遠服

○治小兒吐瀉脾驚一二歲可服

朱砂五厘二歲已上一分

全蝎三歲以上四五分一個去足翅毒

右為細末乳汁調服

凡慢驚元氣虛損而至昏憤者急灸

若待下痰不愈而後灸之則元氣脫散而不救矣此乃臟腑傳變已極總

歸虛處惟脾受之無風可逐血驚可

○紫金錠子治急慢驚風涎潮發搐或吐或瀉不思飲食神昏氣弱

人參去毒 白朮去毒 白茯苓去皮

白茯神去皮

山藥炒

乳香

赤石脂醋煨

辰砂各三錢

麝香一錢

右為末以糕一兩為丸如彈子大金丹為衣每一粒薄荷湯研化服

一 小兒傷食發丹服發表之劑手足搐搦服抱龍丸目翳痰盛余謂脾胃虧損而變慢驚也無風可祛無痰可逐只宜溫補胃氣遂用六君加附子下劑而愈方見補益

一 小兒抽搦痰涎自流或用驚風之藥益甚視其面色黃白余用六君補中益氣二湯補脾肺而愈二方俱見補益

混元丹治小兒急慢驚風痰嗽喘熱吐瀉腹脹小兒百病大有功效方見通

驚後調理

○牛黃鎮驚丸

治驚起後調理安心神

天竺黃研

麥門冬去心

當歸身酒洗

生地黃酒洗

赤芍藥煨

薄荷

水通去皮

黃連姜汁炒

山梔仁炒

辰砂別研

牛黃別研

龍骨火煨各二錢

○青黛別研

右為細末煉蜜為丸如棗豆大每服二三十丸淡姜湯送下

一 小兒五歲因看會見雜鬼臉被驚嚇

兩眼黑睛昏向裏白睛昏向外視物微覺一線諸醫不能治未治於余余

曰此子曾出痘疹否對曰未俟出痘疹可治逾月痘疹盛行其子發熱似

看將出之兒其家果召余治以綿膠脂將水泡出汗慢火熬成膏塗兒兩

眼胞上下二日塗兩次直至痘疹收

醫後其眼復舊

疳疾

夫小兒疳病由乳母寒熱失理動止乖違飲食無節甘肥過度喜怒氣亂醉飽傷勞便乳兒者故成疳病又因久吐之後久瀉之後久痢之後以致久渴久汗久熱久瘡久嗽下血久瘡之後皆能亡失津液益成疳病錢氏云疳皆脾胃傷亡津液之所作也

凡養小兒宜戒敬酒肉油膩偏生病生冷硬物凉水漿不與自無疳疳病疳者肥甘厚味所致而壯大青筋也

○消疳湯 治小兒大便色疳白小便渾濁或澀之如米泔此疳病也

山查肉 白芍 黃連 姜汁

白茯苓 白朮 澤瀉 各一錢

青皮 四分 甘草 生三分

右剉一劑薑棗水煎服

○消疳丸 治五疳皮黃肌瘦髮直尿白物或吐或瀉腹內積塊諸蟲作痛

蒼朮 米泔 陳皮 厚朴 姜汁

枳殼 麩炒 檳榔 神麩 炒

山查 去子 麥芽 炒 三稜 煨

義木 煨 砂仁 茯苓 去皮

黃連 炒 胡黃連 蕪荑仁

史君子 去殼 蘆薈 去

右各等分爲末史君子殼煎湯泡蒸餅爲丸如彈子大每服一丸清米湯化下

○肥兒丸 消疳化積磨癥清熱伐肝補脾進食殺蟲潤腸養元氣

人參 三錢 白朮 去皮 茯苓 三錢 胡黃連 五錢

黃連 姜炒三錢 神曲 炒

史君子 去殼 四錢

麥芽 炒 山查肉 各三錢 甘草 各三錢

蘆薈 二錢 半碗 盛泥 封固 置炕 中 四 五 日 炭 燒 火 煨 透 用

右為末黃米糊為餅米湯化下或作丸黍米大每服二三十丸米湯下看兒大小加減

○快活丸 治小兒疳積疔瘻疔疔皮膚瘦削

睡臥不寧神氣昏沉常服健脾胃化積進食肥肌其效如神

蒸餅 麵一斤作餅十六個每餅重

五錢仍以前項開水入餅內包固炭火內煨透乾取出候冷用之

右為細末別以肥小囊用米泔水浸

經一宿飯上蒸熟去核皮爛杵如糊

同前餅末杵勻為丸如黍子大每服

三五丸不拘時清米湯送下或研

化米湯調服亦可

○蘆連消疳丸 治小兒五疳疔瘻疔疔發熱

肚脹壯脾胃消飲食于積塊

蘆薈 胡黃連 宜黃連 酒炒各五錢

白朮 米泔製炒 白茯苓 去皮 各五錢

當歸 全身用酒洗 白芍 酒炒 各一兩

人參 神曲 炒 各六錢 史君子 去殼 炒 各七錢

山查肉 各七錢 無黨 炒 各五錢

枳柳 各五錢 大甘草節 去粗皮生用四兩

右為細末湯泡蒸餅打糊為丸菜豆大每服五六十丸臨晚米湯送下或煉蜜為丸如龍眼大每晚嚼化一丸或米湯下或酒亦可

一 小兒疳疔疔瘻疔疔皮膚瘦削身瘦瘡疥骨痛喜臥冷地又治胃怯不言解顛併年長不能行者用六味丸各等分煉蜜丸久服神效 方見補益 一 小兒四散消瘦肚腹脹大行步不能頗能飲食作渴發熱去後具穢此脾

臟傷也用異功散補益肥兒丸調理而愈

小兒面色痿黃眼胞微腫作渴腹脹飲食少思腹中一塊或移動小便澄白太便不實此脾疳之患用四君子

方見補益加山梔無美兼肥兒丸而愈

一 小兒尿濁如米泔余以江南做酒小麴炒為末酒調下三服愈

疳疾

錢仲陽云疳塊者僻於兩脇痞結者否於中脘此因乳哺失調飲食停滯邪氣相搏而成或乳母六淫七情所致古人多用剋伐痞疳既久飲食減少脾氣必虛久而不愈必先以固胃氣為王使養正則積自除若欲直攻其結不惟不能消抑亦損其脾上凡

脾土虧損必變症百出矣當參各類及隨見症而主治之若疳塊日久元氣脾胃俱虛宜朝服補中益氣湯夕服千金消疳丸間與混元丹兼服治之獲効者多矣

癖者生於皮裏膜外也

○淨府湯治小兒一切癖塊發熱

柴胡皮去 白茯苓皮去 猪苓

澤瀉 三稜醋炒 莪朮醋炒

山查去核各一錢 黃芩 白朮去芦

半夏姜製 人參各八分 胡黃連

甘草各三分 右剉一劑薑棗煎服

○肥兒丸治疳如神方見疳疾

○千金消疳丸治小兒疳疾積塊有殊効

蘆薈 阿魏別為糊 青黛

木香 檳榔 厚朴姜炒

陳皮去白 麥芽炒四錢 史君子去殼

胡黃連 山查肉 香附水浸

三稜醋炒 葭朮煨醋炒 水紅花子微

神麴炒各四錢 人參去苦 茯苓去皮

白朮去苦 甘草炙一錢

右為末將阿魏一錢研水和麴打糊

為丸菜豆大每服四五十九米飲白

湯任下

○益兒餅 治小兒瘧疾

水紅花子 史君子去殼 山查肉各五錢

白朮去苦 檳榔半錢 木香一錢

神麴炒半錢

右為末入黃蠟麴水和作煎餅吃

○至寶丸

真阿魏錢 蘆薈 天竺黃

胡黃連 雄黃 沒藥

川山甲炒 沉香 白草烏泡

硃砂各二分

右為極細末用好酒和成一塊入銅

鍋內再入酒半茶鍾熬成膏勿令火

大恐傷藥力量可丸取出丸如豌豆

大每丸黃酒化下十歲已上服二丸

臨臥時服待其自然汗出三日服二

次重者五七服輕者二三丸熱即退

塊亦消須要忌口如服後熱不止可

後服金花丸如羸弱不進飲食者可

先服平胃散

○瘧疾方

全蝎去毒 班貓去頭 阿魏

紅娘子去頭尾足翅 雄黃

蠟蟲去足 血蝎 木香

硃砂 蘆薈

當歸尾酒浸 三稜醋煮 莪木醋煮
香附米炒 白豆蔻去皮 蘿蔔子各一錢炒
麝香一分

右為細末醋糊丸如梧桐子大每服三五十丸或酒或溫水下壯盛者可服

○癩疾方

蘆薈五分 阿魏五分 水紅花子一錢
急性子即小批紅子一錢 猴燒灰一錢
黑白牽錢炒

右為細末每服三分黃酒送下三帖全好

癩疾方

牛黃四分 雄膽四分 血竭一錢
蘆薈四分 盧甘石五分 天竺黃五錢
黃蠟五錢 淨皮硝兩 蜂窠四兩

右將蠟化開與蜂蜜一處滾熟任火傾入細磁碗內涼冷後將群藥為細末方入蜜蠟內攪勻每日常服先服用筋頭蘸吃後多服不怕十日全消忌酸冷油膩之物

○癩疾方

核桃仁一斤 檳榔二十個 礶砂一錢
大黃一兩

右三味為細末入桃仁水煮一炷香水滾時陸續入皮硝半斤香盡礶亦盡止食桃仁亦好

○清香散

治癩疾生牙疳潰爛臭穢

乳香 沒藥 孩兒茶
輕粉炒 象皮燒灰 象牙焙黃
紅褐燒灰 珍珠焙黃 海巴焙乾各等分
右為細末搽患處立時痛止生肌如

神

○桃花散

治瘡氣上攻牙齦腐爛

桃花信一塊桑柴火內燒紅浮以細茶濃酒內如此七次去宿將茶酒入雄黃一塊研末入酒內用鷄翎頻掃患處止痛生肌立時見效

○尅堅膏

專治小兒瘡塊發熱癰瘦者

木鱉子 穿山甲 川烏

其遂 其草 當歸

右各八錢先用真香油一斤入鍋內將前藥熬成灰瀝去渣再慢火熬滴永不散方下黃丹八兩熬滴水成珠方下細藥入內再不見火

木蘆薈 阿魏 硼砂

皮硝 水紅花子 各五錢

礬砂 麝香 一錢

右為細末入內攪勻不熬攤為膏藥貼時先用皮硝水瀉皮膚以膏貼瘡二三日後覺肚內疾作咳四五日發瘡棄後有膿血之物是其驗也

○抓癬膏 李滄溪傳

香油 桐油 生豬腦子 半斤

男子血餘 灰水洗淨不拘多少

桃仁 白蠟 各四錢

右俱下鍋內文武火熬的腦子盡用布絹瀝去渣次下飛過黃丹十四兩熬成膏待溫下

胡黃連 香白芷 蘇木

紅花 三稜 莪木 各三錢

當歸尾 礬砂 各五錢 麝香 一錢

各為細末照分兩重羅入前膏內攪勻收貯勿令泄氣如有積塊先用皮

硝煎水洗患處令淨次用生薑擦之
方用絹帛攤藥貼上貼後用熱鞋底
灸熱熨之五七十遍覺內熱方可如
貼後癰即消縮如神

○灸法

穴在小兒背脊中自尾骸骨將手揣
摸脊骨兩傍有血筋發動處兩穴每
一穴用銅錢三文壓在穴上用艾炷
安孔中各灸七壯此是癰之根貫血
之所灸之瘡即發即可見效灸不著
血筋則瘡不發而不效矣

○化癰如神散

治疔塊積聚

蟾酥

黃蠟

羚羊角

牛黃

麝香

巴豆肉

硃砂

冰片

右為末凡如菜子大每用一丸用扁

頭針或患處刺破皮入之用膏藥貼
上一伏時揭起其瘡化膿血出盡服
調理脾胃藥

一 小兒患疔癰服柘柳蓬木枳實黃連
之類瘡益甚余曰此脾經血虛瘡也
不可尅伐遂用六君子加當歸數劑
胃氣漸復諸症漸愈乃朝用五味異
功散加升麻柴胡夕用異功散加當
歸芍藥而愈

諸熱

小兒諸熱辨例

傷寒熱手足絳冷發熱惡寒而無汗
面色青慘而不舒左額有青紋
傷風熱手足稍微溫自汗面赤而光
傷食熱目胞腫右額有青紋身熱而
頭額腹肚尤甚夜熱晝涼面黃或吐

利腹疼

驚風熱面色青紅額正中有青紋手心有汗時作驚惕手脈絡微動而發熱

風熱身熱倍能食唇紅頰赤大小便秘潮熱如水之潮依時而至

變赤熱身熱上下而蒸熱上氣虛驚耳冷微汗唇上下有白泡狀如珠子重者身熱脈亂腹痛啼叫不能乳食或吐現週歲以後無此症也

潮熱發渴有時驚熱顛叫恍惚夜熱夕發且止餘熱寒邪未盡食熱肚背先

熱再熱骨蒸盜汗背熱一向不止煩熱心躁不安積熱頰赤口瘡風熱汗

出身熱虛熱困倦少力客熱來去不定癰熱涎嗽飲水寒熱發如瘡狀血

熱辰巳時發疹熱耳鼻尖冷諸熱得之各有所歸其間有三兩症交互者宜隨其輕重而治之

諸熱為病者宜清解也

○大連翹飲 治小兒傷風感冒發熱痰核腫赤癰癤眼目赤腫口舌生瘡咽

喉疼痛小便淋瀝胎毒痘疹餘毒一切熱毒並治

連翹 藹麥 滑石

車前子 牛旁子 赤芍 各八分

梔子 木通 當歸

防風 各四分 柴胡 黃芩

荊芥 各一錢二分 蟬退 五分 甘草 一錢六分

右剉竹葉十個燈草十莖水煎不拘

時溫服○風痰熱變蒸加麥門○實

熱丹熱加大黃○胎熱痘疹餘毒加

薄荷葉○癰癤熱毒加大黃芒硝

○五福化毒丹

治小兒蘊積熱毒唇口腫破生瘡牙齦出血口臭煩赤咽乾煩燥并痘疹餘毒未解或頭自身熱多生瘡癩

犀角 桔梗 生地黃 酒洗

赤茯苓 牛旁子 微炒各

朴硝 連翹 玄參 黑者

粉草 各六錢 研極細

右為末煉蜜丸如龍眼大每服一丸薄荷湯化下兼有驚加朱砂為衣

感冒

感冒者宜發散也

○惺惺散 治外感風寒鼻塞痰嗽發熱

人參 白朮 白茯苓 桔梗

瓜蒌根 細辛 甘草 薄荷

右剉水煎服

○羌活膏 治小兒風寒外感驚風內積發熱喘促咳嗽痰涎潮熱搐搦并痺疹初作

羌活 獨活

人參 羌活 獨活

前胡 川芎 桔梗

天麻 各五錢 薄荷 地骨皮 各三錢

甘草 二錢

右為細末煉蜜為丸如芡實大每服

一丸薑湯研化下

一 小兒八歲患傷寒頭痛身疼發熱口乾面赤無汗諸醫以傷寒治之百藥罔效已經旬日袖手待斃余以龍腦

安神丸一服其汗如雨即瘥

一 小兒外感風邪服表散之劑汗出作喘此邪氣去而脾肺虛也用異功散

而汗喘止再劑而乳食進方見補益

一 小兒沉默昏倦肢冷驚悸其紋如弓之向裏此屬胃氣虛而外感寒邪也

先用惺惺散以解外邪調胃氣諸症

先用惺惺散以解外邪調胃氣諸症

先用惺惺散以解外邪調胃氣諸症

先用惺惺散以解外邪調胃氣諸症

先用惺惺散以解外邪調胃氣諸症

頓愈但手足逆冷又用六君子湯調補元氣而安異功散六君子湯俱見補益

傷食

傷食者宜消導也

○萬億丸 治小兒乳食生冷所傷發熱肚脹諸症方見通市

○消食丸 又名消乳丸治宿食不消

砂仁 陳皮 三稜

神麴 炒 麥芽 炒 香附 炒

加白朮 炒

右為末麴糊為丸如麻子大食後白湯送下大小加減

○消食餅 治小兒時常傷食皮黃肌瘦肚大腹脹用此餅令常食之

蓮肉 去皮 山藥 炒 白茯苓 炒

神麴 炒 麥芽 炒 扁豆 炒

右各等分為末每四兩入麴一斤水同和烙焦餅用

一 小兒傷食嘔吐發熱面赤服消導清熱之劑飲食已消熱亦未退余以為胃經虛熱用六君子升麻柴胡四劑而痊

一 小兒十四歲傷食發熱服消食丸胸腹膨脹發熱作渴此脾氣復傷也先用四君子升麻柴胡飲食漸進用補中益氣湯而愈後因勞心發熱少食用四君子升麻柴胡而愈

一 小兒傷食發熱抽搐嘔吐喘嗽屬脾肺虛氣虛有熱用六君子炒黑黃連梔子而愈 右方俱見補益

腹脹

腹脹者脾胃氣虛也

○消脹散 治小兒腹脹

蘿蔔子 炒 蘇梗 乾葛

陳皮 枳殼各等分 甘草少許

右劉水煎服食少者加白朮

一 小兒傷食腹脹胸滿有痰余用異功散而痊後復傷食腹脹作痛或用藥下之痛雖止而脹益甚更加喘粗此脾氣傷而及於肺也用六君加桔梗調補而痊

一 小兒停食服通利之劑作嘔腹脹此脾胃復傷也用補中益氣湯而愈右方俱見補益

嘔吐

嘔吐者乳食傷胃也

○定吐飲治吐逆投諸藥

半夏湯泡透切片焙乾 生薑洗淨和皮一兩

薄桂去粗皮

右薑切作小方塊如棗豆大同前半

夏和勻入小鍋內慢火順手炒令香熟帶乾方下桂再炒勻微有香氣以紙攤開地上去火毒候冷略搗去黑焦末每服二錢水一盞姜三片煎七分空心少與緩服

○定吐紫金核治嘔吐

丁香 木香 藿香

半夏姜湯泡七次 人參去芦 白朮去芦各二錢

右為末薑汁打糊為丸如棗核大用沉香朱砂各一錢為衣陰乾每用二丸用棗一枚去核用藥丸在內姜片夾濕帛裹灰火內煨熟去姜帛嚼吃用米飲壓之

一 小兒傷食發熱面赤抽搐嘔吐氣喘喘咳此飲食傷脾肺氣虛弱所致用六君子湯炒黑黃連山梔各二分

劑頓愈 方見神益

泄瀉

泄瀉者乳食傷脾也

○參苓白朮散

治脾胃虛弱飲食不進
多困少力中滿痞噎心
中氣喘嘔吐泄瀉此藥中和不熱久
服養氣直神醒脾悅色順止癆邪

人參 白朮 茯苓 甘草

山藥 炒 甘草 炙各

白扁豆 一錢半 姜 蓮肉 去心

薏苡仁 炒 砂仁 桔梗 去心

右為細末每服一錢棗湯調下量兒

歲數加減

○啓脾丸

消食止瀉止吐消疳消積
消脹定腹痛益脾胃

人參 白朮 白茯苓 去皮

陳皮 蓮肉 各二兩 山查肉

右為末煉蜜為丸梧桐子大每服二

三十九丸空心米湯下或米湯研化服

亦呵小兒常患傷食服之立愈

○一方益元散加白朮末一兩每服一

二錢米湯調下此小兒泄瀉殊效

○一方治瀉泄用柿餅燒熟食之即止

○治小兒水泄不止

五倍子為細末陳醋調稀熬成膏貼

臍上即止

○水瀉痢疾方

生薑 真香油 黃丹 二兩

熬成膏藥貼臍立效

一小兒飲食後即瀉先用六君升麻神

麴山查而止又用五味異功散加升

麻而痊後吐瀉腹痛用保和丸二服

又用異功散調補脾氣而安

一小兒傷食作瀉腹脹四肢浮腫小便

不利先用五苓散五苓散加木香五苓散旬餘諸症漸退又用五味異功散為主佐以加減腎氣丸又旬月二便調和飲食漸進浮腫旋消乃以異功散調理而安

一 小兒因驚久瀉面色青黃余謂肝木勝脾土也朝用補中益氣湯夕用五味異功散加木香子母俱服而愈

一 小兒久瀉兼脫肛小腹重墜四肢浮腫面色痿黃時或兼青諸藥到口即嘔吐審乳母憂鬱傷脾大便不實先用補中益氣湯五味異功散及四神丸調治其母不兩月子母並愈右方俱見

吐瀉吐瀉益補

上吐下瀉者脾胃俱傷也

○白朮散

治吐瀉或病後津液不足口乾作渴和胃生津止瀉利將驚風者

人參去白朮去茯苓去藿香去

木香去乾葛去甘草去

右剉劑水煎服○若小兒頻瀉瀉痢

將成櫻驚加山藥扁豆肉豆蔻煨各

薑一片水煎服○若慢驚已作加細

辛天麻各全蝎各白附子各

若冬月小兒吐瀉多是胃寒胃虛所

致加丁香三○如胃虛不能食而大

渴不止者不可用淡滲之藥乃胃中

元氣少故也以此湯補之加天花粉

○若能食而渴者白虎湯加入參

如中氣虛熱口舌生瘡不喜飲冷服

之即効

○燒針丸治小兒吐瀉

黃丹 朱砂 白礬 枯澁

右為末棗肉為丸如黃豆大每服三四丸
四九截針尖上燈焰上燒過涼米泔研爛調服瀉者食前吐者無拘時外用菜豆粉以鷄子清作膏如吐塗兩脚心如瀉塗額門上止則去之

○又方 治吐瀉

四君子湯加藿香陳皮一劑而愈

○助胃膏 治元氣脾胃虛弱吐瀉不思飲食及久瀉虛寒

人參 白朮 去土 茯苓 去皮

甘草 各各二錢半 白豆蔻 去殼 木香

山藥 炒五錢 肉豆蔻 麩包煨槌去油二個

砂仁 炒一錢 丁香 官桂

藿香 各三錢 陳皮 五錢 薑黃

右為細末煉蜜為丸彈子大每服一

丸米湯化下

○秘方 治小兒水瀉

白礬黃丹各五錢用葱白同搗爛塗臍上即止

○治小兒吐瀉

小丁香 陳皮 各等分 水煎溫服

一 小兒數歲間每停食輒服峻利之藥

東後肚腹膨脹嘔吐泄瀉先用六君子

湯諸症漸愈又用補中益氣湯而安

一 小兒腹脹飲食後即瀉手足逆冷此

脾氣虛寒也先用人參理中丸後用

六君子湯而愈

一 小兒吐瀉乳食色白不化露睛氣喘

此脾肺不足形病俱虛也先用異功

散加桔梗柴胡頓愈再用補中益氣

湯而安

一 小兒因驚吐瀉腹脹先用六君子香

湯而安

柴胡治之，稱嘔又以五味異功散而愈。後因驚搐痰甚，或用鎮驚化痰之藥，倦怠不食而泄益甚。先用異功散加木香、釣藤、鈎藤四劑而愈。方俱見補益

一小兒面黃肌瘦泄瀉無度，腹脹如鼓，不思飲食，百藥不效。予教用好生白朮酒磨濃汁，以溫酒調空心服，二三日即愈。

痢疾

東垣云：白者濕熱傷氣，赤者濕熱傷血，分赤白相雜，氣血俱傷也。痢者腹中食積也。

- 萬億丸 治小兒下痢赤白腹痛初起者一服即愈
- 一方治小兒痢，用鷄子一個，冷水下鍋煮一二沸，取出去白，用黃研碎，以生薑汁小鍾半鍾和勻，與兒食之，忌

茶

- 薑茶煎 治痢疾腹痛不問赤白冷熱皆可用之
- 老生薑 切片三錢 細茶 三錢 用新汲水煎服
- 一方用生薑細茶連根並米三味同搗汁酒調服立止
- 仙梅丸 治痢疾發熱發瀉者
- 細茶 水洗剥去核晒乾 烏梅 水洗剥去 為末用生蜜搗作丸，彈子大，每下丸水冷執隨意化下
- 鐵門拴 治赤白痢疾五種泄瀉
- 文蛤 炒黃色一兩 白礬 生米煨三錢 黃丹 二錢 右為細末，黃蠟一兩溶化為丸，如菉豆大，每服大人十五丸，小兒五七丸，茶一錢，姜二錢煎湯下
- 瀉痢方 五倍子炒黃色為末，烏梅肉水浸為

凡如彈子大每服一丸白痢冷米湯下赤痢姜湯下水瀉冷水下

○水瀉痢疾方

飛白礬一錢 丁香五分

共為細末水瀉白水下痢疾黃酒下

○石蓮散 治小兒噤口痢 嘔逆不食神効

石蓮肉 二兩

右為末每服一二錢陳倉米飲調下

如嘔加生薑汁二匙同服一方山藥末半生半炒米飲調下

○香連丸

黃連 十兩用吳茱萸五兩水拌濕入磁器頭滾湯中半日炒焦黑

木香 二兩 右為末醋糊丸如赤

豆大每服二三丸白湯下

○固腸丸 治紅白痢日久不止

黃蠟一兩 黃丹一兩 共化一處為

丸如黃豆大每服三丸 組痢甘草白痢乾姜紅白

痢甘草乾姜湯下空心服

○治水瀉痢疾用鳳眼草蜜水炒為細末每一錢水前空心服立止

一 小兒患痢脫肛色赤或痛用補中益氣湯送香連丸而愈後傷食作瀉復脫肛不入仍用前湯更以葶麻仁研

塗頂門而愈

一 小兒患痢口乾發熱用白朮散煎與

恣飲時與白朮散送下香連丸而安

一 小兒久痢裏急後重欲去不去手足

金冷此胃氣虛寒下陷也用補中益

氣湯加木香補骨脂倍升麻柴胡而

愈

愈

愈

瀉疾

瘰者膈上痰結也

○萬億丸 方見通治

○芫花散 治小兒瘰癧

芫花根為末每用一二分三歲兒用三分以鷄子一個去頂入末攪勻希糊頂口外用濕帛裹灰火煨熟嚼吃

○天靈散

天靈蓋燒存性為細末每服五厘黃酒調下立止

○消癖丸 治瘰癧母停水結

芫花 炒 朱砂 各等分 右為細末

煉蜜為丸小豆大每十丸東湯送下

○祝由科 治瘰癧疾不愈

呪曰

吾從東南來路逢一池水水裏一條龍九頭十八尾問伊食甚的只喫瘰癧疾鬼右念一遍吹在果子上念七遍在上

令病人於五更雞犬不聞時面東而

立食訖於靜室中安困忌食瓜菜葷

肉熱物此法十治八九無藥處可以

救入果者謂桃杏棗栗之類

一小兒先因停食腹痛服酸厲之劑後

患瘰癧日脯而作余以為元氣下陷欲

治以補中益氣湯不信泛行清熱消

導前症益甚食少作瀉余朝用前湯

夕用異功散加當歸日餘而愈方見補益

一小兒每午前寒後熱久不愈用六

君子加炮姜丸芡實大每服一丸旬

餘而愈方見補益

咳嗽者肺傷風也

○參蘇飲 治小兒四時感冒發熱頭痛

重涕唾稠粘及內傷外感一切發熱帶嗽

紫蘇 陳皮 前胡

桔梗 姜汁 白茯苓 去皮

乾葛 蘇別各

甘草 二味 人參 半 木香 少許

右劉生薑三片水煎食後服○若肺實有邪去人參加黃芩桑白皮杏仁

○參花散 治咳嗽發熱氣喘吐紅

人參 天花粉 各等

為末每服五分蜜水調下

○蜜梨膏 治咳嗽痰喘

甜梨一個刀切勿斷入蜜於內麪裹灰火煨熟去麪吃梨

○一方治小兒喉中痰壅喘急

用巴豆一枚去殼搗爛作一丸以綿花包裹男女右塞鼻中痰即墜下

○一方治傷寒潮熱痰咳 男婦小兒皆可用

鬱金 三錢 石膏 煨一兩

右共為末每服一二匙清茶送下

一 小兒傷風咳嗽發熱服解表之劑加

喘促出汗余謂脾肺氣虛欲用補中

益氣湯加五味子補之不信乃自服

二 陳桑皮枳殼而發搐痰湧仍用前

藥加鈞藤鈎而痊

喘急

喘急者痰氣盛也

○一 捻金 治小兒風痰吐沫氣喘咳

小兒肺脹咳嗽 多人看作風喉

大黃檳榔 牽牛 人參分兩等分

五味研成細末 蜜水調量稀稠

每將一字下咽喉 不用神針法灸

右其症肺脹喘滿胸高氣急兩脇搖

動墮下作坑兩鼻發張悶亂嗽渴聲
嘔不鳴痰涎潮寒俗云馬脾風若不
急治死于旦夕也

○治小兒喉中痰壅喘甚

用巴豆一粒搗爛作一丸以綿花包
裹男左女右塞鼻痰即墜下効

小兒患喘服發汗之劑汗出而喘益
甚用異功散類愈又用六君子湯而

全愈方見補益

一 小兒有哮喘其母遇勞即發兒飲其
乳亦嗽用六君子桔梗桑皮杏仁治之
母子益愈方見補益

小兒初生雜病

一 小兒初生宜先濃煎黃連甘草湯急
用軟絹或絲綿包指蘸藥樞出口中
惡血倘或不及即以藥湯灌之待吐

出惡沫方與乳吃令出痘亦稀少

一 初生三五月宜細縛令臥勿堅頭抱
出免致驚癇

一 乳與食宜相遠不宜一時混吃令兒
生疳癖痞積

一 宜用七八十歲老人舊裙舊襖改作
小兒衣衾真氣相滋令兒有壽富貴

之家切勿宜新製絳綾羅縐絨之
類與小兒穿不惟生病抑且折福

一 小兒生四五個月止與乳吃六個月
以後方與稀粥哺之周歲以前切勿

可吃暈腥并生冷之物令兒多疾若
待二三歲後臟腑稍壯纔與葷腥方
好

延生第一方小兒初生臍帶脫落取置
新瓦上用炭火四圍燒至烟將盡放

土地上用瓦蓋之類蓋之存性研為細末預將朱砂透明者為極細末水飛過臍帶若有五分重朱砂用二分五厘生地黃當歸身煎濃汁一二蠅殼調和前兩味抹兒上臍間及乳母乳頭上一日之內晚至盡次日大便送下穢污濁垢之物終身永無瘡疹及諸疾生子子則得子十分妙法也

滌穢免痘湯

用練樹子一升至正月初十日子時父母只令一人知將練子煎湯待溫洗兒全身頭面上下以去胎毒洗後不出痘疹如出亦輕或只三五顆而已

○一方用五六月間收綠瓜小小蔓藤

陰乾約二兩半重收起煎湯洗

○一方用葫蘆上藤蔓如前法亦可

○稀痘萬金丹 治嬰兒未出痘時除毒如在春秋二分每服一丸使毒漸消用時稀少如遇出痘時氣身一發熱即磨服之九毒從大便而出若有黑陷倒靨化下下九即起死回生如痘出至七日若服恐泄元氣修合者不可加減以取不効

麻黃根 舟麻 各一 羌活

樺皮 茜草根 括蕒根

鼠粘子 天麻 連翹 各一

當歸 芍藥 川芎 各七

右剉作片用冰五升煎至半升去渣入銀器內以湯環成膏入煉蜜少許調均入後藥

朱砂 五錢 水片 雄黃 各五

蝦蟆灰 麝香 全蝎 各十四

右為末入煎藥和勻分作十九丸以蠟

封之如彈子大臨服時猪心血或兌血調勻熱酒調下溫服

凡初生小兒日騰并牙根生白點名馬牙不能食乳此與鵝口不同少緩即不能救多致夭傷急用針縛筋頭上將白點挑破出血用好京墨磨薄荷湯以手指擦母油頭髮蘸墨遍口騰擦之勿令乳食待睡一時醒方與乳食再擦之

小兒不時變蒸者異常也蒸者發熱也所以變換五臟蒸養六腑須要變蒸多變氣血方榮骨脉始長情性有異則後來出痘輕可比變蒸不宜服藥或因傷食因傷風因驚嚇等項來雜相值而發令人疑惑亦須守候一二日俟病勢直的是食則消食是風

則行痰是驚則安神若變蒸而妄投藥餌則為藥引入各經症遂難識而且纏綿不脫反為藥所誤也

一 小兒月內發搐鼻塞乃風邪所傷以六君子湯加桔梗細辛子母俱服更以葱頭七莖生薑一片細搗攤帛上合置掌中令熱急貼額門少頃鼻利搐止

一 小兒未滿月發搐嘔乳腹脹作瀉此乳傷脾胃用五味異功散加漏蘆令每服之子亦服匙許遂愈

小兒雜病

胎熱胎寒者稟受有病也

○胎熱 小兒生下身熱面赤眼

甘草 一錢 黑豆 二錢 淡竹葉 五個

右剉一劑燈草七根水煎頻頻少進

令乳母多服

○胎寒 母孕時受寒，兒生下，面色青白，身起寒慄，四肢厥冷，大便青黑，口為腹痛。

當歸 炒 黃芪 炒 桂心 黃芩 炒

細辛 龍骨 研 白芍 煨 各等分

右為細末，每服一字，以乳汁調下。

臍風撮口者，胎元有毒也。

○臍風 多因斷臍之時，被風濕所乘，或視按其臍，多硬，宜定有臍風。必自臍發出，一道青筋，行肚，却生兩岔，行至心者，必死。於青筋初發，急用燈心蘸油，然於燈上，自青筋頭，并岔行盡處，燻之，以截住，不致攻心，更以艾灸臍，臍二壯，內服萬應丸一二粒，以泄其胎毒也。

○五通膏 治小兒臍風撮口

生地黄 生薑 芫白

蘿蔔子 田螺肉 各五

右件共搗爛，搭臍四圍，一指厚，抱住。

一時許，有屎下泄而愈。

○治小兒斷臍，不如法，七日內有風出，用直姜蚕二三條，炒去絲，為末，蜜調敷口，或乳頭上，帶下亦可。

○香螺膏 治臍風腫硬如盤

田螺三個，入麝少許，搗爛，搭臍上，須臾，再易，腫痛立消。

○宣風散 治初生兒臍風撮口

全蝎 二十八個，頭尾全者，麝香 一字，去毒，用酒炙為末。

右同和勻，細末，每用半字，金銀煎湯調服。

○撮口 由胎氣挾熱，風邪入臍，毒流心脾，之經，故令舌強，唇青，聚口，啼聲不出，當視其齒齦之上，有小泡子，如粟米狀，急以溫水蘸青綿布，裹指輕輕擦破，能開口，便安，甚者，用牛黃一分，將竹瀝調滴入口，即愈。

胎驚夜啼者，邪執乘心也。

○胎驚宜

胎驚宜

○鎮驚散 治小兒在胎中受驚

故生下未滿月而驚
朱砂 研細 牛黃 少許

取猪乳汁調稀抹入口中入麝香 少許

○夜啼宜

○花火膏 治邪熱相乘焦燥夜啼

燈花三顆以乳汁調抹兒口或抹母乳上令兒吮之

一方用燈心燒灰傳乳上令兒吮之

一方加朱砂一字共研末用白蜜調待兒睡抹兒口內

○蟬花散 治小兒夜啼不止狀若鬼祟

蟬退七個下半截為細末用薄荷湯調入好酒少許食後服或者不信將

上半截為末依前法服復啼如初古人立法莫知其妙小兒觸犯禁忌而

夜啼者宜醋炭薰服蘇合香丸

○一方用火柴頭一個長四五寸削平

面用朱砂寫云撥火杖撥火杖將來

捉神將捉著夜啼鬼打殺不要放急

急如律令

○小兒夜啼不止將朱砂書甲寅二字

貼床頭即止

○中惡宜 治小兒中惡毒心腹刺痛悶亂欲死等症

中惡天吊者冒犯邪氣也

○辟邪膏 治小兒中惡毒心腹刺痛悶亂欲死等症

降真香 白膠香 沉香

虎頭骨 鬼白 龍膽草

人參 白茯苓 各五錢

右為細末入雄黃半兩麝香一錢煉

蜜為丸乳香湯下

○天吊宜

○鈎藤散 治小兒天吊潮熱

鈎藤

人參

犀角

鎊屑各五錢

全蝎

天麻

甘草

各二錢半

右對一劑水煎服

鵝口口瘡者胃中濕熱也

○牛黃散 治小兒口中百病鵝口口瘡重腫不能吮乳及咽喉腫塞

熱毒

牛黃

冰片

硼砂

辰砂

雄黃

青黛

各二分

牙硝

黃連

黃柏

末各八分

右共入乳鉢內研勻每用少許敷入口內

○瀉心湯 治小兒口瘡

淨黃連為極細末蜜水調服

○一方治小兒白口瘡用黃丹巴豆仁同炒焦去豆用丹搽口瘡上立愈

重舌本舌者脾經實火也

○重舌 乃舌下生

○當歸連翹湯 治小兒心脾有熱舌下重舌及唇口兩傍生瘡

歸尾

連翹

白芷

各三錢

大黃

甘草

各一錢

右對劑水煎食後頓服

○千金方 治重舌

竹瀝青

黃柏末

二味和勻無時點舌上即退

○又方用蒲黃塗之即瘥

○又方用膽礬研細敷之

○又方用百草霜芒硝滑石共為末酒調敷之

○木舌 乃腫硬不柔軟也宜

○雪硝散 治木舌

朴硝

直紫雪

鹽

五分 二分 半分

右為末入竹瀝二三點用白湯調敷
噤津無妨

○瀉黃散 治小兒木舌弄舌

藿香葉 七分 山梔 一錢 軟石膏 五分

防風 四分 甘草 七分

右剉一劑水煎不拘時服

走馬牙疳者氣虛濕熱也

○立効散 治走馬牙疳

青黛 黃柏 枯礬 五倍子 各一錢

右研細末用米泔水先繳口內搽點

患處

○清胃升麻湯 治小兒齒腫流涎腮腫
馬牙疳王陽明之熱

升麻 川芎 白芍

半夏 湯泡各七分 乾葛 防風

黃連 酒炒二分 生甘草 各一分 軟石膏 煨一錢

白朮 七分 白芷 三分

右剉一劑水煎食後熱服能漱即含
漱而吐之漱藥不用白朮半夏

愛吃泥土者脾臟生疳也

○清胃養脾湯 治小兒愛吃泥土脾
虛胃熱所致此藥王

黃芩 軟石膏 陳皮 白朮 去

茯苓 去 甘草 右剉等分水煎服

○砂糖丸

膩粉一錢和砂糖為丸如麻子大米

飲送下瀉出其土立愈

○黃金餅 治小兒疳吃泥土

乾黃土為末濃煎黃連汁和為餅服

之

丹毒者火行于外也

赤腫者遊走遍身也

○犀角消毒飲 治風毒赤紫丹癰熱
狂燥睡臥不安胸膈滿

悶咽喉腫痛九道有血妄行遍身丹
毒及痘疹已出未出不能快透或已

此熱不解
急宜服此

牛旁子

四錢

荊芥穗

防風

黃芩

各一錢

犀角

甘草

右剉一劑水煎不拘時服如無犀角以升麻代之

○水黃散

治赤遊丹毒

土硝

大黃末

各五錢

右合二處煎汲水調白用鷄翎蘸藥頻頻塗掃

又方用伏龍肝不拘多少用鷄子清調敷患處專治赤腫赤毒火毒走注

○泥金膏

治一切無名腫硬癩疥赤但見諸般丹瘤熱燥濕爛大人亦

同此治陰地上蚯蚓糞熟皮硝蚯蚓糞二分之二共一處研細新汲井水濃調厚敷患處乾則再上

喉痺者熱毒也

會厭兩傍腫者為雙乳為單乳雙難治。乳鷺者小者為喉痺熱結於咽喉且腫且痛腫遠於外名纏喉風。喉痺果發暴死者名走馬喉風。

○甘桔湯

治小兒咽喉腫痛風熱等毒

桔梗

三錢

防風

荊芥

薄荷

黃芩

甘草

右剉一劑水煎食後頻頻溫服

○碧雪

治心肺積熱上攻咽喉腫痛閉塞水漿不下或生瘡癰重舌才舌金

碧雪真青黛 硼砂與煇硝 蒲黃

甘草末俱生等分搽咽喉

眼痛者火盛也

○拔毒膏

治嬰兒患眼腫痛

用熟地黃一兩以新汲水浸透為爛

貼脚心布裹住有效

○通天散

治赤眼暴發腫苦痛

芒硝 五錢 雄黃 三錢 共為細末
吹入兩鼻內流水雙自流淚即效
膿耳者腎氣熱衝也

○羽澤散 治耳中出膿或疼痛或出臭水

枯礬少許為細末吹入耳中即愈
一方用五倍子燒存性為末吹入耳亦
效

一方用抱出鷄卵皮炒黃色為細末香
油調灌耳內即時止

○黃龍散 治停耳小兒因沐浴水入耳
中未濕作留搏於血氣醒瞶
成膿

枯礬 煨 龍骨 煨 黃丹 水飛
胭脂 燒 麝香 少許 海螵蛸 煨

右為細末先將帛條拭乾濃水後以
藥摻入日日用之勿令入風

○治停耳膿耳不問新久痛不止用黃

蠟如皂角子大搓成條外用好綿艾
槌熟裹蠟條火燒着烟薰患處痛止
任薰

鼻瘡者風濕氣攻也

○鼻瘡 熱毒傷肺王氣通於鼻風濕
之氣乘虛客於皮毛入於血脉
故鼻下兩傍瘡濕痒爛是各鼻患其
瘡不痛汁所流處即又或瘡澤瀉散

○澤瀉散 治鼻瘡

澤瀉 鬱金 山梔仁 甘草 各
右為細末用甘草煎湯調食後服

頭瘡者熱毒也

○一掃光 治小兒頭上肥瘡或多生虱
子搔痒成瘡膿水出不止
細茶 三錢 水銀 入茶內 牙皂

花椒 各二錢 右為細末香油調搽
○臘油膏 治小兒頭瘡

臘猪油 半生 雄黃 半熟 水銀 各等

右研三味和勻先將水洗淨濃汁後
敷藥

臍瘡者風濕也

○枯礬散 治小兒因臍瘡外傷於
風形以致臍瘡不乾

枯礬 煨各五分 龍骨 煨各五分 共為細末每

用少許乾摻臍上

小兒臍中汁出并痛用枯礬末乾敷

或黃栢末傅之又奎爾空燒灰存性

摻之亦可

諸蟲痛者胃氣傷也

○追蟲散 治小兒蟲積痛凡腹疼
口中出清水者蟲積也

史君子 用肉二錢 檳榔 一錢

右劉為一劑水煎食遠服

○一方用史君子 檳榔 各一錢 雄黃 五分

俱為細末每服一錢苦練根煎湯調

下

○靈礬散 治小兒蟲咬心胃飲絕

五靈芝 一錢 枯礬 五分

共為末每服二錢水煎不拘時服當

吐出蟲即愈

○練陳湯 治小兒蛇蝎

歌曰

蛇蟲出口有三般 口鼻中來大不堪

如或白蟲兼黑色 靈丹縱服病難安

苦練根皮 二錢 陳皮 一錢 半夏

茯苓 各一錢 甘草 五分

右劉一劑生薑煎服

○錢氏白木散 治小兒冬月吐蛇
是胃寒胃虛所致

人參 去 白木 去 茯苓 去 藿香

木香 甘草 乾葛 丁香 二粒

右劉每服一二錢水煎溫服

尾骨痛者陰虛痰也 小兒尾骨痛乃是
陰虛痰火所致若

陰虛而痛者宜補陰降火湯王芝
燦火作痛者宜化痰降火湯王芝
○補陰降火湯 治陰虛尾骨節痛

當歸 酒洗 川芎 白芍 酒炒

熟地黃 酒蒸 黃柏 酒炒 知母 酒炒 各

右剉少用官桂為引或以前胡木香

為引如痛不止加乳香沒藥

○化痰降火湯 治痰火尾骨節痛

陳皮 去白 半夏 姜汁 茯苓 去澤瀉

黃柏 酒炒 知母 酒炒 甘草 各等

右剉必用前胡木香為引蓋陰虛故

痰盛也若痛不止加乳香沒藥

陰腫疝氣者寒所鬱也

○秘方 治小兒偏 五倍子燒存性為末

以好酒調服出汗立愈

○又方 治小兒外 牡蠣不拘多少為末

用鷄子清調塗之即消

○又方 治陰囊忽腫或坐地多

蟬退半而水一大碗煎湯洗腫處其

痛立止若不消再煎洗後服五苓

散燈草煎服

○又方用葱園內蚯蚓糞以甘草汁調

塗腫處或薄荷汁調亦可

○仙傳方治風執外腎赤腫痛日夜

啼叫不數日退皮如鷄卵殼愈而復

作用老杉木燒灰入膩粉清油調傳

患處即効

盤腸氣痛者風冷所搏也 小兒盤腸氣

啼額上有汗是也小兒為冷氣所搏而

然其口閉脚冷或大便青色不實上

唇乾者是也此多因生下洗遲感受

風冷而致也急用葱湯淋洗其腹探

葱煎臍腹間良久尿自湧

○乳香散 治盤腸氣痛

乳香 沒藥 各等分

共為細末以木香煎湯調服
脫肛者大腸虛冷也

小兒脫肛皆因久患瀉痢所致大腸
頭自糞門出而不收宜用葱湯薰洗
令軟送上或以五倍子為末敷而頻
托人又以楮子煎湯洗亦可又以醬
頭燒存性香油調敷一云以此物燒
烟薰之久自收又以東壁土泡湯先
薰後洗亦効

○提肛散 小兒大腸氣虛肛門脫出

龍骨一錢 訶子煨去核 沒石子

赤石脂嬰粟殼去蒂穰醋

右為末用米飲調食前服仍將葱湯

薰洗令軟欵欵托上

○一方用草麻子搗爛貼頂上腸收即

去之

○脫肛洗藥

苦參 五倍子 陳壁土

右等分水煎湯洗次用木賊末搽上

遺尿者膀胱冷弱也

○鷄脬散 治小兒遺尿

鷄脬一具 鷄腸一具 煨猪胞炙

右為末每服一錢黃酒調服男用雌

女用雄

○破故帛散

破故帛一兩炒為末每服一錢執湯

調下

○桂肝丸 治小兒脾中遺尿不自覺者

官桂為末雄鷄肝一具等分搗丸如

小豆大溫水送下每日進三服

尿濁者濕滯脾胃也

○澄清飲 治小兒大便白小便濁或澀之如米泔

白木 茯苓 白芍炒

黃連姜汁 澤瀉 山查各一錢

青皮四分 甘草生三

右劉劑水煎空心服

便血者熱傳心肺也比初生嬰兒七日之內太小便有血

出者此由胎氣熱盛之所致也謂母食酒麵炙博熱毒等物流於心肺兒在胎內受之熱毒亦傳於心肺且女子熱入心故小便有之男子熱入於肺故大便有之治法以生地黃取自然汁入蜜少許和勻溫服男女皆効或甘草飲兼服尤効

○甘露飲治小兒胃中客熱牙宣口臭

欲飲食及目赤腫痛不任京藥口舌生瘡咽喉腫痛及身面皆黃肢躄微腫大便不調小便赤澀命治

熟地黃 生地黃酒洗 天門冬去心

麥門冬去心 枳殼炒 茵陳

黃芩酒炒 枇杷葉 石斛

甘草各等分 右劉水煎食後臨臥服

○一方用生蒲黃油頭髮燒灰各一錢

為末生地黃汁或米飲乳汁調同服

下淋者膀胱熱也

○五淋散治膀胱有熱水道不通淋瀝

或冷淋如膏或熱淋便熱

赤茯苓六錢 赤芍藥 山梔仁各二錢

條黃芩三錢 當歸 甘草各五錢

右劉劑每服三錢燈心一團水煎服

○一方用生地澤瀉木通滑石車前各二錢

吐血者榮衛氣逆也

○黃金丸治小兒吐血衄血下血

黃芩不拘多少為末煉蜜為丸如鷄

頭實大三歲兒每一丸搗湯化下

○栢枝散治小兒衄血吐血

栢枝 晒乾 藕節 晒乾 各等分為末

三歲者服半錢藕汁和蜜一匙調白湯下

○一方用山梔子炒黑每用三錢生薑煎服

○又方治咯血吐血用白芍藥為末磨犀角汁調服

○秘方治小兒吐血不止用黃連末一錢豆豉二十粒水煎溫服

小使不通者膀胱火也

○神通散治小便緊急小使閉澀不堪言為用芎藭末一錢扁蓄煎湯來送下霎時溲使湧如泉

○五苓散
猪苓 澤瀉 茯苓
白木各等分 官桂減半 右對一劑

木煎食前服加車前子燈草尤效

大便不通者臟腑執也

○萬億丸治大便不通如神
沒藥散治小兒風與熱帶留齒上焦胸膈高起大便不通

沒藥 大黃 枳殼炒
桔梗各二錢 木香 甘草各一錢

右對每服一錢薑三片水煎服

○治新生小兒二三日不大小便用葱汁人乳各半調勻抹在口中同乳帶下即通

○掩臍法治小兒大小便不通取連根葱白一莖生薑一塊淡豆豉二十粒搗一小匙同研爛捏作餅貼臍中烘執能之用絹帛扎定良久氣透自通不通再易餅

○二妙散治小兒大小便不通六七月間尋牛糞中有蜣螂不拘多

少用線串起陰乾收貯用時取一個要全者放淨磚上四面以灰火烘乾以刀從腰切斷如大便閉用上半截小便閉用下半截二便俱閉全用為細末新汲水調服

水腫者土覆水吐也

○加味五皮飲 治小兒四肢腫滿

五加皮 地骨皮 生薑皮

大腹皮 茯苓皮 錢 加姜黃

木瓜 錢 各一 右剉一劑水煎服

一方去五加皮加陳皮桑白皮

○牽牛散 治小兒諸般腫脹

黑牽牛 半生 取頭細末每服一二匙

桑白皮煎湯磨木香汁調服

黃疸者脾胃濕熱也

○茯苓滲濕湯 治小兒黃疸寒熱嘔吐

目俱黃小便不利

茯苓 茵陳 山梔 黃連

黃芩 防已 白朮 蒼朮

陳皮 青皮 枳殼 朱苓 各一

澤瀉 三分 右剉水煎徐徐溫

服○如小便不通加水通○如食傷

不思食加砂仁神麩炒 麥芽炒

汗者陰陽偏勝也

○團參湯 治小兒虛汗或心血液盛

新羅人參 川當歸 各三錢

右細剉用雄豬心一個切三片每服

二錢豬心一片并水一盞半煎食前

作兩次服

○止汗散 治小兒睡而目汗

故蒲扇灰 如無扇只將 為末溫酒調服

○牡蠣散 治小兒盜汗，因食生冷之物，為末，之所傷則不能制，其津液故成汗自出也。

牡蠣 煨二錢 黃芪 蜜炙 生地黃 各一兩

右剉劑水煎服

班者陰陽毒氣也

○治小兒身常發熱，風班及脚指常紅腫，此脾經風熱也。用防風通聖散去硝黃，加鼠粘子，酒炒黃連為末，亦用防風白芷薄荷黃連黃芩黃芪黃柏前湯塗之，宜避風。

○解顯鶴節者胎元不全也

○解顯宜

○八物湯有熱加酒炒黃連黃芩甘草水煎服，外綿帛緊束，及以白芨末敷之。

○人參地黃丸 治小兒顯顯開解頭縫不合，此乃腎氣不成，腎

王腎髓而兩腦海腎氣不足，所以腦髓不足，故不能容。

人參 二錢 懷熟地 四錢 嫩鹿茸

乾占藥 白茯苓 去皮 牡丹皮

山茱萸 去核 右為細末，煉蜜為丸，芡實大，用人參煎湯，研化食，遠服。

○鶴節宜

○當歸地黃丸 治小兒血氣不充，故肌瘦，薄骨節，口舌如鴉之味。

懷熟地 酒蒸 山茱萸 酒蒸 山藥 蒸

澤瀉 去毛 牡丹皮 云木 白茯苓 去

當歸 酒洗各三錢 一方加鹿茸 酥炙

牛膝 酒洗各二錢

右為末，煉蜜芡實大，每用熟水研化，食前服，仍以天南星炮去皮，臍研細末，入米醋調敷，緋帛上烘熱貼之，亦良法也。

行遲髮遲者氣血不充也

行遲髮遲者氣血不充也

行遲髮遲者氣血不充也

行遲髮遲者氣血不充也

行遲髮遲者氣血不充也

行遲髮遲者氣血不充也

行遲髮遲者氣血不充也

行遲髮遲者氣血不充也

行遲髮遲者氣血不充也

行遲髮遲者氣血不充也

行遲髮遲者氣血不充也

行遲髮遲者氣血不充也

行遲髮遲者氣血不充也

○行運宜

○調元散 治小兒稟受元氣不足顯願
遲行遲至足如筒
神色昏慢齒生遲

乾山藥 五錢 人參 去皮 茯苓 去皮

茯神 去皮木 白朮 二錢 石菖蒲 一錢

白芍 炒 熟苳 當歸

川芎 黃芪 甘草 各一錢半

右劉生薑三片棗一枚同煎不拘時服
服嬰兒乳母同服

○錢氏地黃丸 治用腎虛弱骨體不充
鹿茸牛膝五加皮同服自然
髓生而骨強即能漸漸行也

語遲者邪乘心也

○菖蒲丸 治小兒語遲

石菖蒲 人參 麥門冬 泡去心

川芎 遠志 日華水 當歸

乳香 硃砂 別研各一錢

右為末煉蜜丸黍米大每服十九食

遠糲米飲送下

齒遲者腎不足也

○等翁散 治小兒齒遲

川芎 乾山藥 當歸

白芍 炒 甘草 各二錢半

右為細末每服二錢白湯調下食後服
服將此乾藥末擦牙齦即生

龜胸者肺熱脹滿也

○龜胸丸 治小兒龜胸高如覆掌

川大黃 根六分 天門冬 去心 百合

杏仁 去皮尖 木通 去節 枳殼 麩炒

桑白皮 蜜炙 甜苳芳 隔 軟石膏 各一錢

右為細末煉蜜為丸如棗豆大每服五丸
溫水化下食後臨臥服仍宜炙兩乳前各一寸半上兩行三骨間六

處各灸三壯春夏從下灸起秋冬從上灸起依法灸之

龜背者風邪入脊也

○龜背丸 治小兒龜背

枳殼 去穢 防風 去毒 獨活

大黃 煨 前胡 去毒 當歸

麻黃 去節 各

右為細末麴糊丸黍米大每服十五丸九看兒大小以米飲下食後服仍灸肺俞穴在椎下兩傍各一寸半心俞穴在五椎下各一寸半膈俞穴在七椎下兩傍各一寸各灸三壯以小兒中指節為一寸又炷以小麥大但灸三壯而已

小兒行遲齒遲解顛顛填五軟鶴膝腎痔齒豁睛白多愁凡此皆因稟受腎

氣不足當以六味丸加鹿茸補之若因精氣未滿而御女以致多致頭目眩暈作渴吐痰或發熱足熱腰腿酸軟或自汗盜汗二便瀉痛變生諸疾難以名狀余常用六味八味二丸及補中益氣之劑加減用之無不奏效

方見補益

一 小兒五歲不能言咸以為廢人矣但其形色悉屬滿腎不足遂用六味丸加五味鹿茸及補中益氣湯加五味兩月餘形氣漸健將半載能發言至年許始發聲音如常

痘疹

小兒痘疹何以知腮赤眼胞赤赤時呵欠噴嚏及驚怖耳尖手指米如之證作三月瘡不見升發之藥不可遲敗

毒葛根堪選用解熱表汗最為宜寒涼之劑慎勿用臟腑一動致災危

小兒患痘毒臟腑虛寒者見證忌服寒涼藥惡寒寒熱往來自汗惡風手足厥冷

面青面色皸白目睛青色糞色青白身淨急墮嗜臥一便清利吐瀉小渴

唇腫口鼻氣冷飲食不進乳食不化腹脹聲音微弱足脛冰冷精神慢弱

懶言吐乳瀉清脈浮細而虛乃表虛脈沉細而遲乃裏虛

小兒患痘毒臟腑實熱者見證忌服溫藥面赤大便閉身壯熱毛焦唇燥

唇紫小使赤手足極熱驚悸譫語眼黃口鼻熱吐利而渴狂亂叫哭

鼻塞流清涕大便焦黃腹脹不食頭痛身身痛煩燥喉變胸膈痞悶

喉咽乾燥咳嗽喘促上下失血脈浮數而實大表脈沉實而數裏

痘有十候發熱初出出齊起泛行漿漿足回水收靨結痂還元

○初發熱宜加味敗毒散初起發熱即服此藥神效

柴胡 前胡 羌活 獨活 防風 荊芥 薄荷 枳殼

桔梗 川芎 天麻 地骨皮 右古方除參苓恐補早助火也宜加

紫草蟬蛻蘇葉麻黃姜蚕葱白帶根解熱表汗泄瀉加猪苓澤瀉去紫草

水煎熱服出汗為佳

○升麻葛根湯發熱之初未分麻痘傷寒傷食等証宜此解散

庶無誤事

升麻 葛根 白芍全甘草一錢

右剉一劑生薑三片水煎熱服○寒月加蘇葉八分○四肢逆冷加桂枝

一錢半○腰痛當知是痘加桂枝錢

半○時氣酷烈發熱太甚乃是毒氣

盛加牛旁子一錢半只服前散毒散

尤妙

○痘初出宜

神功散治痘出毒氣太盛血純一片

血或吐瀉七日以

前諸症可服解毒

黃芪 人參 白芍

紫草 生苜 紅花

牛旁子各等分 前胡 甘草減半

右剉水煎不拘時服○執甚加黃連

黃芪各一錢未退者再加大黃研入

○左鷲者加蟬蜋一個去翅足○若

頭粒淡黑者有寒乘之加官桂一錢

○胡荽酒痘初出時宜用此酒通噴四

飲能辟穢毒又以淨酒

脂點兩眼所痘入眼

胡荽一束銅錢大細切用好酒熱和

與服須更渾身通暢過一二時以帛

蘸床油點照於無痘處又出如珍珠

光亮數十顆矣如無胡荽即用胡荽

子研亦可

○痘出齊宜

保元湯

人參二錢 黃芪嫩者 甘草一錢

右剉一劑生薑一片水煎服四日以

前有寒症其色黑慘宜用保元湯加

官桂

一五日以後有寒中干重者用附子理

中湯不甚只宜保元湯加官桂

腹痛者毒盛也神功散王之
面紅不退地界不分者神功散倍前
胡吐者毒盛乘火炎而宜也神功散
主之泄瀉者火盛而奔越也服神功
散即止

却用升麻以升提之不可用止瀉
之藥惟解其毒則自止矣

渴者紅花子湯加牛蒡子雖口中如

干烟起即解發渴者或用人參麥門

冬湯飲之亦可切不可用東湯大

煎渴者取真黃土百沸湯碗蓋泡取

與水少加沙糖調飲立止

汗不止者而身已涼乃血隨氣溢也用

當歸 五錢 黃芪 三錢 酸棗 一錢

共剉一劑水煎溫服立止
痰用白附子水磨服切不可用二陳

湯使燥陽明經使孤陽無陰不能
施化也嗽用杏仁煎湯磨白附子
服

三日內頂陷者非虛也乃火盛陽極

反為陰降如當年樹枝向下宜用

九味神功散退其火

三四日色慘不明宜用神功散活血

退火使其望滿光明

或有失治不知解毒五六月間以燈

照之生氣未戕其毒太盛作熟地

界紅燥宜用神功散治之隨觀其

變而施治猶或可救一二過此則

不能施其神功矣

認痘法 故曰氣尊血分者生謂火靖

而後出氣得其令頭粒尖而白根顯

紅而不散譬如一顆珍珠放在胭脂

上也頭粒白于上見氣升而尊根紅
于下見血附而安其分也故生故曰
毒參陽位者死謂帶火而出氣不得
令頭粒紅紫地界不分譬如血猪
肝勢極而不返故死若朱砂咽暗色
者生息之氣由存可治者也

痘不治法

初出勇壯者不治 出如蠶種者不治
隨出隨沒者不治 如蚊蟲咬者不治
氣血相失者不治 倒出者不治
飲水如促鼻者不治
與肺氣不能疏理也

大凡七日以前為裏實不可投溫燥之
劑能劫毒也
八日以後為裏虛不可投寒涼之劑
能伐生氣也

起之宜

當起之而不起用川山甲炒成珠研
二錢溫酒調服

血弱不起根底淡薄用保元湯加丁
香 肉桂 當歸 川芎 水煎服

凡痘不起脹灰白色頂陷者氣血不足
虛寒症也宜托裏散加丁香

凡痘紫紅不起脹者火盛血熱宜服內
托散去桂加紫草紅花熱盛加黃芩

若紫黑陷伏用此藥調川山甲炒成
珠為末五分同服

○內托散 治血氣虛損或風邪穢毒中
出而不勻使毒毒內陷伏而不出或
虛內托毒毒使之盡出易收易斂

黃芪 人參 當歸 川芎

防風 桔梗 厚朴 白芷

甘草 水香 官桂

右方於紅紫黑陷屬執毒者去桂加紫草紅花黃芩○若淡白灰黑陷伏屬虛寒者加丁香救急管桂救表○當貫膿而不貫膿者倍參或當歸煎熟臨服入乳汁好酒同參溫服此貫膿之功法也○泄瀉加丁香乾薑肉蔻

行漿宜

八日漿不行其根虛薄血少故耳蓋以初起時毒戩血妄行未免躡進其血虧矣至此不能成漿急以歸茸湯益之

○歸茸湯

鹿茸酥炙 當歸五錢 剉酒煎服

凡痘屬虛寒八九日色光白如水泡頂陷根白痒塌寒戰等症

○回陽酒

鹿茸酥炙 大附子麩包煨 嫩黃芪去脂皮

當歸酒洗 右剉好酒煎服○兼

有痰嗽加半膽南星

灰陷黑陷嘔吐白沫為表虛用木香

散寒戰咬牙痒塌泄瀉為重虛用異

功散嘔甚用木香散加白豆蔻

泄瀉甚異功散加肉豆蔻此正治也

若未嘗解毒別有法

乾嘔屬胃虛裏熱異功散

○木香散

木香磨 前胡 黃芪

白茯苓去皮 白朮 厚朴姜汁

訶子煨取 陳皮各一錢 肉桂八分

人參雄者 丁香五粒

右剉一劑水一鍾煎七分溫服

○異功散

當歸

川芎

人參減半

黃芪

白木去芦

白茯苓去皮

訶子煨取

大附子麵包煨

肉桂各八分

半夏姜汁炒

厚朴姜汁炒

小丁香七粒

右剉一劑水一鍾煎至八分溫服

漿行而作痒此內熱而外為風寒所乘用荊芥穗帛裹緊搓糊粘帛頭令不散燈上燒過却於桌上吹去灰快放手指定痒疽頭用荊芥穗火點痒處一下即放退患者自以為妙每痒痘悉點之立止
行漿行足而發疥認定是黑疥痘或黑而硬或有紅絲或為太紫泡未曾解毒者仍以神功散加雄黃黃芽黃

連大黃煎服却用點法雄黃一錢研胭脂重浸水令濃調雄黃末點疥痘項上立時即出紅活亦神法也蓋雄黃能拔毒胭脂能活血水

漿足宜

此時有效逆胃氣上越欲絕也以真黃土鼻邊聞之立止

九日而寒者異功散甚者宜姜

九日寒戰大附子半個麵裹煨熟七

錢乾姜炒黑五錢白朮五錢人參

三錢水煎溫服

此時漿滿或為寒所薄一時痒俱紫

黑即如紫葡萄樣不必驚恐急以

肉桂磨湯服之立見如舊

回水宜

九日十日回水之時元氣重蒸直腸

連化其水自然消燭此循環之妙理也其有未會解毒至此時水不能化反歸于胃與所伏之毒伏于陽明則脾胃受戕宜以定中湯治之

○定中湯用真黃土能鎮安胃氣收斂中土取真正黃色不雜者用一塊在碗內百沸湯泡即以碗蓋少傾出用如冷傾入瓷內外以熱水頓熱用酒兩錢和藥朱砂研細五分黃能鎮心胞絡使小腸不奔也雄黃研細一錢能解毒使胃氣寧也二味用和勻以黃土湯少加砂糖溫服二服立止

煩燥悶亂發渴定中湯加片腦半分
牛旁子湯
有寒戰咬牙等症宜用附子理中湯

有擦破周身不能回水急以新瓦搗作粉摻在破處立收比妙法也

收斂骨

若解毒不盡或未經解毒到當醫而不厭面發熱蒸蒸若用甘露回天飲砂糖半酒錢百沸湯調一大碗溫服立時熱退痘壓萬發萬中回天之九也

若痘壓時濕壓外潰之痘淋漓粘淖者宜以甄陶散傳之新瓦不拘多少為細末篩過絹袋包撲患處若乾加堆積不落內又審膿即以瓦粉用鴨蛋清調敷立收而落當壓時腹痛不厭其痛着在中脘乃執毒凝滯瘀血作痛也

○手捻散

白
林

○牛旁子 白芍 桃仁

大黃各一錢 紅花八分 桂枝五分

右剉一劑水煎溫服一服立愈

若將壓時其痘一時盡黑非壓也乃

火極攻裏即凶矣

結痂宜

外潰不結痂者雖陶散傳之

結痂而懼犯風寒惡寒發熱者以補

中益氣湯

○補中益氣湯

當歸 黃芪各錢 人參五分 白朮八分

紫胡 升麻 乾葛各錢 甘草五分

右剉一劑生薑一片水煎服

○加味保元湯

黃芪二錢 人參一錢 麥門冬去心二錢半

知母一錢半 梔子炒一錢半 甘草五分

右剉一劑水煎溫服

結痂後有餘熱者以前藥加牛旁子

一錢 白附子一錢

還元宜

○還元宜

痂落血氣尚虛無力者宜調理八物

湯主之或十全大補湯

○還元痂落有餘毒覺其聚于臟腑時

復作執腹內疼痛宜牛旁子飲主之

○牛旁子飲

牛旁子 前胡 黃連 黃芩

連翹 白附子 玄參 赤芍各一錢

羌活 防風 甘草各五分

右剉一劑水煎溫服

○五福化毒丹

治痘疹後餘毒神效方見前諸熱凡痘後不問毒發

○祖傳經驗秘方

凡何經起紅腫時用

黑葦赤三豆以酸醋浸研漿時時以
鵝翎刷之隨手退去効

補遺秘方

○治小兒痘疹不起發
用李樹上津膠每用些須熬水飲之
即起

○復生丸 治小兒痘疹不起發紫黑陷
伏并痘疹初作已發未發服
之其毒即解五日已前可服
其効如神大梁鍾雲山傳

當歸 白芍 西芍

升麻 葛根 甘草 各五錢

嫩紫草茸 一兩 辰砂 一兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服
一丸水雪兩三水送下如無河水亦
可或糯米湯入酒一匙送下亦可

○桃紅痘疔方 前益類

雄黃 一錢 紫草 三錢

右為細末胭脂汁調將銀替挑破黑
疔將藥點入內即効

○發痘方

穿山甲 用前嘴炒 麝香 少許

右為細末六七歲者熱酒調下三分
不可多用蓋被片時通身汗出

○牛黃散 治痘黑陷
弱而不起發

朱砂 一分 牛黃 二厘

右為細末蜂蜜打溫胭脂汁取末調
藥用銀替刺黑陷上塗之三次一日
塗一次去黑

麻疹

麻疹乃六腑腸胃之熱毒於肺外感內
傷併發與痘症表似同裏實異初熱
三日出脹共三日出而又沒沒而又
出一週時許重者遍身細脹眼亦封

開有赤白微黃不同仍要紅活最嫌
黑脂及面目胸腹癢密咽喉縉纏者
逆發不出而喘者即死與太科癰疹
相似又與發斑相似如錦紋有空鉄
處如雲頭狀麻即如麻通身無空但
疎密不同耳仍有夾斑夾丹夾瘡同
出者

初起呵欠發熱惡寒咳嗽噴嚏流涕頭
眩宜升麻葛根湯加紫蘇葱白以解
肌切忌大汗斑不紅者亦宜乃麻症
初起之神方潮熱甚加平連地骨皮
譚語調辰砂六一散咳嗽加麻黃杏
仁麥冬石羔咳甚別用涼膈散加枯
梗地骨皮泄瀉宜四苓散便血合犀
角地黄湯吐血衄血加炒山梔小便赤
加水通寒熱似痢小柴胡湯

初起全類傷寒但面赤中指令為異耳
已出煩燥作渴者解毒湯合白虎湯喘
便閉者前胡枳殼湯加赤茯苓大黃
甘草五味水煎服便閉三四日者小
承氣湯防風通聖散譚語瀉閉者導
赤散如泄者四苓散加車前木通譚
語如狂者解毒湯調辰砂六一散大
便血小便亦見血者犀角地黄湯合
解毒湯吐血衄血解毒湯加炒山梔
童便泄瀉解毒湯合四苓散喘兼泄
瀉瀉瀉者柴苓湯煩渴作瀉者白虎
湯加蒼木猪苓湯熱盛乾嘔解毒湯
傷食嘔吐四君子湯夏月因暑作嘔
四苓散加入參皂角豆蔻木香三桂
熱藥

麻症初起已出已沒及一切雜症與痘

毒大同但始終藥宜清涼雖麻毒
 涼痘變溫暖不易常道虛則補實
 濕醫家活法故治麻亦有血虛用
 四物湯氣虛用四君子湯天寒傷
 則溫中理中之藥一時之權
 麻症沒後餘熱內攻循衣摸床
 語神昏喪志者死如熱輕餘毒去
 必先見諸氣色雖預防之始終以
 升麻葛根湯為主或消毒飲解毒湯
 症選用仍忌魚腥葱蒜之物

○升麻葛根湯 方見痘瘡

○辰砂六一散 即益元散方見中暑加辰砂二錢名辰砂六一散

○涼膈散 方見火證

○四苓散 即五苓散去桂瓜見中暑

○犀角地黄湯 方見吐血

○小柴胡湯 方見傷寒

○解毒湯 即黃連解毒湯方見傷寒

○白虎湯 方見傷寒

○小承氣湯 即大黃枳實厚朴水煎服

○防風通聖散 方見中風

○導赤散 即生地黃木通其草淡竹葉七片水煎服

○柴苓湯 即小柴胡湯合五苓散是也

○四君子湯 方見補益

○四物湯 方見補益

○理中湯 方見中寒

○清毒飲 即牛旁子防風煎茶甘草水煎服

海山藥譜回春等之...

本症及後余...

○黃連散 治...

○鹽中散 治...

○四時散 治...

○藥本散 治...

○散赤散 治...

○胡風散 治...

○小承氣散 治...

○白濁散 治...

○神毒散 治...



早稲田大学図書館

011488575491