



風陵文庫
文庫19
F 105
17



F0105-(17)

二如亭群芳譜利部目錄

第五冊

藥譜三

共二十種

附錄三種

黃連

黃蘗

黃芩

金銀藤

紫草

三七

紫苑

決明

半夏

牽牛

景天 附煥火樹

穀精

菴麻

王瓜

麻黃

香薷

紫蘇

薄荷

澤蘭

大風子

群芳譜藥譜三目錄

二如亭群芳譜藥部卷之三

濟南 王象晉蓋臣甫 纂輯

松江 陳繼儒仲醇甫

虞山 毛鳳苞子晉甫 全較

寧波 姚元台子雲甫

濟南 男王與敕
係士禎曾孫啟楠 詮次

藥譜三

黃連

一名王連 一名支連 江湖荆夔皆有而以

宣城者爲勝施黔次之東陽歙州處州者又次之苗高尺許叢生一莖三葉葉似甘菊凌冬不凋四月開花黃色六月結實似芹子色亦黃江左者根黃節高若連珠葉如小雉尾正月開花作細穗淡黃白色六七月根緊始堪采蜀道者粗大味極濃苦療渴爲最江東者節如連珠療痢大善大抵連有二種一種根粗無毛如鷹雞爪形色深黃而堅實一種

無珠多毛黃色稍淡而中虛味苦寒無毒止消渴厚腸胃利骨益膽降火療口瘡其用有六瀉心臟火一也去中焦濕熱二也諸瘡必用三也除風濕四也治赤眼暴發五也止中部見血六也

○製用 布拭去毛漿水浸半日時漉出柳木火焙乾用黃連入手少陰心經爲治火主藥治木臟火生用治肝膽實火猪膽浸炒肝膽虛火醋浸炒上焦火酒炒中焦火姜汁炒下焦火鹽水或朴硝炒氣分濕熱之火茶煎湯浸炒血分塊中伏火乾漆水炒食積之火

黃土炒不獨為之引導蓋辛熱能制其苦寒賦寒能制其燥性用者酌之

○附錄胡黃連

生波斯國海畔陸地今南海秦隴間亦有之初生似蘆苗若夏

枯草根頭似烏嘴乾則似楊柳枯枝心黑外黃折之內似鸚鵡眼塵出如烟者良八月上旬採苦平無毒治骨蒸勞熱三消五心煩熱婦人胎蒸虛驚冷熱洩痢厚腸胃益顏色

○療治

肝火為痛黃連姜汁炒為末粥糊丸梧子大每服二十九白湯下一方黃連六

兩吳茱萸一兩同炒為末神麩糊丸梧子大每服三四十九白湯下伏暑發熱作渴嘔惡及赤白痢消渴腸風酒毒洩瀉諸病並宜酒煮黃龍丸主之川黃連一斤切以好酒二升半煮乾焙研糊丸梧子大每服五十九熟水下日三服陽毒發狂奔走不定宜黃連

寒水石等分為末每服三錢濃煎甘草湯下

骨節積熱漸漸黃瘦黃連四分切以童子

小便五大合浸經宿微煎三四沸去滓分作

二服小兒疳熱流注遍身瘡蝕或潮熱肚

脹作渴猪肚黃連丸用猪肚一個洗淨宣黃

連五兩切碎水和納入肚中縫定放在五升

梗米上蒸爛石臼搗千杵或入少飯同杵丸

菘豆大每服二十九米飲下仍服調血清心

之藥佐之蓋小兒之病不出于疳則出于熱

常須識此三消骨蒸黃連末以冬瓜自然

汁浸一夜曬乾又浸如此七次為末以冬瓜

汁和丸梧子大每服三四丸大麥湯下尋常

渴只一服見効消渴尿多黃連末蜜丸梧

子大每服三十九白湯下消渴小便滑數

如油黃連五兩栝樓根五兩為末生地黃汁

丸梧子大牛乳下五十九日服忌冷水猪肉

一方黃連末入猪肚肉蒸爛搗丸梧子大
飯飲下 濕熱水病黃連末蜜丸梧子大每
服二九至四五丸飲下日三四服 破傷風
黃連五錢酒二盞煎七分入黃蠟三錢溶化
熱服之 小便白淫因心腎氣不足思想無
窮所致黃連白茯苓等分爲末酒糊丸梧子
大每服三十丸煎補骨脂湯下日三服 赤
痢久下累治不瘥黃連一兩鷄子白和爲餅
炙紫爲末以漿水三升慢火煎成膏每服半
合溫米飲下 一方只以雞子白和丸服
熱毒赤痢黃連二兩切瓦焙令焦當歸一兩
焙爲末入麝少許每服二錢陳米飲下佛智
和尚在閩以此濟人 赤白久痢並無寒熱
只日久不止用黃連四尺九寸鹽梅七個入
新瓶內燒烟盡熱研每服二錢鹽米湯下
赤白暴痢如鴉鴨肝者痛不可忍用黃連黃

芩各一兩水二升煎一升分三次熱服 冷
熱諸痢不問赤白穀滯休息久下悉主之黃
連長三寸三十枚重一兩半龍骨如碁子大
四枚重一兩大附子一枚乾姜一兩半膠一
兩半細切以水五合着銅器中去火三寸煎
沸便取下坐土上沸止又上水五合如此九
上九下納諸藥入水內再煎沸輒取下沸止
又上九上九下度可得一升頓服卽止 下
痢赤白日夜數十行臍腹絞痛黃連一升酒
五升煮取一升半分再服當止 治赤白諸
痢裏急後重腹痛宜黃連青木香等分搗末
白蜜丸桐子大每服二三九空腹飲下日
再服効如神久冷者以煨蒜搗和丸之不拘
大人嬰孺皆効 一方黃連茱萸炒過四兩
木香麩煨一兩粟米飯丸 小兒冷熱痢加
煨熟訶子肉 小兒瀉痢加煨熟肉豆蔻

小見氣虛瀉痢腹痛加白附子尖 久痢加
龍骨 禁口痢加石蓮肉 痢渴加烏梅肉
以阿膠化和為丸 五疳八痢用連珠黃連
一斤分四分一分酒浸一分自然姜汁炒一
分吳茱萸湯浸一分益智仁同炒去智仁研
末白芍酒煮切焙四兩廣木香二兩使君子
仁焙四兩共為末蒸餅和丸綠豆大每服三
十九米飲食前下日三服忌猪肉冷水 傷
寒下痢不能食者黃連一斤烏梅二十枚去
核炙燥為末蠟一碁子大蜜一升合煎和丸
梧子大一服二十九日三服 又方黃連二
兩熟艾如鴨子大一團水三升煮取一升頓
服立止 氣痢後重裏急或下泄宜連一兩
乾姜半兩各為末收每用連一錢姜半錢和
勻空心溫酒下或米湯下神効 濟生方秘
傳香連丸用黃連四兩木香二兩生姜四兩

以姜鋪沙鍋底次鋪連上鋪香新汲水三盞
煮焙研醋調倉米糊為丸如常日服五次
小兒下痢赤白多時體弱不堪宜連川水濃
煎和蜜日服五六次 諸痢脾泄膿毒下血
雅州黃連半斤去毛切裝肥猪大腸內紮定
入沙鍋中以水酒煮爛取連焙研末搗腸和
丸梧子大每服百丸米湯下極効 赤白下
痢日夜無度及腸風下血用川黃連去毛吳
茱萸湯泡過各二兩同炒香揀出各為末以
粟米飯和丸梧子大各收每服三十九赤痢
甘草湯下黃連丸白痢姜湯下茱萸丸赤白
痢各用十五丸米湯下救人甚効 脾胃受
濕下痢腹痛米穀不化用黃連吳萸二味加
白芍同炒研蒸餅和丸服 腸胃積熱或因
酒毒下血腹痛作渴脉弦數黃連四兩分作
四分一分生用一分切炒一分炮切一分水

浸晒研末條黃芩一兩防風一兩為末麵糊丸梧子大每服五十九丸米泔浸枳殼水食前送下冬月加酒蒸大黃一兩 臟毒下血黃連為末獨頭蒜煨研和丸梧子大每空心陳米飲下四十九丸 酒痔下血黃連酒浸煮熟為末酒糊丸梧子大每服三四十丸白湯下一方用自然姜汁浸焙炒 雞冠痔黃連末傳之加赤小豆末尤良 痔漏秘結用此寬腸黃連枳殼等分為末糊丸梧子大每服五十丸空心米飲下 痢痔脫肛冷水調黃連末塗之良 脾積食泄川黃連二兩為末大蒜搗和丸梧子大每服五十九丸白湯下 泄脾泄宜連一兩生姜四兩文火炒至姜脆各自揀出為末水泄用姜末脾瀉用連末每服二錢空心白湯下甚者不過二服亦治痢疾 眼目諸病勝金黃連丸用宜連不限多

少槌碎以新汲水一大盃浸六十日綿濾取汁入原盃內重湯上熬不住攪之候乾即穿地坑深一尺以瓦鋪底將熟艾四兩坐瓦上燃火以藥盃覆上四畔土封開孔出烟盡取出刮下丸小豆大每甜竹葉湯下十九丸 男翳青盲黃連末一兩羊子肝一具去膜搗爛和丸梧子大每食後暖漿水吞十四丸連作五劑瘥昔崔承元活一死囚囚後病死一旦崔病內障逾年半夜獨坐聞塔除窻窻之聲問之荅曰是昔蒙活之囚今故報恩遂告以此方而沒崔服之不數月眼復明因傳於世 暴赤眼痛宜黃連剉以雞子清浸置地下一夜次早濾過雞羽蘸滴目內 又方苦竹兩頭留節一頭開小孔入黃連片在內油紙封浸井中一夜次早服竹節內水加片腦少

許外洗之 一方黃連冬青葉煎湯洗 一方黃連乾姜杏仁等分爲末綿包浸湯閉目 乘熱淋洗 小兒赤眼水調黃連末貼足心 甚妙 爛弦風眼黃連十文槐花輕粉少許 爲末男兒乳汁和之飯上蒸過帛裹熨眼上 三四次卽効屢試有驗 目卒痒痛乳汁浸 黃連頻點皆上抱朴子云治目中白病 淚 出不止黃連浸濃汁漬拭之 牙痛惡熱黃 連末摻之立止 口舌生瘡黃連煎酒時含 呷之 赴筵散用黃連乾姜等分爲末摻之 小兒口疳黃連蘆薈等分爲末每蜜湯服 五分走馬疳入蟾灰等分青黛減半麝少許 小兒鼻蠶鼻下雨道赤色有疳以米泔洗 淨用黃連末傅之日三四次 小兒月蝕生 於耳後黃連末傅之 小兒食土取好黃土 煎黃連汁搜之晒乾與食 預解胎毒小兒

初生以黃連煎湯浴之不生瘡及胎毒 又 方未出聲時以黃連煎汁灌 匙令終身不 出癩已出聲者灌之癩雖發亦輕此祖方也 腹中鬼哭黃連煎濃汁母常呷之 因驚 胎動出血取黃連末酒服方寸七日三 妊 娠子煩口乾不得臥黃連末每服一錢粥飲 下或酒蒸黃連丸亦妙 癰疽腫毒已潰未 潰皆可用黃連檳榔等分爲末以雞子清調 搽之 中巴豆毒下痢不止黃連乾姜等分 爲末水服方寸七 傷寒勞復身熱大小便 赤如血胡黃連一兩山梔子二兩去殼蜜半 兩拌和炒令微焦爲末用猪膽汁和丸梧子 大每服十九用生姜二片烏梅一個童子小 便三合浸半日去滓食後暖小便令溫吞之 臥時再服甚効 小兒潮熱往來盜汗胡黃 連柴胡等分爲末煉蜜丸茨子大每服一丸

至五丸安器中以酒少許化開更入水五分
 重湯煮二三十沸和滓服 小兒疳熱肚脹
 潮熱發焦不可用大黃黃芩傷胃之藥恐生
 別證以胡黃連五錢五靈脂一兩為末雄豬
 膽汁九菘豆大米飲服一二十九 肥熱疳
 疾胡黃連黃連各半兩硃砂二錢半為末入
 豬膽內紫定以杖子鈞懸於砂鍋內漿水煮
 一炊久取出研爛入蘆薈麝香各一分飯和
 丸麻子大每服五七九至一二十九米飲下
 五心煩熱胡黃連末米飲服一錢 小兒
 疳瀉冷熱不調胡黃連半兩綿姜一兩炮為
 末每服半錢甘草節湯下 滯下純血腹痛
 黃連同槐花枳殼乳香沒藥等分煮服神効
 口糜口瘡黃連 同五味子甘草等分煮濃
 汁漱口甚良 小兒黃疸胡黃連川黃連各
 一兩為末用黃瓜 一個去瓢留蓋入藥在內

合定麩裹煨熟去麩搗丸菘豆大每量大小
 溫水下 吐血衄血胡黃連生地黃等分為
 末豬膽汁丸梧子大臥時茅花湯下五十九
 血痢不止胡黃連烏梅肉竈下土等分為
 末臘茶清下 熱痢腹痛胡黃連末飯丸梧
 子大每米湯下三十九 嬰兒赤目茶調胡
 黃連末塗手足心即愈 癰疽瘡腫已潰未
 潰皆可用之胡黃連川山甲燒存性等分為
 末以茶或雞子清塗之 痔瘡疼腫
 不可忍者胡黃連末鵝膽汁調搽之
 ○典故 荆端王素多火病醫令服金花丸乃芩
 連 梔 栝 四味服至數年其火愈熾遂至
 內障喪明 **本草綱目** 弘治乙卯長
 沙大旱黃連上生王瓜 **徐積卿異林**
 ○麗藻贊 黃連味苦左右相因斷涼滌暑闢命
 輕身縉雲昔御飛蹕上旻不行而至

吾聞其人

劉宋王微

頌黃連上草丹砂之次禦孽辟妖長靈久視騷龍行天馴馬匝地

鴻飛以儀順道

則利梁江淹

黃蘗

一名蘗木一名黃栢出邵陵者輕薄色深

為勝出東山者厚而色淺樹高數丈葉似吳

茱萸亦如紫椿經冬不凋皮外白裏深黃厚

二三分二月五月採皮陰乾性苦寒無毒洩

伏火補腎水堅腎壯骨治衝脉氣逆不渴而

小便不通消五臟腸胃中結熱黃疸女子漏

下赤白陰傷蝕瘡男子陰痿及傳莖上瘡除

骨蒸瀉膀胱相火得知母滋陰降火得蒼朮

除濕清熱為治痿要藥得細辛瀉膀胱火治

口舌生瘡元醫嘔元素曰黃蘗之用有六瀉

膀胱龍火一也利小便結二也除下焦濕腫

三也痢疾先見血四也臍中痛五也補腎壯

骨髓六也凡膀胱腎水不足諸痿厥腰無力

黃芪湯中加用使兩足膝中氣力涌出痿厥

卽去乃癰瘕必用之藥李時珍曰知母佐黃
栢滋陰降火有金水相生之義黃栢無知母
猶水母之無蝦蓋黃栢能制膀胱命門陰中
之火知母能清肺金滋腎水之化源氣爲陽
血爲陰邪火煎熬則腎水漸涸故陰虛火動
之病須之非陰中之火不可用又必少壯氣
盛能食者用之相宜若中氣不足邪火熾甚
者久服有寒中之變近時虛損及縱慾求嗣

之人用補陰藥以二味爲君久服降令大過
脾胃受傷真陽暗損蓋不知此物苦寒滑滲
有反從火化之害也

○製用

削去粗皮用生蜜水浸半日曬乾每五
兩用蜜三兩塗之文武火炙令蜜盡爲

度黃蘗性寒而沉生用降實火熟用不
傷胃酒制治上鹽制治下蜜制治中

○典故

王善夫病小便不通腹堅如石雙睛凸
出飲食不下腿裂出水痛苦不可名狀

治中滿利小便滲洩之藥遍服無驗李杲診
之曰此奉養太過積熱傷腎水致膀胱乾涸
火又運上爲嘔噦繫古老人謂熱在下焦治
下焦其病必愈遂乃用知母黃蘗各一兩酒

洗焙碾入桂一錢為引熱水丸如芡子大每服二百丸沸湯下少時前陰如刀刺火燒之狀溺如瀑泉涌出顧盼之間腫脹消散內經云熱者寒之腎惡燥急辛以潤之以黃蘗苦寒洩熱補水潤燥為君知母苦寒瀉腎火為佐肉桂辛熱為使寒因熱引也

○療治

陰火為病大補丸用黃蘗去皮鹽酒炒

氣虛四君子湯下 男婦諸虛百損小便淋瀝遺精白濁等證黃蘗去皮切二斤熟糯米一升童便九浸九晒蒸過晒研為末酒煮麩糊丸桐子大每服百丸溫酒下 上盛下虛水火偏盛消中等證黃蘗一斤分四分用醇酒蜜湯鹽水童便浸洗晒炒為末知母一斤去毛搗蒸膏和丸桐子大每服七十九白湯下 臍毒痔漏下血不止川黃蘗皮刮淨一

斤分四分三分用酒醋童尿各浸七日洗晒焙一分生炒黑色為末煉蜜丸梧子大空心溫酒下五十九丸久服除根 治諸虛赤白濁川蘗皮刮淨一斤分四分酒蜜人乳糯米泔浸透炙乾切研廩米飯丸如上法服 蘗皮丸黃蘗一斤分作四分三分用醇酒鹽湯童尿各浸二日焙研一分用酥炙研末以猪臟一條去膜入藥在內紫煮熟搗丸如上法服 下血數升黃蘗一兩去皮雞子白塗炙為末水丸綠豆大每服七丸溫水下 小兒下血或血痢黃蘗半兩赤芍藥四錢為末飯丸麻子大每服一二十丸食前米飲下 妊娠白痢晝夜三五十行蘗根黃厚者蜜炙令焦為末大蒜煨熟去皮搗爛和丸梧子大空心米飲下三五十丸日三神妙 小兒熱瀉黃蘗削皮焙為末米湯丸粟米大每服一二十

丸米湯下 赤白濁淫及夢洩精滑黃蘗炒
 真蛤粉各一斤為末每服百丸空心溫酒下
 黃蘗苦而降火蛤粉鹹而補腎也又方加知
 母炒牡蠣粉煨山藥炒等分為末糊丸梧子
 大每服八十九鹽湯下 積熱夢遺心神恍
 惚膈中有熱宜清心丸黃蘗末一兩片腦一
 錢煉蜜丸梧子大每服十五丸麥冬湯下
 消渴尿多黃蘗切片水一升煮三五沸湯即
 飲之恣飲數日即止 嘔血熱極黃蘗蜜塗
 炙乾為末麥門冬湯調服二錢立瘥 時行
 赤目黃蘗去粗皮為末濕紙包裹黃泥固煨
 乾每用一彈子大紗帕包之浸水一盞飯上
 蒸熟乘熱薰洗極効一丸可用三二次 嬰
 兒赤目在蓐內者人乳浸黃蘗汁點之 眼
 日昏暗每旦含黃蘗一片吐津洗之終身行
 之永無目疾 卒喉痺痛黃蘗片含之又以

一斤酒一斗煮二沸恣飲便愈 咽喉卒腫
 食飲不通苦酒和黃蘗末傅之冷即易 小
 兒重舌黃蘗浸苦竹瀝點之 口舌生瘡黃
 蘗合之良深師用蜜漬取汁含之吐涎 心
 脾有熱舌頰生瘡蜜炙黃蘗青黛各一分為
 末入生龍腦一字搽之吐涎 赴筵散用黃
 蘗細辛等分為末搽或用黃蘗乾姜等分亦
 良又黃栢蜜炒研末傅之如神 口疳臭爛
 綠云散用黃蘗五錢銅綠二錢為末搽之漱
 去涎 鼻疳有蟲黃蘗二兩冷水浸一宿絞
 汁溫服 鼻中生瘡黃蘗檳榔末豬脂和敷
 唇瘡痛痒黃蘗末以薔薇根汁調塗立効
 鬚毛毒瘡生頭中初生如蒲桃痛甚黃蘗
 一兩乳香二錢半為末槐花煎水調作餅貼
 于瘡口 小兒顛腫生下即腫者黃蘗末水
 調貼足心 傷寒遺毒手足腫痛欲斷黃蘗

五斤水三升煮漬之 癰疽乳發初起者黃
 蘗末和雞子白塗之乾即易 癰疽腫毒黃
 蘗皮炒川烏頭炮等分爲末唾調塗之留頭
 以米泔水潤濕 小兒臍瘡不合黃蘗末塗
 之 小兒膿瘡遍身不乾黃栢末入枯礬少
 許摻之即愈 男子陰瘡有二種一種陰蝕
 作白膿出一只生熱瘡用黃蘗黃芩等分煎
 湯洗仍以黃蘗黃栢作末傅之又法黃蘗煎
 湯洗之塗以白蜜 賺瘡熱瘡黃蘗末一兩
 輕粉三錢猪胆汁調搽之或只用蜜灸黃蘗
 一味 火毒生瘡凡人冬月向火火氣入內
 兩股生瘡其汁淋漓用黃蘗末摻之立愈一
 婦病此人無識者用此 愈 凍瘡裂痛乳
 汁調黃蘗末塗之 食自死肉毒黃蘗末水
 服方寸七 欽瘡生
 黃蘗末麪糊調塗効

黃芩

一名經芩 一名空腸 一名腐腸 一名內虛

一名黃文 一名印頭 一名妬婦 一名苦督郵

內實者名子芩 一名狹尾芩 一名條芩 一名

鼠尾芩 川蜀河東陝西近郡皆有之 苗長尺

餘莖粗如筋葉從地四面作叢生亦有獨莖

者葉細長青色兩兩相對六月開紫花根如

知母長四五寸二八月採根曝乾氣涼味微

苦而甘氣厚味薄得酒上行得猪膽汁除肝

經芩即片
芩乃舊根

多中空外
黃內黑子

芩乃新根
多內實或

云西芩多
中空北芩

多內實

膽火得柴胡退寒熱得厚朴黃連止腹痛得芍藥治下痢得桑白皮洩肺火得五味牡蠣令人有子得白朮安胎得黃芪白欬赤小豆療鼠瘻總之能治上焦皮膚風熱濕熱頭痛奔豚熱痛火欬肺痿喉腥利胸中氣消痰膈諸失血疔腫排膿乳癰發背婦人產後養陰退陽女子血閉淋露下血小兒腹痛李時珍曰黃芩氣寒味苦色黃帶綠苦入心寒勝熱

洩心火治脾之濕熱一則金不受刑一則胃火不流入肺卽所以救肺也肺虛不宜者苦寒傷脾胃損其母也胸脇痞滿實兼心肺上焦之邪心煩喜嘔默默不欲飲食又兼脾胃中焦之症宜用黃芩以治手足少陽相火黃芩亦少陽本經藥也

○療治 三黃丸孫思邈千金方云巴郡太守秦加減三黃丸療男子五勞七傷消渴不生肌肉婦人帶下手足寒熱瀉五臟火春三月黃芩四兩大黃三兩黃連四兩夏三月黃

芩六兩大黃一兩黃連七兩秋三月黃芩六兩大黃三兩黃連三兩冬三月黃芩三兩大黃五兩黃連二兩三物隨時合搗下篩蜜丸烏豆大米飲每服五丸日三不知增至七丸服一月病愈久服走及奔馬人用有驗禁食猪肉三補丸治上焦積熱瀉五臟火黃芩黃連黃蘗等分為末蒸餅丸梧子大每白湯下二三十九丸肺中有火清金丸用芩炒為末水丸梧子大每服二三十九丸白湯下小兒驚啼黃芩人參等分為末每服一字水飲下肝熱生翳不拘大人小兒黃芩一兩淡鼓三兩為末每服三錢熟豬肝裝吃溫湯送下日二服忌酒麵少陽頭痛不拘偏正片芩酒浸透晒乾為末每服一錢茶酒任下眉眶作痛風熱有痰黃芩酒浸白芷等分為末每服二錢茶下吐血衄血或痰或止

積熱所致黃芩一兩去中心黑朽者為末每服三錢水一盞煎六分和滓溫服吐衄下血黃芩三兩水三升煎一升半每溫服一盞亦治婦人崩漏血淋熱痛黃芩一兩水煎熱服婦人四十九歲已後天癸當住每月却行或過多不止條芩心二兩米醋浸七日炙乾又浸如此七次為末醋糊丸梧子大每服七十九空溫酒下日二崩中下血黃芩為細末每服一錢霹靂酒下許學士云崩中多用止血及補血藥此方乃治陽乘於陰所謂天暑地熱經水沸溢者也安胎清熱條芩白朮等分炒為末米飲和丸梧子大每服五十九白湯下或加神麴凡妊娠調理以四物去地黃加白朮黃芩為末常服甚良產後血渴飲水不止黃芩麥門冬等分水煎溫服無時老小火丹黃芩末水調塗之

秤鍾燒紅
滓酒中名
霹靂酒

○典故

李時珍曰予年二十時因感冒咳嗽既久且犯戒遂病骨蒸發熱膚如火燎每
 日吐痰盈許暑月煩渴寢食幾廢六脉浮洪
 遍服柴胡麥門冬荆瀝諸藥月餘益劇皆以
 為必死矣先君偶思李杲治肺熱如火燎煩
 燥引飲而晝盛者氣分熱宜一味黃芩湯以
 瀉肺經氣分之火遂按方用片芩一兩水二
 鍾煎一鍾頓服次日身熱盡退而痰嗽皆愈
 藥中肯綮如鼓應枹醫中之妙有如此哉
 一人素多酒慾病小腹絞痛不可忍小便如
 淋諸藥不効偶用黃芩木通甘草三味煎服
 遂止 一人因虛服附子藥多病小便閉服
 芩連藥遂愈 一人灸火至五壯血出不止
 如尿手冷欲絕酒炒黃芩二錢為末酒服止

金銀藤

一名忍冬 一名通靈草 一名鴛鴦草 一

名左纏藤 一名蜜桶藤 一名鴛鴦藤 一名老

翁鬚 一名金釵股 處處有之 附樹延蔓 莖微

紫色 有薄皮膜之 其嫩莖色青 有毛對節生

葉葉如薜荔而青 有漚毛 三四月後開花不

絕 花長寸許 一蒂兩花 二瓣 一大一小 長藥

初開者藥瓣俱白 經三二日則變黃 新舊相

參 黃白相映 故名金銀花 氣甚清芬 四月採

花 藤葉不拘時俱陰乾 氣味甘寒 無毒 功用

皆同治風除脹解痢逐尸消腫散毒療癰疽
疥癬發背楊梅諸惡瘡皆為要藥張相公云
誰知至賤之中乃有殊常之効正此類也

○療治

忍冬酒治癰疽發背不問發在何處皆有奇効鄉落貧乏藥材難得但處心服之俟疽破貼以神異膏其効甚妙忍冬藤生葉一把沙盆研爛入生餅子酒少許稀稠得所塗于四圍中留一口洩毒氣藤只用五兩木槌槌碎不可犯鐵大甘草
入沙盆內水二盞文武火慢煎至一盞入無灰好酒一大盞再煎十數沸去滓分爲三服一日一夜喫盡病勢重者一日二劑服至大小腸通利則藥力到沈內翰云如無生者只

用乾者然不及生者効速 忍冬丸治消渴
愈後預防發癰疽忍冬草根莖花葉皆可不拘多少入瓶內以無灰好酒浸以糠火煨一宿取出晒乾入甘草少許研爲細末以浸藥酒打麩糊丸梧子大每服五十丸至百丸湯酒任下此藥不特治癰疽大能止渴 五痔諸瘻方同上 一切腫毒不問已潰未潰或初起發熱金銀花連莖葉取自然汁半盞煎八分服以滓敷上敗毒托裏散氣和血其功獨勝 疥瘡便毒喉痺乳蛾方同上 敷腫拔毒金銀藤大者燒存性葉焙乾爲末各三錢大黃焙爲末四錢凡腫毒初發以水酒調搽四圍留心洩氣 癰疽發背腸癰乳癰無名腫毒愀痛實熱狀類傷寒不問老幼虛實服之未成者內消已成者卽潰忍冬葉黃芪各五兩富歸一兩甘草八錢爲細末每服二

俗名甜藤

錢酒一盞半煎一盞隨病上下服日再服以
滓敷之 惡瘡不愈左纏藤一把搗爛入雄
黃五分水二升瓦罐煎以紙封七重穿一孔
待氣出以瘡對孔薰之三時久大出黃水後
用生肌藥取効 輕粉毒癰方同上 瘡久
成漏忍冬草浸酒日日常飲 熱毒血痢忍
冬藤濃煎飲 五種尸注飛尸者游走皮膚
洞穿臟腑每發刺痛變動不常遁尸者附骨
入肉攻一血脉每發不可見死尸聞哀哭便
作風尸者淫躍四末不知痛之所在每發恍
惚得風雪便作沉尸者纏結臟腑冲引心脇
每發絞切遇寒冷便作尸注者舉身沉重精
神錯雜常覺昏寤 則大作並是身
中尸鬼引接外邪宜用生忍冬葉剉數斛煮
取濃汁煎稠每服雞子大許溫酒化下一日
二三服 鬼擊身青作痛金銀花一兩水煎

飲之 脚氣作痛筋骨引痛金銀花為末每
服二錢熱酒調下 中野菌毒急采鴛鴦草
啖之 口舌生瘡赤梗蜜桶藤高脚地銅盤
馬蹄香等分以酒搗汁雞毛刷上取涎出即
愈 忍冬膏治諸般腫痛金刃傷瘡惡瘡金
銀藤四兩吸鐵石三錢香油一斤熬枯去滓
入黃丹八兩待熬至
滴水不散如常攤用



一名紫丹一名紫芙一名芷蕙一名藐一
名地血一名鴉銜草生礪山山谷南陽新野
及楚地苗似蘭香莖赤節青二月開花紫白
結實亦白紫根色紫可以染紫味甘鹹氣寒

芙蓉 其音紫
其音庚
其音藐

無毒入心包絡及汗經血分涼血和血利大小腸故痘疹欲出未出血熱毒盛大便秘者宜用得木香白朮佐之尤妙已出而紫黑閉者亦可用若出而紅活者及白陷大便利者切忌蓋脾氣實者可用脾氣虛者反能作瀉古方惟用茸取其初得陽氣以類觸類所以用發痘瘡今人不達此理一槩用之則非矣一切惡瘡癰腫毒亦可用

○種植

宜黃白較良之地青沙地亦善開荒黍不深不細

下大佳性不耐水必須高川秋耕深
 細耨平至春又轉耕之三月種耨耩地逐壟
手下手良田一畝用子二升半薄田三升下
 訖耨之或以輕砒碾過地刈穫九月中子熟用鋤恐傷
潔淨為佳壟底草手拔之刈穫刈之候燥聚根不茂此
 打取子收草宜速竟為良一把隨以茅束之草嬌嫩也
擘葛尤善四把為一束當日斬齊一顛一倒濕打則子
 十層許為長行置堅平地上板石壓之令穰泄露不速
兩三宿豎頭置日中曝之令氾氾然五十頭恐遇雨損
 作一洪著屋下陰涼處棚棧上棚下勿有驢草
馬糞及人溺又忌烟皆令草失色其利勝藍不壓難售
 若欲久停者入五月內著屋中閉門塞向窗
泥勿氣風入漏氣過立秋然後開出草色不太乾則碎
黑若經夏在棚棧上草帶濕為良
便變黑不復任用矣不晒鬱黑
太燥碎折

○製用 秋深子熟傍去其土連根取就地鋪齊
少乾輕振其土以茅策束切去虛稍以
之染紫其
色殊美

洪十字大
頭向外以
葛纏縛之

○療治 解痘毒紫草一錢陳皮五分葱白三寸
新汲水煎服 一法熱至三四日痘疹

隱隱將出未出色赤便閉者紫草二兩到百
沸湯一盞泡封嚴勿泄氣待溫時服半合則
瘡雖出亦輕大便利者勿用煎服亦可 痘
毒黑疔紫草二錢雄黃一錢為末胭脂汁調
銀簪挑破點之極妙 癰疽便閉紫草瓜蒌
實等分新水煎服 白禿紫草煎汁塗之
小便卒淋及產後淋瀝紫草一兩為散每食
前并華水服二錢 惡虫咬紫草煎油塗之
火黃身熱宜烙足手心背心百會下廉內
服紫草湯紫草吳藍黃連各一兩木香三錢

水煎服午後却涼身有
紅點或黑點者不可治

三七 一名山漆一名金不換生廣西南丹諸州

畚峒深山中采根曝乾黃黑色長者如老姜
地黃有節味甘微苦似人參止血散血亦主
吐血衄血下血血痢崩中不止產後惡血不
下血暈血痛赤目癰腫虎咬蛇傷治金瘡箭
傷跌撲杖瘡血出不止嚼爛塗或為末摻之
血立止青腫者即消若受杖時先服一二錢

則血不衝心杖後尤宜服產後服亦良迺陽
明厥陰血分之藥治一切血病忌鐵器與騏
麟竭紫鈔同以能合金瘡如漆粘物故名山
漆以貴重故名金不換試法以末摻豬血中
血化爲水者真葉功效同

○附錄 近傳一種草云是三七春生苗夏高三
四尺葉似菊艾而勁厚有岐尖莖有赤
稜最易繁衍夏秋間開黃花藍如金絲盤紐
可愛而不香花乾成絮如苦蕒絮根葉味甘
治金瘡折傷出血及上下血病甚効根大如
牛蒡根與南中來者不類恐是劉奇奴之屬

○療治

吐血衄血山漆一錢細嚼米湯送下或
以五分入人核湯 赤痢血痢三七三
錢研末米泔水調服卽愈 大腸下血三七
研末同淡白酒調一二錢服三服可愈加五
分入四物湯亦可 婦人血崩方同上 產
後血多山漆研末米湯服一錢 男婦赤眼
十分重者以山漆根磨汁塗四圍甚効 無
名癰疽疼痛不止山漆磨米醋調塗卽散已
破者研末乾塗 虎咬蛇傷山
漆研末米飲服三錢仍嚼塗之

紫苑

一名青苑一名紫倩一名莖苑一名還魂
草一名夜牽牛處處有之以牢山所出根如
北細辛者爲良三月內布地生苗五六月開

花色黃白紫數種結黑子本有白毛根甚柔
 細色紫而柔宛故名二月採根陰乾凡使去
 頭鬚及上東流水洗淨每一兩用蜜二分浸
 一宿火上焙乾今人多以車前旋復根紫土
 染過偽為之紫菀肺病要藥肺本自亡津液
 又服走津液藥為害茲甚不可不慎又有類
 紫菀而有白如練色者名白羊鬚草亦宜辨

○製用

連根葉採之醋浸入少鹽收藏作菜辛
 香號名仙菜鹽不宜多易腐 宋興國

時有任氏色美嫁進士王公輔不遂意鬱久
 面漸黑母家求醫一道人用女真散酒下二
 錢日二服一月如故求其方用女菀黃丹二
 物等分按女菀即白菀一名茆一名女復一
 名織女菀即紫菀之色白者也紫菀入血分
 白菀入氣分肺氣熱則面紫黑清則面白三
 十以後肺氣
 漸減不可服

○療治

肺傷咳嗽紫菀五錢水一盞煎七分溫
 服日三 久嗽不瘥紫菀款冬花各一
 兩百部半兩搗羅為末每服三錢姜三片烏
 梅一個煎湯調下日二甚佳 小兒咳嗽聲
 不出者紫菀末杏仁等分入蜜同研丸茨子
 大每服一九五味子湯化下 吐血咳嗽吐
 血後嗽者紫菀五味炒為末蜜丸茨子大每
 含化一九 纏喉風痺不通欲死者紫菀根

一莖洗淨納入喉中待取惡涎出即瘥神効
更以馬牙硝津嚥之即絕根 婦人小便卒
不得出者紫苑爲末井華水服三
撮即通小便血者服五撮立止

决明

有二種馬蹄决明高三四尺葉大於苜蓿

而本小末奢晝開夜合兩兩相帖秋開淡黃

花五出結角如初生細豇豆長五六寸子數

十粒參差相連狀如馬蹄青綠色入眼藥最

良一種苕苕决明即山扁豆苗莖似馬蹄决

明但葉本小末尖似槐葉夜不合秋開深黃

花五出結角如小指長二寸許子成數列如

黃葵子而扁色褐味甘滑二種苗葉皆可作

酒麴俗呼爲獨占缸苕苕决明嫩苗及花角

子皆可淪爲茹忌入茶馬蹄决明苗角皆韌

苦不可食以能明目得名其子鹹平無毒治

目中諸病助肝益精作枕治頭風明目勝黑

豆有决明處蛇不敢入外有草决明石决明

皆能明目草决明即青葙子又有苕苕另是

一種生道傍葉小於決明炙作飲甚香除痰
止渴令人不睡隋稠禪師採作五色飲進煬
帝者也

○療治

決明爲末水調貼太陽穴治頭痛貼心
胸止鼻衄又消腫毒積年失明決明

子二升爲末食後粥飲服方寸七青盲雀
目決明一升地膚子五兩爲末米飲九梧子
大米飲下二三十九補肝明目決明一升
蔓菁子二升酒五升煮曝乾爲末每服二錢
溫水下日二頭風熱痛及目赤腫痛決明
子炒研茶調傳兩太陽穴乾則易之一夜即
愈癰瘡延蔓決明子一兩爲末入水銀輕
粉少許研不見星擦破上藥立瘥此東坡家

藏方也發背初起草決明生用一升搗生
甘草一兩水三升煮一升分二服大抵血滯
則生瘡肝主藏血決明和肝氣不損元氣也
肝熱風眼赤淚每旦取一匙接淨空心吞
下百日後
夜見物光

半夏

一名水玉一名地文一名守田一名和姑

在處有之齊州者爲良二月生苗一莖莖端
三葉淺綠色似竹葉三三相偶白花圓上生
平澤者名羊眼半夏圓白爲勝五月采則虛
小八月采乃實大陳久更佳氣味辛平有毒

生微寒令人吐熱溫令人下射干柴胡爲之

使忌羊血海藻飴糖惡皂角畏雄黃秦皮龜

甲反烏頭消痰熱滿結咳嗽上氣心下急痛

時氣嘔逆除腹脹目不得瞑白濁夢遺帶下

○修治

洗去皮垢以湯泡浸七日逐日換湯眼乾切片姜汁拌焙入藥或研爲末以姜汁入湯浸澄三日瀝去涎水晒乾用謂之半夏粉或研末以姜汁和作餅子日乾用謂之半夏餅或研末以姜汁白礬湯和作餅楮葉包置籃中待生黃衣日乾用謂之半夏麴白飛霞醫通云痰分之病半夏爲王造而爲麴尤佳治濕痰以姜汁白礬湯和之治風痰以

姜汁及皂莢煮汁和之治火痰以姜汁竹瀝或荆瀝和之治寒痰以姜汁礬湯入白芥子末和之比皆

造麴妙法也

○辨訛

江南半夏大乃徑寸葉似芍藥根下相重上天下小皮黃肉白南人特重之用之始知其異此乃由跋類半夏而苗不同誤以爲半夏也 白傍幾子絕似半夏但咀之微酸不堪入藥

○療治

治不眠干里流水八升揚萬遍取清五升炊以葦薪大沸入秫米一升半夏五合糞一升半飲汁一杯日三以知爲度病新者覆盆則臥汗出則已久者三飲而已 法制半夏清痰化飲壯脾順氣用大半夏湯洗七次焙乾再洗如此七轉以濃米泔浸一日

夜每一兩用白礬一兩半溫水化浸五日焙
 乾以鉛白霜一錢溫水化又浸七日以漿水
 慢火內煮沸焙乾收之每嚼一二粒姜湯下
 紅半夏法消風熱清痰涎降氣利咽大半
 夏湯浸焙制如上法每一兩入龍腦五分硃
 砂為衣染之先鋪燈草一重約一指厚排半
 夏于上再以燈草蓋一指厚以炒豆焙之候
 乾取出每嚼一兩粒溫水下 化痰鎮心祛
 風利膈半夏一斤湯泡七次為末篩過一兩
 入辰砂一錢姜汁打糊丸梧子大每姜湯下
 七十九 消痰開胃去胸膈壅滯半夏洗泡
 焙乾為末自然姜汁和作餅濕紙裹煨香以
 熟水二盞同餅二錢入鹽五分煎一盞服之
 大壓痰毒及酒食傷極驗又方用半夏天南
 星各二兩為末水五升入壘內浸一宿去清
 水焙乾重研每服二錢水二盞姜三片煎服

中焦痰涎利咽清頭目進飲食半夏泡七
 次四兩枯礬一兩為末姜汁打糊或煮棗肉
 和丸梧子大每姜湯下十五丸寒痰加丁香
 五錢熱痰加寒水石煨四兩 老人風痰大
 膈熱不識人肺熱痰實不利半夏炮七次焙
 硝石半兩為末入白麴搗勻水和丸菉豆大
 每姜湯下五十九 膈壅風痰半夏斤酸
 漿浸一宿溫湯洗五十遍去惡氣日乾為末
 漿水搜作餅日乾再研為末每五兩入生龍
 腦一錢以漿水濃脚和丸鷄頭子大紗袋盛
 避風處陰乾每服一丸好茶或薄荷湯嚼下
 搜風化痰定志安神利頭目半夏麴三兩
 天南星炮一兩辰砂枯礬各半兩為末姜汁
 打糊丸梧子大每服三十九食後姜湯下
 痰厥中風半夏湯泡三錢甘草炙一錢防風
 一錢五分姜二十片水二盞煎服 風痰頭

暈嘔逆目眩面青色黃脈弦者生半夏生天
南星寒水石煨各一兩天麻半兩雄黃二錢
小麥麵三兩為末水和成餅水煑浮起漉出
搗丸梧子大每服五十丸姜湯下極効亦治
風痰咳嗽二便不通風痰頭痛 風痰濕痰
半夏一斤天南星半兩各湯泡晒乾為末姜
汁和作餅焙乾入神麴半兩白朮末四兩枳
實末二兩姜汁麵糊丸桐子大每服五十丸
姜湯下 風痰喘逆兀兀欲吐眩暈欲倒半
夏一兩雄黃三錢為末姜汁浸蒸餅丸梧子
大每服三十九姜湯下已吐者加檳榔 風
痰喘急半夏湯洗七個甘草炙皂莢炒各一
寸姜二片水一盞煎七分 服 上焦熱痰
咳嗽制過半夏一兩片黃芩末一錢姜汁打
糊丸綠豆大每服七十九淡姜湯食後服
肺熱痰嗽制半夏梧樓仁各一兩為末姜汁

打糊丸梧子大每服二三十丸白湯下或以
梧樓瓢煑熟丸 熱痰咳嗽煩熱面赤口燥
心痛脈洪數半夏天南星各一兩黃芩一兩
半為末姜汁浸蒸餅丸梧子大每服五七十
丸食後姜湯下 小兒痰熱咳嗽驚悸半夏
南星等分為末牛膽汁和入膽內懸風處待
乾蒸餅丸菴豆大每姜湯下三五丸 濕痰
咳嗽面黃體重嗜臥驚兼食不消脈緩者半
夏南星各一兩白朮一兩半為末薄糊丸梧
子大每服五七十丸姜湯下 氣痰咳嗽面
白氣促酒漸惡寒愁憂不樂脈澹者半夏南
星各一兩官桂半兩為末糊丸梧子大每服
五十九姜湯下 小結胸痛正在心下按之
則痛脈浮者半夏半升黃連一兩梧樓實大
者一個水六升先煮梧樓至三升去滓內二
味煮取二升分三服 濕痰心痛喘急者半

夏油炒為未粥糊丸綠豆大每服二十九姜
湯下 急傷寒病半夏四錢生姜七片酒一
盞煎服 結痰不出語音不清年久者半夏
半兩桂心一字草烏頭半字為末姜汁浸蒸
餅丸芡子大每服一九夜臥含嚙 停痰冷
飲嘔逆半夏水煮熟陳橘皮各一兩每服四
錢生姜七片水二盞煎一盞溫服 停痰留
飲胸膈滿悶氣短惡心飲食不下或吐痰水
半夏泡五兩茯苓三兩每服四錢姜七片水
一鍾半煎七分甚捷徑 支飲作嘔嘔家本
渴不渴者心下有支飲也或似喘不喘似嘔
不嘔似噦不噦心下憤憤半夏泡七次半升
生姜半升水七升煮一升五合分服 噦逆
欲死及痘瘡噦氣方俱同上 嘔噦眩憤穀
不得下半夏一升生姜半升茯苓三兩切水
七升煎一升半溫服 心下悸忪半夏麻黃

等分為末蜜丸小豆大每服三十九日三
傷寒乾嘔半夏熟洗研末生姜湯服一錢七
嘔逆厥逆內有寒痰半夏一升洗滑焙研
小麥麵一升水和作彈丸水煮熟初吞四五
枚日三服稍增至十五枚旋煮旋吞覺病減
再作忌羊肉錫糖 嘔吐反胃半夏三升人
參三兩白蜜一升水一斗二升和揚之一百
二十遍煮取三升半溫服一升日再服亦治
膈間支飲 胃寒噦逆停痰留飲半夏湯泡
炒黃二兩藿香葉一兩丁皮半兩每服四錢
水一盞姜七片煎服 小兒吐瀉脾胃虛寒
齊州半夏泡七次陳粟米各一錢半姜十片
水盞半煎八分溫服 小兒痰吐或風壅所
致或咳嗽發熱飲食即嘔半夏泡七次半兩
丁香一錢以半夏末水和包丁香用麩重包
煨熟去麩為末生姜自然汁和丸麻子大每

服二三十丸陳皮湯下 妊娠嘔吐半夏二
兩人參乾姜各一兩為末姜汁麩糊丸梧子
大每飲服十九日三服 霍亂腹脹半夏桂
等分為末水服方寸匕 小兒腹脹半夏末
少許酒和丸粟米大每服二丸姜湯下不瘥
加之或以火炮研末姜汁調貼臍亦佳 黃
疸喘滿小便自利不可除熱半夏生姜各半
斤水七升煮一升五合分兩服有人氣結而
死心下暖以此少許入口遂活 伏暑引飲
脾胃不利半夏醋煮一斤茯苓半斤生甘草
半斤為末姜汁麩糊丸梧子大每服五十九
熱湯下 老人虛秘冷秘及痲痺冷氣半夏
炮炒主硫黃等分為末自然姜汁煮糊丸梧
子大每空心溫酒下五十九 失血喘急吐
血下血崩中帶下喘急痰嘔中滿宿瘀半夏
搥扁姜汁和麩包煨黃研東米糊丸梧子大

每服三十九白湯下 白濁夢遺半夏二兩
洗十次切破以木香猪苓二兩同炒黃出火
毒去猪苓入煨過牡蠣一兩以山藥糊丸梧
子大每服三十九茯苓湯送下腎氣閉而一
身精氣無所管耳妄行而遺者宜用此方蓋
半夏有利性猪苓導水使腎氣通也與下元
虛憊者不同 八般頭風半夏末入百草霜
少許作紙燃燒烟就鼻內嚙之口中含水有
涎吐去再含見效 少陰咽痛生瘡不能言
語聲不出半夏七枚打碎雞子一枚頭開一
竅去黃納苦酒令小滿入半夏在內以鐵子
坐于炭火上煎三沸去滓置杯中時時嚙之
極驗未瘥更作 喉痺腫塞生半夏末啗鼻
內涎出効 骨哽在咽半夏白芷等分為末
水服方寸匕當嘔出忌羊肉 重舌木舌脹
大塞口半夏煎醋含漱之又方半夏二十枚

羊芳譜 卷三 藥譜 三

水煮過再泡片時乘熱以酒一升浸之密封
 良久熱漱冷吐之 小兒 陷乃冷也水調
 半夏末塗足心 面上黑氣半夏焙研米醋
 調敷不可見風不計遍敷從早至晚如此三
 日皂角湯洗下面瑩如玉 癩風眉落生半
 夏羊屎燒焦等分為末自然姜汁日調塗
 盤腸生產子腸不收者半夏末頻嚙鼻中則
 上 產後暈絕半夏末冷水和丸大豆大納
 入鼻中即愈 小兒驚風生半夏一錢皂角
 半錢為末吹少許入鼻即甦 卒死不寤半
 夏末吹鼻中即活 五絕急病一曰自縊二
 曰墻壓三曰溺水四曰鬼魅五曰產乳並以
 半夏末納豆大一丸入鼻中心溫者一日可
 活 癰疽發背及乳瘡半夏末雞子白調塗
 之 吹乳腫痛半夏一個煨研酒照立愈一
 方以末隨左右嚙鼻効 打撲瘀痕水調半

夏末塗之一宿即沒 遠行足跣方同上
 金亦不入骨脈中者半夏白蘇等分為末
 酒服方寸匕日三服二十日自出 飛虫入
 耳生半夏末麻油調塗耳門外 蝎蟻螫人
 半夏末水調塗之立止 蝎瘻五孔相通者
 半夏末水調塗之日二 咽喉骨鯁半夏白
 芷等分為末水服方
 寸七當嘔出忌羊肉

葶生

一名草金鈴一名益甌草一名狗耳草一

名白丑黑丑蔓生有黑白二種處處有之黑
 者尤多二月種子生苗作藤蔓遶籬墻高者
 二三丈蔓有白毛斷之有白汁葉青三尖如

楓葉花不作瓣如旋花而大碧色其實有蒂
果之生青枯白核與棠棣子核相似但深黑
耳白者蔓微紅無毛有柔刺斷之有濃汁葉
團有斜尖並如山藥莖葉花淺碧帶紅色核
白色稍粗其嫩實蜜煎為果名天茄氣味苦
寒有毒治水氣在肺喘滿腫脹下焦鬱遏腰
背脹腫大腸風秘氣秘卓有殊功但病在血
分及脾胃虛弱而痞滿者則不可取快一時

及當服致傷元氣

○修治

凡採得子晒乾水淘去浮者再晒拌酒
蒸從已至未晒乾收之臨用春去黑皮
今多以碾取頭末去皮麩
不用亦有半生半熟用者

○療治

搜風通滯牽牛子以重尿浸一宿長流
水上洗半日生絹袋盛掛風處令乾每
日鹽湯下三十粒極能搜風亦消虛腫久服
令人體清瘦三焦壅塞胸膈不快頭昏目
眩涕唾痰涎精神不爽利膈凡用牽牛子四
兩半生半炒不蛀皂莢酥炙二兩為末生姜
自然汁煮糊和丸梧子大每服二十九荆芥
湯下一切積氣宿食不消黑牽牛頭末四
兩蘿蔔剉空安末蓋定紙封蒸熟取出入白
豆蔻末一錢搗丸梧子大每服一二十九白

湯下 男婦五般積氣成聚用黑牽牛一斤
生搗末八兩餘滓以新瓦炒香再搗取四兩
煉蜜丸梧子大至重者三五丸陳皮生姜煎
湯臥時服半夜未動再服三十九丸當下積聚
之物尋常行氣每服十九丸甚効 胸膈食積
牽牛末一兩巴豆霜三箇研末水丸梧子大
每服二三十丸食後隨所傷湯下 追虫取
積方同上酒下亦消水腫 腎氣作痛黑曰
牽牛等分炒為末每服三錢用猪腰子切縫
入茴香百粒川椒五十粒摻牽牛末入內扎
定紙包煨熟空心食之酒下取出惡物効
傷寒結胸心腹硬痛用牽牛頭末一錢白糖
化湯凋下 大便不通牽牛子半生半熟為
末每服二錢姜湯下未通再以茶服一方加
大黃等分一方加檳榔等分 大腸風秘結
瀉牽牛子微炒搗頭末一兩桃仁去皮尖麩

炒半兩為末熟蜜丸梧子大每湯服三十九
水蠱脹滿白黑牽牛各取頭末二錢大麥
麵四兩和作燒餅臥時烙熟食之以茶下降
氣為驗 諸水飲病張子和云病水之人如
長川泛溢非杯杓可取必以神禹決水之法
治之故名禹功散用黑牽牛頭末四兩茴香
一兩炒為末每服一二錢以生姜自然汁調
下當轉下氣也 陰水陽水黑牽牛頭末三
兩大黃末三兩陳米飯鍋糕一兩為末糊丸
梧子大每服五十九丸姜湯下欲利服百丸
水腫尿瀉牽牛末每服方寸七以小便利為
度 濕氣中滿足脛微腫小便不利氣急欬
嗽黑牽牛末一兩厚朴製半兩為末每服二
錢姜湯下或臨時水丸每棗湯下三十九丸
水氣浮腫氣促坐臥不得牽牛子二兩微炒
搗末以烏牛尿浸一宿平旦入葱白一握煎

十餘沸空心分二服水從小便中出 風毒
 脚氣捻之沒指者牽牛子搗末蜜丸小豆大
 每服五丸生姜湯下取小便利乃止亦可吞
 之 小兒腫病大小便不利黑白牽牛各二
 兩炒取頭末并華水和丸菴豆大每服二十
 丸蘿蔔子湯下 小兒腹脹水氣流腫膀胱
 實熱小便赤澇牽牛生研一錢青皮湯空心
 下一加木香減半丸服 疝氣浮腫常服自
 消黑白牽牛各半生半炒取末陳皮青皮等
 分爲末糊丸菴豆大三歲兒服二十九米湯
 下 疝氣攻腎耳聾陰腫牽牛末一錢豬腰
 子半個去膜薄切摻入內加少鹽濕紙包煨
 空心食 小兒雀目牽牛子末每以一錢用
 羊肝一片同麩作角子二個炙熟食米飲下
 風熱赤眼白牽牛末以葱白煮研丸菴豆
 大每服五丸葱湯下服訖睡半時 面上風

子黑色正
 如揀小核

刺黑牽牛酒浸三宿爲末先以姜汁擦面後
 用藥塗之 面上粉刺癩子如米粉黑牽牛
 末對入面脂藥中日日洗之 面上雀斑黑
 牽牛末鷄子清調夜傳旦洗 小兒急驚肺
 脹喘滿胸高氣急脇縮鼻張悶亂欬嗽煩渴
 痰潮聲啞俗名馬脚風不急治死在旦夕白
 黑牽牛半生半炒大黃煨檳榔各取末一錢
 每用五分蜜湯調下痰盛加輕粉一字各牛
 黃奪命散 小兒夜啼黑牽牛末一錢水調
 傳臍上即止 臨月滑胎牽牛子一兩赤土
 少許研末覺胎轉痛時白榆皮煎湯下一錢
 小便血淋牽牛子二兩半生半炒爲末每
 服二錢姜湯下良久熟茶服之 腸風瀉血
 牽牛五兩牙皂三兩水浸三日去皂以酒一
 升煮乾焙研末蜜丸梧子大每服七丸空心
 酒下日三服下出黃物不妨病減後日服五

九米飲下 痔漏有蟲黑白牽牛各一兩炒
為末以猪肉四兩切碎炒熟蘸末食盡以白
米飯三匙壓之取下白虫為効 又方白牽
牛頭末四兩沒藥一錢為細末欲服藥時先
日勿夜飲次早空心將猪肉四兩炙切片蘸
末細細嚼食取下膿血為効量人加減忌酒
食油膩三日 漏瘡水溢乃腎虛也牽牛末
二錢半入切開猪腎中竹葉包定煨熟空心
食温酒下 濕熱頭痛黑牽牛七粒砂仁一
粒研末并華水調汁仰灌鼻中待涎出即愈

借腎入腎
惡水既泄
不復淋漓

○典故

李時珍云一宗室夫人平生苦腸結旬
日一行甚於生產服養血潤燥藥則泥
膈服稍黃通利藥若罔知如此三十餘年時
珍脈其人体肥膏梁而中多鬱日吐酸痰益
許乃寬又多火病此三焦之氣壅滯有升無
降津液皆化為痰飲不能下滋臟腑非血燥

此也潤劑留滯硝血徒入血分不能通氣俱
為痰阻故無効乃用牽牛末皂角膏丸與服
即便通利精爽能食蓋牽牛走氣分通三焦
氣順則痰逐飲消上下通利矣 柳喬素多
酒色病下極脹痛二便不通不能坐臥立哭
呻吟者七晝夜用通利藥不効予思此濕熱
之邪壅脹精道在二陰之間故前阻小便後
阻大便病不在太陽膀胱也乃用揀實茴香
穿山甲諸藥牽牛加倍水煎一服而減三服
而平牽牛能達右腎命門走精道惟李明之
知之故其治下焦陽虛天真丹用之深得補
瀉兼施之妙 治脾濕太過通身浮腫喘不
得臥腹脹如鼓海金沙散亦以牽牛為君

景天

一名慎火一名戒火一名護火草一名辟

火人多種於石山上二月生苗脆莖微帶黃
赤色高一二尺折之有汁葉淡綠色光澤柔
厚狀似長匙頭及胡豆葉而不尖夏開小白
花結實如連翹而小中有黑子如粟其葉味
苦平無毒治大熱火瘡諸蟲寒熱療金瘡止
血除熱狂赤眼頭痛寒熱游風女人帶下可
煨硃砂苗葉花並可用葉煮熟水淘可食南
北皆有人家多種於中庭或盆栽置屋上以

防火極易生折枝置土中澆灌旬日便活

○附錄

廣州有慎火樹大三
四圍卽景天也

不詳

○療治

驚風煩熱慎火草煎水浴之 小兒中
風汗出一日頭項腰熱二日手足不屈

用慎火草半兩麻黃丹參白朮各二錢半爲
末每半錢漿水調服三四歲服一錢 嬰孺
風疹在皮膚不出及熱瘡丹毒慎火苗葉五
大兩和鹽三大兩同鹽絞汁以熱手摩塗日
再 熱毒丹瘡慎火草搗汁拭之日夜一二
十遍一方入苦酒搗泥塗之 烟火丹毒從
兩股兩脇起赤如火景天草旨 珠末一兩搗
如泥塗之乾則易 漆瘡作癢 援慎火草塗
之 眼生花翳澀痛難開景天草搗汁日點
三五次 產後陰脫慎火草一斤陰乾酒五

升煮一升
分四服

穀精草

一名文星草 一名戴星草 一名流星草

叢生處處有之收穀後生荒田中穀之餘氣也葉似嫩穀秧抽細莖高四五寸莖頭有小白花點點如亂星九月採花陰乾辛溫無毒治頭風痛目盲翳膜痘後生翳目中諸病加而用之良明目退翳功在菊花上餒馬令肥主虫顙毛焦病又有一種莖硬長有節根微

赤出秦隴

○療治

偏正頭痛穀精草一兩為末白麩糊調攤紙上貼痛處乾換又穀精草末銅綠各一錢硝石半分隨左右啞鼻鼻衄不止穀精草末二錢熟麩湯服目中翳膜穀精草防風等分為末米飲服甚効痘後目翳癰澀多淚穀精草為末柿或猪肝片蘸食一方加蛤粉等分入猪肝內煮熟日食之小兒雀盲羯羊肝一具不見水竹刀割開入穀精草一撮瓦礮煮熟日食屢効忌鐵器炙熱作丸每茶下三十九小兒中暑吐瀉煩渴燒存性器覆候冷為末米飲服半錢

菝葜

處處有之夏生苗莖中空有節色或赤或

菝亦作癩牛蝨也

菝音甲

白葉如瓠葉凡五尖夏秋間極中抽出花穗
纍纍黃色每枝結實數十顆上有軟刺如蝟
毛一顆三四子熟時破殼子大半指皮有白
黑紋亦有白紫紋者形微長而末員頭上小
白點遠視之儼如牛蠅皮中有仁色嬌白甘
辛平有毒氣味頗近巴豆善走能利人通諸
竅經絡下水氣治偏風失音口禁口目喎邪
頭風七竅諸病止諸痛消腫追膿拔毒催生

下胞衣下有形諸物無刺者良有刺者毒此
藥外用屢奏奇功但內服不可輕易凡服蓖
麻終身不得食炒豆犯之脹死其油服丹砂
粉霜或言搗膏以筋點六畜舌根下卽不能
食點肛內卽下血死今北方人種之田邊牛
馬過者不食其毒可知

○修治 凡使以鹽湯煮半日去皮取仁研用
取油仁五升搗爛水一斗煮沫起撇取
待沫盡去水將沫熬至點燈不炸滴
水不散爲度可和印色及油紙用

○辨訛博落廻

生江南山合莖葉如菀麻莖空吹之作聲謂之有黃汁大毒不

可入口藥人立死治惡瘡癭瘰癧肉瘡瘻白癩風蠱毒溪毒精魅此藥和百丈青雞桑灰

等分爲末傳之蠱毒精魅當別有法黑天亦利子似菀麻綠在

兩頭尖有毒

○療治

半身不遂失音不語取菀麻油一升酒一斗銅鍋盛油着酒中一日煑之令熟

細細服之口目喎斜菀麻子仁搗膏左貼右右貼左卽正一方菀麻子仁七七粒研作

餅右喎安左手心左喎安右手心以銅盂盛熱水坐藥上冷卽換五六次卽正一方用菀

麻子仁七七粒巴豆十九粒射香五分作餅如上用風氣頭痛不可忍者乳香菀麻仁

等分搗餅隨左右貼太陽穴解髮出氣甚驗又方用菀麻油紙剪花貼太陽亦效又方菀

麻仁半兩棗肉十五枚搗塗紙上捲筒插入鼻中下清涕卽止八種頭風菀麻子剛子

各四十九粒去殼雀腦考一大塊搗如泥糊丸彈子大線穿掛風處陰乾用時先將好茶

調成膏子塗蓋內後將炭火燒前藥烟起以蓋覆之待烟盡以百沸葱湯點蓋內茶藥服

之後以綿被裹頭臥汗出避風鼻塞不通菀麻子二三百粒大棗去皮一枚搗勻綿裹

塞之一日一易三十日聞香臭小兒疳疾及諸病後天柱骨倒乃體虛所致宜生筋散

貼之木鱉子六個去殼菀麻子六十粒去殼研勻先包頭擦項上令熱以津調藥貼之

舌上出血菀麻仁油紙燃燒烟薰鼻中自止舌脹塞口菀麻仁四十粒去殼研油塗紙

上作熬燒烟薰之未退再薰以愈為度有人
舌腫出口外一村人用此法而愈 急喉痺
塞牙關緊急不通用此即破蓖麻子仁研爛
紙卷作筒燒烟薰吸即通或只用油作熬左
妙 咽中瘡腫蓖麻子仁一枚杵硝一錢同
研新汲水服之連進二三服効 水氣脹滿
蓖麻子仁研水三合清且一頓服盡日中當
下青黃水或云壯人止可服五粒 脚氣作
痛蓖麻仁七粒研爛同蘇合香丸貼足心癰
即止 小便不通蓖麻仁三粒研細入紙捲
內插入莖中即通 齁喘咳嗽蓖麻仁炒熟
揀甜者食之須多服見効終身不可食炒豆
催生下胞蓖麻仁七粒研膏塗足心若胎
及衣下便速洗去不爾則子腸出即以此膏
塗頂則腸自入 產難取蓖麻子十四枚每
手各把七枚須臾立下 子宮脫下蓖麻仁

枯礬等分為末安紙上托入仍以蓖麻子仁
十四枚研膏塗頂心即入 盤腸生產塗頂
方同上 催生下胎不拘生死胎蓖麻二個
巴豆一個麝香一分研貼臍中并足心一方
催生一月一粒溫酒吞下 一切毒腫痛不
可忍蓖麻子仁搗傅即止 癩風鼻塌手指
攣曲節間痛不可忍漸至斷落蓖麻子一兩
去皮黃連一兩剉豆大以小瓶入水一升同
浸春夏二日秋冬五日後取蓖麻子一枚劈
破面東以浸藥水吞之漸加至四五枚微利
不妨瓶中水盡更添兩月後喫大蒜猪肉試
之如不發是効也若發動再服直候不發乃
止 小兒丹瘤蓖麻子五個去皮研入麵一
匙水調塗之甚効 瘰癧結核蓖麻子炒去
皮每睡時服二三枚取効一生不可食炒豆
瘰癧惡瘡及軟瘤白膠香一兩瓦器溶化

去滓蓖麻子六十四個去殼研膏溶膠投之
 攪勻入油半匙頭至點水中試軟硬添減膠
 油得所以緋帛量瘡大小攤貼一膏可治三
 五癩 肺風面瘡起白屑或微有赤瘡用蓖
 麻子仁四十九粒白果膠棗各三粒瓦松三
 錢肥皂一個搗為丸洗面用之良 面上雀
 斑蓖麻子仁蜜陀僧硫黃各一錢為末用羊
 髓和勻夜夜傅之 髮黃不黑蓖麻子仁香
 油煎焦去滓三日後頻刷之 耳卒聾閉蓖
 麻仁一百大棗十五枚搗爛入乳小兒乳汁
 和丸作挺每以綿裹一枚塞之覺耳中熱為
 度一日一易二十日瘥 湯火灼傷蓖麻仁
 蛤粉等分研膏湯傷以油調火灼以水調塗
 鍼刺入肉蓖麻仁一兩先以帛襯傷處敷
 之頻看若見刺出即拔去恐藥緊努出好肉
 或加白梅肉同研尤好 竹木骨鯁蓖麻仁

一兩凝水石二兩研勻每以一捻置舌根嚼
 嚥自然不見又方蓖麻油紅麩等分研細沙
 糖凡皂子大綿裹含嚥痰出大良 雞魚骨
 鯁蓖麻仁百藥煎研勻彈子大井花水化下
 半丸即下 惡犬咬傷蓖麻仁五十粒井花
 研膏先以鹽水洗痛處貼之 駒喘痰嗽用
 九尖蓖麻葉三錢入飛過白礬二錢以猪肉
 四兩薄批摻藥在內荷葉裹之文武火煨熟
 細嚼白湯送下 欬嗽涎喘不問年深日近
 用經霜蓖麻葉經霜桑葉御米殼蜜炒各一
 兩為末蜜丸彈子大每服
 一丸白湯化下日一服

○典故

一人病偏風手足不舉用此油及羊脂
 麝香鯪鯉甲等煎作摩膏日摩數次月
 餘漸復兼服搜風化痰養血之劑三月而愈
 一人病手臂上一塊腫痛蓖麻仁搗膏貼

君之... 卷三
之一夜愈 一人病氣鬱偏頭痛菀麻仁同
乳香食鹽搗爛太陽穴一夜愈 一婦產後
子腸不收搗仁貼
丹田一夜而上

王瓜

一名土瓜 一名野甜瓜 一名馬爬瓜 一名

赤雹子 一名老鴉瓜 一名師姑草 一名公公

其實似瓜
或云根味
如瓜作上
氣故名

鬚月令四月王瓜生即此四月生苗其蔓多
鬚嫩時可茹葉圓如馬蹄而有尖面青背淡
澀而不光五六月開小黃花花下結子如彈
丸徑寸長寸餘上微圓下尖長生青七八月

熟赤紅色皮粗澀根如栝樓根之小者用須
深掘二三尺乃得正根江西人栽以沃土取
根作蔬食如山藥南北二種微有不同若療
黃疸破血南者大勝

○根 苦平無毒治天行熱疾酒黃心胸煩熱消
瘀血破癥瘕利大小便治面黑面瘡落胎
子 酸苦平無毒生用潤心肺治黃病炒用治
肺痿吐血腸風瀉血赤白痢反胃吐食

○療治 小兒發黃土瓜根生搗汁三合與服不
過二次 黃疸變黑醫所不能治用土
瓜根汁平旦溫服一小升午刻黃水當從小
便出不出再服 小便如泔乃腎虛也用王

瓜根一兩白石脂二兩兔絲子酒浸二兩桂名王瓜散
心一兩牡蠣粉一兩為末每服二錢大麥粥
飲下 小便不通土瓜根搗汁入少水解之
筒吹入下部 大便不通上方吹入肛門內
二便不通前後吹之取通 乳汁不下土瓜
根為末酒服一錢一日二服 經水不利帶
下小腹滿或經一月再見及婦人陰癩土瓜各土瓜根
根芍藥桂枝麝蟲各三兩為末酒服方寸七散
日三服 一切漏疾土瓜根搗敷之燥則易
中諸蠱毒土瓜根大如指長三寸切以酒
半升漬三宿服當吐下 面上癬瘡土瓜根
搗末漿水和勻入夜別以漿水洗面塗藥且
復洗之百日光彩射人管用有效 耳聾濕
土瓜根削半寸塞耳內以艾灸七壯每旬一
灸愈乃止 消渴飲水爬瓜去皮每食後嚼
二三兩五七度瘥 傳尸勞瘵王瓜焙為末

每酒服一錢入好棗肉平胃散末二錢酒服
食即可下即野甜瓜北方多有之 痰熱頭
風懸栝樓一個赤雹兒七個焙牛旁子焙四
兩為末每食後茶或酒服三錢忌動風發熱
之物 筋骨痛攣馬雹兒子炒開口為末酒
服一錢日二服 赤目痛瀉不可忍土瓜瓢
九月十月采日乾槐花炒赤芍藥等分為末
每服二錢臨臥溫酒下 瘀血作痛赤雹兒
燒存性研末無灰酒空心服二錢 大腸下
血王瓜一兩燒存性地黃二兩黃連半兩為
末蜜丸桐子大 米飲下三十九

麻黃

一名龍沙一名卑相一名卑鹽近汴京多
有之以出榮陽中牟者為勝春生苗至五月

則長及一尺稍上開黃花結實如皂角子味甜微有麻黃氣外皮黃裏仁黑根皮色赤黃長者近尺俗說有雌雄二種雌者三四月開花六月結子雄者無花不結子微苦而辛性熱而輕揚治中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗去邪熱止欬逆除寒熱破癥瘕去營中寒邪泄衛中風熱療傷寒解肌第一藥也過用洩真氣

○修治

立秋後收莖陰乾去節及根水煮十餘沸竹片掠去沫沫令人煩節能止汗

○製用

服麻黃自汗不止冷水浸髮仍用撲法即止凡服麻黃須避風一日不爾病

復作須佐以黃芩無赤眼之患

○療治

天行熱病初起一二日者麻黃一大兩去節水四升煮去沫取二升去滓着米

一匙及鼓為稀粥先以湯浴後乃食粥厚覆取汗即愈傷寒雪煎麻黃十斤去節杏仁四升去皮熬大黃一斤十二兩先以雪水五碩四斗漬麻黃於東向竈釜中三宿後納大黃攪勻桑薪煮至二碩去滓納杏仁同煮至六七斗絞去滓置銅器中更以雪水三斗合煎至二斗四升藥成丸如彈子大有病者以沸白湯五合研一丸服之立汗出不愈再服

一丸封藥勿令洩氣 傷寒黃疸表熱者麻
黃醇酒湯主之麻黃一把去節綿裹美酒五
升煮至半升頓服取小汗春月用水煎 裏
水黃腫一身及目黃腫其脉沉小便不利甘
草麻黃湯主之麻黃四兩水五升煮去沫入
甘草二兩煮取三升每服一升重覆汗出不
汗再服慎風寒有患氣急不瘥變成水病從
腰以上腫者宜此發其汗 水腫脉沉屬少
陰其脉浮者為氣虛脹者為氣實非水也麻
黃附子湯汗之麻黃三兩水七升煮去沫入
甘草二兩附子炮一枚煮取二升半每服八
分日三服取汗 風痺冷痛麻黃去根五兩
桂心二兩為末酒二升慢火熬如錫每服一
匙熱酒調下汗出為度避風 小兒慢脾風
因吐瀉後而成麻黃長五寸十個去節白朮
指面大二塊全喝二個生薄荷葉包帳為末

二歲以下一字三歲以上半錢薄荷湯下
產後腹痛及血下不盡麻黃去節為末酒服
方寸七一日二三服血下盡即止 心下悸
病半夏麻黃等分末之煉蜜丸小豆大每飲
服三九日三服 痘瘡倒靨鄴州麻黃去節
半兩蜜一匙同炒良久水半升煎數沸去沫
再煎去三分之一去滓乘熱服之避風其瘡
復出也一法用無灰酒煎其効更速仙源縣
李用之子病斑瘡風寒倒靨已困用此一服
便出如神 中風諸病麻黃一斤去根以王
相日乙卯日取東流水三石三斗淨鑊盛五
七斗先煮五沸掠去沫逐漸添水盡至三五
斗去麻黃澄定濾去滓取清再熬至一斗再
澄再濾取汁再熬至升半為度密封收之一
二年不妨每服一二匙熱湯化下取汗熬時
要攪勿令着底恐焦仍忌雞犬陰人見此秘

方也 盜汗陰汗不止麻黃根椒目等分爲末每服一錢無灰酒下外用麻黃根牡蠣故蒲扇灰爲末以乳服三分日三服仍以乾姜三分同麻黃根三分爲末撲之 諸虛自汗夜臥卽甚久則枯瘦黃芪麻黃根各一兩牡蠣米泔浸洗煨過爲散每服五錢水二盞小麥百粒煎服 又方麻黃根黃芪等分爲末飛麩糊作丸梧子大每用浮麥湯下百丸以止爲度 產後虛汗黃芪當歸各一兩麻黃根二兩每服一兩煎湯下 陰囊濕瘡腎有勞熱麻黃根石硫黃各一兩米粉一合爲末敷之 內外障翳麻黃根一兩當歸身一錢同炒黑入射香小許爲末噓鼻頻用皆効

○典故 李時珍云一婦自腰以下脹腫面目亦腫喘急欲死不能伏枕大便溏泄小便

短少服藥罔効予診其脈沉大沉主水大主虛乃病後冒風所致名風水用千金神祕湯加麻黃一服喘定十之五再以胃冷湯吞深師齋木丸二日小便長腫消十之七調理數日全愈

香薷 一名香菜 一名香茸 一名香菜 一名蜜蜂

草有野生者有家蒔者方莖尖葉有刻缺似黃荊葉而小九月開紫花成穗有細子沐浴作圃種之暑月作蔬生茹十月采取乾之氣味辛微溫無毒下氣除煩熱療嘔逆冷氣脚

氣寒熱

○修治 八九月開花著穗時采取去根苗葉陰乾勿犯火氣服至十兩一生不得食白

桃山

○製用

世醫治暑病以香薷飲為首藥不知中暑有頭痛發熱惡寒煩燥口渴或瀉或吐或霍亂者宜用有大熱大渴汗泄如雨煩燥喘促或瀉或吐乃勞倦內傷之症宜瀉火益元若用香薷是重虛其表而益之熱矣

○療治

香薷飲治暑月臥濕當風或生冷不節真邪相干便致吐利或發熱頭痛體痛或心腹痛或轉筋或乾嘔或四肢逆冷或煩悶欲死香薷二錢五分厚朴姜汁炙白扁豆

微炒各一錢三分水二盞酒半盞煎一盞水中沉冷連進二服立効活人書香薷二錢八分厚朴一錢四分黃連七分姜汁同炒黃色用水病紅腫乾香薷五十斤剉入釜中水淹過三寸煮使氣力都盡去滓澄之微火煎至可丸九梧子大一日五九日三服日漸增之小便利則愈 暴水風水氣水通身皆腫服至小便利為効香薷葉一斤水一斗熬極爛去滓再熬成膏加白朮末七兩和丸梧子大每服十九米飲下日五夜一服 四時傷寒不正之氣用水香薷為末熱酒調服一二錢取汗 心煩脇痛連胸欲死者香薷搗汁一二升服 鼻衄不止香薷研末水服一錢舌上出血如鑽孔者香薷煎汁服一升口三服 口中臭氣香薷一把煎汁含之 小兒髮遲陳香薷二兩水一盞煎三分入猪脂

半兩和勻日日塗之
白禿
橡痛上方入胡粉和塗之

紫蘇

一名赤蘇一名桂荏又一種白蘇皆二三

月下種或宿子在地自生莖方葉圓而有尖
四圍有鉅齒肥地者面背皆紫瘠地背紫面
青其面背皆白即白蘇也五六月連根收採
以火煨其根陰乾則經久葉不落八月開細
紫花成穗作房如荊芥穗九月半枯時收子
子細如芥子而色黃赤莖葉子俱辛溫無毒

氣辛入氣分色紫入血分解肌發表行氣寬

中消痰利肺和血溫中止痛定喘開胃安胎

散風寒解魚蠃毒治蛇犬傷為近世要藥

○製用

葉生採作羹殺一切魚肉毒嫩時採葉
和蔬茹之或塩及梅瀹作菹食甚香夏

月作熟湯飲 田畔近道可種蘇以避六畜

收子打油燃燈甚明亦可蒸之油物 蘇

子油能柔五金入石 子與葉

同功發散風氣用葉清和上下用子 香紫

蘇採蘇嫩心長三寸許勿見水約三斤用塩

二兩醃一宿梅瀹浸三日晒乾入甘草甘松

白芷木拌勻摻收之 製細酸紫蘇葉同菱

白青梅作絲入白糖曝乾細酸平時取咀嚙

之利瘦結消五品 雲南紫蘇頭葉入梅醬
醃一日取出用糖浸可作佳蔬其子醋浸甚
爽酒 白蘇子乾收炒熟最香入糖
煎拌芝蔴均為佳品 **俱宋氏種補書** **禁忌** 宋
宗命翰林院定湯飲以紫蘇熱水為第一取
其能下胸膈浮氣也不知久則傷人真氣

○療治

感寒上氣蘇葉三兩橘皮四兩酒四升
煮一升半分二服 傷寒氣喘蘇一把
水二升煮一升徐徐飲之 勞復食復欲死
蘇葉煮汁二升入生姜豆豉同煮飲 卒咤
不止香蘇濃煮頓服三升良 霍亂脹滿未
得吐下生蘇搗汁飲之佳乾蘇煮汁亦可
諸失血病紫蘇不限多少入大鍋內水煎令
乾去滓熬膏以炒熟赤豆為末和九桐子大
每酒下三五十九常服 金瘡出血嫩紫蘇
葉桑葉同搗貼 跌撲損傷紫蘇搗敷瘡口

自合 傷損血出不止陳紫蘇葉煎所出血

按爛敷之血不作膿且愈後無痕 風狗咬

傷紫蘇葉嚼敷之 蛇虺傷人紫蘇葉搗飲

食蟹中毒紫蘇煮汁飲子亦可 飛絲入

自令人舌上生泡紫蘇葉嚼爛白湯下 乳

癰腫痛紫蘇煎湯頓服并搗封之 欬逆短

氣紫蘇莖葉二錢人參一錢水一鍾煎服子

研汁粳米煮粥亦可 順氣利腸紫蘇子麻

子仁等分研爛水濾取汁同米煮粥食 順

氣利腸寬中紫蘇子一升微炒杵以生絹袋

盛于三斗清酒中浸三宿少少飲之 一切

冷氣及風濕脚氣紫蘇子高良姜橘皮等分

蜜丸梧子大每服十九空酒下 風寒濕

痺四肢攣急脚腫不可踐地紫蘇子二兩杵

碎水三升研取汁煮粳米二合作粥和葱椒

姜豉食 消渴變水服此令水從小便出紫

拔蘭音
跋活

薄荷

一名菘蘭一名蕃荷菜一名南荷一名吳

南薄荷以
別胡薄荷

蘇子蘿蔔子各炒三兩為末每服二錢桑根
白皮煎湯服日三 夢中失精蘇子一升炒
研末酒服方寸七日再 瀉血欲死雞蘇煮
汁一升服 吐血下血雞蘇莖葉煎湯飲

菘蘭一名金錢薄荷二月宿根生苗清明前

後分栽方莖赤色葉對生初生形長而頭圓

及長則尖人家多栽之吳越川湖多以代茶

蘇州以產儒學前者為佳辛溫無毒利咽喉

口齒諸病治癩癧瘡疥風瘙癢疹去舌胎語

澀止衄血塗蜂螫蛇傷療小兒驚熱

○收採

凡收薄荷須隔夜以糞水澆之雨後刈
收則性涼不爾不涼野生者莖葉氣味

大畧
相似

○製用

可生食同薤作羹相宜病薄荷勿食令
人虛汗不止瘦弱人久食動消渴病

○療治

清上化痰利咽膈治風熱新瘥末煉蜜
丸茨子大每噲一丸白沙糖和之亦可

風氣癢痒薄荷蟬蛻等分為末每溫酒調

服一錢 舌胎語塞薄荷自然汁和白蜜姜

汁擦之 眼弦赤爛薄荷以生薑汁浸一宿

晒乾為末每用一錢沸湯泡洗 癩癧結核

已破未破新薄荷二斤取汁皂莢一挺水浸

去皮搗取汁銀石器內熬膏入連翹末半兩

連白青皮陳皮黑牽牛半生半炒各一兩皂
莢仁一兩半同搗和丸梧子大每服三十丸
連翹湯下 衄血不止薄荷汁滴之或以乾
者水煮綿裹塞鼻 血痢不止薄荷葉煎湯
常服 水入耳中薄荷汁滴入立効 蜂蠆
螫傷薄荷葉搗貼之 因灸火火氣入內兩
股生瘡汁水淋漓者
薄荷煎汁頻塗立愈

○麗藻詩七言

薄荷花開蝶翅翻風枝露葉弄秋
妍自憐不及狸奴點爛醉籬邊

不用錢 一枝香草出幽叢雙蝶紛飛戲晚
風莫恨村居相識晚知名元向楚辭中

澤蘭

一名虎蘭 一名水香 一名都梁香 一名龍
棗 一名虎蒲 一名風藥 一名孩兒菊 生下濕

地二月生苗一出土便分枝梗葉生如薄荷
微香七月開花紫白色亦似薄荷花此草可
煎油及作浴湯人家多種之氣香而温味辛
而散治水腫塗癰毒破瘀血消癥瘕為婦人
要藥

○修治

凡用取葉細剉絹袋盛
掛不見日處令乾用

○療治

產後血虛浮腫防已等分為末每服二
錢醋湯下 小兒疳瘕嚼澤蘭心封之
良 瘡腫初起及損傷瘀腫澤蘭搗汁封之
良 產後及陰戶燥熱遂成翻花澤蘭四兩

煎湯薰洗三三次再
入枯礬煎洗即安

大風子

出海南諸蕃國生大樹狀如椰子而圓

中有核數十枚大如雷丸子中有仁白色久

則黃而油不堪入藥大風仁辛熱有毒其油

治瘡有殺虫之功不可多服或至喪明用之

外塗功不可沒

○製用

大風子二三斤去殼及黃油者研極爛
盛磁器中封口嚴勿泄氣入滾湯蓋鍋

嚴文武火煎黑色如
膏各大風油聽用

○療治

大風諸癩大風油一兩苦參末三兩入
少酒糊丸桐子大空心溫酒下五十九

仍以苦參湯洗大風瘡裂大風子澆存性
和麻油輕粉研塗以殼煎湯洗楊梅瘡治同

風刺赤鼻大風子仁木鱉子仁輕粉硫黃
為末夜夜津調塗之手背皴裂大風子搗

泥塗之

二如亭群芳譜藥部卷三終

