




100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



和漢二才圖會卷第九十二之本日錄

草類



△按凡草始生曰苗音渺而勃萌出曰芽音牙而枝葉豐盛曰茂音懋而訓花下梢曰萼音誇俗云含實曰繩音孕而訓俗云花乃之介流此知周禮注曰交其繩則實不成又綴實底曰帶音帶而訓帶應劭曰木實曰果草實曰蓏音裸而訓蓏又有核曰果無核曰蓏時珍曰天造地化而草木生焉剛柔于柔而成根荄柔交于剛而成枝榦葉革屬陽華實屬陰由是草中有木木中有草得氣之粹者爲良得氣之戾者爲毒故有五形金木土五氣香臭臊五色青赤黃五味酸苦甘五性寒熱溫五用升降浮沉中神農嘗而辨之黃帝述而著之

神農本草經一百六十四種漢魏唐宋良醫代有增益除穀菜外得草屬之可供醫藥者六百十十種分類

日山曰芳曰濕曰毒曰葛曰水曰白苔  
本草綱目所載亦如有名宋用之類省之而不出  
三才圖會農政全書畫譜所載者兼本朝所見者出之  
然未攻其功能者唯記形狀而已

## 藥品

凡諸藥多用草故字从艸今金石木土之劑皆爲藥而  
草木根梢收採惟宜秋末春初則津潤始萌未充  
枝葉秋末則氣汁下降悉歸本根該日賣藥者兩眼用  
藥者一眼服藥者無眼非虛語也鑒不能識藥惟聽市  
人市人又不辨究皆委採送之家傳習造作真僞好惡  
並皆莫測

鐘乳醋煮令白 細辛水漬使直  
當歸酒洒取潤 蟭蟟朱足令赤  
以斬羌亂人參 用木通混防已

黃芪蜜蒸爲餅  
古廣灰云死龍骨  
首蓿根謂土黃耆

螵蛸膠干桑枝 蘿香采茄葉襍  
研石膏和輕粉 以薑黃言鬱金  
批杷葉代欵冬 草仁克草豆蔻  
西宋代南木香 驢脚脛作虎骨  
或半夏煮黃爲玄胡索 或熬廣膠入蕎麵炒作阿膠  
或煮雞子及鯖魚枕爲琥珀之類巧詐百般爲忌畏毒  
甚致殺人歸咎用藥本草綱目本草必  
讀之說若要記之

△按百草黑燒用鍋底墨陳倉米用二年米者雖不中多不  
遠以猿尾膚鹿茸以膠餌襍蜂蜜以黃獨爲何首烏者  
其用藥有何益耶

凡藥品來於中華者 大君命遣識藥人于長崎悉辨正  
之以聽交易出於日本藥品屬僞者嚴所禁止  
藿香 黃茋 白欽 白芷 白鮮皮 桑寄生  
常山 泥砂 滑石 阿膠 代赭石 煙眼石  
右件倭藥不佳所以禁交易

官桂 大戟 茵陳 繢斷 菊花 牛黃 白丁香

熊膽 虎膽 麝香 琥珀 阿仙藥 俗云  
右件藥應僞多有所以禁賣僞藥

熟地黃 麴半夏 神曲 乾薑

右件藥修製宜隨古法如省略者禁賣

川烏頭僞名新附子 大風子油僞名雷丸油

倭當藥僞名胡黃蓮

右件藥自今以後用本名須賣買之

重口輕粉 平戶人參 熊野小人參

右件藥性功不佳所以禁賣買之  
明曆四年法令其詳審如之然恐詐送者嘗錦密之擇求

者每等開也蓋藥肆有言不欲價賤輒可得真者

## 六陳

狼毒 枳實 捻皮 半夏 麻黃 吳茱萸

陶隱居曰六種皆須陳久者良其餘須精新也

大黃 木賊 荆芥 芫花 槐花

李果曰是等亦宜陳久不獨六陳也

## 名義

以時名者 迎春 半夏 夏枯草 款冬 忍冬

以人名者 杜仲 刘寄奴 王孫 徐長卿 丁公藤 蒲公英

以物名者 淮牛藿 常山 高良 天竺 迦南

以地名者 虎掌 狗脊 麋術草 鹿跑草

以形名者 鶴虱 益母 馬鞭 烏喙 鵝尾 鴨膽

以姓名者 没藥 景天 三七 無名異 滅靈仙

強名空心者

石子

知莫三十圖會

卷之九十二

卷之九十二

卷之九十二

# 有南北土地之異

朝廷進御常有不時之花然皆藏土窖中而以火逼之故隆冬時即有牡丹花計其工力一本至十數金此以難得爲貴耳其不時之物非天地之正也北方花木過九月霜降後即掘坑塹深四尺寘花於其中則以草結密壠之春分後發不然卽槁死矣

南方攜入北地者如梅桂梔子之屬尤難過臘至茉莉則百無一存矣南方閩廣即茉莉薔薇酴醿山茶之屬皆以編籬以護西北之人未必信也

有睡草却睡之草醉草醒醉之草宵明草晝暗之草夜合草夜舒之草物性相反有如此者

## 藥七情

○單行 ○相須 ○相使 ○相畏 ○相惡 ○相反 ○相殺

單行者

單方不用輔也

相須者

同類不可離也

如下人參與甘草知母與黃柏類上

相使者

我之佐使也

半夏使黃芩

相惡者

奪我之能也

黃芪使附子人參惡白蘿申白芍皮

相畏者

受彼之制也

附子畏人參甘草半夏

相友者

彼我交讎必不和合

人參反藜蘆

相殺者

制彼之毒也

相反者爲害深干相惡者

今畫家用雌黃胡粉相近便自顯如可證矣

半夏

沙參 玄參 苦參 丹參 紫參 以上

細辛以上藥及藜蘆逢之便殺人

芍藥

細辛

以上藥及藜蘆逢之便殺人

丸用人參此皆精微妙奧非達權衡者不能知

芍藥

## 相反

十八種

人參 白芨 白欵

沙參 藥及藜蘆逢之便殺人

丸用人參此皆精微妙奧非達權衡者不能知

芍藥

半夏

白芨

白欵

爪樓

貝母

以上反烏頭與烏喙連之便疾矣  
大戟 海藻 芫花 甘遂 以上反甘草  
蜜蠟與葱 石決明與雲母 並相反  
黎蘆莫犯酒米浸如犯之都是苦

### 相畏

十九種

官桂與石脂 丹硝與三稜 川烏頭草烏頭與犀角  
丁香與鬱金 硫黃與朴消 狼毒與密陀僧  
水銀與砒霜 巴豆與牽牛 人參與五靈脂

### 忌鐵

二十四種

菖蒲 龍膽 茜根 五味子 拈樓 麻黃 香附子  
芍藥 知母 牡丹 石榴皮 藜蘆 商陸 桑白皮  
槐花 皂莢 雷丸 桑寄生 猪苓 山藥 蕤藜子  
桑草 棘子 何首烏

### 忌銅

四種

辰砂 雄黃 地黃 玄參 益母草 肉豆蔻  
上種 三十二種

### 忌火

青黛 犀角 苔陳 茜根 柴胡 桂香 羚羊角  
雲母 芒消 朴消 滑石 雄黃 菊花 禹餘粮  
川芎 藍葉 乳香 甘松 桂心 下子 鐘乳石  
白檀 蕁香 牛黃 薄荷 紫草 沈香 薰陸香  
白芷 胡椒 膜香 檳榔

### 製法毋輕忽

荒花本利水無醋不能通  
草莫消腫効連壳反脹胸  
蒲黃生通血熟補血運通  
陳皮專理氣連白補胃中  
草烏解風痺生用使入蒙

人言燒過用諸石火煅紅而入醋能爲末製度必湏工  
當歸頭止血尾破血  
蜜成於蜂蜜溫而蜂寒  
穀屬金而糠之性熱  
山茱萸補腎固精元

猪苓茯苓厚朴桑白皮之類

柏子火麻益智草莫之類  
人參桔梗常山之類  
遠志巴戟門冬蓮子烏藥之類  
知母桑白皮天麥門冬地黃何首烏

犯鐵必患二消

麻黃身發汗根止汗  
油生於麻麻溫而油寒  
麥屬陽而麥之性涼  
其核滑精故須去核

不去皮耗人元氣  
不去皮令人嘔吐  
不去心令人煩燥  
不去心令人煩燥

如羊犬狸肉者本朝人嘗  
不食故忌之藥省不記之

忌鯉魚  
忌豬肉  
忌麪及茶  
忌醋及一切酸

忌蘿蔔  
忌薄荷  
勿食飴糖  
勿食炒豆  
勿食鹽肉  
勿食橙橘

## 服藥食忌

如羊犬狸肉者本朝人嘗  
不食故忌之藥省不記之

勿食生葱生菜  
勿食菘菜及海藻

勿食生豆  
勿食野猪肉

勿食河豚及一切無鱗魚蟹

勿食桃李雀肉胡荽大蒜青魚鮮等物

勿食砂龍骨

勿食桔梗烏梅胡黃連

# 飲食禁忌

如牛馬羊犬者本朝人不食故省不記之

△按今人食雞肉多入葱蒜爲腥呼名南蠻者見

又有食鯉鱠下  
胡葱蒜和芥醋者

本草所謂鯉與芥菜同食成腫  
等，然則雖急不自容乎？子食之，猶

相傳，蕎麥與西風同食，煩悶多至死。又鰻鱺浸醋乃鰻鱺  
彭長<sub>ス</sub>於寢中，攷史人須眉<sub>セ</sub>也。蓋西風以水而東奔，故先

西臥後著葛衣則無害乎今人每炙無害多食則必損人至死者有之

本綱五月五日采百種草陰乾燒灰和石灰爲團煅研傳  
金瘡止血亦傳犬咬又治腋臭及瘰癧已破各有方  
又取白草花煮汁釀酒服之治百病或采百草花水煮泥  
封埋百日煎爲丸卒死者納口中卽活也

△梅花鹿銜草以飴其牡，蜘蛛齧羊以磨其腹。虎中毒箭，  
食清泥而解之。野豬中毒箭，逐薺而食。覩五糧，食三  
蓋三獸之事，未見之。蜘蛛之所爲，未面見之。犬中馬錢，  
毒則吞水解之。又蛇見蛤蝓之涎，則避地不到。又大鼠  
共好油，而見桐油，則不敢近。誤誤桐油，物猶知藥與毒，  
況於人乎？

○寛永十四年十二月板倉卜齋請紀伊亞相望請藥草  
根，并核實於朝鮮國。見于羅山文集

沙參 丹參 薰薹子 荸薺子 何首烏  
防已 白微 五味子 石楠葉 蜜蒙花  
射干 馬蘭 佛耳草 白頭翁 黃蜀葵花  
升麻 常山 劍葉草 天仙藤 胡黃連  
薑黃 漏蘆 以上十五種 百部根 銀芷胡 山豆根  
薑黃 要其根 延胡索 胡蘆 繢斷 烏頭

## 山草類

甘草 甘草  
尾人參 尾人參  
羊角菜 和沙參  
桔梗  
萎蕤  
草蓆蓉  
天麻  
黃芪 黃芪  
和人參 和人參  
躍草 跃草  
長松  
知母  
鎖陽  
蒼木  
人參 人參  
沙參 沙參  
薺蕘 薺蕘  
黃精  
肉蓆蓉  
惠布里古  
白朱

猪脊  
 观音草  
 仙茅  
 丹参  
 紫草  
 伊波奈之  
 贯衆  
 遠志  
 紫參  
 白頭翁  
 玄參  
 巴戟天  
 滋羊藿  
 地榆  
 玉孫  
 山芥菜

# 和漢三才圖會卷第九十二之本

攝陽 城醫法橋寺島良安 尚順編

## 山草類

上卷



甘草

唐音

蜜甘

美草

蜜草

靈通

其大美者

名粉草

阿末木

國老

本綱春生青苗枝葉悉如槐高五六尺但葉端微尖而糙  
 濶似有白毛七月開紫花似柰冬結實作角如相思角  
 一本生至熟時角折子扁如小豆極堅齒齒不破根長者  
 三四尺粗細不定皮赤色上有橫梁下皆細根也以大  
 經寸而結緊斷文者爲佳謂之粉草其輕虛細小者不及

安南國甘草大者如桂土人以架屋不識果然否也  
氣味甘平氣厚可升可降陰中之陽也此草治七十二種

乳石毒解一千二百般草木毒調和衆藥有功效爲國老經方少有不用者猶如香中有沉香也凡使須去頭

尾尖處其頭尾吐入苦參乾漆爲之使惡遠志及大戟芫花甘遂海藻

生用則氣平補脾胃不足而大瀉心火  
炙用則氣溫補三焦元氣而散表寒除邪熱去咽痛

凡甘草性能緩急而又協和諸藥使之不爭故熟藥得之緩其熱寒藥得之緩其寒熱相雜者用之得其平凡中滿嘔吐酒客之病不可用甘草甘者令人中滿

△按甘草出於南京陝西河東山西者爲上皆稱之南京

甘草出於福州者細脆帶微苦味又細而如梢者俗謂之藁手又大者名粉草俗謂之鞭手

往昔日本有甘草延喜式云陸奧出羽常陸每年貢之

如今絕不出雖希有而細硬不佳

黃耆 ヨウギ 薑草 ヨウソウ 戴椹 テイゼン 王孫 ヲウソン 百本 ヒツボン

諸耆長也色黃爲良佐名夜波良

本綱黃耆葉似槐葉而微尖小又似蒺藜葉而微潤大青

白疊開黃紫花大如槐花結小尖角長寸許根長二三尺

以緊實如箭簇者爲良嫩苗亦可燥淘茹食其子收之十月下種如種菜法亦可有數種

白水黃芪 赤水黃芪 綿黃芪 木黃芪 土黃芪

蓋白水赤水者共陝西之鄉名綿者出於山西沁州綿上故名或云用其皮折之柔軟如綿者爲良乃謂之綿黃芪木黃芪者短而理橫今人多以苜蓿根假之俗呼爲土黃耆粗堅而脆味苦冷入瘦黃耆柔而味甘冷入肥大異用者宜審木黃耆亦勿用

氣味甘微溫氣薄味厚

可升可降陰中陽也人參補中黃老實

藥中補益呼爲羊肉其用有五補諸虛不足一益元氣二壯脾胃三去肌熱四排膿止痛活血內托陰疽爲瘡家聖藥五也元氣弱肥白而多汗者止之虛熱無汗則發之防風能制黃者黃者得防風其功愈大乃相畏

相使也伏苓爲之使惡龜甲白鮮皮

△按今藥肆不論出處好惡皆號綿黃芪售之但擇取切口黃色柔軟者可用是亦經年者爲堅實而不佳故新渡者良又出於倭者名富士黃者經久則堅脆味亦不肯疑此首著根矣不堪用故令售者禁止也



人參

シヌギン  
人浸  
人術  
海腴  
地精  
鬼蓋  
土精  
皺面還丹

本綱人參爲藥切要與甘草同功有人參處上有紫氣搖光星散而爲人參實神草也根有手足面目如人者爲神生上黨今潞州也山谷及遼東高麗乃朝鮮也者爲最上春生苗多於深山背陰近根樹似桐下濕潤處初生小者三四寸許一桿五葉四五半後生兩桿五葉未有花莖至十年後生三桿半深者生四桿各五葉中心生一莖俗名之百尺杵三四月有花細小如粟蕊如絲紫白色秋後結子或七八枚如大豆生青熟紅自落

朝鮮人參猶來中國互市亦可收子於十月下種如種菜法秋冬采者堅實春夏采者虛軟非地產虛實也僞者皆以沙參蕷朶桔梗采根造作亂之沙參體虛無心而味淡桔梗體堅有心而味苦人參體實有心而甘微苦近有以人參先浸取汁自啜乃晒乾復售謂之湯參不任用

人參生時背陽故頻見風日則易蛀納新器中入細辛與參相間收之密封可經年不壞一法用淋過竈灰晒乾罐

收亦可

凡用時宜隔紙焙之熟用則氣溫並忌鐵器伏苓爲之使  
反藜蘆畏五靈脂惡皂莢黑豆人參可去蘆不去則令  
得升麻則補上焦之元氣瀉肺中之火  
得茯苓則補下焦之元氣瀉腎中之火  
得黃芪甘草則除太熱瀉陰火補元氣

得麥門冬則生脈得乾薑則補氣

凡血脫者用人參益氣則血自生藥品之聖也

△按人參可用不可用之病症本草諸家之辨論區區也  
共不可偏執今時亦然焉一擗有泥其功不詳虛實而  
動則人參多入用者稱之人參醫師

凡人面白或黃或青黧粹者皆肺脾腎不足可用也面  
赤或黑者氣壯神強不可用也

凡脉之浮而芤濡虛大遲緩無力沉而遲濶弱細結代  
無力者皆虛而不足可用也若弦長緊實滑數有力者

皆火鬱內實不可用也蓋此說可以爲的據也

朝鮮人參 朝鮮北韃靼南境有大山名白頭山自然生  
人參爲最上其葉花與人參相似而實異初青熟赤  
圓如南天寶其根似胡蘿蔔而白色使甘草汁蒸乾黃  
色亦益其味頭邊有橫文體重實而中亦潤黃者爲上  
經年者大愈佳似人形者亦百斤中有一二本此雖有  
神而不甚佳出於咸鏡道者潤白透明爲極上最鮮  
判事人參 是亦白頭山之產出於韃靼而未知修治良  
方故功稍劣

蝦手人參 右同蓋韃靼土地水不清毒多故其富豪者  
常浸人參於井中用其水更採出人參販之故帶飲色  
而尾端曲似蝦形所謂湯人參之類乎


唐人參 即中華之產山西之潞安古之北京之永平雲  
南之姚安共爲上而下種植成故功不如朝鮮自然生  
者其大者俗呼曰唐大

小人參 非大人參中擇出者而本自一種者其根是  
一寸許猶賜粟與美人草近年不來俗以尾人參稱

小人參者非也

凡大人參老者則大而功勝嫩者小而力劣焉體輕虛色  
枯白者俗謂浮虛人參無効

ひげのひんざん 鬚人參 俗稱  
小人參 俗稱



尾人參

自此一種也俗  
以爲大人參之  
鬚細根者非也

△按尾人參朝鮮中華共有一蔓生而與人參一類異種  
者也高一二寸葉似人參而小蔓出於莖布地至處生  
根如草石蠶樣取其蔓根爲藥織者似蘚解鬚故名鬚  
人參每唐船皆將來之稱小人參性堅實其功勝於大人  
人參之浮虛者

わいんちん 人參

和名加乃仁  
介久佐

和人參

一名冬末乃伊



茎帶微紫  
葉大切又

△人參往昔本朝有之而中古不用之出於薩摩者名  
小人參一名節近年得唐人參種多植圃平野庄  
多出之二月下種初生一莖三葉及長數莖皆三葉其  
葉厚潤有深刻而無筋畧似銀杏葉每八月中心抽一  
莖高三四尺開細白花如蓋似葫蘆花秋後  
結子細小亦似葫蘆霜後枯宿根亦能生也九月採  
根如胡蘿蔔而淡白色以甘草汁蒸乾則能類人參但  
頭無橫文蘆頭不括縮耳功能亦不及故用者鮮  
和列吉野山中有自然生者又有得真朝鮮參種植者  
並其葉根與朝鮮不異然甚希而未足賣實



名曰  
沙參 白參 知母  
虎鬚 羊乳 羊婆奶  
苦心

本細沙參處處山原有之二月生苗其葉如初生小葵葉而圓扁不光八九月抽莖高一二尺莖上之葉則尖長如枸杞葉而小有細齒秋月葉間開小紫花長二三分狀如鈴鐸五出白蓋亦有白花者並結實大如冬青實中有細子霜後苗枯其根生沙地者長不餘大一虎口黃土地者則短而小根莖皆有白汁八九月采者自而實春月采者微黃而虛小人亦往往熟蒸壓實以亂人參但體虛輕鬆味淡而短耳。

氣味

微苦

厥陰本經藥又爲脾經氣分藥

惡防已味反藜蘆

微苦補陰甘則補陽故肺寒者用人參肺熱者用沙參

代人參

人參體重實專補脾胃元氣因而益肺與腎故內傷元氣者宜人參性溫補五臟之陽

沙參體輕虛專補肺氣因而益脾與腎故金能受火克者宜

△按沙參屈曲如卷細繩或有剥瀆防風皮卷成偽之或中裹偽者之類故繙亂而賣買故近年以來皆不卷屈



羊角菜

今云  
合鉢兒  
細絲藤  
又云  
路人參  
過路黃

本綱沙參下陳藏器曰羊乳根如薺莧而圓大小如拳上  
有角節折之有白汁入取當齋菴苗作葛折之有白汁  
農政全書云羊角菜生田野下濕地抱藤蔓而生莖色青  
白葉似馬兜鈴葉而長大又似山藥葉亦長大面青背頗  
白皆兩葉對生莖葉折之俱有白汁出葉間出蒴開五瓣  
小白花結角似羊角狀中有白穰其葉味甘微苦

△按羊乳卽沙參之別名也然陳氏所謂羊乳乃羊角菜  
而倭沙參也以有蔓爲蔓人參又名弦人參和州河州信州處處山中  
有之蔓生其蔓葉共似初生蘿藦及草薢葉八九月葉  
間開小白花亦有淡紫者形如鈴鐸根莖有白汁但宿  
根未經歲者則無花九十月採根斜殺之晒乾既乾則  
皮黃皺有橫文理如人參文

尋常用之換人參最爲沙參入用藥而有功嘗以爲沙  
參之一類故代唐沙參者無異正代人參者不可也  
凡用人參也特可擇之如不能得朝鮮美者可使唐參也

尾人參勝於朝鮮唐參等浮虛者其次可用倭人參



躍草

山藥

中藥

△按本草時珍所謂沙參之形狀與此能合焉此草高尺  
許莖微赤葉似小葵而兩兩對生三四月葉本開小  
花白色帶微赤狀似人蔘莖躍故俗爲躍草其根細長



薺莧

日本名白參

甜桔梗

苗名隱參

卷之二

山  
草

卷之二十一

本綱其苗似苦梗根似沙參故往往以沙參亂名  
參但齋菴春生苗苗高一二尺莖色青白葉似杏葉而小  
微尖而背白邊有又牙杪間開五瓣白盤子花根形如野  
胡蘿蔔頗肥皮色灰黑中間白毛又有開碧花者  
凡齋菴桔梗一類而甜苦二種也齋菴嫩苗味甘燥熟可  
食桔梗苗苦不可食此其異也

氣味甘寒能解百藥毒乃良品也而世不知用惜哉與諸  
毒藥共處毒皆自然解也虎中藥箭食清泥而解野豬  
中藥箭歷齧羌而食物猶知解毒何況人乎

新名佐木久佐  
按齋茂奈一名美乃波  
出於河內金剛山者良  
山次之藝州廣島又次之  
分岐及淺山中又有之



根

卷之三

白藥

本草

桔梗

和名阿里乃比布木  
不<sub>レ</sub>日<sub>ニ</sub>呼<sub>フ</sub>  
字<sub>ニ</sub>音<sub>ヲ</sub>  
和名<sub>ヲ</sub>

本綱桔梗春生苗莖高尺餘葉似杏葉而長墮三四葉對生又有差互者嫩時亦可煮食夏開小花紫碧色頗似牽牛花秋後結子其根如指大黃白色

本草本經桔梗與薺蕘爲一物至別錄始出薺蕘條分爲二物然其性味功用皆不同根有心者桔梗無心者薺蕘又苗苦者桔梗甜者薺蕘

氣味苦辛平味  
厚氣輕  
足少陰腎經  
凡使須去頭上尖硬  
二三分已來清肺氣利咽喉與甘草  
同行爲舟楫之劑如大黃苦泄峻下之藥欲引至胃中  
至高之分成功須用辛甘之劑升之確如鐵石入江水

再楫不載所以諸藥有此一味不能記也

△按桔梗山野及人家多種之苗叢生無枝梗其葉似杏葉而楷也本草綱目作楷字誤本至未差互生葉間開碧花凡以紫碧者爲桔梗之正色又有白花者有紫白相間者有單葉有八重皆變於子種初無枝梗剪折莖則生枝梗其葉對生者亦有

仙茆



## 長松

其功如松脂  
及仙茆故有二名

本綱生山谷下其葉如松葉上有脂根色如齋茂長三五寸氣味類人參清香可愛山人服其葉云長年

氣味甘微苦溫能治大風惡疾眉髮墮落百骸腐潰每以一

兩入甘草少許水煎服旬日即愈



## 黃精

黃芝 戊己芝  
菟竹 救窮草  
垂珠 野生薑  
米脯 重櫟

龍術 仙人餘糧

本綱黃精又名雞格山野皆有之子亦可種其葉似竹而不尖或兩葉三葉四五葉俱對節而生莖梗柔脆本黃赤亦四月開青白花狀如小豆花結子白如黍粒亦有無子者根如嫩生薑而黃色又其根橫行狀如葵粧俗采其莖燥熟泡去苦味食之名筆管菜二八月采根九蒸九素作果黃黑色而甚甘美忌梅實氣味甘平補中益氣除風濕安五臟久服輕身延年不飢補五勞七傷

博物志云昔黃帝問天老子曰天地所生有全令入不死

者乎天老曰太陽之草名黃精食之可以長生太陰之草  
名鉤吻不可食之入口立死人信鉤吻殺人不信黃精之  
益壽不亦惑乎

△按青精和名方似惠美一名夜未惠美形狀擎和相似而俊者所帶皆  
出於河州金剛山者良江州高島郡者次之武州則澤

余所覈者多葵花也。葵有兩種，高者爲黃精，  
又云黃色節高者，黃精黃白色，節低者，葵莊也。

卷之三

本草

讀書

卷之三

卷之三

五  
七

卷之三

三才圖會

兩兩相值表白，裏青三月開青花結圓實，其根橫行似蠶

精良小黃白色性柔多鬚最難燃葉及根可煮淘食  
氣味甘平能外能內陽中陰也補中益氣止消渴潤

肺虛五勞七傷虛損腰脚疼痛目痛皆爛淚出  
黃精麥莊二物功用大抵相近而麥莊之功更勝則一

物雖通用舟亦可十

△桃葉珊瑚  
河州金曲山之石  
其葉帶狀綠色葉似竹而厚  
脊不對生而向上花如風鈴狀白色本末帶青筋  
方

卷之三

知母

ツウモウ



本綱知母生處處山上形似菖蒲而柔潤葉如韭至難死  
掘出隨生須枯燥乃止四月開青花如韭花八月結實宿  
根之旁初生子根形如蜘蛛之狀故名蜘蛛知母爲知母

本綱知母生處處山上形似菖蒲而柔潤葉如韭至難死掘出隨生須枯燥乃止四月開青花如韭花八月結實宿根之旁初生子根形如蜘蛛之狀故名蜘蛛爲知母

卷之三

卷之三

卷之三

卷一

氣味 辛苦寒氣

沉而降陰也 腎經本藥不足陽明手太

陰其用有四 濕無根之腎火 一療有汗之骨蒸

止

勞之熱 三滋化源之陰 四也 下則潤腎燥而滋陰上則

清肺金而屬火乃二經氣分藥也 上行則浸酒煖乾得

黃柏良 忌鐵黃柏則是腎經血分藥故二藥必相須而

行 磬之根與水毋必相依附

△按知母

萬之和名夜

其葉忌人手觸也 花如蕙爾淡紫色

肉松容

肉蓯蓉



ジヨツラヨン

本綱肉蓯蓉生河西陝西及鴈門是野馬精落地上所生也  
生時似肉三四月掘根長尺餘切取中央好者三四寸繩  
穿陰乾皮有松子鱗甲

震亨疑之曰何當有鱗甲或云大木間及土塹

中多生乃知自有種類爾或疑其初生於馬瘻後乃滋  
殖如茜根生於人血之類是也

氣味 清微

強陰益精氣命門相火不足者以此補之乃

腎經血分藥也蓋眞者罕得人多以金蓮根或嫩松梢  
鹽潤偽之又以草蓯蓉充之用者宜審

△按肉蓯蓉鹽漬來有如鱗甲者其真偽難辨

列當栗當

草蓯蓉



ツアウツランヨン

花蓯蓉

本綱草蓯蓉原出秦州渭州靈州皆有之生巖石上暮春  
抽苗莖圓白色其根與肉蓯蓉相類刮去花壓扁代肉蓯  
蓉功力殊劣

氣味 苦溫

男子五勞七傷及陽事不興者良令人有



鎖陽

ソウヤン

本綱鎖陽生肅州生韓靼田地野馬或歟龍遺精久之發  
起如筆上豐下儉鱗甲似比筋脉連絡絕類男陽而肉蕊  
蓉之類或謂里之淫婦就而食之得陰氣勃然怒長土  
人掘取洗滌去皮薄切晒乾以爲藥功力百倍於蓴蓉也  
疑此自有種類如肉蓴蓉列當亦未必盡是遺精所生也  
氣味甘溫大補陰氣益精血利大便者勿用不燥結

惠布里古

アガムシ

惠布里古

アガムシ

△按惠布里古生韃靼地其原名加良不止一名高麗北  
島之北界也生沙濱中如鎖陽之類爲大塊外灰白內  
白色似茯苓而不濃如枯菌理其味苦蝦夷松前人傳  
曰積聚疝氣一切腹痛等不用諸藥止用此皆愈也然  
虛弱人宜斟酌



天麻

赤箭獨搖芝  
離母赤箭芝  
定風草  
神草合離草



瓜形

羊角形

天麻

鬼督郵

定風草

神草合離草

本細小春生，初出若考藥，有抽一莖直上高三四尺，如管  
管狀，青赤色，莖中空，依半以上貼莖，微有尖小葉，稍頭生  
成穗，開花葉赤色，遠看如箭，有羽，四月開花，結實如豆粒，  
大核作五六棱，中有肉，如麪，日暴則枯萎，其子名還筒子，  
至夏不落，却透虛入莖中，潛生土內。

其根皮肉汁大類天門冬，惟無心麻爾，去根五六寸，有十  
餘子，端之似芋，其根暴乾，肉色堅白，如羊角，俗呼羊角夫。  
麻蕷過黃，皺如乾瓜者，俗呼醫瓜夫，麻皆可用，形尖而空，  
薄如玄參，狀不堪用。本草必讀云皮黃白肉明克

氣味甘暖

肝經氣分之藥，肺虛不足者宜天麻川芎以補之，其用有四：

一治大人風熱頭痛，二治小兒風癇驚悸，

三治風熱語言不遂，四爲治風之

△神藥也，定風草須別藥相佐使，然後見其功。

△桉赤箭

和名乎止，加美乃夜加良

乃天麻也，出武州耶澤者

良藥，廣島次之，倭天麻者一莖一花，而無枝葉，爲俱

已，有油膏。

陰中陽

## 蒼朮

山薑

仙人

ツアンチツ

本細昔人止稱米，不分蒼白，自宋以來始分之，處處山中  
有之，茅山嵩山者爲佳，苗高二三尺，其葉抱莖而生，稍間  
葉似棠梨葉，其脚下葉有三五，又皆有鋸齒，小刺，嫩葉可  
茹，夏開花，淡紫碧色，似刺薊花，或有黃白色者，入伏後結  
子，至秋而苗枯，根如老薑，之狀，旁有細根，蒼黑色，肉黃白，  
色有油膏。

蒼朮

細無棱

如老薑，而膏多

辛烈溫而燥

白朮

葉大有棱

如鼓槌而膏少

氣味甘，微苦溫而和

共可升，可降，防風地榆爲之使，忌桃李菘菜。



○白术 俗名頭木

雖瘦小得土氣充也甚燥白勝干浙

△按唐白术多如鼓槌者爲佳近半有川白术者即是削  
术而所切片者不佳蓋古倭亦不分二术一稱平介良  
右所圖者據本草必讀之繪然圖與名義稍有齟齬焉  
京師五条天神每除夜群集祈除疫社前有賣白术者  
皆求之去焉本草言歲旦服蒼术之事與此合

万葉 犬の根を以て作る。此の子からて根を取る。

倭狗脊

唐

狗脊

強骨

百枝

扶筋

狗青

俗云世罕未以

本綱狗脊生山野其苗尖細碎青色高一尺以來其莖細  
而葉花共兩兩對生正似大葉蕨比貫衆葉有齒向背皆

光其根黑色長三四寸多峽似狗之脊骨大有兩指許肉  
青綠色一云無花但有一種

一種根黑色如狗脊骨

一種

有金黃毛如狗形共入藥

氣味 苦甘微酸

治男女腰膝脚弱或痛者利老人最堅脊利

俛仰革薢爲之使 惡敗醬 痘後足腫者煎湯漬洗

△按狗脊生深山中春月生葉如蕨而一莖無根莖未卷  
葉似握拳狀而小嫩莖可取晒乾用時漬漬木一宿去  
苦味再煮食之淡甘脆美也羽州秋田同最上之產佳  
既長則葉有鋸齒似貫衆而厚面背光兩兩對生附葉  
生細小花老則莖褐色如漆塗筋而長三四尺其根多  
毛但金毛狗形者希矣用藥則金剛山之產良  
一種有大葉者俗呼曰鬼狗脊嫩芽亦不堪食

凡狗脊貫衆之圖所出三才圖會而狗脊有二圖其其  
形狀不似但本草綱目集解和漢無異



有山崗山崗根正似巴戟  
土人采以薪木煮食之  
乃以雜巴戟莫能辨也但擊破視之中紫而鮮紫者爲也  
其中雖紫又有微白參有粉色而理小暗者真也

其中雖紫又有微白者有粉色而理小暗者眞也  
接巴戰天往昔有出於本朝今乃無之皆用唐藥也多  
連珠者佳俗名數珠巴戰  
其葉如茗也如麥門冬也其異大也二才圖會之圖亦  
出一種雖謂山林人家之異未審

觀音草



△按觀音草葉似蘭葉而狹短又似石菖葉而無劍脊深青色四時不凋六月抽莖著小花作穗淡紫色舊可變京師中元日用莖葉綿蓮飯蓋取觀音之名義

一種有白花者是乃變於實生者也俗以爲琉球風  
悉其異種之耳



# 遠志

苗名水草  
萎繞  
棘菀

本綱遠志生山谷有大葉小葉二種莖葉似大青而小者  
其花紅是大葉也狀似麻黃而三月開白花者是小葉也  
根形如高根而黃色長者及一尺去心取皮一斤止得二  
兩如不去心則令人煩悶得茯苓龍骨良  
氣味苦溫入足少陰腎經其功強志益精治善忘  
蓋精與志皆腎經之所藏也腎精不足則志氣衰不能  
上通于心故迷惑善忘也能益腎且強志故名遠志



淫羊藿

八葉枝草十兩金  
三枝九葉禾草

イニヤツホツ

刪前

本細淫羊藿生大山中一根數莖其莖粗如線高十二尺  
一莖二桿一桿三葉其葉長二三寸如杏葉及豆藿面光  
背淡甚薄而細齒有微刺經冬不凋四月開白花亦有紫  
花者碎小獨頭子五月采葉晒乾根紫色有鬚似黃連  
氣味甘溫能益精氣堅筋骨三焦命門藥真陽不足者  
宜之久服使人好爲陰陽有子嘗有淫羊一日百遍令  
蓋食此藿故名

△按淫羊藿和名宇無木奈云夜未止里久佐出丹波船井郡山中形狀  
和漢無異但唐者莖中虛倭者中實



仙茅

獨茅茅丸  
婆羅門參

スエシマリ

本細仙茅生太山中葉青如茅而軟且畧潤面有縱文又  
似初生櫻櫛秧高尺許至冬盡枯春初乃生四五月中抽  
莖四五寸開小花六出不結實其根獨莖而直大如小指  
下有短細肉根相附外皮稍粗褐色內肉黃白色此草始  
因西城婆羅門僧獻方於唐玄宗故呼爲婆羅門參言其  
功補如人參也

氣味辛溫有治風冷癢痺不能行益陽道善補三焦命  
門之藥惟陽弱精寒羸賦素法者宜之若體壯相火熾  
盛者服之反能動火中其毒舌張出口至死忌鐵器及牛乳

根



玄參

正馬

逐馬

重臺

鹿陽

黑參

玄臺

馥草

鬼藏

野脂麻

本綱玄參二月生苗葉似脂麻對生又如槐柳而尖長有鋸齒細莖青紫色七月開花青碧色八月結子黑色又有白花者莖方大紫赤色而有細毛有節若竹者高五六尺其根一根五七枚有腥氣生青白乾節紫黑色宿根多地蠶食之故其中空

氣味苦微

寒

足少陰腎經君藥治胷中氣氤氳之氣無根之火充腎水受傷真陰失守孤陽無根發爲火病者宜壯

水以制火故玄參與地黃同功治鼻中生瘡者玄參末塗之

惡黃芪

乾薑

大棗

山茱萸

黃芩

藜蘆

人參

△極地榆多用倭出金剛山者，高一尺，葉似小梅葉，而小夏開花紫色，千瓣圓似楊梅，及千日紅狀。



丹參

逐馬木半乳  
山參奔馬草



冬至

本綱丹參生山中，二月生苗，高一尺許，莖方有枝，青色，一枝五葉，葉如野蘇而尖，青色有纖毛。三月至九月開小花，成穗，紅紫色，如蛾形，中有細子根皮，形而肉紫，大者如指，長尺餘，一苗數根。

此乃五參之一，而五參配五臟，人參入脾，沙參入肺，黃參入肝，白參入心，玄參入腎。牡蒙紫參丹參赤參，其若參則右腎命門之藥也。古人捨紫參而稱苦參，未達此義爾。

丹參氣味

苦寒

平而降陰，中陽入手，少陰厥陰之經。

與芍藥血分藥也。四物湯治婦人病，不問產前產後，經水多少皆可通用。惟一味丹參散主治與之相同，能破宿血，補新血，安胎，落死胎，止崩中帶下，調經脉。其功大類四物。當歸川芎地黃芍藥故也。蓋久服多眼赤，故應性熱，其云微寒恐謬也。葛根水

△接丹參性，昔本朝亦有之，今則無之。蓋調血之良藥，古方多用之，今用之者罕。

根

シウスン

牡蒙

衆戎

馬行

童腸

シウスン

紫參

五色花



本綱紫參苗長一二尺，莖青而細，葉青形似槐葉，亦有似羊齒，有五月開花，白色似蕊花，而有紅紫而似桃花者。其

本草綱目

卷之二十一

四十一

シウスン

和名

布施波佐

根紅時紫黑色肉帶紅白狀如小紫草  
氣味苦寒入足厥陰肝臟血分藥故治諸血病及寒熱  
癰癥癰腫積塊之屬厥陰者良

辛夷

王孫 智名沼波利名佐又云豆知波利

牡蒙 黃昏

黃孫



王孫

智名沼波利名佐又云豆知波利

本綱王孫生山中其葉生頭頂似紫河車葉又似及已而  
大根長尺餘皮肉亦紫色牡蒙與紫參同名也黃昏與合歡木同名但古方所  
用牡蒙皆爲紫參後人所用牡蒙乃王孫非紫參也不可  
辨

氣味苦平療百疾補虛益氣主五臟邪氣寒濕痺四肢

瘦疼膝冷刺疾金瘡破血生肌止痛

△按王孫丹參紫參皆有根名則徃昔本朝有之明焉



紫草

茈莧 芝草 地血

ツウツアウ 和名無良佐木

本綱紫草生山谷人家亦種之根紫色而可以染紫其苗  
似蘭香莖赤節青二月開花紫白色結實白色秋月熟種  
之法三月逐龍正子九月子熟時刈草春社前後采根陰  
乾其根頭有白毛如茸未花時采則根色鮮明花過時采  
則根色黯惡采時以石壓扁曝乾收時忌人溺及驢馬糞  
並烟氣皆令草黃色

根氣味甘鹹寒古方稀用今醫家多用入心包絡及肝經

其功長於涼血活血利大小腸故痘疹欲出未出

益熱毒盛太便閉濁者宜用之已出而紫黑便閉者亦可用得木香白朮佐之尤爲有益若已出而紅活及白陷太便利者切可忌之

△梅紫草出於薩州者最佳奧州津輕羽州秋田遠州中泉豫州大洲河州山田皆良但家種者不入藥用蓋醫方雖曰紫草可用根若謂紫草草則可用嫩苗葉深絹帛用紫根煎汁深之浸柃木灰汁成

一方用蕷方木煎汁入綠礬少許深之浸柃木灰汁成名之鷹紫經年色變

根



白頭翁

胡主使者  
奈何草  
和名於木奈久佐  
一云奈加久佐

野丈人

本綱白頭翁生山谷及田野正月生苗作叢生狀似白而柔細稍長葉生莖頭如杏葉上有細毛而不滑澤近根有白茸狀似白頭老翁根紫色深如葛青其苗有風則靜無風而搖與赤箭及獨活同

根氣味苦溫氣薄

厚味薄

可升可降陰中陽也熱毒下痢紫血鮮血者宜之

△按白頭翁今無識者別有翁草與此不同

見于湯草之下



山芥菜

俗云草牡丹

救荒本草云山芥菜生山野間苗高一尺餘葉似野蜀葵葉稍大而有五叉又似地牡丹葉亦大葉中擴生莖叉稍刺狀如鼠粘子刺狀而小圓花蓼白色葉味微酸

按草牡丹高一尺葉畧似朱四月開白花似芍藥而  
單葉稍小



伊波奈之

谷云草參丹

△按伊波奈之江列三井寺山中有之苗高二三寸葉大  
如飄樹葉而不尖揭地生二月開小白花似虎耳草花  
三月結子如青大豆而圓數顆攢生如楊梅樣裹於葉  
夾外色青內紫黑色小兒剥皮食味微酸其

益熱毒盛大便閉濁者宜之出而紫黑便閉者亦可用得木香自木佐若已出而急治及白陷太便利者切可忌之

△按紫草出於薩州者最佳奧州津輕羽州秋田遠州中  
泉豫州大洲河州山田皆良但家種者不入藥用蓋鑿  
方雖曰紫草可用根若謂紫草草則可用嫩苗葉

深絹帛

用紫根煎汁深之浸於木灰汁成

一方用蕷方木煎汁入綠礬少許深之浸於木灰汁成  
名之鷹紫經年色變

春

葉子



根



白頭翁

奈何草

胡主使者

野丈人

ペラカウラ

和名於木奈久佐  
一云奈加久佐

本綱白頭翁生山谷及田野正月生苗作叢生狀似白  
而柔細稍長葉生莖頭如杏葉上有細毛而不滑澤近根  
有白茸狀似白頭老翁根紫色深如葛又青其苗有風則靜  
無風而搖與赤箭及獨活同

根氣味苦溫氣厚味薄可升可降陰中陽也熱毒下痢紫血鮮  
血者宜之

△按白頭翁今無識者別有翁草與此不同

見于濕草之下



山芥菜

俗云草牡丹

救荒本草云山芥菜生山野間苗高一尺餘葉似野蜀葵  
葉稍大而有五叉又似地牡丹葉亦大葉中攏生莖義稍  
外刺狀如鼠粘子刺甚而小開花聚白色葉未

按草牡丹高一尺葉畧似朱草四月開白花似芍藥而  
單葉稍小



伊波奈之

谷云草學書

△按伊波奈之江列三井寺山中有之苗高二三寸葉大  
如飄樹葉而不尖揭地生二月開小白花似虎耳草花  
三月結子如青大豆而圓數顆攢生如楊梅樣裹於葉  
夾外色青內紫黑色小兒剥皮食味微酸其

