



地  
倭漢三才圖會

末之四十九

濕草類



和漢三才圖會卷第九十四之末

濕草類

款冬花

剪紅羅

金盞草

車前子

蛇含草

鱧腸

豆和

眼皮

金錢花

狗舌草

鼠尾草

連翹

瞿麥

王不留行

葶藶

馬鞭草

狗尾草

倭連翹



和漢三才圖會

濕草類

菟藿

蓼

葎草

三白草

扁蓄

穀精草

蜈蚣草

紫花地下

草綿

樊噲草

翠蝴蝶

路鳥草 附リ 連鷺草

草列珠

泡盛草

九葉草

贊波丁子

藍 藍殿

水蓼

毛蓼

虎杖 附リ 托蘭草

蓋草

海金沙

碎米薺

鬼針草 附リ 狼把草

秋海棠

岡萍蓬

蝴蝶草

絲線草 附リ

草蓮花

山萵苣

澤桔梗

吉野靜草

青黛

馬蓼

火炭母草

薔

蒺藜子

水楊梅 附リ 柳草

半邊蓮

見腫消

兔兒傘

紫羅襪花

鶴子草

善界草

淡雪草

櫻草

丁子草

二人靜草

十日紅

緜摺草

牡鵪草

玉毬花

熊谷草

夏雪草

碇草

潮風草

粉條兒菜

亂菊

螢草

雉子竄

董董菜

梅鉢草

華鬘草

有馬草

藁荷草

水引草

虎尾草

猩猩袴

風樓草

鹽竈草

曼陀羅花

逢坂草

日向堪

白絲草

望江南

雨點兒菜

十屈菜

剪刀股

野茴香

火燄菜

藤袴

野鸛草

風花菜

星宿菜

草零陵香

蠟子花菜

香菜

遏藍菜

磯邊草

鰾蓬

白屈菜

毛連菜

委陵菜

婆婆指甲

牻牛兒

胡枝花

結縷草

董

芽切草

夫苦草

角觝草

管

和漢三才圖會卷第九十一之本

攝陽

城醫法橋寺島良安

尚順

編

濕草類



欵冬花

虎鬚

菟葵

藁吾

欵凍

氏冬

穎凍

クシトシ

俗云布木乃之字止女

本細百草中惟此不顧水雪最先春也葉似葶藶十一月開黃花青紫莖去土一二寸初出如菊花莖通直而肥實無子根紫色須微見花者為藥或云似葵而大叢生又有紅花者葉如荷而斗直大者容一升小者容數合俗呼為蜂斗葉又名水共春時人採以代蔬其腹裏有絲

氣味辛温 純陽入手，大陰經治。欬逆古方用為温肺治

嗽之最。杏仁為之，使得紫苑、良惡、皂莢、玄參、畏、麻、黃、黃、芪、黃、芩、連、翹、青、葙、子。

△按崔禹錫食經云：落葉，布名，葉似葵而圓，廣其莖煮可

噉之。欬冬，和名也。據此則欬冬即山落。今云至冬亦葉

不凋，落本草二物不分別。然所圖落也。入藥欬冬可

落初生，葉似草薺而無叉尖。大者似牛蒡葉而團莖長

一二尺，有溝青白色。根本帶紫，有微白色皮肉，間有絲

剥皮者，煮食。春時常用之。其花臘月出於土，如藜荷等，大

如梅指淺青色。採之切片塗豆醬炙食，味極苦。然本草

為辛者非也。嗜酒人賞之，或謂治痞積。至春稍長，外皮

綻舒為葉，抽莖四五寸稍開花，白帶黃，無蕊，無子。與州

津輕之產，肥大莖，周四五寸，葉徑三四尺，以代傘。防暴

雨，南方人聞之不信，但未聞有紅花者耳。

根苦平。倭方海人草欬冬，草根甘草，三味浸水湯煎以

用。初生兒云能去胎毒。根氣味切。



### 豆和

欬冬

和名夜未布岐

對落謂山落乎

今以揀棠花同

名俗曰豆和

△按豆和即欬冬，而落之一種莖葉形狀相似而花大異

落 青白有溝，葉薄軟，淺青，不潤，秋冬枯死

欬冬 莖 灰紫無溝，脆，葉厚硬，深青，先澤冬亦不凋

落 花 冬出於根下，一二寸如藜荷等，開舒，淡白，無藥

秋抽莖作朶，二二三尺如菊花萼，開單正黃，有藥

採莖葉，煤淘去苦汁，為蔬。其葉解魚毒，中河豚魚毒者

生噉之，屢有效。又飼馬良，不劣於薊葛之葉也。九列人

今亦每為蔬菜食之。

太加良古 在山中，葉似落而花似豆和，三月開花，連根

莖葉用入洗藥中，洗折傷及麻痺，但葉本莖有穢

藤瞿麥



瞿麥

石竹 蘧麥  
天菊 六蘭  
南天竺草  
巨勾麥

キチモツ  
ヒシカク

和名大奈天之古  
一云止古奈豆

本綱瞿麥葉似地膚葉而尖小又似初生小竹葉而細窄其莖纖細有節高尺餘稍間開花田野生者花大如錢紅紫色人家栽者花稍小而嫵媚有細白粉紅紫赤斑爛數色俗呼為洛陽花並二月至五月開七月結實作穗如燕麥內有小黑子其嫩苗煉熟水淘過可食

一種 葉微大花邊有又極一種 葉莖相似而有毛花晚而甚赤畫譜云石竹二種單瓣者名石竹千瓣者名洛陽花二種俱有雅趣亦須每年起根分種則茂穗苦寒 利小便明目使即空令入氣噎小便不禁也

八正散用瞿麥今人為至要藥若心經雖有熱而小腸虛者服之則心熱未退而小腸別作病矣

△按瞿麥即石竹也今以為二種共葩周圍有刻齒而有切又似剪紅紗者為瞿麥無切又者為石竹並出於豫州者良丹波紀伊次之

倭瞿麥 莖葉細弱花有紅紫白赤斑爛單葉千葉數種南京瞿麥 株太莖細而葉大於倭其花單瓣紅

藤瞿麥 莖大高尺餘葉厚形似匙首而深青色抱節兩兩對生其花數朶小形似桔梗而白帶紫萼長淺青

倭石竹 莖葉細柔其花有數品從春至秋皆變於子種而異品者為珍賞

阿蘭陀石竹 株莖大葉硬強花亦大有數品也開伊流



本草說



剪羅

剪紅羅  
剪紅紗花  
俗云仙翁花  
今云世年

ツマニ  
フキニロウ

本綱剪春羅二月生苗高尺餘柔莖綠葉其葉對生抱莖入夏開花深紅色花大如錢凡六出周迴如剪成可愛結實大如豆內有細子人家多種之為玩治火帶瘡腰生者花葉密澆調塗之  
剪紅紗花 莖高三尺葉似旋覆夏開花狀如石竹花而稍大四圍如剪鮮紅可愛結穗亦如石竹穗中有細子  
剪秋羅花 畫譜云剪秋羅花有五種春夏秋冬羅以時名也春夏二羅色黃紅不佳獨秋冬者紅深色美亦在春時分種喜肥則茂  
△按剪紅羅總名而有數種皆夏月開花稍遲者至秋耳冬乃枯死宿根春生苗故未見春冬開花者畫譜之說

不是也相傳嵯峨仙翁寺始出之仍名仙翁花今此五鳳集云吾邦有一種奇花每歲以六七月着紅謂之仙翁花世傳自嵯峨仙翁寺所出也太唐詩文之中論花甚夥未聞有此名

蓋此仙翁花乃剪紅羅花也疑僧裔然取得種於中國者矣仙翁寺舊地在太覺寺西今為村名今愛宕山一有仙翁寺當時所賞翫者記于左

剪紅羅今云葉形似梅葉而無鋸齒裏有微白毛對生六七月開花正紅色大如錢有刻齒周迴如剪成今時又有白花者

剪秋羅俗云松本世年莖葉與常剪羅相似而五六月開花深紅色其周迴如剪成之處不峻今時有數色紅白及裏朱曙紅櫻色等變於子種

剪紅紗俗云小倉世年葉細長而五六月開花淡紅色形如石竹花其刻齒亦深而美今又有白花者





### 眼皮花

俗稱

△按眼皮草與剪羅一類異種也春生苗柔莖青綠葉厚於剪羅而不圓末尖六七月開花似剪羅花而刻齒淺其色肉赤也俗說達磨大師九年面壁時欲不眠自剪上下眼眶棄之地生此草其花肉赤色以為似眼眶故名眼皮矣一種有逢坂草者見于後



### 王不留行

剪金並花

和名加左久佐

金並銀臺

禁山宮花

本綱王不留行多生麥地中苗高者一、二尺三四月開小花如鐸鈴狀紅白色結實如燈籠草子殼有五稜殼內有實大如豆實內細子大如菘子生白熟黑正圓如細珠可愛其功能金瘡止血出竹木刺性走而不住雖有王命不能留其行故名

氣味甘苦 能走血分下乳汁利小便治癰疽惡瘡又竹木鍼刺在肉中不出疼痛者為末熟水傳即出

△按王不留行花似藤瞿麥花而蓋此治惡瘡故和名為瘡草



### 金並銀臺

俗云幾年世在

杏葉草

長春花

本綱金並花苗高四五寸葉似初生蒿苗葉厚而軟抱莖

而生莖柔脆莖頭開花大如指頭金黃色狀如蠶子四時不絕夏月結實在莖內宛如尺蠖蟲數枚蟠屈之狀其葉味酸煨熟水浸過油鹽拌食有治腸痔下血之功

△按蓋音杯也其花形也近時出白花者為珍俗以為金錢花誤也



金錢花

夜落金錢  
子午花  
和名抄俗云  
古無載  
今云午時花

畫譜云出自外國梁時外國進花朶如錢亭可愛

倭名抄云梁簡文帝有金錢花賦

△按金錢花葉狹長有鋸齒五六月開花深紅色形圓如錢其色狀甚可愛日午盛夜子落俗呼日午時花

以全馬金錢花者甚誤也



葶藶

丁歷 葶藶  
狗齋 太室  
大適

和名波末太加奈  
一云阿之奈豆奈

本綱葶藶叔世云波初春生苗葉高六七寸似薺根白色莖莖俱青三月開花微黃結角子扁小如黍粒微長黃色月令云四月靡草死注曰靡草薺葶藶之屬是也蓋有甜苦二種其甜者不藥入用入箱中時其氣味俱厚不減大黃以洩陽子苦寒降氣以導腫氣其氣味俱厚不減大黃以洩陽分肺中之閉亦能洩大便輔之大棗其苦者下泄之性急既泄肺而易傷胃病人稍涉虛者宜遠之

△按葶藶俗云狗齋豆奈出於攝州者良播州者次之然非真葶藶子多用齋子偽之葶藶出干



### 車前

當道車輪菜  
若以鼠糞衣  
馬為牛遺  
牛舌地衣  
和名於保波方

本綱車前草好生道邊及牛馬跡中故名之春初生苗葉  
布地如匙面累年者長及尺餘中抽數莖作長穗如鼠尾  
花甚細密青色微赤結實如葶藶赤黑色

子甘寒利小便而不走氣與茯苓收難產又治目赤痛  
本大抵頂佐他藥如六味地黃丸之用澤瀉可也非單用  
久服之物

△樓車前子大葉出於藝州者良攝州丹州次之今人取其葉傳一切腫物初發者然未知的搗瘡血出者車前子少糝和令吃之者有搗



### 狗舌草

本綱狗舌草生渠塹濕地似車前葉而無文理抽莖開花  
黃白色四五月採莖暴乾  
氣味苦寒有毒  
治蟲疥瘙瘡殺小蟲為末和涂之即瘥



### 馬鞭草

龍牙草  
鳳頸草  
和名久未豆々良

本綱馬鞭草春月生苗方莖葉似益母對生夏秋開細紫

花作穗如車前穗又類鞭鞘故名馬鞭其子如落子高子而

苗葉苦微

破血行血活血治金瘡通月經治水腫鼓脹

大腹水腫馬鞭草鼠尾草各一斤水一斗煮取五升去滓再煎令稠以粉和丸大豆大每服二三丸

加至四五男子陰腫大如升核痛人所不能治者搗塗

按馬鞭草處處有之攝州之產良陰囊腫痛者用馬鞭

草鼠尾草煎汁洗之佳

威蛇蛇銜

紫背龍牙

小龍牙

### 蛇含草

俗云岐良草



甘巴エ ハアツツアツ

本綱生土石上或下濕地其葉似龍牙而小背紫色一莖五葉或七葉當用細葉有黃花者但有二種細葉者名蛇銜大葉者名龍銜

氣味苦微寒傳蛇虺蜂毒及丹毒瘡腫即愈人家種之亦

令無蛇只用葉晒乾勿犯火根莖不用其根名女青

異苑云有田父見一蛇被傷一蛇銜一草著瘡上經日

傷蛇乃去田父因取其草治蛇瘡皆驗名曰蛇銜草

勿誤用有葉尖葉者號竟命草味酸誤服令人吐血不止

速服知時子解之

### 女青

一名雀瓢

本綱女青即蛇銜根也

氣味辛平人卒暴死者搗女青屑一錢安咽立活也又

辟穰瘟疫正月上寅日搗末女青盛

一種有藤生者生平澤葉似蘿摩兩相對子似瓢形大如

棗許故名雀瓢根似白微莖葉並臭也然則女青有草

生藤生二種矣

△按岐良草生山中移種濕地葉花異峴草

和藪三材圖會

濕草

卷之四



勸濟山陵翹  
鳥草 水青  
私名美命月波木  
俗云水掛草

チノイノツツ

本綱鼠尾草下濕地有之葉如蒿莖端夏生四五穗若草  
前又似鼠尾花有赤白紫三種莖葉俱可以凍皂四月採  
葉七月採花陰乾

花葉苦微 古方療痢多用之 久痢時止時作搗末飲

服一錢 治連年下血鼠尾草地榆二兩水二升煮一

可為 反花瘡生惡肉如飯粒破之血出隨生反

△按鼠尾草多出自攝河州干蘭盆聖靈祭用鼠尾草供

水因稱水掛草無別意但穗花長俗傳鼠尾草莖葉浸

醴投陰地不日蛎喻化生亦一異也海帶浸雨水則化

蛭之類矣



莠音光明  
阿羅漢草  
和名惠沼乃  
古久佐  
俗云波久佐

ケウノイツル

本綱狗尾草原野垣墻多生苗葉似粟而小其穗亦似粟  
黃白色而無實又穗形象狗尾故名又秀而不實故字從  
秀為莠凡赤眼拳毛倒睫者翻轉目瞼以一二莖蘸水浸  
去惡血甚良

△按狗尾草原野多有之小兒用之鈎姓戲者



蓮子草 墨煙草  
金陵草 旱蓮草  
黑頭草 糊孫頭  
猪牙草 黑莖菜  
和名赤木多之

リイノチヤ

本草三才圖會 卷之九

本綱鱧腸草葉似柳而光澤莖似馬齒莧高一二尺開花細而白其實若小蓮房鱧鳥魚也其腸亦鳥此草柔莖斷之有墨汁出故名鱧腸

一種苗梗枯瘦頗似蓮花而黃紫色實亦作房而圓是乃小連翹折其苗則皆煮汁出須臾而濕

鱧腸草 甘酸 治血痢灸瘡血出不止傳之立已塗眉髮

生速而繁烏髭髮傳一切瘡止血排膿繫臂截瘡此草在良女右起小泡謂之天灸其瘡即止甚效

△按鱧腸草是也蓮草田野濕地多有之折苗莖則出黑汁葉似柳小花蔭生而小正白不攢



連翹

本綱連翹相此如翹故別有大小二種子亦有二種

連音早蓮子 異翹三藤 蘭華 根名 連翹又名竹根 和名以多知久性 云以大知波觀

大翹生下濕地或山岡上青葉狹長如榆葉水蘊葦莖赤

色高三四尺獨莖稍間開花黃色秋結實似蓮內作房瓣根黃如蒿根

小翹生岡原之上花葉實皆似大翹而細南方生者葉狹而小莖短纒高一二尺花亦黃實房黃黑內含黑子如粟粒亦名早蓮

出於蜀中者子似椿實之未開者殼小堅而外完無附莖

剖之則中解氣甚芳馥其實纒乾振之皆落不着莖也

出於江南者子如茵蔯殼柔外有附莖抱之而無解脈亦無香氣乾之雖久着莖不脫此甚相異蜀中者為勝

連翹苦平氣味俱薄其用有三瀉心經客熱一也去上焦諸熱二也為瘡家聖藥三也入手足少陽手陽十二經瘡藥中不可無此乃結者散之義

△按連翹本朝古有之今無也而今有連連翹者與以上之形狀稍異記于左



倭連翹

按倭連翹枝莖柔垂似蔓而非蔓高者丈余周迴不過七八寸似草而非草也三月開花純黃形似桔梗花形而小繁茂遠望之如葉其花罷生葉似梅葉而微長小兩兩對生六七月葉間結實形似綿桃而小生青熟黃黑色中子生白熟褐色本草謂小連翹出於南方者是



萌蘗

花曰陸英  
和名抄云朔屬  
二音此間音曾  
今通云曾久  
今通云曾久

本綱萌蘗春抽苗莖有節節間生枝每枝五葉葉大似木芥其花白其子初青如綠豆顆每象如蓋面大又平生有一二百子十月方熟紅其花曰陸英芥及接骨木三物亦同一類故芥名木英接骨木名木英萌蘗名陸英花葉並相似

萌蘗 酸温或陸英 寒苦 云苦凉

治骨間諸痺四肢拘攣疼酸肌皮

按萌蘗原野多有之人用浴湯云治折傷小瘡



藍

覽音  
右有五品所  
圖藍藍也  
和名阿井

本綱蓼藍人家蔬圃作畦種至三四月生苗高二三尺許其似大蓼花紅白色實亦若蓼子而黑色五六月采實但

其葉可染碧不堪作澱

菘藍葉如白菘馬藍葉如苦蕒亦名大葉冬菘此二藍

花子並如蓼藍吳藍莖長如蒿而花白木藍莖長如

大明高者三四尺分枝布葉葉如槐葉七月開淡紅花結

角長寸許累累如小豆角其子亦如馬蹄夫明子而微小

迥與諸藍不同而作澱則一也皆性味不遠其藍子則專

用蓼藍

藍實苦寒解諸毒殺蟲蛟蛟音其利五臟調六腑通關

節益心力明目療毒腫

葉汁寒若甘殺百藥毒及蜂蜘蛛斑蝥砒霜石等毒藍汁

一益入雄黃麝香以點毒蟲咬處仍服其汁神妙如無

澱汁以青縹布試以一蜘蛛投入汁中隨化為水

應聲蟲病疾出奇腹中有物作聲隨人語言名應聲蟲

病用板藍汁一盞分五服效卒自縊死者灌之

唇邊生瘡連年不瘥者以生藍汁洗之

按藍京洛外之產為上攝州東成郡之產最勝阿波

路之產次之莖葉大者稱高麗藍中者稱京蓼小者稱

廣島藍三月下種四月植苗喜旱而好水有蠹能蝕其

葉頻灌煙草莖汁防之凡植七十日許未作穗時晴且

乘露拔採四五日曝乾去根莖用葉累薦漬池水一日

滴水攤之下布筵二層上亦蓋筵二層宿蒸之至六七

日再三攪之經二十日取出醒熱氣能採以鹿麈篩去莖

節再乾收取俗名揉藍阿井美

又未經篩者曰擣丸如餅俗名玉藍阿井

京洛之藍荊葉不着根莖故不採亦用之染色淺青美

凡欲收藍實者荊時殘莖四五寸許則嫩芽再生出穗

### 藍澱

和名阿井之流



本掘地作坑以藍浸水一宿入石灰攪至千下澄去水

和名阿井之流



則青黑也亦可乾收用凍青碧又收藍澱浮沫謂靛花氣味辛苦解諸毒傳熱瘡止血殺蟲治噎膈與石灰作

解毒殺蟲之功似勝於藍唐永徽中有一僧病噎不下食數年臨終命其徒曰吾死後可開吾胃喉視有何物苦我如此及死其徒依命開視胸中得一物形似魚而有兩頭遍體悉似肉鱗安鉢中跳躍不已戲投諸味雖不見食皆化為水又投諸毒物亦皆銷化一僧方作藍澱因以少澱投之即怖懼奔走須臾化成水世傳澱水能治噎疾蓋本干此



靛花青蛤粉

靛花青蛤粉  
去眉色也滅代之故名之

本綱青黛以藍為之攪劉藍澱之浮沫掠出陰乾謂之靛

花即青黛也

氣味鹹寒

解諸藥毒治小兒驚癇及疳熱瀉肝散鬱火

消食積吐血下血咯血傳金瘡惡腫陰瘡

按青黛和薄共有之漢者呼青黛深青倭者呼藍蠟淺青

用為畫具最入藥用亦佳



蓼

和名多天


本綱蓼其類甚多有青蓼香蓼水蓼馬蓼紫蓼赤蓼木蓼之七種紫赤二蓼葉小狹而厚青香二蓼葉亦相侷而俱薄馬水二蓼葉候濶天上有黑點木蓼天蓼蔓生葉侷柘

凡蓼花皆紅白子皆大如胡麻赤黑而尖扁惟木蓼花

青日子史青滑諸蓼並冬死惟香蓼宿根重生木蓼出於灌木類  
 苗葉一食之過多有毒發心痛和生魚食令人脫氣陰  
 核痛未死二月食蓼傷人胃婦人月事來時食蓼蒜癢  
 為淋古人種蓼為蔬禮記云烹雞豚魚鼈皆實蓼干其  
 腹中而和羹膾亦須切蓼也後世飲食不用惟造酒麴  
 者用其汁耳

此蓼花以多而實之五月結實秋之乃多其肉甚長  
 五月月のはるに生るまをれりやふあふ

△按青蓼喜濕地二三月生苗四五月繁茂至秋作穗開  
 細花紅白色播州津由每出穗蓼羊中有穗亦一異也  
 夏月摘其葉與鮓同食以為必用之物食魚膾用蓼酢  
 又採穗鹽漬與醢同食亦可也蓋有和生魚食之令人  
 脫氣之言則不可多食  
 乾蓼莖煮汁味甘僧侶用代鱉肺蓋造酒麴者用其汁  
 者未有之古今食品之用不用異同如此也鼈惡蓼賊  
 捕鼈入蓼於鼈口則出用苦矣



水蓼

虞蓼 澤蓼



馬蓼

大蓼 黑記草

凡物大者以馬名

本綱水蓼生下濕水澤中葉似馬蓼大干家蓼而長五六  
 寸莖赤色水按食之勝干蓼子  
 莖葉辛 蛇傷傳之如蛇毒入腹心悶者絞汁服之

此蓼花以多而實之五月結實秋之乃多其肉甚長  
 五月月のはるに生るまをれりやふあふ

綱馬蓼生下濕地高四五尺莖斑葉大每葉中間有黑

細葉三寸闊者

如墨點記有兩三種其最大者即水荳也



荳草

鴻蘂 龍古  
遊龍 石龍  
天蓼 大蓼

和名伊泥多天

本綱荳草生水旁如馬蓼而長大其莖粗如柳指有毛其葉大如商陸葉其花淺紅色成穗秋深子成扁如酸棗仁而小其色赤黑而肉白不甚辛詩大雅云隰有游龍者即是也

△按荳草大蓼之大者也凡物大者曰馬馬蘭馬藍相似之類是也而可紛其物者以犬為和名大山椒犬碗犬蓼亦有數種水蓼馬蓼共為犬蓼六月六日製神麴用蓼汁者以水蓼為良犬蓼之莖燒為炭為懷爐之炭佳勝於茄蓼之炭能保火

毛蓼

俗云介太天



本綱毛蓼生山麓似馬蓼葉上有毛久根不死蓋此與澤濕之蓼不同

莖葉辛温有毒治癰疽瘰癧疥碎納瘡中引膿血生肌△按俗有用毛蓼為疝氣藥煎服者恐有毒之草多服則有害蓋水荳花治心氣疝痛及痞積與此相誤傳來乎



火炭母草

ホウタンモツアウ

本綱火炭母草生原野中莖赤而柔似細蓼葉端尖近梗形方夏有白花秋實如椒青黑色味甘可食葉味酸乎有毒  
△按蓼類為炭能保燼也蓋此草蓼類而特有火母功乎



### 三白草

和名加太之呂久佐  
俗云半夏草

本綱三白草生田澤畔八月生苗高二三尺莖如蓼葉如商陸及青葙四月其顛三葉面上二次變作白色餘葉仍青不變俗云一葉白食小麥二葉白食梅杏三葉白食黍子五月開花成穗如蓼花狀而色白微香結細實根長白虛軟有節鬚狀如苜蓿根  
氣味甘辛寒有小毒 治水腫脚氣利大小便消痰除積聚  
△按本草蘓恭注云三白草葉上有三黑點非白也仍和

名抄亦用其說共非也半夏生時分變白故俗曰半夏草



### 虎杖

苦杖 太蟲杖  
斑杖 酸杖  
和名伊太止里

本綱虎杖生田野三月生苗莖如竹筍狀上有赤斑點初生便分枝子亦似荏蓼葉圓似杏葉七月開花花狀似菊色似桃花九月結實又有無花者根皮黑色破開即黃似柳根

虎杖根 溫甘微 通月水 婦治五淋 淋最奇如石止渴解熱毒 暑月以根和甘草同煎為飲色如琥珀可愛甚甘美瓶置井中令冷徹如水時人呼為冷飲子啜之且尊於茗 極解暑毒其汁染米作糜饌益美

和名伊太止里

△按虎杖根出於金剛山者良小兒折其莖剥去皮啜之  
 味酸故名酸杖大抵高者不過三四尺然松前之虎杖  
 高丈餘而如木數冬有者蜀本草言木高丈餘而宗奭  
 疑以為非蓋隨土產有不同豈惟虎杖耶  
 日本紀云反正帝生淡路宮時於是有井汲之洗太子  
 時多遲花落有干井中因為御名號多遲比瑞齒別天  
 皇多遲花者今虎杖花也

治奔怪病 人忽遍身皮底混混如波浪聲痒不可忍抓  
 之血出不能解謂之氣奔以虎杖人參青鹽細辛各一  
 兩作一服水煎細飲盡便愈

### 蛇蘭草

本細蛇蘭草生平地其葉似虎杖而小節赤高一二尺種  
 乏辟蛇凡蛇虺毒蟲等螫取根葉搗傳吹處當下黃水

△按蛇蘭草生池隄虎杖之一類二種也



藕 音 尤  
 馬唐 馬飯  
 羊麻 羊粟  
 軒干 蔓干  
 俗云美曾無及良

本細藕生潑稻田中節節有根着土如結縷草而葉長堪  
 飼馬馬食之如餵如飯羊亦食故名之其氣猶臭故曰藕  
 猶者朽木臭也  
 按藕俗云溝渚處處生麥田及溝葉細小而長



扁蓄 音 入 入  
 扁竹粉節草  
 扁辨道生草  
 扁蔓  
 和名宇之久佐

本綱篇竹春中布地生道旁苗似瞿麥葉細絲如竹及落  
 帚葉而不尖莖赤如釵股而弱引蔓促節三月節間開細  
 紅花如葇藍花結細子根如蒿根爐火家燒灰煉霜用  
 根苦平 治熱淋瀝痛利小便霍亂黃疸瘰癧女子陰蝕及  
 痔又小兒蛇咬心痛面青沫出臨死者以水一石煎至  
 一斗去滓煎如空心服一升虫即下也仍常煮汁食  
 陽隔宿勿食 按篇蓄處處原野路邊多有之



本綱蓋草生山谷葉似竹而細薄莖亦圓小煮以泔黃色  
 極鮮好詩云終朝採綠不盈一掬又云策竹荷荷是此蓋  
 草也

蓋草

黃草 鴨脚莎  
 葇竹 葇蓐  
 葇草 執蓋草  
 王芻

氣味平 治久欬上氣喘逆又洗一切惡瘡效

按倭名抄云蓋草一名加木奈黃草加木奈本朝出二  
 處以為二物者非也多出於越前以為漆家必用之物  
 蓋汁加明紫漆黃則令色不脫也或  
 下漆藍上用蓋汁再漆則成藤懸色



茨藜子

茨 旁通  
 屈人 止行  
 休羽 升推  
 和名波萬比之

本綱茨藜生道上及牆上布地蔓生細葉如初生皂莢葉  
 整齋可愛開小黃花其子有三角四刺實有仁其刺狀如  
 菱而小人行多着木履今軍家乃鑄鐵作之以布敵路名  
 鐵茨藜也蓋茨藜有二種 杜茨藜  
 白茨藜 一名沙 綠葉細蔓綿布沙上七月開花黃紫色

和名三寸圖繪

和名

和名

和名

如豌豆花而小九月結實作莢長寸許內子大如脂麻  
如羊腎而帶綠色

蒺藜子溫若治惡血積聚癥及婦人帶下催生久服長肌  
肉明目輕身妙黃色

神仙方云蒺藜子為末每服二錢新汲水日三服勿令  
間斷服之一年冬不寒夏不熱二年老者復少髮白復  
黑齒落重生輕身延年辟穀長生又治三十年失明眼  
△按蒺藜生濱邊故稱濱藜出於豫州者良紀州者次之



戴星草  
流星草  
文星草

本綱穀精草收穀後荒田中生之一科叢生莖葉俱青似

嫩穀秧抽細莖高四五寸莖頭有小白花點點如亂星

餒馬令肥九月採花陰乾可結水銀

一種莖梗長有節根微赤者有之  
花辛溫性浮能上行治眼病加而用之甚良明目退翳之  
功似在菊花之上穀精草防風等分為末米飲

△按穀精草出於參州今郊野開而白如雪亦如花者  
名糕音祿俗此花似之故名波世草



竹園荈  
俗云頂奈久佐  
又云多不岐久佐

本綱海金沙生山林下莖細如線引于竹木上高尺許其  
葉細如園荈葉而甚薄背向皆青上多皺文皺處有細沙

海金沙  
ハイクシスア

狀如蒲黃粉黃赤色不開花細根堅強其沙及草皆入藥  
七月收其全科於日中暴之小乾以紙襯裏以杖擊之有  
細沙落紙上且暴且擊以盡為度  
氣味甘寒 小腸膀胱血分藥也熱在此二經 熱淋急痛  
者為末煎生甘草湯調服二錢或加右妙  
△按海金沙和漢並用之出於江州者良又用江浦草子  
偽之試之然不粘者真也如熱土而粘者偽也

地椒



### 水楊梅


本綱水楊梅生水邊田野叢生苗葉似菊莖端開黃花實  
如楊梅狀類椒而不赤氣味無毒溫治疥瘡腫毒  
△按毒草部所載石龍芮與此形狀相似疑是一物二種

矣其石龍芮葉似和人參葉而有光澤詳毒草條下  
有一種俗云柳草 生田野其莖圓其葉似菊而長似柳  
而有齒莖端開小白花結子似楊梅而青此所謂水楊  
梅乎然花有黃白之差

ひろくさ

### 蜈蚣草

ウ、コシツ石ウ



本綱蜈蚣草生村落墜野間左蔓延右右蔓延左其葉密  
而對生如蜈蚣形其穗亦長俗呼過路蜈蚣  
其延上樹者呼飛天蜈蚣也根苗皆可用  
氣味苦寒 解諸毒治大便不通癰腫搗塗或末服排膿

蜈蚣傷者入鹽少許搗塗○托裏散切癰疽及腸癰  
已破而膿血不散發熱疼痛能食者並宜排膿用或  
蜈蚣赤芍藥當歸甘草等分為末每服二錢溫酒下

本草綱目卷之九十九





碎米薺

もんげもん

俗云蓮華花

救荒本草云碎米薺三月米葉可作羹

按雖不謂其形狀而所圖似今云蓮華花也蓋碎米薺之名義未解也蓮華花春生苗其葉似皂莢及槐之嫩葉兩兩對生枝莖布地如蔓節上抽莖頂開花自三月至四月末盛其花淡紫色本間有白處形似蓮華故名結莢三稜黑色長五六分中有細子自撒易生其多處如敷錦於地人以爲野遊之一興有白花者和列多有之能治湯火傷揉葉傳汁一種有似碎米薺莖葉而四月開正黃花者其花生莖末形如半邊蓮五月結莢長一寸許似野豌豆



半邊蓮

はんぺんれん

急解索

はんぺんれん

本綱半邊蓮生陰濕墜塹塹邊小草也就地細梗引蔓節節而生細葉秋開小花淡紅紫色止有半邊如蓮花狀故名氣味辛平治蛇傷搗汁飲以滓圍塗之按半邊蓮和列河列堤邊有之一莖叢生如蔓葉似碎米薺而秋開淡紫花如刀豆花樣而小似半蓮



紫花地下

あはちん

獨行虎

羊角子  
箭頭草  
米布袋

あはちん

本草綱目卷之...

本綱紫花地丁處處有之其葉似柳而微細夏開紫花

平地生者起莖溝壑邊生者起蔓又云鄉村籬落生者夏秋開小白花如鈴兒倒垂葉微似

木香花之葉此與紫花者相戾恐別一種也氣味苦辛治癰疽發背無名諸腫貼之如神連根以白

麩和成鹽醋浸一夜貼之昔有一尼瘰癧下瘡此草根

去粗皮同白蒺藜為末油和塗神効

△按紫花地丁未考後名凡抽薹梢着花狀頗似釘者得

地丁之名蒲公英為黃花地丁則紫花地丁者今云蓮

華花而本綱之註亦能當矣然畫圖之形狀不似蓮華

花故不決救荒本草碎米薺之圖宛然似蓮華花故重

出之



### 鬼針草

鬼針

クイチツノウ

本綱鬼針草生池畔方莖葉有極子作釵脚着人衣如針故名之氣味苦平治蜘蛛蛇咬梓汁服併傳又蠟蠹傷塗之

### 根把草

一名即耶草

本綱根把草生山澤高三四尺葉作鴈齒如鬼針草苗葉有極如釵脚狀

氣味苦平與鼠尾草功用近故本草見鼠尾草下今附于此

本草綱目卷之...

本草綱目卷之...

筠列



見腫消

クニキニスマリ

本綱見腫消生筠列春生苗葉莖紫色高一二尺葉似桑而光面青紫赤色

氣味酸澀有毒消癰腫及狗咬搗葉貼之

△按見腫消名義其功可知而倭如此草未見識者但此圖三才圖會所圖也而有二品葉形大異



草綿

蠶綿曰真綿故稱之木綿別有木綿即斑枝也出灌

古終 久佐和夕 俗云木綿

本綱有草木二種似木者名古良出干澤木類似草者名古終此種出南番宋末始入江南今則徧及江北與中州矣不蠶而綿不麻而布利被天下其益大哉四月下種莖弱如蔓高者四五尺葉有三尖如楓葉入秋開花黃色如葵花而小亦有紅紫色者結實大如桃中有白綿綿中有子大如梧子亦有紫綿者八月采採謂之綿花並出中核紡為細纒以為帛甚軟白子油微辛熱治惡瘡疥癬燃燈損目史炤釋文云木綿江南多有之以春二三月下種既生須一月三薙至秋生黃花結實及熟時其皮四裂其中纒出如綿土人以鐵鉞碾去其核取如綿者以竹為小弓長尺四五寸許牽弦以彈綿令其分細卷為筒就車紡之自然抽緒如線綿狀織以為布

類聚國史云桓武天皇延曆十八年七月有一人乘小舟

本草綱目卷之...

草綿

本草綱目卷之...

...

二河國以布覆身有犢鼻不著袴左肩著布形似  
袈裟年可計身長五丈五寸耳長三寸餘言語不通不知  
何國人太唐人等見之僉曰崑崙人後頗習中國語自謂  
天竺人常彈一弦琴歌舞哀楚閱其資物有如實者謂之  
綿植依其願令往川原寺即賣隨身物立屋焉後遷往近  
江國國分寺十九年四月十二日以彼綿植賜紀伊淡路  
阿波讚岐伊豫土佐及太宰府等諸國植之其法先簡陽  
地沃壤墾之作穴深一寸衆穴相去四尺乃洗植漬之令  
經一宿明且植之一穴四樹以土掩之以手按之每且灌  
水常令潤澤待生芸之

按相傳昔昔蠶綿之外以穀皮為衣服謂之木綿謂由  
中古草綿始也本朝桓武朝先於中華凡可二百餘年矣  
今聞唐綿灰白色不如倭綿潔白者也下種先漬水一  
宿可糝灰否則生出而蠟子害其苗蓋有早晚早者八  
十八夜以後於麥苗之際撒之晚者四月於麥攬株傍

撒之既生待梅雨晴可拔去繁生者稍長後摘去楠葉  
至立秋前三日則止其花向日性惡北風喜西風最惡  
雨濕從來南方之種也俗呼曰日照草是也如值濕雨  
則桃不開口而凋謂之保呂綿為濕熱所蒸則不意葉  
凋落此乃綿之病名阿天急乘朝露

大抵枝葉花似黃蜀葵而花淺黃色其實如桃呼曰綿  
桃四裂中吹出白綿以攪車緣去中子其子小者精綿  
多稱殖生綿為上品類甚多有白花者有本赤末白  
花或曰午前黃色午後赤紫色者名曰半變

多田綿 出於攝州花黃而綿甚白細強最良然不  
盛生故今多不種用  
蝦手綿 其葉深刻如蝦手樹葉故名之白花而桃  
大其綿潔白然桃數少  
神樂綿 其花有自有黃叔亦攢生儼似神巫所持  
鈴故名種之有大利

神樂綿 鈴故名種之有大利

佐利綿 出於河州其枝葉帶赤色其花本淡紅而黃色或名赤叔者亦此類也燥之能殖生凡神藥佐利之二品為最上三十余年以來行于世蓋佐利者棄去之訓也相傳有人變於子種始得此種有聲乞之而不與然棄去其妻故名但恨不肥圃不能茂

煙草綿 其葉青色而枝極際生小葉形如煙草芽故名之桃小而不佳

凡攝津及備後之產為最上播磨丹波備中並佳河州紀州次之泉州為下其他亦出處不收舉但北國不種凡至白者無如攝州者緒細者無如河州者大顆者無如丹波者

綿子 綿核 一桃中子六七或八九有之小者綿佳其用甚多也磨末榨燈油謂白油光大明也榨糟為田糞良其磨殼燒灰以代薪其灰以琢鋼鐵黑鏽垢能脫其灰汁以洗布帛汚穢去為純白造糕屋作賊果子

以綿子灰汁少許和麩糕令果子脹大然有小毒綿子油濁不堪燈用攝州平野人加用石灰少許則澄始考澄法今盛用



秋海棠

ツウハイダン

爛腸草


三才圖會云秋海棠近日見人取梗去皮蘸糖霜吃頗清香其花艷麗可愛

任權鯉草本花詩譜云秋海棠嬌冶柔軟其同美人捲粧此品喜陰一見日色則瘁九月收枝上黑子撒於盆內地

上明春發老根過冬發花更茂

△按秋海棠莖葉畧似款冬而小軟有艷梗帶赤色抽莖開花似蕙蘭玉簪花之輩而淡紅可愛其子生枝葉間形色似零餘子而大如豌豆種之易生

和漢三才圖會 卷九 野草 二



兔兒傘

俗云敵菅草

救荒本草云兔兒傘生荒野中苗高二三尺許每科初生一莖莖端生葉一層有七八葉每葉分作四叉排出如傘蓋狀故以為名後於葉間攬生莖又上開淡紅白花根似牛膝而疎短採嫩葉煤熟換水浸淘去苦味油鹽調食  
△按兔兒傘五月開黃花似菊而如敵笠狀



樊噲草

俗稱未詳

△按樊噲草高一二尺一莖一葉有七切又似兔兒傘葉而小莖端開小白花畧似慈姑花或名之曰敵菅笠兔兒傘名樊噲會草者亦有



岡萍蓬草

鐵輪花 共俗稱

△按高一尺許葉圓小徑一二寸畧似萍蓬草葉三四月抽莖開黃花似單葉梅花樣



紫羅襪花

草木花詩譜云紫羅襪花其草本色紫翠如鹿葱花秋深

和漢三才圖會 卷九 野草 二

分本栽種四月發花可愛



翠蝴蝶

竹節菜  
翠蛾眉  
簞竹花  
倭青草

鴨跖草之一類乎  
見本草卷一  
可考合

農政全書云翠蝴蝶南北皆有山野中亦有之葉似竹葉微寬短莖淡紅色就地叢生攢節似初生嫩葦節初葉間開翠碧花狀類蝴蝶其葉味甜採嫩苗葉焯熟油鹽調食



蝴蝶草

玉蝴蝶

草本花詩譜云蝴蝶草花儼若蝶狀色黃上有赤色細點

關葉秋時分種

續醫說云雲南臨安之南產靈草狀似蝴蝶名之玉蝴蝶凡仕宦閩廣者以此草綴於衣領中可以預知靈毒領中颼颼作聲其家臭齷斷不可食矣無毒則寂然無聲以是為驗此草雖土人亦罕得之劉紹卿官遊此地得藏于家  
△按玉蝴蝶翠蝴蝶共是一物乎唯花色黃與翠之異耳  
本朝未聞有之其花美而知毒之有無也誠有益草也



鶴子草

不記莖葉之形狀

本綱下有之之鶴子草蔓草也當夏開花形如飛鶴翅羽皆距皆全是媚草採曝以代面壓蔓上春生雙蟲食葉收入粉奩以葉飼之老則蛻而為蝶赤黃色女子收而佩之名

和藥

和藥

和藥

和藥

媚蝶  
△按鸞子草此云鸞草之類者乎然鸞草不蔓鸞子草蔓也當入蔓草部而以花異形列蝴蝶及鸞草類



連路鳥

### 鸞草

鸞草  
佐破草  
連路鳥草  
豆禮佐破  
共俗稱也本名未詳

△按鸞草興州處處有之春生苗葉如麥嫩苗高尺許六月抽莖開花正白色如雪形似鸞鳥故名  
連路草豆禮與鸞草一類異種性惡濕喜陰處赤土原非濕草高五七寸葉畧大似万年青嫩葉而淺青色夏開花白色帶微青其形似鸞鳥十有余羣飛故名



### 絲線草

緒手卷  
共此俗稱  
本名未詳

△按絲線草高二三尺葉似胡蘿蔔葉二三月開花白色帶黃形似鸞故各名之  
一種有八重絲線草其花不單無周圍角籠也



### 善界草

俗稱  
本名未詳

△按善界草高六七寸葉似胡蘿蔔葉三月開花黑赤五形似寶鐸花罷後似白熊毛



和漢三才圖會 卷之十四 雜草



俗稱  
樹有列珠木

△按草列珠高二尺許叢生葉似桃葉六月多開小黃花



俗稱  
草蓮花

△按有草蓮花者高二尺莖韌垂葉如牡丹葉而狹少長又似淡雪草葉六七月抽莖開白花似蓮花而最小單葉其枝條垂而花向下甚艷美可愛  
△農政全書有蓮子草者狀與此葉形疑體腸草矣曰蓮子

草以其花之萼莢狀似小蓮蓬樣故名生下湿地苗高一尺餘莖紫赤色對生莖又葉似小桃紅葉而長稍間開細辨白花而淡黃心其葉味苦  
見體腸草  
前



俗稱  
淡雪草

△按淡雪草高七八寸葉似草蓮花五月抽莖開花白色細小似唐松草之輩



俗稱  
泡盛草

和漢三才圖會 卷之十四 雜草

△按泡盛草，高一二尺，一莖數葉，似草蓮花，而畧圓，夏開白花，細小似花苞之穗。

俗云九輪草

俗云九輪草



### 山萵苣

救荒本草云：山萵苣生山野間，苗葉撮地生，葉似萵苣葉而小，葉脚花又頗少，葉頭微尖，邊有細鋸齒，葉間攢莖開淡黃花，苗葉味微苦。

△按山萵苣，此云九輪草，乎似萵苣葉而扁，邊有細鋸齒，而葉脚窄，葉心莖淡紫，三四月抽莖開小花，似櫻草花而畧大，生於莖圍，八極各一樣，如車輪，至極如此七層，或九層，宛然似浮屠九輪，故名，有紅白紫三種，結子茶褐色，其葉心莖中有紫色，強系丸形狀，乃九輪草也。唯

山萵苣花色黃也，九輪草花未有黃色者，以為異。



### 櫻草

△按櫻草生山谷中，即九輪草之一類異種也。葉形相似，微小，邊無齒，刻不甚，光澤而葉心白。九輪草三四月抽莖，頂生花似九輪草花，而單淡紫色，或白色，又如櫻花，最艷美，故名櫻草。結蒴兒，青色，內結子，初青，後茶褐色，人家移種之。

山萵苣

本草綱目卷之九 澤草類 九葉草



### 九葉草

俗稱木名

△按九葉草高尺許一莖無枝葉似車百合葉而莖圍相列生九枚秋開黃花似旋覆花

俗稱木名



### 澤桔梗

△按澤桔梗高近二尺葉似山丹草葉而短三四月葉間開花形似桔梗而小紫色頗似水葵花而淺水中亦生多生濕地水草部

俗稱木名



### 丁子草

△按丁子草高尺許葉似澤桔梗而細長又似山丹草葉而細三月葉間著花層層其形如丁子而紫色結莢大如綠豆而一拊二莢向上如角

俗稱木名



### 替波丁子

△按替波丁子高二三尺葉似山漆葉而小其花黃色似菊而小有單葉有千葉自六月至九月逐日開

本草綱目卷之九 澤草類 替波丁子



吉野静

俗稱未詳  
静者源義經  
之寵妾有於  
吉野山歌舞  
之事好事者  
比其美以名  
之

△按吉野静高尺許葉似澤桔梗而大三四月開花白色而紫彩點及赤黃色小點甚巧艷



二人静

俗稱未詳  
諸歌云静女  
之幽靈為二  
人同遊舞此  
花二朵相  
艷美以名之

△按二人静高尺許葉似櫻桃葉而厚三月葉間開白花形如蓼穗而二小朵成枝



千日紅

せんぢらべ

△按千日紅高二三尺莖似秋海棠而淡紫色葉似雞頭草而大面有毛茸八九月生花深紫色千葉圓而形似楊梅形其盛久可百日矣有樹名百日紅者以勝之稱千日紅不實唯收花二月採碎之蒔種生或挿枝亦活凡如菊花無實者近年知蒔花



粉條兒菜

黄菅草  
紅菅草  
共俗稱

口葉二十圖會  
濕草  
卷之四

農政全書云粉條兒菜生田野中其葉初生就地叢生長則四散分垂葉似荳草葉而瘦細微短葉間攢葶間開黃花葉甜煨熟油鹽調食

△按黃菅草高二三尺葉似荳草而細硬又比菅則少潤六月開花黃色單葉似姬荳草花所謂粉條兒菜是也紅菅草葉與黃菅草同抽莖開花濃紅色似荳草花



### 蕺荷草

俗稱本名

△按蕺荷草高二尺葉似蕺荷四月抽莖開花如穗而細白花



### 緜摺草

俗稱本名

古者與州信夫郡出緜名緜摺其文如亂髮而美以此之名乎

△按緜摺草高五六寸葉如初生稻苗而細軟三月開花如穗而色淺赤



### 亂菊

俗稱本名

△按亂菊高七八寸葉似櫻而厚狹小其枝極繁七八月葉間抽細莖著花淺紫色如穗一種有白花者



### 水引草

俗稱木綿  
紙燃彩  
絲繩  
水引此草穗  
莖稍似故名  
水引

△按水引草高一二尺葉似楊柳而不嫩秋出長穗著小花紅色其莖圓纖如紙熬鬚及水引故名



### 杜鵑草

俗稱木綿

△按杜鵑草高尺餘葉似百合葉六七月抽莖葉間開小黃花或白或白入紫蒼子或濃紫入白蒼子一種白色有淺紫點名之山杜鵑



### 螢草

俗稱木綿

△按螢草高尺許葉似櫻葉而小四五月開小白花有紫瑤而花多著



### 虎尾草

農政全書有  
虎尾草莖葉  
形狀似之然  
不言開花

又山草有同名各別也

一按虎尾草高二尺許葉長三四寸末窄尖深綠色厚有鋸齒六月莖端著花極細白如穗末窄似獸尾故名一種有淺紫色者瑤瑤色



### 玉毬花

俗云松中草

△按玉毬花高七八寸葉畧似蕪菁葉而小四五月抽莖開花淺紫色細小



### 雉子竄

俗稱本名此草葉細密雉子逃隱可免獵佃故名


△按雉子竄高二尺餘葉似柝菜葉而細密三月葉間著小白花極細難見隨結子青圓秋熟則赤大如南天之子



### 猩猩袴

俗稱本名

△按猩猩袴高六七寸葉似蕙而短五六月開花淺紅色似櫻草花而稍小



### 熊谷草

俗稱本名

△按熊谷草高五六寸葉似款冬而小三月抽莖開花內有細苔子花形似母衣源氏武臣有熊谷直實者一合戰有功其圖負母衣形勢讚之此草形似母衣故以熊谷名之迂遠之甚者也

本草綱目卷九十四

農政全書所圖如左而  
花似矢頭與本文不合  
疑畫工之訛



やくぐそく

箭頭草  
俗云矢筈草

又別有矢筈草  
見于後

農政全書云生田野中苗初掘地生葉似鉞箭頭樣而葉  
蒂甚長其後葉間攢莖開紫花結三瓣萌兒中有子如芥  
子大茶褐色味甘今人用根葉搗傳諸種毒良  
△按矢筈草高一尺許葉厚青色類蕎麥葉又似矢羽形開  
小白花帶微紫結子如芥子大



ふうろうそう

俗稱木訛

△按風樓草高六七寸葉似毛茛葉而有毛三四月葉間  
出莖開花單葉紫色形似梅花



かろせきそう

俗稱木訛

△按夏雪草高二寸許葉似草烏頭葉而小春開小白花  
單葉似梅花其根似生薑而小



しめいそう

俗稱木訛

今以梅花為  
衣服之文呼  
曰梅鉢故名

△按梅鉢草高四五寸葉畧圓厚小而青色帶赤二月開

梅鉢草

梅鉢草

梅鉢草



△白花單葉似梅花蓋風樓草夏雪草梅鉢草一輪草之  
花皆似梅一葉草葉似風樓草葉

俗稱本名



### 鹽竈草

△按鹽竈草高六七寸葉似小菊葉無切又秋開花淺赤  
色而小

俗稱本名



### 碇草

△按碇草高五六寸細莖葉似猴潑木葉三月開小白  
形如舟碇又有紫花者

形如舟碇又有紫花者

俗稱



### 華鬢草

△按華鬢草高尺餘葉似石龍芮而小三月莖端開花淡  
紅色作房其花排畧長似鈞華鬢狀故名

俗稱本名



### 曼陀羅花

△按此云曼陀羅花高六七寸葉似華鬢草葉三月抽莖  
開花黃色帶微赤而小蓋法華經曰雨曼陀羅華者即

毒草類自同  
名不同

和漢三才圖會 曼陀羅花

朝鮮朝顏也

詳見于毒草類

和漢三才圖會

卷九十四

名九十四之末(三十七)



### 潮風草

俗稱未詳

△按潮風草高二三尺葉似紫苑而短小三四月開花黃色作房又有赤者



### 有馬草

攝列有馬名有之故名

△按有馬草高尺許葉似初生椴櫚葉而小二三月抽莖開黃花形畧似蘭花而不香



### 逢坂草

俗稱未詳

△按逢坂草高七八寸葉似眼皮草葉五六月開花形似眼皮草花形而有白紅淺紅之數品但莖莖弱長草見于前莖節帶黑故又名節黑遠列新坂多有之



### 日向堪

俗稱未詳

△按日向堪高三四尺葉似牛蒡葉而小六七月著花似楊梅形而圓大硬

和漢三才圖會

卷九十四

名九十四之末(三十七)

本草綱目卷之六 雜考 藤袴



### 藤袴

ふりてくま 俗稱 未詳

△按藤袴高二三尺葉似女<sup>オニメ</sup>即花葉而無切又六七月開細白花似繡線花此與礮邊草一類二種乎蘭和名曰藤袴和歌亦然而以此草呼同名

### 礮邊草

いさぐさ 俗稱 未詳



△按礮邊草高尺有余葉似藤袴葉四五月開花細白如繡線菊花而數朶美又淡紅色者有之

### 白絲草

俗稱 未詳



△按白糸草高五六寸葉似猩猩袴葉而細三月白花似穗又如筆頭

### 野鶴草

俗稱 未詳



△按野鶴草生原野中莖勁如蔓非蔓一極三葉大如槐葉三月開花於葉叔小黃色後結子小毬五顆攢生

和漢三才圖會 卷之六 雜考 藤袴

新法三才圖會  
菜譜  
鹽蓬



鹽蓬  
クハクハ  
鹽蓬

農政全書云：鹹蓬生水傍下濕地，莖有線楞，葉似蓬而肥壯。比蓬葉亦稀疎，莖葉間結青子，極細小。其葉微鹹，微寒。

花名茶花兒



望江南  
俗名蠶豆

農政全書云：望江南人家園圃中多種，苗高二尺許，莖微淡赤，色葉似槐葉而肥大，微尖，開五瓣金黃花，結角長二寸許，葉味微苦。



風花菜  
カクハクハ

全云：風花菜生田野中，苗高二尺餘，葉似芥菜葉而瘦長又多，稍間開黃花，如芥菜花。採嫩苗葉，燻熟水浸去苦味，油鹽調食。



白屈菜  
カクハクハ

農政全書云：白屈菜生田野中，苗高一二尺，初作叢生。

和漢三才圖會  
菜譜  
白屈菜

葉皆青白色莖有毛刺稍頭分叉上開四瓣黃花葉頗似山芥菜葉而花又極大又似漏蘆葉而色淡



雨點兒菜

うてんこ

全云雨點兒菜生田野中就地叢生其莖脚紫稍青葉如細柳葉而窄小抽莖而生又似石竹葉而頗硬稍間開小尖五瓣白花結角比蘿蔔角又大其葉味甘



星宿菜

さんぐさ

俗云三國草

全云星宿菜生田野中作小斜葉似石竹葉而細小稍開五瓣小尖白花苗葉味甜

△按三國草高尺許葉似石竹葉三月開花細小白似更松草花罷有細子所謂星宿菜昂是乎

常十八

毛連菜



全云毛連菜生田野中苗初揚地生後攬莖又高二尺許葉似刺薊葉而長大稍尖其葉邊襖曲皺上有溢毛稍間開銀褐花微苦採葉燉熟油鹽調食  
△按毛連菜處處有之葉緣微曲所謂襖音偃俗云倍望

本草綱目卷之九 菜部 毛連菜



### 千屈菜

全云千屈菜生田野中苗高二尺許莖四楞葉似山梗菜葉而不尖又似柳葉菜葉亦短小葉頭頗齋葉皆相對生稍間開紅紫花葉甜採嫩苗葉煤熟水浸油鹽調食



### 草零陵香

全云草零陵香菜人家園圃中多種之葉似苜蓿葉而長大微尖莖葉間開小淡粉紫花作小短穗其子如粟粒苗

葉味苦今人遇零陵香缺多以此物代用治病

翻白菜

### 委陵菜



農政全書云委陵菜生田野中苗初掘地生後分莖又莖節稠密上有白毛葉彷彿類栢葉而極闊大邊如鋸齒形面青背白莖葉稍間開五瓣黃花

葉若微辣採苗葉煤油鹽調食



### 剪刀股

農政全書云剪刀股生田野中處處有之掘地作科苗葉似嫩苦苣菜而細小色頗似藍亦有白汁莖又稍間開淡黃花葉味苦採苗葉燂熟去苦味油鹽調食



蠟子花菜

蛇蚤花 野菠菜

全云蠟子花菜生田野中苗初掘地生葉似初生菠菜葉而瘦細葉間攢生莖又高一尺餘莖有線標稍間開小白花其葉苦採嫩葉燂熟油鹽調食



波婆指甲菜

農政全書云波婆指甲菜生田野中場地攤科生莖細弱葉像女人指甲又似初生棗葉微薄細莖稍間結小花蒴苗葉味甘採嫩苗葉燂熟油鹽調食



野茴香

真茴香見于葷草下

農政全書云野茴香生田野中苗初掘地生葉似掃娘蒿葉微細小後干葉間攢莖分生莖又稍頭開黃花結細角

和漢三才圖會 野茴香

有黑子葉味苦



香菜

農政全書云人家園圃種之苗高一尺許莖方密面四稜莖色紫稔葉似薄荷葉微小邊有細鋸齒亦有細毛稍頭開花作穗花淡藕褐色味辛香



牛兒

全云牛兒生田野中就地拖秧而生莖蔓細弱其莖紅

紫色葉似蓀葉而瘦細而稀疎開五瓣小紫花結青莢莢兒上有一嘴其火銳如細錐子狀小兒取以為鬪戲其葉微苦



火燄菜

農政全書云火燄菜人家園圃多種苗葉俱似菠菜但葉稍微紅形如火焰結子亦如菠菜子苗葉味甜性寒冷



過藍菜



今云過藍菜生田野下濕地苗初揚地生葉似初生菠菜葉而小其頭頗圓葉間攢葶分又上結莢兒似榆錢狀而小其葉味辛香微酸性微温



胡枝花


和名波木

隨軍茶 枝葉  
天竺花 花史  
鹿鳴草 以下時和名抄  
茅子花  
芳宜草  
萩 音蕭 音

救荒本草云胡枝花生平澤中有二種葉形有大小而大葉者類黑豆葉小葉者莖類蒼草葉似苜蓿葉而長大花色有紫白結子如粟粒大氣味與槐相類救飢採子微毒昂成菜先用冷水淘淨復以滾水湯三五次去水下鍋或作粥或作炊飯皆可食採嫩葉蒸曬為茶煮飲亦可  
花史云天竺花自五月開至七月花頭細小其色純紫而枝葉如嫩柳其幹之長與人等

△按胡枝花叢生枝長垂蔽地狀似絲垂櫻而一樞三葉其葉似棗葉又似南天燭秧而不光柔軟秋著小花淡紫色新撰萬葉集管聖相詩云曉露鹿鳴花始發者是也俗專用萩字與州宮城野方二里許萩生茂

有山萩有白花者有白紫開分者北國山中有大木可為柱者四國山中有南天燭大木俱叢內人不信  
山萩又名真萩葉大團有大木 雄萩葉大亞山萩花淺紫雌萩城野葉花小共結實褐色大可豌豆扁中有細子



結縷草

かぐらひ草  
かぐらひ草

橫目草  
鼓筆草  
傳階

俗云高麗菜

救荒本草云師古漢書注曰結縷蔓生著地之處皆生細  
根如綫相結故名之今俗呼鼓筆草兩幼童對御之手鼓  
中央則聲如筆也

△按萊之波一名類草田廩生草曰萊今俗用芝字芝類  
瑞草也凡荒野堤岸雜草自生牛鹿常齧之故夏野菜  
不過數寸頗如青稴然

結縷草此一種萊似絲苧秧而無枝極其根細似蔓而  
相延結秋抽細莖出穗似雀麥細冬枯春生裁假山稍  
長時均薊之則最美也又其老莖以鼓筆也如上說



莖

音勤

和名須美禮  
俗云相撲草

苦莖

苦菜

本綱蕪恭曰莖菜野生非人所種葉似蕪菜花紫色劉禹  
錫曰說文云莖根如薺葉如細柳子如米蒸灼食之甘滑  
也而云苦莖古人謂薺甘草謂大苦也

△按莖字未詳本作莖黃土乃粘者今人謂从艸从土會  
黏土字義又謂為頭苗為莖草音謹又木莖同種蓋鳥

頭苗僅共有黏汁也然蕪恭所言者即須美禮也田野  
草也葉似蕪菜及旋花葉而小其根有畧缺三四月

抽黃梢開小紫花其莖曲垂作鉤小兒戲採二莖鉤與  
鉤對引則以莖切落方為負因各角為草結子內有細

子其子綻脫殼三開李時珍以莖為早薊又似柳葉  
小者亦有堀河百子

凡小兒取為鬪戲者牛兒莖力草之二種中莖名高



### 弟切草

正字未詳

△按弟切草初生似地膚子，根而兩兩對生，有枝極而莖葉極之，有汁，源史變紫色，六七月開小黃花，單五瓣，有細葉，結莢有三稜，中有細子，黑色。味甘香美。莖葉傳金瘡折傷及一切無名腫物，有神効。

相傳花山院朝有鷹飼名晴賴，精其業也。入神有鷹，被傷，按草傳之，則愈。人乞問草名，秘之，不言。然有家弟，露洩之，晴賴大怒，刃傷之，自此知鷹之良藥名弟切草。一種莖弱不起，如蔓而葉花子不異，葉畧小，其味極強。



### 夫苦草

ヤムク

△按夫苦草出野堤，小草也。小葉似槐及奴柘，而長抱莖，生高二尺許，枝條希而如著秋之葦，秋葉交結小花穗，微似帚草穗。其葉及晚景則如萎如睡，朝乃如故也。

董董菜 出于前 真夫苦草矣。此草名夫苦之等，未審。



### 角觥草

力草 本名未詳

本呼董名角觥草，花與托相別，為勝負其趣也。

△按角觥草原野湿地有之葉布地叢生似忍藜微扁似石莖而色淺秋起莖墳作穗青白色可有細子而不見其莖扁強健長六七寸小兒取莖縮穗結如繩而用二箇一搯其穰兩人持莖相引而切方為輸以戲因俗名相撲取草自茂盛為農圃之妨引根強難拔因名力草一種相似而莖葉穗俱瘦者俗以為角觥草之雌



### 菅

音

和名須介

不載本綱蓋是前二稜之屬而根異如香附與蚊帳鈎

△按字彙曰菅葉似茅而滑澤莖有白粉柔韌可為索今云須介葉有劍脊而硬不韌莖本白別抽一莖如海莖出穗而短為枝似車前穗六月前葉乾光白色縫莖美也如列金澤攝列深江勢列齋官多作出菅莖根能治積聚



九三