

3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2

和漢三才圖會卷第九十九目錄

草草類

韭

薤

大蒜

胡葱

菘

蕪菁

苔

芥菜

分葱

菖蒲

水晶葱

山韭

水韭

蒜

葱

薑

雲薹

大薑

芥子

白芥子

蘿蔔

白蘿蔔

胡蘿蔔

生薑

乾薑

紫薑

同蒿

早芥

赤芥

阿之大婆

芥菜

野蜀葵

伊乃牟止

馬勒

苔蘿

阿乃牟止

茴香

白花菜

阿乃牟止

羅勒

山葵

阿乃牟止

煙草

阿乃牟止

阿乃牟止

和漢三才圖會卷第九十九

攝陽

城醫法橋寺島良安

尚順

編

葷草類

五葷

俗云五辛

薰音熏辛臭之菜

練形家

小蒜

大蒜

韭

薤

蒜

芸薹

胡荽

道家

大蒜

小蒜

興渠

慈葱

荳葱

胡荽

本草綱目云所謂興渠即阿魏也三說雖各不同然皆辛

熏之物生食增恚熟食發癰有損性霧故絕之也

△按五葷之名有異同不一夫


梵網經云大蒜荳葱。華葱。蘭葱。興渠是五種一切食中不得食。若故食者犯輕垢罪。

和漢三才圖會

卷九十九

九

楞嚴經云食辛人縱宣說十一部經十方天仙嫌其臭穢咸皆遠離蓋興渠未審法藏師注云興渠阿魏藥梵語也今或爲茵陳或爲禳香并不的理阿魏茵陳禳香三物大抵不爲菜者也恐以爲胡荽然矣而不可拘五品之名凡出貴人面前者每宜忌茹葷蒜等之臭穢物乃是禮也事神佛者殊可戒



韭

韭俗字
草鍾乳

唐音

韭字象形俗加
和名古美良
今云余良
艸冠作韭

本綱韭叢生薑本長葉青翠可以根分可以子種其性內生不得外長葉高三寸便剪前忌日中故諺曰觸露不沾葵日中不剪韭一歲不過五剪收子者只可一剪八月

花成叢九月收子其子黑色而扁須風處陰乾勿令浥浥至冬移根于土窖中培以馬屎暖則卽長高可尺許不見風自其根黃嫩謂之韭黃其莖名韭白其花名韭菁韭之爲菜可生可熟可菹可久乃菜中最有益者也

韭生辛淡熟甘酸溫殊辛臭雖煮食之便出猶熏灼不如葱薤熟即無氣煮食溫中下氣補虛止吐血衄血尿血治癰瘍病多食則能昏神暗目酒後尤忌不可與蜜及牛內同食又云物入必變故老韭爲覓

韭

藿育

韻

水韭

山中往往有之形性亦與家韭相類根白葉如燈心苗單寒澗

水韭野生水涯葉如韭而細長山韭水韭俱可食其味鹹

水韭



水韭

音

火葱

菜芝

藠子

藠子

薑械

鴻薑

薑子

音

俗名於保美良

俗云也布介良

本綱薑即韭類也八月栽根正月分時宜肥壤數枝一本則茂而根大葉狀似韭葉中實而扁有劍脊薑葉中空似細葱葉而有稜氣亦如葱二月開細花紫白色根如小蒜一本數顆相依而生五月葉青則掘之否則肉不薄也薑辛苦白根冷青熟也宜去青留白忌牛輕身耐老補不足止久痢冷瀉治女人赤白帶下作羹食之骨哽在咽喉不去者食之即下與蜜同擣湯火傷甚速

△按韭薑一類大小二種耳薑葉六七寸似麥門冬薑葉一尺半許似小水仙共有劍脊雖中空不如葱之空筒中心抽硬莖開花結實人家所種多小韭也



水晶葱

俗云

敵山

又云

行者

蒜

音

蒜

蒜

蒜

蒜

本綱水晶葱著葱葉蒜根與薑相似不臭亦其類也本草必讀云薑亦白殊種亦者兼苦無味白者雖辛不薑其葉類韭稍潤而光

△按水晶葱葉似薑而大開紫小花根似蒜而小不甚臭人以爲葷草外有僧家亦不戒食者故俗曰行者蒜



蒜

音

蒜

蒜

蒜

蒜

蒜

蒜

蒜

蒜

本綱家蒜有二種根莖俱小而瓣少辣甚者此小蒜也
根莖俱大而瓣多辛而帶甘者大蒜也中國初惟有小蒜
漢張騫使西域始得大蒜種歸

根辛溫有毒治霍亂腹中不安葉亦能治中冷霍亂及時氣溫病止截瘻疾小蒜不拘多少研泥入黃丹少許丸

如芡子大每服一丸面東新汲水下至妙

△按小蒜根圓有薄皮所裹中子五六瓣正白色仁而肉也故稱仁肉乎通俗六月土用初日用蒜一二片赤小豆十二粒水飲下云能避時氣暑毒最有據

治虫齒薺蒜以管吮煙薰齒則小虫出去愈葷亦可



大蒜

あやみかく 胡音 葱菜

和名於保比流

本綱葫及胡荽蓬出胡地漢張騫始得之來今處處園圃種之出梁州者大徑二寸最美少辛每顆六七瓣初插一瓣當年便成獨子葫至明年則復其本矣其花中有實亦作葫瓣狀而極小也大小二蒜皆八月種春食苗夏初食薹五月食根秋月收種

大蒜辛溫有毒

氣極葷置臭肉中反能掩臭凡中暑毒人嚼


爛三兩瓣溫水送之下咽即治但禁飲鼻衄不止者擣貼足心衄止節拭去○凡癰疽惡種者用大蒜切如

小錢厚貼瘡頭上灸之蒜焦更換新者一使瘡不開大便內肉不壞三瘡口易合○婦人陰腫作痒者蒜湯洗之乃止

凡用蒜煮羨臚爲饌中之後而多食久食傷肺傷脾傷肝膽損目生痰然北方食肉麪尤不可無日用之故盲聾最多矣食葫合青魚難食令人腹內生瘡合蜜食後入凡服一切補藥者不可食之

△按葫者舊中華之種葫者胡地之種主治亦有異且稱

五種葷草亦以爲一物而今混不分別之或云因地肥瘦有大小之異也本草必讀云大者名葫圃人多種小者曰蒜山野自生也本朝亦今多所種者乃大蒜也徑寸餘如慈姑之大者葉長尺半至二尺四月中心頭上有花結實
音葵實形如根而小味亦辛臭奧州津輕南部之蒜大而徑二寸許當不劣於梁州之蒜凡奧州四國中國山民多種爲常食惟面白浮暫但體臭氣不可近而已却長壽者多瞽盲者不多總邊境民每食用家芋用海藻用江菱之類皆不宜多食之物也然受胎以降爲常食故不有害矣



のびる
蒜歷

音

山蒜

澤蒜

嚴音吟
和名祢比流
俗云野蒜



本綱根如小蒜葉如韭生石間者名石蒜蓋山蒜澤蒜
蒜同一物也但分生于山澤石間不同耳又水中蒜名
蛤則蒜不但產于山而又產于水也

別有山慈姑水仙花老鴉蒜石蒜之類根葉皆似蒜而
不可食其花亦異見山草各條

蒜根

治積塊血瘕用苦醋磨傳多效

△桉蒜山野井溝之邊多生其葷氣淡用根葉煮食膈噎
有効又黑燒傳癰疔消腫止痛



ひのり
葱

音

莧

和事草

き

菜伯

和名紀

俗云比止毛之

又云孙布加

言根深也

本綱葱葉外直中空初生曰葱針葉曰葱青衣曰葱袍莖
日葱白葉中涕日葱苒可種可栽

冬葱

葱一名慈葱一名凍
一名大官葱

夏衰冬盛莖葉俱軟美宜太官

上供冬葱者無子

漢葱

木葱

莖實硬而味薄春末開花成叢青白色其子

莖白

辛平

生辛散熟甘溫外實中空肺之菜也肺病宜

食之

故入手太陰肺胃經主發散

葱青

辛熱不藥入用

凡服

地黃常山人忌食葱

同蜜棗及雉肉不可食

凡不可多食損鬚髮

寢臥中

奄然而死

者是中惡也急取葱心黃刺入鼻孔

中

男左女右

入七八寸

鼻目血出即更或入耳中五寸鼻出

血

即活如無血出即不可活

自縊垂死者

△梅葱

葉圓長無枝故呼名

一文字也蓋冬葱漢葱本此

十月中下種

初生葉細如針正月剪葉和鹽和醋未醃

食之再三可茹故俗呼

曰茹葱

夏月葉硬不可食所謂

漢葱是也

茹葱根長者八月可移種灌水培糞則肥盛

莖根長白色俗呼

曰根葱

淑澦經霜則柔軟堪煮食味

甚甘美溫能除寒氣

所謂冬葱是也四月葉端圓脹

白色似花而不開

中有細子如雞頭子七月熟時取之

十月種之成茹葱

一丁物而如二種

下野州

梅澤濃州宮代之葱白其白處近尺長於葉也

上野州

鹿沼產亦良近頃畿內出夏根葱肥大無異於冬

葱蓋此春時不剪而移栽于他處能灌水培糞作之豪

貴人要不時之美菜故然爾但其味不如經霜者耳



胡葱

島蒜
阿左豆木
本朝式
假名助語也

本綱胡葱非初來於胡地故名之以似葫蒜也八月下旬種五月收取葉似葱而根似蒜而小形圓皮赤稍長而銳其味如薤不甚臭此葱之類也

卷之三

卷之四

卷之十九

△按胡葱宿根自生或收根於籠置陰處至秋生芽即移種正十一月取一二寸如針者生和膾食之甚佳不宜著三四月最長亦細而不過尺其辛味倍于余葱臭氣于余葱故名淺葱津者假名也形狀如本草之說但下者不然耳此物夏則凋枯結子者甚希也故取其根至秋裁之上已日根葉共和膾食但比分葱根圓而硬

分卷

俗字和

和介木

△按分葱根葉似胡葱而畧肥大如筋但根白無赤皮以爲異二三月分取根生和臘和醋味醬食亦同胡葱而夏月硬不可食採收根八月栽之法如胡葱蓋分葱胡葱並根葱之種類也故和訓附紀字於下

水葱
救荒本草云凍葱生水邊淺水中苗類家葱而極細長梢頭結莖同于葱而小開
花根亦如葱而色紫黑味甘微鹹



董文臺

寒菜

和名乎知

油菜

本綱雲薹九十月下種生葉形色微似白菜冬春採薹心爲茹此菜易起薹分枝必多三月則老不可食開小黃花四瓣如芥花結莢收子亦如芥子灰赤色炒過擦油黃色燃燈甚明食之不及麻油近人因有油利種者亦廣莖葉溫破血故產婦宜食之子亦同功

芸薹散 治產後惡露不下，血結衝心，刺痛及產後心
腹諸疾。_{孕後二日不可無此}
_{用芸薹子炒當歸桂心赤芍藥等分，每酒服一二錢，}
下惡物良。

△按雲臺，莖葉子根皆辛，而微有煙草之辛味不佳。其根長不堪食。惟用莖作菹良薦。人好食之。



芥子

音嵩

俗云太加奈

和名抄用辛
芥二字未詳

白菜

本綱菘性凌冬晚凋，四時常見有松之操其根堅小不可食。有二種，莖圓厚微青，其葉皆如蕪菁，淡青白色，其子如蕪薹子而色灰黑。八月以後種之，二月開黃花，如芥花，四瓣三月結角亦如芥，其菜作菹食尤良。其葉最大厚味甘者，名牛肚菘。

氣味甘辛

治小兒赤遊病

行於上下

至心即死

用菘菜擣傅之

即止

又菘菜子油塗頭

長髮塗刀劍

不鏽

有足疾者不可食之

△按菘菜今畿內種之者希也，採其葉搗爛合醋去滓，和魚鱠謂之青醋，又用其莖作菹甚良，華人賞之，故長崎多種之。今以蕪菁菜菔之菹稱莖漬者起於此乎？



芥菜

青芥

刺芥

大芥

芥子

紫芥

以上有六種

和名加良之

馬芥

莖芥

石芥

花芥

石芥

本綱青芥似白菘，有柔毛。太芥綠色尤深，綠味更辛辣，馬芥葉如青芥，花芥葉多缺刻，如蘿蔔英。紫芥莖葉皆紫如蘿蔔。石芥低小，皆以八九月下種，三月開黃花，四出結莢，一二寸子大如蘿蔔子，而色紫味辛，研末泡過爲芥醬，以侑肉食，辛香可愛。

莖葉

溫辛子

能通肺開胃利氣，豁痰利九竅。

有瘡瘍痔疾便血者忌之。

同鯛肉食成惡和病。

陸佃云：望梅生津，食芥墮淚。五液之自外生也。

垂涕而汗出。

五液之自外生也。

△按辛菜今唐人謂芥辣，倭食索麩爲必用之物。四月其

角芥熟半枯時，剪之取子，晒乾碎末，篩去皮，收之用。序盛蓋隔紙上，注水浸芥粉，則甚辣。合醋末、醬和魚鱠最良。或有用芥青葉合醋和魚鱠，俗云太醜亦可。往往有鱠鱠亦用之者，而雖不甚害，合食禁不可不知。

裁久瘧，用芥子粉研爛，貼眉間或髮際，有効。其痕微爛，又吳瑞云：芥末水調塗項，頤止衄血。



白芥子


ペツキイツウ

本綱白芥子種來自胡戎，而盛於蜀。今處處可種。八九月下種，冬生至春深，莖高二三尺。其葉花而有子，如花芥葉，青白色，莖易折，而中空性脆，最畏在風大雪。二月開黃花，香郁結，角如芥角，其子大如梁米，黃白色。

有一種莖大而實者尤高，其子亦大。此菜雖是芥類，迥別種也。然入藥勝於芥子。

白芥子，能入肺，能發散，故有利氣，豁痰，溫中，開胃，散痛，消腫，辟惡邪之功。痰在腸下及皮裏膜外，非白芥子莫能達。凡腫毒初起，用白芥子末，醋調塗之。

畿內



江東

蕪菁

アヒカ

蔓菁及莢菘

ウツイン

諸葛菜

和名阿平奈

根莖曰下體

和名加布良

允唐蕪菁亦如此

本綱蕪菁苗謂蕷。詩谷風曰采葑采葑，乃蕷菁也。凡七月初種者，根葉俱良。是乃芥屬，其根長而白，莖粗葉大，而厚潤。夏初起薹，開黃花，四出，如芥結肉，亦如芥，其子均圓似芥子，而紫赤色。此菜取其纏出，甲可生啖，也葉舒可

煮食_二也久居則隨以滋長_三也棄不令憊_四也回則易
尋而採_五也冬有根可食_六也比諸蔬其利甚博因茲諸
葛亮所止令兵士好種_中蔓菁蜀人呼爲諸葛菜其子擦油
燃燈甚明同麻油鍊熟一色無異但此油烟損目

古者以蕪菁蘆菔同條或以二物爲一種蓋二物都別
也蔓菁根長而白蘆菔根圓亦有長者有紅白二色又
蔓菁根葉_{苦溫又云}蔓菁子紫赤色蘆菔子黃赤色而大數倍且不圓

嗽特立春後遇庚子日溫蔓菁汁合家大小並服之不限多少一年可免時疾又治大醉不堪者用蔓菁葉入

少米煮熟去滓冷飲之良_{俗云水增水方乎}

子_{苦辛平}明目療黃疸利小便又治蜘蛛所咬者蕪菁子
擣末酒服亦以油和傅之蔓菁園中無蜘蛛

同油

塗頭能變蒜髮_{今俗龐而不柔軟髮名}非髮所謂蒜髮是華

按蔓菁以此葉稱菜編根稱蕪菁乃蔬之通

稱而此冠于諸菜也猶以櫻稱華矣大抵菜菔根長葉
菁根短然本草之說反之和漢土地之異然否但信州
松本江州臘吹近郊之產菜菔根短而蕪菁根長帶微
赤色味亦帶微辛苦而甜此異于他處者而偶合本草
之說

攝州天王寺安部野之產根圓大甘美爲勝興州津輕
之產次之蓋有數種○居座蕪須波里根入土淺而其
大者徑四寸許莖葉不多然根平圓而大爲良○子持
菜_古知莖葉多結實亦多爲良○晚熟菜_天菜於人大抵四
月初開花此菜五月中開花而花實少然以耐久爲良
三種共八月下旬彼岸生苗爲準遇霜乃味愈美其根
煮食甚甘生亦不苦冬至以前取根掛檐間乾之_{如過冬}
{心生筋膜不佳立春前取收之}水方{至則根}之產根尖陷爲凹惟天主寺蕪根尖不陷爲凸而刃片
之有黃文如人參以此爲異

荳

音塔

水菜

荳者菜生水中也

△按洛外流水作圃栽蔓菁名水菜其莖葉甚脆柔美但根硬不可食以東寺近郊者爲真不待開花而取食總州菖西之產非水菜而味不劣洛水菜

蔓菁子油

俗云種子油一名水油

凡蔓菁子油今爲燈用第十一但塗髮微臭不如胡麻油燃燈者胡麻油爲勝而光焰小而不如水油之光又綿實油光勝於水油故綿實油少和合之則愈佳

倭



本草必讀
蘿蔔圖

蘿蔔

紫花菘土酥

雹突

溫菘

蘆菔

口沃

蓄出和名沙
和名於佛根
今用大根二字

本綱蘿蔔六月種秋采苗冬掘根春末抽高薹開小花紫碧色夏初結角如蟲狀腹大尾尖其子大如大蒜子圓長不等黃赤色五月亦可再種其葉有大者如蕪菁細者如花芥皆有細柔毛其根有紅白二色其狀有長圓二類大抵生沙壤者脆而甘生瘠地者堅而辣根葉皆可生食可熟可菹可臠可飯乃蔬中之最有利益者也今天下通有之河朔江南安州洪州信陽者甚大重至五六斤或近一秤

根辛葉苦生食升氣熟食降氣能制羶毒及豆腐毒或燶黑欲死者嚼汁嚥下衄血不止者擣汁入酒少許熟服即止擣汁能止消渴塗打撲湯火傷皆有効服地黃何首烏人食萊菔則令人髭髮白因下氣澀營衛也蘿蔔子辛生能升熟能降升則吐風疾散風寒發瘡疹降則定痰喘欬嗽調下痢後重凡治痰有推墻倒壁之功

△按蘿菔大抵八月下種，彼岸中生苗，拔其繁莖食，稱根葉漸長，根如鼠尾者，稱中拔太根，霜後根肥大，味亦甘，其根株見在於地上者，名上出利，正二月食之，根不肥大，至春亦採葉可食者，名三月大根，凡大根葉稍硬，蕪菁葉柔，而至根之形及氣味，二物猶北壯而亞乎穀大，為民利，故諸國皆莫不種之。

尾州宮繁之產大者長三尺，周尺半，重可五七斤，肥後菊地，藝州吉野，勢州津薩州，加護島肥前竹尾之產皆長大也。或列江戶攝州棕橋之產味美也。他國大根五本三本乃至十本爲一耙，唯尾張肥前之產，每一本爲直，攝州天滿宮前相列，波多野共出，細長者長二尺許，周可一寸半而本末均似白紺，漬糟糖爲香物，波多野硬，江列臘吹相列，鎌倉共出，鼠太根形短而有尾味甚辛，食麴人重之，信州景山攝列木代但列直見之產皆辣，得

名，凡麓野瘦地者堅實而辣。



胡蘿蔔

スノウブ

本綱胡蘿蔔，元時始自胡地來，其氣味微似蘿蔔，故名八月下旬種生苗，如邪蒿肥莖，有白毛，辛臭，如蒿不可食，冬月掘根，生熟皆可啖，兼果蔬之用，根有黃赤二種，微帶苦氣，長五六寸，大者盈握，狀似鮮掘地黃及羊蹄根，三四月莖高二三尺，開瓣，白花，攢簇如傘狀，似蛇牀，花子亦如蛇牀子，稍長而有毛，褐色，又如蔥蘿子，根微甜，性溫，下氣補中，安五臟，令人健食，有益無損，忌同野胡蘿蔔，苗葉花實皆同家胡蘿蔔，但根細小，味甘。

卷之三

卷之三

卷之三

沙蘿蔔アラモロコ根長二尺許大者徑寸下支生小者如筋其
黃白味辛微苦亦似蘿蔔氣皆胡蘿蔔之類也
△按胡蘿蔔六月下種秋食苗冬食根味甜而不辛有赤
黃二色黃者生沙地就中自遠列出深赤色者相異
一邊亦出赤色者唐人呼曰紅胡蘿蔔今因時種之茹
葉凡根形畧似人參故倭唯稱人參終不改

生薑

生薑
和名久禮乃
波之加三



子
鹽

本綑生薑處處有之其宿根謂之母薑四月取母薑種之宜原濕沙地五月生苗如初生嫩蘆而葉稍闊似竹葉兩對生葉亦辛香秋社前後新芽頗長如列指狀采食無筋其尖微紫故名紫薑秋分後者次之霜後則老矣性惡

濕洳而畏日故熱則無薑也糟薑瓶內入蟬蛻鹽老
無筋亦物性有所伏耶春秋運斗樞云璇星散而爲薑
生薑辛微溫良要治則留皮久服通神明除風邪止咳嗽嘔
吐去痰下氣開胃氣凡生薑之用有四制半夏厚朴之
毒也發散風寒也與棗同用辛甘益脾胃元氣溫

或問生薑辛溫入肺何以云入胃也曰俗以心土爲胃
口者非矣咽門之下受有形之物及胃之劄便是胃中
與肺系同行故能入肺而開胃口也
又云夜間勿食生薑何也曰生薑主開發夜則氣本發
收斂反開發之則違天道矣若冇病人則不然也
凡早行山嶺宜薑一丁塊不犯霧露山嵐不正之氣
丘八九月多食薑至春多患眼減筋力大人天年孕婦食
之令兒盈指凡病痔人多食兼酒立發甚速癰瘍久人多
食則生惡肉生薑夏末秋初爲之使殺半

本草綱目 卷之三十一 薑草 番茄

蕃茄

生薑皮 辛 消浮腫腹脹痞滿和脾胃去醫

乾薑 白薑

本綱以母薑造之于長流水洗過剝去皮日晒以白淨結實者爲良生則逐寒邪而發表炮則除胃冷而守中散多用則耗能引血藥入血分引氣藥入氣分有陽生陰長之意故血虛發熱產後大熱者用之須炒黑用之吐衄血痢下血有陰無陽者亦宜用之

孕婦忌

△梅生薑

薑青

今俗多用姜字剝爲我青未知其據也

倭名抄云生薑

久禮乃波之加美

蜀椒

奈留波之加美

蔓椒

以多知波之加美

吳茱萸

加波波之加美

蜀椒

奈留波之加美

蔓椒

以多知波之加美

之總名也今疑吳茱萸與生薑之和名不參差乎

生薑處處皆有之山州綺田平尾殿村之產雖稍老而肥大無筋肥州長崎因列長柄之產亦不劣

紫薑醃醋食之甚佳能洗淨切片以布拭水畧乾漬於梅

醋則色赤而經日亦不生白醭且加紫蘿色倍赤
生薑

辛溫

食餳成癥者擣汁飲之即消

今俗以生薑葉醃熟湯洗凍瘡則愈

蓬蒿

俗云高麗菊形風同平蓬

又云春菊

名之

同蒿

八月九月



本綱同蒿八九月下旬植冬春采食肥莖花葉微似白蒿味辛甘作苦氣四月起薹高二尺餘開深黃色花狀如單瓣菊花一花結果子近百成穗如地松及苦蕡子最易繁茂此


菜自古已有今人常食者

氣味

平

安心氣養脾胃消痰飲利腸胃

△按同蒿潔莖葉食晚美然夏菊未開時有之故賞花不爲蔬一莖發自生根六七月開花亦美也



邪蒿

本綱邪蒿三四月生苗葉似青蒿而細軟色淺不臭故皆和也根葉皆可茹煮熟和醬醃食醉作羹亦良。

△按邪蒿今云松菜矣柔滑菜出不葷草同蒿與此共一部分之誤也

ニヅイ

薌萎

胡菜



胡荽

和名古仁之

フウスイ

本綱胡荽八月下旬種晦白尤良初生柔黃圓葉葉有花岐根軟而白多鬚多春采食香美道家五葷之一也立夏後得此種歸宜肥地種之。

開細花成簇如芥菜花淡紫色五月收子子如大麻子亦辛香其子葉生熟俱可食有益於世者漢張騫使西城始得此種歸宜肥地種之。

根葉微毒

辛溫

治五臟補不足利大小腸其香竄內通心脾外連四肢能辟一切不正之氣故痘瘡出不爽快者作酒飲之立出凡服一切補藥及藥中自有自术牡丹者不可食之可食之如頭疽及脚氣金瘡人皆忌之

胡荽子辛溫

煙熏

能發痘瘡治痔漏脫肛如瘻子膿等分乳

△按胡荽和漢同徃昔多種之近年罕有之形狀如上說



芥菜

苦蘗

水英

キンサイ

本綱有水旱二種水芥生陂澤之涯旱芥生平地有赤白二種二月生苗其葉對節而生似蕓其莖有節稜而中空其氣芬芳二三月作英時可作菹及熟瀹食五月開細白花如蛇牀花而無實根亦白色

莖根

苦酸
冷澆

養精保血麻益氣令人肥健嗜食

和醋食
損齒

蛇喜嗜芥且蜥蜴虺蛇之類春夏之交遺精於此故有毒此時不可食

△芥正二月連根與韌筍同用豆醬及醋煮食謂之

芥燒香味甚美普通賞之蓋謂和醃損齒則不宜用醋丸小鳥好啄芥故養鳥之家必種之

旱芥芥子生平地葉似水芥而瘦莖不高起帶赤色三四月

開小白花味亦劣猶韭與山韭

本草綱目時珍以莖爲旱芥者非也詳濕草莖下



赤芥

苔菜 水葡萄

紫堇

楚葵



馬蘄

野茴香

胡芥

一ノキン

別又有野茴香
見于濕草部

名此草似芥而大故也

本綱赤芥生陰厓坡澤近水狀類赤芥藥其葉深綠而背甚赤莖葉似蕓麥花紅可愛結實亦如蕓麥其根似蜘蛛嚼之極酸苦澀三四月采苗當蔬食之

△桉李庭飛云赤芥有毒害人不可食本草必讀云赤白俱可食未嘗有毒害人也

本綱馬蘄與芥同類而異種處處卑濕地有之三四月生苗一本叢生如蒿白毛蒙茸嫩時可茹葉似水芹而微小似蕩蕓葉而色淡五六月開碎花攢簇如蛇牀及蕓花青白色結實亦似蕓子但色黑而重爾故稱野茴香其根白色長者尺許氣亦香而堅硬不可食金光明經三十子品香藥謂之葉婆你

苗

甘辛

益脾胃利胸膈去冷氣作茹食

△按本文所謂馬芥葉似水芹而微小之小字疑當作大否則不應馬芥之名及似蕩蕓葉之文也



農政全書

野蜀葵

俗云三葉芥

何以得蜀葵之
名耶未考

農政全書云生荒野中就地叢生苗高五寸許葉似葛葉狹葉而厚大又似梔牡丹葉味辣採嫩葉燂熟水浸油鹽調食

△按野蜀葵農政全書所圖之畫則此云三葉芥也二月隰地生苗一本叢生莖稍附三葉面背潤青色似蕩蕓葉而微圓大而一莖三葉有細刻齒其莖淺青色或帶淡紫亦有之春取莖葉潔鹽調食脆甘微有松氣亦類芥故名三葉芥四五月老則起莖成枝開碎白花似芥及蕓花子似小茴香而小根亦似芥而堅硬不可食是與芥同類異種也老者生白毛而頗似毛茛毛茛見于其花以黃爲異今人多賞之故十月採出於宿根嫩苗販之然不如正二月之風味佳者也


正字未詳



阿之大婆

△按此草出於八丈島，苗尺許，莖葉畧似三葉芥，而三柱三葉向深青，背青白色甚，光滑有細鋸齒。凡莖葉柔脆，草無不冬凋。此草四時不凋，以爲異。其葉新舊相交，取嫩葉葉食味淡甘，經三年者開小花，相傳小兒食之能免痘疹，未知是非也。

八角茴香



面



背



子



中




上



下



珠




珠



珠



珠



珠



珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

珠

見飛散處能生苗其莖葉雖淪漚甚香臭不可食八角茴香今中華處處高船將來其子枯裂入船而徑八九分每瓣一核似酸棗仁微小

本綱 蔊蘿三四月生苗花類蛇牀花子亦如蛇牀子而簇


生微黑氣辛臭不及茴香俗曰蔊蘿根內有黑子但皮薄色褐而輕七月采實今人多用和五味不聞入藥用能滋食味多食無損

子辛溫治腎氣壯筋骨治閃挫腰痛用蔊蘿研末酒調

服二錢七

△按蔊蘿者未渡來本朝尚無之既名小茴香則伊乃卒之則非茴香伊乃牟止之類如別種者

伊乃牟止



白芥菜

△按以乃牟止即小茴香之屬其苗葉花實皆似茴香而小又子似蛇牀子而瘦小如利微黑而細小也外科擇油用入藥消腫止痛和黃丹塗小兒脊骨免痘疹

正字未詳

番語也

四羅勒

蘭香 香菜

本草主其葉似小茴香而根不直

根如魚頭不直



蔊蘿

慈謀勒番言
小茴香

本綱羅勒處處有之須三月叢葉生時種之乃生否則
生常以魚腥水米泔水泥溝水澆之則香而茂不宜
有三種一種似紫蕪菜一種葉大二十步內卽聞香一種
堪作生菜饑年可濟用其子大如螢褐色而不光七月收
羅勒子用其乾者治目翳及塵物入目以三五顆可安
入月中少頃濕脹與物俱出凡目中不着一塵而此子
可納三五顆亦不妨礙蓋一異也

△
小茴香

白花菜



本綱白花菜三月種之柔莖延蔓一枝五葉葉大如拇指
秋間開小白花長莖結小角長二三寸其子黑色而細狀
如初眠蠶沙不光澤菜氣檀臭惟宜鹽菹食之

氣味微辛
煎水洗痔搗酒飲止癰
一種黃花者名黃花菜形狀相同但花黃也

千金子



白花菜

音

辣米菜

蕓菜乃蕓字
之訛矣

白花菜

音

辣米菜

蕓菜乃蕓字
之訛矣

本綱蕓菜田園間小草也冬月布地叢生長二三寸菜梗
細葉二月開細花黃色結細角長一二分角內有細子野
人連根葉拔而食之味極辛辣如火燄入故云蕓

煙草

淡巴菰

本草
類記



ニシタケウ

直

炮酒

本草洞誥云煙草主治寒溼痺消胸中痞膈痰塞開經治結滯又能通暢人之腸胃筋脉煙氣入口直逼胃脈而行自內達外四肢百骸無所不到其功有四一日醒能使之醉蓋火氣薰蒸表裏皆徹若飲酒然二日醉能使之醒蓋酒後啜之寃氣下痰餘醉頓解三日饑能使之飽四日飢能使之饑蓋空腹吸之充然氣盛如飽飽後吸之則飮食快然易消人遂以之代酒代茶終日吸之不厭時時思想不能離故名相思

羅山文集云佗波古希施婁皆番語也其草採之乾暴剝其葉而貼下紙捲之吹火吸其烟其後用希施婁而不貼干紙希施婁之制或用鉢或用竹其盛佗波古者以鉢爲乏狀如牛翠花樣其底尾有孔斜屈而連續于煙筒之上每有會必備之如用酒芥也雜之以下香沉香等或妓女遊君以爲寄聲通意之媒一吸一吞必相酬酢焉

△按煙草天正年中南蠻商舶始貢此種

番椒之種亦以始干同時

植於長崎東土山今煙草番椒烏日用不可闕之物也
煙草二月下種五月移栽摘去新芽除蟲也每且不可急高三四尺葉似商陸而長大七八月采葉覆藁筵盦之丁宿取出每一葉挾繩如編成而晒乾一夜露宿復晒乾則成黃赤色擴皺收之八九月莖頭出朶細開小白花帶赤色畧似紫苑花結子內有細子黃褐色有小蟲而食其子故能不避蟲則難得其種

備後備中及關東多出之今攝州服部之產爲第一泉河新由次之上州高崎和州吉野甲州小松萩原信州玄古薩州國分丹波大野皆得其名者也
和漢煙草凡同時始矣初出海外後傳種於漳州泉州列今處處有之葉大於菜開紫白細花葉老曝乾細切如線太明崇禎十一年令云有私販煙酒賣通外夷者不拘多寡梟斬由此觀之則太明季人最貴之當日本朝寬矣往古無煙草而莫不足多吸之亦不充一勺量費田四

減穀類故呼曰貧報草元和寬永之比天下令禁種之然不得止竟以立於茶酒之上不嗜者百它唯二三人耳雖有小毒多嗜者亦無害矣

阿蘭陀朝鮮琉球人亦皆嗜之

南蠻流外科青膏藥中入煙草嫩葉汁用能止痛排膿止血殺蟲瓦藍及諸草葉生蟲者以煙草莖汁灌之猫犬蛇諸鳥皆惡煙氣獨猿見刻煙草則抵食

凡人醉煙草者啜未醬汁解之冷水亦可

山薑

和佐比 本朝式

芳草部有山薑又同杜若亦名山薑三物同名異品也

山葵

△按山葵處處山中近水石間多有之人家亦移植之二月下種植者最佳三四月生苗葉似落葵葉故

俗名山葵而厚團深青色有細毛六七月作穗二三寸著細黃曰花結細子其根似菖蒲及良薑根故俗名山薑根皮青黑多瘤有短鬚其肉淡綠色有香氣味辛辣研之和漿酒食散膾最佳食蕎麥麪人不可闕有解魚毒麴毒之功也或曰患觔風下血人多食之愈未試之豫外多有之售于他處

樂氏文書于身後

秦始皇文書也。始皇日患顛風，不與人食。又喜方士之言，求仙藥，不復以爲有。嘗使大將軍蒙恬率三十萬人，築長城，自九連山起，至臨洮，萬餘里。又使燕、趙、齊、楚、韓、魏六國各築長城，使秦直道與之相接。又使大將軍蒙恬築城，自九連山起，至臨洮，萬餘里。又使大將軍蒙恬築城，自九連山起，至臨洮，萬餘里。

