





後學州全重校

延壽鑿院東井先

寬永戊辰孟春吉日

生類編鑿方明鑑

命梓一字無訛

醫法明鑑卷第一目錄

中風 一附痛痺 痿麻

傷寒 二附中寒傷風瘟疫大頭病  
蝦蟆瘟 感冒

中暑 三 中濕 四

癘疾 五 霍亂 六

內傷 七 泄瀉 八

痢病 九 氣 十

痰飲 十一 咳嗽 十二 附肺痿  
肺癰

喘急 十三

醫法明鑑卷之一

中風門

一附 痛痺 痿麻

一三賢風因

○傳 河間曰將息失宜心火暴甚腎水虛  
衰不能制之則陰虛陽實熱氣怫鬱  
心神昏冒筋骨不用而卒倒無所知  
也夫五志過極皆為熱甚俗云風言  
言末而忘其本也

○東垣曰中風者非外來風邪乃本  
自病也凡人年踰四旬氣衰之際或  
因憂思忿怒傷其氣者多有此証壯  
歲之時無有也若肥盛者間而在之  
亦是形盛氣衰故如此耳

○丹溪曰有氣虛有血虛有痰盛西北  
二方真為風所中者在之東南之人  
皆是濕土生痰痰生熱熱生風也

真風類風之辨

○慧有真中風邪者有類于中風者不可  
槩治

○傳因風者真中風也從昔人而治之因  
火因氣因濕者類中風非中風從三  
賢而治之

真風經臟腑之辨

○心慧面加五色有表證脈浮惡風寒拘急  
不仁中腑也加城小續命發表調以  
通聖辛涼之劑

○唇緩失音鼻塞眼瞽耳聾便秘中臟  
也難治二化湯通其滯調以十全四  
物之劑

○外無六經之見証內無便溺之阻膈  
肢不能舉口不能言中經也當從中  
治 大秦尤湯補血以養筋

一真風類風不可為一途

○傳中風蓋因先傷內而後感於外之候  
也但有標本輕重之不同耳

○古人論中風者言其証二賢論中風  
者言其因真中風邪者未必不由氣

軀虛弱然後感於外邪經曰邪之所  
湊其氣必虛是也因火因氣因濕者  
亦未必絕無外邪侵侮而作也若無

外邪侵侮則因火因氣因濕各自為  
他証豈有啗僻癱瘓暴仆暴瘖之候  
乎豈可以一中風之證為一途哉治

法外感重先驅外邪而後補中氣內  
傷重先補中氣而後驅外邪或以散  
風藥為君以補損藥為臣使或以滋補

劑為君以散邪藥為佐使  
似中風之數証

○林傷熱証卒暴僵化者顛中風  
氣激痰碍心竅類中風宜吐後調理  
痰証諸痿諸痺皆類中風

○林尸厥痰厥氣厥血厥酒厥各似中風  
氣中者暴怒傷陰暴喜傷陽憂愁不  
已氣多厥逆便澀潮昏塞牙閉緊急  
似中風灌 藜合香丸醒後隨寒熱

虛實而調之中風肝浮身温多痰氣  
中者脉沉身冷無痰

○酒濕之病作痺証口眼喎斜半身不  
遂古強不正似中風當瀉濕毒

○王口眼喎斜半身不遂之病豈止風之  
一端而已况六氣皆能中人有縱急  
搐搦不知人等証不可不以脉証分  
別也

○口噤筋急或由風熱甚勝濕或因津

液滯胞為痰則筋大燥或筋反緩者  
乃燥之甚血液衰少也故經曰諸筋  
牽急愈燥証微也筋痿難復燥証甚  
也

○林風病外感善行數變其病多實發表  
行滯痿証內傷起肺熱四肢不舉舌  
本強足痿不收痰涎有聲皆是虛証  
無寒可散無實可瀉

○王後世編集以外中風和立名而與內  
傷痿証密同出治此千古之弊也

○心理氣者氣滯氣鬱肩膊麻痛之類此  
七情也宜 烏藥順氣 八味順氣  
之類理血者無表裏之急証唯血弱  
舉發不時者用 大棗元 羌活愈  
風之類 已上皆不可用風藥者  
也

一緩治之治法

○丹溪曰入率主血虛有痰或杖火與

濕治法以痰為先補養次之

○初得之即當順氣及日久則當活血  
初病暴仆昏悶不省人事或痰涎壅  
盛舌強不語兩寸脈浮大而實急用  
吐法入迎脈緊盛或六脈俱浮強者  
急小續命表之看所按見証與時  
令寒溫加減施治病勢稍退精神稍  
復當改用補氣補血清痰之劑調養  
其本氣而安此急則治其標標而本  
乏之治也

○凡人或手足漸覺不遂或臂膊及髀  
股指節麻木不仁或口眼喎斜言語  
蹇澀或胸膈迷悶吐痰相續或六脈  
弦滑而虛軟無力雖未致倒仆為中

風暈厥之候早當從丹溪之法而調

治

左脈不足及左半身不遂以四物補  
血之劑為主治

右脈不足及右半身不遂以四君補  
氣之劑為主治

痰盛者 二陳 道朮 等湯兼  
用

氣血兩虛而按痰 八物加半 星

實 竹瀝 姜汁之類

若真元漸復痰飲漸消或覺風邪未  
退者仍以 羌活愈風 防風通聖  
之類出入加減調治而安此緩則治  
其本本而標之之治也

一卒風治法

○至急中卒風氣絕不語 至寶丹主之

連進生薑汁

○撰初中風卒倒牙關緊急不省人事

蘇香圓 灌之候其甦便可用辨脈

証從法治之

○慧痰壅盛者口眼喎斜者不能言者皆

用吐法 瓜蒂散 稀涎散 口噤

者灌入鼻內虛甚者不可吐

○正年老虛弱之中風及氣虛卒倒不可

吐

一肥瘦之辨

○傳肥人中風口喎肢麻不分左右皆屬

痰用貝 菱 守 星 陳 末

連 百 苓 云 羌 荆 歲

薄桂 甘 天花粉 因痰者加附

子 竹瀝姜汁入酒一匙行經降火

又曰肥白人多濕 烏 附 行經

童便煮浸入薑下行右槌

瘦人中風屬陰虛火熱 四物 加

膝 苓 栢 有痰加治痰藥

○惠肥人中風者以其氣盛於外歎于內

也肺為氣出入之道肥者氣必急痰

涎壅盛所以急之必先理氣

一半身不遂左右之辨

○傳半身不遂大率多痰

在左屬死血少血宜四物 桃仁

紅花 竹瀝 姜汁

在右屬痰與氣虛 宜一陳四君竹

瀝姜汁

一辨治

○惠醒後小便少不可利之汗液死亡榮

衛枯竭無以制火熱退汗止小便自



○中風遺尿氣虛 參 芪 補之  
○飲食坐卧如常但失音 小續命  
去附 加苴

○中風証內外邪已盡當服愈風湯以  
導諸經久服大風悉去經有微和加  
減用之然治病之法不可失其通塞  
或一氣之微汗一旬之通利如此為  
常治之法

一脉辨

○傳 大法中風脉浮遲者吉急疾者凶

○林 寸口脉浮而緊緩而遲皆曰中風  
經曰浮而大者風

○被風不仁痿廢其脉虛者生堅急疾  
者死也

一不治之証

○口開心絕手撒脚絕眼合肝絕遺尿

腎絕聲嘶肺絕也

○林 髮直吐沫橫頭上竄直視口開手撒  
眼合遺尿不知人或面赤如粧或頭  
面青黑汗綴如珠聲如鼬睡皆不可  
治

一灸治

○林 風中血脉口眼喎斜頸會頰車地倉  
左喎灸右右喎灸左

○風中腑手足不遂百會肩髃曲池風  
市足三里絕骨四肢麻痛在左灸右  
在右灸左

○風中臟性命危百會風池大椎肩非  
間使曲池足三里中膈氣塞涎上不  
語心憤服麻灸之各至五年壯

○凡中風治法莫如發表攻裏調氣養  
血治痰若要取全功宜灸灸

林凡五藏中風各灸其本藏之俞自壯皆服續命湯救之治風之法大良宜灸凡心中憤亂神思不怡或手足麻痺此將中藏之候不問風與氣可速灸

○中風眼戴不能上視者灸二椎第五椎上各五壯或七壯齊下火立愈

例○失音不言及天突目反口噤腹脹灸囊下第一橫求十四壯

○中風口噤灸兼漿巨闕一通開竅之劑

林橫鼻法 治卒中風不省人事牙關緊急藥不下兩者細洗去猪牙皂角去子各等分右為細末以紙捻蘸藥入鼻或用竹管輕吹入得嚏後進

藥  
○通頂散 治中風中氣昏不知人急用吹入鼻藜蘆 其生者細參絡一膏伍 右為末吹入鼻中一字就提頭頂髮立甦有嚏者可治

○治大人小兒禁口風 皂角灸去皮法蘿蔔如無用子右以皂角研末用蘿蔔或子同米醋研雞翎拂藥塗于根即甦

○皂角散 蘿蔔子 猪牙皂角各等右為細末每服二三錢水煎熱服半盞即吐

○麝香散 治卒中風昏倒地癱瘓口

喘諸藥未服者服之 真麝香仁 真香油兩 右麝香研細入油攪勻開口灌之自甦蓋麝香通關節可以

行至病所也

○稀涎散

治風涎不可喉中作聲如

牽鋸半夏大者十猪牙皂角一箇

右水煎入姜汁少許服不能嚙者徐

人灌之

○稀涎散

治中風痰涎壅盛口眼喎

斜膈塞不通明礬一兩半生猪牙

皂角四錢去皮右為末每服一二錢

溫水調下以吐為度

○獨聖散

治諸風痰盛及諸癰瘰飲

壅溢等証甜瓜蒂一兩妙黃色凡

右為細末每服半錢或一錢量入虛

實用之以酸壅汁調下以吐為度凡

行吐法宜於天氣清朗之日行之晦

日難得吐病暴急者不拘先令病者

隔宿不食如服藥不吐再用熱壅水

投之如吐風癰者加全蝎微炒如有  
重者加猪油五七點雄黃末各甚者  
加羌花末半錢立吐其虫

○道痰之劑

○三生飲

治卒中不知人口眼喎斜

半身不遂痰壅喉鳴及氣厥痰厥眩

暈南木香半一南星六川烏

附子各生各右煎服

○省風湯

治中風痰涎壅塞口眼喎

斜半身不遂不知人半風

其炙白附 川烏生木 星生絡

蝎右加姜

○貝母凡萎湯

治肥人中風口喎麻

木左右俱作痰治貝萎 星炮

荆風 羌 栝 芩 連 木

陳法半 薄桂 其炙 威 天花

粉各等 右加姜煎至夜服

○秘方白丸子 治卒風半身不遂口

眼喎斜痰涎壅盛喘急咳嗽胸膈滿  
閣及小兒驚風婦人血風

大半夏湯七次 白附洗 星洗 川

烏炮去 天蠶炮去 枳炒各

右為細末姜汁糊丸如梧桐子大每  
服二三十丸臨卧茶清下熱水亦可

小兒驚風風生姜薄荷湯下

○解毒雄黃丸 治中風牙關緊閉急及

痰涎咽喉腫閉如牙關緊閉開口灌

下 麝 雄飛各二巴十四箇

右為末醋煮麩糊丸黍豆大每服七

丸熱茶清下吐出血涎立甦

一去風解表之劑

○林小續命湯 治暴中風不省人事

覺半身不遂口眼喎斜語言蹇澀肢

體麻痺神情昏亂頭目眩暈痰涎多

傳東垣曰中風自汗者不可重發其

汗故此藥亦不可輕用 王仲景謂汗

出則止藥 已 桂 芍 杏

白芍 甘草 麻黃 各一分 風

仁附炮七 右分二貼每服水二盞

姜五棗一枚 去核煎八分服○精神恍

惚加茯神 遠志○骨節煩疼有熱

者 去附倍芍○心煩多驚 加犀

骨節疼痛 倍加桂附○嘔逆腹

脹 加半倍參○蕪寒下痢 去已

芍倍附加木○自汗 去麻杏加

采○脚膝弱加膝解○身疼加九○

腰痛加桃仁○失音加杏○無汗惡

寒倍麻風杏○有汗惡風倍桂芍杏

○身熱無汗不惡寒加知膏六附○  
身熱有汗惡風加葛桂苓○無汗身  
涼倍附加姜○有汗無熱倍桂附其  
○肢節疼痛不止加羌活○

○消風散 治諸風上攻頭目昏眩項

背拘急鼻嚏聲重耳鳴皮膚瘙癢癢  
疹婦人血風頭皮腫痒 荆穗 牛  
炒羌 蟬蛻法炒 藿 芎 風 蚕  
炒苓 參 略 二陳 祛 穢 朴半兩 各右  
為細末每服二錢○感風頭疼鼻流  
用荆芥湯茶清調下○遍身瘙癢濕  
酒下○

○八風散 治風氣上攻頭目昏眩肢

躄拘急癢痺癢疹鼻塞聲重 藿半斤  
祛 芷 前 格 一 莖 甘 參 格 二 卷  
風 格 三 右為末每服二錢酒下

湯調下食後服茶清亦可

○羌活散 治風氣不調頭目昏眩痰

涎壅滯遍身拘急及風邪寒壅頭痛  
項強鼻塞聲重肢節煩疼天陰風雨  
頭覺不安 前 羌 麻 白 苓  
芎 甘 炙 芍 蔓 枳 細 風  
膏別 菊法 梗 萸研 右咬咀每服一  
兩姜四片薄荷三葉水一盞煎至一  
盞去滓溫服去麻細膏菊加參天  
獨芎各一人參羌活散

○清氣宣風散 治上焦風熱膈痰

目赤耳鳴 芎 羌 半 生地  
蚕炒各 飯 木 白芍各一 風 枳  
牛菊 陳 荆 外 連 梔炒各  
蟬退炒 苓 格 六 甘 三 右分二貼水  
一盞姜三片棗一枚食遠溫服  
去風順氣之劑

烏藥順氣散 治風氣攻注四肢骨節疼痛遍身頑麻凡卒中手足癱瘓言語蹇澀者先宜服此藥以疎氣道然後隨証投風藥 麻去根陳去白烏各二兩蚕炒芎芷甘炙桔枳蘇炒各炒半一兩姜炒右為末每服三錢水一盞姜二片棗一枚煎七分溫服憎寒壯熱頭痛倦怠加葱白三寸身躄不能屈伸溫酒調服瘧疾抽之成瘧用薄荷煎常服

八參順氣散 治感風頭疼鼻塞聲重及一應中風服此藥疏通氣道然後進風藥 參各一兩姜各一兩芎各一兩甘各一兩炙各一兩桔各一兩枳各一兩蘇各一兩陳各一兩白各一兩麻各一兩右每服三錢姜二片棗一枚煎七分溫服

八味順氣散 中風先宜服此散進治風藥 木 白苓 青皁芷 陳眩烏 參絡二耳後一右

順風勻氣散 中風中氣半身不遂口眼喎斜先宜服此散大無順木細風二字天參絡一沉 芷 青 甘炙 蕪 瓜絡半 烏 脂各二錢右分二貼水二盞姜二片煎八分食遠溫服或風濕腰腿疼痛亦宜服之

勻氣散 治心脾疼 木半 甘 苓絡三沉 參 陳青 台烏 芷絡二天 木 卷 蕪 瓜絡一右入姜

防風天麻散 治麻痺走注肢節疼痛 風 天 芎 芷 川烏 白附 荆 飯 甘 卷各半滑二兩

右為未熟酒化蜜調服覺藥力運行  
微麻為度或蜜丸熟酒化下白湯化  
下亦得

一夫風養血之劑

○天奉丸湯

中風外無六經之形証

內無便溺之阻隔知血弱不能養筋  
故手足不能運動舌強不能言宜養  
血而筋自榮此方主之 凡 耳

芍 飯 白芍 膏 獨 白芍 各

不 羗 風 芩 芷 木 生地

熟地各五細二分 右作一服水煎

○如遇天陰加生姜三片○心下痞

滿加枳實一錢

○養活愈風湯

治腎肝虛筋骨弱語

言蹇澀精神昏憤安心養神調理陰  
陽使無偏勝治中風內外無邪服此

以行中道

羗 甘 風 蔓

芎 細 枳 熟地 參 麻 苜

甘菊 飯 知 莖 地骨 狗子

獨 芷 仲 朮 柴 守 西

已各三白苓 芩 芍各四分 蒼

生地各六枝半一分○天陰用加姜三

片右作一服空心一服睡下一參丹

臨臥一服睡下四白丹○望春大寒

之後加柴半參各三迎而奪少陽之

氣○望夏之月加膏本知各三迎而

奪陽明之氣○望秋之月加白朮苓

各三勝脾土之濕○初秋本暑之後

加升薑各三桂一分迎而奪太陰之

氣○望冬之月加附桂各半飯仁勝

少陰之氣

○大防風湯

去風順氣活血壯筋又

治痲後脚弱緩痛不能行名曰痲風  
或兩脚腫痛足脛枯脆名曰鶴膝風  
一切痲痺痿軟風濕按履之候服之  
如神 風 熟地 飯酒各 白  
芍 仲姜汁拌炒 木 半 不 卷 參  
膝酒 苁蓉各 芍 附炮各七  
右作一服水二盞姜五片棗一枚煎  
至一盞空心溫服

○林  
天麻丸 治風因熱而生熱勝則動  
以靜勝其燥是養血也此藥行榮衛  
壯筋骨 生地斤 羌附四 飯耐  
仲耐天 膝酒各三 草薺 玄  
參各六 附兩塊 丁方有獨活五  
右細末煉蜜丸

○續命者散 治風氣留滯心中昏憤  
四肢無力口眼開動或時抽搐及

產後中風自汗宜服之 風 獨  
飯 參 細 葛 芍 芎 甘  
熟地 遠 荆 半絡五 桂 七 不  
右每服一兩生姜片汗不止加蝎不  
半

○八寶回春湯 治諸虛不足風痰脈  
絡拘急痰涎壅盛飲食不進 白芍  
五芪三 木 兩 半 兩 生地 熟  
地 甘 桂 烏 姜 附炮參  
麻節 芩 已 苳 杏 風 芎  
飯 神 陳各一 沉 川烏炮各  
右加姜棗

一 去風清熱之劑  
防風通聖散 治諸風潮搐手足痲  
癢小兒急慢驚風大便結閉邪熱暴  
甚腸胃乾燥衄汗咬牙上竄睡語筋



轉筋悸肌肉蠕動 風 苧 飯

芍 大 芒 翹 苧 麻 絡 半

膏 施 桔 苓 木 荆 絡 半 耳

滑 絡 半 右 加 姜

○上清散 治因風頭痛骨眼睚俱

痛不可忍 苧 薺 芍 乳 荆

穗 沒 絡 一 腦 半 苧 芒 各 半 右 爲

細末每用一字薑肉搗

○獨活散 消風化痰治頭目眩暈

細 風 藁 旋 蔓 苧 獨 各

兩膏 苧 各 半 右 爲 末 每 服 二 錢 姜

三片水一大盞煎七分食後熱服

一攻裏通滯之劑

○三化湯 中風外有六經之形並先

以加減小續命治之若內有便溺之

阻滯以此湯導之 朴 大 實 麩

卷各三々半 右分二服每服水

二盞煎八分去粗食前溫服微利則

已

○製慧濟方 治中風六七日太便秘

結煩劇轉增 外 柴 苓 枳

麩 赤 芍 大 半 煮 桃 尖 皮 芒

麻仁去殼 將桃仁以下三味先生木

黃丁半研細貯碗右將麻已下五

味并太黃並水煎數沸攪勻用水冷

服

一鎮神之劑

○參丹 治健忘養精神定志和血

丹 參 熟 地 天 門 各 一 兩 半 人 參

丹 砂 遠 苧 各 五 神 灸 耳

麥 門 各 一 兩 右 爲 細 末 煉 蜜 丸 如 梧

子 大 每 服 五 十 丸 空 心 以 愈 風 湯 下

○四白丹

清肺氣養魄中風昏冒氣

不清利者宜服之

芷兩檀卷

獨藿各一

白苓朮縮參

風耳莎

芎各半知細絡二

甜竹葉二

芎三不麝一研牛黃

腦各半不

右為細末煉蜜丸每兩

作九丸隨口嚥一丸分五七次嚥以

愈風湯送下

○林至寶丹

治卒中急風不語中惡氣

絕及心肺積熱小兒諸瘤急驚心熱

並皆治之

生烏犀屑硃砂飛

雄飛玳屑

琥各一麝腦各一

牛黃兩

安息酒攪澄飛過湯六分

土得淨一兩

金箔一兩入藥

慢火熬成膏

右將玳瑁為細末研勻

箔十片

安息香骨重湯煮成反入諸藥中

丸

○犀黃清心丸

治諸風緩縱不隨語

言蹇痰涎壅盛心悸健忘或發癲

狂

羚兩風朮白芍門

芩兩半犀兩

麝腦各一參麴

炒蒲黃炒各二

白苓芎柴

桔杏各一兩

牛黃二兩雄仁甘

炙五

山七姜白斂各七飯一

兩

浸酒大豆黃卷桂膠各一兩

大棗

去皮成膏金箔片內四百

片為

右除棗杏仁金箔一角末及牛

麝腦雄四味為末入餘藥和勻煉蜜

同棗肉膏為丸每兩作十九丸以金箔

為衣每服一丸食後溫水化下

○珍珠丸

治所風為風和所干則

塊散而不守狀如鷲髻 珍珠母  
三分 阪 熟地各一兩半 參 酸棗  
栝子各一兩 犀 神 沉 龍齒各  
右為末煉蜜丸如梧子大辰砂  
為衣每服四五丸金銀薄荷湯食  
後吞下

○大辰砂丸

清頭目化痰涎及感冒

風寒頭目昏眩皆治之 天 苴  
甘炙 芷略一 風兩 細 苛略  
兩辰一兩 右七味為末煉蜜丸如  
彈子大硃砂為衣每服一丸細嚼食  
後姜湯下茶清亦可

一雜方

○貝母瓜蒌湯

治肥人患風口喎喎

木石右俱作痰治 具 萎 星  
炮 荆 風 羌 栢 岑 連

陳酥 木 半 蕪桂 甘炙 蕨  
天花粉各等 右每服七錢水二盞  
姜三片煎八分至夜服

○齊壽解毒湯

治中風心脾舌強不

語半身不遂 附炮 風 酸  
天略二分 羚 桂各二分 甘  
羌各一分 右分二貼每貼水二盞  
煎八分去粗入竹瀝二匙再滿服

○稀發丸

治偏風口喎時吐涎沫

語言寒泠筋脈拘掣緩弱久服耳目  
聰明髮鬢烏筋力壯健 稀發一味  
五月五日六月六日採洗去土攤取  
葉九蒸九曝每次蒸用少酒蜜水酒  
之蒸一飯久曝乾如此九次為末煉  
蜜丸如桐子大每服一百丸空心温  
酒或米飲送下

○姜活丸

治風氣不調頭目昏眩

痰涎壅滯遍身拘急及風邪壅塞頭  
痛天陰先覺不安 羌 甘菊  
麻 芎 風 前 膏 本 甘 炙  
細 枳 白 苓 蔓 去 皮 各 硃 砂  
一兩半 右為末水糊丸如桐子大  
每服四十九丸姜湯下臨卧食後服

一易簡

○林治中風口眼喎斜枯槁絞取汁和  
麥麩作餅炙令熟熨正便已勿令六  
遍

○又巴豆七枚去皮爛研啞左塗右手  
心啞右塗左手心仍以暖水一盞安  
向手心須更便正洗去藥并頻抽  
中指用草麻子亦可

○丁方皂角一兩去皮弦子炒為末

調敷

○又桂心酒煮取汁故布蘸搗病上正  
即止左啞搗右右啞搗左常用大效

○治風壅痰涎喘多兩膈不利 牛蒡  
子微荆穗各一斗炙半兩 共為末食  
後臨卧湯點一錢服

○丁方五月五日午時取蒼耳葉曝乾  
為末酒或漿水服方寸七日二服作  
散若吐逆蜜丸準計一方七風輕易  
治者每服若身軀有風處皆作粟肌  
出或如麻豆此風毒出也以針刺潰  
去之黃汁出乃止五月五日多取陰  
乾着大瓮中積取用之若時氣不和  
舉家服之并殺三五腸痔一周年服  
之佳七月七日九月九日採用之

一痛風并痺証

○傳夫古之所謂痛痺者即今之痛風也  
諸方謂之白虎歷節風丹溪曰大率  
因血虛受熱又曰濕痰濁血流注為  
病太法用蒼星芎芷散  
酒芬在上加羌枝枯威在下加膝已  
通栢○因痰者二陳加酒洗芍卷蒼  
○因濕者用二木佐以竹瀝姜汁及  
行氣之藥

○加味四物湯

治白虎歷節風

本方加桃膝陳苳并芷膽○在上者  
加羌枝威○在下者加膝已通栢○  
氣虛加參朮枝○有痰加星半生姜  
○血虛倍散芎佐以桃紅

○一方

治上中下痛風

連妙蒼米泔浸星酪二麴妙芎各一  
桃芷已絡五歲酒枝橫行羌各三

○小膽正酒紅瓦右為細末神麴糊  
丸如梧子大每服一百丸空心服

○天羌活湯

治風濕相搏肢節疼痛

羌 升絡一獨杜蒼 歲 已 木  
飯 苓 沢絡五 右作一服水下  
盡半煎至一盞去粗空腹溫服

○四妙散

治疔疔疼痛

歲乾碾碎羯羊角灰仁蒼耳子半一  
白芥子炒一 右為末每服一錢七  
姜湯調下

○一方

治飲酒濕痰痛風

栢酒

歲酒炒各蒼米泔浸羌 耳沒絡陳  
眩芍絡一 右為末每服一錢七姜  
湯下

○肢節腫痛濕熱流注於肢節之間翻

名之靈也

麻節赤芍絡一風

荆 卷 獨 芷 蒼 歲 實  
片 今 爛 桔 葛 苜 絲 半 苳 飯 梢  
升 絡 三 下 焦 加 酒 栢 ○ 婦 人 加 酒  
紅 ○ 腫 多 加 枚 腹 沃 更 加 沒 一 錢 定  
痛 木 妙 ○ 脉 溢 數 有 瘀 血 用 桃 紅 苜  
飯 大

○一妙散

治脚膝濕熱成痛

栢 酒 一 兩 醋 蒼 朮 其 浸 春 秋 一 宿 冬 三  
右 爲 細 末 沸 湯 入 姜 汁 調 服 或 爲 丸  
姜 鹽 湯 送 下 氣 實 者 加 少 酒 佐 之

○潛行散

栢一味酒浸曝乾爲末每

服方寸匕四物湯調下治血虛陰火  
痛風多服效

○手臂痛是上焦濕痰橫行經絡中作

痛也 半 酒 芍 木 星 苳 各  
不 貴 苓 絡 五 蒼 半 不 歲 三 苳 分

右爲一服生姜煎水二盞煎至一盞  
食後服

○加味二陳湯

治臂痛

本方加酒芍 卷 歲 入 姜 水 煎  
食後溫服

○一方

治痛風神效 赤苳 青

歲 木 一 驚 絡 半 紫 威 苳 風 絡  
粉 苳 右 酒 煎 服

○治婦人胸背脇走痛 赤苳 苳

栢 絡 一 枝 蒼 絡 半 歲 半 酒 苳  
右 酒 煎 服

○治走注疼痛 歲 蒼 枝 飯

桃 祛 皮 猗 妙 生 桃 髓 苳 仁 苳 半 不  
右 加 生 姜 五 片 水 煎 入 童 便 竹 瀝 各  
半 盞 煎 熟 服

○節筋湯

治臂痛不能舉是氣血凝

滯經絡不行所致一名五痺湯效如神  
片子姜黃仁耳冬卷絡半海桐皮  
祛外飯赤苟木絡一右作一服  
服生姜三片水一盞半煎至一盞  
去粗沉香磨末少許入內溫服

○加味二妙丸

治兩足濕痺疼痛或

從足跗熱起蒼朮酒浸  
飯尾糯草已板酥各右為  
末酒煮麵糊丸如梧子大每服一百  
丸空心姜塩湯下

○活湯

治白虎歷節風毒注骨髓

疾發不定卷四附炮尤桂  
木苧飯膝麵桃炆燉骨  
碎補風絡一其條六右分一貼  
姜版

○加減地仙丹

治風冷邪濕留滯

焦足膝拘急腫痛地龍炒去  
灵脂祛烏藥白膠香礪椒紅粉去  
歲瓜小豆炒黑豆炒去天仙藤  
川烏炒去五加蒼朮浸木別祛  
右為末酒糊丸空心塩酒湯下  
○仙酒方 治諸風疾手足拘牽半身  
不遂膝尤枯風卷晚  
蚕沙洗淨炒拘分蒼朮炒牛蒡根  
大麻子絡一牛蒡子碎右為末糯  
米酒一斗磁瓶內浸藥封口七日開  
封勿令面近瓶內恐藥氣犯眼日進  
三服每一盞

○秘傳藥酒方

治男婦風濕相搏腰

膝痛及風濕脚氣芷桂半  
巴苧苓桂苟麻苧各  
兩什飯凡陳枳獨

候略半膝 烏略 二蒼四兩

仲如兩酒 右到布袋貯用無灰酒

三斗埋蒸封口煮一時夕過三日後

取酒飲盡相晒乾為末酒糊丸如梧

子大七八十九酒下

○茯苓湯 治痛痺四肢浮腫

赤苓 桑略二芍 風 桂 芍

麻略半 右入姜棗水煎溫服以姜

粥投之汗泄為度有痺留注加飯其

○防風湯 治血痺皮膚不仁 風

獨飯 芫 赤苓 赤芍 芍略 桂

杏 其棗略 右入姜

○全附散 治痺痛自腿臂發作不定

者 小芍 附 芪 木 柴 風

熟地 飯 桂 其 右等分入姜

棗

○續斷圓 治風濕流注四肢浮腫肌

肉 麻痺飯炒續 薛 芍絡杜

乳 風 附 沒略半 天 右為

末煉蜜丸溫酒米飲任下

○生料五積散 治寒濕麻痺 方見傷

○蠲痺湯 治風濕相搏手足冷痺腰

腿沉重身軀煩疼 氏縮 風 各

細若 赤芍 姜黃 飯 酒 各

其酸半 右加姜

○烏藥順氣散 治麻節走注骨節疼

痛 加凡 沒 藕木 方見右

○附子八物湯 治麻節身痛不可忍

附炮姜炮芍 苓 甘 炙 桂 參 各

兩木 兩 右 一方去桂用乾地二

○三痺湯 治男婦血氣凝滯手足拘

○林



坐風痺氣理等續仲風桂

細參苓芍飯麴其丸

生地芍獨絡一膝麴其丸

右每服七錢姜五片棗一枚木二盞

煎至八分溫服

○**薏苡仁湯** 治手足流注疼痛麻痺

不仁難屈伸薏飯芍麻

桂其丸酪倉右每七錢半生

姜七片煎食煎服○自汗其丸麻○熱

減桂

○**通氣防風湯** 治背痠不可回顧及

腰似折項似拔此太陽經氣鬱不行

也此湯治之此丸見前濕用

羌獨絡二風其丸葛絡一芍其丸

蔓其丸右如身重腰沉其丸經中有寒

濕更加酒洗漢防已半錢附其丸

○**如意通聖散** 治風濕走注

壘丁皮麻風芍飯其

次絡右咬咀炒黃每服七錢水二

盞煎八分去粗入乳沒各少許每煎

執服出汗

○**如神救苦散** 治風濕痺痛走注癱

瘓壘祛其丸陳祛其丸虎其丸

麴乳沒其後絡二右為末每服

三錢煎通相執服

○**十味劉散** 治中風血弱臂痛

飯芪炙白芍絡三附其丸半芍風

木絡半桂其丸熟地其丸各

右分二貼姜八片棗二枚食後臨臥

服

○**活絡湯** 治風濕痺痛

木飯羌獨其丸芍絡半

右分一匙姜三片

烏沉木香四物湯 治濕滯脾經有

臂手足疼 莎烏 芍 飯芍

熟地 莖絡二茸炙木絡一右

加味二陳湯 治管痛

本方加翹 風 芍 皂刺 酒芍

蒼

芎活湯 治水飲留滯背痛 芎

獨半 苓 陳 枳絡 木 茸

炙絡 右加姜

羚羊角散 治筋痺肢節束痛 羚

薄桂 附 獨三仁 白芍 風

芎略一 右加姜

五加皮浸酒方 治風濕相搏腰腿

疼痛四肢垂急皮膚癢痺添精補髓

五加甌木 右吹咀生絹袋盛以酒

酒一壘將藥袋入酒中用竹葉密封

罌口入滾鍋內煮一時取出後浸二

十七日開壇空心臨卧飲一二盞多

服効

一痿証并麻木

傳丹溪曰內經謂諸痿起於肺熱又謂

治痿獨取陽明之經蓋嗜慾無節則

水失所養火寡于畏而侮所勝脾得

火和而熱矣木性剛急肺受熱則金

失所養木寡于畏而侮所勝脾得木

邪而傷矣肺熱則不能管一身脾傷

則四肢不能為用而諸痿作矣馮南

方則肺金清而東方不實何脾傷之

有補北方則心火降而西方不虛何

肺熱之有又曰內經論風論痿各有

篇且治法迥異局方以治風藥通治

諸痿何其謬哉

○東垣治痿無一定之方黃柏為君黃

芪等補藥為佐視所授之証制其方

○濕熱用健步丸加柏蒼蒼之類

○濕痿一陳加二末岑柏竹瀝姜汁之

類

○血虛四物加蒼柏七補陰丸補腎丸

○虎潛丸補腎丸 補腎丸 補腎丸 補腎丸

○虎潛丸 柏斛知酒熟地 各三

板酥酸白芍 陳 膝略二虎脛兩

瑣細飯略半 右為末酒煮羌羊肉

為丸塩湯下冬加乾姜半兩

○氣虛 四君加蒼柏九柏蒼治痿

之要藥也

○加味四物湯 治諸痿四肢軟弱不

能舉動 飯身 柏 蒼略一熟地

仁白芍 芎 仲絡北門一五味丸

參 連絡半知三膝軟粉促豚右煎

服又酒糊丸服亦可

○健步丸 治痿中無力屈伸不便腰

脚沉重行步艱難 羌 柴 滑炒

甘炙枯酒桂絡五風 沢絡三苦參

酒川烏炮絡已酒洗 右為末麩糊

丸如梧子大每服七十丸愈嵐湯下

一云荆芥湯下按荆芥湯又號愈嵐

湯也

○大防風湯 治兩足痿弱或麻痺或

兩膝腫痛名曰鶴膝風方見右

○相傳經驗 治兩足痿弱軟痛或如

火焙 蒼米泔浸柏酒浸四兩乾膝

飯尾略二板繼虎脛骨已略一

右為末麩糊丸如梧子大每服七十

左姜盪湯下一方加炮附五分

○鹿角膠丸 治血氣虛弱兩足痿軟

不能行動 鹿角膠斤鹿角霜 熟

地絡半膠 白苓 兔絲 參 木

仲酪二飯身鹿膠鹿膠用無灰酒二盞

右為末別將鹿角膠用無灰酒二盞

煇化丸如梧子大每服一百丸空心

姜盪湯下

○除風濕羌活湯 治諸痿濕氣勝風

証不退眩暈麻木不仁 羌活風

蒼 苾絡一升廿多獨 柴絡五

芍 栢 陳 藁絡三沃 猪茯苓

分連分 右

○清燥湯 治濕熱成痿腰以下痿

軟不能行 苾半多蒼不木 陳

沃絡半五味仇白苓 參 升絡三

門 飯身 生地 麴 猪 酒栢

絡二柴 苾灸連絡一右慧無連

○加味四斤丸 治腎肝虛弱骨痿弱

從容酒膠酒天 瓜 鹿茸 酥 麩熟

地 兔卵碾五味酒碾各 右為末

煉蜜丸如梧子大每服五十九食前

米飲下

○丹溪曰十指麻木胃中有濕痰死血

二陳加一二木桃紅少加附

○人參益氣湯 治兩手指麻木四肢

困倦熱傷元氣也 苾仁多苾 升

絡半五味三十柴分生苾 參絡二

粉白芍廿 右

○道氣湯 治兩腿麻木沉重 苾仁

苾半多青一升 柴 飯栢 沃絡

參陳二分紅紗五味三十 右

○天麻黃芪湯

治素<sup>有</sup>風証因<sup>醉飲</sup>

其証復來右口角<sup>併</sup>眼牽引側視及  
左手腿脚麻木疼痛<sup>多</sup> 天 芍 麴  
步<sup>差</sup>如<sup>不</sup>肢<sup>不</sup>膝<sup>不</sup> 苓<sup>三</sup> 參 連<sup>路</sup> 四  
飯<sup>短</sup> 莖 其 升 葛 栢 蒼<sup>格</sup>  
分<sup>沢</sup> 杜<sup>柴</sup> 桃<sup>或</sup> 或<sup>加</sup> 楮<sup>欲</sup> 右

○神効黃芪湯

治麻木不仁或兩目

羞明昏花睛痛<sup>多</sup> 蔓<sup>仁</sup> 陳<sup>待</sup> 參<sup>分</sup> 瓜<sup>象</sup>  
其 白<sup>芍</sup> 絡<sup>一</sup> 芪<sup>仁</sup> 右<sup>水</sup> 煎<sup>去</sup> 穉<sup>穉</sup>  
臨<sup>卧</sup> 熱<sup>服</sup> ○如<sup>麻</sup> 木<sup>不</sup> 仁<sup>雖</sup> 有<sup>熱</sup> 不<sup>不</sup>  
加<sup>黃</sup> 栢<sup>只</sup> 加<sup>黃</sup> 芪<sup>不</sup> 通<sup>多</sup> ○如<sup>麻</sup> 木<sup>不</sup>  
甚<sup>者</sup> 加<sup>芍</sup> 藥<sup>不</sup> 通<sup>多</sup> 如<sup>有</sup> 太<sup>熱</sup> 証<sup>証</sup>  
加<sup>酒</sup> 栢<sup>分</sup>

○祖傳經驗三妙丸

治濕熱下流兩

脚<sup>麻</sup> 木<sup>或</sup> 如<sup>火</sup> 燔<sup>多</sup> 栢<sup>四</sup> 兩<sup>兩</sup> 切<sup>片</sup> 炒<sup>蒼</sup>  
六<sup>兩</sup> 米<sup>泔</sup> 浸<sup>一</sup> 膝<sup>二</sup> 右<sup>爲</sup> 末<sup>麴</sup>  
二<sup>宿</sup> 細<sup>切</sup> 燻<sup>一</sup> 膝<sup>二</sup>

丸<sup>不</sup> 如<sup>梧</sup> 子<sup>大</sup> 每<sup>服</sup> 五<sup>七</sup> 十<sup>九</sup> 空<sup>心</sup> 姜<sup>姜</sup>  
塩<sup>湯</sup> 下<sup>忌</sup> 魚<sup>腥</sup> 香<sup>麥</sup> 熟<sup>麴</sup> 煎<sup>炒</sup> 等<sup>物</sup>

傷寒門

附

中寒

傷風

感日

一傷寒溫病熱病之異

○林 中而即病名傷寒寒毒藏肌膚至春變為溫病至夏變為熱病醫者均謂之傷寒

一傷寒中寒之異

○林 寒邪傷胃急痛拘攣戰掉強直昏迷厥冷口噤失音此中寒也無汗惡寒頭痛面慘發熱拘急手足微寒此傷寒也

一傷寒中寒為一之說

○傳 有至人傳云傷寒大法有四曰傳經直經即病鬱病夫即病者多為專經鬱病者多為傳經云或但中於太陽未及鬱熱而即發首尾只在本經而不傳變者宜 麻黃 桂枝 等湯

驅散表邪而愈或有從太陽未及營熱不從陽明小陽而入於三陰之經者亦有初不覺入於陽經而直傷於三陰之經而即病者因其味自營熱是以一切為寒証故多有霜降後至春分前發者是也為其無頭眩無入熱脈沉遲而微故古方又出中寒一條實此証也

一傷寒傷風之異

林以日傳變與傷寒無異但寒泣血故無汗惡寒風散氣故有汗惡風為不同

一傷寒感冒之異

傳傷寒溫病熱病之死有四時感冒新受風寒之輕証而見頭痛體痛惡寒發熱等証非營氣傳經重病之比

一六經之脈証

一 二日太陽脈浮惡風寒頭項強痛腰脊痠

二 三日陽明脈長不惡寒反惡熱目疼鼻乾不得睡

三 四日少陽脈弦細口苦咽下堅滿往來寒熱耳聾

四 五日太陰脈沉細腹滿而乾

五 六日少陰脈沉欲寐而渴

六 七日厥陰脈絀氣上衝胸飢不食食吐蛆煩滿囊縮

一兩感  
掌一曰太陽 少陰 頭痛口乾渴  
二曰陽明 太陰 身熱譫言腹滿不食

三曰少陽 厥陰 耳聾囊縮而

厥內外兩感府藏俱病表裏不能一治故難治脈從陽可治從陰難治

傳經曰兩感於寒者死是內外兩感藏府俱病欲表之則有裏欲下之則有表表裏既不能一治故死然所稟有虛實所感有淺深虛而感之深者必死實而感之淺者猶或可治治之而不愈者有矣夫有不治而復生者子掌用此間有生者七得二三故立此方名解利兩感神方大羌活湯方有

一表證

- 林 脈浮緊表實無汗麻黃湯
- 脈浮緩表虛自汗桂枝湯
- 脈浮緩反無汗脈浮緊反煩躁 各半湯麻黃桂枝合為一劑
- 一 半表半裏

○ 金針發熱邪在表若小便黃非在死蒸蒸發熱邪在內若小便清非在內

○ 脈浮大是表証尿赤煩渴是裏証是表裏俱見也 五苓散

○ 心下滿不食大便堅脈沉細是裏証頭汗出微惡寒手足冷是表証此在半表半裏 小柴胡湯

○ 不大便頭痛有熱是裏証小便清不在裏此表裏俱見也 桂枝湯

○ 裏証已急或脈浮或頭痛表証仍有者用 大柴胡謂之雙解

一裏証

○ 裏証者內熱是斷宜下之  
○ 不惡寒反惡熱腹下汗出咽乾糞結潮熱腹滿喘或譫妄脈沉滑是裏証也



小便少手足心身腹下不滋潤者不可攻

一表裏寒熱

○發熱反欲得衣熱在肌表寒在骨髓  
○脈沉遲手足或微厥下利清穀此陰  
証發熱表未解 四逆湯或通脈四  
逆湯

○活人曰表熱裏寒先與 陰旦湯

芍 其後略姜為本略 桂枝加

附 五 右到煎 寒已次小柴胡加

桂

○身寒反不欲近衣熱在骨髓寒在肌  
表先用 白虎加人參湯熱除次各  
半湯

○脈滑而厥口燥舌乾惡寒而踈時以  
煩不欲厚衣 大柴胡

一陽毒

○初受病時邪毒深重當活失汗當下  
失下或吐下後知熱裏虛而入或誤  
服熱藥並為陽毒必發狂登高歌棄  
衣走身面錦斑鼻燥舌卷焦黑脈洪  
大五日可治六七日不可治

○若熱甚時昏口噤咬牙藥不可下者  
用水清法候牙寬狂定用藥

一陰毒

○初受病時寒邪深重致陰氣獨盛或  
汗吐下之後變成陰毒唇青面黑厥  
冷身疼如被杖腹中絞痛或自利咽  
不利虛汗嘔吐脈沉微三日可治五  
日不可治或 真武湯 或飯 桂  
升 其 雄 蠶 椒 水煎溫服  
芒血覆取汗或用葱熨法溫臍下漸醒

肢温有汗即瘥續用四逆湯之類如  
尉而肢不温不可治

○葱熨法 治中寒氣虛氣息欲絕及  
傷寒陰厥葱一握以糸纏如餅去根  
葉惟存白長二寸許以火煨令通熱  
以熱處著臍上下各一餅環即易手  
足温有汗更服姜湯一盞良

○慧 又法葱一握取白二寸於成餅先用  
麝香半分填臍肉上放葱餅以火熨  
之連換二三餅稍醒灌姜汁如不醒  
灸關元氣海二三十壯手足温即醒  
若生手足不温汗不出不省人事者  
死

○選 手足厥冷腹中絞痛唇青氣冷急於  
丹田穴灸之或二五十壯或百壯視  
輕重手足煖為度

○陰毒傷寒四肢逆冷身熱之以其策  
黃一升酒和勻濕絹袋二雙蒸之極  
熱熨兩脚心候氣通輒勻暖即停熨  
累用極驗

一陰證

○傳 怯弱人感寒濕發熱不食數日後不  
省人事言語亂妄神思昏迷面青齒  
黑為必死之証脉沉細先用小柴胡  
等不愈急用四君加附子數片煎以  
碗盛放水盆中少時殺其熱性稍温  
服之脉與神思即回然後可用別藥  
謂之陰証之傷寒

○下後三五日後妄言不寐此神不守  
舍慎勿復下脉多沉細足冷氣促面  
青黑口乾 補中益氣湯倍參加竹  
葉

一陰證似陽陽證似陰

○煩躁面赤微熱脈沉微此則陰證似陽以脈為據不必定症

○小使赤大便結脈沉滑四肢逆冷伏熱深也此則陽證似陰輕者白虎重者兼氣

一溫家之五証 春日傷寒名溫病

○溫病冬傷於寒春必病溫脈浮數發熱頭痛亦惡寒輕於夏夏升麻湯解肌湯桂枝湯

○溫氣來行變成溫疫作天行少長皆同陽脈濡弱陰脈弦緊者熱溫寒清順時宜以平為期

○溫毒陽脈洪數陰脈實大更遇溫熱變為溫毒發斑生疹咳衄心下痞悶玄參升麻湯

○風溫頭痛身熱自注四肢不收多眠鼾息陽脈浮滑陰脈濡弱 黃芪防已湯切忌汗方見中濕門

○溫瘧脈陰陽俱盛重感寒者變成溫瘧 小柴 白虎之類

○濕家之二三證  
○濕溫暑濕相搏成濕溫胸間多汗頭如劈脛冷身重陽脈濡而弱陰脈小而急茯苓白朮湯 芍藥甘草湯

○中濕一身盡痛發黃大便快尿淡脈沉而緩 五苓散

○風濕肢節痛重難轉側額上汗出不欲去被身腫日晡劇其脈浮發汗微少出則風濕俱去也

一瘥證 掌林

太陽經中風又感寒溫又大發溫家

汗則成瘧發熱惡寒似傷寒及張口  
噤如癰

有汗不惡寒者瘧 桂枝加葛根湯

無汗惡寒剛瘧 葛根湯

一惡寒林

太陽發熱無汗惡寒 麻黃湯

陽明雖有下証但惡寒表未解也

麻黃湯

太陽發熱無汗惡風 桂枝湯

陽明脈遲汗多微惡寒表未解也 桂枝湯

少陽頭痛發汗惡寒 小柴胡

少陽發熱微惡寒 柴胡桂枝湯

少陰惡寒脈沉細 四逆 理中湯

汗後惡寒虛也 芍藥甘草附子湯

芍 甘略三附一枚 右

下後惡寒而體溫脈微惡寒表裏

虛小建中湯

吐下後不解執湯時以惡寒表裏俱

執白虎湯

潮熱林

少陽王叔真知太陽王叔已午必此

時發熱邪未入胃應於未申發者謂

之潮熱邪在胃

惡寒潮熱或瀉咳逆 小柴胡

脈浮潮熱兼寒 小柴胡加桂

脈浮弦小便難噦腹滿脇痛無汗喘

引小柴胡加茯苓

下後不惡寒腹滿喘潮熱 大小柴

氣

脈實潮熱 大承氣

下後潮熱大便復硬 大柴胡

汗下後不解日晡潮熱循衣摸床喘

急直視女 美氣湯 脈弦生滿死  
日晡潮熱脈虛微汗之 桂枝湯

煩熱林

爲煩而熱無時而渴者是也

心煩喜嘔 小柴胡

汗後煩熱而渴 辰砂五苓散

汗後胃乾煩不眠欲飲水少與之心傳

煩不得臥 梔子豉湯

一煩躁林

煩爲內不安躁爲外不安邪氣在表

者在裏者因火劫者陽虛者陰盛者

煩躁者證之常也非逆也

結胸煩躁者發熱下利厥逆煩躁不

得卧者吐利煩躁四逆者自利煩躁

不得卧者皆死

惡寒而踈時自煩欲去衣

大柴胡

煩躁消渴 辰砂五苓散

汗後煩躁不得眠欲飲水少與之

自汗心煩小便多 芍藥甘草湯二

等

五五白不大便繞臍痛煩躁發作有

時此有燥屎 小承氣

吐利厥冷煩躁欲死 吳茱萸湯

柴 生姜各一兩 參三分 棗三 右

陰盛而煩躁名陰躁 四逆湯

下利咳嘔煩躁不得卧 猪苓湯

傷寒五六日脈微手足厥冷煩躁名

厥陰背第四椎兩傍各一寸半 名

厥陰厥陰俞 但足厥陰經穴也

自汗盜汗肢汗頭汗林

發熱惡風自汗太陽中風 桂枝湯

自汗小便數 芍藥甘草湯

自汗身熱不渴 柴胡加桂

多發汗汗漏不止名漏風上陽 桂枝 附子湯

陰証四肢厥冷自汗 四逆湯

陽明証汗多渴不大便 調胃承氣

汗多不止 木 藁 苜 芷 酪

米粉半 兩為細末周身撲之 見自汗

門

○汗多亡陽煩躁惡風不得卧先與防

風白朮牡蛎湯二味等分為末米飲

調常時酒調極佳汗止後用 小建

中湯

○肢汗大便難證語四肢汗出熱裏於

胃也可下

不食小便澀四肢汗出中寒也可溫

不可下

盜汗睡而汗出覺則旋止非如雜病

之風邪在半表半裏也

○汗出而微惡寒 小柴胡加桂

脈浮潮熱或盜汗 黃芩湯 苓

芍 甘草等 棗

○頭汗汗下後胸脇滿結小便不利往

來寒熱心煩而頭汗出 柴胡桂姜

湯

頭汗出惡寒 小柴加桂

汗不止者難治喘亦然心下滿頭汗

出水結胸 小半夏茯苓湯

一 無汗 林

脈浮而遲不能作汗身必理 桂麻

各半湯

陽明主有汗今反無汗身痒皮中久

風故也

木附湯 黃芪建中湯 桂枝湯

一頭痛太陽証多頭頂痛屬厥陰頭角痛屬少陽額痛及鼻陽明

無汗發熱惡寒頭痛 麻黃湯

六七日不大便頭痛有熱尿清不在裏仍在表須汗痛甚者必衄 葛根

葱白湯 荆防散 川芎石膏湯見

頭痛

汗出發熱惡風頭痛 桂枝湯

輕者 柴胡桂枝湯

半表半裏往來寒熱頭痛脈弦細

小柴胡湯

發熱頭痛似瘧為欲愈 各半湯

厥陰少陰頭痛嘔吐涎沫 吳茱萸湯方見前

湯方見前

夏月頭痛身冷自汗中氣者濕也木附湯

夏月頭痛惡寒心下煩躁不快五苓散

自汗頭痛風暑及雜病俱宜白虎或

少加夏劑尤妙 或竹葉石膏湯

表邪入裏不大便熱脈沉澀而長頭

痛可下

熱不惡寒或不大便小便赤者胃實

也調胃承氣湯

汗後不解頭痛不止 芷 辛 烏

搗膏貼額上或用不卧散吹入鼻內

一胸脇滿

胸滿多帶表証 胸滿多飲半表半

裏半表半裏脇下痞鞭 冲和湯

去棗加蚘小柴胡湯別名也

汗下後胸脇滿微結小便不利渴而

不嘔但頭汗出或往來寒熱此柴胡湯

桂湯下利身熱腸痛 大柴胡

寒中誤下之愈不快腹脹或吐或利

理中湯 枳 陳輩

心下滿而不痛 半夏瀉心湯

嘔滿而發熱者 小柴胡

飲水多心下滿脹 牡蛎沢瀉湯

一結胸

結胸有下之早而成者脈浮緊心下硬痛未可下之按之則痛為水結胃不接而痛為大結胸

結胸証悉具而加之煩躁者不治

結胸有熱或煩渴先沖和加枳實次

下本藥

飲水不散而結 小半夏茯苓湯或

小柴胡加苓蛇或五苓合枳木湯

枳木湯 實兩 木兩 右

結胸喘促狂亂大躁用地龍水一服未効再服自然汗出愈

和熱在上胸膈痞結未辨虛實先與

理中加枳實芍藥或桔梗枳殼湯二

分

結胸不可近用陷胸藥不効枳

實 理中丸 苓 參 木 姜炮

甘淡略實斤六右煉蜜丸温酒或白

湯下

渴者加枯萎

汗後未全解誤下之為小結胸煩渴

脈實宜一二黃瀉心湯各等分 表

未全解亦不可用

熱實脈沉緊心下痛 大陷胸湯

寒實脈浮滑心下按之痛無熱証

三物小陷胸湯 白散亦可



項強如瘕或從心下至臍上手不可  
近大陷胸湯

灸 黃連二寸許為末巴豆七粒去殼  
研細入黃連末檢作餅子按臍中以  
艾炷如指頭大灸之輕者一炷重者  
不過二三壯熱氣入腹作聲取下惡  
物而愈

慧心下飽悶未下者非結胸及表  
邪傳至胸中未入腹小柴胡加枳芍未  
効本方合小陷  
胸加枳芍即愈

一痞

痞心下滿而不硬按之不痛曰痞硬  
水停滯氣聚不滿不硬但妨悶者非  
痞謂之支飲 小柴胡加桂 胸滿  
而漉漉者半夏瀉心湯 旋覆代赭湯  
旋 甘略一參六分 赭三分生薑  
一兩半八東附二右 輕者 枳實  
枳實湯 枳 半略一實附 陳二  
右或加苓甘又用苓白朮甘草生  
姜湯

胸滿硬按之不痛關脈沉緊 大柴  
胡痞滿小便不利 五苓散

一腹脹滿

腹中滿痛 小柴胡 去芍  
六七日不大便腹滿痛急下之小柴  
氣

大實痛者 桂枝大黃湯

譴妄脈沉數煩渴不拘日數譴胃兼  
氣

太陽病反下之因而腹滿時痛 桂

枝芍藥湯

小腹痛硬小便自利如狂者血証也

小腹急結者 桃仁煎氣

小腹痛，尿不利，為無血，當逐利之。  
腹痛

按之小痛，為虛，尺脈弦，腸鳴泄利。

小建中湯

按之痛者，為實，關脈實，腹滿而大便  
秘，桂枝加大黃湯

少陰腹痛，或泄利，通脈四逆，加芍藥  
湯

陽脈濡，陰脈弦，泄利，桂枝芍藥湯

厥陰証，小腹痛，當四逆湯

飯酒枝，芍，細路三，并灸，通草各  
兩，棗二，附，右

少陰病利而噤，厥逆，腹脹，四逆五  
味子干姜湯

少陰腹痛泄而厥，冷脈微不寒，面  
赤裏寒身熱，通脈四逆湯加芍

因脈實便秘，腹滿，絳脈，煩渴，喘，身作  
有時燥屎，大承氣

腹滿時痛，桂枝加大黃湯

咳嗽掌林

在表之邪，於肺氣則咳嗽，當發散  
而愈

太陽發熱而咳，小青龍

表未解，心下有水，乾嘔發熱而咳，  
小青龍

發熱嘔噦而咳，小柴胡

少陽寒熱往來而咳，胸脇滿，或泄利，  
小柴，去參，棗，加五味，姜

少陰四肢厥逆，腹脹，或泄而咳，四  
逆散，加五味，姜

有痰而咳，大半夏湯

春夏傷寒，秋夏傷風，濕之咳嗽，喉鳴

月五

上氣 橘皮湯 方見咳嗽門

少陰或咳或悸小便不利 四逆散

小陰腹痠尿不利四肢重疼自利而

咳 真武 加五味 細辛 干姜

喘急

和氣外盛而喘雖汗喘不已然汗

下亦可發之 麻黃杏子石膏湯

麻 一分 杏 伍十 膏 二兩 甘草 六分 右

脉盛自汗喘 大柴胡

大陽下之微喘者表未解也 桂枝

加厚升杏子湯

水停心下小便不利腹滿而喘 小

青龍 去麻 加苓

汗後飲水多咳嗽 小青龍去麻加

杏

逆

腹滿而喘潮熱者外欲解 大柴胡

汗後潮熱不惡寒腹滿大便實喘

小承氣

桂枝証反下之利不止脉促喘汗出

葛根黃連黃芩湯 葛 芩 甘草

各 連 仁 右

直視譫語喘滿者死汗出身潤喘不

休肺絕身汗如油喘不休命絕

嘔吐

嘔吐先嘔後泄為欲解先泄後嘔為

水停心上 赤茯苓湯

嘔發熱柴胡証具心下急微煩

大柴胡 胃腸滿嘔潮熱小柴胡加

芒

吐逆一便不通厥逆無脈 大承氣

半表半裏証多嘔吐 小柴胡

胸熱腹痛嘔吐 黃連湯 連 其

姜 枝各一參 半絡半棗二 右

嘔吐手足冷 小橘皮湯

寒多而嘔吐 理中湯 不飲水而吐

理中 去朮 加生姜

經汗下閉脈遲胃虛冷而吐 干姜

黃芩黃連人參湯各等分

發汗後水藥不下及諸嘔吐穀不下

小半夏湯

煩渴欲飲水水入即吐 五苓散

嘔而思水者急與 猪苓湯

右虛熱止氣氣逆欲吐 竹葉石膏

湯

瘧後餘熱在胃而嘔者 竹葉加生

姜汁湯

治熱嘔不可無烏梅

一 渴邪傳裏熱氣薰蒸焦膈

脈弦而嘔渴邪在半表半裏 小柴

胡加枳

消渴氣上衝心中夜熱 桂苓白

朮甘草湯 桂兩三苓兩四朮兩二右

汗下後胸膈滿微結尿澀渴不嘔頭

汗出往來寒熱心煩 柴胡桂枝于

姜湯

汗多而渴 小柴去半夏加參 枳

脈浮發熱渴欲飲水小便不利猪苓

湯

下利咳嘔煩渴不眠 猪苓湯 汗

多者不用

汗後脈洪大而渴陽明脈長有汗發

熱而渴並 白虎湯

吐下後七八日不能表裏俱熱惡

風大渴舌乾欲飲水太陽服桂枝

大汗出煩渴中暈四肢冷汗出煩渴

並白虎加人參湯

夏至前後煩渴發熱不惡寒竹葉

石膏湯

自利而渴尿白下焦虛寒甘草干姜

湯甘四兩 姜二兩右

心煩欲眠自利而渴理中湯

汗後脈浮煩渴五苓散

小便不利而渴必發渴茵陳五苓

散茵陳五苓兩右末米飲下

陽明脈長而實有汗而渴調胃承

氣

脈沉滑熱實煩躁而渴大陷胃湯

陽毒發在煩躁而大渴潮熱咽痛

黑奴丸

汗下之後煩渴飲水涼膈散及瘧

桂五苓甘露益元選而用之

益元散方身前

門又名六一散

一衄血

傷寒衄久不止梔子豨薟末吹入鼻

中脈浮鼻燥口乾漱水不欲嚥者是

欲衄也

發煩目瞑劇者必衄衄乃解

太陽脈浮緊發熱無汗衄者愈

脈浮緊不發汗因致衄者麻黃湯

脈浮自汗而衄桂枝湯

六七日不大便頭痛熱衄小承氣

或涼膈散加生地

衄而渴心煩飲水入即吐五苓

散次竹葉湯

遺汗而失之熱濕為衄及吐血其犀

角地黄湯 黃芩芍藥湯 黃芩三

芍 甘各半

少陰病傷寒而無汗強發之必動血或

從口鼻出或血或從目中出各下厥上

竭難治 姜附湯治本

衄者頭汗出身無汗汗出不至足者

死

汗後熱退衄不止新水濕紙貼於鼻

上及頂項數易之

傷寒七八日不解自胸上至頭面色

黑紫雍腫寸脈浮大而數是欲衄而

不能出刺鼻中出血數升而安或兩

尺沈穴出血如射即安

一 證語

證語身微熱脈浮大者生逆冷脈沈

細者且內死

直視證語喘滿者死下利者死謂正

氣脫絕也

汗多亡陽反身和證語此津液不和

也不可下 柴胡桂枝湯

傷寒發熱經水適來盡明者甚難證

熱入血室 小柴胡

發熱四五日大便秘小便赤證言熱

厥急用 大柴胡

陽虛陰盛而證言脈沉細弱者當溫

經助陽

證言不惡寒反惡熱 白虎

煩不眠證言 白虎加梔子

腹滿身重面黃證言遺尿脈滑實不

可下 白虎湯

喘滿口乾咽爛或不大便久則證言

是被火劫所致 白虎湯

下之緩熱病久神不清狂言脈虛而

長微弦滑 大承氣 柴胡飲

汗出譫言為風下之不利譫言有燥

屎 小承氣

潮熱反不食有燥屎太熱入胃水竭

煩躁必譫言又身熱汗出大便硬譫

言目實並 調胃承氣

傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不

利譫言身重 柴胡加龍骨牡蛎湯

欽鎖神氣

發狂

發狂邪熱至極也新汲水濕布搭於

背上頻易之

熱病六七日未得汗脈洪數面赤目

張煩躁狂走大渴 大柴胡

熱極脈大渴而發狂 黃連解毒湯

不已 承氣湯

血上逆則喜心下畜則內爭其人如

狂犀角地黄湯 重抵當湯

喜忘如狂身黃大便黑血証也抵當

湯

胸滿唇痿舌青口燥漱水不欲嚥無

熱有瘀血必發往下血 犀角地黄

湯加芍

傳汗吐下後熱甚脈洪數喘促身黃在

走三黃石膏湯連進三四服而愈

盜血者如狂熱在下焦小腹硬小便

自利枳實湯下血脈弦而長調胃承

氣沉實有表証大柴胡小腹急結桃

仁承氣

陽毒狂躁 桔梗大黃湯 桔

梔 芩 柴胡 大酩耳 右

升麻梔子湯 升一兩柴三兩梔子十  
膏二兩生地汁一升 右

吐下後及虛人未解發狂人參白虎  
辰砂之類清浮火或寒水石黃連末  
水調下又龍膽草一物湯治陽狂  
火劫者周身用火迫劫出汗其人亡  
陽煩躁驚狂 桂枝甘草龍骨牡蠣  
湯

狂言直視為腎絕汗出復熱狂言不  
食為失志皆死

一發黃

發黃寸口近掌無脈鼻氣冷不治形  
軀黃如爛薰直視橫頭心絕環口黎  
黑溲汗發黃腸絕

發熱身痛身自俱黃太陽中濕 麻  
黃連翹赤豆湯 麻祛根甘多翹各

小豆伴杏杏樹二東欒生姜兩生梓  
白皮待 右

發黃脈浮緊不可下 各半湯  
往來寒熱身痛發黃小柴胡加梔子  
湯

脈浮弦咳嗽短氣腹滿心脇痛鼻乾  
無汗身自黃小便難潮熱少陽中風  
也小柴胡

身熱頭汗尿瀝渴飲水此毒熱在裏  
而身黃茵陳湯

身黃脈沉結小腹硬尿利在畜血在  
下焦桃仁承氣

發熱頭汗渴飲水小便利大便快五  
苓加茵陳

小便不利四肢沉重似癰不欲飲茵  
陳五苓得湯小便利如皂莢汁則黃



從小便出也

食後發黃用枳木內消也

一癍 赤癍五死一黑癍十死一

生有下之太早熱氣乘虛入胃故發

癍有下之太遲熱留於胃中亦發癍

有陽証熱藥多用胃熱焦爛發癍陽

毒發癍紫黑熱毒陷於內也不治

陽毒已深舌卷焦黑鼻燥狂言面赤

癍如錦陽毒升麻湯五日可治六七

日不可治

傳 陽毒生癍 涼膈散加飯

赤癍熱証具咽痛 玄參升麻湯

溫毒嘔者 葛根橘皮湯 葛 橘

杏 芩 麻 甘 絡 一 右

吐水眼赤口下下部生瘡咳而下利

黃連橘皮湯 連仁陳 杏 實

麻 葛 絡 半 朴 其 絡 一 右

冬溫受不正之氣至春發癍爛膿疹

謂之溫毒 化毒丹

溫毒見無大熱煩渴大便實或腹滿

痛生赤癍 調胃承氣

發斑面赤譫言脈大而無力或絕而

不見用參生地絡五炮附子大黃行

半右

一自利

林自利謂不經攻下為自瀉泄

身涼脈小順身熱脈大逆

下利至甚脈不止者死

下利且十餘行脈反實者死

直視譫言下利者死

下利煩躁不得寐者死

下利至足厥冷無脈者灸之不溫脈

不還者死

下利身熱脇滿乾嘔寒熱往來脈長  
大承氣

發熱後重泄色黃赤此為自熱脈遲  
而滑內實數而滑宿食 小承氣

自利清水心下痛口燥且下  
自利而渴白虎湯或黃連阿膠散

自利不渴 理中湯  
咳而嘔渴下利心煩不眠猪苓湯

腸垢熱也燥熱而利必臍下熱黃芩  
湯 芩 芍 甘草各等

鴨漉寒也協寒而利必臍下寒理中  
湯

自利十餘日不止手足微冷無熱証  
理中湯

陽病自利便膿血者協熱也下後脈  
數不解自利不止必燥熱而便膿血

俱犀角地黄湯  
一 太使不利

太使不利脈數能食名陽結調胃承  
氣大柴胡

脈遲不能食名陰結金液丹疏一殊  
解法見

厚朴湯 木香 枳 甘草  
枳 半酪二 右姜棗

太使不利尿難有津液可作汗  
尿數不可汗症似煩則不著鹿藿子

太使堅小使數不可下跌陽脈浮瀉  
麻仁丸 枳實丸

三下不通不可攻當吐提之  
小使不利

小使不利邪熱去於內津液不下從

故不利

汗後小便不利微熱消渴五苓散清其猪苓湯

汗下後尿不利心煩桂枝干姜湯渴小柴胡

小便不利大便難亡易微熱胃中有燥屎 姜氣湯

傷寒七八日身黃尿不利腹滿茵陳湯

頭汗出尿不利渴飲水發黃茵陳湯

傷寒八九日下之實滿煩驚小便不利譫言身重不轉側 柴胡龍骨牡

蛎湯 柴兩分 生姜 欒母 參枝 苓各三分 大行惠枚半合龍骨

各二分

四逆林掌百

諸四逆不可下

吐利煩躁四逆者死吳茱萸湯主之五見

發熱七八日身冷名藏厥難治惡寒踈卧厥逆陰氣極不治

得病後四肢逆冷脈沉細足攣卧惡寒不飲水下利清穀陰厥也 四逆

湯 手足指頭微冷 理中湯

無熱証而厥當飯四逆加吳茱萸生姜湯虛者宜附子湯

陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反不惡寒面赤或腹痛

或乾嘔或咽痛或利止脈不出者此陰盛於內不相通也與通脈四逆湯

寒熱而愛面色不沃冒昧兩手忽無脈或下手無脈必是有汗也與各半湯厥而心下悸先治其水茯苓甘草湯 苓 枝格二半 其格一 生姜三 右

初身熱頭痛已後大便秘小便赤或畏熱或飲水煩躁不眠譫昏而厥陽厥也 大柴胡 厥而渴白虎

脈沉滑頭面有汗爪溫一便秘赤四肢逆冷熱深也 承氣湯

○傳 裡熱內盛陽厥極深皆因失下以致身冷脈微昏將死切不得以寒藥下之誤下即死又為陰厥與溫藥必死但進涼膈解毒養陰退陽如未愈解毒合承氣少下之次解毒 涼膈 天水合而為之用之

一舌胎

舌胎傷寒三四日後舌上有膜白滑如胎甚者或澁或黃或黑皆熱氣之淺深也表邪無舌胎和氣傳裏津液結搏則舌胎伸身曰舌上白胎不可致與小柴胡

腸下鞭滿不大便而嘔舌胎小柴胡熱聚於胃則舌黃熱深也未下者下之

黑滑亦下之經曰熱病口乾舌黑者死 咳逆林掌

胃有寒又飲水而咳逆先與理中湯次用旋覆代赭湯 旋 其酪一參 六分 赭仁半分 生姜六兩 棗對二右 或小青龍去麻加附脈微細橘皮于

姜半夏生姜湯 卷活附子湯 卷

附 苜蓿半木仁干生薑 右

脈浮洪或有熱而咳逆者火熱奔急

上行肺不得納故也 甘草瀉心湯

甘草二芍二姜各一連一 參各半半一

分棗散 右

少陰因突下所致大便硬大承氣大

便軟瀉心湯脈散者死

藥不効硫黃乳末等分末酒煎急令

飲之

灸期門婦人屈乳頭向下盡處骨間

丈夫及乳小者以一指為率

頭汗謔謔腹滿微喘而見咳逆此危

証

一悸動

悸動有氣虛有停水有汗多榮虛神

弱汗後臍下悸欲為奔豚 茯苓桂

枝甘草湯 苓兩枝一 甘兩 附兩 棗四

右

發汗過多心下悸欲振 桂枝甘草

湯 桂枝仁甘草各右

發少陽汗則謔謔而動悸 小柴胡

飲水多厥而心悸雖有他邪先治水

茯苓甘草湯 苓 枝各二各生

姜仁

往來多心悸尿澀煩嘔 小柴胡

脈代結心悸 炙甘草湯

四逆而悸 四逆散加桂

一戰慄

○林 戰慄 先振証戰外慄慄心戰為病欲

解也正與邪爭則為鼓慄而戰振但

虛而不至爭故止發動而振也與桂

苓白朮甘草湯溫經 桂枝芍藥湯

汗下後戰與 故逆湯

發汗後不解仍發熱悸眩暈振真武湯

吐下後裏虛氣上逆陽不足起則眩

脈沉取弦者浮則動經振搖桂苓白朮

草湯或小便中湯

卒口噤背反張搖頭痙病也風主動

故也形軀如爛直視極頭心絕

一身痛

太陽無汗脈浮身痛拘急 麻黃湯

中濕身痛難轉側尿不利五苓散尿

利者木附湯

陰毒身勢沉篤身痛如被杖嘔利唇

青面黑陰毒 甘草四逆湯 真武

湯

汗後脈沉身痛血不足 桂枝加芍

藥半夏生薑湯 桂枝加參治汗後

身痛脈沉者

咽痛不可汗不可下

少陰腹痛猶有熱咽痛 黃連龍骨

湯 連附苓 芍藥一龍骨 右

脈緊主無汗反有汗日下陽暈咽痛

甘草湯

陽毒脈浮數而大噤膿血 烏扇骨

咽痛下利四肢冷無熱証理中湯加

甘草一倍

非待暴寒伏於少陰之經脈微弱而

咽痛次必下利腎傷寒也先半夏桂

枝湯 煎三味各等分次四逆湯

咽厥

林  
蛔厥元有既為蕪寒，蛔上入膈時煩，  
得食而嘔，自吐蛔，或因盜汗，胃中冷，  
故長虫出，或因胃氣困乏，不能食，食到  
口，或聞食氣而上，以理中丸為梅丸，  
妨見濕胃消渴吐蛔，理中加大芩，入  
蜜以利之。

○嘔吐者，雖有大熱忌涼藥，蓋胃中寒，  
蛔上理中，加干姜炒烏梅，煎服，蛔  
定後以小柴胡退熱。

汗後不解林

發汗病不解，反惡寒，麻切芍藥甘草

附子湯

汗後仍發熱，心忡悸動振振，真武

湯

汗後身痛脈沉，桂枝加芍藥人參

新加湯

大汗出熱不去，內拘急，四肢疼，下利，  
惡寒，四逆湯

發汗過多，心悸欲按，桂枝甘草湯

傳桂枝去芍藥

汗後腹脹滿，厚朴生姜人參湯

大汗出，胃乾，不眠，欲飲水，少與之

發熱，汗出不解，心中痞硬，嘔吐下利

大柴胡湯

服桂枝後煩渴不解，脈洪大，白虎加

人參湯

汗後不惡寒，但惡熱，及蒸竹發熱者

調胃承氣

傳發汗之後熱不解，脈尚浮者，白虎加

蒼

一下後不解林

大下後身熱不去，心中結痛而煩，梔

子敗湯

下後腹滿卧起不安施子厚桂湯有燥屎者大承氣湯

下後脈促胃滿桂枝去芍藥湯桂枝証誤下之利不止脈促者表未解喘而汗出者蒼根黃連黃芩湯

過經十餘日一二三下之嘔不止心煩大柴胡湯

汗下後熱未能除用梔子豆豉湯或東垣加減涼膈散

一勞復林

病瘥後勿早起擗頭洗面洗體多言語心令勞復

病後忌酒肉莫難消之物又勿過飽更結熱難救謂之食復

瘥後未滿百日氣力未平復而犯房室者死謂之女勞復

勞復生熱脈浮以汗解之枳殼施子湯

瘥後渴 竹葉石膏湯

勞復發熱欲絕麥門冬湯門其灸等業

食復脈沉實腹滿證謔枳實大黃湯

一陰陽易林掌

男病新瘥婦與之交曰陽易婦病新瘥男與之交曰陰易婦則裏急腰痛連腹痛男則陰腫小腹絞痛

男女俱或熱上衝頭重不舉眼生花離經脈見者死一呼一至損脈離

經一呼二至至脈離經二脈易病有之用燒視散竹皮湯小便不利五苓



散

一狐惑之証

齒燥惡飲食，面目<sup>唇</sup>赤白，舌上白，唇黑，有<sup>瘡</sup>瘡，四肢重，喜<sup>眠</sup>眠，虫食<sup>喉</sup>喉，為惑。食下部聲<sup>啞</sup>啞，為狐。甚者食<sup>藏</sup>藏而死。上唇<sup>瘡</sup>瘡，虫食其<sup>藏</sup>藏，下唇<sup>瘡</sup>瘡，虫食其<sup>脏</sup>脏，以雄黃<sup>散</sup>散膏<sup>納</sup>穀道中。

瘡瘡聲<sup>啞</sup>啞，桃仁湯或黃連犀角湯。

連<sup>犀</sup>犀兩<sup>烏</sup>烏梅<sup>七</sup>七木<sup>七</sup>七右

一<sup>掌</sup>掌

藏<sup>結</sup>結其狀如<sup>結</sup>結胸，飲食如<sup>故</sup>故時<sup>以</sup>以下

利<sup>舌</sup>舌，上白<sup>胎</sup>胎，臍<sup>痛</sup>痛，引<sup>陰</sup>陰，筋不<sup>寒</sup>寒，熱<sup>云</sup>云。

寒<sup>而</sup>而其人反<sup>靜</sup>靜，此<sup>藏</sup>藏結也<sup>死</sup>死。

一不治脉証 林

陽病見<sup>陰</sup>陰脉者<sup>死</sup>死，代<sup>脉</sup>脉者<sup>死</sup>死。

謹言<sup>身</sup>身熱<sup>脉</sup>脉洪<sup>大</sup>大，生<sup>身</sup>身冷<sup>脉</sup>脉沉<sup>細</sup>細，死。

發<sup>斑</sup>斑<sup>陰</sup>陰<sup>脉</sup>脉<sup>死</sup>死。

○傳 咳逆上氣，脉散，其<sup>驚</sup>驚<sup>脉</sup>脉浮<sup>瀦</sup>瀦，難<sup>瘥</sup>瘥。

下利脉反<sup>實</sup>實逆

吐<sup>衄</sup>衄血<sup>脉</sup>脉浮<sup>大</sup>大，凶<sup>下</sup>下不至<sup>關</sup>關，陽<sup>氣</sup>氣絕。

上不至<sup>關</sup>關，陰<sup>氣</sup>氣絕。

少陰<sup>厥</sup>厥逆，無<sup>脉</sup>脉，服<sup>藥</sup>藥，通<sup>脉</sup>脉，漸<sup>續</sup>續生。

脉暴<sup>出</sup>出<sup>死</sup>死。

少陰<sup>四</sup>四肢<sup>厥</sup>厥逆，下利<sup>惡</sup>惡寒，而<sup>拳</sup>拳發<sup>躁</sup>躁。

無<sup>脉</sup>脉不<sup>治</sup>治。

脉陰<sup>陽</sup>陽俱<sup>虛</sup>虛，熱<sup>不</sup>不止<sup>脉</sup>脉，<sup>作</sup>踈<sup>乍</sup>數者<sup>死</sup>死。

依<sup>脉</sup>脉必<sup>是</sup>是有<sup>正</sup>正汗<sup>服</sup>服，麻<sup>黃</sup>黃<sup>甘</sup>甘草<sup>附</sup>附子。

湯<sup>多</sup>多衣<sup>無</sup>無汗者<sup>脉</sup>脉不至者<sup>死</sup>死。

循<sup>衣</sup>衣<sup>摸</sup>摸<sup>床</sup>床，熱<sup>內</sup>內<sup>結</sup>結<sup>脉</sup>脉<sup>弦</sup>弦者<sup>生</sup>生，瀦<sup>者</sup>者<sup>死</sup>死。

赤<sup>瘧</sup>瘧<sup>出</sup>出<sup>五</sup>五死<sup>一</sup>一生，黑<sup>瘧</sup>瘧<sup>出</sup>出<sup>十</sup>十死<sup>一</sup>一生。

發<sup>動</sup>動<sup>氣</sup>氣<sup>汗</sup>汗者<sup>死</sup>死，陰<sup>毒</sup>毒<sup>陽</sup>陽<sup>毒</sup>毒過<sup>六</sup>六七

日<sup>者</sup>者不<sup>治</sup>治，兩<sup>感</sup>感<sup>傷</sup>傷<sup>寒</sup>寒者<sup>死</sup>死。

大發溫家汗則為瘧熱而痊者死  
結胃証見煩躁者死

發少陰汗則動血九竅出血者死謂  
之下厥上竭

發少陽汗則謔言汗只在頭面不至  
遍身血逆

發濕溫汗身青面變耳聾不語不治  
發風溫汗者死亦主謔言咳逆不止

者死 臟結者死 發厥至七八日  
膚冷而躁無時暫安者名藏厥死

厥陰舌卷囊縮者死 少陰吐利煩  
躁四逆者死 凡甲青陽衰敗也

口乾舌黑不治 汗出如貫珠絕汗  
也喘不休衛氣敗也 發黃變黑不

治 發汗不至定者逆  
汗後嘔吐水漿不入逆

腹大滿下泄不治 目張目陷不治  
舌本爛熱不止逆 發斑自利不治

陰陽易病頭重眼花四肢拘急小腹  
絞痛手足絳者死

厥而下利當不能食反能食者不治  
傷寒七八日以上大發熱者難治

狐惑咽乾聲啞唇瘡不治  
諸逆發汗劇者言亂目眩不治

張口出氣乾嘔骨熱痛逆  
謔言直視或喘滿下利並不治

下利發熱或汗不止或厥不止並不  
治

汗後不為汗衰發汗而不得汗發熱  
脈躁疾狂言不能食者謂之二死

搖頭直視如煙薰心絕  
唇吻反青四肢多汗肝絕

反自直視，往言遺尿，腎絕。環口鵝黑，鼻赤汗發，黃脾絕。汗出如油，喘促無已，肺絕。木漿不入，形骸不仁，命門絕。絕及三四歲則死。

一禁戒 掌林

服藥中病，即停後服。

瘥後百日犯房者死。

瘥後少食糜粥，常令稍飢，勿飽。

若食諸肉肥血油膩等物，必大瀉，難

治。又莫勞，莫不可多言，不可使意昏

勞。復取汗，但脈微弱遲，動氣瘡淋

亡血虛煩，必不可用之。夏時用桂

麻，宜加涼劑，其性熱，故有癰變之患

也。

食燒肉消渴

食魚能發黃

食濕麪潮熱

食黃瓜必無病

食茄子成瘡

食生菜顏色不復

食葵菜失明

飲酒太早，年悶飲，在酒浮腫

汗後飲冷水，損心包

早梳頭潮熱

早濯足必癩

早洗浴熱悶

躁怒成痞

思慮重則氣消

遠行脚風

不得早起

不得勞心費力

一發表解肌之劑

麻黃湯

治太陽脈浮，頭身痛，惡寒

發熱無汗而喘。麻去根節 枝三分

甘六分 杏仁 右先煎麻黃，一沸掠去

上沫，下餘藥煎去粗，溫服，覆取汗，冬

及春初，宜用蓋，性熱，夏至後服，發斑

黃狂悶

○桂枝湯 治太陽中風發熱自汗鼻鳴乾嘔 枝二升芍一升甘草二兩右加生姜三片大棗二枚煎之及春初宜用是至前加芍一錢夏至後加知不膏一升

○葛根湯 治太陽陽明合病無汗惡風身疼痛 葛一升麻二兩芍二兩枝半升芍半升右加姜棗

○小青龍湯 治表未解心下有水氣嘔咳發熱 麻芍味半升二細姜甘枝絡半右渴去半加栝一升汗後飲水多咳喘去麻加杏一升咳嗽心下有水氣而小便不利去麻加苓一升

○大青龍湯 治傷寒見風或傷風見寒脈弱汗出勿服 麻伍枝甘草半升

○如聖飲 治剛柔二症搖頭口噤身反張搖擗面赤項強 羌風芎半芷柴芍芍甘草飯烏半芩右加姜煎入竹瀝姜汁口噤咬牙大便實者加大黃一兩無汗剛症加麻蒼右有汗柔症加枝木

○六神通解散 治發熱頭痛發渴身夜脈洪無汗 麻仁甘草仁滑苓絡四蒼八右入姜葱和解之劑

○小柴胡湯 治傷寒四五日往來寒熱胸滿脇痛心煩喜嘔風濕身熱邪在少陽經 柴半芍半參絡甘草半右加姜棗

○大柴胡湯 治傷寒內實大便難不

惡寒反惡熱者，柴細芩，芍各二  
半，大絡二實，半右加姜棗，以和  
為度。

○**柴胡姜桂湯** 柴二枝 芍各三括

一兩 姜炮甘 蛇蠟略 右

○**半夏瀉心湯** 半一兩 芩 參 甘

炙 姜炮 各連 酢 右加姜棗

○**小半夏茯苓湯** 半甌 白苓 甌 右煎

去滓，入生姜自然汁，熱服。

○**小陷胸湯** 治下之太早，變為結胸。

胸中作痛，痞滿，連三分，半六分

芩，連子，棗二右，以水二盞，先煮芩，去

粗納諸藥，再煮。

○**黃連湯** 治傷寒，胃中有熱，胃中有

邪氣，腹痛，欲嘔吐者，連 甘 姜

枝 各二參 半絡 半大棗 二枚

右

○**柴胡飲子** 治內實，便難，不惡寒，反

惡熱，柴 參 芩 甘 大 飯

芍 右等分加姜

○**防風當歸飲子** 治身熱，便秘，不惡

寒而煩渴，柴 參 芩 甘 飯

芍 風 滑 右等分加姜

○**解利兩感神方大羌活湯** 風 羌

獨 已 芩 連 蒼 白 木 甘

炙 細 絡 三 知 芍 生 地 絡 一 右

○**神和靈寶飲** 治兩感，頭疼，惡寒，發

熱，口燥，舌乾，風 羌 芩 甘

細 生 地 芍 柴 葛 芷 膏

加黑右入姜棗，取微汗為度，如未

愈，視表裏証多少，用汗下。

○**柴胡雙解飲** 治寒熱，嘔而口苦。

薑朮弦數。小柴胡加芍藥。入姜。煎入生艾汁。溫服。嘔者入姜汁。煎。腸痛加青皮。尿不利加苓。痰多加萊菔。

○桂枝麻黃各半湯 枝伍 芍 廿

麻去根節杏一十四箇生薑大棗去皮尖炒

○柴胡桂枝湯 柴三 枳枝 芍 參

芍各半半四字 甘草 姜棗

一攻裏之劑

○小承氣湯 治六七日不大便腹脹

滿悶汗後不惡寒潮熱在言而喘者

大枳 實各三右煎服以利為度

○天承氣湯 治胃實證言五六日不

大便腹滿煩渴舌乾口燥日晡發熱

脈沉實者 大枳 枳 實各一 芒

合半 右先煎枳枳去粗內大黃

去粗納芒硝更煎一二沸服以利為度

○調胃承氣湯 治大便秘結證言而

嘔日脯潮熱者 大枳 枳 芒 合

右煎法同前

○大陷胸湯 治大結胸高起手不可

觸 大枳 芒 枳 芒 遠一分二厘 半另未

右先者大黃去粗納芒一二沸納遠

末服以利為度

○京脯散 治表未解半入裏下証未

全懊憹不眠煩渴口舌生瘡證宜便

溺閉結發斑黑陷 翹兩梔 大

苛 芍 芩 絡 五 廿 半 兩 枳 硝 半 右

○黑奴丸 治溫毒發斑煩渴及熱病

六七日未得汗脈洪大而數面赤狂

走渴甚甚微利不渴不可用 芍

釜底煤灶 突墨 芒 麻 漆  
塵 小麥 奴酪 一大三柵右為細  
末煉蜜丸新汲水調下

○**桔梗大黃湯** 大兩柴胡 梔

桔酪二廿仁 右以通瀉為度

一渣熟生津之劑

○**百鬼湯** 治陽明証汗後脈洪大而

渴及虛煩中暈等証 知母廿仁膏

二兩粳飯 右水煎待米熟去粗溫

服○口燥煩渴不止或發赤壯熱

名花斑湯又名大參白虎湯○陽明

下後太便不固熱不退者或濕溫便

溼熱不退者加蒼朮

○**竹葉石膏湯** 去石膏名竹葉湯

膏仁二兩八門一兩參 廿各三各半

粳米竹葉二右每服五錢內粳米三

十粒煎服

○**三黃石膏湯** 治瀉發後在太便泄

者 膏仁參 連 栝各半 豉餅麻

仁栝各 右

○**黃連解毒湯** 治大熱不止乾嘔煩

渴錯語呻吟不得安眠 連仁參

栝 栝各二右

○**茵陳湯** 首辨大粒肥栝仁右先

煎首減水一半內二味煎服

○**梔子豈鼓湯** 治汗下後虛煩不眠

心中懊懣或大下後熱不去心下結

痛 肥栝仁香豉餅 右先煮栝子

水減半內豉同煮去粗溫服得吐止

後服

○**東垣加減涼膈散** 退六經熱及傷

寒餘熱宜煩 翹仁栝 苛 竹

芩 桔絡半 廿生半 右

○甘露飲 治汗下之後煩渴而欲飲

承 廿 膏 寒 苓 沢略二太

枝 猪酪半 滑細 右爲末每服三

錢白湯下

○神 苑子烏梅湯 治傷寒瘧後不得眠

梔 芩 廿 各半 柴一兩 烏梅十四箇 去核

右加生姜竹葉豆豉

○照 道滯散 治病新瘧寒勞復或陰陽

晃 參 知 連 廿 生地 滑

藜 柴 犀 竹青 伊縮 腹 右

姜棗木煎臨服入燒棍襦末半 不調

粘汗出爲效

○牙陽散火湯 治撮空弄衣摸床謔

言沈昏如小使不利者不可治 參

飯 柴 芍 門 芩 木 廿

陳 神 右加姜棗 大便燥結詰

語發渴加大黃 泄瀉者加升木炒

○道赤各半湯 治病後補氣不語目

赤 鹿 焦 舌 乾 連 梔 芩 滑

廿 知 犀 神 參 門 右加灯

心 姜 棗

○酸棗湯 治吐下後心煩乏氣不眠

酸 枳 門 各 廿 一 兩 知 仁 苓 正 芍 姜

各三 右 除煩益元之劑

○白朮散 治病後氣脈不和食復勞

復 桔 芩 芷 陳 眩 青 法 莎

廿 山 酪 二 木 兩 姜 二 兩 右加姜棗

瓜蘇煎如吐瀉入白梅

○增損白朮散 病後服之生津止渴

順氣下痰



木葛 苓 藿 參 木 略 一 兩  
兩 乾 生 姜 各 右

○**溫膽湯** 治病後虛煩不眠并心膽

虛怯一切病後用 橘紅半兩實

半兩一苓三甘細 右加姜棗竹茹

○**益元湯** 治身熱頭疼不煩面赤飲

水不得入口此元氣虛弱無根虛火

泛上非熱証不用涼劑 熟附 甘

參 姜 門 連 知 五味 葱

艾 棗 右

○**當飯活血湯** 治頭不疼不惡寒只

身熱渴小水利大便黑口無倫語此

內傳心脾二經令昏迷沉重不可作

熱証 飯 赤芍 生地 甘 姜

參 柴 枳 桃 紅 三服後去

姜桂桃紅加苓木 右姜一片水煎

入酒三匙調服

○**枳實梔子湯** 治大病後勞傷

實 枳 梔 針 四 豉 升 右

一涼血逐瘀之劑

○**犀角地黄湯** 治大便黑血脈微

發狂發黃當汗不汗內有瘀血

芍 生地 壯 犀 如無以升麻代

右

○**生地芩連湯** 治熱毒入深吐衄不

止 生地 芩 連 梔 桔 甘

柴 芍 芍 犀 如無以升右入棗

二枚煎服入茅根汁如無藕汁亦

可

○**桃仁承氣湯** 外証已解小腹急大

便黑小便不利為瘀血証此藥去之

大行 桂 各 半 甘 一 桃 十 箇 去

右水煎去粗納<sup>抄</sup>一二沸溫服無<sup>盡</sup>  
為度

○抵當湯 治血結胸<sup>證</sup>因<sup>於</sup>血結  
於胸中在言小腹亦滿<sup>飲</sup>水不欲<sup>噉</sup>  
者 水蛭<sup>炒</sup> 蟅虫<sup>各十五枚去</sup>  
桃<sup>十箇去</sup> 皮<sup>尖研</sup> 右煎服血<sup>下</sup>止後服

一治癰疹之劑

○陽毒升麻湯 治陽毒赤斑出在言  
吐膿血 升仁犀屑射下 芩 參  
其生各 右

○陽毒梔子湯 治傷寒壯熱身痛發  
斑爛 梔 升 芩 芍 柴<sup>各一</sup>  
膏仁知半 升 升 杏<sup>各半</sup> 右入姜豉

○犀角消毒飲 治發斑癰疹 牛細  
荆穗 風絡二其仁犀<sup>一各半</sup> 煎  
右煎調犀末服

○梔子仁湯 治發斑煩燥面赤咽痛  
潮熱 梔 赤芍 大青 知<sup>各一</sup>

升 芩 膏 杏<sup>各半</sup> 柴<sup>各一</sup> 其<sup>各</sup>  
兩 右加姜豉

○玄參升麻湯 治發斑咽痛 玄參  
升 其 右各等分

○大青四物湯 治瘟疫發斑 大青  
細膠<sup>炒</sup> 玃<sup>各</sup> 其<sup>各</sup> 香豉<sup>各</sup> 右

○解毒防風湯 治發斑及癰疹痒痛  
風半 地骨 芪 芍 荆 枳  
牛<sup>炒</sup> 各<sup>七</sup> 右

○加味羌活散 治感不正之氣發癰  
疹 羌 前<sup>各一</sup> 枳 其<sup>各</sup> 枳  
芎 天 芩<sup>各半</sup> 蟬 苛<sup>各</sup> 三 右加

姜

○祖傳經驗加味敗毒散 治瘟疫及

應...等証 敗毒加飯 芍 木  
風 荆 蒼 生 地 絡 等 入 姜 棗 此  
因 虛 而 感 風 濕 而 發 斑 者 佳

○調中湯 治內傷外感所發陰斑

蒼半 小陳 宿 霍 芍 煨 甘 炙 桂  
半 芷 菴 枳 格 七 芍 短 麻 枝  
各二 右加姜

○陰毒升麻鱉甲湯 治陰斑 升仁

飯 甘 各 一 椒 二 丁 鱉 炙 一 雄 烟  
研 右煎調雄末服  
一分利之劑

○五苓散 治傷寒中暈煩躁小便不利而渴或霍亂吐利 沢半 兩苓

木 猪 酪 一 桂 朮 右為細末每服  
三錢白湯或清米飲調下或細切加  
姜棗煎服其甚苦種加苓

○猪苓湯 猪 苓 膠 沢 滑

右各等分水煎去滓下膠候消服

○赤茯苓湯 赤苓 陳 參 各 二 木

芍 半 酪 一 右  
一道痰之劑

○加味道痰湯 治內傷七情致痰迷

心 驚 神 不 守 舍 如 鬼 祟 憎 寒 壯 熱 頭 痛  
上 氣 喘 息 口 出 涎 沫 為 傷 寒 治 誤  
苓 半 陳 實 星 甘 木  
桔 參 萎 苓 連 右劉姜棗  
水煎臨服入竹瀝姜汁

○大橘皮湯 治傷寒嘔噦胸滿虛煩

不 安 陳 參 各 一 甘 枳 右每服五  
錢加生姜

○小橘皮湯 治傷寒嘔噦手足逆冷

陳 兩 生 姜 兩 一 右

大半夏湯 半 白苓 生姜倍

右加棗

○小半夏湯 半 酈赤苓 右加棗

一溫經溫中之劑

○四逆湯 治即病太陰自利不渴及

陰証脈沉細而遲身痛 附皮一枚去

脂生 其後六姜伍右煎服取少汗而

愈

○通脈四逆湯 姜兩三 附大者一

右傳無其有參

○茯苓四逆湯 苓兩 參三 附生一枚

皮八 甘草半 二姜 附 右

○理中湯 治即病太陰自利不渴

嘔腹痛鴨溼蛇厥霍亂等証 薑

蠲者雖有大熱忌涼藥蓋胃中寒乾

上加干姜炒烏梅二煎服蛔定後以

小柴退熱 參 甘 姜 木 各二

右○如腎氣動者去木加桂○吐多

者去木加生姜○腹滿下利脈沉遲

而微者加炮附

○真武湯 治即病陰証脈沉細身痛

或發小陰汗筋惕肉瞤等証 苓

芍 生姜 附炮去皮木仁右如咳

者加五味姜細絡一小使秘養去苓

○下利者去芍加姜二○嘔者去附

倍生姜

○姜附湯 治下後復發汗不得眠無

表証而脈微者 姜伍附生一枚右如

下利厥逆脈不至者加其倍姜面赤

者加葱九莖○嘔者加生姜○利止

脈不出加參二錢名通脈四逆湯○

咽痛加桔小陰証腹痛或泄利加芍

一錢半

○附子散

治陰証唇青面黑身痛四肢厥冷

熟附三桂 飯 木酪二

姜炮半酪 一右加姜棗

○生料五積散

治感寒頭身痛惡寒嘔吐或感寒濕腰脚酸疼

芷 芎 甘炙苓 飯 桂 芍 半酪三升

兩陳 枳 麻酪六桔耐二蒼四耐

右加姜葱

○白朮散

治陰毒傷寒心煩四肢逆冷

川烏炮法桔 木 附炮法細

各一姜炮半右

○海藏肉桂散

治傷寒服冷藥過度心腹脹滿四肢逆冷眼昏不知人變

爲陰毒惡証 桂 木 木 枳 炒 良各三百芍 陳 煎 飯

附炮參酪一菜酢右入棗

○再造飲

治無湯証頭眩發熱惡寒項脊強無汗用表劑汗不出是陽虛

不能作汗冬月用之夏加芩膏也

菴 參 枝 甘 熟附 細 菴 風 芍 生姜煨右剉棗二枚水煎

熟加炒芍一撮再煎三沸溫服

○木附湯

治中寒中氣四肢厥冷牙關緊急痰壅脈弱

木七分附三升 耳三升 右分二貼每貼姜十片煎

○調榮養胃湯

治勞力感寒証

氣之 參 菴 飯 柴 陳 甘 木 芍 生地 細 菴 風 右

入姜棗葱白

○人參養胃湯

治外感風寒內傷生

入姜棗葱白

入姜棗葱白

入姜棗葱白

○人參養胃湯

治外感風寒內傷生

入姜棗葱白

入姜棗葱白

冷檀寒壯熱頭目昏眩及夾食停痰  
俱能治之 蒼妙半 朴酪一橘紅  
牡不藿 菓 苓 參略半 甘後半  
右加生薑烏梅寒多加附

一 瘧疫

傳經日冬不藏精者春必病瘟是以多  
感房勞辛苦之人安樂者未之有也  
俗名瘟病醫書曰疫癘一皆觸冒四  
時不正之氣而為病龐安常曰疫氣  
之發大則流行天下次則一方次則  
一鄉次則偏著一家悉由氣運替發  
所致也仲景無治法後人用敗毒散  
治甚得理切不可作傷寒正治而大  
汗大下也但當從乎中治而用小陽  
陽明藥所中看陰陽脈証一方加減  
和治之

冊溪曰眾人病一般者此天行時疫  
也治有三法宜補宜散宜降用大黃  
芩 連 參 桔 蒼 風 滑  
沙 人 中 黃 神 麴 糊 丸 氣 虛 以 四  
君子湯下血虛以四物湯下痰多以  
二陳湯

○ 敗毒散

治瘧疫四時通用 菴

獨 前 柴 芎 枳 桔 白 苓  
參 朮 等 甘 棗 右 為 末 每 服 二 錢 加 姜  
三 片 煎 服 或 沸 湯 煎 服 亦 可 此 藥 治  
傷寒瘟疫風濕風眩肢痛增寒壯熱  
項強睛眩或多風痰或處卑濕之地  
脚氣痿弱此藥不可缺一方加薄荷  
少許

○ 九味羌活湯

治瘟疫初感一二日

間服之取汗而愈其効如神 菴

風 蒼各二升 芎 芷 芩 生地 甘  
絡二細 八 右

○大無神木散 治四時瘟疫頭痛項  
強身痛增寒熱專主山嵐瘴氣之  
妙劑也 陳仁蒼 朴各一升 藿  
菖各一升 右作一服加姜三片棗一  
枚煎服下丸無芎石香附

○十神湯 治時令不正瘟疫疾行或  
四時感冒風熱頭眩身痛寒熱無汗  
陰陽兩感並宜服之 麻 芎 甘  
藜 葛 升 芷 赤芍 陳 莎  
各等 右加姜葱 如中滿氣實者  
加枳殼各

○升麻葛根湯 治瘟疫頭痛發熱  
升 白芍 甘 五兩 葛十五 右

○柴胡升麻湯 治時行瘟疫壯熱  
風頭痛熱鼻塞咽乾痰嗽涕唾稠  
粘 柴 前 赤芍 膏 葛 各  
兩 芩 桑各六兩 荆去梗十 升 五 右入  
姜三片豉十餘粒

○神木散 治四時瘟疫頭痛發熱及  
傷風鼻塞聲重 蒼 藜 藜 芷

細 羌 芎 其各一兩 右加姜葱  
辟瘟病赤小豆新布囊盛之置井中  
三日出舉家服男十枚女二十枚

○又法熬豉和白木浸酒常服之  
○又法用狐狸鼻尖及糞燒之以薰除  
此病狐糞掩有竹木石間頭尖堅者  
是也

○又雄黃研早晨水塗入鼻孔中及臍  
臍亦可塗臍床不傳染

○天行疫癘者東行桃枝剉煮湯合家

澡浴佳

○温病勞役及食復燒人尿存性為未酒調方寸七服

天行瘟疫及小兒熱癩在啼大人酒後暴熱用臘月八日雪磁罈盛之遇此病服效

○屠蘇酒方

大椒 桔 桂 風

各半木 川烏 菝葜各一 右八味

剉以絳囊貯之歲除日懸掛井中令沉至泥正且出之將囊浸酒中略煎向東從小至大飲之棄囊于井中

傳

○東垣曰大頭病乃陽明和熱太甚資實少陽相火而為之也濕熱為腫木盛為痛此邪見于頭多在兩耳前後治法不宜藥速則過其病上熱未除中寒復生當視其腫勢在何部隨

經處治陽明為和首大腫少陽為和出其前後

○丹溪曰濕熱在高巔之上用卷及酒炒本酒蒸大黃隨病加減切不可用降藥

○二黃湯

治大頭天行疫病 芩酒

妙連同生耳各等 右水煎徐徐呷

之○如未退用鼠粘子炒水煎入芒硝等分亦時以少與母令飲食在後○如未已只服前藥取大便邪氣已則止

前方宜各少加引經藥○陽明湯加膏○少陽湯加括○陽明行經升麻葛芍甘○太陽行經荆風甘並與上藥相合用之或云頭疼酒浸白濁葛身痛卷枝風芍俱宜加之



一蝦蟇溫

傳丹溪曰蝦蟇溫屬風熱防風通聖散加煖用之或用水柴胡加風羌荆芎桔煎服。外以側柏葉搗汁調火煖蚯蚓糞和之或用于香尖附子尖南星醋調和之或五葉藤車前草皆可搗碎之效。

○養雞散

治冬溫頭面腫 養雞仁 半膏 菊絡半麻 白薇 羌 杏 茸 青木香 芍各半 右水煎

○大頭天行病從頭領腫熱者又名鷓鴣鴻瘟。用菖酒參酒大黃加煖十五六月服。水柴胡湯不愈者仍用陳蘇發散而愈。又法酒炒參連為君炙其為佐水煎細心呷之再加鼠粘子酒蒸入煎入。明亦類與之。

○甘桔湯

治冬溫咽喉腫痛 甘 桔各等 右水煎時久頻呷之

傳

○不換金正氣散

治四時感冒傷寒 嘔逆寒熱霍亂生瀉及出遠方不伏水土並皆治之 朴姜 陳祛 藿 半 蒼米泔浸 甘半 右加姜棗

○藿香正氣散

治四時感冒頭痛增 寒壯熱或風濕霍亂吐瀉 腹瀉洗 再為豆煮 蘇連坐 藿 芷 苓各六 分 右加姜棗

○清風百解散

治四時感冒頭疼發 熱鼻塞聲重咳嗽喘急等証 蒼 麻 荆穗陳芷各一 右加 姜葱咳甚者加烏梅丁香

八解散 治四時傷寒頭疼體熱惡

風多汗惡心嘔逆 參 木 苓

甘 陳 守 薤 朴 各等 右加

姜棗

和解毒 治四時傷寒頭痛煩燥自

汗咳嗽吐利 蒼去殼 藁 桔 甘

各半 陳 朴 各四 右加姜棗

香蘇散 治四時傷寒頭痛發熱惡

寒 蘇 蘇 略 二 陳 一 甘 各半 右加

姜葱 頭或加芎芷

參蘇飲 治感風頭痛發熱咳嗽聲

重涕喘稠粘大解肌熱寬中快膈或

劣察潮熱往來並能治之 參 蘇

葛 木 半 前 苓 各三 枳 蘇 桔

甘炙陳半兩 各右加姜棗氣盛者去

木香

十味芎藭散 治四時傷寒發熱頭

痛 芎 杜 藭 葛 各二 柴 苓 各半

桔 二 生 甘 三 半 六 枳 三 陳 三 各

右加姜棗 惠 頭疼甚加芷

沖和散 治感風濕頭目不清鼻

塞聲重肢麻倦怠欠伸出淚 蒼 六

荆穗 二 甘 一 兩 一 右煎服

中暑門三

一中暑中熱之異

傳 內經曰靜而得之為中暑動而得之

為中熱

暑熱之時無病之人或避暑於深堂

大廈得之者名曰中暑其病必頭暈

惡寒身形拘急肢節疼痛而煩心肌

層大熱無汗為房室之陰寒所逼使  
周身之陽氣不得伸越大順散桂香  
姜甘  
等熱藥主之

○若行人或農夫於日中勞役得之各  
日中熱其病必苦頭痛發躁熱押之  
肌膚大熱必大渴引飲汗大泄無氣  
以動乃為天熱外傷肺氣蒼木白虎  
等涼劑主之

愚按傷寒論中一證曰中脘即中暑  
也脈虛而微弱煩渴引飲熱自汗  
此蓋得勞役身虛而暑和于衛之候  
是宜東垣清暑益氣湯等補益之劑  
一証曰熱病即中熱也脈洪而緊盛  
頭疼身熱口燥心煩此蓋得之於冬  
感寒邪鬱積至夏而發乃按暑而成  
大熱之候宜黃連白虎解毒等清涼

之劑

一方法

○王中脘而死切不用冷宜溫養以湯熨  
臍中嚼生姜或大蒜送下不能嚼水  
研灌之或生乾姜末湯點下亦佳也

○傳清暑益氣湯

治感長夏濕熱四肢

困倦精神短少膏滿氣促身熱而煩  
小便黃而數大便溏而頻或渴或不  
渴自汗身重脈洪緩按汗少蒼各  
半升行參 朮 陳 麩炒 沢 各五  
草炙栢酒浸飯 青 門 葛 各三  
五味 粒 右

○百虎湯

治暑熱發渴身見傷寒門

玉脈虛加參

○益元散

名天水散  
名六一散

治中暑煩渴

小便不利方見瀉門

○香薷飲 治暑熱腹痛霍亂吐利煩  
心等証 常行朴製扁炒各一右水  
煎 氣虛者不可過多

○黃連香薷散 治証同煎前方去扁  
加連 七分

○十味香薷飲 治暑氣和脾胃 常  
行參 陳 木 苓 扁 莖 瓜  
朴 各半右

○桂苓甘露飲 治伏暑發渴脈虛  
桂 參 莖 苓 木 甘 葛  
沢 膏 寒 水 略 滑 二 水 右 爲  
采白湯下 玉 無 莖 有 薑

○生脉散 參 五味 門 各等  
右水煎夏月時久代熱水飲之垣日  
加莖其令人氣力湧出

○香薷坐散 鮮暑毒止霍亂 常  
朴 姜製 苓 陳 甘 略 良 仁 右 入  
塩一捻水煎

○縮脾飲 鮮伏熱除煩渴消暑毒止  
吐瀉霍亂 縮 果 烏梅肉 甘  
咳 略 扁 炒 葛 略 二 右 水 煎

○五苓散 治中暑煩渴身熱頭痛霍  
亂吐瀉尿赤少如心神恍惚加辰砂  
名辰砂五苓散 亦見傷寒門

○枇杷葉散 治中暑伏熱煩渴引飲  
嘔噦惡心頭目昏眩 杷 炙 丁 陳  
法白 朴 糊 略 藿 半 茅 門 甘 炙  
瓜 略 一 右 入 姜 水 煎 煩 躁 冷 水 調 下

○香朴散子 治伏熱吐瀉霍亂煩悶  
參 苓 甘 炙 蘇 瓜 沢 藿  
半 扁 炒 陳 烏梅 朴 略 等 右 入  
姜 棗

○香朴散子 治伏熱吐瀉霍亂煩悶

參 苓 甘 炙 蘇 瓜 沢 藿  
半 扁 炒 陳 烏梅 朴 略 等 右 入  
姜 棗

者夏月傷暑發熱汗大泄無氣力麻虛  
細而遲此暑傷元氣也 參 芪 續  
門 白芍 陳 白苓 絡 一連 妙 其  
五 絡 柏 分 末 二 分 知 蕭 絡 七 右 加  
姜 煎

○夏暑如在途中常服壯元氣驅暑  
中暑霍亂泄痢等証 參 二 分 門  
白芍 妙 白苓 絡 一 五味 附 粒 末 五 分  
其 核 五 知 妙 陳 蕭 絡 七 分 妙 三 右  
加 姜

○夏秋暑熱因過飲食冷物傷內又取  
涼風傷外以致惡寒發熱胸膈飽悶  
飲食不進或嘔吐泄瀉此內外俱傷  
寒冷也 參 姜 妙 紫 朴 姜 水 陳  
菴 實 白 一 苓 絡 一 木 半 一 各  
五 右 入 姜 木 煎

中濕門 四

○居卑濕之地或衝任風雨或辛苦汗  
沾衣皆外感之濕也

○恣飲酒漿多食肥菓之類皆內傷之  
濕也

○外感多痿痺肺腫疼痛內因多中滿  
痞膈瀉利

○脈沉而緩沉而細微皆中濕

○脈滑數尿赤澀引飲濕熱小便自利  
大便溲身疼自汗濕寒

○身重腫痛或無汗是濕流關節邪  
氣在表五苓加蒼蒼微汗之

○自汗多者宜白朮甘草湯  
小便自利清自大便泄瀉身疼自汗  
為寒濕五苓散加生附蒼朮

○二陳湯加酒芍 菴 蒼 通 散 嵐

行濕最好

○**防己黃芪湯** 治風濕脈浮身重汗出惡風或周身疼痛 已行其半半木行其半 右作一服加姜三片棗二枚

○**加味五苓散** 治濕勝身痛小便不利 蘇重發湯者本方中加羌活一倍

○**深風濕羌活湯** 治風濕相搏一身盡痛 羌活風升 柴各五葉 蒼各一右

○**羌活勝濕湯** 治肩背痛不可屈伸

○**家傳白朮湯** 治中濕身痛難轉側及皮肉痛難著履 木屑細切酒下盞半煎至一盞去粗服

○**對金飲子** 治脾胃受濕腹脹不食身重皮層微浮肢節酸痛 平胃散一兩桑白朮一右為末入姜煎服

**瘧疾門** 五

○**傳** 經曰夏傷暑秋為瘧 瘧云 瘧得於暑當以汗解或以取涼太過汗鬱成痰其初感也弱者即病胃氣強者伏而未動至於再感復因內傷其病及作宜其難震夫暑與風皆外邪也故非汗多不解今之瘧此疾者已經再

三叔試胃氣虛傷何由得愈欲治此証必先與參朮等補劑為君加些蒼朮等發散藥漸而取汗得汗而虛又行補養下餘屬陰最難得汗補藥力到汗出至足方是佳兆

○當以汗之難易較輕重

○大忌飽食遇發且食飽病愈重

○陰虛証午後惡寒發熱至晚亦微汗而解脈必虛濡而數且瘡脈弦而虛

脈不大弦為辨單

○暑瘧宜入參白虎湯之類

○在瘵者二陳湯加常 菓 柴 芩

○不能食者必於飲食上得之當從食治虛者必用參朮一二貼托住其氣不使下陷後用他藥有汗要無汗

帶補

○渴者 生地 門 天花 膝 知 妙柏 葛 其生

○大渴大熱 小柴胡去芩加知 門 連 栝 杷 天花

○久瘧 二陳加芩 蒼 菓 葛 朮 一補一發藥也

○痰滯胸滿熱多寒少大便燥實 大 柴胡利之

○久瘧不得汗以二陳湯倍加二朮少 加枳

○小兒瘧疾者有痞塊方生地各半陳 芩 半 芩 妙各半分入生薑煎調 醋炙鱉甲末

○瘡母用瓦蒸消導之醋煎為君 稜

氣為主帶散無汗要有汗散邪為主

帶補

○渴者 生地 門 天花 膝 知 妙柏 葛 其生

○大渴大熱 小柴胡去芩加知 門 連 栝 杷 天花

○久瘧 二陳加芩 蒼 菓 葛 朮 一補一發藥也

○痰滯胸滿熱多寒少大便燥實 大 柴胡利之

○久瘧不得汗以二陳湯倍加二朮少 加枳

○小兒瘧疾者有痞塊方生地各半陳 芩 半 芩 妙各半分入生薑煎調 醋炙鱉甲末

○瘡母用瓦蒸消導之醋煎為君 稜

氣為主帶散無汗要有汗散邪為主

帶補

○渴者 生地 門 天花 膝 知 妙柏 葛 其生

○大渴大熱 小柴胡去芩加知 門 連 栝 杷 天花

○久瘧 二陳加芩 蒼 菓 葛 朮 一補一發藥也

○痰滯胸滿熱多寒少大便燥實 大 柴胡利之

○久瘧不得汗以二陳湯倍加二朮少 加枳

涉海粉 青桃 紅麴 芽  
隨証加減為丸醋湯送下

○老癭風暑入在陰分用血藥引出  
陽分而散 川芎 撫芎 飯 紅  
蒼木 芷 柏 甘 煎露一宿  
服之

○著 日夕虛癭寒熱不多或無寒但微熱  
者和氣既無之入物加柴苓在陳  
滋補氣血

陽癭多汗用參芪木斂之無汗柴水  
苓其甚發之

陰癭多汗用板方地苴柏斂之無汗  
柴木芍升紅錢之

○傳 截癭常山飲 常菓 枳 知

甘 炙烏梅 穿蠟火右等分每服五  
錢水酒各半盞煎至八分露星月一

宿清晨冷服飲吐則順之忌熱湯  
然常山性暴悍善逐痰飲太傷真氣  
虛弱者勿輕用

○截癭七寶飲 常仁 菓 枳 甘 炙  
朴 青 陳 各半 右作一服酒水

各半盞寒多加酒熱多加水煎八分  
露星月一宿空心冷服忌熱茶湯一  
日至五食溫粥

○百虎加桂枝湯 治溫癭 膏 伍 知  
細 甘 仁 桂 枝 一 類 分 右

○祖傳截癭神方 通 尤 常 穿  
醋炙黃 辰 半 研 梅 訖 大 棗 七 右 水 煎  
先以棗和辰砂末食後服藥

○一方 常 果 知 枳 各 一 酒 一  
盞浸一日臨發日早服

○治癭不愈一服便止永不發其效



如神 常一、二枚、行、丁香、香、伴、烏、梅、仁、  
右作一服用好酒一盞浸一宿臨發  
且清晨飲之

○心 截瘡 穿 木鱉骨等為末二錢空  
心酒調下

○王 桂枝羌活湯 治處暑以前發頭項  
痛脈浮惡風有汗 枝一羌 風  
甘烙等 水煎逆發而服之如吐加  
半夏

○麻黃羌活湯 治証如前惡風無汗  
麻黃 羌 風 甘烙等右

○清脾湯 治脈弦數壯多寒少口苦  
咽乾大小便赤澀 青 朴 木  
菓 柴 苓 半 苓 甘 各右  
加姜

○酸甲飲子 治瘧久不愈腹中結塊

名曰瘧母肝之積也 鱉鱗木 苾  
菓 枳 芍 陳 白芍 甘 各右

○林 清脾湯 治脾瘕食癪 朴 青  
守 梅肉 良絡二菓一甘 各五右  
姜二片棗一枚

○人參養胃湯 治久感風寒內傷生  
冷發為瘕瘕 蒼 朴 制半制各參  
苓 菓 霍 各半 橘紅 三 各一  
五加桂右每服八錢姜瓶烏梅餅水  
煎

○治諸瘕 辰 魏 等分為末糊丸  
如皂子大每服一丸空心人參湯化  
下以諸藥不損脾胃最為穩當

○百草霜 黃丹等為末每服一二錢發  
日空心米飲調下不過兩服愈發時

月五

七

再服

○痰瘧 小柴胡加蚘

○小柴胡湯 方見傷寒門 神治熱多

寒少頭暈目滿咽乾如渴甚而嘔去  
平加大花曹下痞滿加蚘

傳 ○痰瘧發於子午卯酉且寒熱嘔吐舌

乾口燥少陰經瘧也二陳加飯芩相

連柴之類○發於辰戌丑未且寒熱

嘔吐不食或腹滿自利太陽經瘧也

二陳加一二木柴芩之類○發於寅申

巳亥且寒多熱少或腹痛引陰如淋

狀厥陰經瘧也二陳加桂枝附姜之

類

神 ○老瘧飲 治久瘧成癖在胃腸諸藥

不效者 蒼朮 萆 桔 青 陳

良 各半 苓 芷 枳 半 甘 炙 桂

姜 炮 各 菹 苜 各 二 右 入 鹽 少 許 煎

○林 一方 治瘧用雄黃 瓜蒂 赤小

豆為末每服半錢溫水調下以吐為

度

○一方 治勞瘧 繫甲二兩酥炙

為末臨發時溫酒調下二錢匕

霍亂門

傳 ○陳無擇曰霍亂者心腹卒痛嘔吐下

痢情寒壯熱頭痛眩暈

○河間曰因渴而大飲飲而過量或因

飢而始食食而過飽以致濕熱內甚

故陰陽交錯而不和是為吐瀉

○揮霍撩亂而不得吐瀉者此名乾霍

亂多死三月用極鹹塩湯令吐不吐

更服三吐乃止吐定用理中藥  
熱多欲飲水五苓散寒多不飲水理  
中丸

○河間曰凡霍亂此証急用五苓 益元  
桂苓甘露 及吐瀉之聖藥也慎勿  
與粟米粥湯吐瀉止過半日飢甚亦  
可與稀粥少食以漸將息

○轉筋屬血熱 四物加酒芍紅蒼星  
男子以手挽其陰女子以手牽乳近  
兩邊

○林甚劇轉筋入腹即死霍亂惡証無越  
於斯

○內經曰脈伏者霍亂脈訣曰霍亂脈  
微細者生微遲氣少不言者死  
○傳脈大者生微弱漸遲者死脈結促代  
皆不可斷以死

○丹溪曰有且吐者雖自吐利還須以  
吐法提其氣用二陳湯探吐或益湯  
皆可吐之

○香中丸出血或十指頭出血皆良法  
○半夏湯 治霍亂轉筋吐瀉不止

半麴 苓 木 絡五 淡桂二 不 其  
後一右為末每服二錢湯者凉水調  
下不渴者温水調下

○理中丸 木 參 姜 其 絡等為  
末煉蜜丸凉水化下

○天和湯 治霍亂吐瀉不止 木  
半 縮 杏 參 其 絡五 赤 苓  
藿 扁 藜 凡 各一 藟 朴 制 炒 各  
右加姜二片棗一枚

○漿水散 治暴泄如水周身汗出盡  
冷脈弱吐不止 半仁附 乾生姜

甘炙桂各半良二右漿水煎

○姜附湯 治霍亂吐瀉轉筋手足厥冷多汗亦見傷寒門

○理中湯 治霍亂食生冷成霍亂吐瀉心腹滿悶方見傷寒門加陳皮青皮

名治中湯更加丁附名丁香香治中湯

○丹溪曰凡霍亂不瀉用生薑理中湯湯五苓散加五味開滑又曰冬用理中湯夏用黃連香薷湯

○一方 治吐瀉 藿 蒼 朴 陳 縮 芷 甘 半 苓 參 麩各炒

等水煎遇寒加乾姜寒甚加附

○通脈四逆湯 治霍亂多寒身冷脈絕二兩附炮一桂通草 細 白芍 甘草 粳米 右水酒各半加 生薑

○茯苓沢瀉湯 治吐利後煩渴飲水 五苓 去術加甘

○木瓜湯 治霍亂吐上舉轉筋入 腹悶絕 凡兩木瓜兩荷仁甘草一右 入生薑燕菜

○訶子散 治心脾冷痛霍亂吐利如 神 訶 甘炙 朴 藳 姜 果苓 陳 良 麩各 右入鹽些少煎

○七氣湯 治中氣鬱結五臟之間陰 陽不和霍亂吐利 半兩 白芍 苓各四 桂 朴製各 藳 陳各 兩參一 右加姜棗

○止渴湯 治霍亂煩渴 甘炙 參 門 苓 桔 括 葛 沢各 等 右 爲末每服二錢漿水調下

○麥門冬湯 治霍亂已愈煩熱不解

八十五

八十五

多渴小便不利 阿陳法半白苓  
木糖各二甘炙各一分小麥一分  
右炙二貼水二盞姜五片烏梅一箇  
煎八分服

**神** 不換金正氣散 治霍亂轉筋吐瀉  
不止方見傷寒門

**藿香止氣散** 治濕氣霍亂吐瀉  
同

**姜鹽飲** 治乾霍亂 鹽兩生薑兩  
切同炒及色變以水一椀煎熟溫服  
其甚者加童便一盞

**既濟湯** 治霍亂後虛煩不得眠  
參 其炙竹葉四兩附兩半  
伍右入姜五片粳米百餘粒  
林吐藥汗無法可治用井泉水半椀百  
沸湯半椀相合服之極

**瀉法** 治霍亂轉筋入腹鹽多同煎  
湯瀉之

**洗法** 治霍亂轉筋用蓼一把去兩  
頭水煎薰洗  
一方 用陳大蓼

**灸法** 治霍亂已死腹中尚有暖氣  
用鹽內臍中灸二七壯仍灸氣海二  
七壯又灸霍亂吐瀉上管中管各二  
七壯傳灸天樞氣海

又木穀不分而泄瀉灸水分七壯  
又轉筋入腹欲死者使四人捉手足  
灸臍左邊二十四壯  
又轉筋十指攣急不得屈伸灸脚外  
踝骨上七壯

內傷門七

一辨內傷外傷

○傳外傷風寒有餘之証發熱惡寒寒熱  
併作其熱發皮毛之上真氣塞不通  
心中煩悶不安一時一旦增加愈甚  
○內傷飲食勞役不足之証寒熱間作  
其熱蒸人燥熱發肌肉之間口鼻中  
氣短不足以息腹中不和口不知味  
大小便或閉或泄或心下痞悶或胸  
中痛

○內証頭痛有時而作有時止

外証頭痛常以有少之須傳裏去罷

一治法

○傳惡寒發熱頭目沉重之証世醫置不察  
內外虛實硬作傷寒用汗下之法故  
東垣先生著內外傷辨惑論脾胃

榮運日以扶植胃氣為本

○或內傷於痰與食清氣鬱于下濁氣  
塞胃中之候驟用補中益氣等藥則  
氣滿痞塞遂謂補藥不宜此証改用  
汗下而死故王安道著內傷不足中  
有有餘

○勞傷傷誠不足飲食傷當於不足中  
分有餘不足

○酒者大熱有毒氣味俱陽及無形之  
物也若傷之此當發散汗出則愈其  
次補小便二者分治其濕

○傷食必惡食氣氣口脈緊盛胸膈痞  
塞亦有頭痛發熱者但身不痛一陳  
加末直言若如聞食氣即嘔一陳加  
縮青

○傳有按痰者有按外邪者有熱鬱于內

而發者皆補元氣為主。若所按而兼用藥按痰者，補中益氣加半夏氣虛甚才少加附子以行參芪之氣。脈緩怠惰嗜睡四肢不收或便瀉從平胃散。

○脈弦氣弱自汗四肢發熱或便瀉或皮毛枯槁從黃芪建中。

○脈虛而血弱從四物湯而加減。

○真氣虛弱及氣短脈弱從四君子湯。

○或渴或小便閉澀赤黃從五苓散去桂。

○傳 補中益氣湯 芪一廿 煨五 參 病甚

木 飯略七 陳 煨 升 柴 略 三 右

脾胃一虛肺氣先絕故用芪益皮毛閉腠理不令自汗。○上喘氣短損其元氣用參補之。○心火乘脾用芍藥

瀉火熱補胃中元氣若脾胃急痛腹中急縮者且多用之。此三味除濕熱

聖藥也。未除胃中熱利腰膝間血升柴升胃中之清氣又引芪其上升能

補衛氣之散用飯和血脈橋紅理胸中之氣又助陽氣上升散滯氣或少

加柏以救腎水瀉陰中之伏火也。表執者一二貼氣和微汗而愈。○咽乾

者加葛。○心刺痛及血澀不足加飯。○精神短少者加參五味。○頭痛加

蔓荆子其痛加芎。○頭痛腦痛加藁細。○有痰加半生姜。○咳嗽夏加五

味門秋冬加連節麻春加佛耳數冬。○又咳肺中伏火去參。○食不下及胸中有寒或氣澀滯加木陳青寒月

更加益智草豆蔻夏月更加苓通秋

更加枳縮○心下痞悶加芍連○腹  
脹加實木枳縮天寒加生薑桂○腹  
痛加白芍其有寒加桂其加芍其為  
冬加益智草豆蔻半夏○腸痛或縮  
急加柴其○臍下痛加熟地不巳是  
寒也加桂○太便閉滿加大飯○脚  
軟乏力或痛加栝不巳更加巳○氣  
浮心亂以硃砂安神丸鎮固之

○硃砂安神丸 連半 硃石 酒生地  
酒飯身 其五分 右為末湯浸蒸  
餽於津唾吞下食後服下左無飯地  
用生其

○調中益氣湯 脈弦洪緩而沉時滿  
四肢倦怠煩心腹難舒仰一便清利  
而數或太便滿夏月發滯完穀或便  
後見血或白膿胃滿膈噎咳嗽此藥

主之

補中益氣湯去饒加木一分或二分  
如陰火蒸熱加生地仁栝三○大便  
虛坐或下而不已腹中瀉迫血虛血  
滿加飯身分○身躄沉重雖小便多  
亦加苓分蒼石沢短栝分○胃氣不  
和加半兩生薑分○有嗽加生地分  
以制半夏之毒○痰厥頭痛非半夏  
不能除○腹痛春夏加白芍冬月腹  
痛不可用芍只加乾姜或加半夏

○升陽補氣湯 治因飲食勞役胃氣  
不足脾氣下陷氣短無力不能寒熱  
早飯後昏悶倦怠五心煩熱 朴三  
製汁 卷 獨 白芍 風 其分  
沢路 五柴一分 生地七分 右加姜集  
○腹脹乃窄 枕倍括○腹似硬加縮



步

○木香化滯湯

治憂食溫熱結中脘

心死木食或胃脘痛

半斤

草薤溫熱畏

其分各分七分柴分六分木分一分橘分一分

紅分四分實分煨分飯分各分三分酒分紅分分分右分加分生分

姜

○門冬清肺飲

治脾胃虛弱氣喘精

神短少或吐衄

花茸各分甚分白分

芍分其分各分參分門分飯分身分各分五分

五味分粒分右分

○白朮和胃丸

治久不食大便或閉

或澹吐胃氣虛弱也 木分五分兩分半分

朴分各分一分陳分法分白分參分伍分其分各分二分實分

板分各分二分木分半分乾分生分姜分石分為分未分湯分送分下分

蒸餅分九分米分飲分送分下分

○枳木丸

治痞滿消食強胃 木分二分

實分麩分炒分

右為未用沸湯泡青荷葉

乾者亦研分填分間分去分葉分用分湯分浸分晚分梗分米分

拌分粉分以分原分湯分煮分糊分丸分白分湯分送分下分加分橘分

紅分兩分名分橘分皮分枳分木分丸分治分元分氣分虛分弱分飲分

食分不分消分心分下分痞分悶分○加分炒分麩分兩分炒分藥分

麩分一分名分麩分積分木分丸分治分飲分食分太分過分心分

腹分滿分悶分○加分木分兩分名分木分香分枳分木分丸分破分

滯分氣分消分飲分食分○加分半分兩分名分半分夏分枳分木分

丸分治分傷分冷分食分○加分酒分炒分黃分連分酒分蒸分不分

黃分炒分神分麩分橘分紅分兩分黃分芩分兩分名分三分黃分

枳分木分丸分治分傷分肉分食分濕分麩分辛分辣分味分厚分之分

物分填分塞分悶分亂分

○備急大黃丸

治心腹卒痛

大分巴分及分油分膜分乾分姜分各分等分右分為分未分煉分

蜜分丸分小分豆分大分每分服分二分丸分

○丹溪保和丸

治宿食心腹飽悶脾

胃虛者勿服 查五麴炒半略三

苓 陳去白兩 各羅腹子炒翹各一麥

芽麴炒一 右為未別用生神麴五

入姜汁打糊丸白湯米飲下方無

兩脾胃虛四君子湯送下

○祖傳逆源散 凡傷食寒熱久不已

或傷寒後食復以厚食之物燒存性

一兩為末用生韭根葉并汁調服過

一二時以東垣枳實導滯丸下之

○枳實導滯丸 治傷濕熱之物痞滿

悶亂大兩實麴 麴炒各 苓

連 木絡三 沢仁 右蒸餅丸以利

為度 加木棋各二 名木香導滯丸

○參苓白朮散 治脾胃虛弱飲食不

進或嘔瀉大病後補助脾胃極妙

參 朮 苓 山 扁姜九浸炒

各一兩半

其 桔 薏 蓮略一 右為末每服

二錢粟湯調下下方有縮 一兩禁口

麻用粳米湯下

○平胃散 治脾胃不和 蒼五升

陳法各 苓絡二 右加姜棗氣

不舒中脘痞塞 加莎縮 欲進食

加曲芽吳茱洗蜀椒

○益胃湯 治頭悶動勞則微痛不喜

飲食口不知味燥熱氣短 腸鳴便溏

口乾不喜食冷 茵 飯 貴 升

絡五 甘 守絡二 苓 木 參 柴

益絡三 蒼半 右

○凝神散 取斂胃氣清涼肌表

參 朮 苓 山絡二 粳 扁炒 知

生地 甘多 絡竹葉 地骨 門各

半 右加姜棗

感應丸

治傷冷物不能消化或瀉

臭如抱壞雞子 百草霜細底者 兩

杏二百四十粒 姜兩 炮一巴 七十粒 油粒 去

菴二十 木二兩 丁一兩 右姜菴木

丁四味為末同餘三味用蠟六兩錫

化入好酒一升煮數沸候酒冷其蠟

自浮於上取蠟秤用春夏修合用清

油一兩秋冬用一兩半煎熟下酒煮

蠟四兩同化乘熱拌和藥末九姜湯

下

黑圓子

治宿食不消吞酸或腹痛

養泄如痢 烏梅肉酢 百草霜分 杏

二十一箇 巴三枚 去半 九枚 縮二 箇

去皮 尖一 箇 敷油 右為末麩糊丸姜湯下

阿魏圓

治脾胃虛弱食肉麩菓不

消化 魏酒 浸桂 莪少 茅少 麩炒

青 蘿炒 水 姜炮 各百 草霜 分三 巴

二十一箇 右為末糊丸姜湯下麩傷

用麩湯下生菓傷用麩香湯下

著 人遇勞倦辛苦用力過多服之免生

肉傷發熱之病此方主於補氣 莪

蜜炙 一參 門 陳 木各 一甘 五

分味二十 右入姜棗勞倦甚加熟附

四五

養胃湯

治脾胃虛寒嘔逆惡心腹

腸脹痛腸鳴泄瀉或有外感寒熱如

瘧骨節煩疼並皆治之 藿 朴

半 苓 略 一 菓 附 甘 陳 參

各 三 木 酢 右姜棗棗枚烏梅半

補血湯

遇勞心思慮損傷精神頭

眩目昏心虛氣短驚悸煩熱並治

飯 白 芍 白 茯 神 酸 棗 門 各

不亨 生地 陳旻 其各五參  
二分味箇十五右

○泄瀉門八

傳 厚病或曰瀉白為寒瀉青黃赤黑為熱

○大抵瀉利小便清白不泄為寒赤泄為熱

○又大便完穀不化色不變吐利不群穢水液澄徹清冷尿清不泄身冷不瀉脈遲細而微寒証也

○穀肉消化無問色及他証便斷為熱穀不化亦有熱証凡火性急速傳化失常完穀不化而為食泄者亦有之久泄穀道不食或脫肛此元氣下

及太腸不行收令而然 木 芍

麴 陳 訶 菴 五倍 烏梅為

丸四君子加升風煎湯送下

○瀉米腹不痛瀉 四苓散加蒼朮倍

白朮

○飲食入胃不住完穀不化氣虛 參

朮 芍加芪升柴風提之

○瀉米腸鳴痛一陣瀉一陣火四苓散

加滑苓通施伐火利尿

○或瀉或不瀉或多或少痰 海石

黨 苓 麴為丸

○腹痛甚而瀉瀉後痛減食積以大實

曲消滌之

○瀉証須積滯已消後用斷下藥便固

止之多成痢先理中焦次分利水穀

治中不效然後斷下

○泄本屬濕多因飲食不節治法消食燥濕利尿補脾亦有升提下陷之氣有用風藥勝濕亦有久泄腸胃虛濕不禁者收止之

主方 木行苓 芍各一陳行其五分  
傷食泄黃或食積加連朴實○尿赤  
澀少加沢猪通施○口渴引飲加葛  
參門升樞○夏秋濕熱大行暴泄加  
連蒼沢升通○積酒熱瀉加連肉麩  
葛○寒月冷泄加麩姜縮木益○久  
泄胃氣下陷服利尿藥不効加參香  
升柴○久瀉中虛食少難化加耆參  
麩大姜○久瀉腸胃虛弱不禁加訶  
菴小姜脂

○**正瀉丸** 菴紅白滑春冬一兩二兩  
夏冬二兩半秋  
二右為末姜汁調神麩作糊丸服

○**茯苓湯** 治傷冷飲泄瀉變作白痢  
或赤白相交腹痛食減熱躁四肢沉  
困無力 苓生半飯仁桂 其各  
猪 苓各三 沢五分方七分 蒼 生其  
升 柴各一右

○**五寶補胃湯** 治大便一日三四次  
漉而不多腹鳴尿黃 苾 柴 飯  
身 益 橘紅各半升仁其後半紅  
計右

○治痛泄 木炒自芍各兩一兩  
兩半陳一兩風

○**白朮散** 治濕瀉及食積濕熱作瀉  
木 苓 芍各等 水煎或為末米  
飲調下

○**神木散** 治春傷於風夏必發泄  
蒼半 藁 芎各六分 菴四分 其三

細分 右加姜

○**胃風湯** 治証如前及治風冷乘虛

入腸胃泄瀉完穀及濕毒下如豆汁  
或下瘀血或如魚腦 參 苓 芍  
飯 桂 木 白芍各等 右入粟米  
一小撮 水煎如腹痛加木香

○**生料五苓散** 治泄注如水方見傷寒門

加蒼車倍末為末米湯調服○濕熱  
甚下泄如熱湯者去桂加滑苓拖通  
之類○腹痛下泄身冷不渴寒泄也  
倍桂加蔻

○**胃苓湯** 治脾胃不和及夏秋之間

脾胃傷冷水穀不化 平胃 五苓  
合和姜棗煎服

○**漿水散** 治暴泄身冷汗出脈微方見霍亂門

○**理中湯** 治藏府停寒泄瀉不止

方見傷寒門

○**升陽除濕防風湯** 治大便閉塞或

裏急後重數至圜而不能便或有白  
膿或血慎勿利之 蒼兩風仁木  
白苓 白芍各一右

○**實腸散** 治泄瀉不止 菴 訶去 煨

菴 縮 陳 菴 苓 朴各二木  
其八分右加姜棗○手足冷加干姜  
炮

○**赤石脂散** 治腸胃虛泄注完穀腹

鳴痛 脂煨其各縮四煨八右  
為末米飲調下

○**六一和湯** 治暑月泄瀉此方見聖門 藟

朴各二其各赤苓 扁 瓜 藟各  
不參 守 杏 縮各五右加姜棗

○調中散 治腸虛泄瀉不止嘔吐不

食不食 蒼妙翹妙桔酪一茅妙益

橘紅絡二 藿 續 莪炮姜炮桂

苗地果酪半 甘酸三 右入姜棗并少

鹽煎

○袖 止瀉秘方 參 木 苓 甘 炙 姜

炮訶核 木 藿 莪炮右等分煎服

○全 粟殼圓 治暴泄不止 鹽去帶 莪

炮右為末醋糊丸米飲下

○林 木香散 治脾腎俱虛泄瀉 莪炮

煨砂妙木 白苓各半 木 甘各

右加姜棗

○二神丸 治脾腎虛寒泄瀉不食

砂妙 莪生 二 右為末以棗四十九

箇生薑四兩切同煮棗爛去姜研 枣

肉為膏丸桐子大鹽湯下加水 兩半 茵

兩名四神丸治脾腎虛腸鳴泄瀉腹

脇虛脹胸膈不快飲食不化

○五 五味子散 治腎泄 味二 茱半 兩西

綠色 右二味妙香為末陳米飲下

○傳 祖傳 治腹痛泄瀉 艾葉 車前

葉各一握 右細切用水二盞煎至二

盞去粗入姜汁再煎一沸稍熱服立

愈

○灸法 治吐瀉不止灸天樞氣海立

愈

○林 同陷下則多之 百會 脾俞 中

脘 關元 腎俞 大腸俞 長強

痢病門 九

○傳 丹溪曰痢疾乃外感兼內傷之候也

須分表裏治之在表者惡寒發熱身  
首俱痛小柴去參棗加蒼芎生芍陳  
微汗以散之在裏者後重窘迫腹痛  
下積早宜以大小承氣酒煎大黃湯  
之類下之餘邪未盡更以芍藥湯香  
連丸之類穢積已盡而更衣未息者  
此太腸不行取令故也以固腸丸參  
香散之類止瀉之

腹痛 白芍甘草為君飯木為佐惡  
寒加桂惡熱加枳

○腹痛因肺氣鬱在大腸之間以苦梗  
發之後用痢藥一云實則可下虛則  
以苦梗發之

○初下痢腹痛用溫萊姜桂之屬勿用  
參木縱氣虛胃虛不可用  
後重者積與氣墜下故兼升兼瀉

香檳榔丸方見保和丸方見之類內見

○發熱不止者屬陰虛用寒冷兼溫萊  
升藥

○孔痛因熱流於下 木 枳 芩  
連加炒姜又云父病身冷自汗脈沉  
小而孔痛宜溫暴病身熱脈洪大宜  
清之

○下血者宜涼血活血飯麥桃之類風  
邪下陷升提之

○溫熱下痢小便止以少煩渴能食脈洪  
大而緩腹痛後重桂苓甘露飲方見  
送下保和丸

○濕多熱少食少腹痛後重夜多利下  
胃苓湯方見送下保和丸

○氣虛面色痿黃或枯白色疲倦痢頻



併痛後重不食脉細弱或微汗出黃  
芪建中湯下保和丸

○濕熱為痢不渴者建中湯加蒼朮下  
保和丸

○脾胃不和食少腹脹痛後重脉弦緊  
平胃散加芍桂葛朮下保和丸

○血氣大虛腹滿頻併後重不食或產  
後得此証四君方見虛加飯陳下保  
和丸

○下痢白積者芍藥湯加木陳耳滑桃

○下痢赤積身熱益元散加通芍妙陳  
木湯下保和丸

○下痢日久而不能起於床木食疲弱  
之甚者用參 芪 地榆 縮

沢絡五木 芍 陳各一飯杜壘醋  
甘炙木 升 白蔻絡三右煎服

諸痢主方 芍 芍絡二連 木

枳 枳各一廿也○初後重加滑飛  
加枳枚生芍無加條苓○日久後重

不去此大腸墜下也去枳枳用條苓  
加升麻根之○白痢加木芍陳骨初

欲下之加大黃○紅痢加飯芍飛初  
欲下之加大黃○紅白相交加飯芍

飛以理血加滑陳木以理氣有食積  
加枳實

○芍藥湯 行血則便膿自愈和氣則  
後重自除此藥是也 白芍仁飯尾

連 芍絡一大杜甘 枳 木 桂  
絡五 初後重窘迫甚者倍大黃加芒

行○瘕滿不宜通加實行藏毒下  
血加栝不

○黃芩芍藥湯 治瀉痢腹痛或後重

身熱交不愈脈洪數及膿血稠粘者  
芩 芍各二廿右煎服腹痛加桂  
分熟服

○黃連湯 治大便後下血腹中不痛  
謂之濕毒下血 連 飯各二右

○芍藥黃連湯 治便後下血腹痛謂  
之熱毒下血 芍 飯 連各一大  
分桂半 分廿分右

○大黃湯 治痢久不愈膿血稠粘裏  
急後重日夜無度脈沉實者或初腹  
痛甚者窘迫不安者 大黃一味好  
酒浸半日煎去粗類服後以芍藥湯  
和之又再服黃芩芍藥湯徹其邪此  
乃蕩滌邪熱之劑

○香連丸 治下痢膿血相交重急後  
重連二十兩用茱萸十兩同  
以酒拌溫同炒去茱萸

木四兩 右為末醋麩糊丸米飲下  
加石蓮半治禁口痢尤佳

○益元散 治痢之聖藥也 白滑石  
其一右為末白水調下

○神效參香散 治痢日久穢積已少  
腹不痛或微痛不後重窘迫只滑留  
不止乃收功之後藥也 鹽法穢積  
醋炙下  
細二陳一兩薤  
三兩薤  
四兩苓 三兩各  
四兩  
木 參絡一右為末每服一錢七清  
米飲調下食遠

○祖傳和中飲 治痢疾不分赤白久  
近服之但發熱禁口不可服 陳  
木 苓 芍各一  
分 葛七分  
分 陳倉米  
紅砂糖三  
分 粟殼醋炙  
一分 烏梅一  
分 薑右作  
一服 加姜三片枣一枚水煎

○三防飲 治痢後感寒濕脚膝腫痛

石鶴膝風 參 朮 芪 飯 芎  
熟地 芍 仲姜汁 薤 苓 一 其 半  
風 已 卷 膝 絡 附 童 尿 處  
皮 膈 七 分 右 作 一 服 入 姜 三 片 棗 二  
枚

○禁口痢，胃口熱甚，故也用連參前湯  
終日嘔之，如吐則再強飲，但得一啣  
下咽便好。

○又用田蠶搗盒臍中，以引下其熱。  
又禁口不食者，參苓白朮散方見初  
加蒼朮、陳倉米飲下，或參苓蓮入其  
少，苜蓿為末與之，宵次一開，自然思  
食。蓮陳壁土二味細末，棗姜煎湯調  
下。

○**丹溪主方**

治熱痢血痢即古方

連 芩 栝 枳 白 芍 飯 湯

甘 桃 朮 枳 等 為 末 麩 糊 丸 加 大  
黃 米 飲 下

○**一方** 治虛弱患痢 參 仁 白 苓 仁

木 芍 枳 枳 一 蒼 仁 麩 糊 七 升 五 分  
右 水 煎 ○下 重 加 風 酒 飯 各 一 椀  
壯 連 炒 沢 絡 六 甘 多 滑 各 五 分 木 三 分

○治痢後脚細弱 蒼 仁 白 苓 板 各

兩 栝 枳 右 為 末 粥 糊 丸 四 物 湯 加  
陳 其 煎 湯 下

○**黑丸子** 治宿食腹痛 蒼 仁 赤 白 痢  
方 見 內 傷 門

○**駐車丸** 治冷熱不調 下 痢 赤 白 日

夜 無 度 腹 痛 甚 連 三 膠 飯 各 一  
姜 炮 一 右 為 末 醋 糊 丸 米 飲 下

○**白木聖散子** 治瀉痢久不瘥 并 婦  
人 產 後 痢 飯 菘 縮 榴 皮

訶 姜炮陳 木 甘 芍等水煎  
入乳香末空心服

○加減李胃散 久下痢則脾胃虛損  
而血不流於四肢却入胃中為血痢  
宜服此滋養脾胃 木 棋絡三  
木 枳 陳略一其七參 連 自  
苓 膠 枳 絡 五 右為末每服五  
錢姜三片棗一枚水煎去粗服○血  
多加朮○氣不下後重加枳木○膿  
多加膠○濕多加木○腹痛加桂芍  
其○熱泄加連○脈洪大加大黃○  
尿澁加苓沢

○加減木香者散 治一切痢神妙  
木 甘 飯 菘 參 桂 芍  
訶 烏梅枝膠 蛤 白苓 絡 五 罌 一  
半 蜜 右每服四錢姜三片棗一枚

煎去粗服

○加味四君子湯 服藥已多痢不愈  
蓋攻擊藏有之藥轉覺難安宜用和  
氣之藥 參 木 白苓 甘  
菘 芍 罌 蜜 炒 各 每服三錢姜三  
片棗一枚

○百中散 治一切痢一日去五六十  
行只一服便疎 罌 蜜 炒 赤 四  
右為末米湯調下忌生冷曲臍魚鮮  
等

○獨神丸 治痢疾 罌 醋 炒 為 末 煉  
蜜丸如桐子大每服五十丸○赤痢  
甘草湯下○白痢干姜湯下

○倉廩湯 治瘧痢俱作寒熱腹痛煩  
渴及禁口者 柴仁煎 菘 獨  
枳 桔 參 苓 芍 各 一 錢 炙 一

苛半加分苓一右分二貼姜五片東  
一枚倉米細水煎服之三五貼之後  
後重服痛寒熱煩渴脉沉實以大柴  
胡湯宜下之

○葛根湯

治酒癩 葛 枳 半  
苓 生地 杏略分 苓一 枳半  
右分二貼黑豆百粒姜五片白梅  
一箇水煎

○真人養湯

治下痢膿血腹痛及酒  
毒便血 罌蜜炙 參 飯 木焙  
六桂八 訶皮二 木一 薤起煨  
白芍一 細甘一 右水煎藏寒者  
加附三

○調和飲

治下痢積久者 白芍三  
芎 苓 連絡二飯 桃絡一升五  
右水煎

氣門下

傳 內經曰百病皆生於氣也若不善攝  
養者五志之火無時不起五味之偏  
無以不傷是以釀成膠痰固積留滯  
於六腑鬱火邪氣充塞乎二焦使氣  
血失其常候腑臟不能傳導是故外  
邪得以乘虛而湊襲

○脈經曰脈滑者多血少氣濇者少血  
多氣大者血氣俱多脈來大而堅者  
血氣俱實小者血氣俱少細而緩者  
血氣俱虛代者氣衰細者氣少  
○心 氣結則生痰痰盛則氣愈結故調氣  
必先豁痰如七氣湯半夏為主官桂  
佐之調氣雖用豁痰亦不可無溫中  
之劑

傳

一陳湯方見

氣結于胸臆之間而

為痞滿刺痛伏梁等証者加連實結  
萎木之類○在中焦而為痞滿脹急  
者加木朴枳椇或用平胃散○在下  
焦而為奔豚七疝等証者加桃查枳  
枳核茴棟荔枝之類○在兩脇攻藥  
作痛者加青柴芳膽之類  
○婦人胎前產後一切氣疾作楚者四  
物為主加行氣之藥

**七氣湯** 治五藏不調三焦不和心  
腹痞悶脇肋脹面肢浮腫大便秘  
難參桂半絡二耳後一  
右作一貼入姜三片薑半兩桂兩參  
甘各五

**四七湯** 治証同前方見痰門  
**三和散** 治証同前又治背脇痛妨  
食及脚氣攻胃腹滿悶大便不通

菴 蕪 沉 凡 腹絡一尋六分  
茸炙陳木枳木枵九一五加  
生姜 縮 燈心絡一右

**木香飲** 治氣鬱  
脚浮腫無不効 蕪 青 飯酒方  
烏苓 枳 平 耳炙尋 莖炙

實炒風 枳 枳 腹子 薑汁湯  
絡八陳一枵木枵右分一貼姜三片  
棗二枚水煎

**木香流氣飲** 治氣痞胃膈膨脹面  
目四肢浮腫一便秘半兩枳 青  
蕪梗莎 耳炙枵陳二斤枵 枳  
莖煨 下皮煨不見腹 蕪 木 果枵  
兩通法附門 芷 木 赤苓 凡  
參 苜各四 右每服四錢姜三片棗  
一枚

一方去蘿蔔加沉六枳四黃一兩

快氣湯

治氣積心腹脹滿胃塞吞

酸痰逆嘔吐宿酒 香附炒一縮

兩甘醪二右為末塩湯煎服或入姜

煎

柳氣散

治七情所傷中脘不快氣

不升降腸脹 莎炒四陳三甘五

右為末每服二錢食遠白湯煎服

妙方女人尤宜服

分心氣飲

治因憂思氣留滯胸膈

痞悶嘔吐頭眩口舌乾食積漸羸瘦

蘇細羌半 桂 青 陳 腹

桑炒通 芍 耳炙赤令各一右每

貼七錢姜片棗一枚燈心十莖○氣秘

加枳炒萊炒皂角子各一

分心氣飲

治証同前 桔炒 門

菓 腹皮絡一木 桑炙腹子 朴

木 參各半 莎炒蘇 陳 藿各半

丁皮 耳炙各右入姜棗灯心十莖

蘇合香丸

專能順氣化痰并治傳

屍骨為卒心痛鬼魅赤白下痢小兒

絞腸等証 沉 麝研訶梨用十

木 安別研用無灰 莎炒橙 木

檀各二 薰別 蘇合香油入安息

腦研各硃飛烏犀酪二右為末和勻

用安息膏并煉蜜和丸如梧桐子

大空心温水土化十丸酒服亦可

紫沉通氣湯

治三焦氣滯小能宣

通腹脹便秘 蘇 枳炒陳祛赤

苓 耳炙枳酪一沉 木 門 味

桑 莖 姜 苛 荆 實 蘇炒各

右

木香換神丸 疎三焦利胃膈破痰

迷飲逆氣消食 木 枳 青

陳 枳殼連 枳殼各相 大略三

沙 牽藤略右為末水丸如桐子大

每服二十九食後姜湯下

正氣天香湯 治婦人氣痛或胃腹

脹結塊刺痛因之月水不調或駁

嘔寒熱及胎前產後一切氣証

烏半 蘇六陳 蘇 姜略六右水

煎

沉香降氣湯 治氣不升降胃膈痞

悶吞酸 沉四縮五其 一 一 兩

莎 董便浸 右為末每服一錢入鹽

少許白湯調下

異香散 治胃不和腹脇膨脹飲

食難化一切冷氣結聚 莖 稜

益 甘遂絡青 陳 芥絡 蓮

右入姜棗

和氣散 治脾胃不和中脘氣滯腹

滿嘔吐 青 茵炒蒼 甘 蘇

祛桂 良 莎 桔略三右為末並

湯點服

順氣木香散 治氣不升降胃膈痞

痛及酒食過傷噎酸 蒼 桔

茵炒各 姜炮陳祛芥 蘇 一 皮

甘炙良 桂 木略 一 右為末煎服

或入鹽少許沸湯點服亦所

紫蘘子湯 治憂思過度心腹膨脹

喘促煩悶腸鳴一使不排脈虛寒而

籩 蘘子兩腹 蘇 半 芥

木 陳 通 木 實 參 耳 參 各

兩 右加姜棗



林鍼灸法

憂死肢冷心腹口鼻溫已神不轉口無涎舌短不縮鍼灸全二分徐出

針刺之復活又驚死心下溫氣充骨節口也溫心

二分徐出神效悲笑發死肢冷身口溫氣入中三分

灸百會三壯又法 麟道分氣三壯一

奔豚氣撮心二不得息灸谷極五十壯

○灸心氣法男左女右心掌內五指與

丁少之稱心一筋結一筋正也稱心

分開加項上以指按足為於天來骨

上兩邊垂向背後兩指心膈無下者

中書是穴可灸五壯神效

○消氣散 治血氣凝滯心膈不舒

急中清四肢浮腫飲食無味小便不利

清 沉 木 參 半 青 桔 絡

兩陳兩白苓 菓炒腹洗燕麵○通

各三 右姜黃

痰飲門 上

○傳 丹溪曰有熱痰有濕痰有酒痰有食

積痰有風痰有寒痰有老痰

○痰脉皆弦微沉滑雙弦者寒飲偏弦

者飲也沉而弦懸飲內痛脈飲不弦

但苦喘短氣四肢麻節走痛脉沉者

有留飲兩關浮弦大而實者膈上有

稠痰病人百藥不効閉脉伏而大者

痰眼胞及眼下如炭煙黃黑者亦痰

也

○熱痰用烏龍

○濕痰身多軟而重用二朮又日用芩  
苈半具

○酒痰用麥冬蜜丸噙化

○食積痰用麩芽查或化痰丸消積藥  
攻之

○風痰用星 白朮

○寒痰用半夏

○老痰用海石 苈半 葵五倍 云五

倍子佐他藥大治頑痰

○痰結核在咽喉嗽而不能出化痰藥

加鹹能軟堅之味 葵 杏 海石

桔 翹少佐以柿硝姜汁蜜丸噙化

○痰在膈下非白芥子不能達在四肢

非竹瀝不行在腸胃間可下而愈

○脈浮當吐痰在膈必用吐膠同煎

濁必用吐痰在經絡中非吐不可吐  
中就有發散之儀

○凡吐法宜先升提其氣用風 梳

芎 桔 芽茶 生姜之類或就痰

藥探吐吐時須先以布勒腰腹而於

不通風處行之又服瓜蒂藜蘆等藥

不用探吐自吐

○油炒半夏大治濕痰又治喘心痛痰  
丸 生姜湯下

〔二陳湯〕 治痰之要藥也

欲下行加栝 通 仁之類

欲上行加升 柴 風之類

又日加升提之藥能使大便潤而小

便長

陳去白半 煨油七 苓 其 絆 右 作 一

服加姜三片

○風痰壅盛喘咳加風菴星投皂之類  
者白附 天麻 蚕

○熱痰腹脹喘滿加芩連栝蒌滑膏濕  
之類

○濕痰身重寒加二水星之類  
酒痰 加葛根宿曲芽之類

○寒痰 加姜附益草豆蔻之類  
氣痰 加木茯苓宿枳烏沙之類

○燥痰 加藜藜自味之類  
陰風略血痰嗽加二門知栝貝欬惹  
瘵之類

○如痰在中焦作噎氣吞酸胃脘噎  
而痛或嘔清水惡心等証加二木  
曲芽芎宿草菘猪沢實連栝栝木枳  
之類作丸服之  
○著  
氣虛有痰者加參朮

脾虛者宜補中氣以運痰降下加木  
白芍 麴芽兼用升痰提氣

血虛有痰者加天門知薑菘瀝麥汁  
帶血者每加芩白芍桑

○傳  
痰在胃腹痛或痞滿加木曲芽宿之  
類

在脇下痛或漉心在聲加柴青芎芎  
之類

在經絡中或胸背手足臂腫痛者在  
上加羌風蒺在下加已通膠冬日加  
烏附行經

在腰股膝下腫痛加蒼已通栝藤藤  
之類

如偏頭痛在右加芎芷風荆芎升之  
類

在左合四物湯又加風荆芎細薑藥

酒片苓之類

頂痛者加芎藭并柴葛細切等

○丹溪加味二陳湯 道痰補脾消食

行氣 橘紅 苓 麴七各莎

半絡一廿煖二寸 倉 白木絡八

查半一各縮 芽麴五分各 右麴芽別

研餘細切加姜棗水煎調曲芽木服

○導痰湯 治風濕痰等証 半二

星裂 橘紅 枳殼 甘冬各一

右作一服加姜五片○如久嗽肺燥

熱者去平加味○杏仁○

○千縉湯 治風痰維盛 半七

皂一不去皮 甘一分 右作一服入姜

三片

○利膈化痰丸 星裂 蛤 半

貝 薑 莎章便皂姓 杏去煖

各等 右以煎六味研為末以皂

角并碎煎濃汁搗杏仁如泥再以姜

汁和蒸餅丸○菜豆大青黛為衣每服

五十九姜湯送下

○神木丸 治痰飲 蒼丁新米

生芝麻五不用水二小大棗十五枚

右以蒼木焙乾為末以芝麻漿及棗

肉和勻丸如梧桐子大每服五七十

丸溫湯下

○辰砂化痰丸 治風化痰安神定志

止嗽除煩 枯礬研辰研各星兩

半三右為末姜汁糊丸如菜豆大祿

砂為衣每服三十九食後姜湯下

○破痰丸 治五飲 殺 丁 縮

胡椒 木 蝎梢 烏去青 巴

等去各 右以青皮同巴去入漿水

內這一宿次日同煎青皮焦去豆為  
末淹烏梅肉蒸研為膏入棗末和丸  
如棗豆大每服十九至十五丸姜湯  
下婦人頭風服愈蓋頭風是痰飲所  
致也

○**芎辛散** 治熱痰壅塞頭目不清語

言不出 芎 細 風 桔 芷  
羌 其 各 各 各 各 各 各 各 各

○**五飲湯** 留飲心癖飲下痰飲中溢

飲瀰流飲聞此五飲酒後及傷寒飲  
冷過多故有此痰 參 旋 陳  
祛實 藜 末 苓 朴 半 澤 猪  
前 桂 芍 其 鞞 絡 右 入 姜 酒

酒有飲加葛根葛花 縮  
○**蘇子降氣湯** 治虛陽上攻上盛

虛痰涎壅 蘇 蘇 蘇 蘇 蘇 蘇 蘇 蘇  
蘇 蘇 蘇 蘇 蘇 蘇 蘇 蘇

兩桂 陳法白蘇子 半各五 右入  
姜棗

○**四七湯** 治氣鬱痰逆如破絮或如

梅枝在咽喘滿 蘇子二 朴三  
苓四 半兩加姜棗

○**桔梗湯** 治胸膈脹滿短氣痰逆

桔 妙 半 陳 去 白 各 實 五 妙 右 入 姜  
不 下 桔 妙 桂 其 多 枳 各 七 附 炮

○**枳木湯** 治飲癖氣分心下堅木飲

細 木 略 一 實 五 妙 右 入 姜 汁  
○**茯苓飲子** 治痰飲蓄心胃怔忡

赤 苓 半 神 去 陳 法 門 略 二 沉  
其 妙 枳 各 半 右 入 姜

○**咳嗽門** 十二 附肺癆 肺癰

○風寒者鼻塞聲重惡寒 二陳加  
麻 杏 桔 之 類

○風寒鬱熱于肺夜嗽者 三拗湯

加知 脉大而浮者有熱加蒼生薑

○寒嗽以生薑切薄焙乾為末糯米糊

丸如芥子大空心清水飲下三二丸

○火咳者有聲痰涎面赤 芩 薷

海一石 黛 桔 莎 半 訶

青 蜜丸嚙化

○勞咳者盜汗出痰多寒熱 四物加

竹瀝姜汁

○陰虛火動而嗽 四物合二陳加

炒栝知

○陰虛喘嗽或吐衄者 四物加知栝

五味參門桑地骨

好色之人元氣虛弱咳嗽不愈

蜜王膏 最捷

○咳嗽聲嘶者乃血虛受熱用蜜蛤粉

蜜調服之

○痰嗽 半 葵酪五貝 桔酪二

知兩枳半 為末姜汁糊丸服

○痰嗽因酒傷肺 葵 杏 俱并

黃連 為末以竹瀝紫菀煎入韭汁

丸服又用黛薑蜜丸嚙化

○痰嗽氣急 蒼兩莎半 兩薤蒸 杏

薷 半酪一 芩 苓各五 芍三 右丸

服

○著 杏 去皮白苓 絡一 楸紅 此

五味 桔 廿五分

○春多上升之氣宜潤肺抑肝加芍芍

半絡一門炒芍知 絡五

○春若傷風致咳鼻流清涕宜辛涼解

散加風荷蕪炒杏仁 絡一

○夏多火熱炎上最重宜清金降火加

桑知炒芥門膏各一

○秋多濕熱傷肺宜清熱瀉濕加蒼桑各一風琴梳五分

○冬多風寒外感宜解表行痰加麻枝半風生干姜各一肺經素有熱者每

加酒炒芥知各五○若發熱頭痛鼻塞聲重再加藁苈前柴各一○若右

痰加半枳風痰再加星姜汁○濕痰脾困少食加一木○有痰口燥咽乾

勿用半星宜加知密水貝萹芥炒○若夏月熱痰或素熱有痰加芥連知膏

○上半日咳者胸中有火加貝膏連五更咳者全上

○黃昏咳者火浮於肺不可正用寒涼藥宜加五味五倍訶子皮斂而歸之

○牛後咳者屬陰虛即勞嗽也宜補陰降火加芎朮芍熟地柏知瀝姜汁

天門萹貝補陰而也

○若咳嗽久肺虛滋氣補血加炙芪膠飯欬天門馬兜酒芍生薑之類

○肺熱喘咳去參用沙參此兼補血氣也

○若勞嗽見血加膠飯芍天門知貝桑亦於前肺虛陰虛一條攪用大抵咳

嗽見血多是肺受熱和氣得熱而變為火火盛而陰血不得安寧從火上

升故治宜瀉火滋陰忌用人參等甘溫補氣之藥然亦有氣虛而咳血者

則宜用參芪欬等藥但此等証不多

○火鬱嗽謂痰鬱火邪在中宜開鬱消

痰用訶皮便香附薑半海石蜜各為  
末蜜丸噙化仍服煎補陰降火湯藥  
失治則成勞

○痰積食積作咳嗽者用芫薑海石貝  
黛半軟石膏查實姜炒連為末蜜  
丸噙化

○久嗽有積痰留肺如膠氣不下降或  
挾濕與酒而作用茜根童便炒  
海粉 杏 薑 麩 蜂房為末姜

汁竹瀝調噙化  
○嗽而心煩不安六一散一名益元散方見前  
門加辰砂

○痰嗽寒熱交作者 小柴加知一方  
加白芍五味桑

○夏月嗽而發熱 小柴加膏知  
冬月嗽而寒熱 小青龍加杏

○二陳湯 治咳去痰伐病根陰虛血  
虛火盛乾咳者勿用

○喘嗽遇冬則發此寒包熱也解表熱  
自除 枳桔各一麻 風 甘 陳  
藜 通 苓 各等如嚴寒去苓加杏  
半

○潤肺散 治嗽而失聲 訶 五  
倍五味苓甘各等蜜丸噙化

○三拗湯 治風寒咳嗽喘急 麻去不  
根 甘 生 杏 各不去皮尖 右加薑棗

○溫肺湯 治冬感寒而咳嗽吐痰久  
嗽鬱熱者勿用 半 陳 祛 五 味  
姜 桂 杏 栝 五 細 膠 甘 各 各  
半 右姜棗方一布

○葶蓋散 治感寒而嗽胸滿聲重  
蘊子 陳 赤苓 桑 麻各一甘



兩 右入姜

○林 金沸草散

治感寒鼻窒聲重咳嗽

不已寒熱無汗 荆細麻蘇前各三

甘炙赤芍 半各一旋去蘇右加姜

棗

○橘皮湯

治感寒咳嗽頭痛上氣不

得下 陳 芫 麻蘇 飯酒 杏

炒枝 甘炙赤芍各二右

○傳 杏菹飲

治上氣喘嗽而目浮腫

菹杜杏 五味 腹 烏梅各五陳

枯 麻蘇根 桑螵 膠各二花茸

三分 甘炙赤芍二右入姜

○王 東垣加減二奇湯

治咳嗽上氣喘

促曾瞞不利 桂 陳 甘 青

參 菹 桑絡五 半杜杏三味細右

入姜 減枯青參加米貝名橘菹散

治傷風咳嗽惡風有汗脈浮

○東垣加減瀉白散

治陰氣在下陽

氣在上咳嗽嘔吐 桑兩地骨杜陳

青味 參各五 白苓一右入粳米

二十煎

○寶鑑加減瀉白散

治咳而口乾煩

熱胸膈不利喘促 桑兩地骨 知

陳 桔絡五 細 青 苓 甘 蘇各

右

○大橘皮湯

治面腫上喘 瀉丸甘

炙木 枳各半陳三 右

○平氣散

治諸嗽先吐痰惡風不食

參 木 芎 藎 桂 味 甘

凡 藜子 神 杏炒烏藥 花糖

分 右入姜

○全 平肺散

治肺氣上壅喘嗽痰實寒

熱往來咽乾口燥 陳兩桔 炒半  
甘 蕪 烏梅 去花 五味 知

桑 蟻 杏 炒 鹽 蜜 炒 各 半 右 入 姜

○天降氣湯 治上盛下虛痰實喘嗽

咽乾 蕪子 炒 芎 細 前 飯 焙

枳 桔 半 白 苓 陳 祛 桂 其

鞅 各 右 加 姜 五 寧 蕪 五 葉

○半夏丸 治肺熱痰嗽胃膈塞滿

薑 祛 半 芎 各 右 爲 末 姜 汁 麩 糊 丸 食

後 姜 湯 下

○參朮調中湯 瀉熱神氣止咳定喘

和 中 進 食 莖 細 桑 祛 參 其 後

白 苓 朮 各 二 味 箇 地 骨 門

陳 祛 二 青 水 煎 飯 後 服

○五味子湯 治咳嗽不已皮膚皴燥

啞 血 腎 膈 痛 味 桔 苑 其

續 各 二 茄 三 小 豆 煨 生 地 桑 祛 半

○祖傳潤肺除嗽飲 治遠年咳嗽如

神 參 杏 生 甘 苛 於 三 味 丸

欬 苑 茸 陳 祛 麻 桔 膏

半 桑 炙 枳 烏 梅 鹽 蜜 各

右 加 姜 三 片 細 茶 一 撮

○九仙散 治一切咳嗽及擊其情

歸 之 藥 也 參 欬 桑 桔 膠

味 絡 一 烏 梅 箇 貝 母 鹽 蜜 後 入

姜

○貝母湯 治久嗽 貝 姜 炒 浸 味

芩 姜 熟 煎 陳 各 二 桑 炒 半 桂 各

不 柴 熟 者 木 其 各 杏 炒 右 入

姜

○神功散 治久嗽 欬 其 各

雄雞半兩 桂兩 右為末 吸喉中

○**人參散** 治遠年嗽 麻蘇杏 各

井各四陳 味 桑 豐礪 各 門 仁

花 附 參 細 膠 壯 右

○**寧肺湯** 治虛勞發熱自汗咳喘痰

唾 木 芎 芍 飯 漫 地 茸 炙

味 門 桑 炙 苓 各 一 分 膠 二 分 右

加 姜

○**黃芪散** 治咳血成勞能解肌熱

芪 炙 地 門 枯 白 芍 各 三 茸

綏 一 右 加 姜

○**神効寧嗽散** 治勞嗽諸嗽通用

味 苓 桑 炒 蕪 細 陳 去

根 杏 炒 膠 其 炙 豐 蜜 炒 各 半 五

芎 仁 右 入 姜 棗 烏 梅

○**人參芍既湯** 治勞嗽寒熱咯血

飯 芎 白 芍 各 一 參 半 陳

赤 苓 膠 味 細 其 炙 各 右 入

姜 棗

○**柴花膏** 治肺熱久嗽身熱痰稠成

肺 勞 杷 通 欬 花 杏 炒

桑 炙 略 大 伍 右 為 末 煉 蜜 丸 夜 間 噲

化 入

○**紫苑散** 治咳血肺痿 參 苑

知 貝 桔 其 味 苓 膠

右

○**人參養肺湯** 治肺痿咳嗽午後熱

聲 颯 者 參 其 炙 膠 各 一 苓 味

貝 杏 炒 桔 炒 實 炒 各 一 桑 仁 柴 細

右 加 姜 棗

○**知母茯苓湯** 治肺痿喘嗽不已寒

熱 自 汗 苓 其 炙 略 知 味 參

苛半柴木欬桔門  
苓酪半苛膠絡三右入生薑煎食  
後通口眼

○保和湯 治勞嗽肺燥成痿者

知貝 天明 麥門 欬 慧  
杏炒味絡二甘炙 兜 苑 百合  
桔 蘇 苛絡 膠 飯 生地各  
料 右入姜○痰盛加星半橘紅苓  
枳○熱盛加栝大連苓柏翹○喘盛  
加桑陳腹蕪子蘿子○風盛加風荆  
旋菊細沙

傳  
○肺癰先須發表千金曰咳唾膿血脉  
數實或口中咳胸中隱痛脉滑數  
者為肺癰要畧先以小青龍一貼解  
表之風寒邪然後以葶塵大棗鴨肺  
湯桔梗湯葶葉湯隨証用之此治肺

癰之例也然以黃昏湯補裡之陰氣  
此治滑腸之例也

○葶塵大棗瀉肺湯 治肺癰肺脹喘  
促不得卧 葶一兩炒之為細末  
煉蜜丸如彈子大  
大棗十 右以水二盞煎大棗至一  
盞去棗入葶一九煎至一盞攪勻  
服之

○葶葉湯 治咳有微熱煩燥胃心甲  
錯 葶葉仁葶斤 桃酥五十凡辨  
秤 右以水一斗煮葶葉至五升去  
粗入葶葉煮取二升每服當吐痰如  
粥而愈

○桔梗湯 治肺癰心胃氣壅咳嗽膿  
血心神煩悶咽乾多渴或兩脚腫滿  
小便赤黃大便多澀 桔 貝各  
一飯 葶 蕪 八枚炒已 桑

芪絡五茸節 杏枝及百合格三

右作一服加姜五片大便秘加大黃  
小便澀加大通二方有味骨知

○**又方** 治前証 菱 飯 桔  
貝芷 甘絡一石水煎食後服一  
方無貝芷有葶

○**黃昏湯** 治胸中甲錯隱痛知為  
肺癰合歡皮一掌以水三盞煮取一  
盞半分一服

○吐膿血如肺癰狀口臭他方不應者  
消風散入無病男子髮灰清米飲調  
下二服而愈 左見中風門

○**瀉白散** 治喘咳脇痛膏肓氣促肺  
經蘊熱等証 桑炙桔 菱 升  
半 杏去皮骨絡一廿右入菱

○**升麻湯** 治肺癰胃乳間痛吐膿血  
作腥臭 升 桔 薏 地榆  
芩 赤芍 牡 生耳各三右

○**排膿散** 肺癰吐膿後服此排膿補  
肺 芪 芷 味參參絡等 右為末  
蜜湯調食後服

○**四順湯** 治肺癰吐膿五心煩熱壅  
悶咳嗽 貝 芫去枯桔各一兩甘各半  
右

○**理肺膏** 治肺癰咳唾不利膏膈迫  
塞 訶藟 百藥煎 味微條參  
去芦款葉 杏 知 貝 甜

葶 芫 百合 甘節絡五 右為  
末白茅根研取自然汁砂器熬成  
膏更入蜜二兩再熬和前藥丸溫水  
下

○**治肺癰** 葶末糯米飲調下或入粥

內者喫亦所一五水煎服當下膿血便愈

○咳嗽灸法

○灸兩乳下黑自際各數十壯即瘥

○又以膏滿當乳頭周匝圍身冷前後

正中當脊骨灸十壯

○又上氣咳嗽短氣氣滿食不下灸肺

募五十壯即中存

○上氣咳嗽短氣風勞灸脊并一百壯

○上氣咳逆短氣胸滿多唾冷痰灸肺

俞五十壯

○林從大推下第五節下六節上灸二處

年壯

○咳嗽咽冷聲破喉鳴猜瘧灸天突五

壯

○勞嗽膏青年世三里七世肺俞一七

壯

喘急門十三

傳

凡喘者由痰火內鬱風寒外束而致

之又有陰虛喘氣從臍下起直衝

清道而上又有氣虛發喘短氣不能

以接續

○載氏曰凡喘則有痰聲者痰也作進

乍退得食則減食已則喘者火炎也

○凡喘未發時以扶正氣為主已發以

及邪為主

○火急甚者不可用苦寒藥火盛故也

宜溫熱之

○劫藥用椒目五七錢研為細末生薑

湯調服喘止之後因痰消痰因火治

火

○子縉湯 治痰喘不得助人扶而坐  
數日一服而安一方用道遠痰湯合手  
縉湯服一方並見

○一方用蘿菔子二兩 蒸熟 皂角五斤 燒  
萎 海粉各一星 細用白礬一不半 研  
礬一右為末 煉蜜丸 喻化

○方 治喘而嗽用星 萎 半  
莎 橘 紅 蘿 黛 皂角 為

○氣實人因服黃芪過多而喘者宜用  
二拗湯治氣

○三拗湯 治肺感風寒喘急不絕  
門咳嗽

○葶藶大棗瀉肺湯 治肺壅脹胸膈  
滿悶上氣喘急身熱面自浮腫等証

妨見咳

○濟生葶藶散 治過食煎燻或飲酒  
過度致肺壅喘不得卧及肺壅咽燥  
不渴濁唾腥臭 甜葶藶子炒 桔  
萎 升 薏 桑 桑 桑 桑 桑  
右作一服加生薑五片

○瀉白散 治大人小兒風寒傷肺喘  
急咳嗽 桑 骨 絡 一 廿 半 不 右 加  
美 一 方 有 風 荆 絡 七 又 左 加 麻 杏  
各 半 其 效 尤 捷

○祖傳秘方 治遠年喘急  
桑木內蠹虫糞一升 羅半 杏 炒 升 不  
茸二 右為細末湯浸蒸餅丸梧子大  
每服五七十丸淡姜湯送下

○又治哮喘用苧麻根和砂糖爛煮時  
時嚼燕下世 永絕病根神效

○又用猫兒頭骨燒灰酒調二三錢之服便止

○**王液散** 治久近喘嗽口乾渴

括貝母知各四參仁廿錢一右

○**人參胡桃湯** 治喘急不得卧

一各胡桃五十箇湯浸右作一貼

加姜片

○**杏仁煎** 治喘嗽

杏尖破胡桃肉等分各右研膏煉蜜丸彈子大每

服一丸細嚼臨卧姜湯下

又胡桃肉三姜片臨卧嚼吃飲湯二

兩口再嚼再飲能

○**人參定喘湯** 治肺氣上喘喉中有

聲胸膈緊滿參麻鮓半膠

炒甘各一桑炙味各二分鹽蜜炒

右分二貼入姜三片

○**安神散** 治喘嗽

法甘鞞各右為末每服一二錢煎

烏梅湯調食後服

○**人參散** 治喘嗽

參仁右為末每服一錢臨卧煎嚙之

白湯調服亦呼

○**方** 古文錢七箇

水浸二宿空心下咽良久得吐效

○**杏仁飲** 治身熱咳嗽喘急

前枳桔蘓陳白半甘炙

芩參杏各等右入姜

又一方參蘓飲去薑木加柴杏治

証同前

○**清氣散** 定喘止咳

乘炙蘓甘青陳白枳欬各

分右慢火炒焦水煎加生姜半夏



妙

○**寧肺湯**

治喘嗽

罌粟

陳

桔

星炮半

桑炒

參各等

右入姜

○**神祕湯**

治上氣喘急不得卧者

橘

桔

藕

味

參各等

右

○**分氣紫菀飲**

治脾胃不和氣逆喘

促

味

桑

苓

陳白甘炙

腹炙桔各一

右入紫菀生薑鹽少許

○**五味子湯**

治喘促脉伏而厥者

味

酢

門

杏

橘祛生薑各半

棗三

右

○**林灸法**

肺俞

天突

醫法明鑑卷第一終

