





醫法明鑑卷第四目錄

癸 婦人

月經一 崩漏二 帶下三 附無子

中胎前

惡阻二 胎動三 腹痛四 胎漏五

胎腫六 子煩七 子淋八 轉胞九

子懸十 子癩十一 子嗽十二 傷寒十三

痢泄十四 兒哭十五 胎肥十六 腰痛十七

半產十八 胎死十九 難產二十

胎衣不下二十一

下產後

血暈二 惡露不盡三 兒枕痛四

乍寒乍熱五 蓐六 瀉痢七

浮腫八 腹脹九 乳汁十 附乳癰

見鬼神十一 中風十二 附瘧

語十三 身疼十四 脚氣十五 腰痛十六



崩十 淋閉十 附尿管數 大便秘九
 鼻黑衄血 喘急 咳嗽
 頭痛三 廬汗四 渴五 陰脫六
 王門瘡腫七 斷產八 返魂丹九
 產後不治之三證三十

小兒

拭穢一 臍帶二 臍風三 便不通四
 破泡五 胎驚六 不飲乳七 洗浴八
 誰養九 胎驚十 月裏生赤十一
 生黃十二 視手紋十三 診脈十四
 觀形十五 審外証十六 變蒸十七 吐瀉十八
 腹脹十九 腹痛二十 痞癖二十一 夜啼二十二
 客忤二十三 口瘡二十四 重舌二十五 弄舌二十六
 吃泥二十七 滯頤二十八 語遲二十九 行遲三十
 鶴節三十一 腳拳三十二 手拳三十三 顛陷三十四
 顛墮三十五 解顛三十六 龜胸三十七 龜背三十八

項軟九 丁奚哺露十 脫囊四十一
 脫肛四十二 疝病四十三 盤腸內吊四十四
 齒不生四十五 斷乳四十六 誤吞諸物四十七
 諸熱証四十八
 驚風四十九 附慢脾風 天癆 發搐
 馬脾風 喉風 癰証
 疳証五十 痘疹五十

醫法明鑑卷第四

婦人門

上

月經一

傳婦人百病皆自心生如五志之火一
起則心火亦從而熾若夫經閉不通
之証先且心事不足由是心血虧耗
故乏血以歸肝而出納之用已竭云
又曰因食少肺金失所養而氣滯不
行則無以滋腎陰况月經全藉腎水
施化腎水既乏則經血日以乾涸以
致或先或後淋瀝無時漸而至閉塞
不通甚則為癥瘕血膈勞極之証
又如崩漏不止之証先且心火亢甚
於是血脈泛溢以致肝實而不納血
出納之道遂廢月水錯經妄行無時
泛溢漸而至崩中不息甚則化為
濁白滯血枯發熱勞極之証

溪曰經不通或隨胎多產傷血或
患潮熱錯血或久盜汗耗血或脾
胃不和飲食少進而不生血或痢疾
失血治宜生血補血除熱調胃之劑
或七情傷心心氣停結故血閉而不
行宜調心氣通心經使血生而經自
行

四物湯及婦人衆疾之總司也 飯
芎 白芍 熟地 右等分

經水常不及期而行者血熱也用生
地加連芩香附

○過期而來者瘦人多血少倍取地
加莖其少佐以桃紅肥人大槩是氣
虛挾痰阻升降去地加參莖其苓莎
半陳

○過期而紫黑成塊者熱也多作腹痛

用生地加香附連延乳沒五灵血淡
色者痰多血少也用生地合二陳

○經候將來腹中痛者血實也一日瘀
血鬱滯也用生地加香附桃紅延牡
連木莖

○經候過而腹中痛綿綿無休息屬血
虛倍取地莖氣虛者加參莖其木挾寒
者加于姜

○肥盛婦人或三二箇月一行者痰盛
而軀脂閉塞經脈去地芍合導痰湯
加連香附二木

○經水適來適斷往來寒熱如瘧者合
小紫胡

○調經散 經水或前或後或多或少

或踰月不至或一月兩來皆可服

飯酒洗一門二吳茱湯去閉

乾桂各半湯炮參 白芍 芎
牡各一膠 甘各半右作一服加姜
三片

○月經先期而來者宜服 飯身半
芎 膠 艾葉 甘 芍 知各半
連姜汁白芍各八生地 條芩 香
附各一右

○月經過期而不可行者宜服 飯半
芎 桂各半熟地 白芍 香附
蘇木 莪各一桃二十紅分甘通
分右

○柴胡調經湯 治經水不止其色鮮
紅項筋急腦痛脊強 炙甘 飯身
葛各三 獨 藁 升各半柴七卷
蒼各一紅少許 右煎服取微汗立
止

○升陽舉經湯 治經水不止右尺脉
按之空虛是氣血俱脫太寒之証輕
手數疾舉指弦緊或澁皆陽脫之証
陰火亦亡見熱証於口鼻眼或渴此
皆陰躁陽欲先去也當溫之舉之升
之此法乃升浮血氣補命門之下脫
桂不覆用白芍分二紅分三細分三參 熟地
芎各半獨 黑附炮炙甘各七卷
藁 風各一木 飯 芪 柴各二
分桃分紗 右

○膠艾湯 治勞傷氣血衝任虛損月
水過多淋瀝不止 膠 芎 甘
拌飯 艾各七熟地 白芍各一右
一方加地榆若不止
入棗棗棗

○升陽除濕湯 治月事不調或暴崩
不止多下水漿之物皆回飲食勞倦

或回心氣不足致飯酒獨絡半蔓
死風 甘炙升 藁絡一柴 卷
蒼 莖絡一 右煎空心溫服少時
以早飯壓之可一服而已如炙足太
陰經血滯二七壯亦已此藥乃從權
之法為胃氣下隔而氣迫於下以救
其血之暴崩也住後必服參芪多其
飯之數數服以補之

○當取芍藥湯

治婦人經水漏下不

正其色鮮紅時值炎月先因勞役脾
胃虛弱氣短氣逆自汗身熱柴二
甘炙生地絡三莖不陳法 熟地各
分 蒼 白朮 白芍 飯各半 右

○香附一物丸

治經候不調血氣刺

痛腰脇膨脹頭眩惡心香附
浸一日夜用尾銚為 右為末醋糊
台熟焙乾

丸如梧子大每服五十九淡醋湯下

○艾附丸

治証同前又崩漏帶下並

宜治之 莖一斤 艾四 飯二
右為末醋糊丸林曰 顛墮胎由氣不
升降胎氣不固宜服此

○四製醋附丸

莖一斤 醋酒監水

童便每二一分各浸 右為末醋糊丸
如桐子大每服七十九空心酒下瘦
人加澤蘭赤苓各三

○溫經湯

治血海虛寒月水不調

飯 芍 芎 牡 桂 我各半 參
膝絡二 莖一 石

○加味烏沉湯

治經水欲來臍腹痛

痛 莖二兩 烏 宿 延各
兩甘一 兩半 右加姜

○一方

飯一 醋 延 紅 沒各等

右為末每服二小空心下

○桂枝桃仁湯 治月候前腹痛不可忍 枝芍生地桃各等右每服七錢姜棗煎服

○八物湯 治經事欲行腹痛血澁也四物湯加木枳延練子

○逍遙散 治血虛煩熱日水不調臍腹脹痛痰嗽潮熱 飯炒 白苓

白芍 朮 柴各一甘炙半右每服八錢生姜片薄荷許煎服更加知地骨心炒或加芩湯加枳心煩加門鈴角嗽加烏梅款五味

○牛膝散 治婦人室女血閉不通五心煩熱 紅五膝 飯尾各一桃 五不 右為末每服二錢溫酒調下

○萬病丸 治月經瘀閉繞臍痛

乾漆碎炒一時 膝下酒浸 右為末用生地黄汁入二味末銀石器內慢火熬丸如桐子大每服三九空心酒下

○滋血湯 治血熱氣虛經修澀滯不通肢體麻木生瘡 鞭 荆 牡 赤芍 枳 桂 飯 芍 絡 二 烏梅

一箇右分二煎煎服至半月或一月經行病除

○通經丸 治婦人室女月經不通或

成血痕疼痛 桂 青 大 薑 椒 莖 姜 川烏炮去 乾漆炒 飯 桃去皮 右等分為末將四分之一以米醋熬為膏和餘藥末杵丸如梧子大每服二十九空心淡醋湯下漸加至三四十丸溫酒亦可

性畏漆者入雞子清和藥

○柴胡丁香湯 治婦人年三十歲左

右臨經先腰膈痛 生地鈺 丁香
細飯身 風 羌活 柴二分 蝎一
右

○烏藥湯 治婦人血海疼痛 飯一

甘 木各五烏半 芩 莎仁 右

○增味四物湯 治婦人血積血瘦

飯 芎 白芍 熟地 稜 乾漆
炮 薑 桂 莖 右等分

○琥珀丸 治婦人血瘦小腹腰背相

引而痛 瑰 白芍 川烏 度去
膠 酒 鱉 醋 我 煨 朴 製 飯 酒 浸 各
木 桂 澤 蘭 葉 麝 各 半 右 爲 末
酒 糊 九 如 桐 子 大 每 服 七 十 丸 空 心
溫 酒 米 湯 下

○無極散 治經血

不通崩漏腸風帶下血風五淋產後
積血

錦文大黃一升 淨分四處

四兩 用紅花四兩入水取汁浸
大黃一日不用紅花晒乾
四兩 用童便入鹽二升浸大黃
一日取出晒乾不用使
四兩 用田飯四兩入淡醋內
浸一日不用當飯晒乾
四兩 用好酒浸一日令軟切如香核
大晒乾巴豆二十五粒去皮同
炒豆黃色不用豆

右四分同爲一處入南木香一百草

霜 五爲末每服三錢好酒空心調下
又煉蜜丸如桐子大每服三四十九
空心溫酒下即四順故也凡修合用
大突擇一日

○傳 經不通馬鞭草煎汁熬膏爲丸或燒
存性爲丸飯紅煎湯下

祖傳桃奴飲子 治婦人室女月經

不通漸成脹滿 桃奴 桃樹上嫩

落者 朧月 假鼠糞 西頭尖者是

桂 莎 灵脂 祀 柴 宿 堯 去皮 尖別

研石等分細末每服二三錢空心温酒

調下

○治月經不通鼠糞丁合略炒研細温酒調下立效

崩漏

○心崩中者由藏府傷損衝任二脈血氣

俱虛二脈為經脈之海若勞動過極

藏府俱傷衝任之氣虛不能約制其

經血故忽然而下謂之崩中崩下治

宜大補氣血之藥舉養脾胃微加鎮

心藥

○傳 涼血地黄湯 血崩是腎水陰虛不

能鎮守胞絡相火故血走而崩也此

湯主之 芩 荆穗 蔓 各一 分半 百

知 蘗 細 芎 芎 芎 二 連 卷 柴

升 風 路 三 生 地 飯 絡 半 甘 紅

紗石

○丁香膠艾湯 治崩漏不止蓋心氣

不足勞役及飲食不節所得覺崩下

如冰冷白帶及白滑之物間有如屋

漏水 熟地 白芍 芎 三 芎

丁香 香 路 四 膠 欬 分 生 艾 葉 各 飯 二 分

右 芎 地 丁 香 別 為 細 末 飯 芍 艾 各 細

切 連 煎 共 六 味 入 水 五 大 盞 煎 至 三

盞 半 去 粗 入 膠 每 煎 空 心 熱 服

○治血崩不止蒼耳草燒存性好酒調

服立止或入四物湯中亦可

○老婦崩血久不止諸藥不效 橡子

蒼耳根二物燒存性用四物湯加芷
第花于姜煎湯調服效

林 **加味四物湯** 治血崩 芎 飯洗酒

生地 白芍 膠蛤粉 艾葉絡
右一古用熟地加姜

○**下方** 治崩中不止 棕櫚 絲瓜

各燒存性 右為末每服二錢壺酒或
盞湯食煎調下

又塩梅燒存性為末空心米飲下

○**五倍子散** 治血崩帶下 艾葉兩

醋煮五倍二兩赤色烏梅五枚 芎五
右為末米湯下

○**伏龍肝散** 治氣血勞傷衝任脉虛

經血崩下或如豆汁或五色相雜臍
腹冷痛久不止虛煩驚悸 伏龍
赤石兩各一 熟地酒浸 艾葉微炒

甘炙桂各五 飯炒 姜炮 各七 芎三兩
門一兩 右每服七錢棗二枚去核
煎服

○**當歸地黃丸** 治產後所下過多及

崩中傷損虛弱少氣 芷 續
姜 飯 膠各三 附兩 地兩 右

為末煉蜜丸如桐子大每服四五十
元空心溫酒下

○**百芷湯** 以白芷煎湯調百草霜其

者棕灰 後四物加干姜調理回寒
用乾姜因熟用冬因安參芪

三 帶下附無

林 ○帶下風氣寒熱所傷入胞門或中經
脈流轉藏府而發

○傳 帶下是濕熱白屬氣赤屬血二陳加
蒼木為主氣虛入參木血虛入芎飯

○帶下是胃中痰積流下滲入膀胱當升之二陳加一木升柴仍用瓦礫子以燥其濕痰

○肥人帶下多是濕痰

○瘦人少有此病有者是熱

○當歸附子湯 治赤白帶下臍下冷

痛 飯細炒鹽分蝎梢 升各五升

後六柴附地一栢引詩為姜炮良

栢八右煎服或酒煮糊丸亦可

○延胡苦練湯 治臍下痛陰冷大寒

白帶下 栢分延 練子各一附地

桂栢三炙甘栢熟地各一右

○桂附湯 治白帶腥臭多悲不樂大

寒証 栢為引 知栢五桂栢附地三

右

如少食常飽腹中滿悶加白芍半

不思飲食加五味二升如煩惱面上如虫行乃胃中元氣極虛加芪一升參壯炙升各半

○益母丸 治赤白帶惡露時下不止

又治久無子常服驗 益母草五月

椽陰乾為末煉蜜丸如彈子大每服

一丸用熟酒加童便化下滋氣者木

香湯化下

○苦練丸 治赤白帶下最妙 練酒碎

長茴炒飯栢等為末酒糊丸如梧子

丸每服五十丸空心温酒送下

○芍藥湯 治赤白帶下臍腹痛神効

白芍二兩干姜一兩石為末微炒黃色每

服一錢空心臨臥米飲下半月效

○香灸丸 治久冷赤白帶下腹痛面

色痿黃四肢無力久無子息

冬 艾葉各八分 飯各四 吳茱三
兩等 白芍略二 右用醋五升 砂鍋
煮乾為末 醋糊丸如梧子大 每服五
十九 空心醋湯下 日二服

○當飲丸

治帶下不止 腹痛四肢煩
不食 羸瘦 飯圓 赤芍 白芍 芍
粉 熟地 膠蛤粉 續酒浸 各地榆
五 右為末 醋糊丸如梧子大 每服
五十九 空心米湯下

○如聖丹

治赤白帶下 月經不來
枯瓦 蛇床 右等分為末 醋糊丸
如彈子大 乾臙脂為衣 內陰中熱極
再換

○婦寶散毒丸

治赤白帶下 子宮虛
冷 四物湯加芷胡黃柴 煨各 荳
煎乾 煨了 右為末 醋糊丸如

桐子大 每服五十九 空心醋湯下

○琥珀丸

治婦人血風虛勞 上熱下
冷 月水不調 肌肉黃瘦 腹痛或有氣
塊 攻中 瑰 飯 木 甘 風

煨各四 稜 炮 姜 炮 桂 各 五 木 柴
參 絡 二 青 吳 茱 炒 蝎 炒 附 炮 芷

草 薏 根 赤 芍 柏 葉 各 三 桃 去 皮 板
醋 煎 醋 炙 各 天 行 石 為 末 煉 蜜 丸

如 桐 子 大 每 服 二 十 九 空 心 酒 下 干
煎 至 晚 更 進 一 服 如 覺 熱 晚 不 須 服
如 腹 內 積 塊 攻 藥 驚 桃 核

稜 各 加 一 倍

○加味四七湯

治婦人小便不順 甚
者 陰 疝 瘰 癧 半 劑 朴 赤 苓 各 五
菴 仁 甘 仁 荳 豉 各 右 分 四 貼 姜
五 片 煎 去 粗 加 琥 珀 末 一 錢 調 服

烏金散

治婦人久無子息及類墮胎皆因衝任之脈宿挾疾經水不調暴下月內無行或崩漏帶下臍下冷痛烏梅 干姜 敗棕二味並燒存性 各二 石為末烏梅湯調下

洗心丸

治衝任虛寒胎孕不成或損墮 澤蘭葉 木略半桂 姜各 兩熟地 飯二酒浸各等 鮮酒洗白芍 牡 延略一 右為末醋煮麩糊丸如桐子大每服五十丸空心酒下

秦桂丸

治婦人無子 丸 桂 仲妙風 朴各半附炮 白芍各一兩膝 白薇 半 生乾姜 泚參各五參 兩細二兩右為末煉蜜丸如桐子大每服五十丸空心醋湯長米飲亦可未效加丸數已覺有娠便不可服

婦人科中 胎前一

傳婦人無子者多由血少俗醫悉謂子宮虛冷以辛熱之藥煎熬臟腑血氣沸騰禍不旋踵

○瘦怯婦人子宮乾澁宜滋陰養血四物加芩苓之類

○體盛者乃軀脂滿溢閉塞子宮宜行濕燥痰 星 半 芍 滑 風

○隨胎乃血氣虛損不能榮養胎元而自隨其一婦有胎即隨其脈左入無

力重取則瀦乃血少也白朮濃煎湯調黃芩末一錢服末至三四兩得保全而生

固胎飲

熟地 飯 參 白芍 朮 芍 陳 甘 桑寄生 必加

連栢入糯米五七十粒煎服○血虛不安者加膠珠○胎氣痛者如宿

○安胎散

胎氣不安或腹微痛或腰

疼或飲食不表宜服或至五六箇月常服數貼甚好 木 飯 白芍 熟地絡一參 芎 陳 條苓各半 甘 縮 蕪絡三 右作一服加生 姜三片

○安胎丸

木 條苓 麴炒右等

分爲末粥丸每服五十丸清米湯下 條苓木乃安胎之聖藥俗以苓爲寒而不用殊不知胎孕宜清熱養血必用細棧沉實者縮砂安胎以其壅行氣但縮砂非八九箇月內不宜多用 ○懷妊嗜醋物乃肝藏正能養胎而 顯也

○傳

一惡阻乃有孕而惡心阻其飲食者是也多從痰治用一陳之類又以木 丸服一日肥人痰瘦人熱

○半夏茯苓湯

治惡阻不食吐逆頭

眩息隨煩或惡寒自汗 半湯泡上 心黃汁拌 生姜各一 苓炒 熟地 陳 桔 參 旋覆花無嗽 芍 甘 芎 各半 右一方有蕪 細各半

○參橘散

治妊娠二三月內惡阻吐逆

不食或心虛煩悶 橘紅 苓 各 參 門 木 朴 甘 糝 絡 右作一服 加生薑二片竹茹一錢或加參一錢

○林 加味二陳湯

治受胎二三月嘔

吐擇食 胃中院宿 有痰飲 陳 白 苓 絡 四 各 半 洗 三 木 分 半 四 甘 芎 一 右分二貼加姜五片烏梅一箇有妊

雖心半夏然即用姜製其毒服之利
痰逐飲必見功效

○傳一胎動者因火逼動胎逆上作喘急
用修合香附之類

○小腹艾湯 治妊婦因煩仆胎動不
安或胎搶上逼心或腹痛下血 膠
珠一兩 艾葉二兩

○膠艾湯 不問日數安胎 熟地
艾 飯 甘草 芎 膠 各半 芪二分
右

○治胎動冲心煩悶欲死安胎止痛
飯洗 芎 參 膠 炒 甘草 各
升切一右

○因作跌損傷胎氣不安或子死腹中
芎 為末每服一七連進二服死胎
即下

○如聖散 治妊婦腹痛胎動不安或
血下 鯉魚皮 飯 熟地 膠珠
白芍 芎 續 酒 甘草 各
錢姜三片 芎 麻根 伴煎服 一方有子
姜竹茹無續斷

○杜仲丸 妊娠三月胎動不安若下
血腹痛蓋由子宮久虛致令胎墜
服此以養胎 仲 去皮 姜 炒
各一 右為末煮棗肉丸如梧子大每
服三五丸空心米飲下

○一方 芩 木 飯身 宿 炒 絡
右煎服

○加減安胎飲 治胎動不安腹痛漏
下或胎上刺心短氣妊婦氣血弱者
宜服此免有損墜之患 參 芪
芍 芎 熟地 續 側柏 膠 蛤

妙芽炙飯 右等分每貼七錢姜三片漏下不止加艾葉

○林一胎動腹痛皆因飲食冷熱或因交合傷犯其候多嘔氣不調和變成漏胎則難安矣

○**當取芍藥散** 治妊娠腹痛疔痛心

下急滿 飯 苓 木各一芍 澤絡二白芍細右煎服為末酒調亦所如胎動口噤唇青下痢加熾安胎飲加熟艾酒煎

○**火龍散** 治妊娠心氣痛 艾五 益各

妙尚炒練肉五 右煎服

○**通氣散** 治妊娠腰痛不可忍 補

骨瓦 右為末嚼胡桃仁一箇空心溫酒調下一錢

○傳**當取地黃湯** 治胎痛 飯一 熟地

仁 右

○傳 妊婦偶有所傷腰痛不安或從高墜下胎痛及下血者宿砂和皮略炒勿令十分焦黑去皮為末熟酒調服或米飲或艾湯塩湯皆可如覺胎中熱其胎即安此方即驗凡常服安胎易產

○傳 妊娠二三月忽心腹疔痛不安用飯仁膠妙 耳各 葱四 右

○傳 妊娠四五箇月忽心腹疔痛 大棗十 枚四 塩五 令赤 燒 右為末丁撮許酒調服立愈

○傳 治妊娠心腹大痛氣欲絕 芎 飯

苓 朴各 一右

○傳 胎漏謂有胎而血漏下也屬氣虛有熱四物加膠木條苓宿妙 香附妙 糯

米煎服

○治胎漏下血 木一條 芩五縮 膠三珠 右為末 每服二錢 煎艾湯調服 水煎亦可

○又方 枳殼 芩各半 木一兩 水煎食前 温服

○治姙娠下血不止 胎上冲心 四肢厥冷 悶化欲死 炒膠 艾各一茹 如奉 白砂蜜合 右用水一升 煎至一升 入蜜更煎一二沸 分二服

○治姙娠下血 如月信來 若胞乾非特 損子亦能損母 熟地 姜炮各一兩 右為末 每服二錢 一日夜三四服

○加味四物湯 治姙娠下血不止 赤 左加艾葉片三十 膠珠 烏梅肉 許水 煎熱服

○桑寄生散 治姙娠下血不止 胎動不安 桑寄 飯酒續 芎 苈 膠 神 木各一參 苈各半 右并一服 加生姜二片

○林 芎根湯 治胎無故下血 腹痛或下 黃汁如漆 或如豆汁 野苧根 四兩 金紐銀紐 右分二煎 酒水各一盞 煎服

○黃芩湯 治胎漏不安 芩 木 飯酒縮 各半 煎服

○治胎動漏血 產門痛 黃連為末 每服一錢 温酒空心下

○急救方 治漏胎下血不止 胎乾子 母俱死 生地黃汁 升酒 伍煎分三 服如無生者 用乾者為末 酒調二三 錢 食前服

○保氣散 治頭化傷胎漏血安胎寬

氣進食瘦胎 腹 甘 蕪 縮
枳 炒 桔 莎 炒 右 等 分 煎 服

一胎腫謂有胎或手足或頭面通身浮腫者是也屬濕多或用梔子一合炒為末米湯調下凡服亦可也

○治妊娠腰脚腫痛 白苓 木

姜 甘 炙 各 杏 二 不 去 右 水 煎

○木通散 治妊娠身躄浮腫四肢張

急小便不利謂之子腫 通 薤

桑 蕪 一 莖 葉 各 枳 炒 枳 條 各 半

木 訶 子 皮 各 三 右 作 一 服 加 生 姜

三片

○全生白朮散 治妊娠面目腫浮肢

躄腫脹 木 兩 生 姜 皮 腹 陳

苓 兩 右 為 末 每 服 一 錢 米 飲 調 下

一方用苓皮 桑皮無末

○鯉魚湯 治妊娠脹滿或通身浮腫

小便不利 散 白 芍 各 一 白 苓 一

半 木 二 橘 紅 半 鯉 魚 一 尾 不 右 作 一

服 將 鯉 魚 去 鱗 腸 白 水 煮 熟 去 魚 用

汁 一 盞 半 生 姜 七 片 煎 至 一 盞 空 心

服 如 木 末 盡 再 合 一 劑 服 之

○澤瀉散 治妊娠氣壅身躄腹脇浮

腫喘急小便澀謂之子滿 沢 桑

枳 枳 通 赤 苓 各 等 右 每 服 四

錢 加 姜 煎

○防已湯 治妊娠脾胃虛通身浮腫

心腹脹滿喘促尿不利 已 二 枳 桑

赤 苓 蘇 各 二 木 九 右 分 一 煎 加

姜 三 片

○妊娠止兩脚浮腫名曰皺脚通身腫

滿心胸氣脹名曰胎水鯉魚湯皆治之

○平胃散 治酸脚，加姜黃蘗葉煎服。

○赤小豆湯 治羊脚腫，小豆商陸各分煎服，忌食鹽。

○八正散 治姪娠心氣壅手足浮，車瞿蓄滑甘柅通。

大麩果煨入茵一撮，子煩謂姪娠苦煩悶不安，門苓。

風 知各一，右水煎入竹瀝二匙服，下方去知。

○犀角散 治下煩，犀地骨條，苓門赤苓各一，其伴右水煎。

入竹瀝一合，溫服。○當取飲 治子煩，飯半，木苧膠。

○麥門冬湯 治子煩，門風白，桑寄各七，葱七，右。

○知母飲 治姪婦心脾壅熱，口乾渴，苦煩悶，赤苓，苓，莖各二，知。

門 其後各一分，桑伴，右入竹瀝，一方去莖，知，加地骨犀葛各一。

○飯涼節命散 治姪娠面赤，口苦舌乾，心煩腹脹，或一便閉澀，皆因醉酒。

或食生菓雞魚煎燻熱毒物所致，苧，苧根，芍，門，飯，末各二。

○林 糲五，苧半，右煎服。

一子淋，姪娠酒色過度，或飲食積熱，致水道閉澀，名曰子淋。

○安榮散 門，通草，滑絡，一飯，燈心，苧，灸細洗參，絡五，右為末。

每服二三錢麥門冬煎湯調空心服

○**栝樹散**

治妊娠淋瀝小便不通作轉

膠治不効此方屢効栝樹赤芍分等

右煎服一應男女血淋水道澀痛皆

効

○**地膚子湯**

治子淋小便澀數

膚車絡一知炒芍赤芍白芍

枳各七升甘通草各三右

○**又方**

地膚草分四以水四升煮取

二升分三服或新取地膚草極自然

汁服亦可不獨治子淋凡淋閉皆効

○**反葵子散**

治子淋小腹疼胎動不

安葵炒柴桑赤芍赤芍

各分等每服四錢入葱白七寸

○**車前散**

治子淋或尿不通下焦有

熱枳通陳祛赤芍車赤

芍各服滑石薑各去右等分煎

服

○**桑螵蛸散**

治妊娠小便不聚螵蛸

桑為末每服二錢空心用米飲下

○**白薇散**

治妊娠遺尿不知出白

薇白芍各為末每服二錢食乳

酒調服

○**天腹皮散**

治妊娠大小便赤澀

枳炒腹各芍各赤芍各右為

末每服三錢葱白湯下

一傳

轉胞之證古方皆用滑利鮮有藥冊

溪曰胞不自轉為胎所壓轉在一邊

胞系了戾不通等四物加參木陳

半其加姜煎服子懸胎氣不和凌上心腹脹滿痛疼

謂之子懸

○紫蘇散 芎 腹 白芍 陳 蘇
取酒浸各參 其絡釘右分一匙姜
五片葱一棖

○保安散 治胎動心悶唇青口乾上
衝下築手足厥冷 取 參 酌 半
甘仁 右水煎入膠珠一兩葱白一
握每煎溫服

○一方 治妊娠身痛或衝心欲死不
能食 木 晒 芍 兩 芍 兩 右水煎

林子癰妊娠中風頸項強直筋脈變急
言語蹇澀痰涎壅盛或發搐不省人
事名曰子癰

○羚羊角散 治妊娠中風子癰 羚
銜 獨 酸 炒 五 加 各 半 薏 風
取酒 芎 神 杏 各 分 木 香
其絡半 右分一匙入姜二片

○獨活防風湯 治妊娠角弓反張口
噤謂之風痲又曰子癰 麻 祛 風
獨 各 分 桂 羚 銜 升 甘 炙 酸
棗 炒 芎 八 芍 取 杏 絡 六 石
每服七錢姜四片竹瀝一合煎

○防風葛根湯 治妊娠中風腰背強
直時反張 風 葛 芎 生 地 各
各 杏 麻 去 節 各 桂 獨 已 芎
後 徐 右

○葛根湯 治妊娠臨月發風痲暈悶
不省人事吐逆醒後發謂之子癰
貝 葛 牡 已 風 取 芎
桂 苓 澤 絡 半 芎 絡 半 獨 膏
參 絡 一 右煎服貝母令人易產未臨
月者升麻代之

○防已湯 治妊娠中風口噤四肢痺

直角弓反張 已狂 羌 半

石為末別用黑豆一合炒黑投好酒中流定去豆調藥末蘆之穉醒再灌一傳子嗽妊娠感風寒咳嗽不已謂之子嗽

○**天門冬飲** 天門 芫茸 知法洗

桑 蜜炙各 五味 桔各半 右水煎嗽血者加膠律 大便澀加苦亭瀝各半

○**百合散** 治妊娠咳嗽心煩不飲飲

食 百合 芫茸 麥門 桔 桑 各一 其律 右水煎入蜜半匙 再煎一二沸去粗服

婦治妊娠咳嗽不止胎動不安 杏

其 桑絡一朶 天門略一 桔分 茄一 右水煎入蜜服

○**林百合散** 治風壅咳嗽痰多心胸滿

悶 百合 蒸乾 貝 白芍 煎

赤苓 桔妙各 其後 右入姜

○**下方** 麥門 花絡 桑炙杏 去皮

其炙絡桔妙三 茹塊 石

一傷寒

○**蘊散** 治妊娠感風寒壯熱頭目

眩暈 蘊 芎 白芍 木 門

陳 葛各 其 右入姜 蘊 葱

○**升麻六物湯** 治妊六七月傷寒

壯熱或發赤斑變異瀉血 升 桂

杏 大青草 少草 其絡一石加

葱

○**妊娠傷寒百節痛壯熱不急治落胎**

柴 葛 知 膏絡六太青 升各

分 梔 斷 葱 莖 右水煎

○**傷寒安胎** 木 芍 等分 右每

服三錢加姜三片水煎

○治胎傷寒 柴行前 飯後七分

芍 生地各六分 右作一服加生

姜三片葱白三莖

○治胎傷寒憎寒發熱 葱對生薑

二石煎連服取汗愈

○林夏胎散 治胎傷寒太熱悶亂燥渴

恐傷胎 蛤粉五分 嫩捲荷葉 焙乾

右為末每服二錢蜜少許水調服

方穩家園生葛汁服

○胎寒寒熱 小柴胡去半夏最效

○謹熱病誰胎方 乾浮萍 朴硝研大

炒蛤粉炒藍根右等分為末水調三

錢貼臍上安胎解煩極效

一方伏龍肝末水調塗臍下乾則換

用井中泥塗心下又可

一赤白痢并泄瀉

○傳當散芍藥湯 治胎下痢赤白腹

痛 白芍仁飯 白苓 沢 木

條芍各半 連 木 煨各三

石如白痢腹痛甚者恐有寒去芍連

加乾姜二分

○傳香連丸 治並同前 膠珠

末 縮炒芍 各五分 乳 木 各二分

煨炮各連 黃同炒 右為末醋糊丸

如梧子大每服二十九白湯下

○治胎泄瀉兩脇虛鳴臍下冷痛虫

食至冷及當風取涼 訶子煨末各

分陳 良炒木 白芍炮炙各半

菴 菴 煨 石加生薑五片

一傳 兒在腹中叫哭臍帶上疙瘩及兒口

中念者曰胎婦登高取物脫兒口以

此作聲令婦曲腰向地拾物使
復得食入口中即止用多年空屋下
鼠穴中土一塊令婦含之即止

○又方用黃連二三錢濃煎汁時時下
自止

林胎肥身居_貴口_壓其_已聚樂不常
食物無度即飽便卧致令胞胎肥厚
根蒂堅牢行動氣急蓋緣不曾預服
瘦胎之藥致於臨產必難產八月可
服無憂散

○無憂散 取酒 芍 木 甘

炙各半 枳 炒乳 是研各 血餘 下 髮灰
積 猪心 右為末每服三錢水煎服

○滑胎易產救生散 安胎益氣易產

冷子緊小冷母無病 參 詞 煨
木炒麥芽炒麴炒陳炒等 右為

每服一錢煎服

○枳殼散 瘦胎易產抑氣 枳 殼 炒

粉草 炙二 右為末沸湯調食前服
孕七月便宜服太便閉澀加防風蘇
弱加飯本

○軟勝方 甘 炙 生 姜 烏 梅 等 每 服

五錢水煎食前服便令腰膝軟弱為
生養

○丹溪東胎丸 七八箇月內服之

芩 炒 夏 一 兩 秋 七 末 二 芩 半 陳
三兩不見 右為末粥丸如梧子大每
服三四十九丸白湯下

○丹溪達生散 孕八九個月內服

數貼易產腹痛 腹 原 本 二 不 恐
烏豆 洗 洗 乾 再 用 參 陳 蘆 連
葉 各 白 芍 木 飯 絡 一 苒 後 二

石作一服外人黃楊腦七箇食少胎瘦者不
願葱五莖夏加芩連五味春加芎風
秋加沢冬加縮氣上逼心加菴地性
急加柴多怒加芩食少加縮麴湯加
門芩能食加黃楊腦此物能變有痰
加半芩

○丹溪臨月用以養胎方 既 芎

芩 陳 米 莎 各一 芷 得 其 分 右
水煎調益元散一錢服虛者加參此

○仲景當歸散 安胎養血清熱孕婦

時常宜服 既 芎 芍 木 條

芩 右等分為末每服一錢溫酒或
湯調下

○局方枳殼散 妊娠八九箇月內胎

氣壅滿當宜服之滑胎易產 枳殼
五錢炙一兩 莎 一兩 右為末每服二錢

空心沸湯點服

丁方加糯米炒如妊婦弱者置衣
胎寒腹痛者胎弱多驚者加飯而木

兩半

一婦腰痛腎主腰自勞損其經虛風冷衆

乏則腰痛甚則胎墮 既 三 草 一

右水煎入膠珠二葱白一煎

○丁方 大黑豆二合 以酒煮熟去

豆空心頓服

○傳 妊娠腰痛如折不能轉側 鹿角

右火燒令赤酒淬再燒再淬以礞石

度細末酒調服

○通氣散 治妊娠腰痛不可忍 補

骨炒為末麝胡桃仁一箇空心溫酒

調下一錢

○青娥不老丸 治腎氣虛弱風冷乘

之腰痛，胡桃仁去皮二枚，破胡酒浸炒八兩，仲去皮，薑汁，右為末，蒜膏丸如梧子大，每服五十丸，空心醋湯下。

林 半產臍腑虛弱，或氣血衰敗，或先因婚嫁失時，或醉酒飽食，觸熱冒寒，疲極勞傷，月數未用，使墮胎。

○**芎藭補中湯** 養新血去瘀血，黃蘗，扶危，姜炮膠，粉，芍，五味，各二分，芪，蜜水，飯，酒，木，赤芍，各一分，木，參，仲，各去，甘，各六分，右。

○**養命丸** 治小產下血，子死，憎寒，手指唇口爪甲青黑，面色黃黑，或胎上搶心，悶欲死，冷汗出，或食毒物，傷動胎氣，下血不已，胎未損，服之可安，已死，服之可下，牡，白芍，桂，桃。

炒去皮，赤芍，各等分，右為末，煉蜜丸如彈子大，每服一丸，細嚼，醋湯下，連進兩服，不効，加三九。

○**安榮湯** 治胎氣不固，時常小產，頭服此，固胎元，四物加膠，珠，莎，木，宿條，芩，糯米，桑，寄。

○治小產後心腹疼痛，飯，芍，熟地，白芍，酒炒，各，延，杜，桃，紅，各三，莎，青，熟，澤，闌，牡，各半，右水一盞，半童便，酒各半盞，煎至一盞，溫服。

○治小產後下血不止，參，芪，飯，木，白芍，芍，艾葉，甘，各膠，青，莎，宿，右等分煎服。

○**安胎散** 治胎寒腹痛，胎熱多，散，腰痛，腹痛，滿，胞，急，卒，有所下，或因頓仆，或。

食毒物或感冒時疾致胎傷

枳各半一熟地三 糯米一右作一服
生姜三片大棗一枚更加金銀三五

錢同煎

○林孕而服毒藥攻胎牙關緊急強直自汗身微熱與中風相似宜服白扁豆一味生為末新汲水調灌之清米飲亦同

○林胎死母因患熱病府藏極熱薰蒸其胎是以致死緣兒死身冷不能自出醫家以黑神散治之恐本方內有姜附桂之大熱豈宜熱病之人宜以草麻子 朴硝散 濟陰丹 佛手散之劑主對

○下死胎草麻子搗碎敷脚心即下如子腸隨下急去脚心却敷頂心即收

○朴硝散 下死胎取胎衣朴硝末每

服一二三錢溫重便調服

○一方雄鼠屎七枚水三升為一升去粗取清作粥食之即下

○婦擒胎不特病黨所致或口頰作或因驚恐或出入目觸壞胎最多其候舌青知子死

○一方治熱病胎死是即黑神散也

桂 飯 白芍 甘 生地 姜各
小黑豆炒去皮附炮去膽 右為末空
心酒調下一方無附子有蒲黃

○一方下熱病胎死紅一味酒水煎飲一二三盞

○傳 催生散 治熱病胎死身冷唇青不

能自出 蒼朮 桔半搗紅分芷
桂 甘分各 下 飯酒姜炮 朴 芍

半 芍 枳 炒 各 二 木 杏 炒 各

右作一服姜三片棗一枚

○香桂散 下死胎 麝研半不桂

三不 右為一服溫酒調下

○可飯湯 一名佛手散 治妊娠因事跌仆子

死腹中惡露盡下疼痛不止口噤欲

絕用此藥探之若子死腹中立便下

若腹痛隨止子母俱安又治臨產難

生胞衣未下及產後血暈一切胎前

產後危急並皆治之 飯酒洗下不

右作四服用水一盞煎水將乾投酒

一盞半煎五七沸溫服如口噤灌之

如人行五里許至無灌盡四服省

○治橫逆不順子死腹中伏龍肝為末

溫酒調下下錢其兒頭戴土而出

甚驗

○治產難數日子死腹中不出母氣欲

絕 瞿大 通草 三桂 三膝 四榆 白

下五無榆白有天花粉四兩能隨胎

右水九升煎取三升去粗分三服頓

飲即下

○治子死腹中不出用黃犢牛屎陰母

腹上立出

一二云牛屎炒令大熟入醋半盞以青

布包於母臍上正慰之立下

傳 難產多是氣血虛亦有氣血凝滯而

不能轉運者亦有回八九箇月內不

能謹察者

○又曰臨事驚惶用力失宜遂有難產

危

○催生散 白芷 炒 百草霜 白滑石

各等為未訖飯湯調下二三錢

○林神應散

治難產及橫逆皆回坐草

太早努力過多兒轉未逮或以破水
先下其血必乾若先露手謂之橫或
先露足謂之逆此藥無固其血服之
如魚得水 白芷 百草霜 右

等分為末童便米醋各半蓋調藥二
三錢沸湯泡濕服分二次服服畢又
用蜀葵子四十九粒滑石末三錢順
流水煎湯調服如人行五里即生

○加味芎飯湯

治產難三五日垂死

芎 飯各一乾龜殼一箇婦人髮握
燒存 右為末每服三錢水一盞煎七
分服約行五里生胎死胎皆可下

○催生鈔丹

治橫生逆產 黑鈔一

右以小銚子火上鑊化投入水銀二

錢急攪結成砂子傾出用熟絹紙作
瓦子如菜豆大臨產以香水送下立
產

○如神丹

治難產 巴三草麻 七枚
各去

羌 研入麝少許攪作餅子貼臍須臾
子母便分張

○無憂散

治難產及胞衣不下臨月

煎服之則子易生 飯酒芎 白芍
各七 木 苁路五 枳殼 乳絡 一血餘
灰 廂右為末分作二服水一盞煎八
分去粗服

○來甦散

治孕婦欲產未產之時忽

然暈悶不省人事 木 麴炒陳 祛
莖 麥芽炒生薑 炒黑膠 炒成 白芍
絡半木 苁路五 枳殼 乳絡 一血餘
灰 廂右為末分作二服水一盞煎八

分去相溫服

○麥蘗散

治孕婦欲產未產之時忽

然暈悶不省人事 木 麴妙陳法

生 麥芽 妙生薑 妙碎膠 妙成白芍

各半 糯餅半根 分三右作一服水

一盞半煎至一盞去相灌下末醒無

服

○灸法

治難產及胞衣不下急於產

母右脚小指尖頭上灸二壯炷如小

麥大立產

又灸至陰二穴在足小指外側去爪

甲如韭葉灸二壯又灸太衝二穴在

足大指本節後二寸骨鍾間灸二壯

肝經命也

婦

胞漿先破下多胎乾先與四物湯養

血氣次濃煎慈心湯放冷洗產戶令氣

上下通暢仍留右末蜜調塗產戶重

次服催生藥乳香末蜜丸溫湯下佳

傳

若手足先露者用細鐵刺兒手足心

一二分深三四刺之以隔陰其上輕

令送入兒得痛驚轉一縮即順生

○

或見脚先下急以鹽塗見脚底又可

急撥之併以蠶摩母腹上則正生

林

令易產以春梓頭細糠燒末服方寸

七

○

又龜甲燒末酒服方寸七

○

又方用鱉甲

○

又於羊角一枚剝火為末酒調服方

寸七

又大麻根三莖水一升煎半升頓服

立產產衣不下亦可

○

治難產珍珠末一兩和酒服之立生

又赤小豆生吞七枚即生

○治橫倒梁上塵酒服方寸匕

○治橫產鐵杆鐵藥者是也若無用斧或銅錐亦可

右燒令赤投酒中飲之自然順生

○治難產及胞衣不下人病一升用姜葱各一分煎三兩沸乘熱飲便下

○治倒產子死腹中艾葉半升酒四升煮取一升服

○難產惡露身重熱在寒面黑舌青及舌上冷子母俱死面赤舌青母活子死面青舌赤口沫出者母死子活唇白俱青口沫子母俱死婦曰舌下脈青黑而反卷冰冷者子母俱死

婦胎衣不下母生子訖流血入衣中為血脹或不下但服奪命丹逐衣中血血散脹消衣即下

○奪命丹 附炮半 牡蛎于漆二下各半此相毒

右為末釀醋一升熬太黃末一兩成膏煎藥丸如桐子大每服五七丸溫酒吞下衣爛下林倉至無此藥宜朴硝散方見胎死部

○一方紅花一兩酒煮濃汁服之

一方皂角棘燒末每服一錢溫酒調

傳

○治胞衣不下 膝仁飯一通三滑

細葵子三右水煎連進三四服立

下

○林

○如聖膏 治胎衣不下又下死胎

草麻一雄仁研成膏塗母右足心

纔下即洗去

○治胞衣不出婦人槐覆井口立下本

婦人者佳

○又燒鐵并金赤投酒飲之，又牛膝兩葵子兩水九升煎取三升分三服。

○**丁方** 治血道閉澁胎衣不下黑豆一合炒熟入醋一盞煎三五沸去粗分三次服仍取鞋底灸熱慰小腹上七三五次。

○**丁方** 米 麥 赤小豆同煮濃汁服立出。

○治產後惡血冲心胎衣不下腹中血塊 錦文大黃為末米醋熬成膏凡如彈子大每服一丸湯化開服温童便調更好。

○丁方酸米醋升沙鍋內慢火熬至一升入百草霜末一兩太黃末一兩熬成膏凡如彈子大每服一丸温童便化開服。

治胎衣不下惡露不行腹中血塊

神在可代黑神效用大効

○**三退飲** 治胞衣不下 蛇退 丁條

蚕退紙左蟬退九耐 右葶箠盛燒

存性細研順流水調服立下。

婦人科下

產後

○傳 丹溪曰產前當清熱養血為主產後宜大補氣血為要雖有雜証以末治之此萬世不易之論也。

○新產不可用芍藥以其酸寒能伐發生之氣。凡胎前之只以芫易若如腹痛者非芍藥不可雖新產亦用但以酒炒不妨。

○產後之諸疾或作寒乍熱似瘧或大

熱頭眩、身痛、如傷寒、或卒中、口噤、如
瘕、如癱、或角弓反張、或妄言、見鬼、心
神惶惑、或其目口鼻忽覺、薰氣如烟、
薰之狀、或腹中作痛、綿綿不絕、已上
諸証、若非惡露不盡、即是勞傷血氣、
大虛之証、

產後、速、虛、用、參、朮、芪、陳、敗、身、尾、芩、冬、
其、如、發、熱、輕、則、加、茯、苓、淡、滲、之、其、熱、
自、除、重、則、加、干、姜、

或、云、大、熱、用、干、姜、何、也、曰、此、熱、非、有、
餘、之、邪、熱、乃、陰、虛、生、內、熱、耳、蓋、干、姜、
能、入、肺、分、利、肺、氣、又、能、入、肝、分、引、眾、
藥、生、血、然、必、與、補、陰、藥、同、用、之、此、造、
化、之、妙、

一、產、後、血、暈、因、氣、血、俱、虛、痰、火、沉、上、作、
暈、一、陳、導、痰、隨、氣、血、加、煖、硃、砂、安、神、

九、亦、可、服、以、麥、門、冬、湯、下、

○林 血暈者、曰、產時下血過多、血氣虛弱、
致暈悶甚、則昏不知人、氣息欲絕、若
作暗風治之、誠為謬、

○婦 血暈由敗血入肝、經眼見黑花、頭目
旋暈甚、則昏不知人、其因有三、一、有
用心使力過多、而暈者、二、有下血多
而暈者、三、有下血少而暈者、

○ 生子、下、燒、硬、炭、或、江、中、黃、石、令、通、赤、
置、器、於、床、前、以、醋、沃、之、得、醋、氣、除、血、
暈、產、後、一、腸、時、人、作、妙、一、腸、者、謂、
七日也、

○ 一、法、燒、干、漆、令、烟、濃、薰、面、

○ 一、方、 治、產、後、血、暈、危、困、 飯、分、
劉、赤、芍、二分 生、地、汁、盞 右、水、煎、數、沸、
溫、服、如、煩、熱、去、飯、入、童、便、妙、

○ 清、魂、散、 治、產、後、氣、虛、不、安、血、隨、氣、

上迷乱心神故眼前生花甚不知人
口噤氣冷 澤蘭葉 參各一荆一
芎^半 右細末温酒熱湯調灌即醒
一丸有耳草傳 每服一錢温酒入童
便調下

○^傳產後血暈用韭葉細切盛於有嘴瓶
中以滾醋之之急封瓶口以瓶嘴納
產婦鼻中即甦

○又方用鹿角一段燒存性出火毒爲
末酒調灌下即甦

○^林一方 紅花^一爲末分二貼酒二盞
煎一盞温服

○^雲翳湯 治產後去血過多及傷胎
去血多昏暈 飯身 芎 右等
分每服五錢水二盞煎八分服

○一方治產後血暈冲心悶絕 五靈

脂^{半生半} 爲末作一服酒調下口噤
者灌之湯調亦可一方加荆穗^{焙末}
童便温酒

○^{牡丹皮散} 治產後血隨熱上交心
昏暈悶絕 牡 大蘇芒^{各三分}
瓜子 桃^{去皮} 右分一貼水盞
半煎至一盞入芒蘇煎一二沸去粗
服口噤灌之

○^{奇効方} 治產後血上心已死
真蘇金燒存性爲末温米醋調灌下
立活

○^{蒲黃散} 治產後惡露不快血上搶
心煩悶昏迷或在^立 乾荷葉炙
牡 生地 苒^{各半} 蒲^生 石水
少入蜜少許服

○凡產婦昏暈敗血上冲者 牡丹散

○蒲黃散 奇効方 五靈脂 紅花

為主對若血虛者 清魂湯 芎藭

湯為主對其餘非茱萸法等及返魂

丹可通用也

一產後惡露不盡腹痛

○婦 雖惡露方盡或感邪或喜怒斬然而

止餘血停滯故腹痛

○一方治惡露不盡腹痛往來胸滿少

氣 澤蘭 煎 生乾地 飯烙三

芍 生姜各十分 甘六分 棗十四 右水煎

溫服欲死塗身得瘥

○一方治產後下血不盡腹內堅痛不

可忍 飯 芍 桂各三 桃百二

右煎服未瘥加大黃二兩

○一方治產後惡物不盡腹內疝痛

生乾地 飯各一兩 生姜切如蠅

炒八分 細末姜酒調下

○傳 曰積血而刺痛者宜桃紅飯之類

○田溪活套云惡露不盡作痛 四物

湯調香附五錢末服甚者加桃

惡血不去發寒熱成癥瘕者 四物

加 稜 莪 乳 沒 香附 桃

紅 五靈 乾漆之類

○產後腹痛不息 四物加烏藥 香

附 桂 良 陳童便和醋煎服甚

効

○當飯養血丸 治產後惡血不散發

熱腹痛及經候不調赤白帶下腹痛

飯 赤芍各四 牡 桂各

右為末煉蜜丸如梧子大每服三十

丸或酒或米湯任下

○定痛散 治產後惡血不盡腹中作

痛 飯 芍絡二桂各石作服
酒水命一盞半姜五片煎服

○**黑神散** 治惡露不盡血氣攻心腹
痛及血暈等証 黑豆半斤 去皮 熟地
酒 飯酒 長 桂 姜炮甘炙白芍
蒲各四 一方無蒲有附石為末每服
二錢童便和酒調服

○**林** 治產後腹痛鯉魚鱗燒灰酒調服

○ 治產後血不盡心中疼悶荷葉熬令
香為末煎水下方寸匕

○ 治產後腹中絞痛末桂溫酒服方寸
七日三服

○**傳** 治腹痛非芍藥不可雖新產亦可用
但酒炒

○ 產後惡寒發熱腹痛者當去惡血若
腹不滿者非惡血

一婦 兒枕痛者產母胎中宿有血塊產時
其血破散與兒俱下無患若產婦藏
府風冷血凝滯在小腹則結痞名曰
兒枕

○ 一方治兒枕腹痛 延 飯各二
瑰 蒲各分芍半桂二紅分石為末
童便和酒調服

○ 一方 桃半芍 芍 飯 芎 于膝
熬碎 桂 茸略二右水煎

○**王** **失笑散** 治產後心腹絞痛欲死及
兒枕痛 蒲炒五靈各等分 右為末醋
調一錢熬成膏湯化服

○**慎** **三聖散** 治兒枕痛 飯 桂
延各等 右為末每服二錢熱酒或童
便調下

○ **四物一黃散** 治產後腹中血塊作
便調下

痛 飯炒芍藥熟地 白芍炒各半
蒲炒二右為末每服二錢空心溫酒
調下

○四神散 治產後留血不消作塊
痛下痢不止 飯 姜炮 芍 赤
芍 右等分為末每服二錢溫酒調
下

○林 治兒枕痛 伏龍肝為末溫酒調
錢服效

○產後洩血塊 滑石沒仁血竭二
牡丹代 右為末醋丸如梧子大每
服三十丸醋湯吞下
一產後乍寒乍熱 附瘧

○林 因產勞傷血氣陰陽互相乘為乍寒
乍熱亦有惡露下少留滯經絡亦令
入寒熱必小腹急痛陰陽不和增損

四物湯敗血停留奪命丹

○增損四物湯 治產後陰陽不和乍
寒乍熱 飯 芍 參 姜炮 甘草
白芍各等右煎服

○奪命丹 在胎衣不如無奪命丹可用
五積散加醋煎服或黑神散

○大調經散 治產後血積惡露未消
榮衛不調陰陽相乘增寒發熱或自
汗腫滿皆血氣未平所致 大豆炒
皮一神一琥一右為末每服二錢濃
煎紫蘊黑豆湯空心調服喘急煩悶
小便不利亦效

○知母湯 治產後乍寒乍熱通身溫
壯心胸煩悶 知四分赤芍 苓三
桂六分甘草一右煎服或四物湯加
紫苓亦可

○小柴胡湯加生地黄治產後惡露方
下忽然斷絕寒熱往來盡靜暮則在
言此乃熱入血室

○傳
增損四物湯 治產後陰虛發熱或
日間明暮發寒熱 飯 芎 生
地 柴 各等 右水煎

○當歸散 治產後氣血俱虛恐增客
熱宜服此以去惡露 飯 白芍
芎 苓 各一木 右為末每服二
錢童便入溫酒調下

○林
單果飲子 治產後癰寒熱相半或
多熱者 半 赤苓 菓 去其多
陳 芎 芷 各一分 蘇 良 青 各
分 葛 四分 右分二貼水二盞姜五
片棗一枚煎至八分當發日早連進
三服無不効者

○婦
治產後癰疾熱多寒少 清脾湯
養胃湯佳也

一產後蓐勞
○婦
產理不順疲極筋力憂勞心慮令虛
羸容悴食不消邪感肺咳嗽口乾痰
逆喘乏頭昏節痛腹中絞刺榮衛受
和頻發時盜汗寒熱如瀉背膊煩悶
肢重着床名曰蓐勞

○傳
產後發熱自汗肢躄疼痛日久不愈
名蓐勞可用當歸羊肉湯 飯身
參 各七 芪 一 生 姜 兩 右 用 羊 肉 一 升
煮取清汁五大盞去肉入藥慢火煮
取四盞分八服徐飲之

○人參當歸飲 治產後去血過多陰
虛生內熱心煩短氣自汗頭痛 熟
地 參 飯身 桂 門 白芍 各

一右入竹葉五片生姜二片水煎

○婦
治勞勞 熟地 參 白芍 白苓

木略續 芪 桂 五味 飯

門 芎 各三分 右入生姜水煎

○一方 治產後羸瘦煩熱自汗欲變

羸勞寒熱自汗羸瘦用之 白芍

飯 地骨 參 各半 沒 桂 各二牡

紅右水煎

○一方 治血虛勞倦盜汗多困少力

咳痰 飯 芪 芎 各一 柴 前

各一 右入桃柳枝三寸大棗烏梅各

一枚生姜二片水煎若有痰不用烏

梅

○一方 治產後虛弱不食四肢倦怠

心腹痛補虛治氣 參 芍 桂 甘 生

姜 各一 飯 半 生地 兩 右入大棗煎

○三分散 治產後日久羸勞針灸俱

不効 芎 飯 熟地 芍 木

苓 芪 各一 柴 參 各二 芎 半

甘 各半 右分二貼水二盞姜二片

棗一枚煎八分服

○犀角飲子 治產後亡血津液虛損

自汗發熱困倦口乾 犀 門 木

各八 柴 六分 枳 地骨 生地 甘

各 飯 參 苓 芎 芪 各一分半 右

分二貼水二盞姜二片浮麥七十粒

同煎八分溫服

○人參鱉甲散 治產勞由產內未滿

百日或動作勞傷成羸勞其壯羸羸

乍起乍卧飲食不消時咳頭自昏痛

發渴無常盜汗寒熱如瘧皆臍拘急

服之立効 參 桂 桑寄 飯

白苓 白芍 桃 熟地 門 甘
炙各續二 膝七 鱉炙各 右
為末猪腎一對去脂膜水二大盞生
姜一片棗三枚去核煮二盞去粗入
藥末二錢葱三寸烏梅半箇荆芥五
穗煎空心服晚食前亦一服効
○**八珍散** 治月水不調臍腹疼痛全
不思食藏府怯弱泄瀉小腹堅痛時
寒熱四君四物合為一劑各等 右姜
棗煎服

○一方產後補虛 參 木 苓 甘
炙各 飯身 芍 苓 半 陳仁右分
二盞水二盞姜三片煎八分溫服
一林 產後瀉利腹痛者未滿月飲冷當風
邪毒留分肉之間布腸胃之內致腹
痛洞泄又有食肉太早強食過多停

積不化腹痛而成泄瀉者

○**調中湯** 治產後瀉利腹痛六脈沉
後日飲冷當風腹痛良妙飯浸
鳴泄利者用之
桂 白芍 附炮 芍 各二 甘 炙 參 各
一 右

○**胃風湯** 治產後當風致瀉泄腹痛
者 參 苓 芍 飯 桂 木
白芍各等 右入粟米一小撮

○**治中湯** 加砂仁 治日停食而腹痛泄
瀉者

○**傳** 產後瀉痢用陳 木 苓 芍 芍
炒滑 芍 甘 炙 煎服立効一方有
乾姜

一林 產後面目四肢浮腫此因敗血乘虛
停積於五藏循經流入四肢留滯日
深腐爛如水令浮腫醫不審作水治

之天柱者多，但服調經散，血行臍滿。

○調經散 沒 瑰 各一桂 赤芍

飯酒浸各藥半細研其後一二右為末

每服半錢，姜汁溫酒各少，訖調勻，空心服。

○大調經散 治產後惡露不消，敗濁

成腫滿方在作寒作熱之內

○加味四物湯 治產後浮腫氣急，腹

大喉鳴，本方加牡 朮 荆 桑

小豆 腹 杏 半 馬兜 入葱姜

苛脚腫，又加苓皮、生薑皮、陳桑。

○積木湯 治腹大如盤，水飲所作

實一兩木三右每服四錢，水煎溫服。

調經散治血分積木湯治氣分

○正脾散 治產後通身浮腫，及治婦

人大病後脾氣虛弱，腹脹。我 炮香

附米童便 苘 甘 炙 陳 右等分為

末，每服二錢，燈草木通湯調下。

○丹溪治套云：產後通身浮腫，四物加

乳沒桂，通腹良，枚血竭。

一林 產後腹脹滿悶，嘔吐者，因惡露下少

敗血散，脾胃脾受之，為脹滿，胃受之

為嘔逆，宜用抵聖湯，亦有惡露過多

氣無所主，乘脾胃而脹滿嘔逆者，抵

聖湯去澤蘭方，倍陳姜。

○抵聖湯 赤芍 半 澤蘭 華 陳

參 各一 苘 後 半 生 姜 切 片 焙 右 每

服七錢，水二盞煎八分，食遠溫服。

○枳梗半夏湯 調和陰陽，治腹脹吐

逆 枳 半 陳 各 五 方 加 枳 右

分二盞，水二盞，姜三片煎八分服。

○一方 治產後嘔逆不止 陳 三 不

其各薑八右分一貼水二盞
姜五片煎八分服

○**拒勝湯** 治產後腹脹滿悶嘔吐

赤芍 半 澤蘭葉 參 陳各一
不其發一右加姜二片

○**八味理中丸** 治新產血氣俱傷體

弱多汗一白內常服壯氣補虛止
嘔吐 參 姜炮縮 白苓 麥芽
麩炒麩二兩各廿一末二右為末米
糊丸如梧子大每服三十九姜湯下
有痰加半夏

一乳汁不行附吹奶

婦乳汁不行有二種氣血盛乳脉壅閉
而不行 連草 漏芦 土瓜根佳
也血少氣弱乳汁絕少者 猪蹄
鱖魚 鐘乳佳也

年少初產乳雖脹汁不行有風熱服
清利藥則乳行累經產而無乳亡津
液故也服滋溢之藥以動之

血有乳不多者服通經之藥以動之
以養臍引之

婦人素衝任之經有疾乳汁少而其
色黃生子怯弱多疾也

未產前乳汁自出多者生子多不月
乳子忽斷乳不時泄結痛亦有不孕
不痛腫硬如石日吹妳不愈治則難
腫急與栝樓散以手揉之則散

○**栝樓散** 乳香研一分栝樓根末兩石
酒調下

○見不飲乳脹結裡其法不盡皆黃
輕為吹妳始乳重為難

○**方** 治吹妳作癰 葵莖及子石

末酒服方寸匕

○傳治乳汁不通 通草 芫 瞿 柴

天花粉 各一 桔 仁 青 芷 木 通

赤芍 堯 甘 各半 右為一貼 水煎

食後細心飲之 更摩乳房

或無子食乳者 要消乳來芽 下兩炒

作四服 白湯調下

○漏芦湯 治婦人肥盛氣脉壅滯乳

汁不通或留結成膿 漏芦 二兩

蛇退 條一 土瓜根 汁根切 右為末 每

服二錢 酒調下 仍吃熱羹湯助之 林

無土瓜根有括樓 按土瓜當作王瓜

實 十箇 火燒存性 枝色黃 藤蔓

其母如瓜 萎而小如 葉圓無缺者是

○鐘乳散 治婦人氣虛血少脉涉不

行 乳汁絕少 鐘乳粉 每服一錢

濃煎漏芦湯調下

○母猪蹄湯 治乳汁不通 林 服藥仍

梳頭乳自下 母猪蹄 一隻 通草 四兩

水一斗 煮取四五升 飲之 末下 更作

一料服之

○玉露散 治產後乳脉不行身熱頭

目昏痛大便流滯 參 白苓 甘

各 一 帖 芎 芷 各 三 飯 半 芍 仁

粉 右 水 煎

○奇効方 麥門 去心 酒 麝 犀 角 各 一

錢 右 門 冬 末 一 錢 用 犀 角 酒 服

○下方五乳汁 類米 糯米 各 半 蒿

苜子 合 生 苜 汁 兩 猪 右 同 研 藥 令 細

去粗分 二服 立下

○釀乳方 澤 四 猪 赤 苓 天 花 各

分 四 生 地 三 分 苜 苜 各 一 分 右 分

二貼水煎半飢時服

○消毒犀角飲

治產後吹乳

荆穗

四風行其後二鼠粘子八右水煎食後煖服以手揉之及用芙蓉葉搗爛井水調稀塗之加蜜少許調心效

○鍼法

乳癰腫痛諸藥不能止痛鍼

足三里入五分通立止

婦

乳癰足陽明經流不痛血氣不散結

聚成癰四十歲以下治之愈五十歲

以上難差又姙娠乳癰無害

○蓮翹湯

治產後乳汁內結而腫硬

疼痛翹升芒各十玄參芍

白鐵已射于各八大黃分十三甘

六杏製八十箇右剉水煎下芒硝服之

一產後乍見鬼神

因產走耗其血敗血奔冲滿於心所

以乍見鬼神言語顛倒非風邪但服

調經散方在面且四加生龍腦一捻

煎服得睡即安

又方曰血虛心氣不足驚悸恐怖者

宜用蘊合香丸温董使調服

或辰砂妙香散生地黃當依煎湯調

服

又有熱入血室而顛狂者小柴胡加

生地

○鏡珀散

治產後瘀血攻心迷悶

言見鬼 現 鐵粉各一參 神

生地 膠珠各七硃砂五甘 麝各

不右為末每服一錢用金銀煎湯調

下

○交感地黃煎丸

治產後舌強不語

眼見黑花或發狂見鬼及胞衣不下

心腹脹滿等証

生地新搗 生姜各二斤各用石臼 以新瓦 飯延 燒琥 各一蒲 兩四右 各燒乾 飯延 燒琥 各一蒲 兩四右 為末煉蜜丸如彈子大每服一丸煎當飯湯化下林 以生姜汁炒地黃 相以地黃汁炒生薑相各至乾甚 為末為度

○栢子仁散

治產後護安皆心血虧

欠心神不守所致 栢子 遠 參 桑奇 風 琥 飯 熟地 甘 右等分細切每服五錢先用白羊心一枚煮汁一盞去羊心及相溫服

○茯苓散

治產後心虛怔忡言語錯

亂 參 甘 山 飯 絡 一 遠 苓 桂 門 絡 各 半 右 作 一 服 加 生 姜 三 片 大 棗 一 枚 水 一 盞 半 煎 至 一 盞 去 相

溫服

○婦

○方

治產後七日內宿血不散時

人衝心迷悶 荷葉分三 延八 地黃汁 合 右細切水一升煮沸上延胡空 心三 服忌肉 一 日 一 產 後 中 風 附 瘥

○林

產後風邪乘虛而入或身射緩急或不仁或口目不正或忽悶亂及中風候宜小續命又有產後五七日強力下床或月裏房室或懷憂發怒動憂冲和得病之初眼流口噤肌肉腫痛漸致腰背筋急僵直者不可治此及人作非的人風也

○婦

和乘虛入諸陽經則腰背反折如角

○血虛肉理不密故多汗風搏之則變

瘛口噤背強，極頭身反折，灌小續命，稍緩者，汗出手，拭不及者，不治。

○林產後中風，小續命最為要藥，但手足搐搦者，當去附子。

○舉卿古并散 治產後中風口噤手足瘳瘳 荆芥穗 每服二錢

豆淋酒調服 婦童便亦可噤者，灌之，噤甚，吹鼻中。

○一方 治產後中風不省人事吐涎，檣榻飯，荆穗等，右每服五錢水，酒各一盞煎七分溫服，如牙關緊急，幹開灌之。

○大豆子湯 治產後中風如角弓反張，口噤，逆潮，黑豆半斤炒焦，黑

無灰好酒二升，沃之，入磁器中，獨活，五同煎至六七分去滓，溫服。

○治產後中風四肢痺痛背項強急

風兩芍 桂各半 羚羊角 屑 芍 飯 酸棗仁 牛蒡子 炒 各右水煎 溫服

○募 產後中風口眼喎斜等証不可作風治，必大補氣血然後治痰。

○傳 產後中風口眼喎斜，人物加附荆心，加風卷煎服。

○林 產後不語者，敗血停蓄上于心，心氣閉塞，則舌強不語，宜服。

○八珍散 參 茸 生地 酒 蒸 芍 各一 朱砂 風 絡 五 細 各 半 煎 右

為末，每服二錢，薄奇湯調服，地黃，續，膈脾胃不快者，以當飯代之，右妙。

○孤鳳散 治產後閉目不語，明鑿為禾，一錢白湯調服。

○林 產後遍身痠痛者，日產走動，血氣升

降失常，留滯關節，筋脉引急，是以遍身疼痛，甚則腰背強，不能俯仰，手足不能屈伸，或身熱頭痛，不可作他病治之，但服趁痛散，循流血氣，使筋脉舒暢，痛自止。

○趁痛散 膝酒飯浸桂 木 莖

獨 生姜各半 莖白一分 二 其 个半 右水煎加桑寄生尤妙

○如神湯 治產後餘血不盡流入腰

脚疼痛 朴 半 芍 枳 木

桂 陳 白姜各六 蒼仁桔 其 炙

香附 芎 芩 參 苓 芍 飯 止

桃 尖 瓜 分 六 右 分 一 貼 水 一 莖 莖 姜

三片煎八分食前温服

一林 產後脚氣者產後熱悶氣上轉為脚

氣亦有產婦平日感風寒暑濕之氣

蒸襲足經乘虛而發其狀卒起脚弱

熱悶心煩兩足痛痺嘔吐氣上皆其

候也服小續命兩三劑必愈惡附子

者且服獨活寄生湯若嘔者去地黃

倍加生姜

一婦 產後腰痛婦人腎繫胞產則勞腎損

胞諸虛未復感風乘腰故腰痛

○一方 治產後風冷腰痛不可轉側

芎 芍 桂 續 生姜 桑

寄各六 飯 風 各 八 右 水 煎

○當飯黃芪湯 治產後失血過多腰

痛身熱自汗 飯身壯莖 仁 芍 个半

右加生姜三片

一林 產後血崩者曰產血氣暴虛未得平

復回力後或曰驚怒致血暴崩又有

氣衰血弱亦變崩中若小腹痛甚此

為肝經已壞難治俱且固經丸止之
若小腹脹滿此為內有瘀血未可止
之且服芎藭湯

○傳
固經丸

治產後血氣未復而有房

事及勞後損傷致血暴崩或淋瀝不

止 沒 赤石 楮骨 木賊各半

附去雙炮 右為末米糊丸如梧子

大每服二十丸溫酒下或陳米飲下

林無沒藥有
艾葉半兩

○熟乾地黄散

治証同前亦治一切

崩中下血不止頭目沉重 熟地各一

半耳一分蒲炒黑 蟹爪微炒 白苓半

桂二分 膠角膠各一分 鹿角膠一分 茯苓一分 伏龍

肝半 分 男子視 楮骨燒存性 飯各 石作

一服入竹茹一錢水二盞煎至一盞

溫服

○方

治產後七八日惡露不止

飯六芍 續絡八芍 茹各四 生地

炒乾十 右水煎空心頓服

○傳
丹溪活奪曰產後月餘經血淋瀝不

正四物加止升調血餘灰

○林
烏金散

治產後血迷血暈敗血不

止淋瀝不斷腹痛頭目昏眩多

汗又治崩中下血不止 血竭 百

草霜 男子亂髮灰 松墨醋浸

鱗燒飯 延 桂 赤芍右等分為

末每服一錢空心溫酒調服

○壯甥散

治產後淋瀝不絕心悶短

氣不食面黃體瘦 甥粉 芎 熟

地 白苓 龍骨各二續 飯炒

艾葉酒參 五味 地榆絡一耳粉

各五分一貼水二盞姜三片煎一校

煎服

一產後林附尿不通

傳產婦不謹損破尿管而致淋瀝不禁

其脈虛甚與峻補參朮為君芍藥為臣
巨桃陳莢苓為佐以猪羊脬煎湯熬
藥汁極飢飲之十日而安

○林第根湯 治產後諸淋無問冷熱膏

石氣血悉去之 白第根五瞿穗

白苓各二葵子 參各一蒲黃

桃膠 滑絡七甘半紫貝一石首

魚腦沙二筒 右分二貼水二盞姜二

片灯心二十莖煎六分温服為末世

服一錢木通煎湯下亦可如氣壅木

通橘皮煎湯下

○木通散 治產後小便不通

通 麻仁 葵子 滑石 枳 和

各二 甘 半 右水煎

○灸法 治產後小便不通腹脹悶亂

用鹽於產婦臍中填與臍平用葱
白剝去麤皮作一束切作一指厚安
鹽上用艾炷於上以火灸之覺熱氣
入腹內即時便通効難具述

○桑螵蛸散 治產後小便數及遺尿

桑螵蛸十鹿茸五酥各一蛎各一蝦參

赤石 朴各牡右為末每服二錢空

心米湯調下不禁者加龍骨一方無

石脂厚朴有甘草生姜

○治產後小便不禁 雞屎燒灰空心

酒服方寸匕

○婦方 治証同前 雞尾毛燒末温

酒調下

○方 治產後尿數 并遺尿 枳 石仁

為未米飲下

一林 產後大便秘結，回產津液暴竭，且進
橘杏丸以潤之，滑之若尚不通服麻
仁丸以通利之。

○橘杏丸

治弱人氣秘大腑不通

橘 杏 去皮尖 右為未煉蜜丸如

桐子大每服五十九米飲送下

○麻仁丸

治產後大便秘結 麻仁

去粗 參 大 飯 各等 右為未煉

蜜丸如梧桐子大每服二十九白湯
下未通漸加丸數以硬潤為度

○滋腸五仁丸 治產後血氣虛積大

腸閉 薤 傳 導 難 艱 杏 桃 各去

去粗 各 栝子仁 兩 松子仁 半 郁

李仁 麩 炒 橘 紅 桐 右五仁研為

膏合橘皮末和勻煉蜜丸如梧子大

每服三十丸加至五六十丸清米飲

下二十九有飯梢五不

一林

產後口鼻黑起鼻破者陽明者經脈
之海起鼻交頰中俠口交人中左之
右右之左產後氣消血敗入於諸經

却還不得故冷口鼻黑起及變鼻似

此產後虛熱變生此候不可治名曰

胃絕肺敗 急取緋線兩條並產婦

頂心髮二條繫兩中梢上節止無藥

可療亦厭根之一端也

若口鼻無黑起此鼻衄則黑神丹屏

一林

產後喘急者因產後所下過多榮血
暴竭氣無所主獨聚於肺故令喘名
孤陽絕陰難治若惡露不快敗血停
凝上潮於肺亦令喘急但服

血去喘止

婦
○**一方** 治產後血入肺面黑喘欲死

參二兩 蘇木二兩 右蘇木一味煎去滓
隨時加減入參末服之

○**奪命丹** 治惡露不快敗血薰肺喘

急若感風寒者因憂怒者食鹹冷者
並不可服此况孤陽絕陰者乎胎衣

不下

一產後咳嗽

○**二母散** 治產後惡露上攻流入肺

經咳嗽 知 貝 參 白苓 桃
杏並夫 右等分水煎

○**旋覆散** 治產後血風感寒暑濕喘

滿咳嗽坐卧不安 旋 赤芍
前 半 杏 荆穗 五味 苓
麻 苴各等 右入姜蜜

婦
○**一方** 治產後肺虛感微邪咳嗽

甘 桔各六分 款四分 生麥門冬 生地
各十分 葱白握 右水煎

一方 治產後咳嗽痰唾稠粘氣急

前 五味 芫 貝各六分 桑 苓各八分
分竹葉二十 右水煎

○若產後喫鹽太早而咳者難治

一產後頭痛

○**林** 加減四物湯 治產後頭痛血虛氣

弱痰癖寒厥背冷頭痛 羌 芎
風 香附炒熟地 各一細 芷 蒼

各半 甘炙飯各半 膏二 右水煎
如有汗者是氣弱頭痛也加芍三 桂

半 生姜片

如痰癖頭痛加半三 苓半 一不 生姜三
如熱厥頭痛加正三 膏三 知一

如寒厥頭痛加天雄仁附半斤姜三片

一產後虛汗

○**麻黃根湯** 飯 葱 麻黃根 蜆

粉參 甘炙小麥等石煎服

○**管飯黃芪湯** 治產後自汗壯熱氣

短腰痛痛 芪 芍各四飯後右分

二貼入生姜二片

○**黃芪湯** 治產後虛汗不止 芪仁

木 風 熟地 蜆殼白苓 門

其後右入大棗一枚

一產後渴

○**熟地黃湯** 治產後虛渴口乾少氣

脚弱眼昏飲食無味 熟地酒浸焙

半參四分 門三 其炙 一 枯六 右分 一

煎水二盞糯米一撮姜五片棗二枚

煎八分服

○**見現丸** 治產後食麵太早麵毒蒸

肺口乾煩悶或飲食過飽所致

良炒姜黃 華澄茄 陳 參 莪

炮稜炮各 右為末用蘿蔔者爛研此

煮麵糊丸蘿蔔湯下

○**人參白朮散** 治產後勞傷虛羸怒

氣上逆口乾煩悶 參 朮 芎

寗 生地 苓 甘炙芍 滑 藿

各等 水煎

○**門冬飲** 治產後血虛煩渴不眠

芎根切 枯 參 甘 苓各二大

棗二十箇 門生 用石水煎頓服四劑而

瘥忌菘菜

一產後陰脫

○**婦** 治產時勞力太過陰脫如脫肛以通

迫腫痛以鉄精粉上推肉之

○又灸臍下橫文二七壯

又用枳殼煎湯浸良久即入

○又用五倍白礬煎湯浸良久

○又草麻子十四枚去殼研塗頂心如入即去

○當飯黃芪飲

治產後陰脫謂陰戶中官脫

蝦飯 白芍 芪 參各二升半右

水煎

○當飯散

治婦人陰脫 飯 芩

白芍各一兩 蝟皮半兩燒 蛻假二兩 右為

末温酒或米湯調下忌食高舉重

○丹溪活套曰產後子腸不收八物

加升風以酒炒武為君

○桃仁膏

治產後陰咳煩悶 桃

五味 枯凡為末研桃仁膏拌付

○硫黃湯

治產後玉門不斂 硫黃

四吳茱 兔絲各一兩 蛇床一兩 右水煎

頻洗之自斂

○治產後陰脫

硫 烏賊骨各五

味二 右為末參患處

○一方加蛇床子炒布包乘熱熨之亦

治產後陰痛

○草麻葉

枯凡為末以紙片攤葉托

入

○治子宮不收痛不可忍以淡竹葉根

煎湯洗仍用五倍白礬為末干捺正

效

一玉門瘡腫此乃雖非產後之証

○治婦人陰瘡先以荆芥蛇床子煎湯

薰洗軟帛三 乾次以枯凡黃丹扁畜

藥本各一 硫半 荆芥蛇床各五 白蛇

蛻一條燒 右為末脂麻細調塗濕則乾椽

○一方治陰中生瘡如虫咬痛生楊桃葉綿裹內陰中日三四易之

○黃芩散 治陰戶生瘡 芩 飯 芎 白礬 連 右等分煮湯薰洗

○治陰門腫其菊苗研爛百沸湯泡先薰後洗

○治陰腫不散 麻黃 荆 茄種皮 蛇床 真杉木 蛻皮 右為末敷或煎湯薰洗

○一方 小麥 朴梢 白凡 五倍 葱白 右煎湯淋洗尤妙

○治陰癢 硫黃末敷 麝少燒 杏燒 右為末如瘡口深用輕絹包藥線穿

○治婦人陰痒不可忍 麝少燒 杏燒 右為末如瘡口深用輕絹包藥線穿

○火灸熱內陰中

○又方 枸杞子根煎湯淋洗蒜煮湯亦可

○大黃散 治陰痒 大黃微炒 芩 莖 灸各 赤芍 玄參 丹參 山茱 蛇床各半 右為末每服一錢食前溫酒調服

○治婦人陰中生瘡凡入丸散中宜肉草烏七箇燒 右用小瓦罐盛米醋浸乘熱薰候通手洗之

○治婦人交接輒痛出血 桂心 伏龍肝各等 為末每服三錢空心溫酒調服

○一方 連紋藤 其絡四右為末作二貼水四升煎一升洗之日二度

○治婦人交接陽道遠理及他物傷犯

血出淋瀝髮灰 瓦青布灰擦之

○**一方** 刺雞冠血塗之 治陰門腫

堅痛 枳實碎炒令熟故能畏射
冷即易之

一斷產

○**林** **四物湯** 加芸薹子 經行後空心前

服斷產

○**升麻葛根湯** 加瞿穗 膠枯 豉

炮各七 右分八貼 水二盞煎八分空

心午前一服 二相并煎 晚食前服 通

作 四日服盡 亦每月經行後便服 亦

加芸薹子 一撮炒

○**一方** 白麵麴 升無灰酒 舂作糊

煮至一升半 絹帛濾去粗分作二服

候月經來 早晚各一服 次早五更一

服天明一服 經便行 終身無孕

○**下胎不動聲色** 二四日後如月水通

為驗 五積散 一貼 蘇木 二寸 桂

紫金牛 稜 莪 乾漆 各三寸

芷 半 牡 牡 紅 紅 一 飯 半 右 酒 水 各

一盞煎 一盞服

○**林** **返魂丹** 一名益母丸 一名濟陰丹

益母草 一味 此草生二種 於端午小

暑或六月六日花正開時 連根收採

透風 更陰乾 用時以石臼 搗羅為細

末 煉蜜 丸如彈子 大每服 一丸 專

治橫生倒產 難產 產後諸証 及孕婦

胎氣不安 或跌磕 觸動 下血 胎漏等

証 若量加木香 全當 煎赤芍 藥 尤妙

不限丸數 以病愈為度 且服 二九 或

九 桐子 大服 五七 十丸 熬膏 尤佳

熬膏法 益母草 依法採 連根葉

莖洗淨石臼搗爛以麻布揆取濃汁入砂鍋內文火熬成膏如黑沙糖色為度入磁罐內收貯每服用一飯匙極妙

○子死腹中膠悶為痛小便淋血沫出腹脹四肢如冰冷指甲青者是也或臨產時服此藥一丸血氣調順諸病不生破血止痛補虛養脈童便酒各七分化下或只生取一握連根搗爛絞汁入蜜少許服立下

○產難者或產後惡物不盡臍腹刺痛惡露上衝心胸煩悶童便好酒化下
○胎衣不下者發寒熱時有冷汗但出數血其衣自出如帶斷了服此藥自下或橫生不順心悶欲死者童便好酒化下薄荷炒搗湯亦可

○產後二日起卧不得眼前黑花俗呼為暗風或血熱口乾渴心悶亂如見鬼神狂言童便好酒各七分化下

○產後四肢浮腫多寒熱者或氣喘或小便澀滯喘嗽胸膈不利兩脇疼痛溫酒化下

○產後寒熱往來如癘或臍痛溫米湯化下桂枝湯亦可

○產後中風牙關緊急半身不遂童便好酒各七分化下

○產後大便閉結口苦煩渴童便好酒化下薄荷湯亦可

○產後痢疾專湯下

○產後身痛腹脹痛溫米湯下
○產後崩中漏下不止者糯米秦朮湯化下當飯桂枝湯亦可

○產後鼻衄口乾舌焦黑_六童便好酒化下

○產後吐逆不止溫酒化下

○產後赤白帶下秦_九糯米湯化下或每服用末二錢食前溫酒調下

○胎前臍腹痲或作聲溫米湯下

○產後瀉血_十湯下

○月水不調溫酒下或因物湯送下

○婦人久無子息溫酒下至十九二十丸大有效四物下亦可

○急用時連根莖生槐_十入水飲可治喉閉吐即愈冬用根

○產後一切血病并傷損用膏一匙酒化服內損亦可

○產後不治之_三證

○產後氣急喉中作_十猶兒聲者敗血入心_十萬無一生一不治也

○產後中風者蓋_十日未滿勞動百日之中傷_十房事_十中風其狀眼_十腰強筋_十角弓反張牙_十緊急如此者非

○產後面色黑青遍身黑_十者百無一生_三下治也

○產後自傷死者一不治

小兒科

一 棧穢之法

○林 生下急用軟帛棧穢或綿裹手指蘸連茸汁棧口惡汁稍定更以蜜少許調朱砂一字抹入口中鎮心安神解毒一生免瘡豆之患

○惠 灸甘草細切水煎去滓綿裹指蘸灌兒口中令嘔吐痰涎及瘀血方與乳汁智觀無病

一 臍帶斷法 附回氣法 附臍腫

○婦 斷臍帶可只留三寸許帶中有小虫急去之留之異病或綿扎定然後洗之不熱濕氣入腹生臍風兒生三日烙臍帶三壯別處勿加火艾恐成驚癇

○初生氣欲絕不能啼者蓋母難產氣

悶或冒寒所致急以綿絮包裹未可斷臍帶且將胞衣置炭火上燒之仍用天紙燃蘸點火燒臍帶得火氣由臍入股須臾氣回方可斷臍帶

○斷臍之後為水濕所傷或潮熱濕氣傷臍中臍腫多喫不乳 黃柏 釜

下墨 亂髮灰 等分為末傳之

○臍中汁出并痛 枯礬傳之或柏末

一 臍風撮口三

○傳 臍疝傷風或尿在胞中遂成臍風發熱面赤啼聲不出 赤足金頭蜈

蚣 丁條材酒 瞿半蝎梢 箇僵蚕 七 浸去毒炙 右末 鴉管吹入鼻中如嚏噴叫

○林 聲可治後用薄荷汁調服之 面目黃赤赤氣息喘急啼聲不出蓋由

四破之以乳汁銀石器煎灌之立效
○治初生口噤不開不飲乳赤脚蜈蚣
條去足灸灸焦細研如粉每用半錢
以猪乳汁二合和勻灌之

○扶苓丸 治機口不淨穢惡入腹
浦短氣不能飲乳 赤苓法連 枳
炒各 右為末煉蜜丸乳汁調灌下

○白姜散 治產婦胎中受寒兒腹痛
不飲乳 木 陳 枳 各一 桂 白
姜 其物各右剉水煎綿蘇與之嘔
加木瓜丁香
一洗浴

○婦兒生浴躄 寅卯酉日吉 壬申丁
巳癸巳日凶 用益母草金銀草煎
汁浴則不生諸瘡

○小兒新生浴之用五根湯終身不生
瘡疥 柳桃棟梅槐謂之五根

○臍帶未脫不可頻浴頻浴則水入臍
中致臍風撮口

一謹養之法九

○惠 天氣和暖抱之使見風自則血成氣
剛可堪風寒

○常令着地氣便筋骨壯若厚衣過暖
傷皮膚損血脉發瘡瘍汗出睽理開
風邪易入腸胃尚脆而窄凡魚肉果
麩燒炙稠粘等物皆宜禁絕苟務姑
息隨所欲積成痼疾

○婦 天寒用父母常着舊衣忌新綿太煖
則筋骨軟弱

○勿令見乳乳母臂作豆袋枕之

○乳母與兒同睡口鼻氣吹兒額門見
必鼻塞

○糊衣火焙兒心丹毒熱疾

○兒衣服晒日下被惡鳥羽屎落遂成無辜之疾

○將惡相異物嬉戲忽見遂成驚悸

一胎驚十

○應有胎中受驚故未滿月而發驚目上視腹硬手足抽掣角弓反張痰涎壅盛名胎驚宜辰砂研牛黃訛乳汁調抹入口中太妙母服防風通聖散

○林 至聖保命丹 治胎驚及急慢驚風

蝎梢十四 白附 南星炮 蚕炒辰 麝 各一 天麻 風絡二 金箔片 蟬蛻各 右為細末 粳米飯丸每兩作四十九 初生兒半丸 乳汁化下 周歲兒一丸 金銀薄荷湯化下 十歲左右有急候 者二丸薄荷湯化下

一日內畏生赤十一

○林 初生兒日裏生赤肌膚如丹塗者先用牛黃散托裏次用驚葉散塗外乳母服清涼飲子三服

○牛黃散 鬱金 甘炙桔 天花粉

葛根各等 右為末薄荷湯入蜜調服

○藍葉散 藍青 知 甘炙杏 梔

絡五 芩 升 柴 寒水石 膏

赤芍絡四 麝仁右水煎

○清涼飲子 飯調耳 大 赤芍絡

分右水煎

一日裏生黃十二

○林 胎黃之證兒生下遍身黃色如全身熱一便不通乳食不進啼不止母目受濕熱或衣被太暖所致宜漸減綿厚衣被服生地黃湯

○生地黄湯

生地 赤芍 芎

飯 枯絡等 水煎子母俱服

一視手紋

○傳 一歲至六歲曰嬰孩以男左手女右手次指三關脈為驗病輕重死生之訣名曰虎口



頭指

第一節名風關無脈則無病有脈則病輕第二節名氣關脈見則病重第三節名命關脈見則病劇九死一生惡候也二關通度脈候是極重之證必死
○林 二因通度針入指甲者不治

○傳 凡頭面或肚腹有大脈俛青筋見者并是食毒物及驚積難治

○應 胸背百會穴下有二條青脈下點其尖久而愈者不治

一診脈十四
○患 凡診小兒太極按三部一息六七至平和八九至發熱五至內寒弦脈風

癩沉緩傷食

○傳 七八歲曰風九十歲曰壽始可以下指探掌後三部之脈以一息七八至為無病

○十歲至十四歲曰童以一息五六至為常脈

一觀形十五
○林 兩眼無精光黑睛不運轉目睛無鋒銳如魚眼猫眼者不治

傳 鼻門黑燥渴難禁面黑唇青身命莫行

壯大青筋俱惡候更熾腹有直身絞

○顛門腫起定為風此候應知最見凶

忽陷成坑如毒見示過七日命須終

一審外證十六

林 咬牙甚者發驚口吐涎沫而叫者虫

痛昏睡苦寤者粗發瘰癧也吐瀉昏

睡露睛者胃虛熱也吐稠涎咯血者

肺熱也不露睛者胃實熱也瀉青白

穀不化者胃冷也吐瀉乳不化者傷

食道下之身熱飲水熱在內也瀉赤

黃者胃熱毒也呵欠面赤風熱也呵

欠面青驚風呵欠面黃脾虛驚呵欠

而多睡者內熱也呵欠氣熱者傷風

也

一變焦十七

○愚 蕉有十變五蒸者乃生精補意符

俗謂之牙生骨長母漢曰是胎毒散

也

○傳 自生之日始每三十二日一變其治

不汗而熱者發其汗大吐者微下世不

可別治

林 變蒸之時切不得艾灸即宜少與乳

食亦不可妄投藥餌

○明等散 治見變蒸發熱或咳嗽痰

涎鼻塞聲重 苓 木 參 甘

桔 細 芎 各等 右本煎 去等 四等 散

○紫霜丸 杏 五十枚 赤石 兩 巴 三

粒 去膜 代赭石 兩 右各別研

和勻湯浸饒丸如黍米大二歲以

下見二三丸八歲以上十數丸食前

米飲或乳汁送下

○人參散

治變蒸骨熱心煩啼喘
參 甘 炙 門 北 紫 胡 絡 二 膽 風
右煎服

○調氣散

治變蒸吐瀉不乳多啼
木 香 附 朴 參 陳 藿 甘
炙 各 右水煎

○神仙黑子散

治變蒸與傷寒相似
者當詳其証名上唇中心有白點子
者為變蒸宜服此 麻 蘇 大 杏 皮
右燒存性為末每服下字水煎服抱
見於溫煖處有微汗身涼効

一吐瀉十八

○傳

小兒初生吐蓋拭口中穢惡不盡嚥
入喉中故吐可用木瓜丸 瓜 栝
木 麝 臍 粉 粉 輕 右 各 下 字 研 勻
煎糊丸如黍米大每服二三丸甘草
湯送下

湯送下

○初生三日內吐瀉壯熱不乳大便乳
食不消或白色傷食當下之而後和
胃下白餅子和胃益黃散

○白餅子

治小兒腹中有癖但飲乳
嗽而生痰 滑 輕 半 南 各
不巴 二十四粒去皮膜用水一升煮
水盡為度一作水三升
右研勻巴豆後入衆藥糯米飯丸如
菽豆大三歲已上三五餅已下二
餅薄時易下

○益黃散

治小兒脾胃虛寒 陳 不
青 訶 子 皮 甘 糝 各 下 香 仁 右 水
煎加參水各一
不尤効

○吐瀉

吐瀉泄黃熱乳也瀉青傷冷乳也
皆當下白餅子主之傷熱乳者玉露
散傷冷乳者益黃散溫中丸並於下

後服之亦有不須下但服此藥愈者

○玉露散露散 膏 寒水各半

生其二个右為末每服一字或半錢
溫水調下

○溫中丸 參 甘 炙木 略一右為末

姜汁麩糊丸如菘豆大每服一二十
丸糗米飲下

○吐瀉調脾平胃散入熟蜜和藕合香
丸米飲調服

○兒生月裏生嘔先用硃砂丸下之後
用朱沉煎煎無物下而止

○硃砂丸 辰 南 巴霜各半右為

末麩糊丸如黍米大每服二丸薄荷
湯下

○朱沉煎 硃砂二个右為末每服半錢用新

汲水一盞香油滴成花批藥在下須
更墜下澄去水別用水空心送下

○紫金核 治男女一切嘔吐小兒左
効 半湯匙七 參 木 木

丁香 藿各二右為末麩糊丸如黍
核大姜汁糊七効

沉香 硃砂各 細研為衣陰乾每
下丸用棗一枚去核內藥在內溫起

果煨熟嚼服水飲壓之

○掌中散 治吐乳 白豆蔻 砂

仁各十半生半炙半 右為末安堂中
乾吃兒疹口中

○百末散 治小兒脾胃久瀉嘔吐瀉

不止津液枯竭煩渴飲水乳食不進
羸瘦困劣 參 木 木 苓

藿 甘一炙略葛二 右水煎

一腹脹傳十六

由脾胃虛氣攻作也亦有實者必悶
亂喘滿可下之用紫霜丸白餅子不
喘滿者虛也不可下

○**獨氣丸**治小兒虛脹如腹大者加

羅漢一名楊九子 胡椒兩蝎尾
去毒 右為末麩糊丸如粟米大每
服五七丸至一二十九陳米飲下
左有木香一錢

○治小兒虛脹先服獨氣丸不愈腹中
有食積結糞小便黃微喘脈伏而實
時欲飲水能食者可下之宜消積丸
紫霜丸蓋脾初虛而後結有積所治
宜先補脾而後下之後又補脾則愈
也

○**下刀**治腹脹 蘿蔔子 紫蘇梗

葛 陳各等 其紗石水煎食少者加
禾

○**消積丸**丁香 砂仁 胡椒 二巴 二

去皮心膜 右為末麩糊丸如黍米
大二三歲已上三五丸已下一二丸溫
水下

一腹脹傳二十

多是飲食所傷 水半 陳旺 青
各七 山楂去 麥芽各 其
後半 右寒加藿 吳茱有熱加參右
為末米飲或白湯下

○腹痛口中氣溫面黃目無精彩或白
睛多及多睡畏食或不便酸臭者當
磨積宣消積丸甚者用白餅子下之
後和胃用白朮散

○心腹痛面脫自口中沫沫及清水出

發痛有時當作蛇虫又曰凡積痛食
痛寒痛虫痛大同小異惟虫痛者當
口淡而沫白出小兒本怯胃冷故虫
動而心頭痛與癩相似但目不斜手
不搖耳安虫散主之

○安虫散

至鑑用米糊丸
名安虫丸

黃粉炒黃
色明

粉也

川練子去核

各二

括凡

半

右為末每服一字大者半錢或

一錢溫米飲臨痛時服

○集効丸

治虫痛

木 虱炒 換

訶煨去核

蕪炒 附炮去皮

姜各七

大西

半

烏梅去核

二

右為末煉蜜丸陳皮

湯或醋湯下一方有 苓連

治蛇虫作痛一陳湯加苦練根煎服

或只以苦練根向東南生不出王者

去此皮取白皮細切濃煎汁 丁去 益徐

徐獸之不可多飲先以糖蜜或炒肉
食之引虫頭向上然後服之看兒六
小樹酸與之

○一方

治小兒腹痛

甘 姜各二

伏龍肝一

參 苓

百草霜

木各

右為末粥丸梧子大每服三五

丸陳皮湯下

一痞癖二十六

○林

小兒寒溫不調乳哺失節或咳糯米

食生冷瓜菓脾胃微弱不能消化致

五藏不利三焦壅滯腹內堅硬或發

寒熱如瘧漸致弱羸

○紅丸子

治血膜包水脇傍時痛發

寒熱日久

結癖亦効

稜炮 莪煨 芫

花醋 桃

杏各去尖

烏梅

各五

巴二

粒取

硃砂五

右為末

醋糊丸

如葶

豆大硃砂為衣米湯下三五丸

○天黃膏

治瘡癰小兒大人俱用之

大黃 朴硝 等分為末蒜泥成膏用絹帛攤成膏藥貼之自軟消

○木別膏

治痞癰 木別多用獨蒜

半雄半梔為膏入醋少許蠟紙貼患處取積後調理宜異香散

○異香散

治腎氣不和腹脇膨脹痞

悶噎塞喘滿飲食難化噫氣刺痛能破瘰癧和胃進食 蓮去菝根稜

益地各青 陳去白各朴姜製

右為末每服一錢水一盞姜片棗一枚鹽檢煎以分通口服

○灸法

乳下一寸灸七壯

○小兒癰氣久不瘥灸中腕一穴章門

一丁心各七壯又臍後脊中灸七壯

○小兒腸滿瀉利積聚腹痛不嗜食灸

脾俞二穴灸七壯

一夜啼傳二十二

夜啼者心經有熱有虛 參 蓮漢

微略一 甘五竹葉斤二十 右作一加

姜切

○錢氏曰小兒夜啼者脾藏冷而痛也

宜益黃散方見前

○花火膏

燈花三乳汁調抹見口或

抹母乳令兒吃之

○治驚啼邪熱乘心也安神花主之

○錢氏安神丸

治邪熱驚啼門 自

苓 馬牙硝 山藥 寒水 甘草

半硃兩腦半右為末煉蜜丸如芡實

大每服半丸白水下

林

○道赤散

治心躁號啼小便赤口中

熱暖熱或有汗仰身而啼至曉方息
生乾地黄 通 芍药等 右每服二
三錢入研葉煎右証加參用之末煎
用通心飲加門 車 灯心 薄荷

○通心飲 通 堯 瞿 菘 苒
芩 各等 右水煎

○丁方 治夜啼 蟬蛻十四 全者去
大脚為末入硃砂一字蜜丸吃之

○龍齒散 治夜啼不狂 龍齒 蟬
蛻 去翅 鈎鈎藤 苓 參 右等分
為末每服一錢水煎

○六神散 治腰痛夜啼面青口中冷
氣四肢冷或泄瀉青白及不吮乳
參 山炒木各五 芍藥二 白苓 扁
一兩 右入姜蜜

○五不子散 治夜啼及腰痛似有鬼
祟 五味 飯 赤芍 木 各五神
陳 桂 芍各二 右水煎

○乳頭散 治夜啼不止腹痛 莖
甘炙飯 赤芍 木 各等 為末塗乳
與吃

○蒜元 治冷證腹痛夜啼面青手冷
大蒜 枚慢火煨熟研搗 乳香 研
日晒或火煨乾研 右研勻丸如芥子大每服七粒乳空
時服

○治夜啼 乾牛糞如羊犬安臥席上
勿令母知子母俱吉

○黃土散 治客忤夜啼 竈中黃土
蚯蚓屎等 右為末水和塗頂五心良

○凡小兒口到乳上便啼身額心微熱
急看口內或瘡或重舌於各難治之
一客忤附申惡二十三

○小兒神微弱外邪客氣卒暴觸件口吐青黃白沫面色變易喘腹脹反側瘰癧狀如驚癇但眼不上窺視其口中上脘左右如有小泡以竹針刺之或以指甲摘破宜服蘇合香丸姜湯化開頻與之仍以皂角燒薰身次日日淡豆三合水濕梅丸如雞子大摩兒顛上及足心各五六遍次摩臍心良

○犀角散 治客忤驚啼壯執 天麻

犀門 鈞藤 硃砂各一錢粉

雄各半 麝少 石為末 每服半錢 金銀煎湯調服

○安神丸 治証同前 方在

○黃土散亦可 方在前

○小兒中惡卒死以葱白內下部及鼻中

中 正治

一口 附鵝口二十兩

○林 如聖散 治小兒口瘡不能吃乳者

巴豆 二粒 研爛入硃砂 剉開 額前 貼

上如四面起粟米泡 便用溫水洗去

恐成瘡 用苜蓿湯洗使安 其效如神

○傳 治口瘡 黃連為末 蜜水調服

又方 黃柏 細辛 等分為末 付

之

○小兒白屑滿舌及兩脛名鵝口 用髮

經指頭蘸井花水拭口 令淨 又用濃

煮粟汁以綿纏勒頭 或之更以燈過

黃丹搽之即愈

○淋 治鵝口 桑白皮汁和胡粉傳之

治小兒口瘡 搽半蝦 養及并末 傳瘡

上即愈

一重舌 附重舌重舌 二十五

木舌古上瘡

林重舌乃心脾熱也心候於舌脾之脈絡出於舌下心脾熱則血氣俱盛附之根而重生一物形如舌而短小有著類及上腭者曰重脰若牙齦者曰重齦皆當刺去其血也真蒲黃或之或髮灰或牙硝或煇硝或竹瀝浸黃柏點敷之皆效

○治小兒重舌黃丹如豆大內管中安舌上

又方益下土苦酒和塗舌下

又蜂房燒灰研酒和傳舌下三四用之

又蛇蛻炙焦末一豆許傳舌下日三

○治小兒舌上瘡飲乳不得以白礬和雞子置醋中塗兒足底二七即愈

○傳前菓舌用二錢針於舌下紫麻刺之

之思血即愈

又用竹瀝調蒲黃末杜舌下神效

○治小兒木舌塞口欲滿者紫雪二錢竹瀝半合研勻頻付即愈

○紫雪 治內外煩熱不解口出生瘡

顛狂驚癇等証 黃金 兩寒水石

磁石 石膏 滑石 各二斤 已上用米

一石煮至四斗去且入下項藥半

兩青木 犀 屑 麝屑 沉 各五

丁香 兩一升 玄參 各一已上再煮至

一斗五升入下項藥硝石 二斤 苦朴

硝石 斤釋已上入煎藥汁中微火煎

柳枝不住手攪候有七升投散水盆

中半日入下項藥橙 今古硃砂 兩三當

門子 兩一各半 右煎成霜雪紫色每

服一錢或二錢涼水調下並食後服

一弄舌 二十六

○林 脾藏微熱，今舌絡微緊，時久，奇舌，舌
之治之，勿用冷藥，及下之，當少與，瀉
黃散，漸服之，或飲水，醫家謂，非也，
飲水者，脾虛津液少也，又如面黃肌
瘦，五心煩熱，弄舌，為疳黃，宜胡黃連
丸，大病後弄舌者，凶。

○傳 瀉苗散 藿社，搗行膏，拌其半，七分，風

○四右細切，作一服用，酒炒，香熟，以
水一盞煎至半盞，去粗與之。

一吃泥 二十七

○傳 吃泥，胃氣熱也，用軟石膏，文陳艾，系
前服。

一滯頤 二十八

○林 滯頤，乃口涎常流，而膚於頤頤也，宜
分，令熱而治。

○溫肝丸

治脾胃虛冷而流涎，不能

取約 半丁香 木各五 姜蚕 木

青 陳各二 右為末，糊丸，麻子大，每

丁歲十丸，米湯下。

○通心飲 方在夜，通心氣，分水穀，退熱，

利尿，口瘡，加

一語遲 二十九

○林 胃浦丸 治小兒在胎，其母卒有驚

怖邪，乘心，舌本不通，長四五歲，猶不

能言，參 苜 門 透 丸 姜

芎 飯 絡 三 乳 硃 絡 一 右 為 末 煉

蜜丸，如麻子大，每服十丸，米飲下。

一行遲 三十

行遲，乃稟受氣血不充，骨髓不滿，軟
弱不能行，或肝腎俱虛，蓋肝主筋，筋
弱不能束，腎主骨，骨弱不能載，故也。

宜地黄丸

○地黄丸

熟地四兩 山茱 山藥各二兩

沢一兩 壯白苓各一兩半 右為末煉蜜丸

如菓豆大空心塩湯下二二十九

○虎骨丸

虎脛骨酒炙 飯一匙 桂

酸棗酒浸 生地 白苓 風 膝各

分 右為末煉蜜丸如麻子大每服十

丸酒或木瓜湯下

○羚羊角丸

治小兒五六歲骨氣虛

弱脚弱不能行 白苓酸 羚羊 虎脛

骨醋炙 生地各五錢 桂 風 飯

各二錢 右為末煉蜜丸如小豆大食

前温酒化下三五丸服之一月漸愈

即行也

○五加皮散

治三歲不能行 五加

皮一兩 凡各五 右為末每服一錢半

粥飯調次入好酒兩滴調日二服

鶴節三十八

○林 鶴節乃稟受不足血氣不充故肌肉

瘦薄骨節呈露乃得之腎虛精髓內

枯膚革不榮易為邪氣所襲日乾枯

碎其形如鶴脚之節宜地黄丸

一脚拳三十二

○林 脚拳不展乃稟受腎氣不足血氣未

榮脚指拳縮無力不能伸屈宜

○海桐皮散

海桐 牡 飯 熟地

膝各一 山茱 補各五 右粗末每服

一二錢葱白一根水一盞煎半盞服

一脚拳三十三

○林 手拳不展蓋稟受肝氣怯弱致兩脉

攣縮兩手伸展無方宜

○薏苡丸

飯焙 苡 薏 酸 風

卷各一 右為末煉蜜丸雞頭大每服
一吐麝香荆芥湯化下

一 顛陷 三十四

○林 顛陷乃且藏府有熱湯引之致泄
痢久則血氣虛弱不能上充腦髓故
顛陷如坑用黃狗頭骨炙黃為末雞
子清調敷之

一 顛填 三十五

○林 顛填乃顛門腫起也蓋脾主肌肉乳
食不常飢飽無度或寒或熱致使瘴
府不調其氣上衝為填脹顛突而高
毛髮短黃如寒氣上逆則堅硬熱氣
上冲則柔軟寒者溫之熱者涼之肝
盛風熱交攻亦然

○抽防風

栢子 白及 各末乳汁調
冷顛上十日愈

○傳 顛門腫起定作風此候應知最是凶
忽陷成坑如盂足未過七日命須急

一 解顛 三十六

○傳 解顛 顛不 因母氣虛與熱多也錢
氏曰生下而顛不谷腎氣未成也雖
長必少笑更有目白睛多面皯白多
愁少喜也丹溪用八物有熱加酒炒
連煎服更以帛緊束及以白斂末付

○地黃丸

友在行 治年長頭縫開解不
合服此丸仍用炮南星末米醋調攤
緋帛上烘熱貼之

○三辛散

治頭骨不谷 細 桂 各
各 蚕 牡 右為末乳汁調敷乾每敷
之面赤即效
一龜胸傳三十七

○林 龜胸乃肺熱脹滿攻背膈高如龜蓋乳母多食酒麪熱物五辛炙燻而得之

○傳 瀉白散 治龜胸 桑葉黃水搗煨地 骨一其後半加茶行水煎

○林 百合丹 治龜背 大棗七天門心 杏去皮百合 桑葉炙通 甜葶藶

煨煨軟石膏各五 右為末煉蜜丸菜豆 大每服五丸食後臨卧熟水下 一龜背 三十八

○傳 龜背小兒生下客風入背逐骨龜背成龜背以龜尿點背脊骨節即平取龜尿法用蓮葉置龜於上尿自出或令向龜於明鏡則必尿出

○灸肺俞三五壯 一頂軟筋軟 三十九

○五加皮散 治頂軟頭不得正五加皮末酒調塗頂骨上

○健骨散 治久患痺疾膝虛不食及諸病後天柱骨壯 白姜末 蚕末二歲 見半錢薄荷酒調下服後用生筋散貼

○生筋散 木鱉六 苧草六 麻六 粗十 右為末手摩頸項上令熱津唾調貼之 涼肝丸即瀉青丸 治風熱頂軟

○貼頂方 治肝膽風熱致令筋軟 附姓蛙星分為末姜汁調貼頂軟處 次服防風丸凉肝丸

○防風丸 防風各天麻 蚕 蝎各五天 麻 風 參各一珠 雄 麝各二半

牛黃一 甘後 二石煉蜜丸薄荷湯下 小茸丸 治胎中受熱遍身筋軟

麝茸 茯苓 膝 瓜 菟絲 熟
地 飯 天麻 仲 青塩各等爲
末煉蜜丸如皂角子大每服一九塩
湯温酒化下

○羚羊角散

治面紅唇白腸熱項軟

羚羊 白苓 熟地 酸棗 虎脛骨酒
風 桂 芍藥各右爲末每服半錢
或一錢温酒或塩湯調服

一丁奚喘露四十

○林 小兒手足極細項小骨高尻削髮痿
臍突號哭胃階或生穀癥是名丁奚
麻熱往來頭骨分開反食吐虫煩渴
嘔噦是名哺露二者皆無辜種類之
疾最爲難治宜十全丹救之

○十全丹

青 陳法我根 白豆蔻
芎 五灵 板 蒼絡 五木 使君

子肉焙蝦蟇灰各三右爲末循磨
浸蒸糕丸麻子大每服二十九米飲
下有熟薄荷湯下

一脫囊四十

○傳 脫囊陰囊脛大墜下而不取也亦有
囊皮脫爛者 飯 連 芩 通
甘 右煎服

○囊爛者野紫菀葉面青背是爲末香油
調付濕則搽之皮脫而六露者以青
荷葉包之付藥後自生皮

一脫肚四十二

○傳 脫肚用東壁土泡湯先薰後洗
又五倍子爲末付而頻托入之
又驚頭燒存性香油調付三云燒烟
又浮萍存未乾貼患處

又草麻子四十九粒研爛水調作餅
子貼項上即收久洗去

○小兒瀉痢後肛門不收

赤石 伏龍肝等為末每用下錢傳
腸頭上

一 懸病 四十三

○聖慧方治小兒生十餘月後母又有
難令兒精神不喪身軀委靡為鬼病
用伏翼燒灰細研粥飲調下半錢日
四五服效

○龍膽湯 治孕婦被惡崇導腹中致

令兒病其証下利寒熱去來又治婦
人有兒飲乳後有娠孕兒笑此乳亦
作此病 北紫 膽 岑 桔 鈞
藤皮 芍 甘 炙 苓 各二錢 蝦 蟻 各二錢
紙 參 煨 右水煎得利則止量大小

多少與服

一 盤腸內吊 四十四

○釣藤膏 治小兒盤腸內吊腹中極

痛乾啼 乳 沒 木 姜黃四各
研木別十二箇去殼去殼右以木別膏和
四味更入煉蜜少許九櫻桃大煎釣
藤湯化下次服

○魏香散 蓬朮五真阿魏行先以温

湯化開阿魏浸蓬朮一日夜焙乾為
末每服半錢煎紫菀米飲空心調服

○一方 乳 沒各少許木一塊一味煎

數沸服

○茴香散 治盤腸氣痛 茴 炒木炮

附炮 金鈴子核蘿蔔子炒 補煨

白豆蔻煨右入鹽水煎

○木香散 治小兒盤腸氣痛不巳面

青手冷啼叫尿如米泔 川鍊子七箇

去皮枝色豆三十五粒同炒使君肉令豆黃去色豆不用

木 延 荷絡半右為末清米飲空

心調下量見大小與之

一齒四十五

○林齒不生蓋齒者骨之餘髓之所養稟氣不足則髓不能充於骨故齒久不生宜

○苦黃散 芎 飯 白芍 地 山

各一沉五耳仁石為末温鹽湯調服半錢仍用少許擦牙根

○一方 雄鼠糞頭尖者是每日用

一粒指齒根上至下下且當生

一斷乳四十六

○畫眉膏 施二箇燒雌黃 硃砂各

詩石為末入香油輕粉少許調勻候

甲胎著濃抹兩眉骨末自不喫乳未効再用即驗仍以墨調塗乳頭

一誤吞諸物四十七

○林治小兒誤吞錢燈人炭末白湯調方寸匕服即出

又服蜜一升即出

又濃煎艾汁服之効

○治小兒誤吞銅鉄物在咽喉內不下南燭根燒細研白湯調一錢服之

一諸熱證四十八

○林潮熱者胃熱也時發熱過時即退來日依時發熱此欲發熱也地骨皮散主

○壯熱者心熱也下向熱而不已甚則發驚癇導赤散主之

○風熱者肝熱也身熱而口中氣熱有

風証人參生犀散主之

○温熱者脾熱也但温而不熱瀉黃散主之

○心熱者視其睡口中氣温或令口面腫及上竄咬牙昏目者心熱也道赤散主之

○肺熱者手探日鼻耳枯湯主之

○地骨皮散 治虛熱潮熱亦治傷寒

壯熱 知 柴 甘 參 地骨

赤苓 半各等 右每服二錢姜一片

水煎

○道赤散方在夜啼之內

○生犀散 治小兒骨蒸肌瘦頰赤口

乾日晚潮熱及病後餘熱不除

大 燻 鱉 炙 門 莖 凡 犀 鎊 桑

參 苓 地骨 赤芍 柴 枳 各

瓜 一方有知母有痰加半夏右入青蒿少許煎

○瀉黃散 治脾熱目黃壯大口唇生

瘡眼生偷針等証 藶 枳 膏

甘 風酒各等分蜜 右為末温湯調

服

○加減瀉黃散 治濕熱胸膈煩悶皮

色如橘子黃白睛赤黃 連 苜 各

不栢 苓 枳 苓 澤 各三 右煎

服

○耳枯湯 治肺熱手措眉毛 桔 五

甘 兩 右水煎

○甘露飲子 治胃熱口臭齒齲腫痛

咽口有瘡赤眼及瘡疹熱盛者 枳

法熟地 門 枳 麩 苜 生地 天

門 苓 石解 甘 各右等分水煎

丁方加連

○驚風 附慢脾風 天藥 發搐
馬脾風 瘳風 癩証

○傳一驚風有二証急驚屬痰熱慢驚屬
脾熱

○夫急驚之候目闐不常之聲或驢馬
禽獸之哢以致面青口噤或聲嘶而
厥發過則容色如故良久復作其身
熱面赤引飲口鼻中氣熱大小便黃
赤惺々不睡蓋熱甚則生痰々盛則
生風偶回驚而發耳宜用錢氏利驚
丸瀉青丸抱龍丸宣風散五福化毒
丹等

○慢驚之證多回飲食不節損傷脾胃
以致吐瀉日久中氣大虛而致發搐
發則無休止時身冷面黃不渴口鼻
中氣寒大小便青白昏睡露睛目上
視手足瘳痲筋脉拘攣蓋脾虛則
生風々盛則筋急俗名天吊風者即
此候也治宜東垣黃芪湯錢氏釣藤
丸溫白丸丹溪參朮湯送下硃砂安
神丸之類

○急驚者十生一死慢驚十死一生
○有合病者身涼精神倦怠不吐不瀉
又能乳食而發搐者是半陰半陽合
病如傷寒半表半裏也有急驚涼瀉
不愈或與吐下藥太過變為慢驚有
慢驚溫補不愈或與溫補之劑太過
變為急驚

○利驚丸 治急驚風神效

天竺黃仁輕 黛絡一黑丑頭末半
右研勻煉蜜丸如梧桐子大一歲兒
一丸二歲兒二丸五歲三丸温薄荷
水下食後

○瀉青丸又名瀉治肝熱急驚搐搦等

証林長涼肝丸卷 大濕毒裏煨一

芎 梔 膽 飯 風各等右為末

煉蜜丸如芡實大每服半丸至一丸

竹葉湯下

○抱龍丸 治傷風瘟疫身熱昏睡氣

癱風熱痰實壅嗽又治驚風潮搐及

盛毒中暑壯實小兒宜時與服之則

免痰熱驚悸之証 雄二辰五

竺兩牛膽南星四兩焙末臘月納

麝半兩另研右為末煮甘草膏

丸如皂子大温水化下百日兒每丸

分作三服一歲兒半丸五歲二丸童

小二五九臘雪水者甘草和丸尤佳

一方漿水或新水浸南星二日煮三

五沸去皮取白肉切焙炒黃色為末

每八兩以甘草二兩半相破用水二

碗慢火煎至半碗去粗旋以酒入南

星末徐令研之入餘藥

○宣風散 治急驚風搐搦不定

煨枚陳 耳各五黑五四兩生半

末一右為末蜜湯調下二三歲兒半

錢四五歲一錢食前服

○五福化毒丹 治急驚風痰熱搐搦

等証 桔微玄參洗焙牙硝

兩參二苓五耳炙一銀鉞八片麝半

右為末煉蜜丸每兩分作十二丸一

歲兒每丸分四服薄荷水化下

奪命丹

治急驚不省人事目定直

視牙關不開唇白或黑者星半
各四不為末以姜汁和珍珠新自者作餅子焙乾
巴去油硃砂四金鉞 銀鉞格十輕
麝香半右為末麵糊丸如黍米大每
歲兒一丸燈心湯化下

鎮驚丸

鎮驚寧神退心熱夜啼化

痰止咳 珍珠 玳瑁 雄各三金
鉞十片膽星五牛麝香半辰三不右
為末麥麵糊丸如梧子大每服五六
丸薄荷姜蜜湯化下

錢氏安神丸

治邪熱驚啼心疳面

黃頰赤壯熱 疳 牙疳 白芩
山 寒 甘草各辰一腦字右為末
煉蜜丸如芡實大每服半丸砂糖水
化下慢驚參末煎濃汁化下

命金丸

治急慢驚風痰涎壅盛

半 星煨白附炮風各半雄 硃各
半犀牛腦 麝各半金鉞二十
右為末姜汁麵糊丸如麻子大每服
二五丸至一二十丸人參湯下慢驚
去腦

林 弓活湯

治急驚風角弓反張

參 芩 杏 膏各一麻去其桂
芎 藁 升 飯 獨各三右入姜
煎

人參湯

最能利驚 小柴胡加風

快

蠲蛇散

治驚風天釣心熱夜啼驚

癩 蟬六十箇 荆穗一甘蜜大煨
芩各五 蝎梢五十箇 右入白芩根少
許水煎

○神效萬金丹

治急慢驚風十無一

失 硃 輕各等 石研勻用青膏內
虫兒取於淨磁盞內以硃輕虫汁和
丸黃米大一歲兒一丸二歲二丸乳
汁送下取虫時七月初五日最靈

○傳 千金龍膽湯

治眼竟出腹血脉實

盛寒熱交作四肢驚動係諸疳驚等
証 膽 鈎鈎藤 柴 芩 枝
方 神 耳各三 螳螂七 大 五 右水
煎徐服

○一方 治急慢驚風

薄荷 寒

各半 黛 蚕 硃各 蝎二枚 牙皂
角 槐角各半 右為末燈草湯和乳
汁調時令灌之

○黃芪湯

治慢驚風之神藥也

慢驚風者
皆由久瀉脾 黃芪參行灸其半加白

方 一 右水煎

○益黃散

治胃中風熱

芩仁陳白

參 絡 一 白芍 七 生 耳 炙 耳 各 五
紗右為末水煎食前服

○錢氏白朮散

治積病和胃生津止

瀉 瀉 瀉 利 將 成 慢 驚 風 者 服 之 效
參 木 白 苓 甘 炙 木 藿 絡
乾 葛 仁 右 水 煎 ○ 丹 溪 加 山 扁
肉 蔻 煨 各 入 姜 一 片 煎 ○ 如 慢 驚 已
作 加 細 天 麻 各 一 蝎 三 枚 去 白 附
八 分 麩 同 煎 服

○一方

治慢驚風子母俱服

參

木 絡 一 苓 陳 絡 半 甘 苛 絡 二 半
天 各 七 細 分 蝎 去 毒 燉 右 作 一 煎 加
姜 三 片 水 煎

○鈎藤飲

治吐利脾胃氣弱虛風慢

驚 鈞鈞藤 半蟬 風 參 麻 蘇
蚕 炒 蝎 尾 炒 去 毒 天 麻 絡 二 甘 炙 等 各
粉 石 水 煎 溫 寒 者 加 附 半 分

○温白丸 治脾氣虛弱泄瀉瘦怯冷
痺洞泄及吐瀉久病轉成慢驚身冷
瘰癧等証 天 兩 蚕 炒 白 附 子 生 蝎
炒 去 毒 星 湯 泡 七 次 各 二 分 右 為 末 麵 丸 如
菴 豆 大 每 服 五 七 丸 至 二 三 十 丸 空
心 姜 米 湯 下

○灸法

○林 治急驚風灸前項一穴在百會前一寸如不
愈須灸兩眉頭及人中一穴各三壯
慢驚風陰証也吐瀉病久脾胃虛
困似搐不搐眉心顛會一穴在入髮際二寸
百會一穴各三壯
又治慢驚風灸尺沢一穴各七壯

一慢脾風

○林 小兒慢脾風証蓋為吐瀉損脾病傳
已極總歸虛度惟脾所受故曰慢脾
若逐風則無風可逐若鎮驚則無驚
可鎮但脾間痰涎虛熱往來其眼合
者脾困氣乏神志沉迷痰涎凝滯而
然尔

- 一 小兒頭雖熱眼珠青白而足冷
 - 二 小兒頭雖熱或腹脹而足冷
 - 三 頭雖熱或瀉而足冷
 - 四 頭雖熱或嘔而足冷
 - 五 頭雖熱或渴而足冷
- 已上五証忽然吐而作搐者名曰慢
脾風速與神脾益真湯每服三錢更
加蝎一枚
- 如口驚而搐者與前朴散每服三錢

更加附 前各半

○慢脾之候如身冷粘汗直卧如尸喘嗽頭軟二便不禁廬痰上攻呼吸氣兼者不可治

○且慢脾十枚二抵當生胃回陽如大衝脉在則取百會穴多救之

○補脾益真湯

治小兒胎稟怯弱外

實裏虛回嘔吐乳妨糞便青色而成慢驚風氣逆涎潮眼珠直視四肢抽搐或因變蒸客性而作或曰特拘驚嚇而作或曰慢服鎮心寒涼藥而作木 飯 參 芪 丁香 訶肉 陳 朴 姜 薤 麴 粳 甘 炙 藜 苓 木 桂 半 湯泡七次 附 炮各七分 金 蝎 去毒 微炒 一服用 右每服二錢姜一片棗一枚 水一盞半煎二分去滓服 飢極熱服

即訖心腹揉動以助藥力候一時久喫乳食○渴者去附丁葱加參苓○瀉者加丁訶○嘔吐者加陳丁半○腹痛者加朴良○腹脹者加朴丁前枳○咳嗽加前五味去附桂果葱○痰喘加前枳赤苓去附丁葱果○足冷加附丁朴○氣逆不下加前枳去飯附葱○惡風自汗加桂芪

○前朴散

治心腹結氣或嘔噦泄瀉

腹脹時痛或發驚悸 前 木

參 陳 良 薑 甘 炙 朴 製各石

水煎肚飢時服

○異方銀白散

治或吐或瀉涎鳴微

喘露睛驚跳 石 蓮 白 扁 炒 苓 各

不 參 天 白 附 炮 金 蝎 去毒 木 甘

灸 藿 各 半 陳 米 炒 香 右 每 服 一 錢 各

瓜仁七粒姜一片水半盞同煎服此藥助胃祛風慢驚通用

一天鉤証

○林小兒壯熱翻眼手足搐掣如魚之吐鱗皆由乳母過食熱毒旋即乳兒兼挾風和所致但解利風熱則應至而愈

○九龍控涎 治小兒蘊熱痰塞經絡

頭自仰名爲天吊 滴乳各研

半雄研臙茶 枯兀各一甘炙荆穗

炒棗丁百粒半赤脚蜈蚣一條酒右

爲末每服半錢至一錢人參薄荷湯調下

○釣藤飲 治天吊潮熱 釣藤 參

各半分喝 天各一犀 甘炙各右爲

末每服一錢水煎

一查搐

○男發搐目左視無聲右視有聲

女發搐目右視無聲左視有聲

○寅卯辰時發搐潮熱目上視手足動

搐口流熱涎頸筋急此肝木太旺當

補腎抑肝補腎地黃丸抑肝瀉青丸

○巳午未時發搐潮熱驚悸目上視白

睛赤牙關緊急口流涎手足動搐此

心火太旺當補肝瀉心補肝地黃丸

瀉心導赤散涼驚丸主之

○申酉戌時發搐潮熱搐而喘目微斜

視睡則露睛手足冷大便下淡黃水

此肺病當補脾而抑心時補脾益黃

散抑心導赤散抑肝瀉青丸

○亥子丑時發搐潮熱不堪搐而吐不

穩身熱溫無壯熱目睛緊斜視喉中

有痰大便銀褐色乳食不消多睡不醒當補脾抑心補脾益黃散抑心導赤散涼驚丸

傷風發搐口中氣熱呵欠煩悶手足動搖當發散大青膏主之小兒稟賦素怯者多病此

傷食發搐身體溫多睡多嘔或吐不飲食而搐當先定搐人退用白餅子後服安神丸

百日內發搐有真假二証真者不過三二夜必死假者發搐不為重真者內生驚癇假者外傷風冷蓋血氣未實不能勝邪乃發搐也奚知假者口中氣出熱也治之宜發散大青膏主之及用陰懸法與俗驗法

地黃丸 在行遲瀉青丸 在急驚導赤之內 普 在夜啼普之內

涼驚丸 膽 風 黛 各二 鈞藤 二 連 二 兩 腦 一 牛 麝 各 一 右 為 末 麥 麴 糊 丸 如 黍 米 大 每 服 二 五 丸 至 二 十 九 金 銀 湯 送 下

益黃散 在吐瀉之內 天 黛 各 一 白 附 一 半 蝎 尾 去 烏 蛇 肉 焙 乾 硃 砂 絲 麝 各 字 右 為 末 生 蜜 和 成 膏 每 服 半 皂 子 大 或 一 皂 子 大 月 中 見 糠 米 大 同 半 昔 膏 溫 薄 荷 水 化 一 處 服 之 五 歲 已 上 同 甘 露 飲 服 錢 本 有 天 麻 無 大 青

大青膏 治小兒傷風吐瀉心溫乍涼乍熱

雄 茸 甜 硝 寒 生 各 一 罌 金 行 菴 豆 粉 五 腦 行 右 為 末 蜜 和 成 膏 薄

牛黃膏 治熱及傷風壯熱引飲

苛水化下半皂子大食後服

○**耳露飲**在吐瀉之內○有餅子在吐瀉之內

安神丸在夜啼之內

○**塗額法** 麝 蜈蚣末 牛 黛各

字 蝎尾法去毒薄苛葉半右為末熟東

肉為膏新綿上塗勻點額上四方可

出一指許火灸手頓慰百日裏外兒

可用此及浴法

○**俗驗法** 治肥胎併胎怯胎熱

烏蛇肉酒浸焙末 白礬 黛各二天仁

蝎尾法去毒 麝半右為末每用二

錢水三碗帶葉桃枝一椀同煎至干

數沸溫熱浴之勿浴背

一馬脾風謂暴喘也

○**林** 小兒肺脹喘滿氣急兩肋動鼻竅

張悶亂嗽渴舌啞痰涎潮塞俗呼馬

脾風如不急治死在旦夕牛黃奪命散無價散主之

○**牛黃奪命散** 白毒 黑毒各半生

頭末 五不大 煇略 一右為末二歲兒一

錢冷漿水調下涎多加輕粉如無加

○**無價散** 治風熱喘促悶亂不安俗

呼馬脾風 珠二不 輕半 甘遂一不

乾為 焙 右為末每服一字用溫漿水少

許滴香油一匙點藥在油上沉下云

却漿水灌之一方加滑石二錢名油

墜膏

○**暴喘俗呼馬脾風**大小使硬且急下

之用牛黃奪命散上之次用白虎湯

平之

一 喉風

○**林** 眼閉口噤啼聲漸少舌上聚肉如粟

米漿吮乳不得口吐白沫一使不通
蓋由胎中感受熱氣流毒於心脾故
見於喉舌或為風邪所搏致之宜

○辰砂膏 辰砂研砂 牙硝各半
玄明粉二嶋 真珠各一麝字右為

朱油紙包自然成膏每用一二匙許乳
汁調敷乳頭上吮金銀薄荷湯下亦
可有潮熱甘草湯下

○單方 治初生七日口噤

牛黃一錢細研以竹瀝調下宗雁之
一癩証五十

○傳 凡治小兒五癩皆當隨藏治之並五
色丸治之五癩重者死病後甚者亦
死

○惠 風癩癢手足如癱或口喎食癩傷肉
食肢痛用弓反張大聲吐食方定

驚癩癢頭目吊口目或昏或邪視

痰癩似狂耳不聞目不視如夢如醉
或日發或經年發飲癩手足搖動食

不知飽或數日不食寐中發飽亦發
風熱驚駭不時旋暈潮搐吐痰沫忽

然倒地不省人事名曰癩

○林 先身熱掣癡驚啼而後發癩脈浮者
為陽癩易治

先身冷不驚掣不啼呼而病發脈沉
者為陰癩難治

○治風癩之法太卒行痰為主 星
半 麥 連 尋痰尋丸多此治

○五色丸 硃 珍珠各五 水銀二雄
三黑鐵 二兩同 石煉蜜丸如麻子大
每服三四丸金銀薄荷湯下

○**硃砂滾涎丸** 治五癇 硃 白礬

生赤石 硝石各等 右為末研蒜膏
丸如菜豆大每服二十九丸食後荆芥湯下

○**參朱丸** 治癇大神效 參 蛤

朱砂 右為末猪心血丸如梧子大每服二十丸金銀湯下

○**灸法**

神庭一穴 在入髮際五分 治角弓反張半癇

吐舌灸三壯

少衝一穴 在手小指端內廉 治驚癇吐舌沫

出灸三壯

前頂一穴 在入髮際三寸五分 治驚癇冬三壯

長強一穴 在脊腰端 治驚癇冬五壯

○治急慢驚風危証及諸癇瘳病 綳角等兩手足大指甲角縫半申半肉之

間灸三壯先足後手或髮際或顛會

○**疳証** 五十

○丹溪曰小兒嬌嫩飽則易傷飲食不

調其肥無節或嬰幼飲乳粥飲太早

五疳病成甚者胃陷喘噦直瀉腫滿

腹腸脹攻肌肉光紫最難治

五疳 并雜疳

○傳一

肝疳橫頭樣目白膜遮睛汗流腦熱

合面卧筋青髮立肉色青黃羸瘦當

補肝宜地黃丸或生熟地黃湯

○心疳面黃臉赤煩滿壯熱口瘡虛驚

當補心宜安神丸或黃連丸

○脾疳身黃肚大吃泥土脹滿氣乘利

下酸臭當補脾宜益黃散

○肺疳咳嗽氣逆多喘樣鼻咬甲寒熱

口鼻生瘡當補脾此虛者神母也且益黃散或清肺湯主之

○腎瘕躄瘦身有瘡疥寒熱時作頭極熱足冷如木當補腎宜地黃丸

○筋痺濕血而瘦當補肝地黃丸

○骨痺喜卧冷地當補腎地黃丸

○內痺目腫腰脹利色無常或沫青白漸而瘦弱此冷証也宜木香丸

○外痺鼻下赤爛自揉鼻頭有瘡不結痂遠耳而生當治瘡爛宜蘭香散白粉散

○熱痺潮熱如火大便乾澀肌肉黃瘦在自宜胡黃連丸

○冷痺時久泄瀉虛汗如雨不止宜至聖丸

稻甲大蘆薈丸

○此疴食肉太早或腸胃停畜肥膩其証多啼嘔吐清水腹痛脹滿唇紫黑腸頭及齒疴宜下疴丸

○鼻疴上焦壅滯疴虫上宜鼻疴赤疴壯熱啼疴皮毛乾焦肌膚瘦削鼻下連唇生瘡赤爛宜麝香散

○走馬牙疴牙齦潰爛由藏府虛熱乳食不調致成疴病內有疴虫上宜齒疴牙腫爛消黑口多臭氣

○尿白乳哺失節脾傷便濁白色久而成疴宜茯苓散地黃丸在疴之內

林 生熟地黃湯

生地 熟地 芍 赤苓 枳 杏 連 半 天 耳 灸地骨 飯略等 右每服二錢水 一盞姜二片黑豆十五粒煎半盞服

安神丸 在驚風治邪熱驚叫心海面
黃頰赤壯熱

益黃散 在吐瀉之內 治脾胃虛寒脾痺
黃腹大食土口臭生瘡

清肺湯 治肺痺咳嗽鼻臭咬甲寒
熟 桑後五蕪 前 芩 飯 天

門 堯 風 赤苓 桔 生地
甘後各二右每服二錢水一盞煎服

木香丸 治瘦冷疰 木 青 煨
菴 各二麝一續隨一去油蝦蟇 大者三
右為末煉蜜丸如棗豆大每服三

胡黃蓮丸 治肥熱疰 胡連 川
連 各半 硃砂半 右為末和以入猪

膽內用泔漿煮以枚子置餅子上用
線鈎之勿著底俟一炊時取出研入

蘆薈麝香 各一分 飯丸如麻子大每服
五七丸至一二十丸米飲下林有青

蘭香散 治外疰鼻下赤爛 蘭香
葉 各二 銅青 輕粉 各半 右為
末乾信之

石粉散 治疰癩 烏賊骨末 白
芫末 三輕粉七 右和勻先用清漿水
洗瘡拭乾信之

至聖丸 治冷疰時人泄瀉虛汗不
正 木 丁香 朴 史若

肉 煨 陳 菴 濕 煨 右為末麵糊丸如
麻子大每服七丸食前米飲下

大蘆薈丸 治疰疰 蒼 蕪 木
黛 煨 連 各一 蟬退 二十 胡連 伍

麝 計 右為末猪膽二箇取汁浸糕丸

月 伍 四

麻子大每服二十丸米飲下

○下虫丸 治蛇瘴 新白苦練根皮

酒浸 綠色貫眾 木 桃 蕪 各

雞心栴檀三風炒一輕拌乾蝦蟇

三史煨取醋右為末麵糊丸如菜豆

大每服二十丸天明用清肉汁下加

飯連絡半治脊痺及痔瘡

○麝香散 治鼻痔鼻下連唇生瘡亦

爛 麝半 雄 升各半 枯礬五右

為末人乳調敷

○茯苓散 治尿白久而成瘕亦心膈

伏熱萎而得之 稜根莪 縮 赤

苓各五 青 陳 滑 耳各二右

為末每服一錢麥門冬灯心煎湯調

○布聖丸 治冷熱痔瀉 使去

傳 去壳朝

連 川連 白蕪蕪 各二兩 乾蝦蟇

五箇酒麝半右為末蝦蟇膏和丸如

煮成膏 麻子大二三歲兒五七九已上十丸

至十五丸人參湯下

○香蟾丸 治疳消食積虫積肉積及

治腹脹大 稜 莪 青 陳 曲

炒麥芽曲 炒膽 枳各五 木 仁 川 練

子去尖 胡連 川連各四 木 兩 乾

蟾 石為末以乾蟾用醋煮成膏

和藥如乾再加醋丸如麻子大每服

十五丸清米飲送下

○薑薈丸 治疴氣腹脹骨熱 薈

木 枳各二 蝦 酒浸炙 連 各一 蕪 去

青 陳各五 巴 三七粒去殼同 右

為末宿膽汁丸如小豆大二三歲兒三

十九米湯下

又方 治疳積腹大 胡連 魏

各五 疳積 四粒 門子 川連 炒 各 右 為 分

未猪膽汁和丸如麻子大每服三十

丸白木湯送下一方有苦荬

祖傳柘柳丸 治疳疾積塊腹大有

重等証 柘柳 稜 煨去毛 莪 醋炒 各

青 煨陳 半斤 各 蕪 二 个 雷 五 去 壳 鷓 風

三 个 漆 五 斤 炒 木 三 个 不 良 土 一 个 墜

縮 一 麥 芽 麩 五 胡 連 三 甘 炙 三

麩 五 个 炒 山 查 肉 五 右 為 末 醋 糊 丸

如菜豆大每服三五丸空心淡姜

湯下

五疳保童丸 治五疳 五臟之 蓋小

兒骨肉輕軟腸胃微細如乳哺有節

則藏府相調或乳母寒溫失理飲食

無常醉飽喜怒及小兒百晬以後五

歲以前乳食漸多不挾生冷好食肥

膩其酸之物即成五疳並皆治之

連 白鱧 草龍膽 青皮 五倍

蟾頭 棟根 夜明砂 炒 麝

黛 天漿子 熊膽 蒼 胡連 各

分右為末糯米糊丸麻子大一氣見

每服一丸米飲下日三服

一方有乾蝸牛微炒一分

化虫丸 治因疳生虫五心煩熱

蕪 連 麩 炒 麥 芽 等 分 右 為 末 麩

糊丸黍米大空心米飲下煉蜜丸名

蕪蕪丸氣豆大每服十九至十五丸

水湯下

肥兒丸 治諸疳多回關乳與食太

早回患泄瀉胃虛虫動且漸羸瘦腹

大不能行髮堅發熱無精神 連

麩酪一麥芽炒五木仁煨仁葱麩史君肉各五石為末麵糊丸九羅子大每服三三十九量見歲數加煨熟水下

一方 治諸痔 便桶中蛇河水浸二百新瓦上頓放外以火煨乾為末與見亦治走馬痔貼患處良

蝦蟇丸 治五痔腰脹面黃身瘦寒熱喫泥採鼻咬甲頭髮不長肌肉瘡癬吐乳食利色不定日漸黃瘦

蝦 史取皂角各十焦二兩半膽四雄二兩右為末水糊丸粟米大二歲七九乳米飲下

一方 治疳病 煨箇史肉七陳莎絡二輕下右為末每服一錢飯湯空心調服同肉食亦可次日有虫

後發其中

灸法 痔瘻灸翠尾骨上三壯

腸滿瀉利積聚腹痛痰涎寒熱瘦黃灸脾俞二穴各七壯

一無辜痔毒 一 腦後項邊有核如彈按之轉動而不痛其間有虫如米粉不速破之則隨氣流散滯藏府以致肢麻作瘡便利膿血壯熱羸瘦頭露骨高皆由氣血虛憊所致用三稜鐵刺破膏藥貼而愈

小兒衣服勿晒月下被惡鳥羽屎落遂成無辜之疾

林 蚶蝮丸 治無辜痔毒項邊結核如瘰癧按之不疼兼治諸痔一服虛熱退二服渴止三服瀉利住 蟬蝮枚

夏日滿渠中取腹大不跳右取蠶虫
不鳴者其瘰癧落多

一杓置桶中以尿浸之桶要乾不令
虫走却將蟻蜂打殺投桶中住虫自
食一日夜次以新布袋盡包繫定置
急流水浸一宿取出瓦上焙乾為末
入麝香一字粳米飯丸麻子大每服
一二三十丸米飲下

○**下方** 白蕪荑 連 胡連 黛綠

小蚶蚊 去足用 右為末糊丸如粟米

大每服二三十丸食後米飲下

一疔瘡 附 丹毒 白禿 牙疳 鼻

○**應** 自按提至成童潮熱發瘡乃疔氣使
然疔虫蝕其肌膚遍身熱瘡發瘡無
已

○**小兒** 一二歲頭及遍身生瘡皆因在
胎中父母交合所致名曰胎疔生用

化毒丹消毒飲却用父小便以鴉翎

刷洗青黛細末乾搽之効 一方並

○**平血飲** 治諸般瘡毒 敗毒散加

生姜主地門久薄苛煎服 一方有薑

○**甜瘡** 多生面部耳前令乳母嚼白米

成膏臨卧塗之三五次効忌魚動

風物

○**丹** 將走不定欬赤腫痛 寒水 膏

連 栢 右為末水調刷患處

○**一方** 青黛 土朱 右為末并水

入蜜調敷

○**下方** 黃丹 用麝香水調刷

○**丹** 毒腫痛如火 大黃 朴硝 等為

末水調塗立効

○**蓋毒散** 一名蓋毒散方見 治用毒赤

腫身熱如火

○小兒赤癩熱毒鬱結肉間發皮厚赤

如瘤宜生地 通 荆 芍 桃

苦寒帶表之劑外 芩 翹 連之煎

湯入芒硝泡洗

又芭蕉根汁塗之

○小兒遍身赤腫乃久伏熱毒之氣防

其入腹之腎則死

○防已散 已 伍 村 硝 犀 芩 莖

升 各 半 右 入 竹 葉 五 片 水 煎 與 之

○治百統瘡及髮中生瘡取熊脂付

之

○又搗榆白皮醋和塗之虫即出髮即

生

○又白髮不生濃煮陳香露汁止許

和胡粉傳上

○又小兒頭無髮鯽魚燒末醬汁和傳

之

○金線錠子 治走馬牙疳凡貼疳

瘡無如此藥最效 人言行雄二不

乾胭脂得飛羅麵四 右為末水和用

米泔洗患處貼

○銅青散 治口内生疳瘡牙齦潰爛

並疔牙疳 銅青 各一 麝香 右為末

擦之仍服

○蟾酥丸 治諸疔殺虫止腹痛退虛

熱 蟾 一 枚 酥 油 胡 連 川 連

膽 鍊 木 史 君 去 燕 各 一 麝 香

巴 十 四 粒 拉 回 此 陳 各 一 右 為 末 猪 膽

汁 丸 或 糊 丸 青 黛 蓬 朮 紫 蘇 湯 下

○一檢金散 治走馬牙疳 黃丹 飛

白礬 飛 青 塩 飛 草 綿 灰 麝 鈔 石 等 分

爲末先溫水洗淨乾貼

○**蟾酥散** 治疔馬牙疳齒齦臭爛及

唇鼻一應疔瘡 蚶蚶燒連 黛

右等分爲末入麝少許敷之

鼻
○**青牛散** 治牙疳 蝸牛大者燒

焦半栢一麝半右研勻生薑湯洗梔

乾穉翎點之

○**桃葉湯** 治天行頭面鼻疳 桃葉

二搗研小五升煎去粗洗五七次安

○**麝香散** 治鼻母及鼻下連唇生瘡

赤爛 麝半雄 升麻各栢九

五右爲末入乳調化

一方 熊膽湯化塗鼻中

○**小兒丹頰** 柳葉一水三煮三去滓洗日

七八度

○**小兒癬瘡** 蛇床末和猪脂塗之

○**諸瘡** 小兒頭面身上諸瘡蛇蛻末和猪

脂傳之

○**耳瘡** 小兒耳後月蝕瘡胡粉東壁土末

塗之

又黃連末傳之

又蛇蛻尿猪脂調傳之

又黃連栢九末傳之

洗瘡癰 止 苦參 腹等煎湯淋

洗心妙方

又栢 甘 馬鞭草 連鬚葱 荆

等木煎洗

○**疥癬** 赤芍 連 蛇床等輕紗石

爲末香油調敷

○**痘疹** 五十一

一辨真疑

○傳 小兒痘疹太抵與傷寒相似發熱煩躁臉赤唇紅身痛頭疼乍寒乍熱嘔噴呵欠喘嗽痰涎始發之時有因傷風傷寒而得者有時氣傳染而得者有因傷食發熱嘔吐而得者或目窠驚搐如風之狀或口舌咽喉肚腹疼痛或自汗或下利或發熱或不發熱證候多端卒未易辨必須以耳冷尻冷驗之蓋瘡疹屬陽皆藏無証其耳與尻俱屬腎故腎之所部獨冷又不如此其耳後有紅脈赤絡為之真也

○傷寒男婦重面黃女面赤喘急憎寒口中氣熱呵欠煩悶項急也

○痘疹腮赤多嚏噴悸動昏倦四肢冷尻冷

○傷食大便酸臭腹堅不消化畏食耳

下之

○潔白曰傷風皮齒拘急鼻塞痘疹睡中驚喘欠嚏

一辨內外因并疑似

○凡瘡欲出而未出回發者多是外感風寒之邪而內發心熱也宜惺人散或升麻葛根湯參蘇飲

○瘡欲出而未出而吐利者是中焦停寒或挾宿食宜四君子湯加縮陳或和中散○如挾宿食者用紫雲膏

○凡瘡疹覺身熱似傷寒疑似未明先與惺人散或參蘇飲○熱甚者升麻葛根湯人參敗毒散○若見紅點者便忌葛根湯恐得表虛也

○林 古方以升麻葛根湯治瘡疹已發未發世習以為常蓋葛升麻性皆寒損

胃氣凝血脉不能發起

○傳凡熱不可驟去宜輕解之蓋痘瘡無熱則不能發起比之種痘值天時胎暖則易生

○凡瘡疹初欲出時身發熱耳尻冷呵欠咳嗽面赤必是出痘之候宜升麻葛根湯加大力子山查痘必稀而易愈

一治法

○傳痘未出已出之時辰砂細末看兒大小或一錢或半錢蜜水調服多者可少者可無

又絲瓜近帶二寸連皮子燒存性細研砂糖拌乾吃入硃砂心妙

○痘瘡發熱之時以惡實子為末蜜調貼額門上免眼障之患

○痘初出須看胎前若稠密急宜服消毒飲加查艾酒洗紫草減食者加參

○痘初出之時色白者便當大補氣血參木芪芍升葛甘木丁飯酒白芍如大便泄瀉加訶藜

○初起發時自汗不妨蓋濕熱薰蒸故也甚者當以參芪等實表之藥防其難醫也

○初起發時煩躁語狂在湯引飲若飲水則後來壓不齊急以涼藥解其標如益元散之類或去桂五苓散

○凡痘瘡已出可少與化毒湯出不快者加味四聖散紫草飲子紫草木香湯快斑湯絲瓜湯之類

○瘡出稠密甚者人參敗毒散犀角地

黃湯

○凡痘瘡疎則毒少密則毒甚宜以清涼之藥解之酒炒芍連之類雖數服亦不妨庶無害眼之患

○治痘大法活血調氣安表和中輕清消毒溫涼之劑兼而治之此平治之法也溫如荑飯木輩

涼如前葛升輩伏以白芍芍枳桔卷通紫草之屬

○顏色正者以前法不治則安將成乾脚色淡者宜助血藥散芍酒芍之類或少加紅花以潤血色將成乾之際脚色紫者屬熱用涼藥解其毒升麻葛根湯炒芍連及連翹之類甚者必用犀角蓋犀角大解痘毒

○消息大小便如小便赤澀者人違翹湯甘露飲大便秘結內煩外熱者小柴加枳殼或少服四須清涼飲子大便黃黑色其毒氣已盛不可多與熱劑但少用化毒湯可也若二便一有秘結則腸胃壅遏脈結氣滯毒氣無從發泄目閉声啞肌肉黧黑不旋踵而變矣

○太執當利小便宜五苓散導赤散○小熱當解毒且消毒飲四聖散

按陳氏木香散異功散乃從治之法又謂之執因執用也蓋血痘瘡執毒佛鬱于內而不得起發故用下附木蔻桂等辛散劫鬱之劑一二服劫而開之使鬱于內者盡因藥氣而發越于外故陷伏灰白色者皆翕然紅活凸綻而內無遺邪矣切勿過劑如一二

服後劫不起者亦不可多與多則反其毒轉增黑爛咽閉声沉而死

○凡痘瘡爐灰色白濁者作寒紫黑色者齊湧者煩躁者作熱○黑屬血熱涼血爲主○白屬氣虛補氣爲主○中黑陷而外白起得遲者則相兼而治

○凡痘瘡氣虛者參朮加解毒藥血虛者四物湯加解毒藥酒炒芩連各解毒

○凡痘瘡雖分氣血虛實大抵多屬氣血不足有挾邪邪而實者少加防風等藥

○瘡乾者宜退火此用輕清之劑荆芎升葛之類○瘡濕者肌表間有濕也宜瀉濕祛風之類蓋風藥能勝濕也

○咽喉痛者如聖散鼠粘子湯

○喘滿氣壅者麻黃黃芩湯

○煩渴者甘草散烏梅湯

○下利嘔逆者木香理中湯

○凡痘瘡當分表裏虛實吐瀉少食爲裏虛不吐瀉能食爲裏實裏實而補則結雍毒陷伏倒靨灰白色者爲表虛紅活凸綻者爲表實表實而復實其表則潰爛而不結痂也表虛不起發者或用燒人尿驗

○黑陷甚者用燒人尿別用無病小兒糞燒存性蜜水調服

一方用人猫猪犬四糞於臘月燒灰名萬金散

○黑陷二種因氣虛而毒氣不能盡出者酒炒芪朮草人參等藥

○陷入者，加味四聖散更以胡荽酒薄
付其身，厚付其足，噴其床帳衣被，
以厚綿衣蓋之。若未起，獨聖散入木
香煎服。若其瘡已黑，可用宣風湯加
青皮。

錢氏云：黑陷青紫者，百祥丸下之，不
黑者慎勿下。

又云：下後身熱氣喘，欲飲水者可治。
水穀不消，或寒戰者為逆。

又云：百祥丸恐太峻，當以宣風散代
之。瀉後溫脾，用參苓木等，朴木甘草
半為媿。

○瘳擗者，實則脈有力，氣壯，虛則脈無
力，氣怯。

○虛瘳，實表之劑，加涼血藥。

○實瘳，如大便不通者，以大黃等藥少

與之，下其結糞。氣怯輕者，用淡蜜水
調滑石末，搗翎刷瘳上，潤之。

○將瘳時，金白色如豆殼者，蓋因初起
時飲水多，其瘳不齊，名曰倒瘳。不好
宜服實表之藥，及消息一便。

○瘳已出而聲不變者，形病也。瘳未出
而聲變者，氣病也。宜補肺散，加生芪
瘳出而聲不出者，形氣俱病也。身溫
者，宜解毒防風湯。大便閉者，宜當歸
丸。

○形氣俱病，稟賦素弱者，宜預服十奇
散，倍取少加木香煎服。

○陽証足脛熱，咽紅，大便秘，小便澀，渴
不止，氣急，脈洪，數已上證，不可服熱
藥。瘳疹一發，便蜜如蚕種布者，宜清
表連翹升麻湯。瘳出不快，清便自調。

知其表升麻葛根湯若瘡乾黑陷
身不大熱大小使澁滯是熱蓄於內
宜煎大黃湯下宜風散如表大熱者
不可下黑陷甚者百祥丸若瘡已發
稠蜜微喘湯飲飲水且微下之當取
丸及龐氏地黃膏外以黃柏膏塗面
佳

○陰証足脛冷腹虛脹糞青面飢自嘔
乳食目睛青脈沉微已上証不可服
寒藥痘出四肢逆冷或自利宜急溫
之異功散附子理中湯調中丸
瘡瘡平塌灰白色不汎此正氣不足
宜十補托裏散倍芪加附或四肢厥
逆時檣檣宜溫之異功散加青風或
和中散去葛藿加附桂

○肺氣不足之証自汗聲不出瘡頭陷
塌不定肥並宜十奇散自汗倍芪聲
不出倍桔

○心血不足之証灰白色根窠不紅不
汎汎並宜芍散湯加芍紫草紅
一痘瘡日數輕重

○痘瘡一二日始見微冷欲出如粟黍
米或如菘豆或如冰珠光汎明淨者佳
○四日五日大小不等根窠紅汎者
輕稠蜜脂頂灰白色汎而瀉者重

○八日九日長定肥滿瘡蠟色者輕寒
戰悶亂腹脹煩渴氣急咬牙者重之
至也

○十日十一日瘡當結靨如欲落之
時將愈

○十一日十三日當靨而不靨者為逆
身熱稍利之以防其餘毒身不壯熱

或腹脹或瀉湯用十二味異功散救乏

一痘出不快者有五証

○一証天時嚴寒為寒所折不能起發宜散寒溫表紅斑初見宜用五積散正氣散參蘓飲調解散木香散

○一証炎暑隆盛煩渴昏迷瘡出不快宜辰砂五苓散煎生地門冬調服身熱甚者小柴加生地煩渴而便實者白虎加人參湯輕者人參竹葉湯加生地前服

○一証服涼藥損傷脾胃或胃虛吐利當溫中益氣宜理中湯吐利甚者加附或異功散木香散豆蔻丸

○一證或成血疱一半尚是紅點此毒氣發越不透必不能食大便如常者宜半溫裏半助養之劑用四聖散加減及紫草木香湯絲瓜湯阮氏萬金散湯氏安斑湯

○一証外實之人皮膚厚肉腠蜜毒氣難以發泄因出不快宜消毒飲透肌散如大便秘於消毒飲內加大黃梔子煎服瘡出太稠宜犀角地黄湯解毒防風湯○血氣不足十奇散咽噎不利如聖湯加枳芎○口中氣熱咽痛口舌生瘡宜甘露飲子

一解肌清熱之劑

○傳 王氏惺人散 治風熱瘡疹變蒸吐熱疑似之間皆宜服 木炒枯 細參 苓 甘草 桂枝 三石入薄芎三片煎

○升麻葛根湯 治傷風身熱未明痘與

不痘宜服如既出不可服 葛升
芍 芩 炙右等分水煎

○木香參蘓飲 參 蘓 桔 葛

前各四分 陳 苓 各半 枳 三分 木 一分
半分右作一服加生姜三片

○解毒防風湯 風 骨 芪 芍

荆穗 鼠粘 各半 右水煎或為末湯
調下

○消毒飲 痘疹欲出及未出已出熱

未解急宜服之 牛 三分 荆 一分 芩 半
生風 半 右水煎加屋末末末

一溫表補氣血之劑

○十奇散 即托裏十補散 芪 參

飯 各二 枳 各一 桂 三分 芎 風
芩 芷 各一 右為末每服一錢或二
錢溫酒調下水煎亦可

○補肺散 膠 一分 牛 半 馬 半

芩 二分 杏 三粒 糯 一分 加 芪 半
右水煎食後與之

○芎飯湯 飯 芎 右等分水煎

一散寒溫表之劑

○五積散 芷 芎 各五分 桔 一分 芍 苓

芩 飯 桂 半 陳 去 枳 去 麻 去
節 半 蒼 一分 姜 四分 枳 四分 右除桂枳二
味別為末外下十三味細切慢火炒

令轉色攤冷次入二味末作一服水
一盞半入姜三片煎一盞去粗熱服

○正氣散 朴 半 各姜製各陳 藿

藳 木 各半 芩 各三分 右作一服加姜三
片大棗一枚水煎

○調解散 或治食傷痘黑隔 青 陳

枳 炒 桔 炒 參 半 芎 通 葛 各

分甘 蕪各二 右作一服加姜三片
東一枚一方有紫草糯米
一補中溫養之劑

○四君子湯 參 木 苓 各一 甘 半
右加宿陳名六君子湯

○和中散 朴姜製炒 木伴姜炮 甘各
二三右加姜一片水煎

○理中湯 參 甘 炙 木 卷炮名 右作
一服加炮附甚者五分

○木香散 木 腹 參 桂 青 赤 苓 前
訶煨去半 丁香 甘各三分 右作一
服加姜三片棗一枚水煎

○異功散 木 飯酒洗 桂 木 麩 苓 陳
朴 參 藜麩果 丁香 干 附炮各
右作一服加姜三片太棗一枚水煎

○調中丸 木 妙 參 甘 炙 各 姜 炮 四
右為末煉蜜丸如棗豆大溫水食前
送下

○肉豆蔻散 木 縮 白 龍 骨 訶
肉各半 赤 石 枯 瓦各七 殼半兩麩
右為末麩糊丸如黍米大每服三十
丸異功散送下

一清肌涼血之劑
○犀角地黄湯林 瘡 疹 出 大 盛 者 以 此
鮮之 犀 鎊 生 地 牡 赤 芍各等
右水煎

○連翹升麻湯即升麻葛根湯
加連翹一分
生 地 熟 地並酒洗 天 門
麥 門 把 毛去 枳 殼 芩 鮮 茵
甘 各 等 右 水 煎

○紫草湯 名紫草木香湯 治痘出不
快及大便自利 紫 木 苓 木

各一 其伴右作一服入 粳米百粒

○四聖散 治痘出不快及倒靨

紫草茸 木通 各一 枳 半 其 半 右

水煎

○透肌散 名化毒湯 每服三

紫草茸 緣升麻 其 各 右 水 煎 或

與消毒飲同煎尤效

○如聖湯 治身熱如火 頭痛頸赤 痘

瘡口出未出並宜服 白芍 升

葛 各 二 其 紫 草 通 去 節 各 右 每

服 二 三 錢 姜 三 片 葱 白 一 根 同 水 煎

服 ○壯熱心煩加參 赤苓 膏

門

○紫草木通湯 治痘出不快 紫

參 通 酥 苓 類 米 各 等 其 半 右 水

煎

○快透散 治証同前 紫 蟬 蛻

參 通 酥 芍 其 各 等 分 右 水 煎

○連翹散 治痘瘡發熱 翹 風

梔 其 各 等 分 右 水 煎

○升麻湯 治痘在面 升 行 犀 射

干 芩 酒 浸 參 其 各 半 右

一 和 解 之 劑

○小紫胡湯 紫 半 不 芩 參 各 一 半

八 其 半 右 加 姜 二 片 大 棗 二 枚

○人參白虎湯 名化毒湯 知 六 膏 劑

二 其 二 粳 米 加 參 二

○竹葉湯 門 一 兩 參 其 各 二 不 半

四 不 竹 葉 二 右 每 服 五 錢 內 粳 米 三

十 粒 加 膏 二 兩 八 名 竹 葉 石 膏 湯

○五苓散 沢 半 兩 赤 苓 猪 苓 各

兩 桂 附 右 爲 末 白 湯 或 清 米 飲 調 服

或加姜棗煎服亦可加辰砂辰砂五苓散

一通便之劑

○傳紫霜丸友在夏蓋之內

○當飯丸疥瘡欲行大便宜此飯

兩連半升大二升甘二升右先以當

飯熬成膏入三味末為丸如胡椒大

三歲已下兒十九食前清米飲下漸

加以利為度

○宣風散

枳殼陳

甘各半

黑丑四兩

收頭末

右為末蜜湯調服林氣快者

加木香一先下里糞次下宿糞後以

四君子湯加朴木陳米湯服和胃良

久糞黃瘡自出透

○百祥丸

紅牙太戟

險乾水者軟去骨日乾後納汁

中煮汁盡焙

右下味蒸餅丸如粟米

大每服三十九赤芍麻湯下

一消毒攻口舌

○加味犀角消毒飲

治毒氣壅遏壯

熱心煩痘疹雖出未能勻透口舌生

瘡不能吮乳

牛三兩研荆穗 門

桔各五甘一兩風 升各杜犀三右

水煎

○射干湯

治痘疹後身熱大便硬口

舌生瘡咽喉腫痛 牛一兩升 甘

射干各半右水煎

○五福化毒丹

治瘡疹餘毒上攻口

齒 參 玄參 黛 甘 牙硝各

各半 苓 桔各一兩 腦各半 下方

無腦子有金銀箔右為末煉蜜丸每

兩作十二丸一歲兒一丸分作四服

○口生瘡者蜜黃梅汁飲之

一痘疹入眼忌藏盤鮮醬濕更炙燻吹氣及一切發風動火之物

○傳傳決明散 草決明 赤芍 天花

甘格等為末食後茶清調下

○接雲散 卷 風 柴 甘各為

禾水煎服或薄荷汁茶清或菊花苗

煎湯調皆可

○林 蟬菊散 治斑瘡入眼或病後生翳

障 蟬 白菊花各等右每服一錢

水一盞入蜜少許煎乳食後與之屢

驗

○決明丸 治痘瘡入眼雖赤白障翳

遮睛但瞳子不陷者可治 石決明

煨芍 栢各一蒼五不加黃連右為末

用兔屎爛爛和丸如菉豆大每服二

二十九食後臨卧米泔下

○花無比散 治瘡疹入眼 苓

甘炙風各四石決研水蒼各卷

飯各三赤芍十蒺藜炒皮半斤蟬頭

足翅各十蛇蛻炙一右為末食後

米泔調服茶清亦可

○洗方 黃連剉白滑石研銅青研石

絹包泡湯候溫洗眼

○治出瘡眼內有翳 輕粉 黃丹各

分右研勻左眼翳吹入右耳內右吹

左

一痘後餘毒

○瘰癧者毒氣毒出而不得出流於脾

經則場發四肢手腕膝臏腫痛或頭

項胸脇赤腫宜消毒飲或五香連翹

散釐之未成膿者小柴胡加減用之

重者或面赤便秘或渴嗽睡驚尿赤

洗十六味流氣飲加附或加大黃

○如稟受怯弱醫後面青不能飲食身
軀倦怠無熱證與調平藥安養之不
可一於解利也虛則十補湯加枳桔

○痘後壅毒不問發於何經初起紅腫
時即用黑棗赤三豆以嚴醋浸研漿
以鵝翎刷之效

○必勝膏 馬齒莧汁猪脂石蜜右共
熬為膏塗腫處

○蠅子水 蠅子活者以水養五日取
水洗手面漸生肉無
痕

○毒氣入大腸則便膿血或下腸垢或
大便秘結宜用犀角地黃湯身煩熱
湯且黃連解毒湯熱盛者小兼氣湯

下利者黃連解毒湯黃連阿膠丸駐
車丸

○痘後二旬不大便其糞燥作痛用大
芒枳巴等藥及蜜導及服香油一匙
不通令二婢以真麻油含口內用小
竹筒內敷道中吹油入腸內須臾即
通

○消毒飲方在前

○五香連翹湯 乳木沉丁
翹射干升通桑奇獨
大麝各等水煎

○小柴胡湯方在前

○愈後痂已落其痂黑或凹或凸尾粉
輕粉石研倍脂調塗

○十六味流氣飲 參 芪 飯絡一
芎 桂 朴 芷 苈 風 烏

茯苓 枳 木 絡半 桔三 蘇半
右水煎

右水煎

右水煎

氣血虛而自利者加熟附大使實加
天黃

○干柿湯名千奇散

○黃連解毒散連行芍柏施各三右

○不羨氣湯大杜朴 實各三右

○小黃連阿膠丸白豆一莖 苓

訶炮去核連微炒 右為末阿膠一兩醋

煎和丸如粟米大一歲兒十粒米湯下

○駐車丸連三膠 飯略半姜一兩

右為末醋糊丸米飲下

○惠若又痘疹利再作瘡疹者此餘毒未
盡也宜解利之氣虛者未可解利

一 中地風

○惠痘疹愈後忽遍身青或黑手足厥冷
口噤逆喘如喘者此名中地風蓋瘡
疹在愈榮衛尚弱而暴感時令寒暑

風雨地氣毒氣襲虛而入致之宜消
風散二才入蟬蛻末二才不分三服酒
生姜薄荷汁數點湯調二三服立醒
或少汗而解或再出癰疹而愈

○消風散 荆 茸各陳兩參 苓

蚕炒風 芎 蟬蛻炒藿各二升

羌而右為末

一 斑痧水痘附濕毒發斑

○林小兒斑痧疹毒之病俗言痧子是肺
胃有熱也其肺胃蘊積熱毒或以時
氣所作薰發於膚狀如蚊蚤所咬故
赤斑遍身也凡發赤斑者十生一死
發黑斑者十死一生

○又小兒時氣咳嗽聲重涕唾稠粘目
眵赤煩熱渴躁此則肺胃蘊積熱
毒發則易出一出遍於肌皮之上如

泡子見而漸沒病在表受毒之淺此
名瘡子亦名瘡瘡俗曰麻子

○或時行溫毒熱氣薰蒸病在裏受毒
之深發及膚遍麻狀似錦紋或如玉
咬痕顯小者大或黑是曰斑也

○又有水痘一証與正痘不同易出易
壓不宜燥濕或濕之亦不為害但不
能發痂則爛成瘡

○葛根麥門冬散 治小兒熱毒發斑
或赤或黑頭痛壯熱心神煩悶
葛 門絡三參 升 甘炙赤苓
赤芍絡二膏半石水煎

○生地黄散 治小兒瘡子身熱口乾
咳嗽心煩 生地半門七杏皮去
款 陳絡一耳後二石水煎

○麥湯散 治小兒水痘 麻去節大濕紙

及服 知 卷 甜葶藶 紙 參各一
滑 地骨炒各 右為末每服半

○傳 傷寒溫熱病而發斑如錦文者名曰
發斑皆熱毒之所致也是皆冬應寒
而反溫人受不正氣故至春夏而發
為斑爛陽脈浮數而陰脈實大者名

為溫毒治法用化斑湯升麻葛根湯
玄參升麻湯黑奴丸黑膏之類

○丹溪曰發斑屬氣熱挾痰而作通聖
散中消息

○戴氏曰有色點而無顆粒者曰斑
內傷發斑者胃氣極虛一身之火遊
行於外宜補以降之

○疹屬痰厥熱在肺者戴曰浮小者顆粒
而又山通
聖散消息

○化斑湯 即白虎加人參湯

○升麻葛根湯 方見前

○玄參升麻湯 治溫毒發斑咽喉痛煩躁謔語 升 玄參 甘草 各半 右水煎

○黑奴丸 治溫毒發斑煩躁大渴

芩 釜底煤 芒 麻 梁上塵 灶突墨 小麥奴 各一大黃 三 右 爲末煉蜜丸如彈子大新汲水化服如不渴不可與此藥

○黑膏 治溫毒發斑凡冬月大溫人受不正之氣至春發斑脉浮散屬陽沉伏屬陰用此消疫毒

生地 半斤 香豉 升 右細切以酒膏二斤合煎之取濃汁如膏用雞黃麝香如豆大肉中攪和勻每服用彈子大有湯

化下

○防風通聖散 風 芍 飯 白芍

大 芒 翹 時 麻 各四分 桔 苓 各八分 木 樨 荆 各二分 滑 四分 甘草 後一右加姜水煎

○犀角消毒飲 治發斑癰疹等証

牛 四分 荆穗 風 各三分 甘草 一分 犀 一分 別 一分 湯 煎 右水煎調犀末服

○解毒防風湯 方見前治發斑及癰疹痒痛

○陰毒升麻鱉甲湯 治陰毒 升 仁 飯 甘草 各一分 蜀椒 二十粒 鱉 一 雞

是 四分 右水煎調雞末服

○加味羌活散 治感四時不正之氣

發癰疹 羌 前 各一分 枳 一 耳 炙 椒 天 麻 芍 苓 各半 蟬 荷

各三 右作一服加姜二片

○調中湯 治內傷外感所發陰斑

蒼朮下各半 陳行縮 藿 芍 焙 甘草 桔

正 半 卷 枳各七 芍 伍 麻 祛 枝

各三 右作一服加生姜二片

○加味敗毒散 治瘟疫及癰疹等証

羌 獨 前 柴 芍 枳 桔

參 苓各五 芩 苛各半 加 木 風

荆 蒼 飯 芍 生 地各五 右 作

一服加姜二片棗二枚此因虛而感

風濕致發斑者服之良

孕婦痘瘡

○傳凡孕婦發痘宜單胎散胎動不安宜

獨聖散安胎飲身熱甚宜木香參蘓

飲或瘡稠蜜宜十奇散倍芍飯煨桂

加沙烏如胎已五月則桂心半夏之

屬俱不必禁

○單胎散 赤苓 木 飯 白芍

赤芍 葛 北柴 參 桔 條 苓

風 陳 荆 枳 紫草 膠 糯

芷 芩 芍 宿 太熱加鬱金各

分 右作一服水一盞半煎至一盞乾

柿蒂七箇野苧根七寸緝瓜蒂一箇

用銀器煎以荷葉蓋定熬至八分去

粗仍用荷葉蓋覆空心溫服

○獨聖散 用連殼宿砂慢火炒去殼

為末每服半匙熱酒調下胎動則服

服後覺胎熱則安

○安胎飲 腹酒洗淨焙乾 參 陳

木 白芍 飯 芍 香附米童便

宿 蘓 苓 苧 絡半 右作一服水

一盞半燈少七莖糯米一撮煎一盞

食前温服

一痘瘡膿汁不乾

○傳蓋瘡出太盛表里難醫以致膿水粘衣着帶濕痛不能轉側宜白龍散敗草散附之

○白龍散

黃牛糞日乾火煨成灰取心中白者為末帛裹撲之

○敗草散

用蓋屋及墻背土逐年腐草洗淨焙乾為末帛裹撲之及鋪床席上佳

○或以麥麩糝席篋上可

一惡證

○瘵塌寒戰咬牙渴不止痘紫黑色喘喘不寧灰白色陷頂腹脹頭温足冷脚亂飲水氣促泄瀉瀉

○瘵疔出而吐利者困

出而謔語不止者惡候

便血而乳食不化者脾虛已死

瀉血而瘡爛無膿不治

大小便秘目閉聲啞肌黑者死

遍身里腫目閉無魂者死

面色青者死瘡後發毒者危

面黑或鼻有黑氣不治

燥渴尿澀泄瀉不食者危

頭面腫瘡盡抓破鼻爛不可近或足

冷至膝不治

面腫鼻塌目閉咬牙不治

痘瘡里焦風攻頤頷唇項腫硬或胸

膈高突不治

一室中禁事并橫法

避風寒常和暖忌生冷忌聞諸穢氣已見外人忌犯房色已過

月水婦人腋臭者，宜燒大黃參木，以辟惡氣，燒木香亦佳，勿燒沉檀，降真、乳香、腦、麝。

○憚悵之內，宜懸胡妥，或以胡妥漬酒，噴床帳，痘瘡最忌穢惡之氣觸犯。

一痘不出方

○傳 凡值天時不正，鄉隣痘瘡盛發，宜服禁方不出方。

○二豆湯 赤小豆、大黑豆、菘豆

各一升，右二豆淘淨，用水八升，煮豆熟，為度，逐日空心任意食豆飲

汁，七日永不出。

○油飲子 真麻油、升遂，日飲盡，永不

出已上二方，出白鵝倉公方。

○龍鳳膏 烏雞卵、地龍，細活者

右以雞卵開一小竅，入地龍在內，夾

皮紙糊其竅，飯鍋上蒸熟，去地龍，與

見食之，每歲立春，日食一枚，終身不

出痘，隣里有此証流行，時食一二枚

亦好。

一雜方

○羅氏地黃膏 瘡已發，稠蜜微喘，湯

欲飲水，以此下之，生地四錢半

雄雞鬚半斤，右以豬膏一斤，和勻，露干

宿煎五六沸，令三分去一，絞去渣，下

雄黃射香攪勻，稍入飲之，毒從皮膚

中出，即愈。

○黃栢膏 瘡已發，稠蜜用此塗，固佳

栢一兩，去粗，菘豆一兩，其四右為末

以生芝麻油調從，其煎至眼眶厚塗

之日，二三二次，如用早能令瘡不至回

縱，有亦稀，云或只用乾膠，用時

月五

百一五

眼四時亦可

○林天散 治痘黑腫腹脹直視喘急

發搖 蟬退五錢 地龍一兩 右為末

每服半錢大兒一錢研乳香湯調下

連進一服愈

○奇方 治痘出不透腹痛甚或黑腐

者 蟬蛻五十箇洗去足翅晒乾 右為末每服

一錢白湯調下腹痛立止乳母亦可

服一錢

○又 人齒散 治痘初出光壯忽然

黑陷心煩性躁氣喘妄語或見鬼神

不速治毒氣入藏必死 人齒燒存

石為末每齒作一服酒下

○傳 活血散 治痘未出已出煩躁及發

發身痛者 白芍味為末每服一錢

溫水調下止痛酒調尤驗痘四肢出

不快加防風一方用赤芍

○阮氏萬金散 實作萬金 治痘出不紅

潤 風 參 蟬 洛 等 右每服四錢

水一盞薑汁二葉煎不分溫服熱而

實者加升麻

○絲瓜湯 絲瓜連皮子燒存性為末

每服一匙時久用米湯調服此物

豆渣最妙或紫草甘草煎湯調服尤

可

醫法明鑑卷第四

慶安四年 檢九月吉祥 閑
二條通至屋町村 奉末寺 板



地出四

