



婦人 胎前 產後 小兒

一 二 三 四

四





醫法明鑑卷第四目錄

上 婦人

月經一 崩漏二 帶下三 附無子

中 胎前

惡阻二 胎動三 腹痛四 胎漏五

胎腫六 子煩七 子淋八 轉胞九

子懸十 子癇十一 子嗽十二 傷寒十三

痢泄十四 兒哭十五 胎肥十六 腰痛十七

半產十八 胎死十九 難產二十

胎衣不下 二十一

下 產後

血暈二 惡露不盡三 兒枕痛四

乍寒乍熱五 蓐六 瀉痢七

浮腫八 腹脹九 乳汁十 附乳癰

乍見鬼神十一 中風十二 附瘧

不語十三 身疼十四 脚氣十五 腰痛十六



血崩七 淋閉八 附尿數八 遺尿八 大便秘九
口鼻黑九 衄血九 喘急一 咳嗽一
頭痛三 虛汗四 渴五 陰脫六
玉門瘡腫七 斷產八 返魂丹九
產後不治之三證三十

小兒

掛穢一 臍帶二 臍風三 便不通四
破泡五 胎顛六 不飲乳七 洗浴八
謹養九 胎驚十 月裏生赤十一
生黃十二 視手紋十三 診脈十四
觀形十五 審外証十六 變蒸十七 吐瀉十八
腹脹十九 腹痛二十 痞癰二十一 夜啼二十二
客忤二十三 口瘡二十四 重舌二十五 弄舌二十六
吃泥二十七 滯腹二十八 語遲二十九 行遲三十
鶴節三十一 脚拳三十二 手拳三十三 顛陷三十四
顛填三十五 解顛三十六 龜胸三十七 龜背三十八

項軟卅 丁奚卅一 露卅二 脫囊卅三 四十一
脫肛四十二 魁病四十三 盤腸內吊四十四
齒不生四十五 斷乳四十六 誤吞諸物四十七
諸熱証四十八
驚風四十九 附慢脾風五十 天疔五十一 發搐五十二
疳証五十三 馬脾風五十四 瘰癧五十五 癩証五十六
疔証五十七 痘疹五十八

醫法明鑑卷第四

婦人門

上

月經一

傳婦人百病皆自心生如五志之火一起則心火亦從而熾若夫經閉不通之証先因心事不足由是心血虧耗故乏血以歸肝而出納之用已竭云又曰因食少肺金失所養而氣滯不行則無以滋腎陰况月經全藉腎水施化腎水既乏則經血日以乾涸以致或先或後淋瀝無時漸而至閉塞不通甚則為癥瘕血膈勞極之証又如崩漏不止之証先因心火亢甚於是血脉泛溢以致肝實而不納血出納之道遂廢月水錯經妄行無時而泛溢漸而至崩中不息甚則化為白濁白淫血枯發熱勞極之証

丹溪曰經不通或隨胎多產傷血或
久患潮熱錯血或久盜汗耗血或脾
胃不和飲食少進而不生血或痢疾
失血治宜生血補血除熱調胃之劑
○或七情傷心心氣停結故血閉而不
行宜調心氣通心經使血生而經自
行

○四物湯乃婦人衆疾之總司也 飯
芎 白芍 熟地 右等分

○經水常不及期而行者血熱也用生
地加連芩香附

○過期而來者瘦人多是血少倍飯地
加芫其少佐以桃紅肥人大槩是氣
虛挾痰阻升降去地加參芫其苓莎
半陳

○過期而紫黑成塊者熱也多作腹痛

用生地加香附連延乳沒五灵血淡
色者痰多血少也用生地合二陳

○經候將來腹中痛者血實也一日瘀
血鬱滯也用生地加香附桃紅延牡
連木莪

○經候過而腹中痛綿人無休息屬血
虛倍飯地蕪氣虛者加參芫其木莪寒
者加于姜

○肥盛婦人或三二箇月一行者痰盛
而軀脂閉塞經脈去地芍合導痰湯
加連香附二木

○經水適來適斷往來寒熱如癩者合
小柴胡

調經散

經水或前或後或多或少

或踰月不至或一月兩來皆可服

飯酒洗一門仁 吳茱萸湯

乾桂各半 半湯炮參 白芍 芎
牡絡一膠 其絡半 右作一服加姜
三片

○月經先期而來者宜服 飯身一各
芎 膠 艾葉 其 百 知各半
連姜汁白芍各八生地 條芩 香
附絡一右

○月經過期而不行者宜服 飯一各
芎 桂各半 熟地 白芍 香附
蕪木 莪各一 桃 二十 紅三 其 鈺通
分八右

○柴胡調經湯 治經水不止其色鮮
紅項筋急腦痛脊強 灸其 飯身
葛各三 獨 藁 升各半 柴七 菴
蒼各一 紅少許 右煎服取微汗立
止

○升陽舉經湯 治經水不止右尺脉
按之空虛是氣血俱脫太寒之証輕
手數疾舉指弦緊或淡皆陽脫之証
陰火亦亡見熱証於口鼻眼或渴此
皆陰躁陽欲先去也當溫之舉之升
之此法乃升浮血氣補命門之下脫
桂夏月不用白芍分二紅分半細分三參 熟地
芎各半 獨 黑附 炮灸其各七 菴
藁 風絡一末 飯 莖 柴絡二
分桃 鈔 右

○膠艾湯 治勞傷氣血衝任虛損月
水過多淋漓不止 膠 芎 其各
半飯 艾各七 熟地 白芍各一右
一方加地榆莖若不止入棕灰

○升陽除濕湯 治月事不調或暴崩
不止多下水漿之物皆曰飲食勞倦

或曰心氣不足致飯酒獨各半蔓
疝風 甘炙升 藁絳一柴 菴
蒼 莖各半 右煎空心温服少時
以早飯壓之可一服而已如灸足太
陰經血海三七壯亦已此藥乃從權
之法為胃氣下陷而氣迫於下以救
其血之暴崩也任後必服參芪炙甘
飯之類數服以補之

○當飯芍藥湯 治婦人經水漏下不
正其色鮮紅時值炎月先因勞役脾
胃虛弱氣短氣逆自汗身熱柴分二
甘炙生地各三莖一陳桂 熟地各
分蒼 白朮 白芍 飯各一右

○香附一物丸 治經候不調血氣刺
痛腹脇膨脹頭眩惡心香附夫醋
浸一日夜用尾銚煮 右為末醋糊

丸如梧子大每服五十九淡醋湯下

○艾附丸 治証同前又崩漏帶下並

宜治之 莎醋斤 艾四 飯二
右為末醋糊丸林日 顛墮胎由氣不
升降胎氣不固宜服此

○四製醋附丸 莎醋斤分 醋酒監水

童便每斤分各浸 右為末醋糊丸
如桐子大每服七十九空心酒下瘦
人加澤蘭赤苓各三

○温經湯 治血海虛寒月水不調

飯 芍 芎 牡 桂 我 各半 參
膝 各 三 莖 一 右

○加味烏沉湯 治經水欲來臍腹痛

痛 莎去毛 烏 宿 延 各
兩 莖 一 右 加 姜

○一方 飯 醋 延 紅 沒 各 等

右為末每服二不空心下

○桂枝桃仁湯 治月候前腹痛不可忍 枝芍生地桃各等右

每服七錢姜棗煎服

○八物湯 治經事欲行腹痛血

澁也四物湯加木枳延練子

○逍遙散 治血虛煩熱月水不調臍

腹脹痛痰嗽潮熱 飯炒 白苓

白芍 朮 柴各一 芍各半 右每服

八錢生薑片薄苛炒煎服更加知地

骨尤妙或加芍湯加枳心煩加門粉

角嗽加烏梅數五味

○牛膝散 治婦人室女血閉不通五

心煩熱 紅伍膝 飯尾各一桃

五各 右為末每服二錢溫酒調下

別研 萬病丸 治月經不調繞臍痛

乾漆碎 下時 膝 下酒浸 右為末

用生地黄汁入二味末銀石器內慢

火熬丸如桐子大每服三九空心酒

下

○滋血湯 治血熱氣虛經候澀滯不

通股體麻木生瘡 鞭荆 牡

赤芍 枳 桂 飯 芍各二烏梅

去核右分二貼煎服至半月或一月

經行病除

○通經丸 治婦人室女月經不通或

成血癥疼痛 桂 青 大 酒 紙

散 莪 姜 川烏炮去乾漆 紙

飯 桃 去皮尖 右等分為末將

四分之一以米醋熬為膏和餘藥末

枳丸如梧子大每服二十九空心淡

醋湯下漸加至三四十丸溫酒亦可

性畏寒者入雞子清和藥

○**柴胡丁香湯** 治婦人年二十歲左

右臨經先腰膈痛 生地加 丁香
加飯身 風 羌絳一柴二餅蠟故
右

○**烏藥湯** 治婦人血海疼痛 飯不

甘 木烙 五烏半 莎仁 右

○**增味四物湯** 治婦人血積血瘦

飯 芎 白芍 熟地 稜 乾漆
妙烟盡 桂 莪 右等分

○**琥珀丸** 治婦人血瘦小腹腰背相

引而痛 瑰 白芍 川烏炮去
膠酒 蟹醋 我 根朴製飯酒浸各
木 桂 澤蘭葉 麝各半 右為采
酒糊丸如桐子大每服七十九空心
溫酒米湯下

○**無極散** 一名通經丹 露散 治經血

不通崩漏腸風帶下血嵐五淋產後
積血

錦文大黃一斤淨分 四處

四兩 用紅花四兩入水取汁浸
天黃一斤不用紅花晒乾
四兩 用童便入鹽二錢浸天黃
四兩 用當飯四兩入淡醋內
四兩 用好酒浸一日含乾切如香核
大晒乾巴豆三十五粒去皮同
炒豆黃色不用豆

右四分同為一處入南木香兩 百草

霜五分為末每服三錢好酒空心調下
又煉蜜丸如桐子大每服三四十九
空心溫酒下即四順散也凡修合用
大突擇一月

○傳 經不通馬鞭草研汁 熬壹為丸或燒
存性為丸飯紅煎湯下

祖傳桃奴飲子

治婦人室女月經

不通漸成脹滿

桃奴桃樹上嫩

落者正時豚鼠糞西雞糞是

桂 莎 灵脂祀地 宿 朮去皮

研石等分細末每服二錢空心温酒

調下

○治月經不通鼠糞合略炒研細温酒調下立效

一崩漏

○崩中者由藏府傷損衝任二脈血氣俱虛二脈為經脉之海若勞動過極藏府俱傷衝任之氣虛不能約制其經血故忽然而下謂之崩中崩下治宜大補氣血之藥舉養脾胃微加鎮心藥

傳涼血地黄湯 血崩是腎水陰虛不

能鑄守胞絡相火散血走而崩也此

湯主之 芩 荆穗 蔓絡半一百

知 蓐 細 芎絡二連 卷 柴

升 風絡三生地 飯絡半各紅

紗右

○丁香膠艾湯 治崩漏不止蓋心氣

不足勞役及飲食不節所得覺臍下

如冰冷白帶及白濁之物間有如屋

漏水 熟地 白芍絡三一芍

丁香絡四膠珠分生艾葉各飯二分

右芍地丁香別為細末飯芍艾各細

切連煎共六味入水五大盞煎至三

盞半去粗入膠再煎空心熟服

○治血崩不止蒼耳草燒存性好酒調

服立止或入四物湯中亦可

○老婦崩血久不止諸藥不效 橡斗

蒼耳根二物燒存性用四物湯加生
芎花子姜煎湯調服效

林 加味四物湯 治血崩 芎 飯酒洗

生地 白芍 膠蛤粉 艾葉絡二
右一方用熟地加姜

○「方」治崩中不止 棕櫚 絲瓜

絡燒存性 右為末每服二錢鹽酒或
鹽湯食前調下

又塩梅燒存性為末空心米飲下

○五倍子散 治血崩帶下 艾葉兩

醋煮 五倍二兩 烏梅五核 芎伍
右為末米湯下

○伏龍肝散 治氣血勞傷衝任脉虛

經血崩下或如豆汁或五色相雜崩
腹冷痛久不止虛煩驚悸 伏龍
赤石各一兩 熟地一兩 艾葉二兩

甘草桂各五 飯匙 姜炮 芎七 三兩

門一兩 右每服七錢棗二枚三枚

煎服

○當歸地黃丸 治產後所下過多及

崩中傷損虛弱少氣 芷 續

姜 飯 膠各三兩 附兩 地五兩 右

為末煉蜜丸如桐子大每服四五十

丸空心温酒下

○白芷湯 以白芷煎湯調百首霜甚

者棕灰 後四物加于姜調理日寒
用乾姜因熱用參因寒參莖

帶下附無

林 帶下風氣寒熱所傷入胞門或出經

脈流轉藏府而發

○傳 帶下是濕熱白崩氣赤崩血二腫加

蒼朮為主氣虛入參木血虛入芎

○帶下是胃中痰積流下滲入膀胱當
升之二陳加一末升柴仍用瓦礫子
以燻其濕痰

○肥人帶下多是濕痰

○瘦人少有此病有者是熱

○當歸附子湯 治赤白帶下臍下冷

痛 飯後炒鹽三錢梢 升各五身

碎六柴此附他一栢炒時為姜炮良

略八右煎服或酒麩糊丸亦可

○延胡苦練湯 治臍下痛陰冷大寒

白帶下少 栢分延 練子略二附炮

桂略三炙耳短熟地各右

○桂附湯 治白帶腥臭多悲不樂大

寒証 栢為引知略五桂五附他三

右 如少食常節腹中滿悶加白芍餅

不思飲食加五味 薑汁如煩惱面上

如更行乃胃中元氣極虛加芍 打不

參此炙耳升略半

○益母丸 治赤白帶惡露時下不止

又治久無子常服驗 益母草五月

採陰乾為末煉蜜丸如彈子大每服

一丸用熟酒加薑便化下 薑氣者木

香湯化下

○苦練丸 治赤白帶下最妙 練碎

最苗炒飯略等 為末酒糊丸如梧子

大每服五十九丸空心溫酒送下

○芍藥湯 治赤白帶下臍腹痛神效

白芍二兩干姜兩一右為末微炒黃色每

服二錢空心隨卧米飲下半日效

○香灸丸 治久冷赤白帶下腹痛面

色痿黃四肢無力久無子息

苓 艾葉 酪八 莎 飯酪四 吳茱 妙
兩 芍 白芍 酪二 右用醋五升 砂鍋
煮乾 爲末 醋糊丸 如梧子大 每服五
十九 空心 醋湯下 日三服

○**當飯丸** 治帶下不止 腹痛 四肢煩
不食 羸瘦 飯酒 赤芍 白芍 芍
粉 熟地 膠 蛤粉 續酒 履各 地榆
五 右爲末 醋糊丸 如梧子大 每服
五十九 空心 米湯下

○**如聖丹** 治赤白帶下 月經不來
枯兀 蛇床 右等分 爲末 醋糊丸
如彈子大 乾臙脂 爲衣 內陰中 熱極
再換

○**婦寶飯丸** 治赤白帶下 子宮虛
冷 四物湯 加正胡黃柴 蛎 煨各 莎
半斤 醋浸 一宿 右爲末 醋糊丸 如
煎焙乾

桐子大 每服五十九 空心 醋湯下

○**琥珀丸** 治婦人血風 虛勞 上熱 下
冷 月水不調 肌肉黃瘦 腹痛 或有氣
塊 攻冲 琥 飯 木 甘 風
棋 絡 四 稜 炮 姜 炮 桂 絡 五 木 柴
參 絡 二 青 吳 茱 炒 蝎 炒 附 炮 芷
草 葱 煨 赤 芍 柏 葉 絡 三 桃 去 皮 板
醋 驚 醋 炙 各 天 仁 右 爲 末 煨 蜜 丸
如 桐 子 大 每 服 二 十 九 空 心 酒 下 干
煎 至 晚 更 進 一 服 如 覺 熱 晚 不 須 服
如 腹 內 積 塊 攻 築 驚 桃 核
稜 各 加 一 倍

○**加味四七湯** 治婦人小便不順 甚
者 陰戶 疼痛 半 兩 朴 赤 苓 各 五
菴 仁 甘 仁 莎 五 右 分 四 貼 姜
五 片 煎 去 粗 加 琥 珀 末 一 錢 調 服

烏金散

治婦人久無子息及顛墮胎者且衝任之脈宿挾疾經水不時暴下月內無行或崩漏帶下臍下冷痛烏梅 干姜 敗棕三味並燒存性 略二右為末烏梅湯調下

洗心丸

治衝任虛寒胎孕不成或損墮澤蘭葉 末 略半 桂 姜 各施 鮮酒白芍 鮮熟地 飯二碗各 鮮酒白芍 牡 延齡一 右為末醋煮麩糊丸如桐子大每服五十九空心酒下

秦桂丸

治婦人無子 丸 桂 仲妙 風 朴各半 附炮 白苓 略半 膠 白薇 半 生乾 姜 沙參 各五 參 兩細 二兩 石為 末煉 蜜丸 如桐 子大 每服五十九空心醋湯下米飲亦可不效加丸數已覺有娠便不可服

婦人科中 胎前

婦人無子者多由血少俗醫悉謂子宮虛冷以辛熱之藥煎熬臍胎血氣沸騰禍不旋踵

瘦怯婦人子宮乾澀宜滋陰養血四物加芩芍之類

體盛者乃驅脂滿溢閉塞宜宜運行濕燥痰 星 半 芍 滑 風 若一本有芍木無 或道痰湯之類 若一本有芍木無 或道痰湯之類

隨胎乃血氣虛損不能榮養胎元而自墮其下婦有胎即隨其脈左大無力重取則瀦乃血少也白朮濃煎湯調黃芩末一錢服味至三四兩得保全而生

固胎飲

熟地 飯 參 白芍 木 芍 陳 芩 桑寄生 少加

連栢入糯米五七十粒煎服。○血虛不安者加膠珠。○胎氣痛者加宿。

○安胎散 胎氣不安或腹微痛或腰疼或飲食不美且服或至五六箇月常服數貼其效。木 飯 白芍 熟地絡一參 芎 陳 條苓各半 甘 縮 蘊絡三 右作二服加生 姜三片

○安胎丸 木 條苓 麴炒石等 分為末粥丸每服五十九清米湯下 條苓木乃安胎之聖藥俗以苓為寒 而不用殊不知胎孕宜清熱養血必 用細挺沉實者縮砂安胎以此痛行 氣但縮砂非八九箇月內不宜多用 ○懷妊嗜醋物乃肝藏正能養胎而 溫也

○一惡阻乃有孕而惡心阻其飲食者 是也多從痰治用一陳之類又以宋 丸服一日肥人瘦瘦人熱

○半夏茯苓湯 治惡阻不食吐逆頭 眩忘隨煩躁惡寒自汗 半湯泡註 心姜九片 生姜各一苓炒熟地 陳 桔 參 旋覆花 無嗽芍 甘 芎 絡半 右一方有蘊 細絡半

○參朮散 治妊娠三月內惡阻吐逆 不食或心虛煩悶 橘紅 苓石 木 門 木 朴 甘 糝絡右作一服 加生姜三片竹茹一錢或加參一錢

○加味二陳湯 治受胎二三月月嘔 吐擇食口中脫宿食痰飲 陳 白 苓絡四分半洗三木 分半 甘 糝一 右分二貼加姜五片烏梅一箇有妊

雖心半妄然即用姜製其毒服之利
痰逐飲必見功效

○傳一胎動者因火通動胎逆上作喘急
用條本香附之類

○小膠艾湯 治妊婦因頸傷胎動不
安或胎漏上逼心或腹痛下血 膠
珠一兩 艾葉二右

○膠艾湯 不問日數安胎 熟地
艾 飯 甘草 芎 膠 各半 芫 半 分
右

○治胎動沖心煩悶欲死安胎止痛
飯 芎 參 膠 炒 耳 後 酪 葱 白
切一右

○因非跌損傷胎氣不安或子死腹中
芎 兩 為 末 每 服 一 七 連 進 三 服 死 胎
即下

○如聖散 治妊婦腹痛胎動不安或

血下 鯉魚皮 飯 熟地 膠珠
白芍 芎 續 酒 甘 鞞 各 右 每 服 四
錢 姜 三 片 苧 麻 根 伴 煎 服 一 方 有 子
姜竹茹無續斷

○林杜仲丸 妊娠三月胎動不安若下
血腹痛蓋由子宮久虛致令胎墜宜
服此以養胎 仲 去 皮 姜 汁 續 酒
酪 一 右 為 末 煮 東 肉 丸 如 梧 子 大 每
服三五十九空心米飲下

○一方 芩 木 飯 身 宿 炒 絡
右煎服

○加減安胎飲 治胎動不安腹痛漏
下或胎上刺心短氣妊婦氣血弱者
宜服此免有損墜之患 參 芩
芍 芎 熟地 續 側柏 膠 哈

妙其灸版 右等分每貼七錢姜三片漏下不止加艾葉

○林 一胎動腹痛皆因飲食冷熱或因交合傷犯其候多嘔氣不調和變成漏胎則難安矣

○當版芍藥散 治妊娠腹痛疔痛心下急滿 版 苓 木各一芍 澤各二白芍細石煎服為末酒調服亦所如胎動口噤唇青下痢加熾安胎飲加熟艾酒煎

○火龍散 治妊娠心氣痛 艾半五 妙尚妙練肉 妙各 右煎服

○通氣散 治妊娠腰痛不可忍 補骨 妙上 右為末嚙胡桃仁一箇空心温酒調下五錢

○當版地黄湯 治胎痛 版一熟地

仁 右

○妊娠偶有所傷腹痛不安或從高墜下胎痛及下血者宿砂和皮略炒勿令十分焦黑去皮為末熟酒調服或米飲或艾湯塩湯皆可如覺胎中熱其胎即安此方即驗凡常服安胎易產

○妊娠二三月忽心腹疔痛不安用版三膠 妙其 各葱細 右

○妊娠四五箇月忽心腹疔痛 大棗十四枚 塩五不燒 右為末一撮許酒調服立愈

○治妊娠心腹大痛氣欲絕 芎 版 苓 朴略一右

一傳 胎漏謂有胎而血漏下也屬氣虛有熟四物加膠木條芩宿 妙未白附 妙糯

米煎服

○治胎漏下血 木兩條 芩伍縮 參

膠三珠 各右為末 每服一錢 煎艾湯調

服水煎亦可

○又方 枳殼 芩 各半 木兩 水煎 食前

溫服

○治妊娠下血 不止 胎上 冲心 四肢厥

冷 悶化 欲死 炒膠 艾 各一 茹

炮 黍 白砂 蜜 仁 右用水二升 煎至

一升 入蜜 煎 一 沸 分 二 服

○治妊娠下血 如月信來 若胎乾 非特

搗子 亦能 養母 熟地 姜 炮 各

右為末 每服三錢 一白夜 三四服

○加味四物湯 治妊娠下血 不止 本

方加 艾葉 片 十 膠珠 仁 烏梅 肉 許 水

煎熟服

○桑寄生散 治妊娠下血 不止 胎動

不安 桑寄 飯酒 續 酒 芍 苳

膠 神 木 各一 參 苳 各半 右作

一服 加生薑 二片

○林 芩根湯 治胎無故下血 腹痛 或下

黃汁 如漆 或如豆 汁 野 苳 根 四兩

金 匱 銀 匱 右 各 一 貼 酒 水 各 一 盞 煎

服

○黃芩湯 治胎漏 不安 芩 木

飯酒 縮 絡 各半 煎服

○治胎動 漏血 產門 痛 黃連 為末 每

服一錢 溫酒 空心下

○急救方 治漏胎下血 不止 胎乾 子

母俱死 生地黃 汁 升 酒 五 煎 分 三

服如無生者 用乾者 為末 酒 調 二 三

錢 食前服

○保氣散 治頭化傷胎漏血安胎寬
氣進食瘦胎 腹 其 蕪 縮
枳 炒 桔 莎 炒 右 等 分 煎 服

傳胎腫謂有胎或手足或頭面通身浮腫者是也屬濕多或用菘子丁合炒為末米湯調下丸服亦可也

○治姙娠腰脚腫痛 白苓 木 姜 其 各 各 杏 皮 尖 炒 去 右 木 煎

○木通散 治姙娠身躄浮腫四肢脹急小便不利調之子膈 通 薺 桑 蕪 華 葉 各 枳 炒 枳 條 芩 各 半

木 訶 子 皮 各 三 右 作 丁 服 加 生 姜 三 片

○全生白朮散 治姙娠面目虛浮肢躄腫脹 木 兩 生 姜 皮 腹 陳 苓 各 半 右 為 末 每 服 二 錢 米 飲 調 下

一方用苓皮 桑皮無木

○鯉魚湯 治姙娠脹滿或通身浮腫小便不利 版 白 芍 各 一 白 苓 半 木 二 橘 紅 半 鯉 魚 一 尾 不 右 作 一

服 將 鯉 魚 去 鱗 腸 白 水 煮 熟 去 魚 用 汁 一 盞 半 生 姜 七 片 煎 至 一 盞 空 心 服 如 水 未 盡 再 合 一 劑 服 之

○澤瀉散 治姙娠氣壅身躄腹脇浮腫喘急小便澀謂之子滿 尺 桑 枳 枳 通 赤 苓 各 等 右 每 服 四 錢 加 姜 五 片

○防已湯 治姙娠面目虛通身浮腫心腹脹滿喘促尿不利 已 二 分 桑 赤 苓 蘇 各 三 分 木 九 右 分 二 貼 加 姜 三 片

○姙娠止兩脚浮腫各日皴脚遍身腫

滿心胸氣脹名曰胎水鯉魚湯皆治之

○平胃散 治酸脚 加姜枣蕪菜煎服

○赤小豆湯 治羊脚腫小豆商陸各分煎服忌食鹽

○八正散 治姙娠心氣壅手足浮車瞿蓄滑其施通

大麩果煨入茴一撮
傳子煩謂姙娠苦煩悶不安 門苓風 知絡一 右水煎入竹瀝二匙服 一方去知

加琴
○犀角散 治字煩 犀 地骨 條

芩 門 赤苓各一 其拌 右水煎入竹瀝一合溫服

○當眼飲 治字煩 飯打不芎膠

鼓 桑寄各七 葱七 右
○麥門冬湯 治字煩 明 風 白

苓各四 參二 右加姜竹葉
○知母飲 治姙婦心脾壅熱口乾渴

苦煩悶 赤苓 芩 葛各二 知門 其後各下 桑拌 右入竹瀝

一方去葛知加地骨犀葛各一
○飯涼節命散 治姙娠面赤口苦舌

乾心煩腹脹或一便閉澀皆因醉酒或食生菓鷄魚煎博熱毒物所致

芎 苧根 芍 門 飯 木各二 糯粳各半 右煎服

○林 一子淋姙娠酒色過度或飲食積熱致水道閉澀名曰子淋

○安樂散 門 通草 滑絡一飯 浸酒 燐心 其炙細洗參各五 右為末

每服二三錢麥門冬煎湯調空心服

○**換柳散**

治婦人淋瀝小便不通作轉

膠治不効此方屢効 枳 赤芍分

右煎服一應男女血淋水道澀痛皆効

○**地膚子湯**

治子淋小便澀數

膚 車各一知 炒 赤芍 白芍

枳各七升 甘 通草各三 右

○**又方**

地膚草分 以水四升煮取

二升分三服或新取地膚草槁自然

沤服亦可不獨治子淋凡淋閉皆効

○**反葵子散**

治子淋小腹疼胎動不

安 葵炒柴 桑 赤芍 赤芍

版各等 每服四錢入葱白七寸

○**車前散**

治子淋或尿不通下焦有

熱 枳 通 陳醴赤芍 車 赤

芍 版 滑 石韋 去 右等分煎

服

○**桑螵蛸散**

治婦人小便不繫螵蛸

灸為末每服 錢空心用米飲下

○**白薇散**

治婦人遺尿不知出 白

薇 白芍 為末每服三錢食前

酒調服

○**天腹反散**

治婦人大小便赤澀

枳 炒 腹 甘 半 酪 赤芍 兩 右為

末每服三錢葱白湯下

傳

轉胞之證古方皆用滑利鮮有効丹

溪曰胞不自轉為胎所壓轉在一邊

胞系孳戾不通車 四物加參木陳

半其加姜煎服 子懸胎氣不和湊上心腹脹滿痛疼

謂之子懸

○**紫蘇散** 芎 腹 白芍 陳 蘇
飯酒浸各參 廿絡灸右分二貼姜
五片葱一根

○**保安散** 治胎動心悶唇青口乾上
衝下築手足厥冷 飯 參 略 半
廿仁 右水煎入膠珠一兩葱白一
握每煎溫服

○**一方** 治妊娠身痛或衝心欲死不
能食 木 兩五方兩分今二右水煎
林子癩妊娠中風頸項強直筋脉攣急
言辭寒澁痰涎壅盛或發瘧不省人
事名曰子癩

○**羚羊角散** 治妊娠中風子癩 羚
角 獨 酸炒五加絡半 蕙 風
飯酒 芎 神 杏 各一分 木香
廿絡半 右分二貼入姜二片

○**獨活防風湯** 治妊娠角弓反張口
噤謂之風痙又曰子癩 麻 祛 風
獨 各一分 桂 羚 鎊 升 廿 灸 酸
棗炒芫絡八芎 飯 杏 絡 六 右
每服七錢姜四片竹瀝一合煎

○**防風葛根湯** 治妊娠中風腰背強
直時反張 風 葛 芎 生 地 各
不杏 麻 去節各 桂 獨 已 廿
灸各 右

○**葛根湯** 治妊娠臨月發風痙暈悶
不省人事吐逆醒後發謂之子癩
貝 芎 牡 已 風 飯 芎
桂 苓 澤 絡 半 廿 灸 半 獨 膏
參 絡 一 右煎服貝母令人易產亦隨
白者升麻代之

○**防已湯** 治妊娠中風口噤四肢強

直隸弓反張已 已 疴 羌 半

右為未別用黑豆一合炒黑投好酒中沸定去豆調藥未灌之稱醒一傳 子嗽 妊娠感風寒咳嗽不已謂之子嗽

○天門冬飲 天門 苑茸 知酒去毛

桑蜜炙各 五味 桔各半 右水煎嗽血者加膠各 大便澀加苦亭瀝各

○百合散 治妊娠咳嗽心煩不飲飲

食 百合 苑茸 麥門 桔 桑 各一半 右水煎入蜜半匙 再煎一二沸去粗服

○婦治妊娠咳嗽不止胎動不安 杏

耳 桑絡一苑 天門各一桔 分 茄塊 右水煎入蜜服

○林百合散 治風壅咳嗽痰多心胸滿

悶 百合 蘇花 貝 白芍 前

赤苓 桔各 右入姜

○一方 麥門 苑各 桑炙杏去皮

牛炙 絡 桔 紗 三 茄塊 右

一傷寒

○芎藭散 治妊娠感風寒壯熱頭目

眩暈 菴 芎 白芍 木 門

陳 葛 絡 二 廿 右入姜 煎葱 三

○升麻小物湯 治胎六七箇月傷寒

壯熱或發赤斑變異兩血各 升 仁 梔

杏 大青草 少草 廿 絡 一 右加

葱寸

○妊娠傷寒百節痛壯熱不急治落胎

柴 葛 知 膏 絡 一 大 青 升 絡

分 梔 兩 葱 莖 十 四 右 水 煎

○傷寒安胎 木 芍 等 分 右 每

服三錢加姜三片水煎

○治妊傷寒 柴和煎 飯後七參細

芍 生地絡六其分右作一服加生

姜三片葱白二莖

婦治妊傷寒憎寒發熱 葱對生薑

兩右煎連服取汗愈

○單胎散 治妊傷寒太熱悶亂燥渴

恐傷胎 蛤粉五 嫩捲荷葉一兩

右為末每服一錢蜜少許水調服下

方橋家園生葛汁服

○妊寒熱 小柴胡去半夏最效

○熱病誰胎方 乾浮萍 朴硝研大

炒蛤粉及藍根右等分為末水調二

錢貼臍上安胎鮮煩極效

一方伏龍肝末水調塗臍下乾則換

用井中泥塗心上又可

一赤白痢并泄瀉

○當取芍藥湯 治妊下痢赤白腹

痛 白芍各一飯 白苓 沢 木

條芍各半甘 連 木 枳各三

右如白痢腹痛甚者恐有寒去芍連

加乾姜二分

○芍木香連丸 治証風肌 膠珠

木 縮妙芍各五乳 木各二 枳

姜二炮各連 黃同此 右為末醋糊丸

如梧子大每服二十九白湯下

○治妊旅泄瀉而腸風臍下冷痛由

食生冷及當風取涼 訶子煨末各

各陳 良妙木 白芍炮炙各半

菴 蘇煨 右加生薑五片

傳 兒在腹中叫哭臍帶上疔瘡及兒口

中念者曰如婦登高取物脫見口

正作馨令婦婦，此腰向地拾物，使兒復得，念入口中即止。用多年空屋下鼠穴中土一塊，冷雜婦念之即止。

○又方用黃連三五錢，濃煎汁時呷下即止。

林胎肥身居富貴，口屢其肥，聚樂不常。食物無度，即飽便吐，致令胞胎肥厚，根蒂堅牢，行動氣急，蓋緣不自預服瘦胎之藥，致於臨產必難產，八月可服無憂散。

○無憂散 取酒 芍 芍 木 其

疾各半，取炒乳是研各血餘，而後積積心，右為末，每服二錢，水煎服。

○滑胎易產救生散 安胎益氣易產

冷子緊小冷母無病 參 訶 取 木炒麥芽炒麴炒陳炒等右為

每服二錢煎服

○枳殼散 瘦胎易產抑氣 枳 殼 炒

粉草 酸 二 右為末，沸湯調食煎服。孕七月便服，大便閉澀加防風，胎弱加敗本。

○軟勝方 甘 炙 生 姜 烏 梅 等 每 服

五錢，水煎食前服，便令腰膝軟，最為至養。

○丹溪東胎丸 七八箇月內服之

芍 炒 夏 一 兩 秋 七 木 二 苓 牡 不 陳 三 兩 不 見 右 為 末 粥 丸 如 梧 子 大 每 服 二 四 十 丸 白 湯 下

○丹溪達生散 孕八九個月內服之

數貼，易產，腹少痛。腹 原 本 二 不 恐 烏 豆 洗 洗 乾 每 用 參 陳 蘓 葉 各 半 芍 白 芍 木 飯 絡 一 廿 後 二

右作一服外 人黃楊腦七箇食此胎
顛葱五莖夏加芩連五味春加芎風
秋加沢冬加箱氣上通心加蘓地性
急加柴多怒加芩食少加縮翅湯加
門芩能食加黃楊腦此物能瘦有痰
加半芩

○丹溪臨月用以養胎方 飯 芎

芩 陳 木 莎絡 並伴其於右
水煎調益元散一錢服臨者加參

○仲景當歸散 安胎養血清熱孕婦

時常宜服 飯 芎 芍 木 條
芩 右等分爲末每服一錢溫酒或
湯調下

○局方枳殼散 妊娠八九箇月內胎

氣壅滯當宜服之滑胎易產 枳殼
五錢炙一兩 莎 一兩 右爲末每服一錢

空心沸湯點服

一方加糯米炒如妊娠弱者宜衣
胎寒腹痛者胎弱多驚者加飯一

餅

婦腰痛腎主腰且勞損其經虛風冷乘

乏則腰痛甚則胎墮 飯三 芍一

右水煎入膠珠二葱白一煎煎

○一方 大黑豆二 以酒煮熟去

豆空心頓服

○傳 妊娠腰痛如折不能轉側 鹿角

右火燒令赤酒浸飛燒再淬以碎爲

度細末酒調服

○通氣散 治妊娠腰痛不可忍 補

骨炒爲末嚼胡桃仁一箇空心溫酒

調下一錢

○青娥不老丸 治腎氣虛弱風冷乘

之腰痛 胡桃仁去皮 二蒜研膏

破胡酒浸炒 仲去皮 姜研 右為末

蒜膏丸如梧子大每服五十丸空心

醋湯下

一林 半產臟腑虛弱或氣血衰敗或先因

婚嫁失時或醉酒飽食觸熱暑寒疲

極勞傷月數未周使墮胎

○**芎藭補中湯** 養新血去瘀血補虛

扶解 姜炮膠炒 粉芎 五味各二

分 茵陳酒浸 木 赤芍各一分

木 參 仲炒 甘草各 右

○**養命丸** 治小產下血子死憎寒手

指唇口爪甲青黑面色黃黑或胎上

搶心悶欲死冷汗出或食毒物傷動

胎氣下血不已胎未積服之可安已

死服之可下 牡 白芍 桂 桃

炒去 赤芍各等 右為末煉蜜丸如

彈子大每服一丸細嚼醋湯下連進

兩服不效加三丸

○**安榮湯** 治胎氣不同時常小產宜

預服此丸胎元 四物加膠珠莎木

宿條芍 糯米桑葉

○ 治小產後心腹疼痛 飯 芎 熟

地 白芍酒炒 延胡 桃 紅

砂 二 莎 青 紗 澤 蘭 牡 各 半

右水一盞半童便酒各七盞煎至一

盞溫服

○ 治小產後下血不止 參 芪 飯

木 白芍 芎 艾葉 甘草炙

青 莎 宿 右等分煎服

○**安胎散** 治胎寒腹痛胎熱多驚腰

痛腹滿胞急卒有所下或因頓化或

食毒物或感冒時疾致胎傷

枳殼半熟地行 糯米合右作一服

生姜三片大棗一枚更加金銀二五

錢同煎

○林 孕而服毒藥攻胎牙關緊急強直自

汗身微熱與中風相似宜服白扁豆

一味生為末新汲水調灌之清米飲

亦可

○林 胎死母因患熱病有藏極熱蓋蒸其

胎是以致死緣兒死身冷不能自出

醫家以黑神散治之恐本方內有姜

附桂之大熱宜熱病之人宜以草

麻子 朴胡散 濟陰丹 佛手散

之劑主對

○下死胎草麻子搗碎敷腳心即下如

子腸隨下急下腳心却敷頂心內收

○朴硝散 下死胎取胎衣朴硝末每

服二三錢溫童便調服

○一方雄鼠屎七枚水三升煮一升去

粗取清作粥食之即下

○婦 檢胎不特病熱所致或曰變化或因

驚恐或出入胃觸壞胎最多其候舌

青知子死

○一方治熱病胎死是即黑神散也

桂 飯 白芍 甘 生地 姜各

各黑豆二兩炒去皮附一分右為末空

心酒調下一方無附子有蒲黃

○一方下熱病胎死紅一味酒水煎飲

一二三盡

○催生散 治熱病胎死身冷唇青不

能自出 蒼朮 桔梗 橘紅 紅芷

桂 甘草 路丁 飯酒姜炮朴 芍

半 号 枳殼各二木 本 砂 各

右作一服姜三片棗一枚

○香桂散 下死胎 麝研 桂

三 右為一服溫酒調下

○哥飯湯 治游娠因事跌仆子

死腹中惡露不下疼痛不已口噤欲

絕用此藥探之若子死腹中即便下

若腹痛隨止子母俱安又治臨產難

產胞衣未下及產後血暈一切胎前

產後危急並皆治之 飯酒洗下

右作四服用水一盞煎水將乾投酒

一盞半煎五七沸溫服如口噤灌之

如人行五里許再灌盡四服皆

○治橫逆不順子死腹中伏龍肝為末

溫酒調下下二錢其兒頭戴土而出

甚驗

○治產難數日子死腹中不出母氣欲

絕 瞿麥 通草 三桂 三膝 四榆 白

下丸無榆白有天花粉四兩能墮胎

右水九升煎取三升去粗分三服頻

飲即下

○治子死腹中不出用黃犢生屎墮母

腹上立出

一云牛屎炒令大熟入醋半盞以青

布包於母臍上下熨之立下

○難產多是氣血虛亦有氣血凝滯而

不能轉運者亦有因八九箇月內不

能產者

○又曰臨事倉猝用力失宜遂有難產

危

○催生散 白芷 炒 百草霜 白滑石

各等為未孕飯湯調下二三錢

神應散

治難產及橫逆皆曰水章

太早努力過多兒轉未遠或以破水
先下其血必乾若先露手謂之橫或
先露足謂之逆此藥無固其血服之
如魚得水 白芷 百草霜 右

等分為末童便米醋各半蓋調藥二
三錢沸湯泡溫服分二次服服畢又

用蜀葵子四十九粒滑石末三錢順
流水煎湯調服如入行五里即生

加味芍飯湯

治產難二五日垂死

芍 飯酪 一乾薑 散 醋 婦人髮 燻
燻在 右為末每服三錢水一盞煎七

分服約行五里生胎死胎皆可下

催生飲丹

治橫生逆產 黑飲

右以小銚子火上鑊化投入水銀二

錢急攪結成砂子傾出用熟絹紙作
瓦子如菜豆大臨產以香水送下立
產

如神丹

治難產 巴 三草麻 七 各 祛

羌 研入麝少許攪作餅子貼臍須臾
子母便分張

無憂散

治難產及胞衣不下臨月

預服之則子易生 飯 洗 芍 白芍
絡 七 木 甘 絡 五 枳 麩 乳 絡 一 血 餘

灰 烟 右 為 末 分 作 二 服 水 一 盞 煎 六
分去粗服

來時散

治孕婦欲產未產之時忽

然暈悶不省人事 木 麩 炒 陳 桂
芪 麥 芽 炒 生 姜 炒 碎 膠 炒 成 白 芍

絡 半 木 甘 絡 五 枳 麩 乳 絡 一 血 餘
灰 烟 右 為 末 分 作 二 服 水 一 盞 煎 六

分去祖温服

○來麩散

治孕婦欲產未產之時忽

然暈悶不省人事 木 麩炒陳眩

莖 麥芽炒生薑切碎膠珠或白芍

各半糯餅芋根一升右作一服六

一盞半煎至三盞去祖灌下未醒再

服

○灸法

治難產及胞衣不下急於產

母右脚小指尖頭上灸二壯炷如小

麥大立產

又灸至陰二穴在足小指外側去爪

甲如韭葉灸三壯又灸太衝二穴在

足大指本節後一寸骨鍾間灸三壯

肝經俞也

婦

胞漿先破下多胎乾先與四物湯養

血氣次濃煎葱湯放冷洗產戶令氣

上下通暢仍滑石末蜜調塗產戶裏

次服催生藥乳香末蜜丸温湯下佳

傳

若手足先露者用細鐵刺兒手足心

一二分深三四刺之以溫陰其上輕

灸送入兒得痛驚轉一縮即順生

○或見脚先下急以鹽塗見脚底又用

急擗之併以猛摩母腹上則正生

林

合易產以春符頭細燒末服方寸

七

○又龜甲燒末酒服方寸七

○又方用鷺甲

○又羚羊角一枚剉火為末酒調服方

寸七

又大麻根二莖水一升煎半升頓服

立產產衣不下亦可

○治難產珍珠末一兩和酒服立生

又赤小豆生吞七枚即生

○治橫倒梁上塵酒服方寸匕

○治橫產鐵杵藜藥者是也若無用
芥或銅科鏽亦可

右燒令赤投酒中飲之自然順生

○治難產及胞衣不下人溺一升用姜葱各一分煎二兩沸乘熱飲便下

○治倒產子死腹中艾葉半升酒四升煮取一升服

○難產惡證身重寐熱乍寒面黑舌青及舌上冷子母俱死面赤舌青母活子死面青舌赤口沫出者母死子活唇口俱青沫子母俱死婦曰舌下脈青黑而死卷水冷者子母俱死

婦胎衣不下母生子訖流血入衣中為血脹故不下但服奪命丹逐衣中血血散脹消衣自下

奪命丹 附炮半 壯兩于漆二升半

右為末醱醋一升熬太黃末一兩成膏和藥丸如桐子大每服五七丸溫酒吞下衣爛下林倉卒無此藥宜朴硝散方見胎死節

○一方紅花一兩酒煮濃湯服之

一方皂角棘燒末每服一錢溫酒調服

傳治胞衣不下 膝仁取半 通仁滑

細葵子二三升右水煎連進三四服立下

林如聖膏 治胎衣不下又下死胎

草麻一兩雄仁去壳研成膏塗母右足心纔下即洗去

○治胞衣不出婦人槌覆并口立下本婦人者佳

○又燒鐵精合赤投酒飲之又牛膝兩葵子兩水九升煎取三升分三服

○**一方**治血道閉澀胎衣不下黑豆一合炒熟入醋一盞煎三五沸去粗分二次服仍取鞋底灸熱慰小腹上三五次

○**一方**木麥赤小豆同煮濃汁服立出

○治產後惡血冲心胎衣不下腹中血塊塊錦文大黃為末米醋熬成膏丸如彈子大每服一丸湯化開服溫童便調更妙

○**一方**酸米醋七沙鍋內慢火熬至一升入百草霜末一兩大黃末二兩熬成膏丸如彈子大每服一丸溫童便化開服

治胎衣不下惡露不行腹中血塊神丸可代黑神散用大効

○**三退飲**治胎衣不下 蛇退一條 蚕退紙一蠟退四針 右葦箬盛燒存性細研順流水調服立下

婦人科下

產後

○**傳**丹溪曰產前當清熱養血為主產後宜大補氣血為要雖有雜証以末治之此萬世不易之論也

○**產**不可用芍藥以其酸寒能伐發生之氣耐服之只以莖易芍如腹痛者非芍藥不可雖新產亦用但以酒炒不妨

○產後之諸疾或乍寒乍熱似瘧或大

熱頭疼身痛如傷寒或卒中口噤如
瘧如癰或角弓反張或妄言見鬼心
神惶惑或耳目口鼻忽覺無氣如烟
薰之狀或腹中作痛綿綿不絕已上
諸証若非惡露不盡即是勞傷血氣
大虛之証

產後補虛用參朮芪陳取身尾骨灸
其如發熱輕則加茯苓淡滲之其熱
即除重則加干姜

或云大熱用干姜何也曰此熱非有
餘之和熱乃陰虛生內熱耳蓋干姜
能入肺分利肺氣又能入肝分引粟
藥生血然必與補陰藥同用之此造
化之妙方

一傳
產後血暈因氣血俱虛痰火沉上作
暈一陳導痰脂氣血加煖硃砂安神

丸亦可服以麥門冬湯下

○林
血暈者曰產時下血過多血氣虛極
致暈悶甚則昏不知人氣息欲絕若
作暗風治之誠為誤

○婦
血暈由敗血入肝經眼見黑花頭目
旋暈甚則昏不知人其目有三一有
用心使力過多者二有下血多
而暈者三有下血少而暈者

○生
生子以燒硬炭或江中黃石合通赤
置器於床前以醋沃之得醋氣除血
暈產後一腸時令作效一七日也

一法燒干漆令烟濃薰母面

○方
治產後血暈危困
煎赤芍二分 生地汁一盞 石水煎數沸
溫服如煩熱去飯入重便效

清魂散 治產後氣虛不安血隨氣

上迷亂心神故眼前生花甚不知入
口噤氣冷 澤蘭葉 參各一荆兩
芍藥 右細末温酒熱湯調灌即醒
一丸有耳草傳 每服二錢温酒入童
便調下

傳 產後血暈用韭葉細切盛於石甕瓶
中以滾醋之之急封瓶口以瓶嘴納
產婦鼻中即醒

又方用鹿角一段燒存性出火毒為
末酒調灌下即醒

林 一 方 紅花兩為末分一貼酒二盞
煎一盞温服

○ 芎藭湯 治產後去血過多及傷胎
去血多昏暈 飯身 芎 右等
分每服五錢水二盞煎八分服

○ 一方治產後血暈冲心悶絕 五靈
脂半生半為末作一服酒調下口噤
者灌之湯調亦可一方加荆穗等分
童便温酒

○ 牡丹皮散 治產後血隨熱上攻心
昏暈悶絕 牡 大蘇芒烙 三冬
瓜子 桃去皮 右分二貼水盞
半煎至一盞入芒再煎一二沸去粗
服口噤灌之

○ 奇効方 治產後血上心已死
真鬱金燒存性為末温米醋調灌下
立活

○ 蒲黃散 治產後惡露不快血上搶
心煩悶昏迷或狂言 乾荷葉 桑
牡 生地 甘草各二蒲生六右水
少入蜜少許服

○ 凡產婦昏暈敗血上冲者 牡丹散

蒲黃散

奇効方 五靈脂 紅花

為王對若血暈者 清魂湯 芫蕪

湯為王對其餘 韭菜煎法等及返魂

丹可通用也

一產後惡露不盡腹痛

雖惡露不盡或感邪或喜怒斬然而

止餘血停滯故腹痛

一方治惡露不盡腹痛往來胸滿少

氣 澤蘭熬 生乾地 飯各三

芍 生姜各十 廿分棗十四 石水煎

溫服欲死塗身得瘥

一方治產後下血不盡腹內堅痛不

可忍 飯 芍 桂各三 桃十百二

石煎服末 瘥加大黃二兩

一方治產後惡物不盡腹內疝痛

生乾地 飯各一兩 生姜切如蠅

頭大尾

傳 細末 姜酒調下

日積血而刺痛者宜桃紅飯之類

丹溪活套云惡露不盡作痛 四物

湯調香附五錢末服甚者加桃

惡血不去發寒熱成癥瘕者 四物

加 稜 莪 乳 沒 香附 桃

紅 五靈 乾漆之類

產後腹痛不息 四物加烏藥 香

附 桂 良 陳童便和醋煎服甚

効

當飯養血丸 治產後惡血不散發

熱腹痛及經候不調赤白帶下腹痛

飯 赤芍兩 牡 桂 延 各

右為末煉蜜丸如梧子大每服三十

丸或酒或米湯任下

定痛散 治產後惡血不盡腹中作

明益四 三十三

痛 飯 芍药二桂行右作二服
酒水命一盞半姜五片煎服

〔黑神散〕 治惡露不盡血氣攻心腹
痛及血暈等証 黑豆炒去皮熟地
酒 飯洗桂 姜炮芽炙白芍
蒲略四丁方無蒲有附右為末每服
二錢童便和酒調服

○ 治產後腹痛鯉魚鱗燒灰酒調服

○ 治產後血不盡心中疼悶荷葉熬令
香為末煎水下方寸匕

○ 治產後腹中絞痛未桂温酒服方寸
七日三服

○ 治腹痛非芍藥不可雖新產亦可用
但酒炒

○ 產後惡寒發熱腹痛者掌去惡血若
腹不滿者非惡血

一婦 兒桃痛者產母胎中宿有血塊產時
其血破散與兒俱下無患若產婦藏
府風冷血凝滯在小腹則結塊名曰
兒桃

○ 丁方治兒桃腹痛 延 飯略二

琥 蒲炒各分芍半桂二紅分右為末
童便和酒調下

○ 丁方 桃碎芍 飯 芍 于膝

○ 笑笑散 治產後心腹絞痛欲死及
兒桃痛 蒲炒五分各等右為末醋
調一錢熬成膏湯化服

○ 三聖散 治兒桃痛 飯 桂
延各等右為末每服二錢熱酒或童
便調下

○ 四物一黃散 治產後腹中血塊作

痛 飯炒芍藥熟地 白芍炒各半

蒲炒半右為末每服二錢空心溫酒調下

○四神散 治產後留血不消作塊疼

痛下痢不止 飯 姜炮 芎 赤 右 右等分為末每服三錢溫酒調下

○林 治兎桃痛 伏龍肝為末溫酒調下

錢服效

○產後血塊 滑石沒仁血竭如無

此丹代 右為末醋丸如梧子大每服二十丸醋湯吞下

一產後自寒乍熱附瘧

○林 回產勞傷血氣陰陽互相乘為乍寒乍熱亦有惡露下少留滯經絡亦令入寒熱必小腹急痛陰陽不和增損

四物湯敗血停留奪命丹 增損四物湯 治產後陰陽不和乍寒乍熱 飯 芎 參 姜炮 芍 炙 白芍各等 右煎服

○奪命丹 在肺衣不如無奪命丹可用

五積散加醋煎服或黑神散

○大調經散 治產後血積惡露未消

榮衛不調陰陽相乘增寒發熱或目汗腫滿皆血氣未平所致 大豆如 皮一 神兩 琥一 右為末每服三錢濃煎紫蘇黑豆湯空心調服常急煩悶小便不利亦效

○知母湯 治產後乍寒乍熱通身溫

壯心膈煩悶 知母八分 赤芍 芩三 桂六分 甘草一 右煎服或四物湯加紫芍亦可

紫芍亦可

○小柴胡湯加生地黄治產後惡露方
下忽然斷絕寒熱往來盡靜暮劇狂
言此乃熱入血室

○傳
增損四物湯 治產後陰虛發熱或
日間明了暮發寒熱 飯 芎 生
地 柴各等 右水煎

○嘗散 治產後氣血俱虛恐增客
熱宜服此以去惡露 飯 白芍
芎 苓各一木 右為末每服二
錢童便入溫酒調下

○林
草果飲子 治產後瘧寒熱相半或
多熱者 半 赤苓 菓根去其皮
陳 芎 芷各一分 蘓 良 青各
分 葛四分 右分二貼水二盞姜五
片棗二枚煎至八分當發自早連進
三服無不效者

○婦
治產後瘧疾熱多寒少 清脾湯
養胃湯佳也

一產後羸勞
○婦
產理不順疲極筋力憂勞心慮令虛
羸容悴食不消和感肺咳嗽口乾痰
逆喘乏頭昏節痛腹中絞刺宋衛受
邪頻發時盜汗寒熱如瘧背膊煩悶
肢重着床名曰羸勞

○傳
產後發熱自汗肢躄疼痛日久不愈
名羸勞可用當飯羊肉湯 飯身
參各七莖而生姜酢右用羊肉一升
煮取清汁五大盞去肉入藥慢火煮
取四盞分八服徐飲之

○人參當飯飲 治產後去血過多陰
虛生內熱心煩短氣自汗頭痛 熟
地 參 飯身 桂 門 白芍各

一右入竹葉五片生薑三片水煎

婦
○**治虛勞** 熟地 參 白芍 白苓

木略一續 莖 桂 五味 飯

明 芍各三 右入生薑水煎

○**一方** 治產後羸瘦煩熱自汗飲

葶勞寒熱自汗羸瘦用之 白芍

飯 地骨 參各半 沒 桂各二壯

仁右水煎

○**一方** 治血虛勞倦盜汗多困少勞

咳嗽 飯 莖 芍各一 柴 前

絡一右入桃柳枝三寸大棗烏梅各

一枚生薑二片水煎若有痰不用烏

梅

○**一方** 治產後虛乏不食四肢倦怠

心腹痛補虛治氣 參芍桂甘生

姜各一飯一兩生地兩右入大棗煎

○**二分散** 治產後日久虛勞針灸具

不効 芍 飯 熟地 芍 木

苓 莖各三分 柴 參各二 芍 半

甘藥各七右分一貼水二盞姜三片

棗一枚煎八分服

○**犀角飲子** 治產後亡血津液虛損

自汗發熱困倦口乾 犀 門 木

各八柴一分 枳 地骨 生地 甘

麥飯 參 苓 芍 莖各一分半右

分二貼水二盞姜二片浮麥七十粒

同煎八分溫服

○**人參驚甲散** 治產後由產內味滯

百日或動作勞傷成羸勞其壯虛羸

乍起乍臥飲食不消時咳頭自眩痛

發渴無常盜汗寒熱如瘧皆脾拘急

服之立効 參 桂 桑寄 飯

白苓 白芍 桃 熟地 門 茸
五各續半 不 膝半 驚 芩 各 一 右
為末猪腎一對去脂膜水二大盞生
姜一片棗二枚去核煮二盞去粗入
藥末二錢葱三寸烏梅半箇荆芥五
穗煎空心服晚食前亦一服効

○**八珍散** 治月水不調膈腹疔痛全
不思食藏府怯弱泄瀉小腹堅痛時
寒熱四君四物合為一劑各等右姜
棗煎服

○一方產後補虛 參 木 苓 甘
炙 絡 苓 飯 身 芍 各 半 陳 仁 右 分
二貼水二盞姜三片煎八分溫服

積不化腹痛而成泄痢者

○**調中湯** 治產後瀉利腹痛六脈沉
後日飲冷當風腹痛良妙飯酒
鳴泄利者用之

桂 白芍 附 炮 芍 各 二 甘 炙 參 各
不 右

○**胃風湯** 治產後當風致瀉泄腹痛
者 參 苓 芍 飯 桂 木
白芍各等 右入粟米一小撮

○**治中湯** 加砂仁 治日停食而腹痛泄
痢者

○**傳** 產後瀉痢用陳 木 苓 芍 芍
炒滑 芍 甘 炙 煎服立効一方有
乾姜

○**林** 產後面目四肢浮腫此因敗血乘虛
停積於五藏循經流入四肢留滯旧
深腐爛如水念浮腫醫不審作水治

之天柱者多但服調經散血行腫消

○調經散 沒 瑰絡一桂 赤芍

飯酒浸各麯半細拌其後二右為末 每服半錢姜汁温酒各少許調勻空心服

○天調經散 治產後惡露不淨敗濁

成腫滿方在作寒

○加味四物湯 治產後浮腫氣急脹

大喉鳴 本朮加牡 朮 荆 桑

小豆 腹 杏 半 馬兜入芎藭

苛脚腫又加苓皮生姜皮陳桑

○積木湯 治腹大如盤水飲所作

實一兩 木三兩 右每服四錢水煎温服

調經散治血分

○傳 正脾散 治產後通身浮腫及治婦

人大病後脾氣虛弱腹脹 莪 炮

附米童便 苘 甘 炙陳 右等分為

末每服二錢灯草木通湯調下

○丹溪活套云產後通身浮腫四物加

乳沒桂通腹良換血竭

一林 產後腹脹滿悶嘔吐者因惡露下少

敗血散脾胃脾受之為脹滿胃受之

為嘔逆宜用抵聖湯亦有惡露過多

氣無所主聚脾胃而脹滿嘔逆者抵

聖湯去澤蘭芍倍陳姜

○抵聖湯 赤芍 半 澤蘭葉 陳

參各一耳後半生薑切片焙 右每

服七錢水二盞煎八分食遠温服

○桔梗半夏湯 調和陰陽治腹脹吐

逆 桔 半 陳各五 一方加枳右

分二貼水二盞姜二片煎八分服

○一方 治產後嘔逆不止 陳三不

耳各分八右分一貼水一盞
姜五片煎不分服

傳 拒勝湯 治產後腹脹滿悶嘔吐

赤芍 半 澤蘭葉 參 陳法箱
各分一右加姜二片

○八味理中丸 治新產血氣俱傷體

弱多汗一百日內常服壯氣補虛止
嘔吐 參 姜炮縮 白苓 麥芽
麩炒麩炒略耳各一木兩右為末米
糊丸如梧子大每服二十九姜湯下
有痰加半夏

一乳汁不行附吹奶

婦 乳汁不行有二種氣血盛乳脉壅閉
而不行 通草 漏芦 土瓜根佳
也血少氣弱乳汁絕少者 者蹄
鯽魚 鐘乳佳也

年少初產乳雖脹汁不行有風熱服
清利藥則乳行累經產而無乳亡津
液故也服滋益之藥以動之

雖有乳不多者服通經之藥以動之
以美臍引之

婦人素衝任之經有疾乳汁少而其
色黃生子怯弱多疾也

未產前乳汁自出多者生子多不香
乳子忽睡乳不時泄結痛亦有不痛
不痛腫硬如石日吹奶不急治則癰
腫急與栝樓散以手揉之則散

○栝樓散 乳香研分栝樓根末一右
酒調下

○見不飲乳脹結担其汁不盡皆蓄留
輕為吹奶始乳重為癰

○方 治吹奶作癰 葵莖及子右

未酒服方寸匕

○傳治乳汁不通 通草 牡 瞿 柴

天花粉 絡一 桔仁 青 芷 木通

赤芍 堯 甘各半 右為一貼 煎

食後細飲之 更摩乳房

或無子食乳者 要消乳麥芽 一兩炒

作四服 白湯調下

○漏芦湯 治婦人肥盛氣脈壅滯乳

汁不通或留結欲成膿 漏芦 二兩

蛇退條 一 土瓜根 十根切 右為末 每

服二錢酒調下 仍吃熱羹湯助之 林

無土瓜根有栝樓 按土瓜當作王瓜

實十箇 火燒存性 按土瓜當作王瓜

其實如瓜萎而小如荔枝色黃藤葛

葉圓無缺者是

○鐘乳散 治婦人氣虛血少脈涉不

行乳汁絕少 鐘乳粉 研細 每服二錢

濃煎漏芦湯調下

○母猪蹄湯 治乳汁不通 林 服藥仍

梳頭乳自下 母猪蹄一隻 通草 四兩

水丁子煮取四五升飲之 未下更作

下料服之

○至露散 治產後乳脈不行身熱頭

目昏痛大便澀滯 參 白苓 甘

各一 桔炒 芎 芷 絡三 飯半 分 芍 仁

粉 右水煎

○奇効方 麥門 去心 酒磨犀角 約一

錢石門冬末 一錢 犀角酒服

○一方玉乳汁 煖米 糯米 各半 茵

苳子 合生 苳子 兩者 右同研藥合 雜

去粗分 二服 止下

○釀乳方 澤 細 猪 赤 苓 天 花 各

分 四 生 地 三 分 苳 苳 各 一 分 右 分

一服木煎半飢時服

○酒毒犀角飲 治產後吹乳 荆穗

細風各其後二鼠粘子以右水煎食後頓服以手揉之乃用芙蓉葉為爛井水調稀塗之如蜜少許調木妙

○鍼法 乳癰腫痛諸藥不能止痛鍼足三里入五分通立止

○婦 乳癰足陽明經發不痛血氣不散結聚成癰四十歲以下治之愈五十歲以上難差又姪娠乳癰無害

○蓮翹湯 治產後乳汁內結而腫硬 攻痛 翹 升 芒 各十玄參 芍

白欬 已 射于絡八大黃分三甘 分杏八十箇右剉水煎下世硝服之

一產後亡見鬼神 林 因產走耗其血敗血奔冲流於心所

以在見鬼神言諸顛倒非風邪也服 調經散 方在面自加生龍腦一捻 煎服得睡即安

又有因血虛心氣不足驚悸恐怖者 宜用蘇合香丸溫童使調服

或辰砂妙香散生地黃當歸煎湯調 服

又有執入血室而顛狂者小柴胡加 生地

○傳 琥珀散 治產後瘀血攻心迷悶妄

言見鬼 琥 鐵粉 各一參 神 生地 膠珠 各七 硃砂 五 麝 各

各 右為末每服一錢用金銀煎湯調 下

○天麻地黃煎丸 治產後舌強不語

眼見黑花或發狂見鬼及胞衣不下

心腹脹滿等証

生地乾者 拍生薑各二斤各用石臼研
以新瓦細以布瀝去汁留粗
各姓乾飯延炒琥珀一蒲兩四石
為末煉蜜丸如彈子大每服一丸
當飯湯化下林 以生薑汁炒州黃柏
以地黃汁炒生薑各至乾其為末
為度

○相子仁散

治產後證妄者心血虧

欠心神不守所致 相子 遠 參
桑寄 風 琥 飯 熟地 甘炙
右等分細切每服五錢先用白羊心
一枚煮汁二盞去羊心及相溫服

○茯苓散

治產後心虛怔忡言語錯

亂 參 甘 山 飯 絡 一 遠 苓
桂 門 絡 半 右 作 一 服 加 生 姜 三 斤
大棗一枚水一盞半煎至一盞去粗

溫服

○婦

一 方 治產後七日內宿血不散

人衝心迷悶 荷葉分三延 地黃汁
二 右細切水二升煮沸下延胡空
心三服忌肉丁日

一 產後中風 附症

○林

產後風邪乘虛而入或身軀緩急或
不仁或口目不正或忽悶亂及中風
候宜小續命又有產後五七日強力
下床或月裏房室或懷憂恐怒動擾
沖和得病之初眼泄口噤肌肉攣攣
漸致腰背筋急癱直者不可治此乃
人作非的尔風也

○婦

邪乘虛入諸陽經則腰背反折如角

○血虛肉理不密故多汗風搏之則變

昏口噤背強擡頭身反折灌小續命
稍緩若汗出毛拔不及者不治

○林產後中風小續命最為要藥但手足
搐搦者宜去附子

○聖神古并散 治產後中風口噤舌
足瘳癱 荆艾穗 每服二錢

豆淋酒調服 婦童便亦可噤者
灌之噤甚吹鼻中

○一方 治產後中風不省人事吐涎
搐搦 飯 荆穗 等 右每服五錢水
酒各一盞煎七分溫服如牙關緊急
幹開灌之

○天豆子湯 治產後中風如角弓反
張口噤涎潮 黑豆半斤炒焦黑
無灰好酒每瓶此酒入磁器中獨沽
伍同煎至六七分去滓溫服

○治產後中風四肢麻痺背項強急

風雨乃 桂各半 羚羊角 屑 芍
飯 酸棗仁 牛蒡子 炒 石水煎
溫服

○傳 產後中風口眼喎斜等証不可作風
治以大補氣血然後治痰

○林 產後不語者敗血停菴上于心心氣
閉塞則舌強不語宜服

○八珍散 參 苜 生地 酒 薑 芍
各一 朱砂 風絡五 細 芥 煎 半 右
為末每服二錢薄荷湯調服地黃
膈脾胃不快者以當飯代之右也

○孤鳳散 治產後閉目不語明鑿為
禾一錢白湯調服

○林 產後遍身疼痛者日產走動血氣升

月五十四

四十四

降失當，通滯，開筋，筋脈引急，是以遍身疼痛，甚則腰背強，不能俯仰，手足不能屈伸，或身熱頭暈，不可作他病治之，但服趁痛散，猶流血氣，使筋脈舒暢，痛自止。

○趁痛散 膠酒飯浸桂 木 莖

獨 生姜各半 雄白一分 二 其後一右水煎加桑寄生七枚

○如神湯 治產後餘血不盡流入腰

脚疼痛 朴 牛 芍 枳 木

桂 陳 白 姜 各 大 蒼 仁 桔 其 名

香 附 妙 苗 妙 參 苓 芍 飯 正

桃 妙 去 瓜 哈 大 右 各 二 貼 水 一 盞 姜

三 片 煎 八 分 食 煎 溫 服

一 杜 產後脚氣者產後熱悶氣上轉為脚

氣亦有自產婦平日感風寒暑濕之氣

蒸襲足經乘虛而發其狀卒起脚弱熱悶心煩兩足痛痺嘔吐氣上皆其候也服小續命兩三劑必愈惡附子者宜服獨活寄生湯若嘔者去地黃倍加生姜

一 婦 產後腰痛婦人腎繫胞產則旁腎推

胞諸虛味後感風寒腰故腰痛

○一方 治產後風冷腰痛不可轉側

獨 芍 芍 桂 續 生 姜 桑

寄 絡 六 飯 風 絡 八 右 水 煎

○當飯黃芪湯 治產後失血過多腰

痛身熱自汗 飯身延芪仁芍 羊 肚

一 林 右加生薑二片

產後血崩者回產血氣暴虛未得不

復回勞役或日驚怒致血暴崩又有

氣衰血弱亦變崩中若小腹痛甚此

為肝經已壞難治俱宜固經丸止之
若小腹脹滿此為內有瘀血未可止
之且服芎藭湯

傳

固經丸

治產後血氣未復而有房

事及勞役損傷致血暴崩或淋瀝不

正 沒 赤石 補骨 木賊各半

附一雙炮 右為末米糊丸如梧子

大每服二十丸溫酒下或陳米飲下

林無沒藥有

熟地黃散

治証同前亦治一切

崩中下血不止頭目沉重 熟地

半茸一分蒲炒黑 蟹爪微炒 白苓半

桂二分 膠角膠不炒得鹿 白芍伴伏龍

肝七分 男子視襠燒存性 飯不右作

二服入竹茹一錢水二盞煎至一盞

溫服

婦

一方

治產後七八日惡露不止

飯分芍 續絡八芍 茹絡四 生地

二乾十 右水煎空心頓服

傳

丹溪活奪曰產後月餘經血淋瀝不

止四物加芷升調血餘灰

林

烏金散

治產後血迷血運敗血不

正淋瀝不斷腹臍疼痛頭目昏眩多

汗又治崩中下血不止 血竭 百

草霜 男子亂髮灰 松墨醋浸 鱗

鱗燒飯 延 桂 赤芍右等分為

末每服一錢空心溫酒調服

○

狂蛎散

治產後淋瀝不絕心悶短

氣不食面黃體瘦 蛎粉 芎 熟

地 白苓 龍骨絡二續 飯炒

艾葉酒炒 五味 地榆絡一茸灸

左右各一貼水二盞姜三片煮一校

前服

一產後淋 附尿不通

附尿數遺尿

傳產婦不謹損破尿脬而致淋瀝不禁其脉虛甚與峻補參朮為君芍液為臣桃陳莢苓為佐以猪羊脬煎湯熬藥汁極飢飲之一日而安

○茅根湯

治產後諸淋無問冷熱膏

石氣血悉主之

白茅根五兩

白苓各二錢

葵子 各一分半 蒲黃

桃膠 滑石各七錢

紫貝一箇 石首

魚腦沙燒

右分二貼水二盞姜二

片灯心二十莖煎六分温服為末每服一錢木通煎湯下亦可如氣壅不通橘皮煎湯下

○木通散

治產後小便不通

通 麻仁

葵子

滑石

枳 和

各二錢 甘草右水煎

○灸法

治產後小便不通腹脹悶

用鹽於產婦臍中填與臍平却用葱白剝去麤皮作一束切作一指厚安臍上用艾炷於上以灸灸之覺熱氣入腹內即時便通效難具述

○桑螵蛸散

治產後小便數及遺尿

桑螵蛸十五箇 鹿茸酥炙 各一兩 蜆煨 赤石 朴各六分 石為末每服一錢空心米湯調下不禁者加龍骨一升無石脂厚朴有甘草生薑

○治產後小便不禁

雞屎燒灰空心

酒服方寸匕

婦

○方

治証同前

雞尾毛燒末温

酒調下

○方

治產後尿數

并遺尿益智仁

為末米飲下

一林 產後大便秘澀，因產津液暴竭，且進橘杏丸以潤之，滑之若尚不通，服麻仁丸以通利之。

○橘杏丸 治弱人氣秘大腑不通

橘 杏去皮尖 各等分 右為末，煉蜜丸如

桐子大，每服五十丸，米飲送下。

○麻仁丸 治產後大便秘結 麻仁

去枳 參 大 飯各等 右為末，煉

蜜丸如梧桐子大，每服二十丸，白湯

下，未通漸加丸數，以便潤為度。

○滋腸五仁丸 治產後血氣虛損，大

腸閉澀，傳導難艱 杏 桃各去

麩炒各 一兩 栢子仁半 松子仁二 郁

李仁麩炒 橘 紅四兩 右五仁研為

膏，合橘皮末和勻，煉蜜丸如梧桐子大

每服二十九，加至五六十丸，清米飲

下，一方有飯梢五不。

一林 產後口鼻黑起，鼻衄者，陽明者，經脈

之海起，鼻交頰中，俠口交入中左之

右，右之左，產後氣消，血敗入於諸經，

却還不得，故冷口鼻黑起，及變有鼻衄，

此產後虛熱變生，此候不可治，名曰

胃絕肺敗，急取緋線兩條，並產婦

項心髮一條，繫兩中筋，上節止，無葉

可療，亦厭根之一端也。

若口鼻無黑起，止鼻衄，則黑神丹犀

角地黃湯皆可。

一林 產後喘急者，因產後所下過多，米血

暴竭，氣無所主，獨聚於肺，故令喘，名

孤陽絕陰，難治。若惡露不快，敗血停

凝，上潮於肺，亦令喘急，祖服奪命丹。

血去喘止

婦
○**一方** 治產後血入脈面黑喘欲死

參二兩 蘇木二兩 右蘇木一味煎去滓
隨時加減入參末服之

○**奪命丹** 治惡露不脫敗血薰肺喘

急若感風寒者因憂怒者食鹹冷者
並不可服此况孤陽絕陰者乎
胎衣
之內

一產後咳嗽

○**二母散** 治產後惡露上攻流入肺

經咳嗽 知 貝 參 白苓 桃
杏並去尖右等分水煎

○**旋覆散** 治產後血風感寒暑濕喘

蒲咳痰坐卧不安 旋 赤芍
前 半 杏 荆穗 五味 苓
麻 耳絡等右入姜棗

○**一方** 治產後肺風感微邪咳嗽

甘 桔各六 款 四 生 麥 門 冬 生 地
各十 分 葱 白 握 右 水 煎

一方 治產後咳嗽痰喘稠粘氣急

前 五味 芫 貝 各六 桑 苓 各
分竹葉片十右水煎

○ 若產後喫鹽太早而咳者難治

一產後頭痛

○**加減四物湯** 治產後頭痛血虛氣

弱痰癖寒厥背冷頭痛 羌 芎

風 香附 炒 熟地 各一 細 芷 蒼
各一 甘 炙 飯 各半 膏 二 右 水 煎

如有汗者是氣弱頭痛也加芍仁桂
半 生 姜 三

如痰癖頭痛加半仁苓半 生 姜 三
如熱厥頭痛加芷仁膏仁知

如寒厥頭痛加天雄仁附子各炮姜片

一產後虛汗

○麻黃根湯 飯 葱 麻黃根 蛎

粉參 甘草小麥等右煎服

○當歸黃芪湯 治產後自汗壯熱氣

短腰痛 芪 芍各四飯後右分

二貼入生姜三片

○黃芪湯 治產後虛汗不止 芪仁

木 風 熟地 呀煨白芍 門

甘草各右入大棗一枚

一產後渴

○熟地黃湯 治產後虛渴口乾少氣

脚弱眼昏飲食無味 熟地酒浸焙

半參四分門三甘草 枯石分二

貼水二盞糯米一撮姜五片棗一枚

煎八分服

○見現丸 治產後食麵太早麵毒薰

肺口乾煩悶或飲食過飽所致

良炒姜黃 華澄茄 陳 參 莪

炮稜炮各右為末用蘿蔔者爛研汁

煮麵糊丸蘿蔔湯下

○人參白朮散 治產後勞傷虛羸怒

氣上逆口乾煩悶 參 朮 芎

宿 生地 苓 甘草 滑 藿

各等 水煎

○門冬飲 治產後血虛煩渴不止

芎根切 一枯 參 甘 苓 略二大

棗二十門生用右水煎須服四劑而

瘥已菘菜

一產後陰脫

○婦治產時勞力太過陰脫肛狀逼

迫腫痛以銚精粉上推之

○又灸臍下橫文二七壯

又用枳殼煎湯浸良久即入

○又用五倍白礬煎湯浸良久

○又葶麻子十四枚去殼研塗頂心如入即去

○傳當飯黃芪飲 治產後陰脫謂陰戶中官脫

水煎 蝦飯 白芍 芪 參各二升半右

○當飯散 治婦人陰脫 飯 芩

白芍略一蠟皮半兩燒 蛎殼二右為

未溫酒或米湯調下忌登高舉重

○丹溪活套曰產後子腸不收小物加升風以酒炒為君

○桃仁膏 治產後陰癢煩悶 桃

五味 枯凡為末研桃仁膏半付

○硫黃湯 治產後玉門不斂 硫黃

兩具 茱 皂絲各二蛇床兩右水煎

頻洗之自斂

○林治產後陰脫 硫 烏賊骨各五

味半 右為末搽患處

○下方加蛇床子炒布包 乘熱熨之亦

治產後陰痛

○草麻葉 枯凡為末以紙片攤藥托

入

○治子宮不收痛不可忍以淡竹葉根

煎湯洗仍用五倍白礬為末干搽立

效

○林一玉門瘡腫此乃非產後之証

治婦人陰瘡先以荆芥蛇床子煎湯

薰洗軟帛搽乾次以枯凡黃丹扁畜

蒙本略 硫 荆芥 蛇床 各五 白蛇

蛻一條燒 右為末脂麻細調塗濕則乾燥

○一方治陰中生瘡如虫咬痛生槐桃葉繡裹內陰中日三四易之

○**黃芩散** 治陰戶生瘡 芩 飯

芎 白礬 連 右等分煮湯薰洗

○治陰門腫其菊苗研爛百沸湯泡先薰後洗

○治陰腫不散 麻黃 荆 茄種皮

蛇床 真杉木 蝟皮 右為末敷

或煎湯薰洗

○**一方** 小麥 杜梢 白朮 五倍

葱白 右煎湯淋洗右妙

○治陰瘡 硫黃末敷

○治婦人陰痒不可忍 麝少杏燒在

右為末如瘡口深用輕絹包藥線答

口火灸熱內陰中

○**又方** 枸杞子根煎湯淋洗其者湯

亦可

○**大黃散** 治陰痒 大黃微 芩 莖

炙 酪赤芍 玄參 丹參 山茱

蛇床各半 右為末每服二錢食煎溫

酒調服

○治婦人陰中生瘡凡入九竅中者因

草烏七箇燒 右用小瓦罐盛米醋淬

乘熱薰候通手洗之

○治婦人交接輒痛出血 桂心 伏

龍肝各等 為末每服三錢空心溫酒

調服

○**下方** 連紋藤 其絡四 右為末作

二匙水四升煎一升洗之日二度

○治婦人交接陽道違理及他物傷犯

血出淋瀝髮灰并去布灰擦之

○**一方** 刺雞冠血塗之 治陰門腫

堅痛 枳實斤碎炒令熟故微暴烈

冷即易之

一斷症

○**林** 四物湯加芸芫子 經行後空心前

服斷產

○**升麻葛根湯** 加瞿穗 膝枯 肢

炮各七 右分八貼水二盞煎八分空

心午前一服二相并煎晚食前服通

作四日服盡亦每日經行後便服亦

加芸芫子一撮炒

○**一方** 白麵麴并無灰酒缸杵作糊

煮至一升半絹帛濾去粗分作二服

候月經來比晚喫一服次早五更一

服天明一服經便行終身無孕

○**下胎不動聲色** 三四日後如月水通

為驗 五積散二貼 蘇木二寸 桂

紫金牛 稜 莪 乾漆 各三寸

芷半 不壯仁紅不飯半 右酒水各

一盞煎一盞服

○**返童丹** 一名益母丸 一名濟陰丹

益母草 下味 此草生二種 於端半小

暑者或六月六月花正開時連根收採

透風處陰乾用時以石臼搗羅為細

末煉蜜丸如彈子大每服一丸 專

治橫生倒產難產產後諸証及孕婦

胎氣不安或跌磕觸動下血胎漏等

証若量加木香全當散赤芍藥木香

不限丸數以病愈為度且服二丸或

丸桐子大服五七十九丸熬膏尤佳

熬膏法 益母草依法採連根葉

葶洗淨石白，搗爛，以麻布按取濃汁，入砂鍋內，文火熬成膏，如無沙糖色，爲度，入磁罐內，收貯，每服用一飯匙，極妙。

○子死腹中，腹悶冷痛，小便淋血，沫出，腹脹，四肢如冰，冷指甲青者是也。或臨產時服此藥一丸，血氣調順，諸病不生，破血止痛，補虛養脈，童便酒各七分，化下，或只生取一握，連根搗爛，絞汁入蜜少許服立下。

○產難者，或產後惡物不盡，臍腹刺痛，惡露上衝，心胸煩悶，童便好酒化下。胎衣不下者，發寒熱時有冷汗，但出敗血，其衣自出，如帶斷，服此藥自下，或橫生不順，心悶欲死者，童便好酒化下，薄荷炒薑湯亦可。

○產後二日，起時不得，眼前黑花，俗呼爲暗風，或血熱，口乾渴，心悶亂，如見鬼神，狂言，童便好酒各七分，化下。

○產後四肢浮腫，多寒熱者，或氣喘，或小便澀滯，喘嗽胸膈不利，兩脇疼痛，溫酒化下。

○產後寒熱往來，如癘，或臍痛，溫酒化下，桂枝湯亦可。

○產後中風，牙關緊急，身不運，童便好酒各七分，化下。

○產後大便閉結，口苦煩渴，童便好酒化下，薄荷湯亦可。

○產後身痛，腰痛，痛溫米湯下。

○產後崩中漏下，不止者，糯米素丸湯化下，當飯桂枝湯亦可。

○產後鼻衄口乾舌焦黑童便好酒化
下

○產後吐逆不止溫酒化下

○產後赤白帶下秦九糯米湯化下或
每服用末二錢食前溫酒調下

○胎前臍腹痲或作聲溫米湯下

○產後瀉血專湯下

○月水不調溫酒下或四物湯送下

○婦人久無子息溫酒下至十九二十
丸大有効四物下亦可

○急用時連根莖生搗汁入水飲可治
喉閉吐即愈冬用根

○產後一切血病并傷損用膏一匙酒
化服內檢亦可

一林
○產後不治之二證

○產後氣急喉中作循見聲者敗血入

心膈萬無一生一不治也

○產後中風者蓋回七日未滿勞動百
日之中傷勞事申風其狀眼澁腰強

筋急角弓反張牙關緊急如此者非
死邪自傷死者一不治

○產後面色黑青遍身黑壓者百無一
生三不治也

小兒科

一 枝穢之法

○林 生下急用軟帛拭淨或綿裹手指蘸連耳汁拭口惡汁稍定更以蜜少許調朱砂一字抹入口中鎮心安神解毒一生免瘡疔之患

○惠 炙甘草細切水煎去滓綿裹指蘸臍兒口中令嘔吐痰涎及瘀血方與乳汁智散無病

一 臍帶折法

附回氣法 附臍腫

○婦 臍帶可只留三寸許帶中有小虫急去之留之異病或綿扎定然後洗之不熱濕氣入腹生癰風兒生三日烙臍帶二三別處勿加火艾恐成驚癇

○初生氣欲絕不能啼者蓋因難產氣

悶或胃寒所致急以綿絮包裹未可斷臍帶且將胞衣置炭火上燒之仍用大紙燃蘸油點火燒臍帶得火氣由臍入腹須臾氣回方可斷臍帶

○斷臍之後為水濕所傷或襁褓濕氣傷臍中臍腫多哭不乳 黃柏 釜下墨 亂髮灰 等分為末傳之

○臍中汁出先痛 柏葉傳之或相木之傳

一 臍風撮口 三

○傳 日臍折傷風或尿在胞中遂成臍風發熱面赤啼聲不出 赤足金頭蜈蚣 浸一條林酒 瞿麥 蝎梢 四厘 蠶矢 七 纏去 右末鴉管吹入鼻中如嚏噴吐聲可治後用薄荷汁調服之

○林 面目黃赤氣息喘急啼聲不出蓋此

胎熱流心脾故令舌強唇青撮口飲
乳有妨 真姜蚕絲絲為末蜜調塗
口

又牛黃研作餅調一字抹口中

○**蝎梢散** 治膈風及百日內撮口臍

風 蝎梢四十九箇每箇用薄荷
葉捲定以線扎放砂鍋中
炒轉炒令薄 姜蚕四十九箇生姜
黃乾為度

右二味為末更以腦麝各少許研勻
雄雞肝二片煎湯調服一字

○灸法臍風撮口請治不效灸然谷三

壯穴在內踝前起
大骨下陷中

一二使不通四

○應初生二便不通腹脹欲絕急令婦人

熱湯漱口吸嘔小兒前後心并臍下

手足心共七處每處三五次漱口吸

嘔紅赤為度須臾自通

○**林** 生下不大便先用葱火任入肛門次

用牛黃散送下硃砂丸牛黃散見前

硃砂丸見
吐瀉之內

一破泡五

○**惠** 生下即死急者口中上腭有泡以手

指擠破用綿拭淨便活若入喉不可

治

○**婦** 每日頻於無風處看小兒上脰頰凡

有白泡起以指馬甜破拭淨之

一貼顛六

○**林** 出胎時被風鼻塞閉星未姜汁調成

膏貼顛上病去除之

○初生鼻寒乳食不下用牙皂直直取

葱涎拌成膏貼顛會穴甚效

一不飲乳七

○**林** 治初生不飲乳及未便用葱白二寸

四破之以乳汁銀石器煎灌之立效

○治初生口噤不開不飲乳赤脚蜈蚣一條去足炙令焦細研如粉每用半錢

以猪乳汁一合和勻灌之

○扶苓丸 治口不淨穢惡入腹

浦短氣不能飲乳 赤苓 牡連 枳

等分 右為末煉蜜丸乳汁調灌

○白姜散 治產婦胎中受寒兒腹痛

不飲乳 木 陳 枳 枳 桂 白

姜 其粉烙右劉水煎蘇與之嘔

加木瓜丁香

一洗浴入

○婦兒生浴時 寅卯酉日吉 壬申丁

巳癸巳日凶 用益母草金銀草煎

汁浴則不生諸瘡

○小兒新生浴之用五根湯終身不生

瘡疥 柳桃棟梅槐謂之五根

○臍帶未脫不可頻浴頻浴則水入臍

中致臍風撮口

一謹養之法九

○惠天氣和暖抱之使見風則血炆氣

剛可堪風寒

○常令着地氣便筋骨壯若厚衣過暖

傷皮膚損血脈發瘡癩汗出腠理開

風邪易入腸胃尚脆而窄凡魚肉果

蔬燒炙稠粘等物皆宜禁絕務姑

息隨所欲積成痼疾

○婦天寒用父母常着舊衣忌裁綿太煖

則筋骨軟弱

○勿冷兒枕乳母臂作豆袋枕之

○乳母與兒同睡口鼻氣吹兒顙門兒

必真寒

○糊衣火焙見必丹毒熱疾

○兒衣服晒月下被惡鳥羽屎落遂成無辜之疾

○將惡相異物嬉戲忽見遂成驚悸一胎驚十

○患有胎中受驚故未滿月而發驚目上視股硬手足抽掣角弓反張痰涎壅盛名胎驚宜辰砂研牛黃許乳汁調抹入口中大妙母服防風通聖散

○至聖保命丹 治胎驚及急慢驚風

蝎十四 白附 南星炮 蚕炒辰 麝 各一 天麻 風絡二 金箔片 蟬蛻一 右為細末粳米飯九每兩作四十丸 初生兒半丸乳汁化下周歲兒一丸 金銀薄荷湯化下十歲左右有急候者一丸薄荷湯化下

○一月裏生赤十一

○初生兒月裏生赤肌膚如丹塗者生用牛黃散在裏次用藍葉散塗外乳母服清涼飲子三服

○牛黃散 鬱金 甘多桔 天花粉 蒼根各等 右為末薄荷湯入蜜調服

○藍葉散 藍青 知 甘多杏 龜 絡五 升 柴 寒水石 膏 赤芍 各四 於右水煎

○清涼飲子 般酒茸 大 赤芍 等 分右水煎

○一月裏生黃十二

○胎黃之證兒生下遍身黃色如金身熱二便不通乳食不進啼不止母目受濕熱或衣被太暖所致宜漸令裁綿厚衣被服生地黃湯

○生地黄湯

生地 赤芍 芎

飯 枯烙等水煎子母俱服之

一視手紋附頭面腹上

○傳一歲至六歲曰嬰孩以男左手女右手次指三關脈為驗病輕重死生之

訣名曰虎口



頭指

第一節名風關無脈則無病有脈則病輕第二節名氣關脈見則病重第三節名命關脈見則病劇九死一生惡候也三關通度脈候是極重之證必死

○三關通度針入指甲者不治

○傳凡頭面或肚腹有大脈俛青筋見者并是食毒物及驚積難治

○臆胸背百會穴下有二條青脈下對耳尖久而愈青不治

一診脈十四

○惠凡診小兒太極按三部一息六七至平和八九至發熱五至內寒弦脈風痲沉緩傷食

○傳七八歲曰剛九十歲曰鬆始可以一息指探掌後三部之脈以二息七八至為無病

○十一歲至十四歲曰童以二息五六至為寬脈

一觀形十五

○林兩眼無精光黑睛不運轉日暝無鋒鋸如魚眼貓眼者不治

傳鼻門黑燥渴難禁面黑唇青命莫存

壯犬青筋俱惡候更變腹有直身紋

○顛門腫起定為風此候應知最是凶

忽陷成坑如盡足未過七日命須終

一審外證十六

○咬牙甚者發驚口吐涎沫而吐者虫

痛昏睡苦噫者將發瘧疾也吐瀉昏

睡露睛者胃虛熱也吐稠涎咯血者

肺熱也小露睛者胃實熱也瀉青白

穀不化者胃冷也吐瀉乳不化者傷

食瀉下之身熱飲水熱在內也瀉赤

黃者胃熱毒也呵欠面赤風熱也呵

欠面青驚風呵欠面黃脾虛驚呵欠

而多睡者內熱也呵欠氣熱者傷風

也

一變蒸十七

○變蒸有十變五蒸者乃生精神意氣

俗謂之牙生骨長毋溪曰是胎毒散

也

○傳生之日始每三十二日一變其治

不汗而熱者發其汗天吐者微下不

可別治

○寢蒸之時切不得艾灸即且少與乳

食亦不可投藥餌

○疳疔散 治兒寢蒸發熱或咳嗽痰

涎鼻塞聲重 苓 朮 參 茸

桔 細 芎 絡 等 右水煎去芎加枳

○紫霜丸 杏十枚 皮十枚 赤石兩 巴三

粒去膜 代赭石煨醋淬 右各別研

和勻湯浸蒸餅丸如黍米大二歲以

下見二三九八歲以上十數丸食前

米飲或乳汁送下

○人參散 治夏蒸骨熱心煩啼叫
參 甘 麥 門 北 紫 胡 絡 二 膽 風
右煎服

○調氣散 治夏蒸吐瀉不乳多喘
木 香 附 朴 參 陳 藿 甘
炙 各 右水煎

○神仙黑子散 治夏蒸與傷寒相似
者當詳其証若上唇中心有白點子
者為夏蒸宜服此 麻 蘇 大 杏 連
右燒存性為末每服一字水煎服抱
見於溫暖處有微汗身涼效

一吐瀉十八

○傳小兒初生吐蓋拭口中穢惡不盡
入喉中故吐可用木瓜九瓜 枳
木 麝 一 臙 粉 粉 輕 右 各 一 字 研 勻
麝 粉 丸 如 黍 米 大 每 服 三 二 一 九 其 草

湯送下

○初生二日內吐瀉壯熱不乳大便乳
食不消或白色傷食宜下之而後和
胃下白餅子和胃益黃散

○白餅子 治小兒腹中有癖但飲乳
嗽而生痰 滑 輕 半 南 各
不巴二十四粒去皮臙用永一丸煮
水盡為度天作水三升
右研身巴豆後入衆藥糯米飯丸如
菜豆大三歲已上三五餅已下二
餅薄苛湯下

○益黃散 治小兒脾胃虛寒 陳 不
青 訶 子 皮 甘 粉 各 一 香 仁 右 水
煎 加 麥 水 各 一
不 尤 效

○吐瀉泄黃傷熱乳也瀉青傷冷乳也
皆宜下白餅子主之傷熱乳者玉露
散傷冷乳者益黃散温中丸並於下

後服之亦有不獲下但服此藥愈者

○王露散

露散 膏 寒水 各半

生耳二右為末每服一字或半錢

溫水調下

○溫中丸

參 甘 炙 木 略 一 右為末

姜汁麩糊丸如菴豆大每服一二十

丸類米飲下

○吐瀉調脾平胃散入麩蜜和藕合香

丸米飲調服

○兒生日裏生疳先用硃砂丸下之後

用朱沉煎惡物下而止

○硃砂丸

辰 南 巴 霜 各 半 右為

末麩糊丸如黍米大每服二九薄荷

湯下

○朱沉煎

硃砂二 飛 藿仁三 滑石五 不沉

仁丁香耐四 右為末每服半錢用新

汲水一盞香油滴成花批藥在上須
曳墜下澄去水別用水空心送下

○紫金核

治男女一切嘔吐小兒七

効 半湯泡製 參 木 木

丁香 藿各二 右為末麩糊丸如李

核大姜汁糊丸効

沉香 硃砂各一細研為衣陰乾每

一丸用棗一枚去核內藥在內溫帝

畏煖熟嚼服米飲壓之

○掌中散

治吐乳 白豆蔻 砂

仁略十 甘半 兩半 右為末安掌中

乾吃兒參口中

○白朮散

治小兒脾胃久虛嘔吐瀉

不止津液枯竭煩渴飲水乳食不進

羸瘦困劣 參 朮 木 苓

藿 甘 炙 略 葛 兩 右水煎

一腹脹十六

由脾胃虛氣攻作也亦有實者必悶
亂喘滿可下之用紫霜丸白餅子不
喘滿者虛也不可下

○**獨氣丸** 治小兒虛脹如腹大者加

薤白子名獨丸子 胡椒兩 蝎尾

去毒 右為末麩糊丸如粟米大每

服五七丸至一二十九丸陳米飲下

亦有木香一錢

○治小兒虛脹先服獨氣丸不愈腹中

有食積結糞小便黃微喘脉伏而實

時欲飲水能食者可下之宜消積丸

紫霜丸蓋脾初虛而後結有積所治

宜先補脾而後下之後又補脾則愈

也

○**二方** 治腹脹 薤白子 紫葳梗

葛 陳恪等 其妙右水煎食少者加

米

○**消積丸** 丁香 砂仁 薑 二巴 二

去皮心膜 右為末麩糊丸如黍米

大二歲已上三五丸已下一二丸溫

水服

腹痛傳二十

多是飲食所傷 水半 陳法青

各七 山查 核麩 步縮 夾茅 一各其

後半 有寒加藿 吳茱 有熱加荜 右

為末米飲或白湯下

○腹痛口中氣溫面黃目無精彩或白

睛多及多睡畏食或大便酸臭者當

磨積宜消積丸甚者用白餅子下之

後和胃用白朮散

○心腹痛面脫白口中沫沫及清水出

發痛有時當作蛇虫又曰凡積痛食
痛寒痛虫痛大同小異惟虫痛者宜
口淡而沫自出小兒本怯胃冷故虫
動而心頭痛與癩相似似目不斜手
不搐舉安虫散主之

○安虫散 寶鑑用米糊丸 萬粉 炒黃

粉也 煨 川練子 去核 虱 各二 枯凡
半 右為末每服一字大者半錢或
一錢温米飲臨痛時服

○集効丸 治虫痛 木 虱 炒 煨

訶 煨去 蕪 炒 附 炮去 姜 各七 大兩
半 烏梅 去核 二 右為末煉蜜丸陳皮
湯下或醋湯下一方有芩連

治蛇虫作痛一陳湯加苦練根煎服
或只以苦練根向東南生不出土者
去麤皮取白皮細切濃煎汁一盞徐
徐飲之不可多飲先以糖蜜或炒肉
食之引虫頭向上然後服之看兒大
小斟酌與之

○一方 治小兒腹痛 甘 炙 姜 各二

伏龍肝 一 參 苓 百草霜 米 各
不 右為末粥丸梧子大每服二五十
丸陳皮湯下

一痞癖二十六

○林 小兒寒温不調乳哺失節或啖糯米
食生冷瓜菓脾胃微弱不能消化致
五藏不利三焦壅滯腹內堅硬或發
寒熱如瘧漸致弱羸

○紅丸子 治血膜包水脇傍時痛發

寒熱日久結癖亦効 稜 炮 莪 煨 芫
花 醋 桃 杏 各法 皮 烏梅 各 巴 二
粒 取 硃砂 五 不 右為末醋糊丸如葶

豆大硃砂為衣米湯下三五丸

○**大黃膏** 治痞癰小兒大人俱用之

大黃 朴硝 等分為末蒜泥成膏用絹帛攤成膏藥貼之自軟消

○**木別膏** 治痞癰 木別多用獨蒜

半雄半鴉為膏入醋少許蠟紙貼患處取積後調理宜異香散

○**異香散** 治腎氣不和腹脇膨脹痞

悶噎寒喘滿飲食難化噫氣刺痛能破癥瘕和胃進食 蓮花莖根稜

益母草煨略青 陳法柏各姜製 右為末每服一錢水丁香薑片棗枚

鹽炒煎不分通口服

○**灸法** 乳下丁士灸七壯

○小兒癰氣久不瘳灸中脘一穴膏肓

一穴各七壯又膈後脊中灸一七壯

○小兒腸滿瀉利積聚腹痛不嗜飲食

脾俞一穴灸七壯

一夜啼傳二十二

夜啼者心經有熱有虛 參 連

芩各一 甘五竹葉二十 右作一貼加

姜切

○錢氏日小兒夜啼者脾藏冷而痛也

宜益黃散方見吐瀉之內

○**花火膏** 灯花三 乳汁調抹兒口或

抹母乳令兒吃之

○治驚啼邪熱寒心也安神丸主之

○**錢氏安神丸** 治邪熱驚啼門 白

苓 馬牙硝 山藥 寒水 甘草

酥一 腦字右為末煉蜜丸如芡實

○**導赤散** 治心躁號啼小便赤口中

○**林**

熱腹熱或首汗仰身而啼至曉方息
生乾地黄 通 茸各等 右每服二
三錢入研葉煎右証加芩用之末
用通心飲加明 車 灯心 薄荷

○通心飲 通 堯 瞿 施 茸
芩各等 右水煎

○一方 治夜啼 蟬蛻十四 全者去
大脚為末入硃砂一字蜜丸吃之

○龍齒散 治夜啼不往 龍齒 蟬
蛻 去翅 鈎鈎藤 苓 參 右等分
為末每服一錢水煎

○六神散 治腹痛夜啼面青口中冷
氣四肢冷或泄瀉青白及不脫乳
參 山炒木絡五 茸 後二 白苓 扁
炒各 兩 右入姜棗

○五味子散 治夜啼及腹痛似有鬼
崇 五味 飯 赤芍 木絡 五神
陳 桂 茸各二 右水煎

○乳頭散 治夜啼不止腹痛 芫
茸 炙飯 赤芍 木絡等 為末塗乳
與吃

○蒜丸 治冷證腹痛夜啼面青手冷
大蒜 十枚 慢火煨熟研爛 乳香 半斤 不
日曬 或火煨乾研 右研勻丸如芥子大每服七粒乳空
時服

○治夜啼 乾牛糞如手大安臥席下
勿令母知子母俱吉

○黃土散 治客忤夜啼 竈中黃土
蚯蚓屎 右為末水和塗頂五心良

○凡小兒口到乳上便啼身額心微熱
急看口內或瘡或重舌於各類治之

一客忤 附中惡二十三

○小兒神微弱，外邪客氣，卒暴觸忤，口吐青黃白沫，面色變易，喘，腹痛，反側，瘕瘕，狀如驚癇，但眼不上，竄視，其口中，上腭左右，如有小泡，以竹針刺之，或以指甲，摘破，宜服藜合香丸，姜湯化開，頻與之，仍以皂角，燒薰身，次用淡豆三合，水濕搗丸，如雞子，大摩兒顛上及足心，各五六遍，次摩臍心，良。

犀角散

治客忤驚啼壯熱 天麻

犀 門

鈞藤 硃砂 各一 鐵粉

雄 各半 麝 許右為末 每服半錢 金銀煎湯調服

煎湯調服

安神丸

治証同前 方在

○黃土散亦可 方在前

○惠 小兒中惡卒死 以葱白 內下部及鼻中 立活

一口齋 附 鴉口 二十四

如聖散

治小兒口瘡不能吃乳者

巴豆

二三粒 研爛入 硃砂 新開 顛門 貼

上如四面起粟米泡 便用溫水洗去

恐成瘡 用苜蓿湯洗 使安 其效如神

○傳 治口瘡 黃連為末 蜜水調服

又方 黃柏 細辛 等分 為末 付

之

○小兒白屑 蒲舌及兩脇 名鴉口 用髮

纏梳頭 蘸其花水 拭口 令淨 又用濃

煮粟泔 以綿纏筋頭 拭之 更以煨過

黃丹 搽之 即愈

林

○治鴉口 桑白皮汁 和胡粉 傅之

治小兒口瘡 端半蝦蟆 炙料 未傅瘡

上即瘥

一重舌 附重勝重 二十六

林重舌乃心脾熱也心候於舌脾之脉絡出於舌上心脾熱則血氣俱盛附之根而重生一物形如舌而短小有著頰及上腭者曰重腮若牙齦者曰重齦皆當刺去其血也真蒲黃敷之或髮灰或牙硝或煇硝或竹瀝浸黃栢點敷之皆效

○治小兒重舌黃丹如豆大內管中安舌下

又方釜下土苦酒和塗舌下

又蜂房燒灰研酒和傳舌下三四用之

又蛇蛻炙焦末一豆許傳舌下日三

○治小兒舌上瘡飲乳不得以百藥和雞子置醋中塗兒足底一七即愈

○傳重舌末舌用二稜針於舌下紫麻刺之

之出惡血即愈

又用竹瀝調蒲黃末貼舌上神效

○治小兒木舌寒口欲落者紫雪二錢竹瀝半合研勻頻付即愈

○紫雪 治內外煩熱不辨口中生瘡

顛在驚瀾等証 黃金 兩寒 本石

磁石 石膏 滑石 各研已上用米

一石煮至四斗去粗入下項藥中

丁香 兩升 玄參 各一已上再煮至一斗五升入下項藥硝石 研亦可

硝石斤擇已上入煎藥汁中微火煎

物枝不住室攪候有七升投放水盆

中半日入下項藥攪令勻硃砂 兩

三當 門子 兩 右煎成霜雪要色每

服一錢或二錢涼水調下並食後服

脾藏微熱，冷舌絡微緊，時以舒舌，故
之治之，勿用冷藥，及下之，當少與瀉
黃散，漸服之，或飲水，醫疑為熱非也。
飲水者，脾虛津液少也。又如面黃肌
瘦，五心煩熱，弄舌為疳黃，宜胡黃連
丸，大病後弄舌者，凶。

傳 瀉黃散 藿杜施仁膏 半升 七分 風

分右細切，作一服用，蜜酒炒香，熟以
水一盞煎至半盞，去粗與之。

一吃泥 二十七

傳 吃泥 胃氣熱也，用軟石膏文，陳艾末
前服。

一滯頤 二十八

林 滯頤，乃口涎常流而流於頤頤也，宜
分冷熱而治。

○瀉脾丸 治脾胃虛冷而流涎不能

取約 半丁香 木各五 姜蚕 木

青 陳絡 二右為末，糊丸，麥子大，每

一歲十九丸，米湯下。

○通心飲 治通心氣分水穀退熱

利尿 口瘡加
地草

一語遲 二十九

林 曹蒲丸 治小兒在胎其母卒有驚

怖邪，弄心舌本不通，長四五歲猶不

能言 參 首 明 遠 法 姜

芎 段 絡 三 乳 硃 絡 一 右為末，煉

蜜丸，如麥子大，每服十九丸，米飲下。

一行遲 三十

行遲，乃稟受氣血不充，骨髓不滿，軟
弱不能行，或肝腎俱虛，蓋肝主筋，不
弱不能束，腎主骨，人弱不能載，故也。

宜地黄丸

○地黄丸

熟地四山茱 山藥各一

沢兩壯

白苓各一右為末煉蜜丸

如莫豆大空心湯下二三十九丸

○虎骨丸

虎脛骨酒炙 飯 芍 桂

酸棗酒浸

生地 白苓 風 膝各

分右為末煉蜜丸如麻子大每服十

丸酒或木瓜湯下

○羚羊角丸

治小兒五六歲骨氣虛

弱脚弱不能行

白苓炒 羚羊 虎脛

骨醋炙

生地各五 桂 風 飯

各半 右為末煉蜜丸如小豆大食

前溫酒化下三五丸服之下月漸愈

即或行也

○五加皮散

治三歲不能行 五加

皮兩

丸各五 右為末每服下錢半

粥飲調次入好酒兩滴調日二服

鶴節三十八

○林

鶴節乃稟受不足血氣不充故肌肉

瘦痺骨節呈露乃得之腎虛精髓內

枯膚革不榮易為邪氣所襲用乾枯

悴其形如鶴脚之節宜地黄丸

一脚拳三十二

○林

脚拳不展及稟受腎氣不足血氣未

榮脚指拳縮無力不能伸屈宜

○海桐皮散

海桐 牡 飯 熟地

膝各一

山茱 補各五 右粗末每服

一二錢葱白一根水一盞煎半盞服

一手拳三十三

○林

手拳不展蓋稟受肝氣怯弱致兩脉

攣縮兩手伸展無力宜

○薏苡丸

飯 薏 酸 風

羌絡一石為末煉蜜丸雞頭入益服
一粒麝香荆芥湯化下

一顛陷 三十四

林顛陷及耳藏社有熱湯引水漿致泄
痢久則血氣虛弱不能上充腦髓故
顛陷如坑用黃芩頭骨炙黃為末雞
子清調敷之

一顛填 三十五

林顛填及顛門腫起也蓋脾主肌肉乳
食不常飢飽無度或寒或熱致居藏
府不調其氣上衝為填張顛突而高
毛髮短黃如寒氣上逆則堅硬熱氣
上冲則柔軟寒者溫之熱者涼之肝
盛風熱交攻亦然

補防風 栢子 白及 各末乳汁調

塗顛上十日愈

傳顛門腫起定作風此候應知最長凶
忽陷成坑如盪足未過七日命須終

一解顛 三十六

傳解顛顛不 因母氣虛與熱多也錢
氏曰生下而顛不谷腎氣未成也雖
長必少髮更有目白睛多面皸白多
愁生喜也丹溪用八物有熱加酒炒
連煎服更以芎藭東及以白斂末佐
之

林地黃丸 治年長頭縫開解不

谷服此丸仍用炮南星末米醋調攤
緋帛上煨熟貼之

○三辛散 治頭骨不谷 細 桂 路

不 蚕半 右為末乳汁調敷乾再敷
之面赤即效

一龜胸 傳三十七

○林龜胸乃肺熱脹滿及胃脹胃高如龜蓋乳母多食酒麪熱物五辛灸燭而得之

○傳馮白散 治龜胸 桑蜜水拌地

骨仁其後半加杏仁水煎

○林百合丹 治龜胸 大礬七 天門心

煨杏去皮百合 桑炙通 甜葶藶

煨軟石膏各五 右為末煉蜜丸棗豆

大每服五丸食後臨卧熱水下

一龜背 三十八

○傳龜背小兒生下客風入背逐骨龍即

成龜背以龜尿點背脊骨節即平

取龜尿法用蓮葉置龜於上尿自出

或令向龜於明鏡則必尿出

○灸肺俞三五壯

一頂軟筋軟三十九

○林五加皮散 治頂軟頭不得正五加

皮末酒調塗頂骨上

○健骨散 治久患痺疾躄廬不食及

諸病後天柱骨判 白姜蚕末三歲

見半錢薄苛酒調下服後用生筋散

貼

○生筋散 木鱉六斤草麻六斤粉右

為末手摩頸項上令熱津唾調貼之

○涼肝丸 即馮青丸方 治風熱頂軟

○貼項方 治肝膽風熱致令筋軟

附生炷星等為末姜汁調貼項軟處

次服防風丸涼肝丸

○防風丸 防風丸 蚕 蝎各五天

麻風 參各一 硃 雄 麝各二

牛黃各半後二右煉蜜丸薄苛湯下

○小葶丸 治胎中受熱遍身筋軟

麝茸 茯苓 膝 瓜 菟絲 熟地 飯 天麻 仲 青塩各等 爲 禾煉蜜九如皂角子 大每服一丸 塩湯温酒化下

○羚羊角散

治面紅唇白腸熱項軟

羚羊 白苓 熟地 酸煨 虎脛骨 風 桂 甘草各 右爲末每服半錢 或一錢温酒或塩湯調服

一丁奚喘露四十

○小兒手足極細項小骨高尻創躄痿 臍突號哭育腫或坐數歲是名丁奚 虛熱往來頭骨分開反食吐涎煩渴 嘔噦是名哺露一者皆無辜種類之 疾最爲難治宜千金丹救之

○千金丹

青 陳祛我 煨白豆蔻 芎 五灵 故 蒼絡 五木 使君

子肉煨蝦蟇及絡三 右爲末微磨汁 浸蒸糕丸麻子大每服一十九米飲 下有熟薄荷湯下

一脫囊四十一

○傳 脫囊陰囊墜大墜下而不收也亦有 囊皮脫爛者 飯 連 芩 通 甘 右煎服

○囊爛者野紫蕪葉細精 爲末香油 調付濕則搽之皮脫兩丸露者以青 荷葉包之付藥後自生皮

一脫肚四十二

○傳 脫肚用東壁土泡湯先薰後洗 又五倍子爲末付而煨托入之 又驚頭燒存性香油調付一云燒烟 又浮萍并末乾貼患處

又草麻子四十九粒研爛水調作餅
子貼項上即收入洗去

○小兒瀉痢後肛門不取

赤石 伏龍肝等分為末每用半錢傳
腸頭上

一 瘧病 四十三

○林聖慧方治小兒生十餘月後母又有
姪令兒精神不爽身熱萎痺為鬼病
用伏真燒灰細研粥飲調下半錢日
四五服效

○龍膽湯 治孕婦被惡蟲導腹中致
令見病其証下利寒熱去來又治婦
人有白飲乳復有娠孕見喫此乳亦
作此病 北柴 膽 芩 桔 鈞
藤皮 芍 甘 炙 苓 各二錢 蠶 蝦 故 大
鈞 裏 濕 右水煎得利則止量大小
多少與服

一 盤腸內吊 四十四

○芍藥膏 治小兒盤腸內吊腹中極
痛乾嘔 乳 沒 木 姜黃各半
研木別研十二箇去殼右以木別膏和
四味更入煉蜜少許丸櫻桃大煎芍
藥湯化下次服

○魏香散 蓬朮五真阿魏行先以溫
湯化開阿魏浸蓬朮一日夜焙乾為
末每服半錢煎紫蘇米飲空心調服
○一方 乳 沒各少許木一塊藥水三
數沸服

○茴香散 治盤腸氣痛 茴 炒 木 苑
附 炮 金 鈴 子 核 蘇 荀 子 煨 枳 補 苳
白 豆 寇 煨 右入鹽水煎

○木香散 治小兒盤腸氣痛不巳面

青手冷啼叫尿如米泔 川練子箇

去皮枝巴豆三十五粒同炒使君肉

木 延 苜蓿 右為末清米飲空

心調下量見大小與之

一齒四十五

○齒不生蓋齒者骨之餘髓之所養稟

氣不足則髓不能充於骨故齒久不

生宜

○芎黃散 芎 飯 白芍 地 山

酪一沉五茸右為末溫鹽湯調服

半錢仍用少許擦牙根

○一方 雄鼠糞頭大者是每日常

二粒楷齒根上至二十一日當生

一斷乳四十六

○畫眉膏 施二箇燒 雌黃 硃砂各

許右為末入香油輕粉少許調勻候

見睡著濃抹兩眉骨末自不與乳味

効再用即驗仍以重調塗乳頭

一誤吞諸物四十七

○林 治小兒誤吞錢燒火炭末白湯調方

寸七服即出

又服蜜一升即出

又濃煎艾汁服之効

○治小兒誤吞銅鉄物在咽喉內不下

南燭根燒細研白湯調二錢服之

一諸熱證四十八

○潮熱者胃熱也時發熱過時即退

來日依時發熱此欲發驚也地骨皮

散主

○壯熱者心熱也一向熱而不已甚則

發驚癇導赤散主之

○風熱者肝熱也身熱而口中氣熱有

風証人參生犀散主之

○温熱者脾熱也但温而不熱瀉黃散主之

○心熱者視其睛口中氣温或合面腫及上竅咬牙昏目者心熱也導赤散主之

○肺熱者手探日鼻聾拮湯主之

○地骨皮散 治虛熱潮熱亦治傷寒壯熱知柴芩參地骨

赤苓 半各等 右每服二錢姜一片水煎

○道赤散 方在別夜啼之內

○生犀散 治小兒骨蒸肌瘦頰赤口乾日晚潮熱及病後餘熱不除

大蘼 驚 炙 門 莖 丸 犀 鎊 桑 參 苓 地骨 赤芍 柴 枳 各

分 一方有知母有痰加半夏右入青蒿少許煎

○瀉黃散 治脾熱目黃壯大口唇生瘡眼生翳針等証 蘼 施 膏

芩 風 酒 各 等 分 蜜 右為末温湯調服

○加減瀉黃散 治濕熱胸膈煩悶皮色如糯米黃白睛赤黃 連 茵 各

不 相 芩 施 苓 澤 各 三 右煎服

○耳枯湯 治肺熱手攣骨毛 桔 伍 耳 而 右 水 煎

○耳露飲子 治耳熱口臭齒齲腫痛咽口有瘡赤眼及瘡疹熱盛者 杷

去 熟 地 門 枳 麩 旨 生 地 天 門 苓 石 解 耳 各 右 等 分 水 煎

○驚風 陰慢脾風 天竒 發搐
馬脾風 喉風 癩証

○傳一驚風有二証急驚屬痰熱慢驚屬
脾熱

○夫急驚之候回聞不常之聲或驢馬
禽獸之吼以致面青口噤或聲嘶而
厥發過則容色如故良久復作其身
熱面赤引飲口鼻中氣熱大小便黃
赤惺忪不睡蓋熱甚則生痰今盛則
生風偶回驚而發草宜用錢氏利驚
丸瀉青丸抱龍丸宣風散五福化毒
丹等

○慢驚之證多因飲食不節損傷脾胃
以致吐瀉日久中氣大虛而致發搐
發則無休止時身冷面黃不渴口鼻
中氣寒大小便青白昏睡露睛目上
視手足瘻瘳筋脈拘攣蓋脾虛則
生風今盛則筋急俗名天吊風者即
此候也治宜東垣黃芪湯錢氏釣藤
丸溫白丸丹溪參朮湯送下硃砂安
神丸之類

○急驚者十生一死慢驚十死一生
○有合病者身涼精神倦怠不吐不瀉
又能乳食而發搐者是半陰半陽命
病如傷寒半表半裏也有因急驚瀉瀉
不愈或與吐下藥太過變為慢驚有
慢驚溫補不愈或與溫補之劑太過
變為急驚

○傳利驚丸 治急驚風神效

天竺黃、紅輕、黛絡、黑丑頭末半兩生用、右研勻、煉蜜丸、如梧桐子大、一歲見一丸、二歲見二丸、五歲三丸、溫薄荷水下、食後。

○瀉青丸又名瀉肝丸 治肝熱急驚、搐搦等証、林、是涼肝丸、甚、大、瀉肝丸、無大、黃、

芎、梔、膽、飯、風、務、等、右為末、煉蜜丸、如芡實大、每服半丸、至一丸、竹葉湯下。

○抱龍丸 治傷風、癘疫、身熱、昏睡、氣、麤、風、熱、痰、實、壅、嗽、又治驚風、潮、搐、及、盡、毒、中、暑、壯、實、小、兒、且、時、與、服、之、則、免、痰、熱、驚、悸、之、証、雄、二、不、半、辰、伍、絲、兩、牛、膽、南、星、騰、中、陰、乾、百、日、取、研、麝、多、今、用、二、不、半、右、為、末、煮、甘、草、膏、丸、如、皂、子、大、溫、水、化、下、百、日、見、每、丸、

分、作、三、服、一、歲、見、半、丸、五、歲、一、丸、童、兒、二、五、九、臘、雪、水、者、甘、草、和、丸、尤、佳、丁、方、漿、水、或、新、水、浸、南、星、二、日、煮、三、五、沸、去、皮、取、白、肉、切、焙、炒、黃、色、為、末、每、八、兩、以、甘、草、一、兩、半、相、破、用、水、二、碗、慢、火、煎、至、半、碗、去、粗、渣、以、酒、入、兩、星、末、徐、心、研、之、入、餘、藥、

○宜風散 治急驚風、搐搦、不定、換、散、陳、其、各、五、黑、丑、四、兩、半、生、半、末、一、右、為、末、蜜、湯、調、下、一、二、三、歲、見、半、錢、四、五、歲、一、錢、食、前、服、

○五福化毒丹 治急驚風、痰、熱、搐、搦、等、証、桔、微、文、參、洗、焙、六、兩、黛、妙、牙、硝、各、二、參、兩、冬、五、其、冬、一、銀、鉞、八、片、麝、半、兩、右、為、末、煉、蜜、丸、每、兩、分、作、十、一、丸、一、歲、見、每、丸、分、四、服、薄、荷、水、化、下、

○奪命丹

治急驚不省人事目定真

視牙關不開唇白或黑者星半

各四分為末以姜汁和珍珠新白者

作餅子焙乾巴去油珠砂細金銷銀鉤路十輕

麝各半右為末麵糊丸如黍米大每

歲見一丸燈心湯化下

○鎖驚丸

鎮驚靈神退心熱夜啼化

痰止咳珍珠琥珀絲雄各三金

銷十片膽星五牛仁麝各辰半二右

為末麥麵糊丸如梧子大每服五六

丸薄荷姜蜜湯化下

○錢氏安神丸

治邪熱驚啼心海面

黃頰赤壯熱門牙硝白苓

山寒甘草各辰兩腦字右為末

煉蜜丸如芡實大每服半丸砂糖水

磨化下慢驚參末煎濃汁化下

○金鉤丸

治急慢驚風痰涎壅盛

半星煨白附炮風兩半雄珠各

半厚仁牛腦麝各半金鉤片十

右為末姜汁麵糊丸如梧子大每服

三五丸至一二十丸人參湯下慢驚

去腦

○林

治急驚風角弓反張

參苓杏膏各一麻各一桂

芎藭升飯獨各三右入姜

煎

○人參湯

最能利驚小柴胡加風

枳

○蠶蛇散

治驚風天鈞心熱夜啼驚

癩六寸蟬六寸荆穗一其大娘

去足翅去毒右入白茅根少

許水煎

○神效萬金丹

治急慢驚風十無一

失_主 硃 輕_{各等} 右研勻用青膏內
虫兒取於淨磁盞內以硃輕虫汁和
九黃米大一歲兒一丸二歲二丸乳
汁送下取虫時七月初五日最靈

○千金龍膽湯

治頭暈出腹血脈實

盛寒熱交作四肢驚掣作諸母驚等
証 膽 鈎鈎藤 柴 芩 枝
芍 神 其絡三螳螂大行右水
煎徐入服

○一方

治急慢驚風

薄荷 寒

各半 儻 蚕 硃各一蠟二枚 牙皂
角 槐角各半 右為末燈草湯和乳
汁調時令灌之

○黃芪湯

治慢驚風之神藥也

皆由_{胃脾} 濕_{成也} 甚仁參行灸其伴加自

芍一久右水煎

○益黃散

治胃中風熱

芫仁陳白

參 絡一 白芍 牡生茸 灸茸各五連
紗右為末水煎食前服

○錢氏白朮散

治積病和胃生津止

瀉頻瀉利將成慢驚風者服之效
參 朮 白苓 井炙木 藿各一
乾葛仁右水煎○丹溪加山 扁
肉蓯一煨絡入姜一片煎○如慢驚已
作加細 天麻絡一 蝎三枚去 白附
八分 煨同煎服

○一方

治慢驚風子母俱服

參

木 絡一 苓 陳絡半茸 苛絡二半
天 絡七 細分蝎三枚 右作一服加
姜二片水煎

○釣藤飲

治吐利脾胃氣弱風慢

驚^ラ 釣鉤藤^半 風 參 麻 蘇
蚕^炒 蝎尾^{去毒} 天麻^各 二 苒^各 各
粉^右 水煎^{虛寒者} 加附^{半分}

○温白丸 治脾氣虛弱泄瀉腹痛冷
痔洞泄及吐瀉久病轉成慢驚身冷
瘦癯等証 天^半 蚕^炒 白附子^生 蝎
去^毒 星^{湯泡七次} 右^各 為末^{麵丸如}
菴豆大^{每服五七丸至一二三十九空}
心^姜米湯^下

○灸法

○林 治急驚風灸前項一穴^{在百會如不}
愈須灸兩肩頭及人中一穴各三壯
慢驚風陰証也且吐瀉病久脾胃虛
困似搐不搐眉心顛會一穴^{在入髮}
百會一穴各三壯
又治慢驚風灸足一穴^各七壯

一 慢脾風

○林 小兒慢脾風証蓋為吐瀉損脾病傳
已極總歸虛處惟脾所受故曰慢脾
若逐風則無風可逐若鎮驚則無驚
可鎮但脾間痰涎虛熱往來其眼合
者脾困氣乏神志沉迷痰涎凝滯而
然^尔

- 一 小兒頭^顛熱^{眼珠青白}而足冷
 - 二 小兒頭^顛熱^{或腹脹}而足冷
 - 三 頭^顛熱^{或瀉}而足冷
 - 四 頭^顛熱^{或嘔}而足冷
 - 五 頭^顛熱^{或渴}而足冷
- 已上五証忽然吐而作搐者名曰慢
脾風速與補脾益真湯每服三錢更
加蝎一枚

如^目驚而搐者與前^散每服三錢

更加附 前各半

○慢脾之候，施身冷，粘汗，直眦，如尸，喘嗽，頭軟，一便不禁，虛痰上攻，呼吸氣，廉者不可治。

○且慢脾七枚，三拗，薑生，胃，回陽，如木衝，脈在則，百會穴多救之。

○補脾益真湯

治小兒胎稟怯弱，外

實裏虛，吐，嘔，吐，乳，妨，糞，便，青色，而成

慢驚風，氣逆，涎，潮，眼，珠，直，視，四，肢，抽

制，或因，憂，蒸，客，性，而，作，或，因，特，拘，驚

嚇，而，作，或，因，誤，服，鎮，心，寒，涼，藥，而，作

木 飯 參 莖 丁香 訶肉

陳 朴 薑 菖 椒 苴 炙 菓 苓 木

桂 半 湯 泡 七 次 附 炮 各 姜 汁 製 七 分 全 蠅 去 毒 微 炒

一 服 用 右 每 服 三 錢 姜 二 片 棗 一 枚 水 一 盞 半 煎 八 分 去 滓 肚 飢 檟 煎 服

服訖，心腹掣動，以助藥力，候一時久，

喫乳食，○渴者去附丁菖，加參苓，○

瀉者加丁訶，○嘔吐者加陳丁半，○

腹痛者加朴良，○腹脹者加朴丁前

枳，○咳嗽加前五味，去附桂果菖，○

痰喘加前枳赤苓，去附丁菖果，○足

冷加附丁桂，○氣逆不下加前枳，去

飯附菖，○惡風自汗加桂莖，○

○前料散

治心腹結氣，或嘔噦泄瀉

腹脹時痛，或發驚悸，前 木

參 陳 良 薑 苴 炙 菓 苓 木

水煎肚飢時服

○異方銀白散

治或吐或瀉，涎鳴微

喘露睛驚跳，石蓮 白扁炒各

各 參 天 白附炮 金蟾 毒木 苴

灸 藿 裕 半 陳 米 炒 香 右 每 服 二 錢 各

瓜仁七粒姜一片水半盞同煎服此藥助胃祛風慢驚通用

一天鉤証

○小兒壯熱翻眼手足搐搦如魚之上鉤皆由乳母過食熱毒旋即乳兒兼被風邪所致但解和風熱則應手而愈

○九龍控涎 治小兒蘊熱痰塞經絡

頭目仰名爲天吊 滴乳一絲和

半雄研鴨茶 栝凡各一廿荆穗

炒葦一百粒半赤脚蜈蚣一條酒右

爲末每服半錢至一錢人參薄荷湯調下

○釣藤飲 治天吊潮熱 釣藤 參

各半蝎 天各一犀 耳各右爲

末每服一錢水煎

一發搐

○男發搐目左視無聲右視有聲

女發搐目右視無聲左視有聲

○寅卯辰時發搐潮熱目上視手足動

搖口流涎涎頸筋急此肝木太旺當

補腎抑肝補腎地黃丸抑肝瀉青丸

○巳午未時發搐潮熱驚悸目上視白

睛赤牙關緊急口流涎手足動搐此

心火太旺當補肝瀉心補肝地黃丸

瀉心導赤散涼驚丸主之

○申酉戌時發搐潮熱搐而喘目微斜

視睡則露睛手足冷大便下淡黃水

此肺病當補脾而抑心肝補脾益黃

散抑心導赤散抑肝瀉青丸

○亥子丑時發搐潮熱不堪搐而眦不

親身熱溫無壯熱目睛緊斜視喉中

有痰大使銀褐色乳食不消多睡不醒宜補脾柳心補脾益黃散柳心導赤散涼驚丸

○傷風發搐口中氣熱呵欠煩悶手足動搖當發散大青膏主之小兒稟賦素怯者多病此

○傷食發搐身體溫多睡多嘔或吐不飲食而搐當先定搐退用白餅子後服安神丸

○百日內發搐有真假二証真者不過三二次必死假者發搐不為重真者內生驚癇假者外傷風冷蓋血氣未實不能勝和乃發搐也奚知假者口中氣出熱也治以真發散大青膏主之及用陰翹法與俗法

○疳黃丸在行遲瀉青丸在急驚導赤之內

散在夜啼之內

○涼驚丸 膽 風 黛絡三 鈞藤二 連二不兩腦仁牛 麝各一 右為三麥

麴糊丸如黍米大每服三五丸至二十丸二十九金銀湯送下

○益黃散在吐瀉之內

○大青膏 治小兒傷風吐瀉心溫作瘰疬熱 天 黛各一 白附一各蠟 犀去烏蛇肉酒浸 硃砂 竺 麝各

字右為末生蜜和成膏每服半皂子大或一皂子大月中兒糝米大同半黃膏溫薄荷水化一處服之五歲已上同耳露飲服錢氏有天麻無天青

○牛黃膏 治熱及傷風壯熱引飲

雄 甘 甜硝 寒生各一 鬱金 行 豈豆粉五 腦行 右為末蜜和成膏

苛水化下半皂子大食後服

○耳露飲在吐瀉之內白餅子在吐瀉之內

安神丸在夜啼之內

○塗額法 麝 蜈蚣末 牛 黛 各

字 蝎尾祛毒薄苛葉伴右為末熟束

肉為膏新綿上塗勻貼額上四方可

出一指許火炙手頻扇自自裏外見

可用此及浴法

○俗寐法 治肥胎併胎怯胎熱

烏蛇肉酒浸焙末 白礬 黛絡 二天仁

蝎尾祛毒 硃各半 麝字右為末每用三

錢水三碗帶葉桃枝一握同煎至干

數沸溫熱浴勿浴背

一馬脾風謂暴喘也

○林 小兒肺脹喘滿采急兩助扇動鼻竅

張閉亂嗽瀉善變痰涎潮塞俗謂馬

脾風如不為治死在旦夕牛黃奪命

散無價散主之

○牛黃奪命散 白牽 黑牽各半生

頭米五升大 枳殼一石為末 二歲兒一

錢冷漿水調下延多加輕粉如無加

○無價散 治風熱喘促悶亂不安俗

呼馬脾風 珠二不輕半其遂 丁不

乾煮焙 右為末每服一字用溫漿水少

許酒香油一匙批藥在油上沉下去

却藥水準之丁方加滑石二錢名油

墜膏

○暴喘俗呼馬脾風大小使硬且急下

乏用牛黃奪命散下之次用白虎湯

平之

一 嚔風

○林 眼閉口嚔啼聲漸少舌上聚肉如粟

米狀既乳不得口吐有沫二使不通
蓋由胎中感受熱氣流毒於心脾故
見於喉舌或為風邪所搏致之且

○辰砂膏

辰砂礞石 牙硝各半

玄明粉仁蟻

真珠各一麝字一右為

朱油紙包自然成膏每用二豆許乳

汁調敷乳頭上吮金銀薄荷湯下亦

可有潮熱甘草湯下

○單方

治初生七日口瘡

牛黃一錢細研以竹瀝調下字權之

一癩証五十

○傳九治小兒五癩昔嘗羅藏治之並五

色九治之五癩重者死病後甚者亦

死

○惠風癩癩手足如癱或口咽食癩傷肉

食肢搖角弓反張太聲吐食方定

驚癩癩頭目品口目或昏或邪視

癩癩似狂耳不聞目不視如夢如醉

或日發或經年發發癩手足搖動食

不知節或數日不食寐中發飽亦發

○林風熱驚駭不時旋運潮搐吐痰沫忽

然倒地不省人事名曰癩

○先身熱製驚啼而後發癩脈浮者

為陽癩易治

先身冷不驚製不啼呼而病發脈沉

者為陰癩難治

○治風癩之法大卒行痰為主

半 萎 連 尋痰尋火丹多生治

○五色丸

硃 珍珠各五 水銀二 雄

三 黑鉛 二兩同 右煉蜜丸如麻子大

每服二四丸金銀薄荷湯下

林 硃砂滾涎丸

治五癩 硃 白礬

生赤石 硃石各等 右為末 研各膏

丸如棗豆大每服二十九丸食後煎茶

湯下

○天朱丸

治癩大補藥 參 蛤

朱砂 右為末 微心 血丸如梧子大

每服二十丸金銀湯下

○灸法

神庭一穴在入髮際五分 治角弓反張羊癩

吐舌灸三壯

少衝二穴在手小指端內廉 治驚癇吐舌沫

出灸三壯

前頂一穴在入髮際五分 治驚癇灸三壯

長強一穴在腰脊 治驚癇灸五壯

○治急慢驚風危証及諸癩瘕病 額角

縛兩手足大指 甲角縫半由半肉之

間灸三壯先足後手或髮際或額會

疳証五十

○疳瘕曰小兒嬌嫩飽則易傷飲食不

調其肥無節或嬰幼飲乳粥飲太早

五疳病成甚者皆陷喘噎直瀉腫滿

腹脇脹疼肌肉光紫最難治

五疳 光雜疳

肝疳 蠶頭 樣目白膜遮睛 汗流腦熱

合面 肝筋青髮立 肉色青黃 羸瘦當

補肝宜地黃丸或生熟地黃湯

○心疳 面黃臉赤 煩滿壯熱 口瘡 廔驚

當補心宜安神丸或黃連丸

○脾疳 身黃肚大 吃泥上 脹滿氣急 利

下酸臭 當補脾宜益黃散

○肺疳 咳嗽氣逆 多喘 痰鼻 咬甲 寒熱

口鼻生瘡當補脾此虛者補母也宜
益黃散或清肺湯主之

○腎痔，身瘦，身有瘡疥，寒熱，時作頭極
熱，足冷，如木，當補腎，宜地黃丸。

○筋痔，瀉血，而瘦，當補肝，地黃丸。
骨痔，喜吐冷地，當補腎，地黃丸。

○內痔，目腫，腹脹，利色無常，或沫青，白
漣，而瘦弱，此冷証也，宜木香丸。

○外痔，鼻下赤爛，自探鼻，頭有瘡，不結
痂，遠耳，而生，當治瘡，爛，宜蘭香散，白
粉散。

○熱痺，潮熱，如火，大便乾澀，肌肉黃瘦，
雀目，宜胡黃連丸。

○冷痺，時人泄瀉，膿汗如雨，不止，宜至
聖丸。

○脊痔，食食吞服，身熱，下痢，膿，瘦，頰，瘦，
積甲，大蘆薈丸。

○蛇痔，食肉，大早，或癰，曾，停，育，肥，臍，其
証多，啼，嘔，吐，清水，腹，痛，脹，滿，唇，紫，黑，
腸頭及齒，痔，宜下聖丸。

○鼻痔，上焦，壅滯，痔，皮，上，蝕，鼻，肉，赤，瘻，
壯，熱，啼，吐，皮，毛，乾，焦，肌，膚，瘦，削，宜
連，犀，生，瘻，赤，爛，宜磨香散。

○走馬牙疳，牙齦潰爛，由積，府，虛，熱，乳
食不調，致成，疳，疔，內，有，疳，虫，上，蝕，齒
牙，腫爛，消，黑，口，多，臭，氣。

○尿白，乳，疳，失，節，脾，傷，便，濁，白，色，久，而
成，疳，宜，菖，苓，散，地，黃，丸，在，行，藥
之內。

○生熟地黃湯 生地 熟地 芍

赤苓 枳 杏 連 半 天 甘
炙地骨 飯後等 右每服二錢水

一盞姜二片黑豆十五粒煎半盞服

傳 安神丸 治疔熱驚呼心海面黃頰赤壯熱

○益黃散 治脾胃虛寒脾痺乾黃腹大食土口臭生瘡

○清肺湯 治肺時咳喘痰臭咬甲寒熱 桑葉 五蘊 前 芩 散 天 門 堯 風 赤苓 桔 生地

○丁香丸 治瘦冷痺 木 青 棋 其後格二右每服二錢水一盞煎服

○天香丸 治瘦冷痺 木 青 棋 各二錢一續隨 去油蝦蟇 右為末煉蜜丸如棗豆大每服二九至二十丸薄昔湯送下

○胡黃連丸 治肺熱疔 胡連 川 連 略半 硃砂半 右為末和以入猪 膽內用籠蒸熟以投子置鐵子上用 線鐵之勿着底俟下後時取出研入

盧香藥香粉 丁飯丸如麻子大每服 五七丸至二十丸米飲下 綠有聖丹 儼伴蝦蟇去足燒灰

○蘭香散 治疔時鼻下赤爛 蘭香 藥各二錢銅青 輕粉各半 右為 末乾壯之

○白粉散 治疔瘡 烏賊骨末七白 芡末七輕粉七右和勻先用清漿水 洗瘡拭乾生之

○至聖丸 治疔時時人泄瀉虛汗不 正 木 下皮 丁香 朴 史君 肉 煨 陳 菴 濕 右為末麵糊丸如 麻子大每服七丸食前米飲下

○大盧香丸 治疔疔 香 蕪 木 黛 棋 連 各一 蠟 退 二 箇 胡 連 疔 瘡 妙 右 為 末 猪 膽 二 箇 取 汁 浸 蠟 丸

○天香丸 治瘦冷痺 木 青 棋 各二錢一續隨 去油蝦蟇 右為末煉蜜丸如棗豆大每服二九至二十丸薄昔湯送下

○胡黃連丸 治肺熱疔 胡連 川 連 略半 硃砂半 右為末和以入猪 膽內用籠蒸熟以投子置鐵子上用 線鐵之勿着底俟下後時取出研入

盧香藥香粉 丁飯丸如麻子大每服 五七丸至二十丸米飲下 綠有聖丹 儼伴蝦蟇去足燒灰

○蘭香散 治疔時鼻下赤爛 蘭香 藥各二錢銅青 輕粉各半 右為 末乾壯之

○白粉散 治疔瘡 烏賊骨末七白 芡末七輕粉七右和勻先用清漿水 洗瘡拭乾生之

○至聖丸 治疔時時人泄瀉虛汗不 正 木 下皮 丁香 朴 史君 肉 煨 陳 菴 濕 右為末麵糊丸如 麻子大每服七丸食前米飲下

○大盧香丸 治疔疔 香 蕪 木 黛 棋 連 各一 蠟 退 二 箇 胡 連 疔 瘡 妙 右 為 末 猪 膽 二 箇 取 汁 浸 蠟 丸

麻子大益服二十丸米飲下

○**下虫丸** 治蛇蝎 新白苦練根皮

酒浸 綠色貫衆 木 桃 蕪 各條
雞心栳柳仁虱炒一輕待乾蝦蟇鱖
三史五十箇右為末麵糊丸如菽豆
大每服一二十丸天明用清肉汁下加
飯連條治各痔及痔瘡

○**麝香散** 治疔瘡鼻下連唇生瘡水

臘 麝半 雄 升各半 枯礬五右
為末入乳調敷之

○**我苓散** 治尿白久而成痔亦心膈

伏熱兼而得之 稜 煨 莪 縮 赤
苓各五 青 陳 滑 其後各二右
為末每服一錢麥門冬灯心煎湯調
下

○**如聖丸** 治冷熱痔漏 使下兩胡

連 川連 白蕪黃 去皮炒 乾 蝦蟇
五箇酒 麝半 右為末蝦蟇骨和丸如

麻子大二三歲兒五七九已上十丸
至十五九人參湯下

○**香蟾丸** 治疔消食積虫積肉積及

治腹脹大 稜 莪 青 陳 曲
炒麥芽曲 炒膽 煨各五 木 仁 川 練
子去枝 胡連 川連各四 木 兩 乾
蟾 右為末以蠟蟾用醋煮成膏
和藥如乾每加醋丸如麻子大每服
十五丸清米飲送下

○**薑薈丸** 治疔氣腹脹骨熱 薈

木 煨 各二 蝦 酒浸炙 連 各一 蕪 去
青 陳 各五 巴 上 西 味 炒 去 同 右
為末猪膽法丸如赤豆大二三歲兒三
十丸米湯下

○又方 治疳積腹大 胡連 魏

各五錢 當門子 川連 麩 各一各 右為

宋猪膽汁和丸如麻子大每服三十

丸白木湯送下一方有苦茶

○祖傳換柳丸 治疳疾積塊腹大有

重等証 枳 兩 稜 煨去毛 莪 醋炒各

青 炒 陳 枳 各 蕪 半 不 雷 五 錢 鶴 心

三 錢 漆 無 燻 木 三 錢 不 良 土 二 錢 壁

縮 一 夾 芽 麩 炒 五 胡 連 行 其 後 三

麩 炒 山 查 肉 五 右 為 末 醋 糊 丸

如 薑 豆 大 每 服 三 五 十 丸 空 心 淡 姜

湯 下

○五疳保童丸 治五疳五癰之蓋小

兒骨因輕軟腸胃微細如乳哺有節

則藏府相調或乳母寒溫失理飲食

無常醉飽喜想及小兒百病以後五

歲以前乳食漸多不挾生為好食肥

膩甘酸之物即成五疳並皆治之

連 白 鱗 草 龍 膽 青 皮 五 倍

蟾 頭 棟 根 夜 明 砂 雄 麩

鯨 天 漿 子 熊 膽 蒼 胡 連 各

分 右 為 末 糯 米 糊 丸 麥 子 大 一 歲 兒

每 服 一 丸 米 飲 下 日 三 服

一 方 有 乾 蟬 半 微 燉 一 分

○花重丸 治因理生虫五心煩熱

蕪 連 麩 炒 麥 芽 各 右 為 末 麥

糊 丸 黍 米 大 空 心 米 飲 下 煉 蜜 丸 名

蕪 蕪 丸 黍 米 大 每 服 十 丸 至 十 五 丸

水 湯 下

○肥兒丸 治諸疳多回開乳製食太

早 回 惠 泄 瀉 胃 且 虛 更 動 且 漸 羸 瘦 腹

大 不 能 行 髮 豎 發 熱 無 精 神 連

麩酪一麥芽砂五木仁枚仁菱麩史君肉絡五右爲末麵糊丸蘿蔔子大每服三二九量見歲數加減熟水下

○**下方** 治諸疳 便桶中蛆河水浸三日新瓦上頓放外以火焙乾爲末與兒亦治走馬疳此處長

○**蝦蟇丸** 治五疳腹脹面黃身瘦寒熱喫泥採鼻咬甲頭髮不長肌肉瘠癯吐乳食利色不定日漸黃瘦

蝦 史此取阜角幾各十黛二兩半 膽兩雄二兩右爲末水糊丸粟米大二歲七九乳米飲下

○**一方** 治疳病 核箇肉仁陳莎各二輕煎 右爲末每服一錢飯湯空心調服回肉食亦可次日有蟲

從糞中出

○**灸法** 疳瘦及羸尾骨上三壯

○腸滿瀉利積聚腹脹痰涎寒熱瘦黃炙脾俞一穴各七壯 一無辜疳毒

○**疳** 腦後項邊有核如彈擦之轉動而不痛其間有虫如米粉不速破之則隨氣流散滯蝕藏府以致肢躄作瘡使利膿血壯熱羸瘦頭露骨高皆由氣血虛憊所致用二稜鍼刺破膏藥見而愈

○**疳** 小兒衣服勿晒月下被惡鳥羽尿落遂成無辜之疾

○**阿蚊丸** 治無辜疳毒項邊結核如瘰癧按之不疼兼治諸疳一服虛熱退一服渴止二服瀉利住 喚除於

夏日溝渠中或腹大不跳右取黃蠶
不鳴者其類毒落多

一杓置桶中以尿浸之桶要乾不令
虫走却將蟻蜂打殺投桶中住虫自
食一日夜次以新布袋盡包繫定置
急流水浸一宿取出居上焙乾為末
入麝香一字糝米飯丸麻子大每服
二三十丸米飲下

○**丁方** 白蕪蕒 連 胡連 黛瑤

小蚶蚩去足用右為末糊丸如粟米
大每服二三十丸食後米飲下

一痔瘡附 丹毒 白疔 牙疳 鼻
痔 癰瘡 耳瘡 疥癬

○**患** 自孩提至成童潮熱發瘡乃疳氣使
然疳虫蝕其肌膚遍身熱瘡發為無
色

○**林** 小兒一二歲頭及遍身生瘡皆因在
胎中父母交合所致名曰胎毒先用

化毒丹消毒飲却用父小便以雞翎
刷洗青黛細末乾搽之効一丁方並
見瘡部

○**平血飲** 治諸般瘡毒 敗毒散加
生姜生地門冬薄荷煎服丁方有葛
升天麻
蟬

○**甜菊多生** 面部耳前冷乳母嚼白米
成膏臨卧塗之三五次効忌烏魚動
風物

○**丹** 遠走 不定瘰赤腫癩 寒水 膏
連 栢 右為末水調刷患處

○**方** 青黛 土朱 右為末并水
入蜜調敷

○**方** 黃丹 用摩力水調劑

○**丹** 毒腫癩如火 大黃 朴硝等為
末水調塗立効

○**蓋青散** 一名蓋葉散方見
月裏生赤之內 治丹毒赤亦

腫身熱如炙

○小兒赤腫熱毒鬱結肉間發皮虛赤如瘡宜生地 通 荆 芍 桃 苦寒帶表之劑外 芩 翹 連之煎 湯入芒硝泡洗

又芭蕉根汁塗之

○小兒遍身赤腫及久伏熱毒之氣其入腹之腎則死耳

○兩已散 已研朴硝 犀 芩 芪

升各二右入竹葉五片水煎服之

○治石漆瘡及髮中生瘡取熊脂付

○又搗榆白皮醋和塗之即出髮即

○又白髮髮不生濃煮陳香薷汁止許和胡粉傳上

○又小兒頭無髮鱗魚燒末醬汁和傳

○金線錠子 治走馬牙疳凡疔毒

瘡無如此藥最效 人言行雄半不

乾胭脂行飛羅麵四右為末水煎用 采洗洗患處貼

○銅青散 治口内生疔疔牙齦潰爛

並疔牙疳 銅青各一麝香一右為末

擦之仍服

○蟾酥丸 治諸疔殺虫止腹痛退風

熱 蟾酥一枚酥油胡連 川連

膽 練去木 史君去蕪各一麝香

巴封四粒向陳各一右為末猪膽

泔丸或糊丸青黛為衣粟蘆湯下

○二檢金散 治走馬牙疳 黃丹飛

白髮飛青益飛草綿麩麝砂石等分

爲末先溫水洗淨乾貼

○**蟾酥散** 合走馬牙疳齒齦臭爛及

唇鼻丁癩疔瘡 蚰蚊燒連 黛

石等分爲末入麝少許敷之

○**青牛散** 治牙疳 蝟半大者燒

黛半 栢一 麝一 石研勻 先搗湯洗梔

乾切 鴉兒 點之

○**桃葉湯** 治未行頭面鼻疔 桃葉

二搗研水 五升煎去粗洗五七次 安

○**麝香散** 治鼻疔及鼻下連唇生瘡

赤爛麝 伴雄 升麻各 枳殼 凡

五石爲末人乳 調化

丁方 熊膽湯化 塗鼻中

○**小兒丹** 柳葉水 煮去滓洗日

七八度

○**癬** 小兒癬瘡蛇灰末和猪脂 塗之

諸瘡 ○小兒頭面身上諸瘡蛇蛻末和猪

脂傳之

○**耳瘡** 小兒耳後月蝕瘡胡粉東壁土 末

之

又黃連末傳之

又燒斷刺屎猪脂 調傳之

又黃連枯凡 末傳之

洗瘡癩 芷 苦參 腹等 煎蘇

洗尤 妙方

又栢 甘 馬鬣草 連髮葱 荆

等水 煎洗

○**疥癬** 赤芍 連 蛇灰 等輕 鈔石

爲末香 相調 敷

○**痘疹** 五十一

辨真 疑方

○傳小兒痘疹大抵與傷寒相似發熱煩躁臉赤唇紅身痛頭眩乍寒乍熱嘔嘔呵欠喘嗽痰涎壅盛一時有因傷風傷寒而得者有時氣傳涼而得者有因傷食發熱嘔吐而得者或目窠驚搐如風之狀或口舌咽喉肚腹疼痛或自汗或下利或發熱或不發熱證候多端卒未易辨必須以耳冷尻冷驗之蓋瘡疹屬陽者藏無証其耳與尻俱屬腎故腎之所部偏冷又不如祖其耳後有紅脈赤絡為之真○惠傷寒男婦重面黃女面赤喘急憎寒口中氣熱呵欠煩悶項急也
 ○痘疹腫赤多嘔嘔悸動身倦四肢冷尻冷
 ○傷食大便酸臭腹堅不消化與食宜

下之

○潔白曰傷風皮涉拘急鼻寒毒疹睡中發鼻欠嚏
 一辨內外因并疑似
 ○凡瘡欲出而未出曰發毒自是外感風寒之邪而內發心熱也宜惺人散或升麻葛根湯參蘇飲
 ○瘡欲出而未出而吐利者是中焦停寒或按宿食宜四君子湯加縮陳或和中散○如按宿食者用紫霜丸
 ○凡瘡疹覺身熱似傷寒疑似未明先與惺人散或參蘇飲○熱甚者升麻葛根湯人參敗毒散○若見紅點者便忌葛根湯恐得表虛也
 ○古方以升麻葛根湯治瘡疹已發未發世醫以為常蓋葛升麻性皆寒損

胃氣凝血脈不能發起

○傳凡熱不可驟去宜輕解之蓋痘疹無熱則不能發起此之種痘值天時暄暖則易生

○凡瘡疹初欲出時身發熱耳尻冷呵欠咳嗽面赤必是出痘之候宜升麻葛根湯加大力子山查痘必稀而易愈

一治法

○傳痘未出已出之時辰砂細末看其大小或一錢或半錢蜜水調服多者可少少者可無

又絲瓜近帶二寸連皮子燒石性細研砂細拌乾吃入硃砂心妙

○痘瘡發熱之時以惡實子為末蜜調貼額門上免眼障之患

○痘初出須看胸前若稠密急行服消毒飲加查苓酒紫草咸食有加參

○痘初出之時色白者便當大補氣血參木芪芍升葛草木丁飯酒白芍如大便泄瀉加訶藜

○初起發時自汗不妨蓋濕熱蒸故也甚者當以參芪等實表之藥防其難癒也

○初起發時煩躁證語狂渴引飲若飲水則後來屬不濟急以涼藥解其標如益元散之類或去桂五苓散

○凡痘瘡已出可心與化毒湯出不快者加味四聖散紫草飲子紫草木香湯快斑湯絲丸湯之類

○瘡出稠密者人參敗毒散犀角地

黃湯

○凡痘瘡疎則毒少密則毒甚宜以清涼之藥解之酒炒冬連之類雖數服亦不妨庶無害眼之患

○治痘大法活血調氣安表和中輕清消毒溫涼之劑表而治之此平治之法也溫如荳飯木輩

涼如前葛升輩佐之以白芍芍枳桔菴通紫草之屬

○顏色正者以前法平治則安將成就脚色淡者宜助血藥散芍酒芍之類或少加紅花以潤血色將成就之際脚色紫者屬熱用涼藥解其毒升麻葛根湯炒冬連及連翹之類甚宜必用犀角蓋犀角大解痘毒

○消息大小便如小便赤澀者大連翹湯甘露飲大便秘結內煩外熱者小柴加枳殼或少服四須清涼飲子大便黃黑色其毒氣已盛不可多與熱劑但少用化毒湯可也若二便一有秘結則腸胃壅遏脈結氣滯毒氣無從發泄目閉聲啞肌肉蠶蠶不旋踵而變矣

○大熱當利小便宜五苓散導赤散○小熱當解毒宜消毒飲四聖散

按陳氏木香散異功散乃從治之法又謂之熱因熱用也蓋痘瘡熱毒母佛鬱于內而不得起發故用下附木寇桂等辛散劫鬱之劑一二服劫而開之使鬱于內者盡因藥氣而發越于外故陷伏灰白色者皆翕然紅活凸綻而內無遺邪矣切勿過劑如一二

服後却不起者亦不可多與多則反其毒轉增黑爛咽閉聲沉而死

○凡痘瘡癰灰色白淨者作寒紫黑色者齊湧者煩燥者作熱○黑屬血熱涼血為主○白屬氣虛補氣為主○中黑陷而外白起得遲者則相兼而治

○凡痘瘡氣虛者參不加解毒藥血虛者四物湯加解毒藥酒炒各連各解毒

○凡痘瘡難分氣血虛實夫松多屬氣血不足有挾外邪而實者必加防風等藥

○瘡乾者宜退火止用輕清之劑荆芥升葛之類○瘡濕者肌表間有濕也宜瀉濕祛風之類蓋風藥能勝濕也

○咽喉痛者如聖散鼠粘子湯

○喘滿氣壅者麻黃黃芩湯

○煩渴者甘草散烏梅湯

○下利嘔逆者木香理中湯

○凡痘瘡當分表裏兩實吐瀉少食為裏虛不吐瀉能食為裏實裏實而補則結毒毒陷伏倒靨灰白色者為表虛紅活凸綻者為表實表實而後實其表則潰爛而不結疔也表虛不起發者或用燒人尿驗

○黑陷甚者用燒人尿別用無病小兒糞燒存性蜜水調服

一方用人猫猪犬四糞於臘月燒灰名萬金散

○黑陷二種因氣虛而毒氣不能盡出者酒炒芪朮草人參等藥

○階人者加味四聖散更以胡荽酒漬
付其身厚付其足噴其床帳衣被俱
以厚綿衣蓋之若未起獨聖散入木
香煎服若其瘡已黑可用宣風湯加
青皮

錢氏云黑陷青囊者百祥丸下之不
黑者慎勿下

又云下後身熱氣溫欲飲水者身冷
水數不消或寒戰者為逆

又云百祥丸恐太峻當以宣風散代
之瀉後溫脾用參苓木等分村木各
半為妙

○痺癢者實則脈有力氣壯虛則脈無
力氣怯

○虛痺實表之劑加涼血藥

與之下其結毒氣怯輕者用淡蜜水
調滑石末鴉翎刷瘡上潤之

○將壓時金白色如豆殼者蓋因初起
時飲水多其壓不齊名曰倒壓不好
宜服實表之藥及消息一使

○瘡已出而聲不變者形病也瘡未出
而聲變者氣病也宜補肺散加生芪
瘡出而聲不出者形氣俱病也身溫
者宜解毒防風湯太使閉者宜當歸
丸

○形氣俱病稟賦素弱者宜預服十奇
散倍飯少加木香煎服

○陽証足脛熱脈紅大便秘小便澀渴
不止氣急脈洪數已上證不可服熱
藥瘡疹一發便蜜如蚕種布者宜清
表連翹升麻湯瘡出不快清使自調

知其表升麻葛根湯若瘡乾黑陷
身不大熱大小便澀滯是熱蓄於內
宜煎大黃湯下宜風散如表大熱者
不可下黑陷甚者百祥丸若瘡已發
稠蜜微喘渴欲飲水宜微下之當服
九及龐氏地黃膏外以黃柏膏塗面
佳

○陰証足脛冷腰痠脹糞青面飢自嘔
乳食目睛青脉沉微已上証不可服
寒瘡瘡出四肢逆冷或自利宜急溫
之異功散附子理中湯調中丸
瘡瘡平塌灰白色不沢此正氣不足
宜十補托裏散倍芪加附或四肢厥
逆時檣檣宜溫之異功散加青風或
和中散去蒼朮加附桂
○肺氣不足之証自汗声不出容頭陷

塌不定肥並宜十奇散自汗倍芪声
不出倍桔

○心血不足之証灰白色根窠不紅不
光沢並宜芍藥湯加芍藥草紅

一瘡瘡日數輕重

○瘡瘡一二三日始見微令欲出如粟黍
米或如粟豆或如米珠光沢明淨者佳

○四白五白大小不等根窠紅光沢者
輕稠蜜陷原灰白色渴而瀉者重

○八日九日長定肥滿瘡蠟色者輕寒
戰悶乱腹脹煩渴氣急咬牙者重之
至也

○十日十一日自瘡當結膿痂痂欲落之
時痊愈

○十一日十二日自當屬而不屬者為逆
身熱稍利之以防其餘毒身不壯熱

或腹脹或瀉瀉用十一味異功散救之

一痘出不快者有五証

○一証天時嚴寒為寒所折不能起發宜散寒溫表紅斑初見宜用五積散

正氣散參藜飲調解散木香散

○一証炎暑隆盛煩渴昏迷瘡出不快宜辰砂五苓散煎生地門冬調服身熱甚者小柴加生地煩渴而便實者白虎加人參湯輕者人參竹葉湯加生地煎服

○一証服涼藥損傷脾胃或胃虛吐利當溫中益氣宜理中湯吐利甚者加附或異功散木香散豆蔻丸

○一證或成血疱一半尚是紅點此毒氣發越不透必不能食大便如常者

宜半溫裏半助養之劑用四聖散加煖及紫草木香湯絲凡湯阮氏萬金散湯氏安斑湯

○一証外實之人皮層厚肉腠蜜毒氣難以發泄因出不快宜消毒飲透肌散如大便秘於消毒飲內加大黃梔子煎服瘡出太稠宜犀角地黃湯解毒防風湯○血氣不足十奇散咽噎不利如聖湯加枳芎○口中氣熱咽痛口舌生瘡宜甘露飲子

一鮮肌清熱之劑

○傳王氏惺人散林治風熱瘡疹變毒吐熱疑似之間皆宜服木香 桔 細參 苓 甘草 括各三 右入薄荷三片煎

○升麻葛根湯林傷風身熱未明痘與

不痘宜服如既出不可服 葛升
芍 其炙右等分水煎

○木香養蘓飲 參分蘓 桔 葛
前各四分 陳 苓各半 枳各三分 木一分
半分右作一服加生薑二片

○解毒防風湯 風一地骨 莖生芍
荆穗 鼠粘各右水煎或為末湯
調下

○消毒飲 痘疹欲出及未出已出
未解急宜服之 牛三分荆一分其半
生風半右水煎加犀末无

一温表補氣血之劑
○十奇散 即托裏十補散 芪 參
飯各二 枳各一 桂各三 芍 風
其 芷各一 右為末每服一錢或二
錢温酒調下水煎亦可

○補肺散 膠一分 牛半 珠半 馬兜半
其二分 杏二 權一 加生
右水煎食後與之

○芍飯湯 飯芍右等分水煎
一散寒温表之劑

○五積散 芷各三 桔一分 芍 苓
其炙 飯 桂半 陳去 枳炒 麻根
節半 蒼各一 姜炮 四 朴細 右除桂枳
味別為末外一十二 味細切慢火炒
令轉色攤冷次入二 味未作一服 水
一盞半入姜三片煎一盞去粗熱服

○正氣散 朴 半 各姜製各陳 藿
槩木各半 其各三 右作一服加姜三
片大棗一枚水煎

○調解散 或治食傷痘黑陷 青 陳
枳炒 桔炒 參 半 芍 通 葛各

分其 蕪各二 右作一服加姜三片
束一枚 一方有紫草糯米

一補中溫養之劑

○四君子湯 參 朮 苓 各一 其 伴
右加宿陳各六君子湯

○和中散 朴姜製炒 朮姜製炒 木姜製炒 苓姜製炒 各
三 右加姜一片水煎

○理中湯 參 朮 各 右作
二服加炮附分甚者分

○木香散 木腹 參 桂 青 赤 苓 前
訶煨去半 丁香 其各三分 右作一
服加姜二片棗一枚水煎

○異功散 木 飯酒洗 桂 木 苓 陳
朴 參 藜麩裹 下 香 半 附炮各
右作一服加姜二片太棗一枚水煎

○調中丸 木 炒 參 其各四分 姜炮四分

右為末煉蜜丸如菉豆大溫水食前
送下

○肉豆蔻散 木 縮 白 龍 骨 訶
肉各半 赤 石 枯 几各七分 葶半兩 麩煨

右為末麩糊丸如黍米大每服三十
凡異功散送下

一清肌涼血之劑

○犀角地黄湯 犀 瘡 疹 出 大 感 聖 藥 以 此
鮮 之 犀 鎊 生 地 牡 赤 芍各等

右水煎
○連翹升麻湯 升 麻 葛 根 湯
加 連 翹 一 分

○甘露飲子 生 地 熟 地並酒洗 天 門
麥 門 杷 芩去 枳 殼 芩 鮮 茵

其 各 等 右 水 煎
○紫草湯 名 紫 草 木 香 湯 治 疽 疔 不
快 及 大 便 自 秘 紫 木 苓 木

○**四聖散** 林治痘出不快及倒靨
紫草茸 木通 各一枳殼 甘草 各半
水煎

○**透肌散** 名孔毒湯每服二三升
入粳米五十粒
紫草茸 緣升麻 其絡 一石水煎或
與消毒飲同煎尤妙

○**如聖湯** 林治身熱如火頭痛頰赤痘
瘡已出未出並宜服 白芍 升
葛絡 二升 紫草 通去節各右每
服二三錢姜三片葱白二根同本煎
服○壯熱心煩加參 赤苓 膏
門

○**紫草木通湯** 治痘出不快 紫
參 通酥苓 粳米 絡等 其減石水
煎

○**快透散** 治証同前 紫 蟬蛻
參 通酥苓 其絡各右水煎

○**連翹散** 治痘瘡發熱 翹 風
施 其絡等 右水煎

○**升麻湯** 治痘在面 升 犀 射
干 苓 酒 乾 參 其絡 半 右
一和鮮之劑

○**小紫胡湯** 柴 半 苓 參 絡 一 半
八 其 半 右 加 姜 三 片 大 棗 二 枚

○**人參白虎湯** 名化斑湯 知六膏兩
仁 其 二 煖 五 加 參 仁

○**竹葉湯** 門 半 兩 參 其 絡 三 升 半
半 字 竹 葉 兩 右 每 服 五 錢 內 粳 米 三
十 粒 加 膏 二 兩 八 名 竹 葉 石 膏 湯

○**五苓散** 沢 半 兩 木 赤 苓 猪 各
兩 桂 兩 右 爲 末 白 湯 或 清 米 飲 調 服

○**五苓散** 沢 半 兩 木 赤 苓 猪 各
兩 桂 兩 右 爲 末 白 湯 或 清 米 飲 調 服

○口舌生瘡者蜜漬黃栢汁飲之

一痘疹入眼氣乃一切發風動火之物

○傳 芾明散 草决明 赤芍 天花

其粉等 爲末食後茶清調下

○撥雲散 卷 風 柴 甘鞞各爲

末水煎服或薄荷汁茶清或菊花苗

煎湯調皆可

○林 蟬菊散 治斑瘡入眼或病後生翳

障 蟬 白菊花各等 右每服二錢

水一盞入蜜少許煎乳食後與之屢

驗

○决明丸 治痘瘡入眼雖赤白障翳

遮睛但瞳子不陷者可治 石决明

煨芍 栢酪各一 蒼五不加黃連 右爲末

用兔肝爛搜和丸如菘豆大每服三

二十九食後臨卧米泔下

○全 蟬花無比散 治瘡疹入眼 苓

甘草各四 石决明各四 研如粉 芍 卷

飯酪三 赤芍耐三 蒺藜尖半斤 蟬頭

足翅蒼妙 耐蛇蛻久 右爲末食後

米泔調服茶清亦可

○林 洗方 黃連剉白骨右研銅青研右

緝包泡湯候溫洗眼

○治出瘡眼內有翳 輕粉 黃丹各

分右研勻左眼翳吹入右耳內右吹

左

一痘後餘毒

○惠 痘癰者毒氣當出而不得出流於脾

經則場發四肢手腕膝臆腫痛或頭

項胸脇赤腫宜消毒飲或五香連翹

散餅之末成膿者小柴胡加減用之

重者或面赤便秘或渴嗽睡驚尿赤

炭十六味流氣飲加附或加大黃

○如稟受怯弱屢後面青不能會食身

躄倦怠無熱證與調本藥安養之不

可毛於鮮利也毛則十補湯加枳桔

○傳痘後壅毒不問發於何經初起紅腫

時即用黑棗赤二豆以嚴醋浸研漿

以鵝翎刷之效

○必勝膏 馬齒莧特多猪脂石蜜右共

熬為膏塗腫處

○蠅子水 蠅子活者以水養五日取

禾洗洗面漸生肉無

○毒氣入大腸則便膿血或下腸垢或

大便秘結宜用犀角地黃湯身煩熱

湯宜黃連解毒湯熱盛者小兼氣湯

下利者黃連解毒湯黃連阿膠丸駐

車丸

○痘後二旬不大便其糞燥在止高田大

芒枳巴等藥及蜜導及服香油碗

不通念下婢以真麻油含口內用小

竹筒內敷道中吹油入腸內須臾即

通

○消毒飲方在前

○五香連翹湯 乳木 沉 丁

翹 射干 升 通 桑奇 獨

大 麝格等 水煎

○小柴胡湯方在前

○愈後癩已落其癩黑或凹或凸小尾粉

輕粉石研猪脂調塗

○十六味流氣飲 參 芪 飯各一

芍 桂 朴 芷 苈 風 烏

枳 芍 枳 木 絡半 桔 紅 蘇一 木

石水煎

氣血虛而自利者加熟附大使實於
天黃

○干柿湯又名干奇散

○黃連解毒散 連行 芍 栝 梅 各各

○小養氣湯 大杜村 實 裕半 右

○小黃連阿膠丸 白豆 一 棗 苓

訶 炮 去 核 連 微 炒 右 為 末 阿 膠 二 兩 醋 煎 和 丸 如 粟 米 大 一 歲 兒 十 粒 米 湯 下

○駐車丸 連 三 膠 飯 略半 姜 一 兩

右 為 末 醋 糊 丸 米 飲 下

○惠 若 又 痘 疹 利 再 作 瘡 疹 者 此 餘 毒 未

盡 也 宜 鮮 利 之 氣 虛 者 未 可 鮮 利

一 中 地 風

○惠 痘 疹 愈 後 忽 遍 身 青 或 黑 手 足 厥 冷

口 噤 涎 喘 如 錫 者 此 名 中 地 風 宜 磨

疹 丸 愈 榮 衛 尚 弱 而 暴 感 時 令 寒 氣

風 雨 地 氣 毒 氣 襲 風 而 入 致 多 宜 清

風 散 一 分 入 蟬 蛻 末 二 分 入 三 酒

生 姜 薄 苛 汁 數 點 湯 調 三 三 服 立 醒

或 少 汗 而 鮮 或 再 出 癰 疹 而 愈

○消風散 荆 苈 各各 陳 醋 參 苓

蚕 絲 風 芎 蟬 蛻 地 龍 略 二 升

卷 兩 右 為 末

一 斑 痧 水 痘 附 溫 毒 發 斑

○林 小 兒 斑 痧 毒 之 病 俗 言 痧 子 是 肺

胃 有 熱 也 其 肺 胃 蘊 積 熱 毒 或 以 時

氣 所 作 薰 發 於 膚 狀 如 蚊 蚤 所 咬 故

赤 斑 遍 身 也 凡 發 赤 斑 者 十 生 一 死

發 黑 斑 者 十 死 一 生

○又 小 兒 時 氣 咳 嗽 聲 重 涕 唾 稠 粘 目

睡 欬 赤 煩 熱 渴 躁 此 則 肺 胃 蘊 積 熱

毒 發 則 易 出 一 出 遍 於 肌 皮 之 上 如

泡子見而漸沒病在表受毒之淺此
名瘰子亦名層層俗曰麻子

○或時行溫毒熱氣薰蒸病在裏受毒
之深發及層遍身狀似錦紋或如
咬痕顯小豆大或黑是曰斑也

○又有水痘一証與正痘不同易出易
靨不宜燥濕或濕之亦不為害但不
能結痂則爛成瘡

○**葛根麥門冬散** 治小兒熱毒發斑
或赤或黑頭痛壯熱心神煩悶
葛 門絡三參 升 甘草赤苓
赤芍絡二膏兩右水煎

○**生地黄散** 治小兒瘰子身熱口乾
咳嗽心煩 生地附門杜杏各去
款 陳絡二甘草二右水煎

○**麥湯散** 治小兒水痘 麻節大
熟煨 知 菴 甜葶藶 參 各

滑 地骨 甘草 各 右為末每服半
錢水一小盞入小麥七粒同煎溫服

○**傷寒溫熱病而發斑如錦入者名曰**
發斑皆熱毒之所致也是皆冬應寒
而反溫人受不正氣故至春夏而發

為斑爛陽脈浮數而陰脈實大者名
為溫毒治法用化斑湯升麻葛根湯

玄參升麻湯黑奴丸黑膏一類
丹溪曰發斑屬氣熱挾痰而作通聖
散中消息

○戴氏曰有色點而無顆粒者曰斑
內傷發斑者胃氣極虛一身之火
行於外宜補以解之

○疹屬痰熱在肺戴曰浮小者顯粒
而文出也聖散消息

○**化斑湯**即白虎加人參湯

○**升麻葛根湯**方見前

○**玄參升麻湯** 治溫毒發斑咽痛煩躁諸語升 玄參 甘草各半 右水煎

○**黑奴丸** 治溫毒發斑煩躁大渴 芩 釜底煤 芒 麻 梁上塵 灶突墨 小麥奴各一 大黃三 右為末煉蜜丸如彈子大新汲水化服如不消不可與此藥

○**黑膏** 治溫毒發斑凡冬月大溫人受不正之氣至春發斑脉浮散屬陽沉伏屬陰用此消疫毒 生地半 香豉升 右細切以猪膏一斤 合煎之取濃汁如膏用雞黃麝香 豆大肉中攪和勻每服用彈子大右湯

化長

○**防風通聖散** 風 芎 飯 白芍

大 芒 翹 荷 麻各四 桔 苓各八 木 枳 荆絡二 滑四 甘草後一 右加姜水煎

○**犀角消毒飲** 治發斑癰疹等証 牛四 荆穗 風絡三 甘草一 犀一 別一 鑄一 不煎湯 右水煎調犀末服

○**解毒防風湯** 方見前治發斑及癰疹痔痛

○**陰毒升麻鱉甲湯** 治陰毒 升仁 飯 甘草各一分 蜀椒二十 鱉一 雄一 別一 右水煎調雄末服

○**加味羌活散** 治感四時不正之氣 發癰疹 羌 前各一 參 桔 甘草 枳 天麻 芎 苓各半 蟬 荷

各三 右作一服加姜二片

○調中湯 治內傷外感所發陰斑

蒼朮 陳行縮 藿 芍 倍 其 炙 桔

芷 半 羌 枳 各 七 芍 五 麻 枝

各三 右作一服加生薑三片

○加味敗毒散 治瘡毒及癰疹等証

羌 獨 前 柴 芍 枳 桔

參 苓 各 五 芍 芎 各 二 加 米 風

荆 蒼 飯 芍 生 地 各 五 右 作

一服加姜三片棗二枚此因虛而感

風濕致發斑者服之良

一孕婦痘瘡

○傳 凡孕婦發痘宜單胎散胎動不安宜

獨聖散安胎飲身熱甚宜木香參蘇

飲或瘡稠蜜宜十奇散倍芍飯煖桂

加沙烏如胎已五月則桂心半身

屬俱不必禁

○單胎散 赤苓 朮 飯 白芍

赤芍 葛 北柴 參 桔 條 苓

風 陳 荆 枳 紫 草 膠 糯

芷 其 芍 宿 大 熟 加 鬱 金 各

分 右 作 一 服 水 一 盞 煎 至 一 盞 乾

柿蒂七箇野苧根七寸甜瓜蒂一箇

用銀器煎以荷葉蓋定熬至八分去

粗仍用荷葉蓋覆空心溫服

○獨聖散 用連殼宿砂慢火炒去殼

為末每服半匙熱酒調下胎動則服

服後覺胎熱則安

○安胎飲 腹 酒 泡 淨 乾 參 陳

木 白芍 飯 芍 香 附 米 浸 使

宿 蘓 苓 其 絡 半 右 作 一 服 水

一盞半燈少七莖糯米一撮煎一盞

食前温服

一痘瘡膿汁不乾

○傳蓋瘡出太盛表裏難解以致膿水粘衣着席濕痛不能轉側宜白龍散敗草散附之

○白龍散

黃牛糞日乾火煨成灰取

心中白者為未亂撲之

○敗草散

用蓋屋及牆背土遠年腐

草洗淨焙乾為末亂撲之及鋪席席上佳

○或以麥麩移席篋上可

一惡證

○痺塌寒戰咬牙渴不止痘紫黑色喘

渴不寧灰白色陷頂腹脹頭温足冷

悶亂飲食氣促泄瀉瀉

○惠瘡正出而吐利者困

出而謔語不正者惡候

便血而乳食不化者脾虛已死

瀉血而瘡爛無膿不治

大小便秘目閉声啞肌黑者死

遍身黑陷目閉無魂者死

面色青者死瘡後發變者危

面黑或鼻有黑氣不治

燥渴尿澀泄瀉不食者危

頭面腫瘡盡搨破臭爛不可近或足

冷至膝不治

面腫鼻塌目閉咬牙不治

痘瘡黑焦風文腫鏡唇項腫硬或胸

膈高突不治

一室中禁事并機法

避風寒常和暖忌生冷忌聞諸穢

氣忌冒外人

忌犯房色忌近

月水婦人眩暈者 巨燒大黃茶末
以辟惡氣燒木香亦佳勿燒沉 檀
降真 乳香 腦 麝

○憚悵之內且懸胡芩或以胡芩薑酒
噴床悵痘瘡最怕穢惡之氣觸犯

一痘不出方

○傳九值天時不正鄉隣痘瘡盛發宜服
禁方不出方 二豆湯油飲子 鳳龍膏

○二豆湯 赤小豆 大黑豆 菘豆

各一升 右二豆淘淨用水八升
煮豆熟為糜遂用空心任意食豆飲
汁七日止不出

○油飲子 真麻油升 遂用飲盡永不

出已上一方出扁鵲倉公方

○龍鳳膏 烏雞卵筒地龍一條活者
細小者

石以雞卵開一小窠入地龍在內夾

皮紙糊其窠飯鍋上蒸熟去地龍與
見食之每歲立春日食一枚終身不
出痘隣里有此証流行時食一二枚
亦好

一雜方

○雁氏地黃膏 瘡已發稠蜜微喘濕

欲飲水以此下之 生地四錢半

雄雞一雞半右以稻膏一斤和勻露下

宿煎五六沸令二三升去渣絞去粗下

雄黃射香攪勻稍久飲之毒從皮膚

中出即愈

○黃柏膏 瘡已發稠蜜用此塗面佳

栢一兩去粗菘豆一兩右為末

以生芝麻油調從耳前至眼眶厚塗

之且二三次如用早能令瘡不至面

縱有亦稀少林云或用紅花二兩

服四時亦可

○林

○周天散 治痘黑陷腹脹直視喘急

發極 蟬退五地龍一兩 右為末

每服半錢入兒一錢研乳香易湯調下

連進二服愈

○奇方

治痘出不透腹痛甚或黑陷

者 蟬蛻五寸箇洗去足翅晒乾 右為末每服

一錢白湯調下腹痛立止乳母亦可

服一錢

○又

人齒散 治痘初出光壯忽然

黑陷心煩性躁氣喘妄語或見鬼神

不速治毒氣入藏必死 人齒燒存

右為末每齒作一服酒下

○活血散

治痘未出已出煩躁及癢

發身痛者 白芍末為末每服一錢

溫水調下止痛消調尤驗痘四肢出

小快加防風一方用赤芍

○阮氏萬金散

林作萬金 治痘出不紅

潤風參 蟬絡等 右每服四錢

水一盞薄荷二葉煎入分溫服熱而

實者加升麻

○絲凡湯

絲凡連皮子燒存性為末

每服一抄時久用米湯調服此物發

豆瘡最妙或發草其草煎湯調服亦

可

醫法明鑑卷第四終

延寶三卯年

村田庄三郎

福森兵右衛門行



卷四

四

