


丹臺玉案卷之六

明新安休邑後學孫文胤對薇父參著

古潤外父 江東銘懷一父 較正

常山縣岸盟弟黃表仁德懷父

蘭陰盟 弟方調元善長父 仝閱

小兒科

男子婦人之病可以問而知可以切而得斷死生辨難易審差劇猶有所依據而不至於大悞若小兒者懷抱之時雖有所苦而不能言及能學語又不能指

其苦之處欲診其脈則骸骨短小氣血未足寸關尺將何以分浮中沉將何以定雖有一指滾珠一部之說而終未得其部位況至數急促豈能以悉察之大約八九至爲平五六至爲遲十一二至爲數依稀彷彿之間而已故啞科治療之難每十倍於大人而尤不可以不愼者也惟虎口之脈稍爲可驗其脈在食指外側每一部一關三節爲三關男視在左女視在右有筋脈如系映於肉內仔細觀之紫則爲風紅則傷寒青則爲驚白則爲疳黃則爲脾困青黑則爲

驚入掌則爲內吊若三關通度爲沉痾之候惟此以少知之耳雖然幼科之治病當多方求之豈可執虎口之脈法而盡小兒之諸病哉必於病之未形而用意察之庶可以爲預消之地如小兒呵欠連綿乃小兒臟腑受邪病之漸也若面赤則知其風熱而瀉肝之劑可以先服面青則知其驚風而治驚之劑可以先服面黃則知其多睡則知其爲脾虛而補脾之劑可以先服口中氣熱則知其爲傷風而疎風之劑可以先服皆當隨症

形而先治之勿俟其發而後用藥也其有不治之症者尤不可以不知小兒眼上有赤脉顴腫及陷者一不治也魚口氣麤嚙齒咬人者二不治也冷汗如雨痰熱不退者三不治也臍風撮口鎖肚吊腸者四不治也風攻頤頷脣項腫硬者五不治也臭有黑色者六不治也咳喘心痛者七不治也四肢浮腫者八不治也胷高而突起者九不治也五軟五硬者十不治也凡見此等之症即當去矣苟不知幾而復藥之則病者之死雖不由於我我亦何辭於彼哉大凡小兒之病有常多者不得所怒則易怒而啼故肝病常多飲食不知節雖飽而猶求食故脾病常多心神未定聞響易動故驚病常多性喜吮乳甘食停積而易感風熱故痰病常多治兒之病審其所常多者酌而施之以已之意察病之情亦庶乎用藥之無謨也然此數種雖或常有而肝脾之病尤多神而明之存乎其人得心應手不可以言求也

初誕法

小兒在胎稟陰陽五行之氣以生臟腑百骸藉胎液

以滋養受氣既足自然生育出世之時口合血塊啼聲一出隨即嚥下而毒伏於命門週天行時氣或飲食停滯或外感風寒驚風發熱等因發為癍疹須急於未啼時用軟帛裹指宅出其血用黃連硃砂甘草研之後出胞亦輕有嚥入即時肚脹嘔吐氣短不乳者用扶苓丸治之但黃連性寒若母稟氣膏粱積熱者宜服若滋味淡薄胎元弱者又不宜用硃砂固能解毒恐金石鎮墜不若牛黃分許蜜調與吮為佳又有嬰兒因其難產或見風寒而垂危者切不可斷臍帶急忌煙綿絮包抱懷中急以胎衣置火中煨燒更用大紙捻於臍帶上往來燎之使煖氣入腹須臾氣復自甦猶戒洗浴恐臍理不密元氣發泄而邪乘之也

立方

生下遍身如魚泡用窯陀滑為末糁之仍服是紅肉者乃胎氣未足也用旱米粉撲之俟生皮自正

舐蜜法 先以黃連煎湯拭兒口吐去惡汁再以硃砂一分研細蜂蜜少許抹兒口吮之鎮心定魂安神解毒

牛黃法 以牛黃一分硃砂半分竹葉七片煎湯調

生後身冷口氣亦冷腹鳴瀉痢青黑腸肉釣心腹絞痛衆乳者一應香一字撥枝一握水煎沸溫熱浴之勿洗臍胎瘦白姜散 白姜 木香 官桂 陳皮 枳殼 丹皮 各等分嘔加木瓜 青皮 香附 各一錢 水煎量兒大小以綿蘸灌之 木香勻氣散 木香 丁香 檀香 白豆蔻 各二錢 藿香 五苓散 各一錢 砂仁一錢

有生下不能啼者必因難產冒寒或致急急以綿絮包抱懷中未可遽斷臍帶宜將胞衣置一火中煨之俟作大油紙撚點火於臍帶上往來遍燎之蓋帶連兒臍得火氣自臍而又更以熱醋湯洗先臍帶須臾可洗淨并斷臍帶

有胎縮者乃初生受寒用硫黃呆妻各五錢為末研大蒜汁調塗腹上仍點床子燈火微炙黑

有生下口兒者急看兒口中懸癰前膊上有泡以手指擿破用帛拭血令淨若血入

胎瘦怯面黃白睛多喜哭身肌肉薄大便色白屬肺腹長生丸 挾積各二兩木香五錢砂仁一兩丁香半兩麝香少許為末每五七丸乳汁下寬止黃下神脾化痰止瀉 白豬青黛烏梢蛇各一錢半天麻五分蝎梢硃砂各二分半

灌益肝膽除煩熱祛驚邪辟惡氣除小兒百病

茯苓丸

赤茯苓　黃連胎冷者易芩藥　枳殼各等分

右爲末煉蜜爲丸如梧子大每服一丸乳汁化下

護胎法

小兒初生肌膚未實宜用舊綿護其背不可太煖更宜頻見風日則血氣剛強肌肉緻密若藏於重幃密室或厚衣過煖則筋骨軟脆不任風寒多易致病衣服當隨寒熱加減但令背煖爲佳亦勿令出汗恐表虛風邪易傷乳哺不宜過飽若宿滯不化用消乳丸治之陳氏所謂忍二分寒喫七分飽頻搔肚少洗澡要肚煖頭涼皆至論也須令乳母預愼七情六淫厚味炙煿則汁清寧兒不致病保嬰之法未病則調治乳母既病則審治嬰兒亦必兼治其母爲善

立方

消乳丸

砂仁炒　蓬术煨　三稜　陳皮

神麯　麥芽各五錢　香附一兩炒

候即死初生數適血乳者乃肺經閉小肝門急用金銀玉簪看其端的處刺穿或用火針刺不可深以穿過道爲法看住緊急只以油紙捻套住內服清涼飲藥再合當歸芍藥大黃牙草各等分水煎溫服治血熱溫結壅滯不通或身生瘡或目赤口瘡即熱或夜多熱皆血熱也

有生後面紅乳急腹痛啼叫欠二便不利或有血水甚則手足搐搦眼常不視身常戰跳宜連翹飲五福化毒丹生地黃當歸芍藥甘草各等分水煎溫服

有不能飲乳者用黃連甘草各不拘多少蜜丸乳汁化下

有生下面赤眼閉二便不通不飲乳者醲乳方法

有單小便不通者乃心乳積熱併於小腸急用地龍數條蜜炙許研勻數服兼上內用鑽起煙灸末研細腦麝少許爲末煎湯調服

有不乳小便難者用乳汁和煎白芷煎湯灌之

大便不通腹脹氣急者令婦人以溫水漱口吸咂兒前後心并暗下手足心共七處吸咂三五次以紅赤爲度便即自通

右爲末。麪糊爲丸。蘇子大。每服三十九。白湯下。

面部氣色舉症圖



下頰屬腎水。左腮屬肝木。天庭印堂屬心火。鼻準屬脾土。右腮屬肺金。半週兩歲爲嬰兒。三四歲爲孩兒。五六歲爲小兒。七八歲爲齠齔。九歲爲童子。十歲爲稚子矣。

面部氣色舉症

古云。小兒爲之芽。如草之芽。如水之源。蓋因臟腑脆嫩。口不能言。最難投劑。當首察色而知其所屬。次驗虎口。以辨其所因實爲治法之簡要也

小兒有病。看面部全依氣色決分明。望聞問切能窮究臨病方無拘手。尋面部諸般各有屬。脅肢上下俱屬木。左目太陽右太陰鼻準脾家土。心應唇口兩傍脾所居。兩目顴間腎之墟。額同顴臉屬心火。左頰原來肝所主。右頰脣中是肺基。四時各有

一色強依時無急逆時硬要分旺相休囚否盡在
人心自酌量春天青旺赤爲相黑休白囚黃否家
夏天赤旺黃相吉青休黑囚白不良假爲肝病面
青時白色當春未易醫此是肺金來尅木色黃又
被脾家欺心病夏天尚面赤望色只愁形色黑此
彼腎水尅心火白色又被肺家屈肺病秋來面白
宜若行赤色最難除此因心火尅肺金青色反令
肝作威腎病面黑各天相黃色現時多怩怏此乃
脾土尅腎水色赤反致心磨障脾居四季面形黃

如遇青色最難當此爲肝木尅脾土色黑反使腎
家強春赤夏黃秋黑色冬青雖相亦無益從前來
者實形傳實瀉其子平方吉五臟所屬各一宮五
色分來人不全色內能分明與滯據色方能辨吉
凶心赤順時雞冠色不宜瘀血糊塗赤肝形翠羽
順光多色如嫩草安爲吉脾色貴如蟹腹黃形如
秋實必災殃肺形獨貴豬脂狀枯骨定知壽不長
腎色最尚如烏羽形如炭煤非吉理色色去將兩
色分吉凶灼然不虛語更看人氣清明順神昏氣

餒作、囟誤、瘦而氣壯、色必實肥而氣怯、色必嫩氣壯則實以安祥氣怯則虛壽不長再看得病面如何發熱額上紅必多青色現時急驚作若成昏暗定知殂額冷足冷夾食驚額熱足熱傷風重顴門貴合不宜陷腫起成坑兩無用。印堂青色驚之病紅色心驚白主和或見微微青紫色只因客忤驚相過山根青今驚爲疾紫色傷於乳和食瀉脫宜黃白須灸年壽黃爲吐利基若成既白是乎虛兩顴赤爲啼哭熱左腮紅是痰氣爲右腮紅是傷風熱面青脣赤傷寒至面目皆黃濕熱生面黃弄舌五心熱兩眉紅主見夜啼眉蹙頭疼痢疾爲眼脖浮腫主久嗽病之將瘥目皆黃淡紅心熱無多說目多直視乃驚風赤脈貫睛肝病凶魚自定睛非吉兆瞳人中陷亦之宗

三關觀指舉症





懸針形



青黑水驚赤色腑熱慢驚

如環形



主傷食嘔吐。

如蟲形



主傷硬汞麪物。

水字形



主咳嗽積滯驚風。

如豹形



主傷生冷物。

曲向外形



主傷風多汗。

乙字形



主驚色青黑慢脾風。

雙鉤形



主傷寒。

曲向裏形



主傷寒無汗。

如蛇形



主脾經濕熱泄瀉。

川字形



主食積五臟有痛。

三關過度形



看紋細而紅多主驚有黑不治。

三關觀指脈法

陰陽運合。男女成形。已分九竅四肢。乃生五臟六腑。部位既別。逆順難明。若存寸吉之浮沉。必乃橫亡於孩子。須明虎口辨別三關。精詳用藥。始無差誤。

寢後方將形脈看。要分寅卯辰。男看左手女看右。氣寅風卯命辰安。紋青枝紫驚為病。紋紫枝

紅傷寒症。紅爲采粒脈結熟黑色透辰傷暑論青
紋瀉痢胃家寒白色微微即是疳枝赤涎潮宵痞
膈黃紋隱隱困脾端枝形宛爲鉤鈎樣傷風傷寒
分所向向外傷風有汗形向內傷寒無汗相枝青
渾如魚刺形驚疳虛風三部分枝直懸針青黑色
水驚肺熱慢脾併枝如釆字三關有唊嗽積滯風
疳久枝如一字青紅紋總是驚風慢脾疾一曲如
環傷食干兩曲如鉤傷冷看三曲長蟲傷硬物雙
鉤脈樣是傷寒枝形或似如蛇樣定是脾經濕熱
多亂紋食指如川字食積相兼五臟疳。

臍風撮口

臍風撮口總爲一病未有臍風而不撮口未有撮口
而非臍風也患此病者九死一生蓋臍命根也臍爲
風所入命根絶矣而可以得生乎求其所屬之經乃
心脾之症也開口屬心閉口屬脾風入於臍先流於
脾由脾而至上傳入於心心爲邪所客故口不能開
而頻撮也其發搐者風使之也究其病之所由或有
內外因之異蓋臍帶繫於胞必其未生之時其母先

感風邪遺其邪於小兒謂之胎風其驚搐者謂之胎驚病從內得故曰內因其或斷臍之後包裹失於周密被窩風入來及三七十日而臍帶已脫必成此症病從外得故曰外因有以艾灸其臍徒苦之耳竟何益哉欲求一生於萬死之中惟下之而已矣外此更無他法

立方

復生飲　治一切臍風撮口

牙皂　殭蠶　穿山甲炙黃各等分

防風　膽星　半夏各五分　甘草三分

大黃一錢後入署煎一沸

先卽以此兒脫下臍帶煎五六沸去帶再入前藥煎臨服加入薑汁竹瀝各二茶匙麝香少許調勻徐徐以匙灌之以通利則有生機

又方　前藥不効再服此劑

牛黃　殭蠶各一錢　膽星八分　麝香一分

右爲末每服五分薑汁調灌下

封臍散　生南星爲末封臍不可再見風

重舌鵞口

舌者心之苗也以爲君火其體本熱而況小兒以純陽之軀先受於胎復感熱於外其母愛惜之至惟恐其寒而又裹之以綿衣覆之以重衾幾何而不爲兒之病哉重舌鵞口之症未必皆兒之自病或者其母有以致之也古人云若要小兒安常令飢與寒飢則不致於傷脾寒則不致於生熱此保嬰之道乎所謂寒者亦非使之凍也惟令常溫不至甚煖耳冷煖得宜豈復有鵞口重舌之患耶然何以名之曰重舌重舌者舌下腫突其狀又若一層故謂之重非其有兩舌也何以名之曰鵞口鵞口者滿口皆白有似鵞之口中俗謂之雪口是也分而言之重舌屬心鵞口屬脾合而言之總爲心熱何者心統於脾故曰治於口也使不由於心熱則口雖白而舌白赤何爲而舌上皆白耶大法內服瀉心清熱之劑而外敷涼藥則重者可消白者可退矣

立方

清熱飲　治重舌

黃連　生地各一錢　甘草　木通
連翹　石蓮子各五分
淡竹葉七片時時灌入口中
瀉脾飲　治鵝口
山梔　石膏　黃連各八分　生地
黃芩　白茯苓各七分
燈心十莖　徐徐灌之即愈
涼心散　重舌鵝口皆可吹入舌上
青黛　硼砂　黃連入乳拌曬入中　白礬各二錢煅過

風化硝　黃柏各一錢　氷片二分
右爲極細末吹之並治口瘏

丹毒門

丹毒火症也得於胎熱其母受胎之後不忌胡椒薑蒜煎熬炙煿酒麵之類或感風熱或不節房事皆能助火火邪內攻胎受其毒而傳氣於兒故小兒出胎之後多有是症近則五六日或十日或半月遠則彌月之後或兩三月其症形不同或頰下如櫻桃突出色赤而光謂之赤癍或遍身紅點如灑珠謂之丹疹

或遍身紅腫熱氣如霎謂之火丹或小腹臍上陰囊
等處忽然紅腫如霞流行不定謂之赤遊丹病名非
一總爲丹毒丹毒入腹腹脹不飲乳者死必於未入
腹之時急服退毒涼劑外用小力輕輕刺出惡血猶
有可生其入腹者無如一瀉間有瀉而得生者乃千
百中之一也諸丹毒惟赤遊丹爲至危善保嬰者若
見小兒多啼多哭多乳則遍視其身上一有紅色即
急治之苟看視不周丹毒在身而母猶未覺及至覺
時已入腹矣救之奚及丹毒惟絲瘤不治因久服熱

藥遺熱在胎非藥所能解也

立方

解毒湯 治小兒一切腫硬赤諸般丹毒初起即
服立愈

黃芩 各一錢 黃連 甘草

連翹 天花粉 皂角刺 各五分

竹葉十片不拘時呷之

化毒飲 治火丹遍身紅腫

赤芍 當歸 甘草 大黃 各八分

水煎不拘時服

防犀飲　治丹毒遍身如酒珠者

防巳三錢　朴硝　犀角　黃芩　黃耆　升麻各八分　甘草一　赤芍各八分

澹竹葉十五片煎服

消毒飲　治五種丹毒

鬱金　天花粉　乾葛各一錢二分　燈心二十莖不拘時服

搽毒散　多年胞衣化開同金汁塗之神效

又方　綿羊腦子同研貼患處并治赤癜神効

十種丹毒三日不治毒入腸胃則不可救治法錄後

一從頭項起腫用蕎白研汁塗之　二從頭上起紅腫痛用赤小豆末鷄子清調搽　三從面起紅腫用臟心土鷄子清調搽　四從背起赤點用桑白皮為末羊脂調搽　五從兩臂起赤腫黃色用柳葉燒灰水調塗　六從兩脇起虛腫用生鉄屑和豬糞調搽

七從臍上起黃腫用檳榔末米醋調搽　八從兩脚
起赤腫用乳香末羊脂調搽　九從兩脚有赤白點
用猪槽下土麻油調塗　十從陰上起黃腫用屋漏
處土羊脂調搽

中惡門　天吊　客忤　夜啼

中惡天吊者爲惡鬼之氣所中兩目上攛吊起而不
能瞤也此因胎氣不足精神失守虛之所在邪必襲
之心虛則神走肺虛則魄亂肝虛則魂亾脾虛則意
擾腎虛則精之而鬼得以犯之矣其症面白帶青或

土色目睛上視口吐白沫手足拘攣身冷如氷有似
於驚風而實非驚風也又有所謂客忤者非中惡之
謂也乃偶見生人異物卒然驚駭啼哭不止心志恍
惚聞聲即跳常欲躲避之狀者是也如爲所忤故
爲客忤豈以客爲鬼乎又有所謂夜啼者非客忤之
謂乃心經受熱也其症至夜即啼百計安之而不能
止蓋心爲君火而主於血夜則血歸於肝而心虛火
熾故煩燥不寧而多啼也

立方

定神散　治中惡天吊。

茯神　遠志　膽星　麥門冬　各五錢　石菖蒲二錢　琥珀一錢五分

右爲末每服一錢滾湯調下。

抱龍丸　治中惡天吊夜啼客忤等症每一丸薑湯下。方見驚風門

安魂湯　治客忤立効

棗仁　茯神　遠志各一錢　膽星各七分　當歸

燈心二十莖煎服。

保安丸　治夜啼

人參　麥門冬　黃連　茯神　龍齒　遠志各五錢　硃砂五錢金箔二十片

右爲末蜜丸朱砂金箔爲衣每服一丸滾湯化下。

吐瀉門　附食積傷食

小兒吐瀉交作人皆以爲脾胃受寒不能安飲食故上則爲吐下則爲瀉此據其病形而言耳而不知脾胃受寒者止於腹中微微作痛或微溏或吐痰涎而

已其勢殊無可畏至於大吐大瀉一時發越津液頓
亡面目乍瘦豈受寒之爲病哉必是平素先傷飲食
鬱蒸作熱蓄之既久將發未發一感外之風勢勢不
可遏故攻擊臟腑一齊而至遂令小兒困憊當此之
時若以爲吐瀉空虛即投補劑盡溫熱之藥立見危
亡愼之愼之如有吐而無瀉或有瀉而無吐者乃有
寒熱之分吐酸臭而苦者熱也清痰則非熱矣瀉臭
穢而不可近者熱也

立方

藿半散　治小兒吐酸苦者

黃連薑汁炒　半夏薑製　藿香　各五錢　白茯苓
砂仁　各三錢

右爲末每服二錢不拘時薑湯調下

安然湯　治吐清痰者

白豆蔻　蘇子
陳皮各八分　藿香　各一錢　膽星

生薑五片不拘時煎服

霞齡散　治小兒吐瀉交作

木瓜　厚朴　砂仁　藿香各五錢
木通　白扁豆　黃連薑汁炒　白芍
廣木香各三錢
五分
右爲末每服二錢白滾湯調下
和脾溫胃散　治小兒瀉利清水不止
陳皮　蒼木　白朮　白茯苓
甘草　防風各五錢　肉桂二錢
右爲末薑湯調下一錢
消滯調脾飲　治小兒泄瀉臭穢之極

陳皮　滑石　黃連各八分　神麴
麥芽　白芍　車前子　澤瀉各六分
生薑二片不拘時煎服
香橘丸　治吐瀉或食積所傷肚腹作痛脾胃不和
蛔蟲上行並皆治之
橘紅　茯神　青皮　麥芽
厚朴　山查各二兩　砂仁　三稜
神麴　人參　澤瀉各一兩　甘草五錢
右爲末蜜丸如龍眼每服一丸薑湯化下

附食積傷食。

消磨散　治小兒諸食所傷。以致肚腹膨脹。面色黃瘦。

蓬朮　三稜　陳皮　山查

草菓去殼各一兩

右爲末。每服二錢。薑湯調下。

針砂丸　治小兒腹中食積成塊。堅硬如石。作痞塊。身面俱黃。肚腹脹大。

針砂　四兩。煆紅。淬七次　使君子肉　三稜各二兩

草烏一兩去皮醋煮　南木香　皂礬煆紅

鷄肫皮各二兩炒　蝦蟇蛆　薑黃各二兩　五錢

右爲末。以練樹皮煎湯爲丸。如菜荳大。量兒大小。或三四五六分。臨睡。苦茶下。

運脾飲　治小兒飲食所傷。腹中作痛。脾氣不調。

香附　蘿蔔子　陳皮　山查各六分

廣木香　白朮　青皮　丁香各四分

生薑二片。不拘時。溫服。

驚風門

夫風一也。在大人則爲中風。在小兒則爲驚風。大人無驚故名之曰中。小兒易驚且易惹風。故以驚名而兼乎風也。驚之有慢急猶風之中腑中臟。急驚與中腑同謂之陽症。而症俱在表。慢驚與中臟同謂之陰症。而症俱在裏。治者能辨其陰陽表裏而治之。斯可以無悞矣。蓋急驚之症。其身常熱。其眼常開。手足直跳。頭項強直。痰涎壅盛。啼哭泣頻。燥不寧者是也。慢驚之症。身常不熱。半開半閉。精神倦怠。形體若呆。大便或溏者是也。又有慢脾風者。虎口紋青紫色。或黑色。隱隱相雜。似出而不出。手足不動。遍身皆冷。兩眼常合不能啼哭。症若至此。無復救矣。慢驚病根固有淺深。而亦可以施治於萬一之中。若因急驚而變慢驚。或因慢驚而成慢脾。或因吐瀉而致慢脾。則不治矣。大抵驚屬於心。風屬於肝。心火動則振跳而不可遏。肝氣發故搐掣而不自持。二經相助其勢必盛。心火有餘則火熾而風益猛。是風從火出也。肝有餘則風在而火益旺。是火從風熾也。風火齊發。故可畏。此特以急驚

言之耳而慢驚慢脾又兼脾虛與寒勢若稍緩而及深焉然以其病之可生可死而細分之則各有所屬非謂止於心肝二經而不入於他經也是故不時吊眼者驚入於肝夢中咬牙者驚入於腎夜啼至晓者驚入於小腸喉中如鋸者驚入於大腸面青下白驚入於膽氣喘吸水者驚入於脾不時乾嘔者驚入於胃睡中驚哭者患在三焦此皆可以生之症也至若爪黑者為肝絶瀉黑血者為心絶日多盜汗者為胃絶忽作啞聲為肺絶咬人者為骨絶眼半開半合者為腎絶日鼻乾黑者為脾絶驚風慢脾風垂危者一九立得生耶

立方

秘寶萬靈丹　治急慢驚風患此七絶其兒何能愈

牛黃　硃砂　礞石　硝煆　蛇含石　各五錢煆醋淬
禮鑞　全蝎　膽星　半夏薑製
茯神　各一兩　麝香三錢　金箔　銀箔　各八片
皂角　麥門冬　各一兩五錢煎膏

右為末以皂角刺炙黃為丸如櫻桃大金箔為衣每服一丸薑湯化下

鎮驚丹　治急慢驚風發喘痰盛或咳嗽并痰迷心竅不能言語

南星薑汁炒　防風　枳實麥麩炒　天麻甘草水浸焙　半夏薑製　桔梗各二兩四錢　生大黃　礞石用生各一兩　熟大黃九蒸九曬　辰砂　雄黃各四錢　巴豆霜去油淨二錢

右為末蜜丸如粟米大量小兒大小或三四分薑湯下

抱龍丸　治驚風發搐或風痰身熱

膽星　琥珀　雄黃　硃砂各五錢　天竺黃　全蠍各十六錢　麝香一錢　甘草二兩煎膏

右為末甘草膏為丸如芡實大每服一丸薑湯化下

保嬰秘効散　治急慢驚風或胎驚臍風撮口天吊夜啼奇症異症

牛黃一錢　膽星　琥珀　珍珠各一錢五分

滑石　茯神　遠志各二錢　麝香
硃砂各六分　大黃九烝九曬五錢
右爲末量兒大小四五分燈心湯調下。
聚寶丹　治慢脾風神效
人參五錢　白茯苓　琥珀　天麻
膽星　防風各八錢　全蝎三錢　殭蠶
白附子　烏稍蛇　硃砂各二錢　麝香一錢
右爲末蜜丸如芡實大每服一丸薑湯化下。
至寶湯　治一切驚風等症。

天麻　膽星
殭蠶　鉤藤
甘草一分
生薑二片不拘時煎服。

白附子　陳皮各五分
白朮　白茯苓各三分

痢積門
小兒痢症大抵多是過食甘甜膠臟之物停積於脾不能消化則變而爲痢痢者甘也脾喜甘而凡屬於甘者其味皆屬於脾從病從甘故名曰痢其症身體常熱形容黃瘦小便如泔肚腹膨脹毛髮黃腫臟多

白甲。惡心欲吐。飲食不爲肌膚。或頭面頭上多生瘡癢而疳之大槩有如此者。此脾之症也。脾先受病傳於他臟。故有五疳之名焉。在心則爲驚疳。在肝則爲風疳。在脾則爲滾疳。在肺則爲氣疳。在腎則爲急疳。五疳分屬五臟而其爲病亦未盡同。悉而言之。則渾身壯熱。四肢無力。面黃臉赤。怕寒愛煖。口臭乾燥者。因驚撲而成。所謂驚疳是也。搥頭揉鼻。白膜縵眼。指磨多淚。面有青色。體渾癢癬。毛髮焦豎者。因感風而成。所謂風疳是也。食物難消。愛食泥土。腹大有筋。頭髮稀疎。喘息呵欠。無歇欲啼。痢多酸臭者。因傷食而成。所謂滾疳是也。多啼嗽逆。鼻頭生瘡。昏昏愛睡。體瘦腸滑。四肢軟弱。面色帶白。瀉膿吐血者。因傷氣而成。所謂氣疳是也。瀉痢兼作。吐逆脫肛。身體壯熱。手足偏冷。飲食不進者。病勢已急。所謂急疳是也。五疳之症。惟急疳爲難療。以其腎氣不足。土來尅水故也。要而言之。總歸於脾。脾土一虛。則不能攝五臟之氣。故其傳變至於如此耳。

立方

保命丹　治諸般疳積神効

大蟬二十隻剖開砂仁胡黃連各五錢
皂角二挍煆存性
使君子肉一兩

右爲末以神麴打糊爲丸如粟米大每服一二錢薑湯下

肥兒丸　治疳積肌肉消瘦肚大筋青飲食不思或泄瀉口渴

黑蟬以大者不拘幾隻放深缸中取黨坑內蛆一淘淨倒其缸內任從自食待五日瀉出黨水取起倒掛陰乾兩

人參一兩　白朮　砂仁　使君子肉
山查肉各一兩　宣黃連　胡黃連
五錢
白茯苓　蘆薈　蓮子各八錢

右爲末陳米糊爲丸每服一二錢米飲化下

雞肉丸　治疳瘠壯熱形體羸瘦眼閉不開四肢漸小肚腹漸大

黃連薑炒　柴胡　鶴虱　秦艽
知母酒炒　黃芩酒炒　使君子炒　蘆薈各一兩

蕪荑 五錢

共爲末用黃雌鷄一隻以大蒜子餌之七日溫炙去毛淨尾上開一孔取腸洗淨拭乾入前藥末於內縫密以小甑先用黑荳鋪底安鷄上又以黑豆蓋之厚三寸蚤晨蒸至晚後冷去骨搗爛爲丸如乾加酒少許丸如麻子大每服十丸五歲二十丸量兒大小加之白湯下。

鷄肝散 治宿積眼目不明翳膜腫瞖

雄鷄肝一具 威靈仙 白土 各二錢爲末。

即打來光粉

右鷄肝同上一未煮熟只食肝每日一個七個全愈

瘧疾門

小兒瘧疾不外乎風痰與食無食不發熱無風不作寒而痰食風之所成也外感風寒則手太陰肺經先病肺主皮毛故風易入內傷飲食則足太陰脾經先病脾受有形故食多則傷脾也肺氣不清則生痰脾主受傷則聚痰故痰者風食之所成也無痰則不成瘧故寒熱作焉要而言之風雖屬肺食雖屬脾而風食之所藏又近於膽經寒熱蓋膽經爲足之少

陽。其位在半表半裏。是以寒熱往來也。大率寒多則爲風熱多則爲食寒熱相半則風食俱多治此病者。惟消食疎風化痰而已。然消食必兼疎風疎風必兼消食而消食疎風必兼化痰蓋三者不全則不能成瘧故宜兼用但量其所屬輕重可也

立方

疏脾飲　治小兒因風成瘧

紫蘇　柴胡　半夏各一錢　防風

青皮　厚朴　川芎各五分

生薑三片。不拘時熱服。

檳陳飲　治小兒因食成瘧

山查　青皮　草菓各八分　檳榔

枳實　半夏　柴胡　麥芽各六分

生薑三片。空心煎服。

平妥飲　治小兒痰瘧來時作嘔。

半夏　貝母　橘紅　柴胡各七分

黃芩　草菓　白朮　枳殼各五分

生薑三片。不拘時熱服。

驚甲飲　治小兒久瘧不止。

何首烏　驚甲　酒炙　當歸　白朮

人參　黃芩　各八分

黑棗三枚　空心煎服。

痢疾門

凡瀉在脾而痢在腎。故先瀉而後痢者。則曰腎傳脾。爲微邪。其病難愈。先痢而後瀉者。則曰脾傳腎。爲賊邪。其病易愈。此前人之說也。以愚論之。瀉爲在脾不假言矣。而謂痢爲在腎。不能無議焉。瀉固多由於飲食。而痢獨非飲食之所傷乎。飲食停積。因濕熱而化。遂爲稠濁。膠固於腸胃之中。欲下不下。是以有裏急後重之苦。明是脾經之病矣。而顧以痢屬於腎者何。所謂蛾吾未聞飲食之入。不由於脾。而反由於腎也。太緊謂之腎病。矣然治痢之藥。悉用蒼朮厚朴黃連木香白朮陳皮之類。並未有用杜仲黃柏牛膝地黃補腎等藥治腎之疾。而乃用脾家之劑。必其非腎病故也。要之先痢後瀉者。以其積滯已盡。而脾尚虛也。豈腎傳脾之謂耶。先瀉後痢而難愈者。以脾

土已壞而積滯方壅也豈脾傳腎之謂耶腎能藏精不能藏飲食若以痢屬於腎則飲食皆藏於腎矣豈理也哉大約治痢之法與大人無異但下痢純血者大人則爲難治在小兒則爲食積而無所殆而治在小兒之痢又宜多以消積爲主其詳具大人痢疾門不復細贅耳

立方

通快飲　治小兒痢疾始發

山查一錢　麥芽　蒼术　萊菔子

枳實　木通各七分　大黃　檳榔各一錢二分

生薑三片不拘時熱服

金寶散　治小兒赤白痢疾肚腹作痛裏急後重

廣木香　黃連酒炒　陳皮各三　肉豆蔻麵包煨

厚朴炒　車前子各二錢　白术

山查　蒼术各一錢

右爲末每服一錢至半分空心燈心湯調下

歸芍飲　治小兒痢疾久不肯住

人參　白术　白芍　白茯苓

柯子肉　各五分　烏梅半箇　黃連
厚朴　肉荳蔻　柴胡　各六分
黑棗二枚　空心煎服

傷風門

傷風之症頭疼身熱。鼻塞氣窒噴嚏呵欠。呻吟不絕。見風便怕。灑淅微寒。與大人傷風無異。若挾食即吐。挾痰即吐痰。藥劑比大人所服者宜減一半。不論有痰有食否。常須兼用清痰消食之藥。蓋小兒易傷食而熟則生痰。故劑中宜畧用輕輕疎解。令汗微出。不宜過多。過多則真元亦傷。是伐無過之地也。

立方

柴葛飲　治小兒傷風頭疼發熱。鼻流清涕。

紫蘇　乾葛　前胡　柴胡　各七分
防風　半夏　陳皮　甘草　各五分

葱白三莖生薑三片煎服。

保幼湯　治小兒胃風嘔吐頭疼身熱。

羌活　山查　紫蘇　各一錢二分
藿香　柴胡　桔梗　各八分

生薑五片煎服

咳嗽門

小兒咳嗽風熱居多而寒者間或有之以其爲純陽之體其氣常熱而不甚寒也凡肌肉肥白者易於惹風赤而堅實者易於感熱惟虛弱瘦損面青不澤乃易感寒焉感風而嗽者必鼻塞氣麤多涕多淚或發熱多痰是也感熱而嗽者無鼻塞氣麤之症惟口中覺熱舌燥煩渴面赤頓嗽而有濃痰是也感寒而嗽者灑淅惡寒哮喘不寧至冬月即發是也凡此症與大人無異而所感畧有不同大人兼七情所傷或任勞嗜酒而小兒無是是以不能無少異耳藥劑輕清爲佳而服藥亦不宜太驟當逐時進之不必盡劑

立方

平肺飲　治感風邪咳嗽痰多灑淅惡寒

陳皮　前胡　桑皮　薄荷

防風　各五分　瓜蔞仁　蘇子　桔梗各四分

生薑三片煎服

涼肺湯　治肺熱咳嗽。痰盛音啞。

黃芩　貝母　天花粉　枳殼　各七分
橘紅　山梔　桔梗　麥門冬
甘草　各五分

燈心三十莖。食遠服。

定嗽湯　治小兒肺有寒痰。咳嗽并作氣喘。

款冬花　杏仁　橘紅　各八分
桔梗　枳實　各六分　瓜蔞仁　膽星　各五分

生薑三片。不拘時煎服。

八卦部位舉症圖




中央戊己土。疎黃無辛苦。若見紫黑色便是木來剋。

八卦舉症歌

乾宮屬大腸稠密背受殃糞門多癢瘍宜服保元湯
坎宮屬腎水稠密陰亦起腎腧似火燒七日歸泉裏
艮宮屬腎經梅花甚不仁若加紫黑色八日落牙根
震宮乃肝木宜大不宜小如品如串樣十四日歸山
巽宮屬小腸稀疎宜帶貫若還梅品赤淋閉還不効
離宮屬心火譏形甚不可四肢不容卻遍身無你我
坤宮屬命門生炙在其中稠密終不好疎朗亦無凶
兌宮屬肺金更多我不驚若還無容地智背反相因

耳紋看法一見吉凶皆知

耳紋圖



歌曰

耳後筋紋淡淡紅疎疎磊磊決無凶若然紫裏青白色任是軒岐枉費功
耳後紅筋赤一條又無枝葉上面高將來必主心經痘頭面若稀不必憂
耳邊紫黑魚刺形紛紛却向裏邊行將來必主肝經

痘滿身班黑八朝冝
耳後蒼筋痘主稀頭大尾尖人不知將來必主脾經
痘向外排行疎更奇
耳後淡白亂如蘇紛紛俱往外頭爬將來必主脾經
痘形如蠶種七朝嗟
痘參忌觸十四款
腋下狐臭氣溝渠濁惡氣房中淫液氣婦人經候氣
諸瘕白腥氣酒醉葷腥氣硫黃毒藥氣麝香臊穢氣
痰汗柔濕氣悞燒頭髮氣魚骨腥臭氣葱蒜韭韮氣

亨煎油膩氣坑廁尿糞氣
治痘總論秘訣
痘之發與雜症不同雜症只在一經痘則五臟之症
俱見古云似傷寒者亦太槩言也寒由外入痘自裏
出故惡寒無汗頭痛脊強左額青紋面色慘而不舒
此傷寒之所有而痘症之所無也雨眼含淚臭氣出
龍睡中微驚耳紋現惡熱不惡寒此痘症之所有而
傷寒之所無也五臟症已詳
凡初熟時睡中微泽臭氣出龍斯二者僅可作痘症

驗有云中指獨冷耳凡冷等說不必信

痘者苗也肖其形則生不肖其形則死形之不肖元神竭矣尖圓而凸周淨而聳形之有神者也如麩如沸如疹如齊如蠶種如蛇皮如蚊跡如蚤斑如湯泡如火刺形之無神者也形而無神可畫生乎至如色也欲如春花之在露不欲如秋草之經霜紅白兩分明潤光活色之有彩者也如膩粉如枯骨如紅米飯如豬肝色色之無彩者也形不有神色不現彩生意可知矣嗚呼神彩其生死之門戶也

凡看痘先看元氣痘兒元氣非有非無唯心領意會耳已如形色初善而終變惡惡者元氣內竭也形色初善者必求本

人知痘藉氣血不知痘之所藉尤有超於氣血者元氣是也蓋元氣盛則氣血流通而領遂有貫徹並行祛毒痘必應期而開落元氣一虧則在外者內不續在內者外不固毒肆妄行或出或入而為外剝內攻矣調養眞元補益氣血誠治痘完策不得已而欲攻

他症中病即已經日常毒治病十去其九
十去其九
夫包血成圓者氣也氣能拘血制毒則瘡窠必圓尖而周淨附氣成暈者血也血能附氣制毒則瘡暈必光明而紅活頂陷者氣之虛塌陷者氣之離暈枯者血之虛根散者血之離圓也暈也氣血之所爲也而所以成圓成暈者氣血不得專生也
根窠者血之暈膿者血之腐故六日之前專看根窠無根窠必不貫膿六日以後專看膿色無膿色必難收屬此理也勢也

無形者依有形有形者附無形互相依附固天地之道亦氣血之道也氣之離不出血之散乎故自氣血交後常觀根窠為憑準麤緊紅活生意沛然若微細而不現不斂且黯淡則氣將飛去而必不克制毒矣是故內攻根散者死內攻而根血猶附非毒作楚必三因致之頂白根紅氣血分也在四五日間不分則後必作癢頂冲根附氣血支也在六七日不交則後必有變至是而根白地清起發勃勃可不藥而愈若

深紅壯熱疔將作也四日用清六日用補乃治常法

纏睪

氣血有常而不能自虧於常然亦有盈者何也毒壅於氣火搏於血耳班者血有餘也泡者氣多甚也經曰邪氣甚則實精眞氣奪則虛凡形色大惡氣血不交藥不成似爲久症若精神爽朗便食如故而天庭上有一二顆悅目者猶可發舊作臭爛而愈何者毒在外不在內故也毒停肌肉則發腫毒滯皮膚則作臭肌肉陽明主之屬土皮膚太陰主之屬金癰腫土象腥臭參金亦各從其類也

青謂紅班生紫班者死黑班藍班百不救一亦有紅死而紫班藍班得生者班血熟也失於解利則發班惡瘡班出勢所必然無論顏色但天庭疎朗形色善而班出又當別論昔一班症諸醫莫治召予視之已七日矣班分上中下上紅班中紫班下青班視其瘡則綻凸疎朗內含清水色雖黑而精神爽健視脣舌則多苔燥予曰失解故也進

以清涼自愈後果然由是書不可拘也察形色驗唇舌是準疔之結也亦孰毒壅甚失於解利內不能入而結隨道空隙之所惡瘡疔結逆轉為順矣但結前後心者死結耳門喉下者死辨疔有法愼無以黑毒作疔黑瘡猶瘡也疔則陷入肉中形如螺蓋揑之有核割不知痛其白根或長寸許醫多誤認醫後疔爛生肌散治之

瘡之所特者血為養而氣為充也故眼臭必欲封合眼合則神不馳臭封則氣不逐神氣內榮而毒不為

制伏者鮮矣抑又有徵甚壅而竅外乾黑者死封而有淚生之兆也眼封而沿眶浮腫者死眼封當在五六日間若未腫過而封後必有眼疾瘡少者不封或封而纔厭即退

氣血之分猶清濁之本乎上下也氣血之交猶陰陽之互為依附也當分不分毒結之當交不交毒隔之知升陽散鬱何不分之患知清熱解毒何不交之患瘡之形症有四日毒壅日血熱日氣虛日血虛又虛實有四表裏虛實是也見黯稠密形不尖聳色慘黯

而皮間欲出不出此毒壅也見點深紅而漸變紫黑
夾雜夾斑血熱也頂陷皮薄平塌不振者氣虛也色
淡根散或瘐色與肉色無異血虛也身微熱而有汗
日表虛壯熱無汗喘促面浮皮毛焦肌膚痛表實也
精神困倦脣舌淡白日裏虛狂亂氣甚渴飲善食脣
燥而舌見黃白苔者裏實也毒壅也血熱也同爲表
裏之實血虛也氣虛也同爲表裏之虛此又一而二
二而一者也壅者疎之熱者涼之虛者補之實者瀉
之不實不虛以平調之明此八者思過半矣雖然辨

寒熱虛實尤當用舌作綱領
大都症候相似氣運使然也彼與此一般症狀無殊
非氣運而何故乾溼者火鬱勝吐瀉而肉腫者土鬱
勝枯燥喘促金鬱勝彼此疑伏水鬱勝鬱而不出木
鬱勝火則清之土則平之金則潤之水則温之木則
發之書云責之於症求之於經其此之謂乎
諒形體用藥上工也小兒臟腑易虛易實體實劑過
猶爲之損況弱乎凡瘡極光澤極榮灌至回潰日而
忽變逆誰之咎歟形體素虛理宜補益不察而愛行

攻劫使入元氣一驅而出外雖榮潅內實耗盡欲不
死者得乎誠形體者非泥於形而審形形之神也痘
陷有五有白陷有灰陷有紫陷有黑陷皆責
氣虛而後人責以用補誤矣彼之論陷有深究其源
脣舌滋潤身不壯熱唯痘色遷變而陷故責以氣虛
若唇燥舌苔壯熱燎人焦紫其色而四陷不起果虛
乎抑毒耶妄執補益猶按圖索驥耳予治陷不然有
外實則解之有內實則清之正之內外無症則平劑
以調之不惟治陷即始終亦然藥隨舌轉症由舌痊

嗚呼舌之功大矣哉
舌通五內人知之而莫之用不由指示臨局必迷軌
知此乃用藥樞紐也藥有寒者涼者溫者熱者於之
樞紐在手則縱橫顛倒一自我出而是非利害皆
置勿論且易虛易實小兒也使無定見而謂不狂入
命吾未知前信
治痘有四節次務要不紊紊則氣血顛倒火毒肆虐
而諸症蜂作矣故驚者狂者吐者瀉者斑者疹者腰
疼腹痛者肉腫痘不腫者水喉錯喉者皆當發不發

毒鬱二焦停滯氣道也焦紫者枯黑者渴者燥者發疔毒者胃爛口臭者皆當清不清陽明內熱所致當補不補則爲白陷爲泄瀉爲蓐瘡爲倒靨外剝內攻中氣虛也

當滲泄不滲泄則反壯熱或少食或瀉不止或肌肉作痒蒲而疱爛何者脾濕內淫也

標離而異本合而同藥當其節變症息矣不應四法必三因乘之六氣外襲爲外因驚恐內動爲內因調攝失宜爲不內外因四法正也三因奇也奇正互用兩得之矣

治瘡症不治雜症萬古秘論也雜症有日瘡症止兩七耳且瘡中之症緣失治而作今猶治症不治瘡將症愈甚而瘡愈憊矣

發熱三日訣

夫疽不熟不發猶五穀之不熟不結身有熱也乃毒與時氣相觸而動內傳百脉外注皮膚症未見而先兆此乃必至者但熱有輕重毒輕則熱輕毒重則熱重又有熱五六日出者有熱一日即出者太過則正

不勝邪欲期則氣血凝滯唯三四日身涼痘出爲正
凡發熱肌膚温平潮潤脣舌滋潔無聲音清亮睡中微驚便食如故或少食貪睡皆吉兆也重則反是
一發熱即脣裂舌坑煩躁狂亂口渴惡寒兩耳灼熱兩睛紅一便結方內加玄明粉或千里馬下之惡熱者暫下以善爲增減不可拘在初熱當發之說此亦百中之一二又毋執以爲常如脣舌滋潤雖見惡症切不可妄下損人
發熱時腹疼腰痛四肢酸痛皆重症若表過痛止者吉痛加甚者凶
發熱吐瀉切不可行止法惟吐瀉酸臭可加消導藥佐之是傷食也驚發症前陰陽被陰冲則雍遏之患息故吉照前加減治之毋服驚藥誤服而米其毒釀害匪淺亦有一驚即死此必中惡
發熱時譫語顛狂見神見鬼躁亂不寧是熱甚失表外邪內毒兩相搏激也重發之則愈舌見黃苔非下不可

凡臟腑鬱毒非微汗則不解故一發熱必用汗藥也
身熱四五日不退者知毒猶在內務要熱退爲佳
身熱四五日不退痘影焦紫黯黯不出此必實之氣外
鬱閉塞鬼門也今服驚蟄丸發出臭汗則熱自退痘
自出也
一發熱頭面中有大痘數點餘不出復不除熱此名
曰報痘急用銀針刺破不去則潰敗正氣爲留連之
禍
初發熱即頭温足冷不渴大便溏面皎白或瀉痢清
穀嘔食不化虛症也
凡熱時燈照肉內有隱隱紫紅塊者重而紅脣白亦
重再加形色不善死必矣九竅流血者死目閉無氣
舌黑聲嘎胸高而凸掌文出血皆死症不治
見點三日訣
見點三日炎生判矣斷於此時方稱高列關竅唯面
部爲喫緊面者諸會之首天庭印堂尤面部最緊要
者天庭爲看痘把柄何者元神所歸也元神者元氣
也小兒出痘不過氣血毒三字氣血又元氣所統也

元氣勝毒開落應期毒勝元氣內攻外剝毒既勝矣
又安望元氣之復勝哉故此處先見先起先潰先靨
密而癢慘而黯皆死症也毒從虛發信矣哉
凡見點蔕落摸得礙手色潤澤眼部以下先見身熱
漸退吉症也蔕落礙手稀而有神者也色潤澤謂有
彩也天庭後見元氣固也反是者逆
痘初出時三五相連者後必密簇見者稀毒之淺深
於此預見矣
形屬氣色屬血兩者均可驗吉凶決生死人何專言

血而不及氣氣無形難知血有色易見故見點三日
色如猪肝者死如紅米飯者死如洗過舊紅紬者太
重雖然面部上有數十顆有神彩者亦可救活不慮
形惡慮無神不慮色惡慮無彩神綻而凸彩潤而明
惡痘中見有一二紅活可愛雖凶亦吉何者元氣猶
存也大都自眉以上幾點悅目可愛又不瑣屑又不
歪斜雖遍體稠密雜症百出終不至於死悅目二字
即予筆古難盡詮在學者自會
見點頭焦面色或紫者血分毒熾也滿天秋治之屑

燥舌苔熱見愁黃苔超者子里馬蓋焦紫雖血熱而未必不由內熱也審之以舌察斯當矣

見點白如氷珠者重若稀疎不密其入乎素色黃而兼痘起發氣至而血不至也宜與散火倘神不內寧痘日增多頭尖作形毒太甚也恐非藥可愈矣

若見點色白不紅不可便作寒治白而無神唇舌淡白或吐或瀉虛症也若白而起皺色唇舌赤紅非虛也是伏火痘也三日後必漸變紅紫倘作虛治其誤入不淺見點脚氷冷者不必盧氣未下行也

見點兩日而大便尚秘舌上無苔知是血燥非毒壅也急行清解枳殼玄明粉治之恐貫時咽痛作瀉而不起方內歸芎宜倍用

初見時大小不一有色點如疹者日夾疹救苦丹治之又一等瓊屑紅點隱隱肉間日夾痧治亦同前丹症亦然但有此症必正痘悅目可愛方為痧疹之夾不然皆痘也識者詳辨之

又有痘出數顆而來疹遍身圓淨疎朗顏色紅活現一兩日而盡沒衆醫莫不驚愕予曰疹也非痘也痘沒

必悶亂煩燥此則寧靜且正瘟依然予故知其爲疹也治以平劑後漸愈未沒特亦難辨焉

點見身熱毒未盡也但所感不同有寒氣外鬱者有熱毒內鬱者兩者均且散之救苦丹是其治也內鬱黃苔加千皇馬其色漸焦紫隱隱不出而身熱壯盛或肌膚腫亮再加賽春雷發之

見點自汗有生者有死者丹溪謂自汗無妨指形色蓋言者也若汗出而形色日變必死不可不辨但治症不須以此慮虛症也又須看舌用藥

凡瘟出不快須審時令藥之冬則寒鬱主賽春雷夏則熱鬱主滿天秋然亦有虛實之別屑舌滋潤無苔當從虛治

一見點色白不甚起發屑舌淡白或吐或瀉或腹脇或自汗肢冷神氣怯弱表裏虛也治從虛例

一見點在臂在肛門四圍成堆者皆重症

一出數點即發數粒山根上者重纔出而聲遂變或焦或啞者尤重

瘟出數點而面目即光亮如爪甲口中氣臭勃勃衝人

其疹甚速後必發斑吐血而歿

一見黙先於眉上或兩太陽出數粒突起光亮少頃即沒此賦痘也必疹又有初出愛入皮薄光亮一兩日即大長是未至而又有初出愛入皮薄光亮一兩日即大長是未至而至癘氣使然也後必變癆塌而歿認爲順症則醫殺之諸斷乎難免

凡患諸瘡毒未愈而見黙於此者重此陽毒也但瘡不乾紅雖重決不歿

謂爲於可爲之時則從爲於不可爲之時則凶指險症也至見黙如蛇皮如鱉穗蚊跡蚤斑湯泡火刺青黑藍斑身如被灰發斑而脣腫口臭瞶瞶蒙頭斷腰無根色粉白如枯骨胃高氣喘七孔流血面斜視如橘皮形色不正而驚狂併腰疼腹痛不止可爲乎不可爲乎

凡謂斷腰無根必諸痘形色不善如形色圓滑即腰脚無痘何妨

起脹三日訣

曰起脹是黙已定毒氣盡出時也本乎上者上之本

乎下者下之氣血定位毒被制伏成膿矣若白不泛
頂紅不斂窠氣血毒混而爲一元氣弱也苟能察形
色駿脣舌如轉柁迴流一持而正後段如破竹矣
凡疽三日先見者先起脹後見者後起脹根紅頂白
面與目漸浮腫鼻塞流涕口角涎出而眼蒙不欲開
順候也即不然而兩腮間有一二起脹悅目頂白根
紅亦順候也
凡起脹時色焦紫者毒甚也形大皮薄而起縐紋者
毒甚氣虛也滿頂紅者血滯也滯者活之焦者清之
氣虛毒甚補而兼解散之但面部有一二悅目可愛
用藥當節則枯者潤薄者厚而生意自勃勃矣
起脹時諸症未起而其中先有起處六色如黃金者
各曰賊脹症至五日而內外症平宜詼起發退紅
若不起發不退紅正氣虛也方內倍人參加黃芪古
人以此爲喚漿法
當起脹時有一等光活可愛嬌嫩艷觀手捺之則破
燈照如琉璃此假脹又名空歡喜急救表或可幸治
遲則必癢塌而死

又四日起大塊亦非吉兆何者表虛毒甚也七日後腫退創靨皆此之變遇此須分虛實預防之

又有一等至五七日而即帶黃色假漿也不信請以神彩辨之有神有彩者爲眞漿此則無也或補或瀉唯舌是準

起脹時瘡上有小孔不黑不白曰蛀瘡用保元湯加丁桂服之其孔一一密其瘡自起

瘡出五六日眼不對鼻不塞而大孔時下氣者逆也輕瘡無妨

大都瘡出五六日氣血不分顏色焦紫面紅腫如瓜而瘡伏或猶烟雲罩定或舌白至唇濕處者曰內潰或遍身發紫泡或悶亂不寧吁哭不已腰腹猶痛皆必死也雖然亦有形色本善調理失宜而然者又有誤餌湯藥而致者

貫膿三日訣

瘡出七日陰中之陽盡付於外內則空虛如釜中甑內之氣妙不可言陽起一分陰亦長一分故其漿也則宜漸而黃根下血暈亦宜漸而緊如線圍定不鋪

散不灰黯晝夜痛楚飲食倍常大便少身微熱吉症也反是者逆至是欲決生死唯視血暈聚散膿色眞僞耳眞者寶色燁燁手捻粘絲僞則土黃也聚者氣拘血而化毒也散則氣虛散而眞氣將竭血暈全無者必膿者毒所化也訣曰六日以後專看膿色故膿有者生無膿者必使或有或無而脚根不紅或連肉灰紅作癢煩燥目閉復開作瀉乾嘔不食少睡氣虛不能拘血化毒也急峻補之倘此時尚見黑昔有刺生意絶矣不唯不咎補卽補之何益

漿行七日腫要過頸將水要過胷胸者毒外出也言過胸者從上下也至陽物亦要貫乃宗筋之會也兩脚不貫不妨又兩臂亦宜滿不然臨收時必不食而生他變手臂脾所主也

瘡出七日或大瀉者氣陷也急補澁之若漿色正而根血一線緊緊繞定雖瀉無妨漿色不正血散不歛毒在內也七日毒尚在如命何

若正瘡依然根暈紅活精神飲食清健而瀉此陽症也不妨但看舌用兼止之藥而愈

至八九日漿行似足忽眼開而陷毒內攻也內攻者必悶亂煩燥根暈飛散若無是而唇舌潔淨方內加桂附治之唇燥舌赤內加連苓解毒治之有一等至八日充灌飽滿撲摸不破而刖破無膿毒陷伏也不可作順瘡誤入服賽春雷是正法也若數服而猶硬無膿根暈不活生意可知矣然此必神不內寧若神寧瘡少不必藥治

貫膿時作癢十常六七並準以唇舌藥之但爬破成玩者或乾而無采者皆不治

瘡行漿作痛火熱也亦吉兆也丹溪曰諸痛爲實是氣滯作痛方內加枳殼山查治之血熱作痛方內加芍藥生地治之

八九日寒戰咬牙虛極也唯峻補而已此外無法若頭搖牙顫目閉無神者不治

又八九日有等半黃而硬者往往作正漿且之不知此爲陰陽失政致漿注於中板膩收塞而黃硬也俗呼曰板黃瘡須急瀉舌治之古有曰珠不在天在乎體之明漿不在足在乎色之正土黃者黃而無彩者

也。又有貫膿充足至九日大便忽欲去不去陽明血燥也方內倍加當歸以潤之不治則靨落之後非滯下必乾熟而死。

灌膿發泡氣過甚也本方加白朮茯苓滲利之擦破水出而不能包者敗草散揜之八九日最忌皮薄漿清皮薄則嫩而易破漿清則水而不膿晝日漿假毒成毒從漿化若此而幸成者未之有也凡皮薄漿清至九日而躁亂不寧生死可隔壁斷矣周歲半歲者又不必至九日若七日便蹬打不定指破不乾萬不救。何者痘以七日爲界七日以前氣血外行七日以後氣血內入外行時尚不欲畜毒矧內入時乎故七日後躁亂者毒攻也毒攻內者必死。

凡灌膿時額上如湯泡皮肉盡赤而乾者死諸痘纔貫而兩脣先黃硬者死擦破無膿血者死擦破而瘡痕隱然有生意者穢觸也不當作死症論。

結靨三日訣

痘至十日毒解矣膿亦轉黃作蒼蠟色元氣實者痂

必循次而結如口角與陽物先結正收也身漸輕快腫漸消解眼矇矇而欲開食倍常便如故從上至下而收結痂厚色紅大事畢矣不然猶未可以爲喜結痂時忽忽發熱者蒸蒸作膿也不必慮

凡一時痂盡一時痂即落者毒火爍也急解之此症必膿未充足若聲啞煩悶喘促不食死期迫矣否則必發癰毒而解

瘡至十日正收膿之期膿而不膿非氣虛必血熱也氣虛方內加參芪丁桂治之血熱方內加芩連解毒治之氣虛血熱脣舌紅不紅辨之也亦有時令致然者時之寒也用温劑以飲之時之熱也用涼劑以清之

凡不及期眼開者重輕症不拘又過期眼不開者亦重十二日眼開期矣

當結膿時渴飲無休津液竭矣方內加生脉散主之若渴甚而下瀉尤重者爲難治凡治渴切忌利小便便愈利而渴愈甚矣

十日九日半痂半不痂作瀉者不必慮乃陽氣內回

非膏膿時比也方內倍白朮茯苓治之切忌澀劑倘不知誤用後必不食而作痢

十二十三日有形如火燒烟薰者生死最決若音不清食不入破處乾枯煩亂不寐死症也音清能食睡臥安寧爬破滋滴神氣爽生症也又當分虛實治

唇舌潔淨溫補兼清解之唇燥舌苔單解之解而苔去繼以平和則攻補兩盡矣

凡當膿時而流漿不已為過表故也然亦有飲水霑濕致然者兩者皆方內倍白朮茯苓加防蒼燥之或

腐爛而和皮脫去者倒膿也方內加人參丁桂主之破者復灌消者復腫空虛復出一層治功也俗呼曰翻空瘡逆症有此大吉也膿後腮紅唇乾面色帶紫者肺癰將作也連翹飲治之桔梗知母百合麥冬宜常服

瘡至結膿未及結痂時必定作氣息者築腥臭者雀尸臭者死全無氣息知有餘毒也須解之

額與足遲膿者獨陰獨陽也額與足先膿者重反陰背陽也當膿之時凡見腹脹氣喘咽爛不食或唇白

至宮泄瀉悶亂昏沉不省作坑尸臭目中無神寒戰
噤牙手足搐動皆死症也間有二三不死亦幸活耳

落痂餘毒訣

痘至落痂一大事工案了手矣予尚有言否曰是何
言也末路難特功虧一簣正此之謂也如痂久不脫
或堆如雞屎薄如竹膜泡發丹纏癰腫疔潰或疹或
痲或嘔吐作渴或赤白痢或虛煩不眠坐立
微顫唇不蓋齒咽啞腹痛或熱或發癢而形色粉紅
非險乎又如破而不貫坑陷乾枯驚搐無覓走馬牙
疳目暗昏白或胃高而喘戰掉不休疤痕之色皆粉
白不紅非逆乎且氣血初定相火易煽即靨後疤紅
而不禁辛熱猶致目疾不避風寒猶發瘡瘍不節飲
食猶成吐痢諸症子何以無事目之
靨漸結漸落色明而厚順也或粘肉不脫或嵌入肉
中或半粘半揭或痂半有永或薄如竹膜色煤黑者
險也有虛實寒熱實而熱者連翹飲主之虛而寒者
方內加參芪肉桂治之治癍色亦然紫紅者實也粉
紅者虛也粉白者氣血衰服藥不轉者死

瘡後癰毒非瘡之過乃醫之過也當發不發則成癰不當補而補則成癰癰者壅也元氣內實毒不能聞故壅腐而出經曰營氣不從逆於內裏則生腫是矣曲池委中三陰交會之地毒多壅此虛故也然有實者有虛者形體怯弱食少微熱腫處不痛虛也形體壯盛身熱能食痛甚不已實也虛者流氣飲實者連翹飲分並以必勝膏貼之潰而出膿太補湯久不收口者生肌膏塗之凡多癰不食嘔瀉不休睛慢脣白而膿出清水者死醫後病自俗皆謂目中出瘡如果

瘡也胡不見報瘡成膿而遂結痂耶此症亦醫之過也古云熱蘊於肝則目病確言也有赤腫而痛不能開者赤腫涼肝散翳膜涼膈散切忌點藥睛突瞳陷不能治矣瘡初出而即用護眼法為有後患

凡口瘡皆胃熱致之有輕者重者有死不治者滿口白糜或紅點蔟輕症也雷棗丹吹之脣舌腫硬牙齦黑爛成瘡者重也內服甘露飲外吹雷棗丹爛入喉者亦以藥吹之色如乾醬臭爛日甚而臭發紅點者死俗名走馬瘡然此亦醫之過也

瘡後腹痛甚重須分治之傷食和中丸餘毒連翹飲
血虛本方去翹梔加參芪乾薑治之腹痛見舌白者
死元氣竭也
驚發瘡後書云莫救者是目閉無覺更兼吐瀉唇白
肢冷如熱甚小便閉塞或素有驚疾又非不可治者
瘡後出瘡名曰痧蓋瘡落發此吉兆也不可作尋常
痧痲治只消疏風之劑丹與癮疹亦然
瘡後浮腫囊大加蚣毒匿皮膚以連翹飲加腹皮茵
陳主之有加枳殼倍柴胡

立方

三荳湯　治天行時氣廣出瘡瘡自服之出時必少

小赤荳　黑荳　菜荳各五錢　甘草節一錢

水煮熟在鬼食之久服則不出矣

胡荽酒　治瘡瘩初發噴之

胡荽一握酒煎一二沸去渣乳母含口內噴之從頂至顧身足塗擦遍遍滿房門戶灑之

解肌敗毒飲　治瘡瘡初起三日內服

柴胡　防風　獨活　前胡
荊芥各八分　蟬脫　梔梗　薄荷
川芎　紫蘇　紫草各六分
蔥白三莖胡荽一握煎服
鼠粘子湯　治痘疹稠密身熱等症
鼠粘子　當歸　甘草　柴胡
連翹　黃芩　黃芪　地骨皮各等分
水煎不拘時服
人參透肌散　治虛而有熱雖能出快長不齊整隱

於肌膚者
人參　白朮　白茯苓　紫草
當歸　白芍　木通　蟬脫
甘草　糯米各五分
水煎不拘時服
犀角地黃湯　治血熱痘初出太熱太便黑紫或鼻衄小便出血方見傷寒門
保元湯　治痘蓄初出圓暈成形乾紅少潤然淺急服此劑

人參二錢　黃芪　甘草各一錢

水煎不拘時服。

紫草散　治瘡瘡黑陷。氣血虛弱。瘡疹不起。

紫草　甘草　黃耆　糯米各一錢　五分

水煎溫服。

益元散　治瘡疹煩燥作渴。調下二錢。方見傷寒門

流氣飲　治虛而結滯者。

當歸　川芎　赤芍　黃耆

人參各五分　甘草節　廣木香　紫蘇

烏藥各四分　桔梗　厚朴　枳殼各三分

水煎服。

十神解毒湯　治見點三日。身熱等症。

丹皮　紅花　赤芍　川芎

當歸　生地　木通　桔梗

連翹　甘草等分

淡竹葉十片煎服。

生脉散　治氣虛口乾舌燥。方見中暑門

連翹飲　治熱毒蓄內。瘡不肯出齊。

黃芩　黃連　黃柏　山梔仁
大黃　石膏　蟬蛻　牛蒡子
紅花各八分　麻三分
燈心三十莖煎服。舌上無苔去大黃。
和中丸　治瘡後傷食腹痛等症。
陳皮　厚朴　枳殼　麥芽
山查肉各一兩　白茯苓　白朮各一兩
五錢
神麴三兩
右爲末。神麴打糊爲丸。每服二錢。滾白湯下。

醍醐飲　治見標太重。以此托之。
當歸　梔棵　白朮　川芎各一
熟地一錢　桂枝六分
二分
水煎溫服。

大補湯　治毒流臟不止。氣血兩虛。
人參　白朮　白茯苓　草甘
當歸　川芎　白芍　熟地
黃耆　肉桂　白芷　連翹
金銀花各等
分

水煎溫服。

救苦丹　自發熱至見黶多獲其效。四日前壽甚者服。

羌活　防風　升麻　麻黃
生地　吳茱萸　黃芩　連翹　各五分
當歸　黃連　各三錢　川芎　藁本
酒芩　生芩　蒼术　各二錢　細辛
甘草　白术　陳皮　紅花　各一錢

右爲末。蜜丸。龍眼大。每服量人大小加減。煎劑內同服。

滿天秋　自發熱至起脹時。有熱症者。皆可服。

石膏一兩煅　茜草　寒水石　人中白　各三錢
甘草　紅翹　各二錢　鬱金
紫草茸　辰砂　各二錢　五分

右爲末。每服三錢。燈心湯調下。

賽春雷　治紅紫焦枯。或因風寒。疸不起發內熱甚。甚瘡癰不出。自發熱七日前皆可服。

麻黃　紫草　各一兩　甘草　白附子　各五錢

殭蠶　蛇蛻各三錢　穿山甲一錢五分
蟾酥一錢　蜈蚣一條　全蝎八分共炙爲末

右末另以麻黃二兩紫草紅花各一兩酒水各一碗煎去渣再熬成膏入蜜三兩再畧熬同前末搗丸如龍眼大每服一丸燈心湯化下

熱見愁　凡見脣燥舌苔即宜服之

燒人糞一兩　黃芩　黃連　黃柏
山梔俱酒炒各一兩　升麻三錢

右爲末每一二錢量人大小加入煎劑同服

千里馬　疏瀉之劑無舌苔不可服

大黃一兩浸過　紅麴五錢炒　川芎
烏藥各三錢　蚯蚓去泥土一兩

右爲末另以大黃四兩熬膏加蜜少許爲丸如龍眼大每服一二丸入煎劑同服

一丸春　治一切頂陷不貫者

天麻　殭蠶　天花粉各二錢五分
全蝎　甘草各二錢　象皮　光烏各三錢
硃砂　牛黃五分　狗寶各一錢

麝香　三分

右爲末元米飲爲丸如龍眼大硃砂爲衣每服一丸臨臥時酒漿化下

斂膿散　治當歷不歷以此收之

黃耆蜜炙　枸杞子　白芷　甘草

何首烏各一兩　蜜炙

右爲末每服二錢米飲調下

護眼膏　治見點兩眼腫赤肝脾二經熱甚以此塗之

甘草　黃栢　大胭脂各一兩

桑荳五合水五碗浸一晝夜去荳

右爲末以菜荳水加紅花四兩煎至二碗去渣入前末成膏塗眼眶上下

涼膈散　治瘡後羞明怕日翳膜遮睛

當歸　川芎　柴胡　黃連

龍膽草　防風　蟬蛻　寶蒙花各六分

右爲末以猪肝一兩切片同煮服

四聖丹　治七竅外有疔以此點之

珍珠三分　活蛇膽四十九粒　男髮煆灰存性一錢
雄黃六分　氷片一分

右爲末以紫草二兩蔴油黎膏調點

必勝膏　治貼腫毒每日兩換

蔥白不拘多少搗爛入蜜和作餅貼患處

靈寶丹　治走馬牙疳并二切口疳吹之立效

小青蝦蟇三十箇
銅綠一分　麝香三釐
生礬一錢　南棗去核五枚

右共搗爛鹽泥封固火煆存性去泥爲末吹之

綿藭散　治瘡後燗不收口

綿藭二十箇以生礬裝滿爲度火燒炙乾爲末
每一兩蜜陀僧五錢白芷二錢

右爲末白蜜調敷

生肌散　治膿後疔潰成坑內見筋骨者

赤石脂　伏龍肝　輕粉　黃柏
血竭　杭粉各一錢　黃丹　髮灰
乳香　沒藥各五分　氷片三分　蜜陀僧一錢五分

右爲末摻上有臭氣加阿魏三分

薰療法

茵陳　白芨　荊芥　各等分

爲末以紙條薰之

逐蛆法　以絲瓜搗汁噙噴瘡上其蛆自出

又方　以柳葉鋪床又有皮厚不能出者用銀針挑破滴油入內蛆見油即出外用花椒水浴之

痧麻

夫痧麻出自六腑先動陽分而後歸於陰經故標屬陰而本屬陽也如未出時或已出而出之不暢者即當發散必先明其歲氣如時令溫燠以辛涼之藥發之時令暄熱以辛寒之藥發之時令或寒或熱以辛平之藥發之但發得出則毒盡解若發不出再加藥發之要其大綱雖是熱症然不可驟用涼藥恐過絕邪氣於內而不得出多有不救者宜解毒發散爲主若發熱之時遍身汗出者此毒從汗散有臭中血出者此毒從血解若上吐下利則毒從吐利解俱不可遽止若太過斟酌止之痧已出其色喜紅潤極忌紫黑如有咽喉腫痛不能

飲食者此毒火鬱上薰咽喉也咳嗽口乾心煩者此毒在心肺發未盡也痢已出而渴尤不止者最爲惡候出已遍身而尤拂拂頻熱頻作嘔吐者此毒未盡留連於脾胃之間也

立方

解毒湯　治瘧症初起天時温暖

防風　薄荷　荊芥　石膏
知母各八分　桔梗　甘草　牛蒡子
連翹　木通　枳殼各六分

淡竹葉甘片煎服

清毒湯　治瘧初起夏月大熱

黄連　黄芩　防風　荊芥各一錢
桔梗　石膏　玄參　木通
山梔仁各八分

淡竹葉甘片煎服

化毒湯　治瘧症初起冬月寒冷

桂枝　厪黄　赤芍　防風各八分
荆芥　羌活　桔梗　人參

川芎 各五分 牛蒡子一錢

生薑三片煎服

清寧湯 治症汗出太多。熱血不止。

當歸 連翹 石膏 黃連 各一錢

生地 麥門冬 玄參 甘草 各七分

淨小麥一錢煎服

玄桔湯 治痧症咽喉腫痛。

玄參 桔梗 各一錢

天花粉 牛蒡子 連翹

淡竹甘片煎服

清金飲 治痧症咳嗽。口乾心煩。

天花粉 桔梗 桑皮 知母 各七分

玄參 連翹 乾葛 各八分

燈心三十莖煎服

炒勝飲 治痧已出而瀉不止。

陳皮 厚朴 蒼术 白茯苓

牛蒡子 澤瀉 木通 各八分

生薑一片食盡煎服

和榮散　治痧已出渾身發熱

當歸　川芎　生地　麥門冬
白芍　木通　甘草各八分
燈心三十莖煎服

靈功飲　治痧後痢疾

當歸　黃連　川芎各八分　人參二分
廣木香　枳殼　甘草一分　滑石　檳榔各六分
燈心三十莖食前温服

治痧發不出　蔥一把搗汁一盞入酒漿一盞同服

又秘方　櫻桃核四十九粒甘草五分煎服

痧出紫黑　急以人糞燒存性酒調五分立刻變紅

瘡瘍科

諸痛癢瘡瘍皆屬心火則瘡瘍之疾非外得也而昔人列之爲外科者以形症在外非若內症之無形可見也然外之所成皆內之所發未有不由臟腑而出者其可視以爲外症而忽之乎瘡瘍之中癰疽爲甚而犬疔之毒尤甚於癰疽故治犬疔者十活其一二

沿疽者十活其五六沿癰者十活其八九惟毒有淺
深故治有難易耳然何以辨其癰疽大抵哉亦視其
腫之高下地之廣狹脉之浮沉而已蓋癰者壅之義
也氣血爲毒所壅聚而不行故發而爲癰其初發之
時必灑淅惡寒而身微熱多生於背與頂在背之上
部或左或右爲上搭手在背之下部或爲正發生於
腦後者爲對口比之上下搭手尤爲毒也凡癰皆掀
然熱而腫高其勢易大其根不甚深從乎陽也疽者
沮之義也氣血爲毒所阻滯而不行故發而爲疽其
初發之時亦灑淅惡寒先覺麻癢如痦瘕之狀按之
內實手推不能動多發於背腰肩隅之間及小腹胃
傍其發股足之間者名附骨疽凡疽皆腫不甚高勢
不易大而其根反深惟發於背心及股者爲至重乃
五臟所發從乎陰也疔者丁之似也猶釘之在木拔
之不能出撮之不能動其根至深其毒至甚其頭至
硬其初發之時反不知痛癢但不覺麻木外雖如麻
裏則如爪及其勢甚則痛苦異常應心入膽而不可
忽乃五臟六腑所發之火煅煉已久并合於一處而

生疔者多見於面部骨節之間而究其毒之所從來多由於飲食服餌之中經曰膏粱之變足生大疔凡肥甘厚味炙煿煎熬之物最能助火嗜味之人恣供口腹酣酒以勞之以色脾土於是乎燥烈腎水於是乎枯竭積之既久醞於五臟佈於六腑火鬱而不散乘其氣血所虛之處而發之根抵於內而顯濊於外其毒甚於鴆鳥試割其肉以飼鷄犬立見其斃此大疔之所以多灰也若夫似疔而非疔者則俱以腫毒治之而無大害然二者之脈何以辨之蓋浮而數者毒氣在表故知其為癰沉而數者毒氣在裏故知其為疽若沉而又滑數而弦急者必疔也此皆有形之可見者雖其治有難易猶可因其症而施之至於腸癰腹癰肺癰之類皆為內癰其狀與癤瘡瘡癖無異苟或以為內科之症而進以削堅破結之劑所治非其所患幾何而不殞人之命也大法瘡瘍之在外者初發無如一灸艾烟一透其毒立效若延至六七日則不可灸矣毒之淺者點之毒之深者決之毒之尤深而針力所不及者則烙之未成毒膿則用化毒

既成膿則思托裏此外在人之臨症機變多矣

發背門

陰發難治陽發易醫爲治之法或疎散或消毒或針烙或內托或外消或瀉或補隨其虛實寒熱而調治之又當辨其五善十惡如痛息自寧飲食有味一善也便利調勻二善也膿腫自消色鮮不異三善也神彩光明聲音清朗四善也體氣平和爲之五善也腹痛而渴瀉利無度小便如淋一惡也膿大潰瘍腫猶甚臭敗莫收二惡也喘急氣促恍惚嘔逆四惡也三焦毒氣攻心藥食嘔逆四惡聲嘶色脫面目如垢膚青臭黑四肢浮腫五惡二便不通煩燥時咳六惡四肢沉重未潰先黑陷下爲之七惡

立方

神授衛生湯　治發背并腦疽對口諸惡毒未成者即消已成者即潰藥性平和功効甚速

羌活　防風　白芷　穿山甲

沉香　紅花　連翹　石決明　各六分

金銀花　皂角刺　當歸尾　甘草節

天花粉　乳香　各八分　大黃酒炒二錢

水煎食遠服。

消腫托裏散　治發背不拘上下左右並一切癰疽腫毒。

人參　赤茯苓　白朮　滑石

桔梗　金銀花　荆芥　山梔

當歸　川芎　黃耆　各一錢　赤芍

蒼朮　麻黃　各七分　大黃三錢　黃芩

防風　甘草　薄荷　連翹　各八分

石膏　苦硝　各一錢　五分

水酒各一鍾煎服。

灸法　如發背初起時背上微有紅腫重墜即是發背以此法立時消散屢屢効驗。

用河邊水中泥先空去一尺許再取一大塊同人糞杵極熟做一餅如碗大頂上以針通一細孔放在患處外用艾火灸之如痛灸至不痛不痛要灸至痛住。

薰發背奇方　治發背七日後未成者自消已成者

自潰不起發者即發不腐潰者即腐

雄黃　硃砂　血竭　沒藥　各二錢

麝香五分

右爲細末每用二分綿紙裹藥爲撚長尺許以蘇油潤透燃火離瘡半寸許自外而內周圍徐徐炤之初用三條加至五條候毒勢漸消漸減

散毒飲　治發背二三五日間身上漉漸惡寒疼痛急脹加未成膿即消已成即潰調氣血和脾胃使毒不攻心

乳香　沒藥　天花粉　黃耆　各一錢

防風　當歸　白芷　桔梗　各一錢

穿山甲　皂角刺　連翹　各一錢二分

陳皮　金銀花　牡丹皮　川芎　各八分

水煎食後服

蜘蝥丸　治發背癰疽並一切腫毒服之能護心膜毒氣不能攻心

黃蠟一觔　硃砂八兩研末　入錢研細

先以蠟鎔開入明蠜末攪和投水中衆手丸如菜

苣大珠砂爲衣每服百丸白滾湯下
生肌丸 治一切發背疽毒服此長肉收功
黃蠟一觔 乳香研細 沒藥研細 血竭各三兩研細
象牙末四兩
先用蠟鎔化再入乳沒等藥和勻挼冰中衆手丸
如菜苣大每服百丸一日二服
吸毒竹筒 治發背癰疽腫毒以此拔出膿血惡水
蒼朮 白斂 厚朴 艾葉
白芨 烏相皮 芽茶 白蔌藜各等分
如法用竹筒六七箇長二寸二頭留節削去青令極薄隨大小用之以藥煮筒十數沸煮乾爲度乘筒熱按上緊吸瘡口膿水滿自脫落不然用手拔脫更換別箇竹筒如此三五次毒盡消矣
托裏定痛散 治發背潰後血虛餘毒未盡作疼
歸身 熟地各二錢 乳香 沒藥
川芎 白芍各一錢酒炒 肉桂
栗殼去筋膜蜜炒各一錢五分泡水煎食後温服

五寶飲　治發背不肯收口作痒作癢服之去即收功

金銀　黃耆　甘草　歸身

人參各一錢

水二鍾煎八分食後服

生肌神秘散　治發背將收功摻上腐肉即去新肉即生

白昇藥一兩輕粉　鉛粉各一錢

銀硃　珍珠一豆腐內煮過各四錢

右爲極細末摻於瘡口

十全大補湯　治發背已潰寒熱往來或作痒痛膿多或自汗盜汗氣血兩虧神思倦怠瘡口不斂

人參　黃耆　川芎　白芍

當歸　肉桂各二錢　熟地　白茯苓

白朮　甘草各一錢五分

黑棗五枚食前煎服

癰疽門　附腦癰　肺癰　臀癰　附骨疽

凡癰疽緣陰陽相搏而生蓋氣屬陽血屬陰血行脈內氣行脈外相並週流寒與濕搏之則凝滯而行遲

爲不及熱與火搏之則沸騰而行速爲太過氣得邪而鬱津液閉結爲痰爲飲積久滲入脉中血爲之濁血得邪而滯隧道路阻隔或溢或結此陰陽不能和暢則癰疽惡毒從此生焉

立方

真人活命飲　治一切癰疽腫毒初起服此止痛立消散毒

當歸尾　赤芍　防風各二錢　白芷　天花粉　穿山甲　乳香　沒藥各一錢

皂角刺　浙貝母　陳皮　金銀花　甘草節各一錢五分

頭生酒水各一碗煎隨其疽毒上下以分饑飽服之

飛龍奪命丹　治一切癰疽并發背疔瘡對口無名惡瘡未成者服之立消已成者服之即潰疼痛者服之立止此丹乃惡症中至寶

沒藥　硃砂爲衣　蟾酥酒化開　乳香　銅綠各二錢　明雄黃三錢　膽礬二　寒水石各一錢

麝香五分 蝸牛二十一箇。輕粉五錢
血竭一錢 蜈蚣一條。酒浸多
右爲末。以蝸牛研爲泥。加葱汁和丸如菜豆大。每
服三九。先用葱白三寸。令病人臍爛。放手掌中。將
丸置在葱白內。用熱酒送下。於被覆暖。取汗。如未
有汗。又飲酒數鍾。以助藥力。

立潰拔毒膏 黠破諸般惡毒癰疽瘡癤

黍米二兩。南皂角燒
芽各三錢 同炒。赤 硇砂
斑猫各三錢 好石灰一兩。皂角燒
烟薰共爲末。桑柴灰
眞炭灰 皂角灰 毛竹去青
炭灰 芝蔴稭灰 各二
兩
右以五樣灰淋汁。鍋
慶調前四味。黠於患處。內慢火熬之。面上起白霜爲
太乙神應膏 治發背癰疽。疔瘡瘭毒。跌打損傷。心
疼腰痛。一切外科百病。無不効驗。

川烏 草烏 黃連 黃栢
赤芍 白芍 玄胡索 當歸尾 各二
良薑 木鱉子 麝 亂髮 各五
紫荊皮 地龍 穿山甲
石南藤

白芷　川芎　白牽牛　槐花
五倍子　地骨皮　杏仁　花椒
大茴香　茅香　玄參　蒼耳子
桂皮　南星　瓜蔞仁　苦參
蒼术　五加皮　防風　熟地
蜜陀僧　丁香　內消　生地
蒙本各一錢　何首烏　細辛各二錢五分
江子三十粒去殼　草蒲子三十粒去殼
旱蓮草　人參　百藥煎　黃芪

甘草節　羌活　五靈脂　獨活
地蜈蚣根各一兩
前藥各爲咀片用蒜油一觔半浸一宿入銚內文武火熬至黑色濾去渣却將後藥爲末次第加入
廣木香　安息香　琥珀　蔓香各二錢
乳香　沒藥　血竭　降香
韶粉　自然銅各一錢五分醋淬三次　桑白皮
白芨　雄黃各五錢　黃丹六兩夏井加二兩炒黑色
右各爲末入油次下黃丹以槐柳條不住手攪滴

未成珠爲度諸品要選真正道地者庶誠煎熬自然應驗

千金內托散　治癰疽惡毒未成者速散已成者速潰此方活血調氣祛風解毒和胆補虛

黃耆　人參各二錢　防風　厚朴
當歸　白芷　薄桂　川芎
甘草　桔梗各一錢

酒煎溫服

紫金錠　治一切癰疽瘡癤發背惡毒每服二錢酒磨送下外以磨敷上甘草毒漸漸消散方見疫門

附腦癰

立方

黃連救苦湯　治腦癰初起增寒發熱頭面耳項俱腫服之立消

黃連　赤芍　桔梗　金銀花各一錢五分
升麻　八分　柴胡　乾葛　川芎
當歸尾各一錢二分　連翹　防風
羌活　黃芩　甘草各二錢

水二碗煎八分服加酒一鍾食後服
保安湯 治腦癰已潰流膿內痛飲食減少
黃耆 麥門冬 藿香各一錢 當歸 白茯苓 川芎各一錢 桔梗 半夏 陳皮 白朮 甘草 人參各一錢
黑棗五枚食後煎服
飛龍奪命丹 治腦癰初起灑淅惡寒頭腦脹痛日服二次方見前

十全大補湯 治腦癰已潰之後膿水出多氣血兩虛精神短少飲食少進煩燥不眠日晡潮熱方見發背門
附肺癰
立方
平肺飲 治肺癰初起咳嗽氣急胷中隱隱作痛吐膿痰
人參 麥門冬 赤芍 檳榔 赤茯苓 陳皮 桔梗各一錢 甘草五分

水煎食遠服

清肺飲　治肺癰咳吐膿痰胃脘脹痛上氣喘急發熱

銀柴胡　玄參　陳皮　桔梗各一錢
白茯苓　地骨皮　麥門冬　薏苡仁
人參　甘草　瓜蔞仁各八分

燈心三十莖煎八分食遠服

排膿散　治肺癰已吐腥臭之痰服此排膿補肺

黃芪　北五味　人參各三錢

右爲細末每服二錢食後白滾湯調下

八寶飲　治肺癰咳嗽日久痰帶腥臭身熱虛羸

白茯苓　桔梗　貝母　人參
北五味　天門冬　胡黃連　熟地各等分

水煎食後服

附臀癰

臀癰生於小腹之後位遠僻臭氣亦罕到血亦少來
凡生是癰者乃濕熱凝滯聚結而成此毒也

立方

活血散瘀湯　治臀癰初發紅赤腫痛重墜如石及大便秘澁

川芎　當歸　防風　赤芍　各一錢
蘇木　連翹　天花粉　皂角刺
紅花　黃芩　枳殼　各一錢
大黃三錢

水煎食前服

十全大補湯　治臀癰出膿後服十餘劑外貼太乙膏方見發背門

內消沃雪湯　治臀癰不得出膿堅硬腫痛不可忍者

青皮　陳皮　乳香　沒藥
連翹　黃蓍　當歸　甘草節
白芷　射干　天花粉　穿山甲
貝母各一錢　白芍　金銀花　皂角刺各八分
廣木香五分　大黃三錢

水酒各一碗煎服

附骨疽

立方

黍米寸金丹　治附骨疽并諸腫毒神効

乳香　沒藥　雄黃　狗寶
輕粉　烏金石各三錢　蟾酥
硇砂各四錢　白粉霜水銀昇煉　黃蠟各五錢
鯉魚膽三箇陰乾
狗膽一箇　白丁香
金頭蜈蚣七條酥炙黃色　人乳頭胎者佳

右爲末先以乳蠟二味熬成膏同藥爲九如菉豆大大人三十九小兒一二九重者五九蔥湯送下忌衣被

密盖出汗爲度

當歸拈痛湯　治附骨疽因濕熱下注腰脚赤腫痛不可忍

羌活　當歸　防風　茵陳
蒼术各一錢　苦參　升麻　白术各七分
葛根　甘草　黃芩　知母
澤瀉　猪苓　人參　黃柏各五分
水煎温服

托裏黃耆湯　治附骨疽初起腫痛外貼太乙神應

黃耆　當歸　柴胡　木瓜
連翹　羌活　肉桂　生地
黃栢 各等分
水酒各一鍾煎服。
羌活防已湯　治附骨疽初發於太陽太陰厥陰分上者。
羌活　川芎　蒼朮　防已
木香 各一錢　連翹　射干　甘草

赤芍　木通　歸尾
水酒各一鍾煎服。　蘇木 各一錢二分
黃連消毒飲　治附骨疽在腿外側。堅硬漫腫作痛。不能行步上者。
黃連　羌活　黃栢　黃芩 各一錢二分
防已　生地　防風　歸尾
知母　獨活　陳皮　黃耆
人參
蘇木煎溫服。 各一錢

十全大補湯　治證骨疽將愈時服十餘劑永無他患方見發背門

乳癰門　附乳巖　腸癰　囊癰

夫乳病者乳房陽明胃經所司乳頭厥陰肝經所屬乳子之母不善調養以致乳汁濁而壅滯因惱怒所傷氣滯凝結而成癰毒又有憂鬱傷肝思慮傷脾積想在心所願不得志者致於經絡痞澁聚結成核初如荳大漸若棊子半年一載二載三載不疼不癢漸漸而大始生疼痛則無解日後腫如堆栗或如覆碗紫色氣穢之漸漸潰爛深者如巖穴凸者若泛蓮疼痛連心出血作臭其時五臟俱衰四大不正救名曰乳巖凡犯此症百無一生宜清肝解鬱益氣養榮患者清心靜養無掛無礙服藥調理苟延歲月而矣

脉云

乳癰之脉多於弦緊弦數鬱火弦滑鬱痰

立方

牛蒡子湯　治乳癰結腫疼痛之甚服此立散

牛蒡子　陳皮　山梔　金銀花

瓜蔞仁　天花粉　黃芩　青皮各一錢
連翹　柴胡各一錢　甘草三分
水煎臨服加酒一鍾同服
消癰散毒飲　治乳癰惡寒發熱瘍腫疼痛服此立消
青皮　浙貝母　天花粉各二錢
蒲公英開黃花即滿地金　連翹
鹿角屑　當歸各一錢　五分
水酒各一鍾煎服

飛龍奪命丹　治一切乳癰已成未成者方見癰疽門
散腫湯　治乳癰未成即消方見癰疽門
青皮　石膏各二錢　甘草節　瓜蔞子
沒藥　蒲公英即滿地金錢　金銀花
當歸尾各一錢五分
水酒各一鍾煎服
附乳巖
立方
青橘葉二十片

肯徇飲　治婦人一切不如意。久積憂忿。乳內有核不
癢不痛。將成乳巖。
青皮 五錢 醋炒。　橘葉三十片

水煎食遠服

神功飲　治婦人乳內一核。初起如錢。不作疼癢。二
五七年成功紅腫潰時無膿。惟流清水一形如巖穴之
凹。

忍冬藤　蒲公英　甘草節　金銀花 各二
瓜蔞一個 連殼

生酒煎服。

十六味流氣飲　治乳巖赤腫疼痛。

人參　黃芪　當歸　川芎 各一錢五分
肉桂　白芷　厚朴　甘草
桔梗　防風　烏藥　檳榔 各一錢
赤芍　枳殼　廣木香　蘇梗 各八分

水煎食後服。

附腸癰。

腸癰因濕熱流入小腸而成。小腹急脹。按之則痛。水

便泄數時時出汗惡寒發熱腹皮堅實高腫遶臍生瘡是也

立方

神通散　治腸癰不拘已成未成服之膿血皆從大便中出

出過蠶蛾燒灰　大黃各六錢　穿山甲炒
牙皂各五錢

右爲末每服一錢酒調下

化毒飲　治腸癰腹癰初起小腹腫痛急脹

木通四錢　黃連　青皮　乳香
沒藥　大黃各三錢九
生薑三片水二盌煎服
牡丹皮湯　治腸癰腹濡而痛以手按之則止或時時下膿

人參　丹皮　白芍　赤茯苓
黃耆　桃仁去皮尖　薏苡仁　白芷
當歸　川芎各一錢　廣木香　甘草
官桂各五分

水煎食前服

排膿湯 治腸癰小腹脹痛。裏急後重。時時下膿。

黃芪　穿山甲　白芷　當歸各一錢　金銀花　防風　二分　水煎食前溫服。　川芎　瓜蔞仁各一錢

十全大補湯 治腸癰。小腹脹痛。膿下無時。方見發背門

附 囊癰

囊癰者。乃陰虛濕熱流注於囊。結而為腫。至潰之後。畢竟懸掛。猶不傷人。其毒從外發。治當補陰清利濕熱為主。

立方

如意黃金散 敷囊癰初起。紅赤腫痛。發熱隆重者。

天花粉　黃柏　大黃　薑黃各五兩　白芷三兩　厚朴　陳皮　甘草　各二兩　蒼朮　南星各一兩

右為末。以蔥汁同蜜調敷患處。

清肝滲濕湯 治囊癰肝經濕熱結腫。小水不利。發熱煩痛。

川芎　當歸　龍膽草　生地
白芍　柴胡各一錢五分　天花粉
山梔　黃芩　木通　澤瀉各一錢
燈心三十莖食前服
滋陰內托散　治囊癰已成腫痛發熱有膿服之即潰
當歸　川芎　白芍　黃耆各一錢五分
熟地　皂角刺　穿山甲炒　澤瀉各八分
水煎食前服

懸癰門

懸癰者乃三陰虧損濕熱結聚而成此穴在谷道之前陰器之下又謂之海底穴也初起如豆少養多痛日久漸大赤腫掀痛潰膿後輕則成漏重則瘡盡氣血變爲癆瘵多矣

立方

內消沃雪湯　治懸癰初起增寒發痛方見癰疽門
琥珀蠟礬丸　治懸癰并一切癰疽發背已成未成之際恐毒不能內攻必致內攻宜服以護心膜亦效

毎小兒痛

明礬一兩 琥珀 硃砂 雄黃各二錢 乳香一錢 蜂蜜二錢臨入

前藥俱爲細末將蜜溶化再末藥并蜜攪勻衆手急丸如菜豆大硃砂爲衣每服三十九白湯送下病重早晚日進二次神効

神功內托散 治瘡癤日久不潰高硬腫痛不可當者

人參 白朮各二錢 白芍 當歸

附子 陳皮 川芎 枳殼 穿山甲 木香各一錢 生薑三片煎八分二分食前服 皂角刺 黃芪各一錢 透膿散 治瘡癤并二切痘毒已成不肯穿破者服之即潰

穿山甲炒 當歸各一錢 皂角刺各一錢五分 黃蓍 川芎 水酒各一碗食前熟服 生肌元 治瘡癤不能收口每日早晚服之即愈

外發背門

疔瘡門 附癤瘡 臁瘡

夫疔瘡之初生也（一）人多不覺（二）生於頭面手足胠脇腰腹間（三）亦無定處（四）二十日必作寒熱（五）似瘧（六）頭疼體痛不可忍（七）其痛法異於尋常之症（八）須遍身覓之（九）有小瘡頭腫黑根赤色（十）而其形壯者（十一）即外疔也（十二）又有內疔與外疔同（十三）亦發寒熱（十四）但瘡形不見（十五）過數日（十六）一處腫起（十七）即內疔也（十八）

立方

追毒飲 治一切內外疔瘡神效

歸尾 川芎 各八分 荊芥 乾葛 烏藥 獨活 各四分 羌活 赤芍 各六分 白芷 升麻 甘草節 防風 枳殼 紅花 蘇木 各七分

水二鍾煎八分食遠服

金蟾丸 治一切疔瘡

草烏 雄黃 硃砂 海金沙 輕粉 各二錢 蟾酥 三錢 酒熬化

右為末以蟾酥為丸如菉豆大每服三丸用蔥白一寸夾藥在內灰火中煨令香取起帶熱連藥嚼下白滾湯送之被蓋出汗

拔毒丹 治一切疔瘡

蜣螂一個去翅足 硇砂五分 白礬三分

右為末以蔥汁為丸如菉豆大先以三稜針刺破瘡將此丸以頻簪腳捺入須臾大痛變作黃水而出

解急飲 治一切疔瘡

野菊花搗汁一盞滾酒送下一日連進三服

又方 馬齒莧搗爛加醋少許敷在疔上立刺拔出

又方 醬板草搗爛加醋少許鹽三分敷患處神效

紅玉散 治疔瘡不收口

輕粉 血竭各三錢 珍珠 甘草

黃連 鉛粉各二錢

右為細末摻上即愈

代針膏 治疔瘡堅硬作痛並諸毒難潰者點上即時出膿

拂光散　治一切頑癬

斑猫去翅足　大楓子　各二錢　川槿皮

枯礬　輕粉　各三錢　白砒五分

右爲細末醋調擦患處

又方　治陰癬

川槿皮二錢　檳榔　雷木鱉子　各五個

以上三味用陰陽水三碗煎至一碗入後藥

巴豆　大楓子肉　斑猫　各十五個　麝香四分

輕粉三錢

水二碗入硇砂五分煎至一碗加入胭脂灰一兩待化過再熬至乾入白砒末三錢銀鋪末三錢仍入好醋研和收貯器中

神驗方　治一切疔瘡初起一敷即散

爛鷄糞　蜗牛七個　荔枝肉一個　杏仁七粒

銀硃三分

右四味同爛鷄糞搗勻貼在患處

附癬瘡

立方

右爲末以前藥水調和將穿山甲刮微破用筆蘸塗之日三次愈

浮萍丸　治一切陰陽頑癬

紫背浮萍　蒼耳草　蒼术各二兩
苦參三兩　黃芩　殭蠶　鉤藤
蒺藜草　防風各一兩　蟬蛻各一兩
五錢

右爲末酒法爲丸每服二錢白滾湯送下
效妙散　治一切頑癬并楊梅癬亦效

蜜陀僧　雄黃各三錢　白礬二錢　枯礬五錢

硫黃火煅入燒酒煮過埋土中一宿一兩

右爲細末抓破患處以煨熟薑切開蘸藥擦上三日全無

附臁瘡

立方

萬金膏　治臁瘡久不收口

黃連　粉霜各三錢　輕粉　鉛粉各二錢
樟腦　銀硃各五分　氷片三分

右爲細末以猪脂溶化入前末留氷片候冷加入

末勻攤貼神効

赤玉膏　治內外臁瘡

血竭　黃丹　珍珠一錢五分　黃蠟六兩　豬脂一兩　血餘煅灰　寒水石煅過各一兩

右爲極細末先以黃蠟豬脂溶化再入前末攪勻攤貼瘡上

洗方

黃栢　花椒　杏仁　苦參　荆芥各等分　防風

右藥水煎去渣洗瘡以絹拭乾再貼赤玉膏

瘰癧門　附湯火金瘡

瘰癧皆猶於痰毒風熱所致先起之於少陽一經因不守禁忌延及陽明經緣是食味之厚鬱氣之積故發此症也

立方

眞人活命飲　治瘰癧未潰連服五劑立消方見癰疽門

紫金錠　治瘰癧初起磨五錢滾酒下外以井水磨方見痰症門

飛龍奪金丹　治瘰癧已潰未潰每服二九。愈酒送下。方見癰疽門

蠟礬丸　治瘰癧未潰時。滾湯送下二三錢。漸消止痛

生肌神秘散　治瘰癧潰爛不得收口。摻之。二方俱見發背門

附湯火

玄妙飲　治湯火所傷。先服恐火毒攻心。

川黃連　天花粉　玄參　各二錢　陳皮

桔梗　山梔　各一錢五分

淡竹葉廿片。前服。

黑龍散　治一切湯火傷。以此敷之。

山木炭　黃連　大黃　各等分

右爲末。以生桐油敷患處。

附金瘡

秘驗桃花散　治刀刃所傷。出血不止。

石灰一升　大黃五兩。切片。同炒紅色。篩去大黃。

右炒過石灰。以冰牛膽汁拌勻。復裝入膽內。陰乾爲末。搽患處。

廣瘡門 附結毒 便毒 疳瘡 蛀疳

夫廣瘡者。即楊梅瘡也。總猶濕熱邪火所化氣之傳染者。輕。精化慾染者。重。

立方

托毒飲 治廣瘡初起

當歸尾 金銀花 天花粉 連翹 各一錢

赤芍 皂角刺 殭蠶 蟬蛻 各六分

芒硝 穿山甲 大黃 各二錢 蜈蚣 一條

水煎空心服。

靈奇飲 治廣瘡二服神效

麻黃 去節 春夏六錢 秋冬八錢 大黃 蟬蛻

威靈仙 白芷 各一兩

以羊肉一觔。水五碗。煮去肉。再湯煎藥。熱服。出汗。

化毒湯 治一切廣瘡

川黃連 木瓜 金銀花 苡仁米 各二錢

肥皂子七箇 皂夾子七箇 土茯苓半觔 猪腰子一箇

水七碗。先煎腰子。取汁。煎前藥。空心服。

點藥

杏仁 取霜二錢 膽礬 輕粉 各八分 氷片

麝香 銀硃 各三分

右爲末醋調點上。

十全大補湯 治廣瘡將愈多服以補元氣百後無患方見發背門

附結毒

結毒神効方 治一切結毒并筋骨痛。

當歸 川芎 各三錢 肥皂子七箇 防風

生地 白蘞皮 赤芍 金銀花

牛膝 人參 防巳 威靈仙 各二錢

土茯苓 四兩

水四碗。煎二碗。温服。服後飲酒以助藥力。

八寶奇秘散 治一切結毒。

鍾乳石 牛黃 各三錢 麝香 氷片 各六分

蟾酥 鴉片 各半分 珍珠 硃砂 各三錢

右爲細末。收貯。臨用時。取藥一錢。加飛麵三錢。同拌勻。分作十服。每一服加土茯苓一觔。水四碗。煎湯調服。

生肌散　治結毒流膿水不得收口掺患處方見發背門

附便毒

祛毒飲　治便毒初起一服即消

金銀花　穿山甲　各二錢　瓜蔞仁帶殼一個

全蝎五個　大黃五錢　甘草各一錢

水酒各半煎服

飛龍奪命丹　消腫定疼方見癰疽門

吸毒竹筒　治便毒已潰膿出不盡用此

生肌散　治出膿難於收口掺患處二方見發背門

附疳瘡蛀疳

龍膽瀉毒湯　治一切下疳

柴胡　龍膽草　山梔各一錢　大黃

黃連　滑石　木通各一錢　甘草五分

加燈心三十莖食前服

長肌散

珍珠一兩　乳香　血竭各三錢　頭髮煆灰一

絲綿煆灰　氷片各一錢

右爲末掺患處

碧雲散　治牡筋痃先以杏仁煎湯洗
象牙泥裹煅存性　雄黃煅　鳳凰衣煅各一錢
鷄肫皮五箇煅　南棗煅　面粉
珍珠　茶葉煅灰各二錢
右爲末搽患處
痔瘡門　附痔漏

夫痔。不分男婦小兒皆有緣富貴之家多患此疾皆因嗜飲麵酒過貪色慾併厚味肥甘椒薑炙煿等物以致濕熱流注大腸之經積而成痔蘊蓄日久則變爲漏矣。

立方

和榮清火湯　治痔瘡疼痛。
槐角子　連翹　枳殼各一錢　川連
當歸　川芎　赤芍各一錢五分　桃仁　生地
加燈心三十莖煎服
壯氣收腸湯　治番花痔。腸落不收。
黃耆　人參　當歸　川芎

廣木香　金銀花　川連各一錢　升麻七分
黑棗二枚煎服
蠐艾丸　治一切痔瘡出血裏急後重
艾葉　槐角　地榆　當歸
川芎　刺蝟皮　貫衆各一兩　頭髮煆存性三錢
猪後甲十箇炙焦
右爲末蜜丸每服三錢空心米飲下
熊氷散　治内痔
熊膽　氷片　蘆薈　雷丸各二錢

銀硃五分
右爲末以胡蘿蔔煨半熟綿裹蘸藥入幽門
附痔漏
清潤湯　治一切痔漏
防風　秦艽各一錢五分　生地
當歸　川連　阿膠各二錢
水煎食前服
秘靈丹　治一切遠年近日痔漏神効
血竭　乳香　沒藥　全蝎去頭足

殭蠶　蟬蛻各三錢　大黃酒蒸　當歸
象牙屑末各八分　穿山甲酥炙頭髮煆
珍珠各四錢　川連　青黛　刺蝟皮各二錢五分
槐花　琥珀各五錢

右爲末以黃蠟八兩溶化入蜜一兩同前末攪勻
衆手爲丸每服二十錢空心清茶送下
耳聾門　附諸蟲入耳

夫耳聾皆緣三焦濕火肝經風熱並腎家虛火妄動而成聾者是也

立方

清肝抑火湯

石菖蒲　川連各三錢　龍膽草　山梔仁
柴胡　當歸各一錢　龍眼肉五枚　空心煎服

珍奇散　治耳聾並耳內流膿

珍珠　蘆甘石煅各二分　麝香　枯礬各一分

右爲細末吹入耳內　紫草茸各三錢

附諸蟲入耳

蠅蚊諸細蟲入耳以蒜油滴數點入竅蟲自效取出

蜈蚣蜜蜂等大蟲入耳以肉炙香安耳邊其蟲聞香自出

有蟲夜間暗入耳者宜正坐點燈光向耳邊其蟲自出

諸蟲咬

蜈蚣咬取蜘蛛一枚於上即吸其毒立愈

壁鏡咬醋磨大黃塗之

毒蛇咬雄黃爲末藍葉搗汁調敷內以半枝蓮取汁入酒和汁服

蜘蛛咬毒入肉取苧汁塗之

蚯蚓咬入形如大痲風眉鬚皆落以濃鹽湯浸浴數次愈

蝎咬白礬一兩爲末醋半碗煎滾入礬末浸螫處外以井泥敷之

蠼螋延疾蟲也隱於牆壁間尿射人影遍體生瘡如湯火傷以鷄翅毛燒灰蘇油調敷

蜾蠃咬。取地下青苔擦之。又方。以耳末擦上。其痛立止。

諸獸傷

馬咬。獨顆栗燒灰摻上。

鼠蛟。麝香爲末。唾調塗。或用貓毛燒灰裹之。

貓咬。薄荷汁塗。

猪咬。松脂鎔作餅子貼。又方。屋溜中泥塗。

虎咬。明礬爲末摻傷處。裹之。止痛立愈。

狗咬。花椒煎水洗。蒴草爲末。蓖油調塗。

狂狗咬。番木鱉磨水服二分。其傷以蔴油燈火刺之。再服雷橫散。

雷橫散　治狂狗咬。一服即愈。行下有胞衣包之。一串約六七箇。先看如頭上有紅髮一根。已傷五臟。不可救矣。

白丑　黑丑　大黃各六錢　雄黃一錢

右爲末。大人二錢。小兒一錢。黑砂糖湯調下。

丹臺玉案六卷終

正保二乙酉年睦月吉辰

二條通　鶴屋町田原仁左衛門梓行

