



要分別五臟形症次看面受盈虧胎氣虛實明其標本而治之無不可者

入門審候歌

觀形察色辨因由

要知有熱肚皮求

渾身皆熱是傷寒

五指稍頭冷

必定是傷寒

女右男分左

觀面部五色

面赤為風熱

脈症辨溫涼

陰弱陽強髮硬新

鼻冷便知是瘡疹

上熱下冷傷食病

驚來不可當

中指獨自冷

分明仔細看

若是傷寒雙足冷

耳冷應知風熱症

若逢中指熱


麻痘症相傳

心肝形此見

虛寒眊白光

若逢生黑氣 面部觀形察色圖

腎敗命須亡



頰腎

下頰屬腎水北

左腮屬肝木東

額上屬心火南

鼻準屬脾土中

右腮屬肺金西

小兒三歲以下有病須看男左女右手虎口三關從第一指側看第一節名風關第二節名氣關第三節名命關辨其紋色紫者屬熱紅者屬寒青者驚風白者疳積黑者中惡黃者脾之困也若現於風關為

輕氣關為重過於命關則難治矣

二關脈紋主病歌

紫熱紅傷寒

青驚白是疳

黃即因脾端

黑時因中惡

又

青色大小曲

人驚併四足

水火飛禽撲

紫色大小曲

赤色大小曲
傷米麵魚肉

黑色大小曲

脾風微作搐

手指脈紋八段錦

丫魚刺形主驚風痰熱

懸針形主傷風泄瀉積熱

水字形主食積嗽驚疳

乙字形主肝病驚風

蟲形主疳蟲木腸積積

環形主疳積吐逆

輕氣關為重過於命關則難治矣

二關脈紋主病歌

紫熱紅傷寒

青驚白是疳

黃即因脾端

黑時因中惡

又

青色大小曲

人驚併四足

水火飛禽撲

紫色大小曲

赤色大小曲
傷米麵魚肉

黑色大小曲

脾風微作搐

手指脈紋八段錦

丫魚刺形主驚風痰熱

懸針形主傷風泄瀉積熱

水字形主食積嗽驚疳

乙字形主肝病驚風

蟲形主疳蟲木腸積積

環形主疳積吐逆

亂紋主虫

珠形主死

虎口二關脈紋圖



風關第一節寅位

氣關第二節卯位

命關第三節辰位

虎口又丰處是也

小兒至三歲以上乃用一指按寸關尺三部常以六七至為率添則為熱減則為寒浮洪風盛數則多驚沉遲為虛沉實為積

小兒脈法總歌

小兒有病浪蕩脈

一指三關定息數

遲冷數熱古今傳

浮風沉積當先識

左手迎主外症

右手氣口主內疾

外候風寒暑濕燥侵

內候乳食痰積致

洪緊無汗是傷寒

右為細末用米粉糊為錠辰砂為衣用薄荷湯化下

○大聖奪命金丹 治小兒急慢驚風癲癩天吊客忤物件中惡及初生製顛反引竄視昏悶不醒但是一切驚風危惡緊急之症並皆治之其效如神其他驚藥俱不及此真起死回生之良劑也揚絕兩傳

天麻 炮 全蝎 去毒 炒 姜蚕 炒 膽星 防風 去芦 羌活 川芎

白附子 炮 茯神 去皮 遠志 炮 桔梗 去芦 石菖蒲 半夏 姜製

人參 去芦 白朮 去芦 茯苓 去皮 酸枣仁 炒 荆穗 細辛 各五

川烏 炮 去皮 臈一箇 烏蛇尾 酒浸炙 大赤足蜈蚣 一條 薄荷汁

其山 炙 沉香 犀角 羚羊角 辰砂 水飛 珍珠

琥珀 各 三天竺 黃兩 牛黃 五錢 雄黃 射香 各一錢 金箔 三十片

銀箔 四十片

右為末姜汁打糊為丸如芡實大朱砂為衣每服一丸用金銀同薄荷煎湯研化不拘時服

大赤足蜈蚣 治小兒驚風 赤足者良 治小兒驚風 雙

一小兒潮熱發搐痰涎上壅手足指冷申酉時左腮青色隱白用補中益氣湯調補脾肺六味丸滋養肝腎而痊 二方見補益
一小兒二歲因驚搐搦發熱痰盛久服抱龍丸等藥面色或赤或青此心肝二經血虛風熱生痰也用六味丸滋腎生血用六君柴胡升麻調補脾胃而安 二方俱見補益

慢驚

慢驚症因病後或吐瀉或藥餌傷損脾胃肢體逆冷口鼻氣微手足瘰癧昏睡露睛此脾虛生風無陽之症也

慢驚屬脾中氣虛損不足之病也 慢驚者陰虛也治宜固裏醒脾散主 醒脾散 治小兒吐瀉不止作慢驚風脾困昏沉默不食

人參去芦 白朮去芦 白茯苓去木 木香 全蝎去毒 天麻

白附子煨 姜蚕炒各等分 甘草炙減半

右劉生姜二片末一枚水煎溫服○一方去天麻姜蚕加南星泡半

夏泡陳倉米二百粒前服累效

○黃芪湯治小兒慢驚風之神藥也

黃芪 二錢 蜜水炒 人參 一錢 炙甘草五加 白芍 一錢炒

右劉一劑水前食遠服

○治小兒吐瀉脾驚一二歲可服

朱砂五厘一歲以上一分 全蝎一個去足翅毒一歲

右為細末乳汁調服

凡慢驚元氣虛損而至昏憤者急灸一二百會火若待下痰不愈而後灸

變已極危歸虛處惟脾受之無風可逐血驚可療此因脾虛不能攝涎而似痰也

糕 每餅同時
餅 以黍糯合
餅 蒸成餅
餅 音去白和
餅 子數字

紫金錠子治急慢驚風涎潮發搐或吐或瀉不思飲食神昏氣弱

人參去芦 白茯苓去木 白茯苓去木 山藥炒 乳香 赤石脂醋服七次

白朮去芦 辰砂各三錢 射香 一錢

右為末以糕一兩為丸如彈子大金箔為衣每一粒薄荷湯研化服

小兒傷食發丹服發表之劑手足搐搦服抱龍丸目睛痰盛余謂脾

胃虧損而變慢驚也無風可祛無痰可逐只宜溫補胃氣遂用六君

加附子一劑而愈方見補益

小兒抽搦痰涎自流或用驚風之藥益甚視其面色黃白余用六君

補中益氣二湯補脾肺而愈二方俱見補益

混元丹治小兒急慢驚風痰嗽喘熱吐瀉腹脹小兒百病大有功效方見通治

驚後調理

○牛黃鎮驚丸 治驚退後調理安心神養氣血和平預防之劑

天竺黃研麥門冬 去心當歸身洗酒 赤芍藥煨薄荷 木通

皮黃連姜汁炒 山梔仁炒辰砂 另研水飛 牛黃另研龍骨 火服各二

青黛另研一錢

右為細末煉蜜為丸如菉豆大每服一三十九淡姜湯送下

小兒五歲因看會見粧鬼臉被驚嚇兩眼黑睛奮向裡曰睛奮向死

視物微覺一線諸醫不能治求治於余余曰此子曾出痘疹否對曰

未俟出痘疹可治逾月痘疹盛行其子發熱似有將出之兒其家果

召余治以綿胭脂將水泡出汁慢火熬成膏塗見兩眼胞上下十日

塗二次直至痘疹收靨後其眼復舊

疳疾

先輩曰疳之生也小兒口味大過ヨリ起ル赤入門ニ疳ハ乾也
瘦瘠少血也其病証ハ多端也其証ハ及ハテ亦急有
疳者疳氣疳積疳疔疳疔疔等百十五以前ヲ疳ト云イテ
疳疔疔ト云イテ壽生保元ニ詳也

親屬相
親屬相
親屬相

乾胭脂 燕脂也

先輩曰此乃燕脂也

乾胭脂者和味平乎

夫小兒疳疾由乳母寒熱失理動止乖違飲食無節甘肥過度喜怒不
亂醉飽傷勞便乳兒者故成疳病又因久吐之後久瀉之後以致久
渴久汗久熱久瘡久嗽下血久瘡之後皆能亡失津液並成疳病錢
氏云疳皆脾胃傷亡津液之所作也
凡養小兒宜戒敬 酒肉油膩偏生病 生冷硬物涼水漿
不與自無疳癖病

疳者肥其厚味所致而肚大青筋也

○消疳湯 治小兒大便色疳白小水渾濁或澀之加米泔此疳病也

山查肉 白芍炒 黃連姜汁炒 白茯苓去 白朮去芦 澤瀉各一錢

青皮四分 其外生三分

右剉一劑姜水煎服

○消疳丸 治五疳皮黃肌瘦髮直尿白肚大青筋好食泥炭茶米之物

或吐或瀉腸內積塊諸虫作痛

一 小兒肝痺白膜遮睛筋痺症瀉而腎痺身瘦瘡疥骨痛喜臥冷地又
治胃怯不言解顛併年長不能行者用六味丸各等分煉蜜丸久服
神効方見補益

一 小兒四肢消瘦肚腹脹大行步不能頗能飲食作渴發熱去後臭穢
此脾臟傷也用異功散方見補益肥兒丸調理而愈

一 小兒面色痿黃眼胞微腫作渴腹脹飲食少思腹中一塊或移動小
便澄白大便不實此脾痺之患用四君子方見補益加山旆蕪荑菲
肥兒丸而愈

一 小兒尿濁如米泔余以江白做酒小麩炒為米酒調下三服而愈

癖疾 小兒塊積也

錢仲陽云癖塊者僻於兩脇痞結者否於中脘此因乳哺失調飲食停

滯邪氣相搏而成或乳母六淫七情所致古人多用疳疔瘰癧既久
飲食減少脾胃必虛久而不愈必先以固胃氣為主使養正則積自
除若欲直攻其結不惟不能善消抑亦損其脾土凡脾土虧損必變
症百出矣當參各類及隨見症而主治之若癖塊日久元氣脾胃俱
虛且朝服補中益氣湯夕服汗金丹消癖丸間與混元丹兼服之獲効
者多矣

癖者生於皮裏膜外也

○淨府湯 治小兒一切癖塊發熱口乾小便赤或瀉瀉

柴胡 白茯苓去皮 猪苓 澤瀉 二稜醋炒 莪木 酒炒 山查

去核各一 黃芩 白木去芦 半夏姜製 人參各八分 胡黃連

其出各三分

右剉丁劑姜棗煎服

○肥兒丸 治癩如神方見癩疾

○千金消癖丸 治小兒癩疾積見有殊效

蘆薈

阿魏另為青黛

木香

檳榔

厚朴

姜炒

陳皮去白各一錢

麥芽炒四錢

史君子去殼胡黃連

山查肉

香附水浸二稜醋炒

莪朮煨醋炒各一錢

水紅花子微神麩炒各四

人參去芦茯苓去皮白朮去芦各三錢

其山炙一錢

右為末將阿魏一錢研水和麵打糊為丸菴豆大每服四五十九米

飲白湯任下

○益兒餅 治小兒癩疾

水紅花子

史君子去殼山查肉各五錢

白朮去芦四錢檳榔半一錢

木香一錢

神麩炒二錢半

右為末入黃蠟麩水和作煎餅吃

○至寶丸

真阿魏錢二蘆薈

天竺黃

胡黃連

雄黃

沒藥

川山甲炒沉香

白草烏泡

硃砂各二

苦湯煮及胃噎嘔吐水

右為極細末用好酒和成一塊入銅鍋內再入酒半茶鍾熬成膏勿
冷火大恐傷藥力量可丸取出丸如豆大每丸黃酒化下十歲已上
服二九臨臥時服待其自熱汗出三四服一次重者五七服輕者二
三九熱即退塊亦消消要忌口如服後熱不止可服金花丸如羸弱
不進飲食者可先服平胃散此方極驗

○癩疾方

全蝎去毒斑蝥去頭翅

紅娘子去頭尾足翅方阿魏

雄黃

蘆薈

雄黃

硃砂

蘆薈

木香

木香

當歸尾酒浸二稜醋煮

莪朮醋煮香附米炒

白豆蔻去皮

紅娘子 苦平通血 閉行癩血

羅蔔子各一錢 麝香一分

右為細末醋糊丸如梧桐子大每服三五十九或溫水或酒下壯盛者可服

○癩疾方 ○急性子 鳳仙花子也時珍曰其實如小桃者則通裂去毒

盧薈五分 阿魏五分 急性子即小桃紅 水紅花子一錢 黑白牽牛共

右為細末每服三分黃酒送下三帖全好

○癩疾方

牛黃雄膽各四 血竭一錢 蘆薈四分 盧耳石五分 天竺黃五錢

黃蠟四錢 淨皮硝兩 蜂蜜四兩

右將蠟化開與蜂蜜一處滾熟任火傾入細磁碗內涼冷後將群藥為細末方入蜜蠟內攪勻每日常服先服用筋頭醮吃後多服不怕

水紅花子 即荔枝子也 滿激真 去熱散血消積

十日全消長酸冷油膩之物

○癩疾方

核飛仁一升 栴榔個 礶砂一錢 大黃一兩

右三味為末入棗仁水煮一炷香水滾時陸續入皮硝半斤香尺礶亦盡止食飛仁亦好

○清香散

乳香 沒藥 孩兒茶 輕粉 象皮 燒灰 象牙 煨黃

紅褐燒灰 珍珠煨黃 海巴煨乾各等分

右為細末搽患處立時痛止生肌如神

○瘰癧散

用桃花信一塊桑柴火內燒紅滾入細茶濃酒內如此七次去信將茶滴入雄黃一塊研末入酒內用鷄翎掃患處止痛生肌立時見效

紅褐 大明人曰紅色 羅紗 之類也 海巴 即貝殼 桃花信 何種一 侯信石

○ 尅聖膏

專貼小兒癩塊發熱癩瘦者

木鱉子 穿山甲 川烏 甘丹 甘遂 當歸

右各八錢先用真香油一斤入鍋內將前藥熬成灰濾去渣再慢火熬滴水不散方下黃丹八兩熬滴水成珠方下細藥入內再煎火
蘆薈 阿魏 礞砂 皮硝 水紅花子各五錢 礞砂 三錢 麝香 一錢

右為細末入內攪勻不熬攤為膏藥貼時先用皮硝水洗皮膚以膏貼癩二三日後覺壯因疾作痰四五日發痊糞後有膿血之物是其驗也

○ 抓癬膏 李滄溪傳

香油 半斤 桐油 半斤 生豬腦子 半斤 男子血餘 灰水洗淨不多拘少 杏仁 四兩 白蠟 四錢

右俱下鍋內文武火熬的腦子盡用布絹濾去渣次下飛過黃丹十四兩熬成膏待溫下

胡黃連 香白芷 蘇木 紅花 三稜 莪木各三錢

當歸尾 礞砂 各五錢 麝香 一錢

各為細末照分兩重羅入前項膏內攪勻收貯勿令泄氣如有積塊先用皮硝煎水洗患處令淨次用生姜擦之方用絹帛攤藥貼上貼後用熱鞋底炙熱熨之五七十遍覺內熱方可如貼後癬即消縮如神

○ 灸法

穴在小兒背脊中自尾骶骨將手撮摸脊骨兩傍有血筋發動處兩穴每一穴用銅錢三文壓在穴上用艾炷安孔中灸之壯壯此是癬之根貫血之所灸之瘡即發即可見效灸不着血筋則瘡不發而不

効矣

○化癥如神散 治痞塊積聚

蟾酥

黃蠟各二鈔羊角

牛黃各五分麝香三分巴豆肉一錢

硃砂

冰片各一分

右為末丸如菜子大每用一丸用扁頭針或患處刺破皮入之用膏藥貼上一伏時揭起其熔化膿血出盡服調理脾胃藥

一 小兒患痞癥服檳榔蓬朮枳實黃連之類痞益甚余曰此脾經血虛痞也不可耐伐遂用六君子加當歸數劑胃氣漸復諸症漸愈乃朝用五味異功散加升麻柴胡夕用異功散加當歸為藥而愈益見補

諸熱

小兒諸熱辨例

傷寒熱手足稍冷發熱惡寒而無汗面色青慘而不舒左額有青紋傷風熱手足稍微溫自汗面赤而光

食熱目胞腫右額有青紋身熱而頭額腹肚尤甚夜熱晝涼面黃或吐利腹疼

驚風熱面色青紅額正中有青紋手心有汗時作驚惕手脈絡微動而發熱

風熱身熱倍能食唇紅頰赤大小便秘潮熱如水之潮依時而至

變蒸熱身體上下而蒸熱上氣虛驚耳冷微汗唇上下有白泡狀如珠子重者身熱脈亂腹痛啼叫不能乳食或吐現週歲以後無此症也

潮熱發歇有時驚熱顛叫恍惚夜熱夕發且止餘熱寒邪未去食熱肚

腹先熱，泄熱，帝蒸，汗背熱，下向不正，煩熱，心燥，不安，積熱，煩赤，瘡風熱，汗出身熱，虛熱，困倦，少力，客熱，來去不定，癍熱，涎嗽，飲水寒熱，發如癍狀，血熱，辰巳時發，疹熱，耳鼻大冷，諸熱得之，各有歸其間，有三兩症，交互者，宜隨其輕重而治之。

諸熱為病者，宜清解也。

○大連翹飲 治小兒傷風感冒，發熱，痰壅，風熱，丹毒，腫痛，頸項，有核，頤餘毒，一切熱毒，並治。

連翹 蘼麥 滑石 車前子 牛蒡子 赤芍 各八分

梔子 木通 當歸 防風 各四分 柴胡 黃芩

荆芥 各一錢二分 甘草 一錢六分 蟬退 五分

右到竹葉十個，燈心七莖，水煎，不拘時溫服。○風痰熱，癍蒸，加麥門冬。○寶熱丹熱，加大黃。○胎熱瘡疹，餘毒，加薄荷葉。○痘癍熱毒，加

大黃 芒硝

○五福化毒丹 治小兒蘊積，熱毒，唇口腫，破生瘡，牙齦出血，口鼻，頰赤，咽乾，煩燥，疔疽，疹餘毒，未離，或頭目，身體，多生瘡，癍。

犀角 桔梗 去芦 生地黄 酒洗 赤茯苓 去皮 牛蒡子 微炒 各一兩

連翹 玄參 黑者 粉炒 各六分 青黛 一分 研極細

右為細末，煉蜜丸如龍眼，大每服一丸，薄荷湯化下，兼有驚加朱砂為衣。

感冒

感冒者，宜發散也。

○惺惺散 治外感冒，風寒，鼻塞，痰嗽，發熱。

人參 白朮 白茯苓 桔梗 瓜蒌根 細辛 甘草 薄荷

右劉水煎服

○菴活膏 治小兒風寒外感驚風內積發熱喘促咳嗽痰涎潮熱搐搦并痘疹初作

人參 菴活 獨活 前胡 川芎 桔梗

天麻 各五升 薄荷 地骨皮 各三升 甘草 二錢

右為細末煉蜜為丸如芡實大每服一九薑湯研化下

一 小兒八歲患傷寒頭痛身疼發熱口乾面赤無汗諸醫以傷寒治之百藥無効已經旬日袖手待斃余以龍腦安神丸一服其汗如雨即瘥

一 小兒外感風邪服表散之劑汗出作喘此邪氣去而脾肺虛也用異功散而汗喘止再劑而乳食進 方見補益

一 小兒沉默昏倦肢冷驚悸其紋如弓之向裏此屬胃氣虛而外感寒邪也先用惺二散以解外邪調胃氣諸症頓愈但手足冷又用大君

子湯調補元氣而安果功散六君子湯俱見補益

傷食

傷食者宜消導也

○萬億丸 治小兒乳食生冷所傷發熱腹脹諸症方見通治

○消食丸 又名消乳丸治宿食不消

砂仁 陳皮 三稜 炒 麥芽 炒 神麩 炒各五升 香附 炒一兩

加白朮 炒五錢

右為細末麩糊為丸麻子大食後白湯送下大小加減

○消食餅 治小兒時常傷食皮黃肌瘦肚大腹脹用此焦餅令常食之

蓮肉 山藥 炒 白茯苓 去皮神麩炒 麥芽 炒 扁豆 炒

右各等分為末每四兩入麩一斤水同和烙焦餅用

小兒傷食嘔吐發熱面赤服消導清熱之劑飲食已消熱亦未全
以爲胃經虛熱用六君升麻柴胡四劑而痊

小兒十四歲傷食發熱服消食丸胸腹膨脹發熱作渴此脾氣復傷
也先用四君升麻柴胡飲食漸進用補中益氣湯而愈後因勞心發
熱少食用六君升麻柴胡而愈

小兒傷食發熱抽搐嘔吐喘嗽屬脾肺虛氣虛有熱用六君炒黑黃
連梔子而愈在方俱見補益

腹脹

腹脹者脾胃氣虛也

○消脹散 治小兒腹脹

薤白炒 蘇梗 乾薑 陳皮 枳殼各等分 半升 少許

右劉水煎服食少者加白朮

小兒傷食腹脹胸滿有痰余用異功散而痊後復傷食腹脹作痛或
因藥下之痛雖止而脹益甚更加喘粗此脾胃氣傷而及於肺也用
六君加桔梗調補而痊

小兒傷食服通利之劑作嘔腹脹此脾胃復傷也用補中益氣湯而
愈右方俱見補益

嘔吐

嘔吐者乳食傷胃也

○定吐飲 治吐逆投諸藥不止服此神效

半夏湯泡透切片焙乾 生姜洗淨和 薄桂去粗皮剉二錢

右姜切作小方塊如菘豆大同前半夏和勻入小鍋內慢火順氣炒

令香熟帶乾方下桂再炒勻微有香氣以紙攤開地上去火毒候冷
更搗去黑焦末每服二錢水一盞姜三片煎七分空心少與緩服

○定吐紫金核治嘔吐

丁香 木香 藿香 半夏姜湯泡 人參去芦 白木去芦各

右為末姜汁打糊為丸每核大用沉香朱砂各一錢為衣陰乾每用
一丸用枣一枚去核用藥丸在內姜片夾濕紙裹灰火煨熟去姜紙
嚼服米飲壓之

一 小兒傷食發熱面赤抽搐嘔吐氣喘哮喘此飲食傷脾肺氣虛弱所
致用六君子湯炒黑黃連山梔各二分之劑頓愈亦見補益

泄瀉

泄瀉者乳食傷脾也

○參苓白朮散治脾胃虛弱飲食不進多困少力中滿痞噎心中氣喘
和研

人參 白朮炒 茯苓去皮 山藥炒 甘州各二錢 連肉去心

白扁豆一錢半姜汁浸炒 薏苡仁炒 砂仁 桔梗去芦各乙錢

右為細末每服二錢東湯調下量兒歲加減

○啟脾丸消食止瀉止吐消疳消黃消脹定腹痛益脾健胃

人參 白朮去芦 白茯苓去皮 山藥炒 蓮肉各一兩 山查肉

陳皮 澤瀉 甘州各五錢

右為末煉蜜為丸梧桐子大每服二三十九空心米湯下或米湯研
化服亦可小兒常患傷食服之立愈

○一方益元散加白朮末二兩每服一錢米湯調下止小兒泄瀉殊
效

○一方治瀉泄用柿餅燒熟食之即止

○治小兒水泄不止

五倍子為細末陳醋調稀熬成膏貼臍上即止

○水瀉痢疾方

生姜四兩 真香油四兩 黃丹二兩 熬成膏藥貼臍立效

一 小兒飲食後即瀉先用六君升麻神麩山查而止又用五味異功散加升麻而痊後吐瀉腹痛用保和丸二服又用異功散調補脾氣而安

一 小兒傷食作瀉腹脹四肢浮腫小便不利先用五苓散原見中是

加木香旬餘諸症漸退又用五味異功散為主佐以加減腎氣丸又旬日一使調和飲食漸進浮腫旋消乃以異功散調理而安

一 小兒因驚又瀉面色青黃余謂肝木勝脾土也朝用補中益氣湯又

用五味異功散加水香子母俱服而愈

一 小兒久瀉兼脫肛小腹重墜四肢浮腫面色痿黃特或兼青諸症到口即嘔吐審乳母憂鬱傷脾大便不實先用補中益氣湯五味異功散及四神丸調治其母不兩月子母並愈右方俱見補益

吐瀉

上吐下瀉者脾胃俱傷也

○白朮散治吐瀉或病後津液不足口乾作渴扶胃生津止瀉痢將欲成慢驚風者

人參去芦 白朮去芦 茯苓去皮 藿香 木香 乾薑 甘草各等分

右剉劑水煎服○若小兒類瀉痢將成慢驚加山藥扁豆肉豆蔻煨各一錢 姜一片水煎服○若慢驚已作加細辛天麻各一錢 全蝎

三個白附子八分煨○若冬月小兒吐乳多是胃寒胃虛所致加丁香三粒○如胃虛不能食而大渴不止者不可用淡滲之藥○胃中元氣少故也以此湯補之加天花粉○若能食而渴者白虎湯加入參○如中氣虛熱口舌生瘡少喜飲冷服之即効

○燒針丸治小兒吐瀉

黃丹 朱砂 白礬枯過

右為末束肉為丸如黃豆大每服三四丸散針尖上燈燭上燒過

米泔研爛調服瀉者食前吐者無拘時外用藥豆粉或鷄子清作膏如吐瀉而脚心如瀉奎顯明上正則去之

○又方治吐瀉

四君子湯加藿香陳皮丁劑而愈

○助胃膏治元氣脾胃虛弱吐瀉不止不思飲食及久瀉虛寒

人參 白朮去苳 茯苓去皮 甘草炙各二錢半 白豆蔻去壳 木香

山藥炒 五肉豆蔻 麩炮 飽煨 砂仁炒 二十丁香 官桂

藿香各 三陳皮五錢

右為細末煉蜜為丸彈子大每服一丸米湯化下

○秘方治小兒水瀉

白礬黃丹各五錢用葱白同搗爛塗臍上即止

○治小兒吐瀉

小丁香 陳皮各等分 水煎溫服

一 小兒數歲間每稔食輒服較利之藥後肚腹膨脹嘔吐泄瀉

先用六君子湯諸症漸愈又用補中益氣湯而安

一 小兒腹脹食後即瀉手足逆冷此脾氣虛寒也先用八參理中丸後

用六君子湯而愈

一 小兒吐瀉乳食色白不化露睛氣喘此脾肺不足形病俱虛也先用

異功散加桔梗柴胡頓愈再用補中益氣湯而安
 一 小兒因驚吐瀉腹脹先用六君木香柴胡治之稍可又以五苓其功
 散而愈後因驚搐甚或用鎮驚化痰之藥倦怠不食而泄益甚先
 用異功散加木香釣藤鈎四劑而愈方俱見補生血
 一 小兒面黃肌瘦泄瀉無度腹脹如鼓不思飲食百藥不効予教用好
 生白朮酒磨濃汁以溫酒調空心服二三日即愈

痢疾

東垣云白者濕熱傷氣分赤者濕熱傷血分赤白相雜氣血俱傷也
 痢者腹中食積也
 ○ 萬億丸 治小兒下痢赤白腹痛起者一服即愈
 ○ 一方治小兒痢用鷄子一個冷水下鍋煮一二沸取出去白用黃研

細茶即其茶
 細茶即其茶
 細茶即其茶

碎以生薑汁半小鍾和勻與兒食之此茶
 ○ 姜茶煎 治痢疾腹痛不問赤白冷熱皆可服之
 若姜切片三錢細茶三錢用新汲水煎服
 ○ 一方用生薑細茶連根菲菜三味同搗爛取汁酒調服立止
 ○ 仙梅丸 治痢疾發熱渴者
 細茶 烏梅 水洗剝去核曬乾為末用生蜜搗作丸彈子大每
 丸水冷熱隨意化下
 ○ 鐵門栓 治赤白痢疾五種泄瀉
 文蛤炒黃色 白礬半生半煨 黃丹 二錢
 右為細末黃蠟一兩溶化為丸如棗豆大每服大人十五丸小兒五
 七丸茶一錢姜一錢煎湯下

瀉痢方

瀉痢方

五倍子炒黃色為末烏梅肉水浸為丸如彈子每服五粒刺冷米湯下赤痢姜湯下水瀉冷水下

○水瀉痢疾方

飛白礬錢一丁香五分共為細末水瀉白水下痢疾黃酒下

○石蓮散治小兒噤口痢嘔逆不食神效

石蓮肉炒去心

右為末每服一二錢陳倉米飲調下如嘔加生姜汁二匙同服一方

山藥末半生半炒米飲調下

○香連丸

黃連十兩用茶葉五兩水拌濕入磁器頓滾湯中半日炒焦黑 米香二兩

右為末醋糊丸如赤豆大每服一二三丸白湯下

○固腸丸治紅白痢日久不止

鳳眼丹 備方曰鳳眼丹 係椿楮上藥 生莖也

黃蠟一兩 黃丹一兩 飛共化一處為丸如黃豆大每服三丸如紅痢茸

草白痢乾姜紅白痢茸山乾姜湯下空心服

○治水瀉痢疾用鳳眼山蜜水炒為細末每服一錢水煎空心服立止

一小兒患痢脫肛色赤或痛用補中益氣湯香連丸而愈後傷食作

瀉復脫肛不入仍用前湯更以葶麻仁研塗頂門即愈

一小兒患痢口乾發熱用白朮散煎與飲時與白朮散送下香連丸

而安

一小兒久痢裏急後重欲去手足並冷此胃氣虛寒下陷也用補中益

氣湯加木香補骨脂倍升麻柴胡而愈

瘧疾

瘧者膈上痰結也

芫花苦寒能
消痰逐水
逐濕止咳痰

○萬應丸方見通治

○芫花散治小兒瘧疾

芫花根為末每用一二分三歲兒用三分以鷄子一個去頂入末攪
勻搗細頂口外用濕紙封裏炭火煨熟罈貯

○天靈丹

天靈蓋燒存性為細末每服五厘真酒調下立止

○消癖丸治瘕母停水結癖腹脇堅痛

芫花炒 朱砂各等分

右為細末煉蜜為丸小豆大每十九丸湯送下

祝由科治瘧疾不愈

咒曰 吾從東南來

九頭十八尾

路逢一池水

水裏一條龍

問伊食甚的

只喫瘧疾鬼

右念一過吹在果子上念七遍在上令病人於五更鷄犬不聞時而

東而立食訖於靜室中安困忌食瓜果膏肉熱物此法十治八九無

藥處可以救八果者謂杏栗之類

一小兒先因停食腹痛服峻厲之劑後患瘧日晡而作余以為元氣下

陷欲治以補中益氣湯不信泛行清熱消導前症益甚食少作瀉余

朝用前湯夕用異效散加當歸日餘而愈

一小兒每于前寒後熱久不愈用六君子加炮姜為末實大每服一

丸旬餘而愈方見補益

咳嗽

咳嗽者肺傷風也

○參蘇飲治小兒四時感冒發熱頭痛咳嗽喘急痰涎壅盛鼻寒舌重
涕唾稠粘及內傷外感一切發熱喘嗽

萬應丸

卷之七

二二

中
外
箱
三

紫蘇 陳皮 前胡 桔梗 半夏姜汁炒 白茯苓去皮

乾葛 枳殼麩炒各等分 甘草 人參二味減半 木香許

右剉生薑二片水煎食後服○若肺實有邪去人參加黃芩桑白皮

杏仁去皮

○參花散 治咳嗽發熱氣喘吐紅

人參 天花粉 各等分 為末每服五分蜜水調下

○蜜梨喻 治咳嗽痰喘

甜梨一個刀切勿斷入蜜於內麩裹灰火煨熟去麩吃梨

○一方治小兒喉中痰壅喘急

用巴豆一枚去殼搗爛作一丸以綿花包裹男左女右塞鼻中痰即

墜下

○一方治傷寒潮熱痰咳 男婦小兒皆可用

替射金 三錢 石膏 一兩煨過

右共為末每服一二匙清茶送下

一 小兒傷風咳嗽發熱服解表之劑加喘促出汗余謂脾肺氣虛欲用

補中益氣湯加五味子補之不信乃自服二陳桑皮枳殼而發搐痰

湧仍用前藥加鉤藤鈎而痊

喘急

喘急者痰氣盛也

○一捻金 治小兒風痰吐沫氣喘咳嗽肚腹膨脹不思飲食

小兒肺脹喘嗽

人參分兩等分

每將一字上咽喉

多人看作風候

五味研成細末

不用神針法灸

大黃棋榔牽牛

蜜水調量稀稠

○其症肺脹喘滿胸膈氣急兩脇攪動墮下作坑兩鼻竅張悶亂嗽渴聲啞不鳴痰涎潮塞俗云馬脾風若不急治死在旦夕也

○治小兒喉中痰壅喘甚

用巴豆一粒搗爛作一丸以綿花包裹男左女右塞鼻痰即墜下効

一 小兒患喘服發汗之劑汗出而喘益甚用異功散頓愈又用六君子湯而全愈 方見補益

一 小兒有哮喘病其母遇勞即發兒飲其乳亦嗽用六君桔梗桑皮杏仁治之母子並愈 方見補益

小兒初生雜病

一 小兒初生宜先濃煎黃連甘草湯慧用軟絹或絲綿包指蘸藥搨出口中惡血倘或不及即以藥湯灌之待吐出惡沫方與乳吃今出痘

細辛藥兒衣也亦稀少方

裙俗舊字襖來屬也

一 初生三五月宜細縛令臥勿堅頭抱出免致驚癇

一 乳與食宜相遠不宜一時混吃令兒生疳癖痞積

一 宜用七八十歲老人舊裙襖改作小兒衣衫直氣相滋令兒有壽富貴之家不宜新製紵絲綾羅氈絨之類與小兒穿不惟生病抑且折福

一 小兒生四五個月止與乳吃六個月以後方與稀粥哺之周歲以前切不可吃暈腥拜生冷之物令兒多疾若待二三歲後臟腑稍壯纔與暈腥方好

延生第一方 小兒初生臍帶脫落取置新瓦上用炭火四圍燒至烟將盡放土地上用瓦爇之類蓋之存性研為細末預將朱砂透明者為極細末水飛過膠帶若有五分重朱砂用二分五厘生地黃當歸

身煎濃汁一二碗，調和前兩味，抹兒上，臍間及乳頭上，一日之內，晚至更次，日大便遺下穢污濁垢之物，終身永無瘡疹及諸疾，生子則得一子，十分妙法也。

條穢免痘湯

用練樹子一升，至正月初十日，子時，父母只令一人，知將練子煎湯，待溫洗兒全身頭面，上下以去胎毒，洗後不出痘疹，如出亦輕，或只三五顆而已。

○一方用五六月間收絲瓜小三蔓，藤陰乾，約一兩半重，收起。

○一方用葫蘆上，藤蔓如前法亦可。

○稀痘萬金丹 治嬰兒未出痘時，胎毒在臟腑，因時氣而發也。如在春氣身一發，熱即磨服一丸，毒從大便而出，痘有黑陷，倒靨，化下，下九即起死回生，如痘發至七日，若服恐泄元氣，修合者不可加戒，以取

効不

樺皮 樺木之皮也

麻黃根

升麻 各一兩

羌活

樺皮

茜草根

括麥根

苗中根 時珍曰

鼠粘子 炒

天麻

連翹 各一兩

當歸

芍藥

川芎 各七

子

苗根 色赤而氣

右剉作片，用冰五升，煎至半升，去渣，入銀器內，以湯蠟成膏，入煉蜜少許，調勻，入後藥。

朱砂 五不

冰片

雄黃 各五

蝦蟆灰 半

射香 七分

全蝎 十四個

分

蝦蟆 研碎 取蝦蟆

右為末，入煎藥和勻，分作十丸，以蠟封之，如彈子大，每服時，猪心血或兔血調勻，熱酒調下，溫服。

初生小兒口脣并牙根生白點，名馬牙，不能食乳，此與鵝口不同，少緩即不能救，多致大傷，急用針縛筋頭上，將白點挑破，出血，用好京墨磨薄荷湯，以手指捻母油頭髮，蘸墨遍口脣擦之，勿令乳食待醒，一時醒方與乳食，再擦之。

小兒不時變蒸者，異常也，蒸者發熱也，所以變換五臟蒸養六腑，須

涌芦一名野蒲
時效曰屋之西北黑
處謂之涌凡物
黑色謂之蓋此
秋後即黑里
象中故名

要變蒸多變氣血方榮骨脉始長情性有異則後來出痘輕可凡變
蒸不宜服藥或因傷食因傷風因驚嚇等填夾雜相值而發令人疑
或亦須守候一二日俟病勢真的是食則消食是風則治風是痰則
行痰是驚則安神若變蒸而妄投藥餌則為藥引入各經症遂難識
而且纏綿不脫反為藥所誤也
一 小兒月內發搐鼻塞乃風邪所傷以六君子湯加桔梗細辛子母俱
服更以葱頭七葉生姜一片細搗攤帛上合置掌中令熱惡貼額門
少頃鼻利搐止
一 小兒未滿月發搐嘔乳腹脹作瀉此乳傷脾胃用五味異功散加滌
芩令母服之子亦服是許遂愈

小兒雜病

胎熱胎寒者稟受有病也

○胎熱 小兒生下身熱面赤眼閉口中氣熱焦喘燥熱

甘草一錢 黑豆二錢 淡竹葉 五個

右剉一劑燈草七根水煎頻服少進令乳母多服

○胎寒 母身起寒時受寒兒生下面色青白四肢厥冷大便青黑口冷腹痛

當歸炒 黃芪 蜜炒 桂心 黃芩炒 細辛 龍骨 細研

白芍 煨各 右為細末每服一字以乳汁調下

臍風撮口者胎元有毒也

○臍風 多因斷臍之時被風濕所乘或者胎元稟有熱毒則兒下胎時
而氣行至此者必死於青筋初發急用灯心蘸油於燈上煎青筋頭并
其胎毒也 以世
○五通膏 治小兒臍風撮口

○五通膏 治小兒臍風撮口

生地黄 生姜 葱白 蘿蔔子 田螺肉 各五分

右件共搗爛搭臍四圍一指厚抱任一時許有屁下泄而愈

○治小兒斷臍不如法七日內有風出用直姜蚕二三條炒去絲為末

蜜調敷口或乳頭上帶下亦可

○香螺膏 治臍風腫硬如盤

田螺二十個入射少許搗爛搭臍上須臾再易腫痛立消

○宜風散 治初生兒臍風撮口 嘔喘不乳口出白沫

全蝎二十個頭尾全者去射香一字另研

右同和勻細末每用半字金銀煎湯調服

○撮口 由胎氣挾熱風邪入臍毒流心脾之經故令舌強唇青聚山啼

聲不出當視其齒齦之上有小泡子如粟米狀急以溫水蘸綿衣裹指輕二擦破即開口便安甚者用牛黃一分將竹瀝調滴入

且即愈

胎驚夜啼者邪熱乘心也

○胎驚宜

○鎮驚散 治小兒在胎中受驚故生心未滿月而驚者神效

朱砂研細入牛黃少許取猪乳汁調稀抹入口中入射少許神效

○夜啼宜

○花火膏 治邪熱相乘焦燥夜啼

燈花三顆以乳汁調抹兒口或抹母乳上太兒吮之

一方用燈心燒灰傳乳上令兒吮之

一方加朱砂一字共研末用白蜜調待睡抹兒口內

○蟬花散 治小兒夜啼不止狀若時驚

蟬退七個下半截為細末用薄荷湯調丸好酒少許食後服或者不

信將上半截為末依前法服復啼如初古人立法真知其妙小兒觸

犯禁處而夜啼者宜醋炭薰服蘇合香丸

中惡

○一方用火葉頭丁個長四五寸削平面用朱砂為云撥火杖撥火杖將末提神將捉着夜啼兒打殺不要放急二如律令
●小兒夜啼不止將朱砂書甲寅二字貼赤頭即止
中惡天吊者身犯邪氣也

○中惡宜

○辟邪膏治小兒卒中惡毒心腹刺痛悶亂欲死等症

降真香 白膠香 沉香 虎頭膏 鬼臼 龍膽草

人參 白茯苓 各五錢

右為細末入雄黃半兩射香一錢煉蜜為丸乳香湯下

○天吊宜

○鈎藤散治小兒天吊潮熱

鈎藤 人參 犀角 鏘屑 各五錢 全蝎 天麻 各二錢

天吊

降真香 白膠香 人參 白茯苓 各五錢

鵝口瘡

甘草 一錢半 右剉一劑水煎服

鵝口二瘡者胃中濕熱也

○牛黃散治小兒口中百病鵝口口瘡重勝不能吮乳及咽喉腫塞

牛黃 冰片 硼砂 辰砂 研各一分 雄黃 青黛 各二分

牙硝 一分 黃連 一分 黃柏 未八分

右共入乳鉢內研末勻每服用少許敷入口內

○瀉心湯治小兒口瘡

淨黃連為極細末蜜水調服

○一方治小兒口瘡用黃丹巴豆仁同炒焦去豆用搽口瘡上立愈

重舌木舌者脾經實火也 附弄舌

○重舌 乃舌下生舌也宜

○當歸連翹湯治小兒心脾有熱舌下有形如舌而小者名曰重舌

當歸連翹湯

治小兒心脾有熱舌下有形如舌而小者名曰重舌

重舌

歸尾 連翹 白芷各三錢 甘草各一錢

右剉劑水煎食後頻服

○千金方 治重舌

竹瀝青 黃柏末 二味和勻無時點舌上即退

○又方用蒲黃塗之即瘥

○又方用百草霜芒硝滑石共為末酒調敷之

○又方用膽礬研細敷之

○木舌 乃腫硬不柔也宜

○雪硝散 治木舌

朴硝 五錢 真紫雪 二分 鹽 半分

右為末入竹瀝二三點用白湯調敷 煎津無妨

○寫黃散 治小兒木舌弄舌

木舌

走馬牙疳

藿香葉 七分 山梔 一錢 軟石膏 五分 防風 三分 甘草 七分半

右剉一劑水煎服不拘時飲

走馬牙疳者氣虛濕熱也

○立効散 治走馬牙疳

青黛 黃柏 枯礬 五倍子 末各一錢

右研細末用米泔水先繳口內粘貼患處

○清胃升麻湯 治小兒齒腫流涎腮腫馬牙疳王陽明之熱

升麻 川芎 白芍 半夏 湯泡各乾葛 防風

黃連 酒炒 生甘草 各五分 軟石膏 煨一錢 白朮 七分

白芷 三分

右剉一劑水煎食後熱服能瀉即含漱而吐之漱藥不用白朮半夏

愛吃泥土者脾臟生疳也

清胃升麻湯

卷之二

三十

桔梗三升 防風 荆芥 薄荷 黃芩 其外各一錢

右剉一劑水煎食後頓服溫服

○碧雲治心脾積熱上攻咽喉腫痛閉塞水漿不下或生瘡癰重舌木

碧雲真青黛 礞砂與煇硝 蒲黃其外未生 等分搽咽喉

腫痛者火盛也

○煇毒膏治嬰兒患眼腫痛

用熟地黃一兩以新汲水浸透搗爛貼脚心布裹住有效

○通天散治赤眼暴發腫苦痛

苦硝五小 雄黃二小 共為細末吹入兩鼻內流水雙目流淚即

效

膿耳者腎氣熱衝也

○羽澤散治耳中出膿或疼癢或出冰

眼目

碧雲 是部非
藥名方名也
中碧雲多矣
文也

胭脂耳子解
毒毒活血

枯礬少許為細末吹入耳中即愈

一方用抱出鷄卵皮炒黃色為細末香油調灌耳內即時疼止

一方用五倍子燒存性為末吹入耳亦效

○黃龍散治停耳小兒因沐浴水入耳中水濕停留搏於血氣醞成

枯礬 龍骨炒 黃丹 水飛 胭脂燒灰 射香少許 海螵石

右為細末先將帛條乾濃水後以藥摻入日日用之勿令入風

○治停耳膿耳不問新久痛不止用黃蠟如皂角子大搓成條外用好

綿又搥熟裏蠟條火燒着烟薰患處痛止在薰

鼻瘡者風濕氣攻也

○鼻瘡熱壅傷肺又王氣通於鼻風濕之氣乘虛客於皮毛入於血脈

散王澤瀉散治鼻瘡

澤瀉散

澤瀉 鬱金 山柰仁 其用 各一錢

右為細末用其前湯調食後服

頭瘡者熱毒也

○一掃光 治小兒頭上肥瘡或多生蟲子搽成瘡膿水出不止

細茶 水銀 牙皂 花椒 各二錢

右為細末香油調搽

○臘油膏 治小兒頭瘡 水銀 各等分

臘猪油 半生半熟 雄黃

右研三味和勻先將水洗淨濃汁後敷藥

臍瘡者風濕也

○枯礬散 治小兒因臍外傷於風邪以致臍瘡不斂

枯礬 龍骨 各五分 共為細末每用少許乾搽臍上

臘猪油 即取
十二月 猪油也

瘡

小兒臍中汁出并痛用枯礬末乾敷或黃柏末傳之文蚕繭空燒灰
存性搽之亦可

諸蟲痛者胃氣傷也

○追蟲散 治小兒蟲積痛凡腹疼口中出清水者蟲積也

史君子 用肉五分 檳榔 一水 右製為一劑水煎食遠服

一方用史君子 一水 檳榔 一水 雄黃 五分 俱為細末每服一錢若練

根煎湯調下

○靈礬散 治小兒蟲咬心痛飲絕

五靈芝 末二水 枯礬 五分 共為末每服二錢水煎不時服當出

出蟲即愈

○練陳湯 治小兒蚘蟲

歌曰 蚘蟲出口有三般 口鼻中來大不堪

諸蟲

廣濟回春

卷之二

如或白蟲兼黑色 靈丹縱服病難安

苦練根皮二升 陳皮 半夏 茯苓各一升 甘丹五分

右剉一劑生薑煎服

○錢氏白朮散 治小兒冬月吐乳多是胃寒胃虛所致

人參去芦 茯苓去皮 藿香 木香 甘丹各二升 白朮去芦

丁香二粒 乾葛二升

右剉每服一二錢水煎溫服

尾骨痛者陰虛病也小兒尾骨痛乃是陰虛痰火所致若陰虛而痛者宜補陰降火湯 宜化痰降火湯主之

宜化痰降火湯主之

○補陰降火湯 治陰虛尾骨疼痛

當歸 酒洗 川芎 白芍 酒炒 熟地黄 酒蒸 黃柏 酒炒 知母 酒炒各

右剉少用官桂為引或以前胡木香為引如痛不止加乳香沒藥

化痰降火湯 治痰火尾骨節痛

陳皮去白 半夏製 姜汁 茯苓去皮 澤瀉 黃柏 酒炒 知母 酒炒

車草各等

右剉必用前胡木香為引蓋陰虛故痰盛也

若痛不止加乳香沒藥

陰腫癰氣者寒所鬱也

秘方 治小兒偏墜氣痛 五筒子燒存性為末以好酒調服出活立愈

又方 治小兒外腎腫大 牡蠣不拘多少為末用鷄子清調塗上即消

又方 治陰囊忽腫或坐地多時或風邪或蟲蟻咬者

蟬退半兩水一大碗煎湯洗腫處其痛立止若不消再煎再洗後服

五苓散燈草煎服

○又方用葱園內蚯蚓糞以甘草汁調塗腫處或薄荷汁調亦可

老樹木 即梓
老料也

盤腸氣痛

仙傳方治風熱外腎癰赤腫痛日夜啼叫不數日退皮如雞卵殼愈而復作用老杉木燒灰入膩粉清油調傳患處即效

盤腸氣痛者風冷所搏也小兒盤腸氣者則腰間乾嘔額上有汗是也

兒為多氣所搏而然其口閉胸急或大便青

絕不實上唇乾者是也此多因生下洗遲感風冷而致也急用葱湯淋洗其腹極急發熱騰腹間良久尿自瀉出其痛自止宜服乳香散

乳香散 治盤腸氣痛

乳香 沒藥 各等分

共為細末以木香煎湯調服

脫肛者大腸虛滑也

一小兒脫肛皆因父患瀉痢所致大腸頭自糞門出而不收宜用葱湯薰洗令軟送上或以五神子為末敷而煇托入又以梧子煎湯洗亦可又以蠶頭燒存性香油調敷一云以此物燒烟薰之父自收又以陳壁土泡湯先薰後洗亦效

脫肛

沒石子 本名無
食子也 味苦
氣溫 益血生
精 烏髮 頭發

提肛散 小兒大腸氣虛出門脫出

龍骨 二錢 訶子 炒去核 沒石子 赤石脂

嬰粟殼 去蒂穰醋炙各等分

右為末用米飲調食前服仍將葱湯薰洗令軟款款托上

一方用葶麻子搗爛貼頂上腸收即去之

脫肛洗藥

苦參 五倍子 陳壁土

右等分水煎湯洗次用木賊末搽上

遺尿者膀胱冷弱也

遺尿者膀胱冷弱也 猪胞 猪之膀胱也 日曬乾能水煎調也

雞脬散 治小兒遺尿

雞脬 一具 雞腸 一具 燒存性 猪胞 炙焦 右為末每服一錢黃酒調服男用雌女用雄

雞脬 雞之膀胱也 雞腸 雞之腸也

遺尿

卷之二

○破故帛散

破故帛一兩炒為末每服一錢熱湯調下

○桂肝丸 治小兒睡中遺尿不自覺者

官桂為末雄雞肝一具等分搗丸如小豆大溫水送下每日進三服

尿濁者濕滯脾胃也

○澄清飲 治小兒大便白小便濁或澄之如米泔

白朮 茯苓 白芍炒 黃連 姜汁澤瀉 山查各一錢

青皮 四分 甘草生三

右剉一劑水煎空心服

便血者熱傳心肺也凡初生嬰兒七日之內大小便有血出者此由胎氣熱盛之所致也謂母食酒麵炙煖熱毒等物流

入心則兒在胎內受之熱毒亦傳於心肺且女子熱入心故小便有血男子熱入於肺故大便有之治法以生地黃取自然汁入蜜少許和勻溫服男女皆效或特露飲煎服尤效

○甘露飲 治小兒胃中客熱牙宣口臭齒齲腫爛時出膿血飢飽不欲飲食及目赤腫痛不在京藥口舌生瘡咽喉腫痛及身面黃敗赤微腫大便不調小便赤澀並治

熟地黄 生地黄 酒洗 天門冬 去心 麥門冬 去心 枳殼 炒 茵陳

黃芩 酒炒 枇杷葉 石斛 其外各等分 右剉水煎食後臨

臥服

一方用生蒲黃油頭髮燒灰各一錢為末生地黄汁或米飲乳汁調同服

下淋者膀胱鬱熱也

○五淋散 治膀胱有熱水道不通淋瀝不出或尿如豆汁或如沙石或

赤茯苓 六分 赤芍藥 山梔仁 各二分 條黃芩 三分 當歸

其外各五分 右剉劑每服三錢好酒一團水煎服

一方有生地澤瀉木通滑石車前各二錢

高麗國春 卷之三

吐血者榮衛氣逆也

○黃金丸 治小兒吐血衄血下血

黃芩不拘多少為末煉蜜為丸如鷄頭突大三歲兒每下九粒湯化下

○栢枝散 治小兒衄血吐血

栢枝 晒乾 藕節 晒乾 各等分為末三歲者服半錢藕汁和蜜一匙

調白湯下

○一方用山梔子炒黑每用二錢生姜煎服

○又方 治咯血吐血衄血 用白芍藥為末磨犀角汁調服

○一方 治小兒吐血不止用黃連末一錢豆豉二十粒水煎溫服

小便不通者膀胱熱也

○神通散 治小便緊急不通或去血

藕節 晒乾 口鼻出血不止 治之

豆豉 豉得麥

則能汗得鹽

則能吐得酒

則治風得藥

止而熱則又能

止所以

小便不通

兒茶 孩兒茶也 苦澀平清工和 化痔生津 本出 部

大便不通

小便閉澀不堪言

扁蓄煎湯來送下

為用兒茶末一錢

霎時溲便湧如泉

○五苓散

猪苓 澤瀉 茯苓

白朮 各等分官桂 減半

右剉一劑水煎食前服加車前子灯草尤効

大便不通者臟腑熱也

○萬應丸 治大便不通如神

○沒藥散 治小兒風與熱泄瀉留蓋上一焦胸膈高起大便不通

沒藥 大黃 枳殼 炒 桔槔 各二錢 木香 甘草 各一錢

右剉每服一錢姜三片水煎服

○治新生小兒三五日不大小便葱汁入乳各半調勻抹在口鼻

乳帶下即通

○掩臍法 治小兒大小便不通

取連根葱白一莖生薑一塊淡豆豉二十粒鹽一小匙同研爛置作餅子貼臍中烘熱貼之用線紮定良久氣透自通不通再易一餅

○二妙散 治小兒大小便不通

六七月間尋常糞中有塊唧不拘多少用線串起陰乾收貯用時取一個要全者於淨礮上四面以灰火烘乾以刀從腰切斷如大便閉用上半截小便閉用下半截二便俱閉全用為細末新汲水調服水腫者土虧水旺也

○加味五皮散 治小兒四肢腫滿腸水陰水皆可服

五加皮 地骨皮 生薑皮 大腹皮 茯苓皮 各一錢
加薑黃 木瓜 各一錢
右剉一劑水煎服○一方去五加皮換陳皮桑白皮

○牽牛散 治小兒諸般腫脹

黑牽牛半生半炒取頭細末每服一二匙桑白皮煎湯磨末香汁調服黃疸者脾胃濕熱也

○茯苓滲濕湯 治小兒黃疸熱喘吐瀉飲冷水身體面目俱黃

茯苓 茵陳 山梔 黃連 黃芩 防己 白朮
蒼朮 陳皮 青皮 枳殼 猪苓各一錢 澤瀉二分
右剉水煎徐溫服○如小便不通加木通○如食傷不思食加砂仁神麩炒麥芽炒

汗者陰陽偏勝也

○團參湯 治小兒虛汗或心血液盛不發為汗此藥收斂心氣

新羅人參 川當歸各三錢

右細剉用雄猪心一個切三片每服二錢猪心一片并水一盞半煎

食前作兩次服

○止汗散 治小兒睡而自汗

故蒲扇灰 如無扇只將曹蒲燒灰為末溫酒調服

○牡蠣散 治小兒汗因食生冷之物過度或熱水淘飯大能損土為

牡蠣 煨二錢 黃芪 蜜炙 生地黃 各一兩 右剉劑水煎服

斑者陰陽毒氣也

○治小兒身常發熱風斑及脚指常紅腫此脾經風熱也用防風通聖

散去硝黃加鼠粘子酒炒黃連為末亦用防風白芷薄荷黃連黃芩

黃芪黃柏煎湯送之宜避風

解顧鶴節者胎元不全也

○解顧宜 小兒顧鶴節之合丸

○八物湯 有熱加酒炒黃連黃芩甘草水煎服外絹帛膠束及以白

鹿茸 牛溲毒
虛勞止 四氣毒
痛破 血壯

鶴節 痲源

云小兒稟生血
氣不足之部肌
肉肢作紫如二
瘦皆 筋骨垂
于 筋之筋之

芫末敷之

○人參地黃丸 治小兒顧顧開無頭縫不洽此乃腎氣不成腎主骨髓

人參 二錢 懷熟地 四錢 嫩鹿茸 乾山藥 白茯苓 去皮

牡丹皮 山茱萸 去核各三錢

右為細末煉蜜為丸芫實大用大參煎湯研化食遠服

○鶴節宜

○當歸地黃丸 治小兒血氣不充故肌瘦薄骨節呈露如鶴之膝

懷熟地 酒蒸 山藥 酒蒸 山茱萸 酒蒸 去核 澤瀉 去毛 牡丹皮 去梗

白茯苓 去皮 當歸 酒洗各三錢 一方加鹿茸 酥炙 牛膝 酒洗各二

右為末煉蜜為芫實大每用熟水研化食前服仍以天南星炮去皮

臍研細末入米醋調敷緋帛上烘熱貼之亦良法也

行遲髮遲者氣血不充也

行遲宜

○調元散 治小兒稟受元氣不足顯瘦開解肌肉消瘦腹大而腫語遲行遲手足如箇神色昏慢齒生遲

乾山藥 五錢 人參 去蒸 茯苓 去皮 茯神 各二錢 白朮 二錢半

石菖蒲 一錢 白芍 炒 熟艾 當歸 川芎 黃芪 各一錢半

其少 各一錢半

右劉生姜三片束一枚同煎不拘時服嬰兒乳母同服

○錢氏地黃丸 治肝腎虛弱骨體不充不能行依本方加酒炙鹿茸牛膝五加皮同服自然強生而骨強即能漸行也

語遲者邪乘心也

○菖蒲丸 治小兒語遲

石菖蒲 人參 麥門冬 泡去 川芎 遠志 其少水泡去心

當歸 乳香 硃砂 另研各一錢

右為末煉蜜丸黍米大每服十丸食遠粳米飲送下

齒遲者腎不足也

○芝窮散 治小兒齒遲

川芎 乾山藥 當歸 白芍 炒 甘草 各二錢半

右為細末每服一錢白湯調下食後服將此乾藥末擦牙齦即生

龜胸者肺熱脹滿也

○龜胸丸 治小兒龜胸高如覆掌

川大黃 煨 六 天門冬 去心 百合 杏仁 去皮尖 木通 去皮 枳殼 炒

桑白皮 蜜炙 甜葶芳 炒 隔布 軟石膏 各一錢

右為細末煉蜜為丸如菉豆大每服五丸溫水化下食後臨卧服仍

宜多兩乳前各一寸半上兩行二膏間六處各灸二壯春夏從下灸

起秋冬從上灸起依法灸之

龜背者風邪入脊也 小兒背脊高如龜背者為龜背也

○龜背丸 治小兒龜背

枳殼 煑炒防風 去芦 獨活 麻黃 去節各三錢

大黃 煨 前胡 去芦 當歸 各三錢

右為細末 麵糊丸黍米 大每服十五六丸 看兒大小 以米飲下 食後服 仍灸肺俞穴 在三椎下 兩傍各一寸半 心俞穴 在五椎下 各一寸半 膈俞穴 在七椎下 兩傍各一寸 各灸三壯 以小兒中指節為一寸 文炷如小麥大 但灸三壯而已

小兒行遲齒遲解顛顛填五軟鶴膝腎疳齒豁睛白多愁凡此皆因稟受腎氣不足當以六味丸加鹿茸補之若因精氣未滿而御女以通多致頭目眩暈作渴吐痰或發熱足熱腰腿酸軟或自汗盜汗一便瀉癩變生諸疾難以名狀余常用六味八味二丸及補中益氣之劑加減用之無不奏效方見補益

一 小兒五歲不能言咸以為廢人矣但其形色悉屬肺腎不足遂用六味丸加五味鹿茸及補中益氣湯加五味兩月餘形氣漸健將半載能發一二言至年許始聲音如常方見補益門

痘瘡

小兒痘疹何以知腮赤眼胞赤赤時呵欠噴嚏及驚悸耳尖手指冷如冰證作三日瘡不見升發之藥不可遲敗毒腐根堪選用解熱表汗最為宜寒涼之劑慎勿用臟腑一動致災危

小兒患痘瘡臟腑虛寒者見証 已服寒涼藥

惡寒	寒熱往來	自汗惡風	手足厥冷
面青	面色皸白	目睛青色	糞色青白
体淨	急隨嗜睡	二便清利	吐瀉不瀉

初起發熱
初起發熱
初起發熱
初起發熱
初起發熱
初起發熱
初起發熱
初起發熱
初起發熱
初起發熱

昏睡	口鼻氣冷	飲食不進	乳食不化
腹脹	聲音微弱	足脛冰冷	精神懦弱
嘔吐	吐乳瀉滑	脈浮細而虛	脈沉細而遲
面赤	大便閉	身體壯熱	毛焦膚燥
唇紫	小便赤	手足極熱	驚悸譫語
眼黃	足氣熱	吐利而渴	狂亂吐衄
鼻塞	流清涕	大便焦黃	腹脹不食
頭痛	身背痛	煩燥痰壅	胸膈痞悶
喉乾	咽乾燥	咳嗽喘促	上下失血
脈浮數而實	脈沉實而數	起張	行聚

痘有十候
發熱
初出
見點
出齊
起泛
行聚

口鼻膿

漿足 回水 收斂 結痂 還元

○初發執宜

○加味敗毒散 初起發熱即服此藥神效

柴胡 前胡 羌活 獨活 防風 荆芥 薄荷
枳殼 桔梗 川芎 天麻 地骨皮
右古方除參苓恐補早助火也宜加紫山蟬退蘘葉麻黃姜蚕葱白
帶根解熱表汗泄瀉加猪苓澤瀉去紫山水煎熱服出汗為佳
升麻 葛根 白芍 各三廿一錢
右劉一劑生薑三片水煎熱服○寒月加蘘葉八分○四肢逆冷加
桂枝一錢半○腰痛當知是痘加桂枝錢半○時氣酷烈發熱太甚
乃是毒氣盛加牛旁子一錢半○只服前敗毒散尤妙

高麗國香

卷三

四

痘初出宜

神功散 治痘出毒氣太盛血紅不分明地界如蠶子種或諸失血或吐瀉七日以前諸証可服解毒

黃芪 人參 白芍 紫山 生芋 紅花

牛旁子 各等分 前胡 甘山 減半

右剉水煎不拘時服。熱甚加黃芩黃連各一錢未退者再加太黃研之。有驚者加蟬退一個去翅足。若頭粒淡黑者有寒惡之加官桂一錢。

胡荽酒 痘初出時宜用此酒遍噴四面床壁及與患者服後人皆飲能辟穢毒又以淨胭脂點兩眼角防痘入眼

胡荽一束銅錢大細切用好酒煎和與服須更渾身通暢過一二粒以紙蘸麻油點照於無痘處又出如珍珠光亮數十顆矣如無胡荽即用小麥子研亦可

痘出宜

胡荽酒 消谷食 各症宜

保元湯

人參二錢 黃芪三錢 甘山一錢 右剉一劑生薑一片水煎服四白以

前有寒症其色黑慘宜保元湯加官桂五分

五月以後有寒中子稟者用附子理中湯不堪只宜保元湯加官桂

腹痛者毒盛也神功散主之

面紅不退地界不分者神功散倍前胡

吐者毒甚乘火炎而宜也神功散主之

泄瀉者火盛而奔越也服神功散即止却用升麻以升提之不可用

止泄之藥惟解其毒則自止矣

渴者紅花子湯加牛旁子雖口中如烟起即解發渴者或用人參麥

門冬湯飲之亦可切不可用寒湯大渴者取真黃土百沸湯研益

泡取水少加砂糖調飲立止

真黃土 源藏中 日乘三三以下日 凡用人參三五 然則三三以下

汗不止者而身已涼乃血隨氣溢也用當歸五錢黃芪三錢酸棗一錢
共煎一劑水煎溫服立止

痰用白附子水磨服切不可用二陳湯使燥陽明經使孤陽無陰不
能施化也

嗽用杏仁煎湯磨白附子服

二日內頂陷者非虛也乃火盛陽極反為陰降如當午樹枝向下宜
用九味神功散退其火

三四白色淡不明宜用神功散活血退火使其瑩滿光明
或有未治不知解毒五六日間以燈照之生氣未戒其毒太盛作熱

地界紅燥宜用神功散治之隨觀其變而施治猶或可救一二過
正則不能施其神功矣

認痘法 故曰氣專血分者生謂火靖而後出氣得其令頭粒尖而白

當午樹枝 仲夏
五月茂樹云

根顆紅而不散露如一顆珍珠放在腮脰上也頭粒白干上見氣升
而尊根紅干下見血附而安其分也故生故曰毒發陽位者死謂帶
死而出氣不得令頭粒紅紫地界不分譬如血猪肝勢極而不返
故死者朱砂胭脂色者生息之氣猶存可治者也

痘不治法

初出勇壯者不治

出如蚕種者不治

隨出隨沒者不治

如蚊蟲咬者不治

氣血相失者不治

倒出者不治

飲水如從鼻者不治

與肺氣不能疏理也

大凡七日以前為裏實不可投溫燥之劑能助毒也

八日以後為裏虛不可投寒涼之劑能伐生氣也

起法宜

當脹泛而不起用川山甲炒成珠研二錢溫酒調服

血弱不起根底淡薄用保元湯加丁香三粒肉桂一錢當歸五錢
川芎一錢水煎服

九痘不起脹灰白色頂陷者氣血不足虛寒症也宜托裏散加丁香
九痘紫紅不起脹者火盛血熱宜服內托散去桂加紫山紅花熱盛加
黃芩若紫黑陷伏用此藥調川山甲炒成珠為末五分同服

○內托散治血氣虛損或風邪穢毒中纏使瘡毒內陷伏而不出或出
而復入此藥准血自氣調胃補虛肉托瘡毒使之盡出易
脫

黃芪蜜炙 人參 當歸各二 川芎 防風 桔梗 白芷

厚朴姜汁 甘草各二錢 木香 官桂各三分

右方於紅紫黑陷屬熱毒者去桂加紫山紅花黃芩○若淡白灰黑
陷伏屬虛寒者加丁香救裏官桂救表○當貫膿而不貫膿者倍參
芪當歸煎熟臨服入人乳汁好酒同蒸溫服此貫膿之巧法也○泄

瀉加丁香乾姜肉蔻

行漿宜

八日漿不行其根虛薄血少故耳蓋以初起時毒戰血妄行未免
進其血虧矣至此不能成漿急以歸身湯益之

○歸身湯

鹿茸炙一兩 當歸 五錢 剉酒煎服

凡痘屬虛寒八九日色光白如水泡頂陷根白痒塌寒戰等症

○回陽酒

鹿茸炙 大附子炮 嫩黃芪 當歸酒洗

右剉好酒煎服○兼有痰嗽加牛膽南星

灰陷黑陷嘔吐白沫為表虛用冰香散

寒戰咬牙痒塌泄瀉為裏虛用異攻散

此時漿滿或為寒所薄一時痘俱紫黑即如紫葡萄樣不必驚恐急以肉桂磨湯服之立見如舊

回水宜

九日十日回水之時元氣薰蒸真陽運化其水自然消燥此循環之妙理也其有未曾解毒至此時水不能化反歸于胃與所伏之毒伏于陽明則脾胃受戕宜以定中湯治之

○定中湯用真黃土能鎮安胃氣收斂中土取真正黃色不雜者用一塊在碗內百沸湯泡即以碗蓋少傾出用如冷傾入盞內外以熱水頻熱用兩酒盞和藥末研細五分能鎮心胞絡使小腸不奔也雄黃研細一錢能解毒使胃氣寧也一味用和勻以黃土湯少加砂糖溫服二服立止

煩燥悶亂發渴用定中湯加片腦半分牛勞子湯二盞和服

有寒戰咬牙等症宜用附子理中湯

有搽破周身不能回水急以新瓦搗作粉搽在破處立收此妙法也收斂宜

若解毒不盡或未經解毒到當醫而不醫致發熱蒸二者用甘露回天飲砂糖半酒盞百沸湯調一大碗溫服立時熱退痘醫萬發萬中回天之力也

若痘醫時溫醫乃外潰之痘淋漓精薄者宜以醃陶散傳之新瓦不拘多少為細末篩過絹袋包撲患處若乾如堆積不落內又穿膿即以此瓦粉用鴨蛋清調敷立收而落

當醫時腹痛不醫其痛看在中腕乃熱毒凝滯瘀血作痛也

○手捻散

牛勞子

白芍

桃仁

大黃各一

紅花八分

桂又五分

右劉一劑水煎溫服下服立愈

若將醫時其痘一時盡黑非醫也乃火極攻裏即凶矣

結痂宜

外潰不結痂者既開散傳之

結痂而快犯風寒惡寒發熱者以補中益氣湯

○補中益氣湯

當歸 黃芪各一錢 人參 五分 白朮 八分 柴胡 升麻各二錢

乾葛 一錢 甘中 五分 右劉一劑生姜一片水煎服

○結痂後虛煩者宜加味保元湯

○加味保元湯

黃芪 二錢 人參 一錢 麥門冬去心二錢 知母 一錢半 梔子 炒 一錢半

甘中 五分 右劉一劑水煎溫服

還元宜

結痂後有餘熱者以前藥加牛旁子 一錢半 白附子 一錢

痂落血氣尚虛無力者宜調理八物湯主之或十全大補湯

○還元痂落有餘毒其聚于臟腑時復作熱腹內疼痛宜牛旁子飲
主之

○牛旁子飲

牛旁子 前胡 黃連 黃芩 連翹 白附子

玄參 赤芍 歸 羌活 防風 甘中各五分

右劉一劑水煎溫服

○五福化毒丹 治海疹後餘毒神效方見前諸熱

祖傳經驗秘方凡痘後不問癰毒發紅腫時用黑桑赤豆以酸醋浸研漿

時以鵝翎刷之隨手退去劫

增補痘門方旨

增補參蘄飲

紫蘄 陳皮 半夏 茯苓 乾葛 前胡 桔梗
各一錢 甘山五分 人參七分

風寒壯熱體重頭痛痰嗽壅盛者此方主之。○風寒客于外故用紫蘄乾葛以發表痰嗽壅于內故用半夏前胡桔梗陳皮茯苓以安裏邪去之後中外必虛人參甘山急固其虛此則表和而痘易出裏和而氣不虛表裏無失斯良劑矣

增補麻黃湯

麻黃 杏仁 甘山 桂枝

天寒腠密表熱壯盛者此方主之。○解表之藥有三品辛涼辛溫辛熱也夏月表氣易泄宜用辛涼春秋表氣平調宜用辛溫若大寒之

時表氣閉密辛涼辛溫不能解散故以麻黃桂枝之辛熱者以主之亦各當其可而已佐以杏仁利其氣也佐以甘山和其氣也

增補惺二散

人參 白朮 甘山 細辛 白茯苓 天花粉
白芍 桔梗各七分

發熱之初未明是痘形體怯弱者此方主之。○人參白朮茯苓甘山防其虛也乃細辛桔梗所以疎其陽天花粉白芍藥所以和其陰增補加味全蝎散

天麻 麻黃 荆芥穗 全蝎 薄荷 紫山
蝉退各等分

風熱驚搐者以此方調抱龍丸。○痘之出也自內達外心熱則驚肝熱則搐所以搐者風也所以驚者熱也是方也麻黃荆芥薄荷天麻

全蠲蟬退所以消風解熱乃紫丹者所以解毒發痘而活血也

增補羌活透肌湯

羌活 陳皮 柴胡 前胡 半夏 茯苓 甘山
桔梗 川芎 當歸 山查

痘出見點未盡者此方主之○表氣未疏則出有未盡故用羌活柴胡前胡川芎以疏表裏氣未利則出有不速故用半夏茯苓陳皮甘山桔梗以調裏當歸活表裏之血山查消表裏之滯血活滯消則痘之出也易矣

增補甘桔湯

甘山二錢 桔梗三錢
咽喉腫痛者此方主之○甘山之甘瀉實火而補虛火桔梗之苦清喉熱而瀉氣熱

增補再造丸

生玳瑁一兩 片腦三錢 水蛭炒黃一錢 蜈蚣炒三錢 麻黃去節一兩

猪尾血為丸龍眼大每服一丸日服得微汗吉

痘中有赤黑斑狂言煩燥者此方主之○原是實熱之症失于清熱化毒則冷痘中夾斑治之失道則熱益盛而斑赤黑矣若以手按之血散者可治是方也生玳瑁能解毒而化斑蜈蚣能從毒而化毒水蛭能散瘀而破血片腦能化氣而利竅歷更能透肌而達表和之以猪尾血取其動而不滯爾

增補黃連解毒湯

黃連炒 黃柏炒 黃芩炒 梔子炒黑等分

裏熱蘊盛者此方主之○無熱固不化毒熱蘊則毒亦不化故用黃連瀉心火黃芩瀉肝肺之火黃柏瀉腎火梔子瀉上下之火

而惟熱壅故用藥亦精專云

增補人參白虎湯

石膏三錢 人參 甘草 桔梗各一知母二錢

裏熱渴甚者此方主之○石膏清胃熱胃清則不渴人參知母桔梗
甘草化氣而生津液三藥則渴自除

增補四順清涼散

大黃 當歸 芍藥 甘草

實熱內壅腹脹秘結痘不能出者此方主之○痘以熱而出固不能
以無熱若實熱內壅腹脹便秘則三焦之氣不化而痘不能以出矣
故用大黃通其滯當歸活其血芍藥養其陰甘草調其胃通利之後
表裏氣血皆承順矣故曰四順

增補活血散

木香二糸 當歸尾酒浸 赤芍藥酒洗炒 川芎 紫芎

酒紅花各五糸 血竭一糸 每服三錢

痘中氣血凝滯者此方主之○氣貴利而不貴滯血貴活而不貴凝
木香川芎調其氣滯當歸尾紫芎紅花血竭理其血凝

增補退火回生散

滑石一糸 辰砂水飛 冰片三厘

每用冷水調服三錢

痘症血熱枯澀者此方主之○火炎則水乾是故枯澀用滑石辰砂
導去其熱此竈底抽薪之意入冰片者欲其速達而無壅滯也

增補二中益氣湯 人參 黃芪 白朮 當歸 柴胡 升麻 陳皮

甘草 茯苓 白朮 當歸 柴胡 升麻 陳皮

中氣虛弱，痘不起脹者，此方主之。○難經曰：氣主兩之故，氣者，長萬物者也。痘不起脹，氣之弱也。可知矣。故用人參、白朮、黃芪、甘州以補氣，用柴胡、升麻以升陽，有當歸可以活其榮，陳皮可以利其氣。

增補當歸活血湯

當歸

川芎

赤芍

紅花

紫州各一兩 生地黃一兩五分

取汁更良

血熱壅滯者用此方活血涼血。○色紫為血熱，色枯為血滯，熱者涼之，枯者澤之，調血之道也。是方也。生地黃涼血之品也，當歸、川芎、赤芍藥、紅花、紫州、滑血之品也，涼者性寒，滑者質潤，氣利而已。

增補內托散

人參

黃芪

甘州

當歸

川芎

白芍

厚朴

防風

白芷

肉桂

木香

桔梗

表虛裏實，氣血皆弱者，此方主之。○在表者，痘頓灰陷為氣虛，痘根色淡為血虛。故用當歸、人參、黃芪、甘草、血虛、白芷、肉桂能引諸藥入內而托之。於外，木香、桔梗、厚朴能調壅實以歸于和。○加減法：紅、紫、黑陷屬熱毒者去桂，加紫州、紅花、黃芪、淡白灰陷屬虛寒者加丁香、香溫、裏肉桂溫表，當歸、厚朴而不貫膿者倍，參、當歸、糯米煎熟，入人乳好酒。

增補八珍湯

人參

白朮

茯苓

甘州

當歸

川芎

芍藥

地黃

氣體虛弱，痘症雖順，此方主之。○醫貴未然之防，痘症雖順，若氣體虛弱，不補恐有後失，故用人參、白朮、茯苓、甘州以補氣，當歸、川芎、芍藥、地黃以養血。

增補內解散

人參 黃芪 甘中 白芍藥 川山甲 當歸
 川芎 木香 山查 金銀花 皂角刺 乾姜
 七八日間痘色枯淡不起無漿者此方主之○痘至七八日灌膿起
 脹之時也若根窩色淡者責其血虛不起無漿者責其氣虛故用人
 參黃芪甘中木補其氣又用當歸川芎白芍木補其血川山甲皂角
 刺金銀花長於化毒乾姜木香山查長于化滯

增補托裏散

人參 黃芪 甘中 肉桂 白芍 當歸 川芎
 連翹 貝母 山查 陳皮 桔梗 木香
 補虛托裡此方主之○人參黃芪甘中補氣藥也佐之以山查木香
 則氣不滯當歸川芎芍藥補血藥也佐之以肉桂則血不滯桔梗連

翹流氣清熱陳皮貝母利氣開痰

增補附子理中湯

附子 人參 甘中 白朮 乾姜
 胃中虛寒或又誤服涼藥瀉而手足厥冷者此方主之○人參甘中
 白朮之甘溫所以補虛乾姜附子之辛熱所以回陽

增補救生散

續猪尾血臘月取以新瓦盛掛于當風處陰乾易末 冰片 射香
 臍粉 硃砂 馬牙硝各一錢

右為末一歲者服一字大者五分溫水和乳少許調服
 痘陷色黑危困惡候此方主之○痘之為物外感污氣則陷而入內
 食穢物則凸而出故猪血牛黃射香原皆污物可以起痘乃馬牙硝
 者所以攻結毒硃砂臍粉者所以攻結熱水片則神於行滯而也是

方也為熱毒倒入臟腑不得已而用之以少卧時許下惡物如腦
為苦然非平劑也

增補十全大補湯

人參 黃芪 白朮 茯苓 白芍藥 當歸

川芎 肉桂 甘山 熟地黃

痘症十日以上血氣虛弱者此方主之○參芪苓朮甘山大補氣也
芎歸芍地肉桂大補血也氣血平補故曰十全

增補人牙散

人牙一枚燒存性 射香少許 共為末酒調下

痘症黑陷者此方主之○痘之為物外感穢氣則陷入內食穢物則
凸出牙灰射香亦穢物耳故用之以起陷下之痘錢氏云變黑歸腎
而用骨餘以治之非通論也

增補蟬退散

蟬退 地骨皮 白芷等分

每服三五分酒調下

表有風熱而痘色滯者此方主之○蟬退白芷消風熱半表地骨皮
退風熱于裏

增補瀉肝散

當歸 川芎 防風 荆芥 白芍藥 甘山

黃連 木賊 蔓荊子 白茯苓 甘菊花

痘後肝經蘊熱目痛者此方主之○目者肝之竅肝木臟也喜散而
惡鬱故散之則條達鬱之則執痛此方用防風疾藜荆芥木賊蔓荊
菊花雖所以清肝經之風執而實所以散之使其條達也和肝部之
血有當歸芍藥和肝部之氣有甘山川芎復有黃連瀉心火如實則

瀉其子以故用之

增補復明散

當歸 川芎 白芍 防風 生地黃 荆芥

柴胡 蔓荊子 白芷

痘後目痛紅絲翳膜者此方主之○日月中天光明者也一為雲物蔽之明者晦矣風行天上則蔽障去而日月復明此方用防風荆芥柴胡白芷蔓荊子諸風藥以治目翳亦是道也復用當歸川芎芍藥地黃養血之品者經曰目得血而能視是故用之

增補犀角黃連湯

生犀角水磨臨飲時入一錢烏梅 一枚 木香 二分 黃連 一錢

痘後牙疳此方互用○諸痛癢瘡痒皆屬心火故用黃連瀉心生犀涼心乃烏梅者取其味酸可以收斂虛邪而木香者取其辛香可以

輯和榮氣

補遺秘方

○治小兒痘疹不起發

用李樹上津膠每用些須熬水飲之即起

○復生丸治小兒痘疹不起發紫黑陷伏并痘疹初作色發未發服之其毒即解五日以前可服其効如神 梁鍾雲山傳

當歸 白芍 川芎 升麻 葛根 甘州 各五錢

嫩紫中葶 一兩 辰砂 一兩二錢

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服一九水雪兩三水送下如無河水亦可或糯米湯入酒一匙送下亦可

○桃紅痘疔方

雄黃 一錢 紫中 三錢

右為細末胭脂汁調將銀簪挑破墨疔將藥點入內即効

○發痘方

穿山甲用前驚炒焦黃色射香少許

右為細末六七歲者熱酒調下三分不可多用蓋被片時通身汗出

○牛黃散治痘黑陷虛弱而不起發

朱砂三分 牛黃二厘

右為細末蜂蜜打濕胭脂汁取蜜調藥用銀簪刺黑陷上塗之三次
一日塗一次去黑

麻疹

麻疹乃六腑腸胃之熱蒸於肺外感內傷併發與痘症表似同裏實異
初熱三日出脹洪三日出而又沒二而又出一周時許重者通身紅

脹眼亦封閉有赤白微黃不同仍要紅活最嫌黑陷及面目胸腹稠
密咽喉續纏者逆發不出而喘者即死與大科癩疹相似又與發斑
相似如錦文有空缺處如雲頭狀麻即如麻遍身無空但疎密不同
耳仍有夾斑夾丹夾瘡同出者

初起呵欠發熱惡寒咳嗽噴嚏流淚頭眩宜升麻葛根湯加紫蘇葱白
以鮮肌切忌大汗斑不紅者亦宜乃麻症初起之時方潮熱甚加芥
連地骨皮諸語調辰砂六一散咳嗽加麻黃杏仁麥冬石羔咳甚另
用涼膈散加桔梗地骨皮泄瀉宜四苓散便血合犀角地黄湯吐衄
血加炒山梔小便赤加水通寒熱似瘧小柴胡湯
初起全類傷寒但面赤中指冷為異耳

已出煩燥作渴者鮮毒湯合白虎湯喘便閉者前胡枳殼湯加赤茯苓
大黃甘草五味水煎服便閉三四日者小承氣湯防風通聖散諸語

瀉開者導赤散如游者四苓散加重前本通諸語如狂者解毒湯調
辰砂六一散大便血小便亦見血者犀角地黄湯合解毒湯吐血衄
血解毒湯加炒山梔童便泄瀉解毒湯合四苓散喘滿泄瀉瀉者
柴苓湯煩渴作瀉者白虎湯加蒼朮湯熱成乾嘔解毒湯復食
嘔吐四君子湯夏月因暑作嘔四苓散加入參急用豆蔻木香姜桂
熱藥

麻症初起已出已沒及一切雜症與痘毒大同但始終藥宜清涼雖麻
喜清涼痘受溫暖不易常道虛則補實則瀉醫家活法故治麻亦有
血虛而用四物湯氣虛用四君子湯天寒傷冷則溫中理中之藥一
時之權也

麻症沒後餘熱內攻循衣摸床譫言妄語神昏喪志者死如熱輕餘毒
未除必先見諸氣色雖預解毒湯隨症選用仍忌煎腥葱蒜之物終

五刻增補萬病回春集卷之八

癰疽

癰疽脈數浮陽沉陰浮數不熱但惡寒侵若知痛處急灸或針洪數
病進將有膿淫滑實緊促內消可禁宜托裏者脈虛濡遲或乳瀉微
潰後亦宜長緩易治短散則危結促代見必死無疑矣

瘡瘍之症當察經之傳受病之表裏人之虛實而攻補之假如腫痛熱
渴大便閉結者邪在內也疎利之癰癩作痛寒熱頭疼者邪在表也
發散之癰癩痛甚者在經絡也和解之微癰微痛而不作膿者氣血
虛也補托之漫腫不痛或不作膿或膿成不潰者氣血虛甚也峻補
之色黯而微癰痛或膿成不出或腐肉不潰者陽氣虛寒也溫補之
若泥其未潰而驟用敗毒復損脾胃不惟瘡者不能成膿而潰者亦

瘡 原病式
八頭三百者瘡
一有托裏之身
二有托裏之身
三有托裏之身
四有托裏之身
五有托裏之身
六有托裏之身
七有托裏之身
八有托裏之身

難收斂七惡之症蜂起多致不救經云諸痛癢瘡瘍皆屬心火若瘡
赤煩燥發熱引冷便閉作渴脈洪數實是其常也雖在嚴寒之時必
用大苦寒之劑以瀉熱毒若脈微皮寒瀉痢腸鳴飲食不入嘔吐無
時手足逆冷是變常也雖在盛暑之時必用大辛溫之劑以助陽氣
經曰用寒遠寒用熱遠熱有假
者反之雖違其時必從其症

瘡疽大按乃痛者病深小按便痛者病淺按之處陷不復者無膿按之
處即復者有膿不復者可消若按之都牽強者未有膿也按之半軟
者有膿也又手按上下不熱者無膿若熱甚者有膿凡覺有膿急當
破之無膿但氣腫若有血慎之慎之不可針破也

瘡者大而高起屬乎陽六腑之氣所生也
疽者平而內發屬乎陰五臟之氣所成也
凡瘡疽未破毒攻臟腑一毫熱藥不敢用若已破潰臟腑已虧飲食少

進一毫冷藥不敢用也

腫瘍者瘡疽未見膿而腫也

腫瘍內外皆壅宜以敗毒表散為主說欲行大黃者宜審其虛實之
原

瘡疽初起之時宜

灸法 治瘡疽發背初生累試累效

凡人初覺瘡疽發背已結未結赤熱腫痛先以溫紙覆其上立視候
其紙先乾處即是結疽頭處取大蒜切成片如三箇銅錢厚安在頭
上用火艾壯灸之三壯換一蒜片痛者灸至不痛不痛者灸至痛時
方住最要早覺早灸為上方發一二日者十灸十愈三四日者六七
愈五六日者三四愈過七日則不可灸矣若有十數頭作一處生者
用大蒜搗成膏作餅子鋪瘡頭上聚艾燒之亦能安也若背上初發

赤腫內有一粒黃如粟米者即用獨蒜切片如前灸法治之次日去痂膿自潰已

●竹筒吸毒方 諸般惡瘡並治

用苦竹長一二寸用頭節剉去青皮似紙薄為佳其大小隨瘡斟酌應毒瘡初發時用

白炭藜 蒼朮 烏柏皮 厚朴 各五錢重

右四味剉片用水一碗同煎竹筒煎熟以藥將乾為度乘竹筒熱以手按之於瘡上頂與其筒自粘在瘡上不必手按也仍更用前藥分兩再煮候前竹筒冷以手拔去再換熱者如前法其膿自吸入筒中而瘡愈矣

●荆防敗毒散 治瘟疽時腫發背乳癰等症增寒壯熱甚者頭痛拘急狀似傷寒一二日至四五日者一二劑即衰其毒輕者內自消散

防風 荆芥 羌活 獨活 柴胡 前胡 薄荷
連翹 桔梗 枳殼 川芎 茯苓 金銀花 甘草

大便不通加大黃芒硝熱甚痛極加芩連
右剉生薑煎服瘡在上食後服瘡在下食前服

●千金漏蘆湯 治一切惡瘡腫毒癰疽疔腫魚睛五疔癰疽初覺沉重恍惚悶亂坐臥不安皮肉潰爛頭暈渴急惡寒肢身疼痛四肢大便閉結小便赤黃並治婦人勿服

漏蘆 白欬 黃芩 麻黃 枳實 麩炒 牡麻 芍藥
甘草 大黃 芒硝 連翹

●追風通氣散 治瘡癰發背腦疽流注腫毒救壞病活死肌強患於未傷元氣條蕩邪穢自然通順不生瘰癧並治損破傷折疔氣血疔脚氣諸氣痞塞塊痛腰痛一切痰飲症

當歸 何首烏 小兒水通節 赤芍 白芷 小茴 烏藥

漏蘆 一名野蘭
時珍云 去
白欬 東漢曰
脈鮮 危少用惟
飲者 去 參用之
故者

馬病回春 卷之八

枳殼 楚炒 甘草

右剉劑酒水各半煎病在上食後服在下食前服

一瘰癧初萌必氣血凝滯所成爲日既久則血積於所滯而後盛作故病人氣血盛者減當歸多則生血發于他所再結瘰癧毒生生不絕矣

一腦疽皆發在上者去木通恐導虛下元爲上盛下虛之病難於用藥

一瘰癧生痰有二一胃寒生痰加半夏健脾化痰二乃鬱而成風痰加桔梗生姜

一流注可加獨活流注者氣血凝滯故氣凝則血留而凝加獨活者可以動一身血脈血脈既動豈復有流注乎

下方以醋濕紙貼痛處以妙益慶之即消

一流注起於傷寒傷寒表未盡遺毒於四肢經絡溢於所滯而後爲流注也如病尚有潮熱則裏有寒而未盡散加升麻蘇葉熱不退加乾葛頭痛加川芎姜葱無汗用酒水各半煎大能行血生氣故也

一發背既久不愈乃前醫用涼藥過也涼藥內傷其脾外水其血脾主肌肉脾既受傷飲食必減顏色痿痺肌肉不生血爲脈絡血一受水則氣不旺肌肉糜爛故必理脾脾健肉自生本方去木通少用當歸加厚朴陳皮盛則加白豆蔻

凡病瘰癧之人有泄瀉者不可便服此藥宜先服蠟礬丸止瀉後用此

一腸肚內瘰癧宜十宣散與此方相間服之並宜加忍冬藤
一腫毒堅硬不穿加川芎獨活麻黃連鬚葱煎服出汗即穿

留頂 普基 蘇引
某下下下下下下
ツクルニ其境ノ頂ノ所ニ茶ヲツケテニシヨクシム

一打傷打在頭上去木通加川芎陳皮

一經年腰痛加草薢玄胡索酒煎

一脚氣加木瓜栴榔穿山甲水煎

一痰飲為患或喘或咳或暈頭痛腫疼遍身拘急骨節痺攻高背頭

項腋腰腿手足聚結腫硬或痛或不痛按之無血潮雖或有微

紅亦淡薄不熱堅如方破之無膿或有薄血或清水或如乳汁又

如瘰癧在皮肉之間如鷄卵可移動軟活不硬破之亦無膿血針

口弩肉突出惟覺咽喉痰實結塞作寒作熱加南星半夏

●神攻散 治癰疽疔毒一切疔毒并瘰癧

川烏 泡去 川黃柏 各等分

右為細末用唾調成膏如唾少漱口水亦可發背癰疽等瘡纔起者

敷患處留頂候藥乾用淘米水時常潤濕每日藥敷一次如瘡已

成重患將潰爛者先將槐枝艾葉煎湯噴濕將瘡洗淨用綿帛

去膿血以香油潤患處用綿帛仍照患處剪成員錢醫頂貼下夜

用藥塗於紙如乾依前用淘米水潤日換一次聽其自然流膿不

可手癢如敷藥後病人瘡覺在痛減熱即愈如生肌則腐肉自落

腐如不落者剪割亦可最不宜用針發背不宜貼膏藥凡醫瘡用

去別醫止飲別藥方可治忌氣怒房事勞復并孝服休氣飲酒之

人飲食忌酒并羊鷄魚肉茄姜辣之物若因氣怒及復發腫依前

治之如治對口井腦疽不必洗去膿藥逐次添藥恐動瘡口若風

也一腫毒加南星赤小豆等分醋調塗立消姜汁亦可

●真人活命飲 治一切癰疽疔毒疔腫不問陰陽虛實善惡腫毒大痛或不

服初用一劑大勢已退然後隨

症調治其功甚捷成補方也

芽山甲 三片切 天花粉 甘草節

乳香 明透 赤方

白芷各一錢 防風 貝母各七 沒藥 皂角刺各五 陳皮

右剉一劑好酒煎空心熱服能飲者服後再飲酒三五盃滓再煎服
在背俞倍皂角刺 在腹膜倍白芷 在骨次加瓜蒌仁 二錢
在四肢倍金銀花

呂洞賓仙傳化毒湯 治癰疽發背乳癰一切無名腫毒
起服之立消已成已潰服之立愈
防風 甘草節 白芍 茯苓 貝母 黃芩 連翹
白芷各一錢 天花粉 金銀花各二錢 半夏七分 乳香 沒藥
各五分

右剉一劑好酒煎前飯前服背脊上飯後服下部空心上部食後俱
要出汗為度如無汗用水香薰脚腕內被蓋汗出而愈
神仙排膿散 治惡瘡毒風毒疔瘡綿花瘡小兒惡瘡膿血俱從大便
中出亦治氣滯腹脹及婦人經閉不通此方神效之人

可用犀角
類當慎之

大黃 十二兩酒 白芷 沉香 木香 乳香 沒藥
川山甲 陳壁土炒 各五錢

右各為細末量入虛實用之實者不過二錢虛者二錢半臨臥用好
生酒調服服後禁飲食湯水半日五更覺腹內疼痛動三五次以
稀米粥補之服此藥內有川山甲恐令人作嘔瀉急之即嚼生葱
可止凡修合此藥要誠意不可令婦人雞犬見又不可多合恐久
放則不效矣

芙蓉膏 治癰疽發背諸毒
芙蓉葉 或皮或根亦可 黃荊子

右各等分入石臼內搗極爛用鷄子清調搽於瘡上黃頂不過一晝收
切頂如烟起立時止痛其效如神

賜兩虛此藥有迴生起死之功但不分經絡不載時令醫者觸類而
長之可也或見腫平瘡寬遂以為安慢不知皆無補益調養之功愈後
虛証復見因而轉為他病以危劇者多矣

神仙蠟磬丸 治瘧疽及肺癰腸癰能消毒固臟腑止疼痛護脂膜止
瀉瀉疳積後宜服兼治諸瘡毒粉癩疥癩核三五
年者半料即消不問
惡瘡新起者亦効

黃蠟 二兩 白礬 三兩
右為末溶蠟為丸梧子大每服三十丸酒下不飲酒熱水下下日服
三次肺癰蜜湯下咳嗽姜湯下

五善七惡主治

夫善者動息自寧飲食知味便利調勻膿潰腫消水鮮不真神彩精明
語声清朗脉氣和平是也此屬腑症病微邪淺更能慎起居節飲食
勿藥自愈

惡者乃五臟虧損之症或因汗下失宜榮衛消鏹或因寒涼尅伐氣血
不足或因峻厲之劑胃氣受傷以致真氣虛而邪氣實外似有餘而

內實不足法當純補胃氣多有可生不可因其惡遂棄而不治

若大渴發熱或泄瀉淋閉者邪火內淫一惡也 竹葉黃芩湯氣血俱虛
以五味山茱萸煎不應佐
以加味八味丸煎服

若膿血既泄瀉腫痛尤其膿色敗臭者胃氣虛而火盛一惡也 人參黃
芪湯如
不應用十全大補
湯加麥門冬五味

若目視不正黑睛緊小白睛青赤瞳子上視者肝腎陰虛而目系急二
惡也 六味丸料加炒山
揆麥門五味子如不應
用八珍湯加炒山揆

若喘粗短氣恍惚嗜卧者脾肺虛火四惡也 大君子加天
麻生薑如不應
用補中益氣湯加麥門
冬五味心火刑剋肺金
人參平肺散陰火傷肺
六味丸加五味子煎服

若唇青不揮四肢沉重者脾腎虧損五惡也 補中益氣湯加山
茱萸如不應
用十全大

補湯加山藥
莫山藥不味

若不能下食服藥而嘔食不知味者胃氣虛弱六惡也六君子加木香

加附子

若聲嘶色敗唇鼻青赤面目四肢浮腫者脾肺俱虛七惡也補中益氣

生薑如不應用大君子湯加炮姜更不應急加

若腹痛泄瀉咳逆昏憤者陽氣虛寒氣內滯之惡症也急用耗長溫中

湯加附子或
加姜桂溫補

若有潰後發熱惡寒作渴或怔忡驚悸痛寐不寧牙關緊急或頭目赤

痛自汗盜汗寒戰咬牙手撒身熱脈洪大按之如無或身熱惡衣欲

殺於水其脈浮大按之微細衣厚仍寒此氣虛極傳變之惡症也

若手足逆冷肚腹疼痛泄瀉腸鳴飲食不入吃逆嘔吐此陽氣虛寒氣

所乘之惡症也

若有汗而惡寒或無汗而惡寒口噤舌冷腰背反脹頸項勁強此氣血

虛極變淫之惡症也急用參芪歸木附子救

大抵立善見三則吉七惡見四必危虛中見惡症者難治實症無惡候

者易治

●六味丸一名六味地黃丸此壯水之劑夫人之生以腎為王凡病皆

由腎虛而致此方乃天上生水之劑無有不可用者世所罕知若腎

虛發熱渴小便淋閉痰氣壅盛咳嗽吐血頭目眩暈小便短少眼花

耳聾咽燥燥痛口舌瘡製齒不堅固腰腿痿軟五臟齊損肝經不足

之症尤當用之水能生木故也若腎虛發熱自汗便血諸血失痛水

泛為痰之聖藥血虛發熱之神劑也

熟地黃用生者自山茱萸酒浸去核取肉山藥各四兩白茯苓去皮牡丹皮

澤瀉各三兩

右地黃酒蒸黑梓膏餘為末煉蜜丸梧子大每服七八十丸痰水下

○八味丸 治命門火衰不能生子以致脾土虛寒而患流注鶴膝等症

○加減八味丸 治癰疽瘡瘍後及痔瘡口乾渴甚舌或生黃及未患

山藥一兩 酒浸并膏桂心 去粗皮 澤瀉 白茯苓 各五

錢 五味子 二兩 牡丹皮 五錢 熟地黃 用生者八兩酒拌

右為末入膏加蜜少許同丸梧子大每服六七十丸五更初末言語

前或空心用鹽湯送下

○補中益氣湯 治元氣虛損或因勞傷惡寒發熱肢體倦怠飲食少

黃芪 蜜炒 人參 白朮 去皮 甘草 各一錢 當歸 一錢 陳皮 五分

升麻 柴胡 各三分

右劉一劑姜棗煎服

○四君子湯 治脾胃虛弱或因社伐腫滿不散潰飲不能宜用此以補

思或食而難化或欲作嘔或大便不爽若脾胃氣虛痰白出血吐血

歸脾胃既壯飲食自進陰血自生若用四物湯沉陰之劑脾胃復傷

諸症蜂起若命門火衰而脾土虛寒必用八味丸以補土母

人參 白朮 去皮 茯苓 各二錢 甘草 多一錢

右劉一劑姜棗水煎服

○六君子湯 治脾胃虛弱或寒涼社伐腫滿不消或不潰飲宜服此湯

八珍湯 治脾胃傷損惡寒發熱煩燥作渴或瘡瘍潰後氣血虧損

十全大補湯 治瘡瘍氣血虛弱腫痛不愈或潰瘍膿消寒熱自汗盜

加黃芪 肉桂

○托裏溫中湯 治瘡瘍膿潰元氣虛寒或因社伐胃氣脫陷腸鳴腹痛

大便漏泄神思昏潰此寒變內陷緩則不洽

元氣虛寒或因社伐胃氣脫陷腸鳴腹痛

大便漏泄神思昏潰此寒變內陷緩則不洽

元氣虛寒或因社伐胃氣脫陷腸鳴腹痛

大便漏泄神思昏潰此寒變內陷緩則不洽

元氣虛寒或因社伐胃氣脫陷腸鳴腹痛

大便漏泄神思昏潰此寒變內陷緩則不洽

元氣虛寒或因社伐胃氣脫陷腸鳴腹痛

大便漏泄神思昏潰此寒變內陷緩則不洽

元氣虛寒或因社伐胃氣脫陷腸鳴腹痛

大便漏泄神思昏潰此寒變內陷緩則不洽

元氣虛寒或因社伐胃氣脫陷腸鳴腹痛

羌活 附子泡去皮臍 乾姜炒三錢 益智 丁香 沉香

茴香 木香 陳皮各一錢 甘草炙三錢

右劉姜水煎服

○人參黃芪湯 治潰瘍飲食少思無睡發熱

人參 白朮 陳皮 麥門冬 蒼朮米泔浸各五分 黃芪一錢

歸身 升麻各五分 黃柏炒四分

右劉水煎服

○竹葉黃芪湯 治瀉痢氣血虛胃火盛而作渴

淡竹葉二錢 黃耆 麥門冬 當歸 川芎 黃芩炒

芍藥 人參 半夏 石膏煨 甘草各一錢 生地黄二錢

右劉二劑水煎服

○人參平肺散 治心火壯伐肺金直痰咳嗽喘嘔痰涎壅盛胃膈痞滿
咽嗌不利結因肝木太過而治當補肺君因腎水不足

而患當補肺肺因心火壯而自病當利小便

人參 茯苓 陳皮 地骨皮 甘草各一錢 知母炒七分

五味子 青皮去穢 天門冬去心各四分 桑白皮炒一錢

右劉一劑水煎服

一瘡疽發背諸瘡出膿潰爛日久不愈飲食少思身體倦怠口舌乾燥
或寒熱往來驚怖少睡用補中益氣湯去柴胡加蒼朮麥門冬神麩
五味子黃柏少睡加炒酸棗仁瘡肉生遲加白蘇一錢肉桂五分如
膿多或清倍加黃芪人參當歸白朮

外治敷貼之藥

●琥珀膏 治癰疽發背諸般腫毒久年頑瘡

香油四兩干沉香一錢煉淨待油熟去之次下嫩松香八兩文武火
出銀珠青珍曰水珠 還不住手攪加琥珀色住火入乳香沒藥銀珠血竭各一錢為末攪入

銀珠 青珍曰水珠

膏內令有退火毒用油并攤貼神效
白龍膏 治背疽及腫瘡皆效

香油四兩煎數沸入官粉二兩研細次入黃蠟一兩溶化攪勻退火
待藥將凝面用厚連四紙剪大小不一拖藥在土收候若貼時先將
葱鬚煎湯洗淨貼之

○治發背

艾絨 字彙曰挺者直也云云此則
莖中

官粉不拘多少研細用槐枝艾挺判碎拌炒官粉黃色去槐艾每粉
一兩入銀珠一錢研勻用相調難舊棉紙上貼之
瘡瘍肌肉不生若赤色而不生者血熱也四物湯加牡丹皮若膿水
清稀氣血俱虛也十全大補湯食少體倦脾氣虛也補中益氣湯煩
熱作渴起居如常胃火也竹葉黃芪湯煩熱作渴日晡熱甚腎虛也
用加減八味丸

瘰癧

瘰癧頂起核名曰蟠蛇瘰癧○延及背前膝下者名曰瓜藤瘰癧○左耳根腫
核者名曰患袋瘰癧○右耳根腫核者名曰蜂窩瘰癧

結核連續者為瘰癧也

形長如貽者為馬刀也

夫瘰癧初發必起於少陽經不守禁戒必延及陽明經大抵飲食厚味

鬱氣之積曰毒曰風曰熱皆此二端招引變換消分虛實彼實者故

易自非痛斷厚味與發氣之物雖易亦難殊為可慮以其屬膽經王决

斷有相火而且氣多血少婦人見此若月信不作寒熱可生稍久轉

為潮熱其証危矣自非斷慾絕慮食淡雖聖神不可治也

瘰癧先從結喉起者

- 紫蘇
- 烏藥
- 枳殼
- 桔梗
- 柴胡
- 前胡
- 防風

羌活 獨活 川芎 芍藥 茯苓 大腹皮 甘草

右剉水煎食後服

瘰癧先從項上起者

紫蘇 連翹 桔梗 枳殼 防風 柴胡 羌活

獨活 白芷 當歸 川芎 芍藥 甘草 各等分

右剉水煎食後服

瘰癧先起左邊者

紫蘇 厚朴 防風 羌活 枳殼 前胡

當歸 川芎 芍藥 蘿蔔子 蘇子 甘草

右剉水煎食後服

瘰癧先從右邊起者

紫蘇 香附 青皮 烏藥 半夏 厚朴 桔梗

茯苓 柴胡 防風 羌活 甘草

右剉水煎食後溫服

人稍壯者宜

●內消散 治源癰結核

朱砂 血竭 各一錢 斑蝥 去翅足三分生用

右為細末每服一分空心燒酒調服一日一服未破者三五立消既

破者內服此藥外用金頭蜈蚣一條焙研極細末用麻油一小鍾浸

三日夕搽患處其瘡即腫潰過一二日腫消可貼膏藥瘡勢大者二

十日瘡小者十餘日可保平復

●琥珀散 治源癰結核內消神效

滑石 白牽牛 頭末各一兩 班蝥 三錢去翅足 姜蚕 一兩 枳殼 五錢

赤芍 柴胡 各五錢 木通 連翹 各七錢 琥珀 二錢 黃芩 一兩

甘草 三錢

右剉作六劑水煎服

○班猫散 即神效散

班猫 去翅足酒炒 川山甲 土炒 姜蚕 去頭足酒炒 丁香 白丁香

苦丁香 紅小豆 磨刀泥 各一錢

右為細末每服一錢五更無根水調服至末時打下毒物其形如鼠後用田中野菊花焙黃色為末陳醋調敷貼瘡上一日一換七日全安

○赤白丸 治瘰癧未破

白礬 三兩 朱砂 九錢

右為細末酒糊為丸菜豆大每服三十丸清茶送下日進三次服藥盡即消

人虛弱者宜

○益氣養榮湯 治懷抱抑鬱瘰癧流注或四肢患腫肉色不變或日腫

黃芪 人參 白朮 炒各一錢半 當歸 川芎 白芍 炒

生苧 陳皮 香附 貝母 去心各一錢 柴胡 桔梗 炒

地骨皮 甘草 炙各五分

右剉一劑水煎食遠服 有痰加橘紅 脇下刺痛加青皮木香

○午後有熱或頭微眩加黃柏 膿水清倍參芪當歸 女人有鬱氣

胃膈不利倍香附貝母月經不通加牡丹皮當歸

○抑氣內消散 治瘰癧并諸癰結核

當歸 川芎 白芍 酒炒 白朮 去蘆 青皮 去穰 陳皮 半夏

姜汁炒 桔梗 羌活 白芷 獨活 厚朴 姜汁炒各

防風 黃芩 烏藥 香附 檳榔 各二 蘇葉 一兩半

沉香 三錢 木香

人參

粉草 各五錢

右劉水煎溫服服十餘劑即消若再服照分兩製酒糊為丸如梧桐子大每服七十九酒下

摩癰外施之藥

●神品膏 貼年久不愈癰疽瘡神效

真香油 二斤 官粉 半兩 黃蠟 二兩 乳香

沒藥 孩兒茶

血竭 各四 胡椒 六錢

先將香油熬滴水不散方下官粉熬成膏下黃蠟再熬滴水成珠離火方入細藥瘡久者胡椒加半攪勻入磁器內收貯退火毒油單紙攤貼每用先將葱鬚花椒艾槐條熬水洗瘡淨後貼之

●奇效膏 貼癰癩未破內消已破則全

真香油一斤二兩 大黃六兩 入油煤化濾去渣慢火下淨黃丹半斤

慢火再熬滴水成珠下古石灰炒過五錢乳香四錢沒藥四錢黃蠟二兩成膏用油單紙攤貼

●治癰癩鼻瘡甚效

嫩槐條 一斤 蘄艾 四兩 川椒 三兩淨

右三味用新大砂鍋一箇盛水滿前至七分去渣待溫將所患之瘡徐徐洗一炷香去膿水并用軟白布拭乾待至午時仍將藥渣入水一鍋又煎至六分去渣照前洗一炷香拭乾待晚仍將藥渣入香次日用大蒜瓣切薄片圍瘡止用麥子大艾炷灸蒜上如痒再灸以痛為止漸漸自愈

●烏龍膏 治癰癩潰爛久不愈者

木鱉子 帶壳炒存性 栢葉 焙

人中血 即亂髮燒灰 青龍骨 即銅押

紙錢灰 飛羅麵 各一錢

右俱為末用好陳米醋調成膏塗瘡上外用紙貼

●瘰癧膏

真香油四兩象皮三錢熬熟去滓入黃蠟三錢官粉一兩五錢離火燒溫入沒藥乳香各二錢孩兒茶一兩龍骨一錢五分血竭一錢攪勻以磁器收貯任意貼之

馬刀瘡者項側有瘡壘而不潰也

●柴胡通經湯

柴胡 連翹 當歸 黃芩 牛蒡子 三稜

各一 桔梗二兩 生甘草一錢 紅花少許

右剉水煎食後服忌苦藥泄大便

●散腫潰堅湯 治馬力結硬如石或在耳下至缺盆中或至肩上下或於腋上皆屬手足少陽經及瘰癧遍於頰下或至頰重堅而不潰在足陽明所出或瘡已破出水並皆治之兼治癰瘡大如升斗久不潰者

昆布冷水洗 海藻微炒 黃柏酒炒 知母酒浸 天花粉 桔梗各五錢

龍胆草四錢酒炒 三稜酒炒 我朮酒炒 三錢 連翹 黃連

黃芩酒炒 乾葛 白芍酒炒 升麻 柴胡各五分 甘草

錢五 歸尾五分

右剉每一兩水一盞先浸半日煎至一盞去渣熱服於甘處伸足在高處頭微低每啜一口作十次嚥下至服畢依常安臥取藥在胃中停蓄之意也另攢半料作細末煉蜜為丸每服百丸或百五十丸用此藥湯留一口送下 一婦人瘰癧後遍身作瘡脈大按而虛以十全大補加香附治之而愈大凡潰後午前痒作氣虛午後痒作血虛若作風症治之必死

儒者瘰癧愈後體瘦發熱晝夜無定此足三陰氣血俱虛用八珍加麥門五味三十餘劑又用補中益氣加麥門五味及六味丸而愈

疔瘡

疔瘡皆生四肢發黃泡中或紫黑必先痒後痛先寒後熱也

其中或紫黑色有條如紅絲直上倉卒之際急以針於紅絲所至處必刺出毒血然後以鹽酥丹藥刺處塗之針時以病者知痛出血為好否則紅絲入腹攻心必至危矣

疔瘡者風邪熱毒相搏也

●追疔奪命湯專治疔瘡

防風 八分 青皮 十分 羌活 一錢 獨活 一錢 黃連 一錢 赤芍 六分 細辛 八分

姜蚕 一錢 蟬退 四分 澤蘭葉 五分 金銀花 七分 甘草節 八分

獨腳蓮 七分 紫河車 一名金線重 十分

右劉五錢先服倍金銀花一兩澤蘭一兩少用葉生薑十斤同葉搗

沃蘭葉 桑葉
蘭葉 便分
苦微温治產後
痛婦人之要藥
杜勝蓮 澤白王
蚤休一名重樓 金線然則是謂紫河車者蚤休也

紫河車一名金線重樓二物一名一則人胎一則狗胎也

爛好酒斂執泡之去渣熱服不飲酒者水煎亦可然後用酒水各一半煎生薑十片熱服出汗病退減後再加大黃五錢同煎服以利二三去餘毒若有膿加何首烏白芷稍●在脚加楨榔木瓜●要通利加青皮木香大黃梔子牽牛

●龍芽一醉飲治疔瘡如神

龍芽草五月端午採收陰乾將好酒浸搗取汁量加乳香沒藥桑耳粉入汁內同飲將渣敷瘡上此日不許吃一此茶水只可飲酒就洗面亦不可用水

●秘傳妙方治誤食瘟牛馬羊肉生疔瘡

用桐油樹葉搗爛絞汁一二碗頓服得大瀉毒氣乃愈如冬月無葉挖取嫩根研水服之以利二三為度

●神效丹即點舌丹治傷寒初起諸般惡毒疔瘡發背一切腫毒遍身

疔瘡

疔瘡

疔瘡

閉腫痛又治
蠱毒并破傷風

雄黃 朱砂 片腦 各五分 乳香 沒藥 輕粉 各三分

血竭 一錢 真蟾酥 一錢 射當門子者

右共為末用酥油或乳汁為丸扁豆大每一丸化用酒嗽下

○飛龍奪命丹治疔瘡腫痛背脊乳疔疔骨疽一切無名腫毒惡瘡服之立愈此皆

惡証乃藥中至寶

雄黃 二錢 蟾酥 乾者酒化開 銅綠 乳香 沒藥 膽礬

寒水石 血竭 各一錢 朱砂 一錢 為輕粉 片腦 射香當門子者

各五 蜈蚣 一條 酒浸炙 蝸牛 二十箇

右件俱為細末先將蝸牛連殼研如泥和藥為丸如粟豆大如丸不
就入酒打麵糊丸之每服二十九丸用葱白三寸冷病人嚼爛吐於男
左女右手心將丸藥裹在內用無灰熱酒二四盃送下於避風處以

衣被蓋之約人行五里之久再用熱酒二三盃以助藥發熱大汗為
度如重者無汗再進一丸汗出即効如疔瘡走黃過心者并出汗冷
者難治病人不能嚥者研爛裹之與服瘡在上食後服在下食前
服忌冷水黃瓜茄子油膩鷄魚肉濕麵一切發物不可食

●神仙解毒丸治一切疔瘡疔背魚口諸般惡瘡疔名腫毒初發一服

白礬不拘多少溶化作丸如粟豆大硃砂為衣每服十九丸用連鬚葱
七八根水煎至一碗送下汗出立愈已成者不傷未成者即消
疔瘡外施之藥

●蟾酥丹大種本細口

用大癩蝦蟇以針破眉稜上手捻出酥干油紙上或桑葉上用竹篾
刮下然後插在背陰處有乾取用
蟾酥以白麵黃丹等分搜和丸如麥粒狀針破患處以一粒內之

○類聖散 治一切疔瘡惡毒腫痛神效

川烏 火烏 蒼朮 細辛 白芷 薄荷 防風 其外各五錢

右為細末鷄子清調塗患處

○追毒膏 治諸般惡瘡及无名腫毒

乳香 五分 沒藥 一錢 兒茶 二錢 血竭 一分 青木香 一錢 廣木香 五分 芙蓉葉 四兩 白芷 四兩

右各為細末勻在一處臨用時看瘡大小以生蠶調塗患處以綿紙附之不過三五次即消

○疔毒方

急將毒用針刺破葱白搗爛敷上干帕繫任人行五里之時其毒出然後用熱醋洗淨

怕紅縮球額多胎

一切惡瘡

用黃花苗老葱蜂蜜共一處搗爛貼瘡即好

○治疔瘡方

核桃仁一箇古銅錢一箇二者細嚼黃酒下能將死不過一服其效如神

○小奪命散 治腦疽及疔瘡惡毒无名腫毒其效如神

千頭子 即痛毒子 楓花子 地丁 蒲公英也

右三味各等分水煎通口溫服加蟾酥少許尤妙

○鐵柱杖 治疔瘡發背頭疽

用草烏不拘多少去皮洗為末用葱白去蘆葉搗爛為丸碗豆大以雄黃為衣每一丸先將葱細嚼熱酒下或惡心吐涎四口冷水一口止之即臥以被厚蓋汗出為度

黃花苗 梅蒲公英
遊也 年平治惡瘡
毒瘡毒
核桃仁 甜柑仁
核那甜柑仁
也

爆火烈也

射于幸温系
邪解毒毒

一男子患疔服命丹汗不止而瘡不痛熱不止而便不利此汗多亡陽毒氣盛而真氣傷矣用參芪歸木芍藥防風五味子二劑諸症悉愈惟以小便不利為憂余曰汗出不宜利小便汗既止陽氣復而自利矣仍用前藥去防風加麥門倍用當歸黃芪四劑便行瘡潰而愈
灸法治疔瘡毒用太蒜搗爛成膏全腫處四圍留露腫頂以艾炷灸之
以爆為度如不爆稍則難愈宜多灸百餘壯無不愈者

便毒

便毒一名騎馬癰此奇經衝任為病而癰見於厥陰經之分野少氣多血又名血疔或先有疔瘡而發或卒然起核疼痛而發皆熱鬱血聚而成也初發宜疏利之即散成膿後如常用托裏內補之藥
便毒是厥陰濕熱因勞倦而發用射于三寸以生姜煎食前服得行一

二决立効凡射于用開紫花者是
便毒者生兩腿合縫之間也

歸尾 赤芍 金銀花 天花粉 白芷 各一錢 木鱉子 煎
姜蚕 二錢 大黃 三錢 黃硝 二錢 川山甲 二片 土炒成珠
右剉一劑好酒二碗煎至一二次入硝黃再煎一沸連藥鏗露一宿
五更温服厚蓋出汗利一二次即愈

○神奇散 治便毒魚口

穿山甲 三片 土炒 木鱉子 三個 牡蠣 大黃 三錢 黃連 黃芥

黃柏 金銀花 連翹 各一錢 黃硝 三錢

右剉一劑酒水各半煎空心服

○班白散 班猫 去翅 足炒 白芷 八分

右共為細末每服六分空心黃酒送下即利立効

○龍膽瀉肝湯 治肝經濕熱或囊癰便毒下疳懸癰腫痛或作小便澀

丸胆草 酒洗炒 澤瀉 各一兩 車前子 一兩 木通 一兩 生地黃 酒拌歸尾

酒拌山梔 黃芩 甘草 五分

右剉一劑水煎空心溫服

便毒潰破即魚口瘡也

大黃 二錢 姜蠶 川山甲炒 五靈脂 炒各一錢 金銀花 二錢

右為細末每服三錢空心黃酒調下

○立消散 治魚口便毒

木蝦蟇 一箇剉去皮連腸搗爛 入葱五錢再搗敷腫處却用皮裹貼

其上

下疳

下疳者陰頭腫痛而生瘡也乃厥陰肝經主病宜

○消疳敗毒散 專治下疳瘡

防風 獨活 各一大分 連翹 荆芥 黃連 蒼朮 知母

各七分 黃柏 赤芍 赤苓 木通 九膽少 各九分

柴胡 一錢 甘草 稍三分

右剉一劑燈草二十四根水煎空心熱服如有便毒量入虛實加大

黃一二錢

○涼血解毒丸 先服升麻湯根湯發其毒二出后服此丸即愈不必服

苦參 入兩 黃連 四兩 連翹 三兩 牛蒡子 生地黃 白芷 各二兩 防風

石膏 各一兩 大黃 二兩

右為末荆芥煎湯打糊為丸如梧桐子大每服百丸空心溫水送下

下疳外治之藥

○珍珠散 治下疳瘡如神

枯白礬 雄黃 珍珠 黃柏 官粉 煨過各等分

右為末以米泔水洗瘡令淨後搽藥

○治疳瘡

蝸牛 焙乾一錢 枯白礬 一錢

右為細末濕則乾搽乾則以香油調付上即愈

○治下疳 井王靈龜也長出來如物止少元首就是舌廉波人咬去

黑鉛五錢化開即投汞二錢五分研不見星入寒水石三錢五分真

輕粉二錢五分好礪砂一錢共為極細末聽用如遇此患用葱艾花

椒熬水洗患處若怕洗將湯入瓶內將瓶口薰之止于痛再

洗試乾搽上此藥若治舌咬去先以乳香沒藥煎水口噙止痛後上

藥即長也

○洗疳湯

川練干 黃連 瓦松 花椒 葱根 艾葉

右剉各等分煎米傾入盆內用青布展洗瘡上立効

○治下疳

用皮硝一碗乳香雄黃孩兒茶各五分入小壩內外用乾牛糞火煨

熟堊其硝自化薰之晚上使心口涼為度

○下疳方 抱過鷄卵殼畧炒為末孩兒茶末各一錢和勻先用茶洗

淨後搽藥

楊梅瘡

俗云トウバク或云チカトト呼者也

楊梅天疽者風濕熱毒也

初起宜

巴松 二物 曰名也
野遊 昨葉何
巴地謂 可換昨葉
何州也 恭曰昨葉何
州 其 上 皆 黑 屋 上 加
蓬 初 生 高 天 能 遠
望 如 新 喜 酸 平 治
諸 瘡 不 飲

天抱 楊梅瘡
名也

萬病回春

卷之八

三三

○消風敗毒散

歸尾 川芎 赤芍 生地黃 升麻 乾葛 黃芩
 各一錢 黃連 黃柏 連翹 防風 各八分 羌活
 金銀花 甘草 各五分 蟬退 二箇 初服加大黃 二錢 芒硝 一錢 半通
淨後勿用
 右剉一劑水煎熱服

毒發出宜

○二十四味風流飲

防風 荆芥 連翹 白芷稍 歸尾 川芎上節備用
 赤芍 黃芩 黃連 木瓜 梔子 地骨皮 五加皮 木通
下部瘡宜用 白鮮皮 薏苡米 姜蚕 黃柏 白蒺藜 甘草 土茯苓白實者三片

瘡痛加羌活獨活 ○ 休虛加入參茯苓去梔子
 右剉作五十劑每日服一劑水煎忌牛肉燒酒薑且炒過食則不生癰

○茯苓湯

土茯苓四兩搗碎 桔梗 防風 各一兩 乳香 沒藥 各五分
 右剉水五碗煎至三碗溫服一日服盡忌茶水諸物五貼全條忌鐵器

○茯苓糕治楊梅瘡毒

土茯苓去粗皮為細末一斤白蜜一斤糯米粉一斤三味和勻蒸糕
 食之常以茯苓煎湯當茶吃不可飲茶水

○雄黃敗毒丸

雄黃 朱砂 輕粉 孩兒茶 各一錢 苦參 一兩淨末

右為細末粳米飯為丸梧桐子大每服二十九米湯送下日進二服

口噴薑豆湯

遺毒為患宜

香鏢湯 治楊梅筋骨疼痛久不愈者立效
甘草 麻黃 烏藥 細茶 魚鱧三錢用項麻 槐子
炒 花椒各五 乳香一錢

右剉一劑水二鍾姜五片葱五根煎至一鍾通口溫服二三貼即愈
不發

通仙五寶丹

棉花 綿花瘡及楊凡入病過楊梅天庖棉花等瘡致成一切難以名狀之症或楊梅瘡爛見骨經年不收口者或筋骨疼痛舉發無時或遍身疥瘡不消或手足皴破出血或遍身起皮發癢屬好二層起一層或赤癩白癩等症

我身掌風癩 予學存之六子加引之白クケムク立マナリ

風癩或皮好骨爛口鼻難當及久年癩瘡不愈一切頑瘡患毒並皆

鍾乳粉三分 大丹砂二分 琥珀五厘 水片五厘 珍珠二厘半

右為細末每服五厘另八飛白霜一分半炒過合作一服每十料分作十二貼每二日用土茯苓一斤用水煎作十二碗去渣清晨以一碗入藥一貼攪勻溫服其茯苓湯須一日服完不可別用湯水并茶日日如是服盡一料以十二日即愈或有不終劑而愈者如病重須再服一料無不愈也百發百中忌鷄鴨牛肉房事服藥完不忌此方

西聖復煎丸 治梅毒後腫爛經年破而難愈以致垂危百方不効用

乳香 沒藥 兒茶 丁香 阿魏 白花蛇

血竭各四錢俱為 白麵炒一蜂蜜熬兩煉香油四兩煎熟棗肉

海桐皮 特效
海桐皮 有巨刺
如高阻甲之刺
白苦温通血
治頑癩疹痛

核去皮
右共一處為末搗于餘下丸如驢子大每用一九十枚冷四兩水四
碗煎至一碗入丸煎化去渣温服
○茯苓餅 治遠近頑瘡爛不斂者並治

防風 人參 五加皮 白鮮皮 當歸 川芎 丁皮
木瓜 皂角刺 海桐皮 乳香 沒藥 金銀花 甘草
錢各一 土茯苓 半斤
右共為細末將藥末四兩對麩麵四兩水和一處作餅焙乾熱用不
拘時外將末細粗末煎作湯飲以瘡好為度
楊梅天泡愈後疤痕紅黑用大黃白礬二味等分同研擦患處其痕即
去色亦如舊
○玉脂膏 治楊梅愈後發出惡毒風癩起白皮去一層發二層又發不愈

柏油 鴨白木之油
銀朱 時珍曰水銀
出於丹砂鑄化還
復為朱者是也

牛油 香油 柏油 黃蠟 酪一兩化開待 銀珠 二錢 官粉
射香 五分
以上三味為末入油內攪勻火焙解令熱將藥末上再焙再搽即愈
秘方 治楊梅瘡

官粉 二錢 入三錢 且將粉搽干內重湯煮食立瘥
灸法 治楊梅瘡 初起那一箇灸三五壯後不再發

臙瘡

俗云ハキカレ或ハカシカレ云

臙瘡腫痛者風熱濕毒也
○荆防敗毒散 方見癰疽
○三香膏 治遠年近日一切臙瘡潰爛至骨疼痛
乳香 二錢 松香 三錢

松香 即松脂也

楊梅瘡

卷之八

三

共為細末用香油調用包粽子的好葉薄名家三刺孔將藥末攤其上
用藥葉貼患處藥居中上用完葉其蓋之帛扎住當時止癩生肌

○黃柏散 治癩瘡濕毒及遍身熱瘡

黃柏 一兩 輕粉 三錢

共為末用猪膽汁調塗濕則乾

○癩瘡膏 并治疥瘡

古石灰 枯礬 各二錢 乳香 沒藥 血竭 各一錢半

右為細末用桐油一半香油一半先用槐花下合入內煎黑瀉去渣
後入松香二錢煎沸又瀉去渣入黃蠟五錢熬成膏滴水不散為度
將藥末於內再熬黑色滴水成珠即好不問遠年新癩瘡先用葱
白防風煎水洗淨付藥其有不平唾津塗指捻藥成塊填於不平處
用油單紙攤骨貼患處候瘡愈皮老為瘡瘡亦效神效

油紙二一〇

○隔紙膏

黃香 研爛 輕粉 銀珠 各五錢 水 半分

右合研極細末香油調用油單紙攤先以針為窠刺孔將藥攤於孔
上夾於中每貼以孔口向瘡貼先將葱頭花椒細茶煎水洗淨瘡毒
後貼上用布帶繫扎夏月一日一換冬月二日一換一洗其真爛不
可聞者不過五貼而愈神妙宜忌諸般發物九攤藥看瘡大小形式

攤貼

○貼癩瘡方 治不拘新久癩瘡併疥瘡疥癩貼之即下

花紅絹 燒灰 三錢 蛾口爾 燒灰 二錢 枯礬 二分 珍珠 一分 血餘灰 一分

飛羅白麵 一分 官粉 二分

共研為細末用黃蠟二兩鎔化入藥用紙攤貼神效

○癩瘡方

取真無石末而癩瘡易愈口部小瘡粉之搽之即愈

黃香 研爛 輕粉 銀珠 各五錢 水 半分

花紅絹 燒灰 三錢 蛾口爾 燒灰 二錢 枯礬 二分 珍珠 一分 血餘灰 一分

○癩瘡方

取真無石末而癩瘡易愈口部小瘡粉之搽之即愈

右為末用香油煎雞子令熟去雞子不用只用油調藥搽瘡

○金不換 治血風瘡癬瘡虫瘡及半板瘡疥癩非瘡並効

蛇床子 五錢 大楓子 錢去壳 五水銀 二錢 白錫 一錢 枯白礬 一錢

右各為末先將錫化開次入水銀研勻不見星再入末藥相油共研勻搽藥且乾此或無相油勝猪油亦可

○治疥癩瘡痒先用藥水洗後用薰藥被蓋薰之

防風 荆芥 馬鞭草 白礬 花椒 苦參 野菊花

右剉水煎頻洗

○薰藥

苦參 五錢 蒼朮 一錢 半夏 大黃 雄黃 各二錢 熟艾葉

右為末分作筒以熟艾綿紙捲筒每十晚被蓋薰一筒

○又方

銀珠 一錢 雄黃 一錢 水蠶子 一箇 好孔香 一錢 艾 三錢

右為細末以綿紙捲筒被蓋留頭在外薰之大小便亦要包裹

○治男婦小兒遍身生疥癬并脚上瘋塊痛痒不止

硫黃 一錢 蛇床子 二錢 白礬 二錢 水銀渣 三錢

右為細末用生薑汁調擦患處立止

○治滿身生牛皮疥癩

花椒 一錢 大楓子去壳 六巴豆仁 八箇 人言 一錢 雄黃 一錢 艾 一兩

右共為細末將艾槌熟入藥紙捲作一筒每晚薰一筒被蓋留頭在外仍要包裹大小便免傷毒氣作瓦二片陰陽放藥盛于中放脚腕下薰其者不過二次愈

○補遺方

○祛熱搜風飲 治疥及膿疽瘡

苦參 金銀花二味為君 柴胡 生地 片苓 荆芥
黃柏炒 黃連炒六味為 連翹 薄荷 獨活 枳殼炒

防風五味為 甘草蜜炙為
右剉水煎食遠熱服

增補疥瘡門方旨

叙曰人以佛病為安疥瘡雖曰小疾或流連其痒難息其搔則亦非
可觀之度矣因著六考以主之庶幾乎無瘡瘕也

增補防風通聖散

防風 川芎 川歸 黃芩炒 麻黃去節 連翹 薄荷
石膏 白木炒 梔子炒黑 大黃 芒硝 桔梗 荆芥
白芍藥 滑石 甘草

表有疥瘡內有實熱此方主之○諸漏瘍瘡瘰疬皆屬心火故表有疥

瘡必裏有實熱是故也用防風麻黃泄熱于皮毛用石膏黃芩連翹
桔梗泄熱于肺胃用荆芥薄荷川芎泄熱于七竅用大黃芒硝滑石
梔子泄熱于二陰所以各道分消其勢也乃當歸白芍者用之以和血
而白木甘草者用之以調中互見中風門火門

增補玉燭散

川芎 當歸 生地黃 赤芍藥 大黃 甘草
朴硝各半分

疥瘡作痛者此方主之○諸漏屬實二者可瀉故用大黃朴硝瀉其
實生地赤芍涼其血川芎當歸和其營甘草調其衛是方為攻下之
劑必形氣病兩實者始可用之若病氣有餘形氣不足者以前方防
風通聖散去大黃芒硝可也

增補當歸養血湯加防風連翹方

當歸 防風 各一錢 黃芪 五錢 連翹 二錢

疥瘡有血無膿搔痒不止者此方主之。○有血無膿者表氣不足也諸痒屬虛二者可補故用當歸黃芪大補其氣血乃防風者引歸芪直達于表二物得之而効愈速也若連翹者解諸經之客熱而已此藥服之數劑諸瘡化毒生膿又更服之得膿滿毒盡則去病根而無溫癩之患若膿日久而乾者去黃芪加白朮茯苓以燥之如治爛痘之法則善矣

增補十全大補湯

人參 黃芪 白朮 茯苓 熟地黃 當歸 川芎

芍藥 甘草 并分桂少許

瘡久血氣虛弱頰面腹背皆瘡者此方主之。○瘡發生于手足者為輕生于頰面腹背者氣血虛羸之盛乃小入道長之象故用人參黃

芪白朮茯苓甘草補其氣用當歸川芎白芍熟地桂心大補其氣血得補則腹背之瘡先愈而君子道長小人

道消矣。○脾胃門參苓白朮散亦可酌用

增補加品

古方有苦參沙參忍冬花皂角刺者此皆治瘡善藥若依前法則此輩不用亦愈必欲用之苦參宜用酒炒

增補疥瘡塗藥總考

古方塗藥有用蛇床子川椒雄黃樟腦水銀桉榔者有少入人言者皆殺虫也有用木鼈子大楓子者皆去風也有用枯礬流黃者為燥濕也有用大黃二栢輕粉鉛粉黃丹者為解熱也或以相油塗者或以麻油塗者于少時常自用之率驗於此而違於彼今月少愈再月即發竟以服藥而瘡終無益于塗也然病淺者用藥塗之而愈故塗藥亦所不廢

癬瘡

五癬 保元

五癬者濕頑風馬牛也亦疥皆血分熱燥以致風毒結於皮膚浮淺為

防風通聖散治癬瘡去硝黃加浮萍皂角刺方見中風

浮萍散治諸風癬疥癩瘡

浮萍 當歸 川芎 赤芍 荆芥 麻黃 甘草

各二錢

右剉二劑葱白二根豆豉五六十箇煎至八分熱服出汗

治乾濕癬

雄黃一錢 斑蝥七介 輕粉四分 硫黃三分 蛇床子五分 金毛狗脊五
寒水石五分 芒硝三分

層々

種

右為末香油調搽濕則乾參

治鷲掌風癬層層起皮且痒且痛用此一洗立愈

川烏 草烏 何首烏 天花粉 赤芍 防風 荆芥

蒼朮 地丁 艾葉

右剉水煎先薰後洗立愈

又方 治鷲掌風癬

核桃殼 鱸皮尤佳 鵝鴝糞等分煎水頻洗立痊

又方用白菟耳并入練子同熬水早晚洗每七次全愈

治鷲掌風并癬

用黑鉛不拘多少打成片熬一炷香時入菘豆一碗再煮爛去渣以
水乘熱洗數次立効或搽上亦可

治癬方

萬病回春

卷八

三

用蒜瓣煮水洗浴展乾再用生桐油搽抹炭火上炙即愈

治癬瘡方

枯白礬四錢 朝腦二錢 為末用極好醋調起將癬抓破搽上即愈

治癬瘡方

雄黃煨過六錢 川槿樹皮一兩 白藜一兩

右為細末用無根水調在飯鍋上頭以赤色為度癬瘡不可抓破忌七八日不可見水神效

右用小磁器罐一箇用鹽泥封置雄黃在內用燈蓋蓋定將鐵線縛緊周圍以木炭灰泥固完封口慢火煨過半炷香黃升盡上取用

燒瘡

シラクホ

防風通聖散方見中風治癩頭瘡用本方為末酒浸焙乾九三次食後白湯調服日三服至頭有汗效

小兒頭生白瘡

陀僧散

鵝鴒糞一兩炒研末 蜜陀僧五錢 硫黃一錢 花椒五錢 人言半分

右為細末香油渣調搽患處晚間洗去

治男婦小兒頭生白瘡

公鷄屎晒乾半升能去病根 人言一錢火煨過殺虫 塘中黑泥晒乾篩過 蛇床子五錢

殺白礬根三錢住痒 硫黃五錢殺虫 五倍子炒五錢

右為細末先用鷄蛋一箇香油煎熟貼在頭上引出虫去盡用白礬梔子煎水洗一次後用香油調前藥搽頭上十日搽一次搽過一

七日即愈

掃雪膏

治小兒瘡 松樹厚皮燒灰三兩 黃丹水瘡一兩 寒水石細研一兩 枯礬

黃連 大黃 各五錢 白膠香 二兩 輕粉 一分

共為末熟熬油調傳瘡上頭先洗淨瘡痂後傳藥

●治瘡瘡黃水瘡薄皮瘡羊鬚子瘡

槐枝不拘多少截四指長用直香油放鍋內浸過槐枝為止熬數沸將槐枝拿出一根指兩截看內查黑色通去槐枝加黃香些須入油搽之

●治瘡瘡方

用花椒艾熬滾湯放深盆內將瘡頭倒放熱湯泡浸如湯冷再換將瘡甲洗淨用粘發黃丹葱汁蜂蜜調搽包住不許見風

癩風

白癩紫癩一般風 附子硫黃最有功 姜汁調勻茄蒂搽 但患瘡

處中無跡

右先將龜布擦洗患處令淨以茄蒂醃擦之一說白癩用白茄蒂紫癩用紫茄蒂

○追風丸 治白癩風

何首烏 荆芥 蒼朮 米泔浸 苦參 各等分

右為末用好大肥皂去皮弦剉碎煮汁濾去渣入麪少許打糊為丸如梧桐子大每服五十九空心茶清送下忌一切動風之物

○治汗斑

用蜜陀僧為細末以隔年醃醋調搽斑上隨手而愈

治黑白癩風

硫黃 一錢 蜜陀僧 一錢 信 六分

以上三味俱生為細末用隔年陳醋調和搽之工及即愈晚間搽

上水早洗法

厲風

白屑屑之增多
ノリ多クハ
ユミヲモ身中
ケタツツ

厲風者天刑之疾陰陽肅殺之氣成人肌膚傷人肢休初起白屑雲頭

紫黑垢流膿甚者鼻崩肉陷致此危矣初見雲頭皮木就當施治
患者屏絕慾情清淡飲食十活一二否則難治

○通天再造散

鬱金 五錢 皂角刺 黑者 大黃 煨谷 一 白牽牛 頭末大鐵半

右為細末每服五錢日未出時無灰酒送下 面東服之當日必利下
惡物或臭不可近或虫或膿如出口黑色乃是多年赤色乃是近者
數日後又進一服無虫乃止

○洗大風方

地骨皮 苦參 荆芥 細辛 防風 蒼耳子
右剉片水煎薰洗遍身血出為効如洗務要寬湯浸洗良久方佳
洗數次為妙

○灸法 治大風斷根方

於大拇指筋骨縫間約半寸灸三炷香以出毒氣

諸瘡

○防風通聖散 治諸瘡腫毒神効如見中風

○隔蒜灸法 治一切惡瘡毒大痛或不痛或麻木如痛者灸至不痛不
從治之法也大 有洞生之加驗

用大蒜頭切三艾錢厚安瘡頭上用艾柱於蒜上灸之三壯換蒜蒜
灸未成者即消已成者即破大勢不能為害如瘡大用大蒜搗爛

萬病回春

瘡上將艾鋪上燒之蒜散再換如不痛或不作膿不起發或陰毒瘡更宜多灸三而仍不痛不作膿者不治此氣血虛也

○葱熨法 治虛怯人患腫塊或痛或不痛或口氣於經絡肢體疼痛或手足緊冷並治

用葱頭細切杵爛炒熟敷患處冷則易之再熨腫痛即止如神

○豆豉餅 治瘡瘍腫硬不潰及潰而不斂并一切頑瘡惡瘡

用江西豆豉為末以唾調作餅子二文錢厚置患處上將艾壯多之乾則易之如瘡勢大及背發用水漱口水調作餅置患處以及鋪餅上灸之如未成即消已成即敗其毒勢易愈如有不斂者氣血虛也

一切無名腫毒

○洪寶丹 治一切腫毒散血消腫及湯盪火燒金鎗打撲血出不止並

天花粉 二兩 白芷 二兩 赤竹 二兩 鬱金 一兩

右為末熱毒用茶調冷用酒調塗患處○吐血不止冷水調塗後頸項上此藥最絕血路

○二白散 治一切腫毒諸瘡疼痛

白芨 一兩 白蔞 一兩 白礬 煨五錢

右俱為末用時入藥於水碗中即沉底外用桑皮紙拖水搭於患處熱則再易連易連搭直待其腫處水冷將藥敷上立時消散

○千金消毒散 治一切惡瘡無名腫毒發背疔瘡便毒初發時洪敷效

連翹 黃芩 赤芍 各二錢 歸尾 一兩 金銀花 一兩 皂角刺

牡蠣 天花粉 大黃 芒硝 各三錢

右劉酒水各半煎服

○祛毒湯 治一切無名腫毒瘰癧初起神效

貝母 川山甲 土炒成珠 姜蚕 各二錢 大黃 二錢 半生半熟

刺痒甚不時流血水或以藥水洗淨貼上膏藥其杖處疼痛腫硬次日即消○散破歐班痕方用熟麻油黃酒各二碗同煎數沸服畢日以此油燒熱地上一夜疼止消腫無痕有打傷人者仇家驗即無二毫傷痕

○救刑妙方

土鱉瓦上焙乾一沉香末二分銀珠五分

右三味為末合一處刑後隨用好酒調溫服消腫去毒止咳神效痛不

○退血止痛飲

治杖後腫痛瘀血不散血氣攻心或增寒壯熱

歸尾 赤芍 生地黃 白芷 防風 荆芥 羌活
連翹 黃連 黃芩 黃柏 梔子 薄荷 枳殼
桔梗 知母 石膏 車前 甘草
右剉劑水煎溫服

○生血補氣湯治杖後潰爛久不愈者

人參 白朮炒 茯苓 當歸 白芍 熟地黃 陳皮
香附 貝母各等 桔梗 甘草二味減半
右剉劑水煎服○寒熱往來加柴胡地骨皮○口乾加五味子麥門冬○膿清加黃芪○膿多加川芎○肌肉遲生加白蘇肉桂
○捧瘡疔甲壹聚 止痛收血水消腫去疔甲
乳香 沒藥 孩兒茶 雄黃各三錢 輕粉 一錢 官粉 一兩
黃蠟 一兩

先將猪脂入鍋煉出油冷定却將諸藥研成細末入油攪勻隨將黃蠟化開收入一處又攪勻用油單紙攤成膏藥貼患處量瘡大小貼之極能去疔甲收膿水消腫止痛內宜前未耳散
先用此藥水洗好的更快

防風 荆芥 若參

各等分煎水洗

○生肌散 用煎藥水洗後擦藥

乳香 沒藥 孩兒茶

各等分爲細末撒土即止痛生肌

○去疔甲藥

用鷄子清加麝香少許銀簪打成稀水照疔甲處輕用簪子尖點上三不多時其疔甲化爛取去上散藥外貼宣樂一日一換化死肉之後三四日換一次不數日如初

○鬱金膏 貼杖瘡一切腫毒

生豬脂 熬去渣淨油 鬱金 四兩 生地黄 忌犯鐵器

俾片入豬油內煎枯去藥渣又入淨黃蠟半斤化開又入好朝腦一

兩磁罐收入每用一兩加官粉一錢溶化攪勻攤油單紙上貼之

○英雄丸

乳香 沒藥 蜜陀僧 自然銅 燒紅淬七次 地龍 卽蜥蜴

木鱉子 去殼 花椒 各等分

右爲末煉蜜爲丸如彈子大每一丸以酒化服或臨刑方用打不覺痛任打血不浸心妙不可言

折傷

折傷者多有瘀血凝滯也 且先用童便黃酒各一鍾和而溫服最能散

○通導散 治跌撲傷損極重者先服此藥打不致死血瘀血不散吐腸脹上攻藥不可用酒煎愈不通矣亦量天虛實而用

大黃 芒硝 枳殼 各二厚片 當歸 陳皮 木通

故方虎
 換紅
 紅升牛膝
 午抄條
 膝少甚
 下抄桂
 苦木黃至
 三丁酒奉
 七六

紅花 蘇木 各一錢 甘草 五分

右到一劑水煎熱服以利為度惟孕婦小兒勿服

○交斗散 治跌傷骨碎用藥一厘黃酒調下如重車行十里之候其骨
 接之有聲初跌之時整理如舊對在綿衣蓋之勿入見風方服
藥休移動端字日製忌婦人
 雞犬等物孫都督傳

土鱉 一箇剝瓦 巴豆 一箇去 半夏 一箇生用 乳香 半分 沒藥 半分 自然銅
火燒七次醋淬七次
 用些須

右為細末每服一厘好黃酒送下不可多用多則補得高起神效

○天靈蓋

天靈蓋用柴火燒存性為末每二錢黃酒調服神效

○接骨効方

山梔 生為末五飛羅麵三錢

姜汁調和敷患處一日夜皮肉青黑是其驗也○一方治跌撲傷損

逆氣作腫痛不可忍者用搥子白麵為末井水調敷乾則掃去即効

○接骨膏

當歸 七錢半 川芎 五錢 乳香 五錢半 沒藥 五錢 廣木香 一錢 川烏 四錢

煨骨碎補 五錢 古錢 三錢 火煨酒淬 黃香 六兩 香油 一兩 五錢

右先將各藥為末和油成膏用油紙攤貼患處如骨碎筋斷用此復

續如初

○白膏藥 治跌打或刀各傷侯血及用蔥花椒煎水將患處洗淨拭乾敷
 藥不必包裹其効如神

白芨 一兩 猪脂油 六兩 芸香 四兩 樟腦 四兩 輕粉 三錢 乳香 三錢

沒藥 兒茶 各三錢 片腦 五分

右各為末將油銅鍋化開先下白芨次下芸香樟腦兒茶丁立時取出離火方下乳香等藥俟冷又下片腦輕粉此方不徂生肌凡瘡

毒皆可貼之膏成將磁罐內盛之每用油紙攤貼患處

芸香 山礬也

○接骨散 治跌打損傷能接續筋骨

用葛子不拘多少微炒研細末每服二三錢同好酒調服

○接骨方

白疾藜炒為末每服一錢熱酒調下被蓋汗出即愈

○神效葱熨法 治跌撲傷損

用葱白細切秤爛炒熱敷患處如冷易之腫痛即止其效如神

一 人墜馬腹內作痛飲酒數盃葱草大便自下瘀血即安此元氣充實挾酒勢而行散也

一 男子墜馬腹有瘀血服藥上之致發熱盜汗自汗脈浮濇余以為重劑過傷氣血所致投以十全大補湯益甚時或譫語此藥力未及而然也以前藥煎炮附子五分服之即睡覺來頓安再劑而痊

金瘡

○熱粘皮 治金瘡出血不止

龍骨 煨三錢 五倍子 二兩半生 白礬 半生半拮 無名異 一兩 乳香 沒藥 各二錢

右共為末乾摻患處不作膿不怕風立時止血住痛生肌如神

○軍中一捻金 治金瘡傷破出血并狗咬要端牛日製

礦石灰不拘多少炒研生菲葉連根同搗作餅陰乾為末摻上止血生肌千年古石灰更妙

○出箭方

花蕊后其形似硫黃出在陝州有白班點者丁味火煨七次為細末撒在傷處周圍箭頭即出

○止痛生肌散 治刀斧傷出血不止

乳香 沒藥 兒茶 象皮炒 龍骨水飛 石膏煨水飛

黃丹 水飛 三七

右八味各等分共為細末用之

○金瘡出血不止

用楮樹葉為末擦上血即止

梁閣老姪金瘡腫痛出血不止寒熱口乾此氣虛血無所附而血不歸經也用補中益氣湯五味麥門子之陽氣復而愈 見癰疽

破傷風

破傷風症河間云風者善行數變八變甚速死生在反掌之間宜急分表裏虛實而治之

破傷風邪在表者則筋脈拘急時或寒熱筋惕搐搦脈浮弦也宜散之

○羌活防風湯 治破傷風邪初在表者急服此藥以解之稍遲則邪入

羌活 防風 甘草 藁本 當歸 白芍
各一錢 地榆 細辛 各五分

右剉一劑水煎熱服

破傷風邪在半表半裏者則頭微汗身無汗也宜和之

○羌活湯 治破傷風在半表半裏者服此湯稍緩邪入於裏不宜用

羌活 菊花 麻黃 川芎 石膏 防風 前胡
黃芩 細辛 甘草 枳殼 白茯苓 葛荊子 各五分
薄荷 白芷 各二分半

右剉一劑水煎服

破傷風邪傳入裏者舌強口禁項背反張筋惕搐搦痰涎壅盛胃脘滿

汗出脈洪數而
發也宜導之

○大芎黃湯 治破傷風在裏宜導導意服此湯

川芎 羌活 黃芩 大黃 各二錢

右剉一劑水煎溫服臍臍通和為度

一人聞歐肩稜被打破傷風頭面腫大發熱以九味羌活湯熱服取汗
外用杏仁搗爛入白麵少許新汲水調付瘡上腫消熱退而已

○金刀如聖散 治破傷風

蒼木 入錢 白芷 川芎 細辛 麻黃 各五錢 川烏 炮

草烏 炮 各四錢 薄荷 一錢

右為末每服一錢熱黃酒調服蓋覆通身汗出有驗如治痛風加滴
乳香一錢

○玉真散 治破傷風及金刀傷打僕傷損并癩狗咬傷能定痛生肌

天南星 為防風脈解服 防風 各等分

右為末破傷風以藥敷瘡口然後以溫酒調一錢如牙關緊急角弓
反張用藥二錢童便調下

一打傷欲死但心頭微溫以童便灌下二錢拜進一服

一癩狗咬破先口吮漿水洗淨用綿拭乾貼藥更不再發無膿大有功

一方 治破傷風

槐子 一合炒黃好酒一碗煎八分熱服汗出為愈

一方 治破傷風

用野蘇子半生半炒為末煉蜜丸如指頂大每服一丸熱黃酒下
破傷外治之法

○治跌打破頭面及刀傷破手足大出血流不止

瀝青 即松香 不粘少破為細末將所傷破瘡口用手捏裹一處用

藥末厚敷上將淨布帛扎住不道風不與水旬日即痊
○治被傷風

甘草其遂各等分研成末將蜂蜜并隔年老葱頭共搗一塊將瘡用
揭起微將射香先撒於上然後捨藥在上點香至四寸薄身汗出即
愈

○灸法 治被傷風及癩狗咬傷此方最易而神效

用核桃殼半邊內填桐人糞蒲仍用槐白皮礮破傷處用艾灸飛壳
上灸之若遍身汗出其人大困即愈若年遠者在瘡上灸之亦愈

湯火

●治湯火傷

蛤蠣殼不拘多少炙焦黃色研細末用生香油調膏敷之如冰仍無

痕跡

一方以蜜調敷之疼立止不膿不痴效

●治湯火傷

用桐油二分水一分攪勻調入黃丹石膏末敷之效

●黃白散

用榆樹根白皮為細末二兩黃丹二錢攪勻看瘡大小用井花水調
勻敷患處若乾再以涼水敷之不惟止痛三五日即痊或人家失火
燒了牲畜照患處塗之須臾流水出可治不流水是燒得太重不可
治也然人被燒亦同此斷

●湯火瘡方

槐子燒灰為末香油調上即好用槐皮炒為末香油調上亦好

一男子火傷兩臂痲痛大小便不利此火毒傳於下焦用生地黄當歸芍

藥黃連木通山枝赤茯苓甘草丁劑一便清利其痛亦止乃以四物
參芪白芷甘州而壞肉去又敷劑而新肉生

男子因醉被熱湯傷腿潰爛發熱作渴飲水脈洪數而有方此火毒
為患用生地當歸麥連木通葛根甘州十餘劑諸症漸退却用參芪
木芳歸芍多州白芷木瓜新肉將完因勞忽寒熱此氣血虛而然也
仍用參芪之藥加五味酸棗而安又月餘而瘡愈

一 人夜間回祿烟薰致死者以蘿蔔搗汁灌之即甦

虫獸

一 狗咬傷

杏仁甘州口嚼搭傷處又宜銀杏漆傷處○又宜罌麻子五十粒去
殼以井花水研成膏先鹽水洗傷處後敷此藥

一 癩狗咬傷

用班猫七個去翅足為末酒調服于小便桶內見水沫似狗形者為
効如無再服頂六七次無狗形亦不再發甚効○又宜以班猫去翅
用糯米一撮同炒黃去米將班猫研末麵糊丸如菘豆大每七九温
酒下○又宜番木鱉即馬前子磨水吃即看腦頂上有紅頭髮急宜
摘去○又宜用艾灸蒜切片下二七炷五倍子末撒土疔勿見風

一 蛇咬傷

用雄黃五錢五靈脂一兩共為末每服二錢好酒調服仍敷患處良
久再進一服○又宜貝母去心好酒服○又宜白芷為末夾門冬湯
調服立愈○又宜托拔歸無葉尖青如髻頭尖樣藤有小刺有子圓
黑如醋味酸用藤葉搗汁酒調隨量服之用酒搗傷處立愈

○又方治蛇咬食蒜飲酒更用蒜杵爛塗患處變干蒜上灸之其毒自

解尸毒虫傷並効

一蠅螫傷

○妙化丹

治蠅螫傷宜端午日製忌婦人雞犬見之

乳香

沒藥

輕粉

海漂消

雄黃

各五錢

硫黃二分

右為細末左邊被傷點左眼右邊被傷點右眼神効

○六神散

治蝎螫疼痛不可忍者

川烏

草烏

南星

半夏

香白芷

九節菖蒲

右為細末每用少許

先以涎唾抹傷處即將此藥擦之立止如神

一蜘蛛咬成瘡

用雄黃一錢射香半分為末用蓼藍汁和塗瘡上如無蓼藍汁以青黛

五分入水內和塗之立愈

○治蝎螫方

川烏

草烏

狼毒

半夏

南星

雄黃

膽礬

各三錢

右共為細末五月五日午時以醋糊丸如鼠糞大塗患處立愈

一臭虫方

用蕎麥糶熬水浸林其虫即死

○蟬花散

治夏月大傷及諸損傷虫極盛臭惡不可近者

晉州吳推府佃客五月收麥用驟車搬載一小厮引頭被一驟車倒
又破破二三處痛楚不可忍五七日膿水臭惡難近又蛆蠅極盛藥
不能救無如之何臥于大門外車房中一化飯道人見之云我有
方用之殊効我傳與汝修合服之蛆皆水化而出蠅亦不敢近又以
寒水石末敷之旬日良愈爰以為神故錄之

蟬退

青黛各五

蛇退

華陰細辛

一錢五分

右為細末每服三錢黃酒送下

中毒

脈人為百毒所中傷其脈洪大者生微細者死又曰洪大而遲者生微細而數者死

○大九百毒所中

用甘草豇豆水煎服之能解百毒

○又方不問一切諸毒宜其多灌香油無慮

○解毒丹 治此毒若飲食中者易治酒中得者難治若在胃中作毒可 研水灌之即吐若在腹中宜下後服此

水粉 即粉錫也

黃丹 水粉 青黛 焰硝 豇豆粉 各等分

右為細末以水藍按水調下 ○腹痛倍黃丹豇豆粉并花水調下

○解此毒神方

毒者 按此部 之畧字也 本細草 部

用江西豆豉一兩乾蚯蚓一兩為末凉水調服不拘多少立效 ○又宜用黃連煮水取汁去渣熬成膏子用黑牛膽停對加蜜少許調稠得所入磁瓶內每用凉水化下入口即活雖不言但心口動者還治得 ○又宜硫黃四錢豇豆粉五錢共為末冷水調服緩服之冬月温水服如肚痛再加一服待不痛用鷄毛探吐 後用溫稀粥下四五日不可食飯與稗

○誤吞木屑 搶喉不下死在須臾用鐵斧磨水灌下即効

○誤吞銅錢銅物多食核桃或葶薺其銅自爛

○誤吞針蚕豆煮熟同韭菜吃下針同菜從大便而出

○誤吞水蛭宜食蜜即化為水 ○又宜用田泥作丸如櫻桃大每一丸白水下水蛭即抱泥同下 ○一方用濃茶多服亦効

○誤吞金銀銅鐵等物不能化者以砂仁濃煎湯服之其物自下

蚕豆 一名胡豆

○白衣丸 治男婦小兒喉吞麥芒針刺銅錢鵝魚等骨硬在喉中及喉

烏賊骨魚 白茯苓 砂仁 山豆根 甘草 姜蚕 各五錢

管仲 一兩 硼砂 射香 珍珠 象牙 腦子 各少許

右為細末飛羅白麵打糊丸梧桐子大用蚌粉為衣陰乾每用一丸

冷水浸化頻服又將一丸口嚼化尤妙

○治慢食粉毒用伏龍肝水為丸百草霜為衣淋稗灰水送下即解

一男子偶然低頭往暗處藏身不言問亦不答飲食俱肯入竊食人見

之則食不下諸人以為中邪用三牲祭之其物經宿乃妻食之病亦

如是諸醫莫識予思必中鼠涎蓋鼠涎有大毒也以吳茱萸塞入猫

口猫涎自出將茱萸更令夫婦服之悉愈

一藥室家人正對藥忽仆地不省人事諸人以為中風痰厥乃訊于予

予曰此非病也必藥氣薰蒸中於藥毒令與甘草煎湯灌之立醒

管仲 本名賈魯也
車中作賈中苦
寒治婦人血熱

中藥毒

一婦人將燒酒貯于錫壺內經旬取服止飲一小鍾即醉悶不省象莫
識其症予曰此中鉛毒也今以陳土積水澄清入甘草煎湯灌之即
醒

骨硬

魚身較骨骨相三五丸云 該文二體骨相中二留也

○神仙釣骨丹 治諸骨硬其骨自隨藥帶下或吐或出如神

朱砂 丁香 各一錢 血竭 磁石 龍骨 各五錢

右為細末黃蠟三錢為丸朱砂為衣每服一丸香油煎好醋吞下如

要吐用絲荷煎好醋吃後用濃茶在服如無矮荷以桐油代之

○治諸骨酸喉以象牙末吹之妙○又宜將狗倒吊起涎出碗盛徐上

燕下其骨化水如神○又宜燈心以竹筒填滿火燒過取燈心灰用

米糖化開調灌下勿犯牙

○治骨顛白節糖入口嚼嚙卽下○又宜研砂大塊者水洗淨日夜爲
化嚙其骨自軟

○治鷄骨魚骨顛用霜梅肉搗成指大作丸子將綿裹用線穿在內冷
茶送下扯住線頭在手一嘔卽出○又宜胡荽葉搗拌醋并渣煎下
卽解

五絕

五絕病者一曰自縊死氣已絕二曰墻壁屋崩壓死氣已絕三曰溺水
死氣已絕四曰鬼壓死氣已絕五曰產乳死氣已絕並可救治又治
卒死并中風不省人事等証
半夏爲末如葶豆大吹入鼻中卽活心頭溫者一曰既治
一自縊死者且至暮雖已冷仍可治自晨至且則難此陰氣盛故也

然夏月夜短於晝又熱猶應可治又云心下若微溫者一曰已上猶
可治之當徐二抱解不得截繩上卡安被臥之一人以脚踏其兩肩
手挽其髮常令弦急勿使縱緩一人以手按臆骨上數摩動之一人
摩將脗脛屈伸之若已僵直但漸二強屈之并按其腹如此少頃雖
得氣從口出呼吸眼開仍按臆置亦勿勞之源史可以溫飲粥灌之
更令兩人以管吹其兩耳此法最効

一自縊者切不可割斷繩宜以膝蓋或用手厚裹衣物緊頂谷道抱起
解繩放下揉其項痕搖鼻及吹其兩耳待其氣回方可放手若便泄
氣則不救矣
一自縊死者宜從容安定心神徐二緩解下慎勿割斷繩抱起心下猶
溫者刺鷄冠血滴口中卽活男用雌女用雄一方鷄屎白如棗大酒
半盞和灌吸鼻中尤妙千金方以藍汁灌之餘法同上

○卒墮壓倒打死心頭溫者皆可救將本人如僧打坐令一人將其頭髮控放抵用半夏末吹入鼻中如活却以生姜汁清油攪勻灌之

○一救溺死方取甕中灰兩担埋之從頭至足水出七孔即活

○一溺水者放木甕上臥着將脚後發站起一磚却蘸鹽擦臍中待其水自流出切不可倒流水出此數等但心頭微熱者皆可救治又方溺水死者過一宿尚活抱皂角末綿裹內下部須更水出即活去死人衣帶等物灸臍中即活

○一救鬼魘死不省并中惡者皂角為末如菘豆大許吹入鼻中即嚏則氣通而活

一魘死不得近前喚但痛咬其脚跟及唾其面不省者移動些少臥處徐徐喚之元有燈則存無燈則不可點燈用皂角末吹兩鼻即活

一臥忽不悟勿以火照之殺入但以痛咬大姆指甲際而唾其面則活

取韭汁吹鼻孔冬自用韭根搗汁灌口中

一卒魔用雄黃末吹鼻孔中即活

一從高墮下瘀血沖心欲死

漆三鼓一盞水煎去渣服若便覺氣絕不能言取藥不及擊開口以熱小便灌之

一救冬月墮水凍死凡四肢冷口不能言只有微氣者不可便以火炙用布袋盛熱灰放在心頭冷即換熱者待眼開却用溫酒或姜湯灌之

一救伏暑死不可使冷水冷之即死宜用溫湯常摩洗其心腹間如路

途急切用路上熱土置臍間令人更尿其臍中即活用路熱土煎酒飲之即活

膏藥

彰德府 趙王府秘傳

萬病無憂膏

治風寒濕氣所傷跌撲閃挫傷損一切疼痛皆貼患處心腹疼痛俱貼患處哮喘喘嗽貼臍上或眼痛貼太陽穴及治一切無名腫毒癰疽發背疔瘡癩毒流注湯毒膿瘡初覺痛痒便貼患處即消已成亦能止痛癰膿長肉生肌百發百中其功不能盡述

川烏 草烏

大黃各六錢 當歸

赤芍

白芷

連翹

白欬

白芨

烏藥

官桂

木鱉子各八錢

槐

桃

柳 桑 棗枝各四錢

加苦參皂角各五錢

右剉散用真香油二斤浸藥一宿用火熬至藥焦色以生絹濾去渣

不用將油再熬一滾入飛過黃丹十二兩炒過陸續下槐柳棍攪不住手滴水成珠為度離火次入乳香沒藥末各四錢攪勻收貯退火毒聽用一方加蘇合香二錢尤妙

萬應紫金膏

治跌撲傷損手足肩背并寒濕脚氣風毒痛不可忍

瀝青二斤 威靈仙 二兩

車蔴子一百粒 木鱉子二十八個

沒藥為末

乳香一兩 若炙

黃蠟 三兩

生姜二斤 搗

生葱 搗汁一碗

麻油兩

春

秋三兩冬四兩先同靈仙熬去渣滴水不散為度

右將瀝青研末同一汗下鍋熬化看二汗盡時却起火桑柳條不在手攪却入前靈仙油同熬再下木鱉子草蔴子搗勻入內攪勻又下乳沒黃蠟再攪成膏矣每用好厚綿紙攤貼先將姜擦患處後貼上即用烘熱鞋底熨之瀉痢貼丹田嗽咳吐血貼背心三疼貼心上風損貼患處

萬病無憂膏

萬病無憂膏

五十一

●海仙膏 治風損諸瘡癰腫毒並效

赤芍 苦參 各等分

右二味剉片用香油浸過煎至焦枯濾去渣秤香油二斤淨再煎沸徐入蜜陀僧水粉各四兩

●千槌膏

粘錫也

松香 明淨者不拘多少為末 單麻子仁同入石臼內搗爛成膏如稀則加松香如稠則加麻仁須要稀稠得所取出入水中扯板數次再入乳香沒藥血竭孩兒茶各為末少許頑瘡加輕粉龍骨再扯令勻碎器收貯每用時重湯化開綿帛攤上貼患處神效

通治

丹蓬頭祖師秘傳混元丹

一專治大人小兒諸虛百損五勞七傷小兒百病隨後引用之

詩曰

百花未放此花先

修合成丹號混元

能除腸內諸般疾

安神定志最延年

嬰兒胎毒驚風症

疳積瀉痢嘔痰涎

立奏奇功真可羨

老無風疾少無癩

又曰

乘鶴西風出華州

袖藏千載混元裘

紅鉛黑汞東西產

白雪黃芽次第收

孔子泣麟周道否

下和識玉楚王休

藥中消息誰人會

脫却紅塵自在遊

混元衣乾者二錢按中

梅花三錢按北方

辰砂其一兩水蒸

細為衣六兩壯冊皮二兩煎水去

丹其半日一兩

坤松四錢去毛按秋金

按西方粉草一兩去皮按東方

我木三錢火煨過

縮砂三錢去皮按西方

益智仁一錢去壳按西方 人參一錢去芦按木香 木香一錢按南方

黃芪一錢按西方 山藥二錢五分按香附 香附二兩按東方

桔梗去芦一錢按東方 白茯苓二錢五分去皮按北方

白茯苓二錢五分去皮按北方 遠志一錢五分甘草 射香三分按中央

空固玄 天竺黃也 丑玄 三分按中央 空箇玄方 一錢按西 金箔 三帖為衣按西方

右共為細末煉蜜為丸如龍眼大單人大小加減丸數用之中風痰厥不省人事姜湯研下

傷寒夾驚發熱葱姜湯研下宜出汗

停食嘔吐大便酸臭腹脹姜湯下 霍亂紫蘇木瓜湯下

赤白痢裏急後重陳倉米湯下 大便去血槐花陳倉米湯下 小便

不通車前子湯下 夜出盜汗浮小效湯下 發熱金錢薄荷湯下

痘疹不出赤麻湯下 中暑煩渴灯心湯下

喘急咳嗽麻黃杏仁湯下

積聚腹痛姜湯下

虫癩舌練根皮湯下

血氣偏墜小茴太苧湯下

夜喘不止灯心灰湯下

急驚搐搦薄荷湯下

慢驚人參白朮湯下

諸病後無精神少氣力不思飲食姜棗湯下

胎寒手足冷口氣涼腹痛腸鳴姜葱湯下

面目四肢浮腫面黃茯苓皮陳皮桑白皮大腹皮姜皮湯下即五皮散

癰疾槐柳枝各五寸姜三片煎熟一宿五更溫熱送下

疝熱身瘦肚大手足細大便或淋或泄小便如泔陳倉米湯下

劫封通微顯化真人 即赤脚張三峰神仙所授

神仙萬億丸

朱砂透明鏡面 巴豆去壳并心

寒食麵於清明前一日本名寒食用白麵不拘多少好酒和麵一塊包
 右各伍錢先將硃砂研極細再入巴豆又研極細却將寒食麵去包
 皮取內細麵用好酒打成糕蒸熟入藥內仍又同研百餘下為丸如
 黍米大每服三五丸看人大小加減用之各隨証引用于后

感青風寒發熱姜葱湯下出汗
 心痛文醋湯下
 霍亂吐瀉姜湯下
 白痢姜湯下
 伏暑傷熱冷水下
 瘡疾作寒熱姜湯下
 積聚發熱茶清下
 小便不通燈心湯下

內傷飲食生冷茶下
 腹痛淡姜湯下
 赤痢茶清下
 赤白痢疾姜茶湯下
 諸虫作痛苦練根皮湯下
 心膨氣脹姜湯下
 大便閉結茶清下
 咳嗽痰喘姜湯下

急慢驚風薄荷湯下
 神應救苦丹 治諸風百痛如神
 大川烏畧炮 肥草烏畧炮 蒼朮 青皮去穢 生地黄 西芎
 枳殼炒 白芍各五錢 五靈芝二兩
 右共為細末酒打糊為丸如彈子大每服一丸細嚼熱酒送下汗出
 即効若為小丸亦可不飲酒者又用熱水下

治頭風腫痛 心腹痛 脚根痛 疝氣痛 手背痛
 遍身骨節痛 破傷風痛 棒瘡痛
 瘡疽發背及一切惡瘡痛

奇病

一項上生瘡如櫻桃大有五色瘡破則項皮斷但逐日飲牛乳自消

一寒熱不止經月後四肢堅如石以物擊之一似鍾磬日漸瘦惡用茱萸木香等分煎湯飲即愈

一太腸頭出寸餘痛若直侯乾自退落又出名爲截腸病若腸盡乃不治但初截寸餘可治用脂麻油罌盛之以臂坐之飲大麻子汁數升愈

一口鼻中腥臭水流以碗盛之有鐵色鯁魚如粳米大走躍不在以手捉之即化為水此肉壞矣在意饌食雞肉愈

一腹上麻痺不仁多者發白吃之自愈
一婦人小便中出大糞名交腸服五苓散効如未及愈可用舊撲頭燒灰酒服之

一兩足心凸如腫上面生黑豆瘡硬如釘子釘子履地不得脛骨破碎眼髓流出身發寒顛唯思飲食此是肝腎氣冷熱相吞用炮川烏

頭未傳之前非子湯服効

一腹脹經久忽瀉數升晝夜不止服藥不驗乃爲氣脫用益智子煎濃湯服立愈

一四肢節脫但有皮連不能舉動名曰經解用酒浸黃蘆二兩經一宿取出焙乾爲末每服二錢酒調下服盡安

一玉莖硬不痿精流無歇時如針刺捏之則脆乃爲腎滿漏疾用非子破故紙各一兩爲末每服三錢水一盞煎至六分作三次飲之愈則任服

一咽喉間生肉層二相疊漸腫起不痛多日乃有痰子其氣自出遂退飲食用臭橘葉煎湯連服愈

一腹中如鐵石臍中水出旋作虫行之狀繞身匝咏痒痛難忍擦掃不盡用濃煎倉米浴之以倉米末入射香少許水調服痊

化生丸之類之骨之數子

板藍汁 本經
藍集解

一眼前常見頭般禽虫飛走以手捉之則無乃肝膽經為疾用酸棗仁
 菴活玄明粉青箱子花各一兩為末每服二兩水一大匙煎至七分
 和渣飲一日三服

一太腸虫出不斷之後生行坐不得用鶴風末水調五錢服之自愈

一眼睛壘出至鼻如黑角色痛不可忍或時大便出血名曰肝脹用
 菴活煎汁服數盞自愈

一腹中有物作聲隨人語立用板藍汁一盞分五服之又名應聲虫
 當服雷丸自愈

一有飲油五升以來方始快意長得吃則安不爾則病此是髮入胃被
 氣血裹了化為虫也用雄黃半兩為末水調服虫自出如虫舌者置
 於油中逡巡間連油滲之長江

一治臥於床四肢不能動只進得食好大言說吃物謂之失說物望病

苦杖 虎杖也治
諸風痛至極血
結多

治法如說食猪肉時便云尔吃猪肉一頓病者聞之即喜遂置肉於
 病人見臨要却不與吃此乃失他物望也當自睡中涎出便愈

一手十指節斷壞惟有筋連無節虫行如燈心長數尺餘遍身綠毛卷
 名曰血餘以茯苓胡黃連煎湯飲之愈

一遍身忽皮裏混二如波浪聲痒不可忍抵之血出不能解謂之氣奔
 以人參苦杖青葙細辛各一兩作一服水二碗煎十數沸去渣飲之
 便愈

一眼白濁黑見物依舊毛髮直如蕪條雖能飲食不語如醉名曰血潰
 用五灵芝為末二錢酒調下

一着又多訖木痴便退落瘡內鮮肉片子飛如蝶形狀騰空去了痛不
 可忍是血肉俱熟用大黃朴硝各半兩為末水調下微利即愈

一歸臥渾身虱出約至五升隨至血肉俱壞每宿漸多痒痛不可言狀

真... 卷...

雖熨水臥未晝夜號哭舌尖出血不止身齒俱黑唇動鼻開但飲鹽醋湯十數碗即安

一眼赤鼻孔大喘渾身出斑毛髮如銅錢乃胃中熱毒氣結於下焦用白礬滑石各一兩為末作一服水三碗前至平冷不在飲候及乃安

一有虫如蠅走於皮膚下作聲如小兒啼為筋肉之化用雄黃雷丸各一兩為末摻在猪肉片上熟吃盡自安

一手足甲忽然長倒生肉刺如錐痛不可忍吃蔬菜自愈

一鼻中毛出晝夜可長一二尺漸粗圓如繩痛不可忍錐痛摘去

一莖即後更生此因食猪羊血過多遂用乳香礞砂各一兩為末以飯丸如梧子大空心臨臥各一服水下十粒自熱退落

一面上及遍身生瘡似貓兒眼有光彩無膿血但痛痒不常飲食減少久則透脛名曰寒瘡多吃魚雞韭葱自愈

一腸破出臭穢急以香油搗腸用手送入煎入參枸杞林之皮自合矣下喫羊腎粥十日即愈

一鼻中氣出盤旋不散延如黑墨色過十日漸至肩胸與肉相連堅勝金鐵無由飲食此多因瘡後得之煎澤瀉湯日飲三盞連服五日愈

一遍身忽肉出如錐既痒且痛不能飲食此名血擁若不速治潰而膿出以青皮葱炒灰淋洗喫豉湯數盞自安

一眉毛揮動目不能視交睫喚之不應但能飲食有經日不効者用蒜三兩取汁酒調下即愈

一毛竅節次血出若血不出皮脹膨如鼓須臾眼鼻口被氣脹合此名脈溢飲生薑水汁各一盞即安

一忽然氣上喘不能言語口中汗流吐逆齒皆揮動氣出轉大則悶絕

蘇復如是名曰傷寒併熱霍亂用大黃人參末各半兩水三盞煎至一盞去渣熱服可安

一曰內生肉疔其惡自己惡是有根線長五寸餘如釵股吐涎出飲食了却吞其線以手輕捏痛徹於心因不可言用水調生射香下錢服三百驗

一渾身生瘰泡如甘棠梨每箇破出水內有石一片如指甲大泡復生抽其肌肉不可治急用荆三稜我木各五兩為末分二服酒調連進愈

一頭面發熱有光色他人手近之如火燒用蒜汁半兩酒調下吐如蛇狀遂安

一人自覺自形作兩人並臥不別真假不語問亦無對乃是離魂用辰砂人參茯苓臘煎湯服之真者氣爽假者他也

一男子自幼喜飲酒至成丁後日飲一斗不醉片時無酒叫呼不絕全不進食日就衰弱其父用手巾縛住其手足不令動搖但扶少立欲取生辣酒一壘就於其子口邊打開其酒氣衝入口中病者必欲取飲堅不可與之須臾口中忽吐物一塊直下壘中即用紙封裹壘口用猛火燒滾約酒乾了半即開視之其一塊如猪肝樣約二兩重週回有小孔如針眼不可數計棄之於江飲食復舊雖滴酒不能飲矣

一夜間飲水悞吞水蛭入腹經停月餘日必生下小蛭能食入肝血腸痛不可忍面目黃瘦全不進食若不早治能令人死用田中乾泥一小塊死魚三四箇將猪脂溶攪勻用巴豆十粒去殼膜研爛入泥內為丸菘豆大用田中冷水吞下十九小兒只用二十九至五九須臾大小水蛭一時皆濕出却以四物湯加黃芪煎服生血補理方見補益

婦人產後忽爾乳伸長細小如腸垂下直過小肚痛不可忍危急須
臾名曰乳懸將川芎當歸各二斤半斤剉散於瓦石器內用水濃煎
不拘時侯多少溫服餘一斤半剉作太塊用香爐慢火添施燒烟安
在病人面前鼻下要烟氣在上不絕令病人低伏桌子上將口鼻
及病乳常吸烟氣直俟用此一料藥盡看病證如何或未全安畧縮
減再用一料如前法煎服及燒烟薰吸必安如安用此一料已足雖
兩乳略縮上而不復舊用冷水磨車麻子一粒於頭頂心上塗片時
後洗去則全安矣

婦人臨產服催生藥驚動太早夫肉離經而用力太過以眉膜有傷
產後水道中垂出肉線一條約二尺長牽引心腹痛不可忍以手微
動之則痛欲絕先服笑散數服仍用老生薑二斤淨洗不丟皮於
石鉢臼內研爛用清油二斤拌勻入鍋內炒熟以油乾焦為度先用

熟絹段約五尺長摺作結方令穩重婦人輕盛起肉線使之屈曲
作一團納在水道口卻用絹袋兜裹俟油姜稍溫傳在肉線上薰覺
姜漸冷又用熨斗火熨熱使之常有姜氣如姜氣已過除云又用新
者如此薰熨一日一夜其肉線已縮大半再用前法越兩日其肉縮
盡入腹中其病全安却再服笑散若歸湯補理切不可使肉線斷
作兩截則不可醫

一人患勞瘵兩年諸藥不効一日聞肉味其腹痛不可忍又恐傳染移
在空房候其自終經停二百病者腹痛氣息將絕思憶肉味之念忽
有入患鷄子三枚其病人俛仰取火低頭取瓦鉢煎熟吹火燻瘵瘵
鼻中有所碍將熟間忽噴噴一聲有紅線一條自鼻中出牽抽約二
尺長趨下在鉢中病人知是怪物惡用碗覆煎鉢中火力燒火不往
其鉢欲裂方任火開鉢視之乃是小虫一條頭目皆具已煨死如鐵

線樣卽以示家人後棄之於江其病卽安

一居民逃避石室中賊以烟火熏之欲死迷悶中摸索得一束蘿蔔嚼汁下咽而甦又炭烟熏人往致死含蘿蔔一匕者口中烟氣不能毒人或預晒乾為末倘用亦可或新水搗爛乾蘿蔔飲之亦可

一自行顛穿斷舌心血出不止以米醋用雞翎刷所患處其血卽止仍用真蒲黃杏仁去皮火礱砂少許研為細末煉蜜調藥稀稠得所食化而安

一身上及頭面上浮腫如蛇狀者用雨滴堦礫上苔痕一錢水化開將蛇頭上立消

一病人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒處或下刺宜急治之下部不曉此者但攻其上不以爲意則下部生虫食其肛爛見五臟便死燒艾於管中薰下部令烟入更入少雄黃良

一人被蜘蛛咬腹大如孕其家棄之乞食於道有僧遇之殺飲羊乳未幾日而平

一妖魅猫鬼病入不肯言鬼用鹿角屑搗末以水調服方寸上卽實言也

一蛟龍子生在芹菜上食之入腹變成龍子瀆瘻之用錫梗米杏仁乳饒者粥食之三升三服吐出蛟龍子有兩頭

一鬼擊之病得之無漸卒者如刀刺狀胸脇腹內切痛不可抑按或卽吐血衄血下血一名鬼排斷白犬頭取熱血一升飲之

馬希聖年五十餘性嗜酒常痛飲不醉糟粕出則寤便溺出後數六脈皆沉澁與四物湯加海金沙木香檳榔木通桃仁服而愈此人酒多氣肆酒升而不降陽極虛酒濕積久生熱煎熬血乾陰亦大虛陰陽偏虛皆可請按此人中年後陰陽虛時暫可活者以其形實酒中

穀氣尚在三十日後其人必死後果然

雲林暇筆 九十二條

一 醫家十要

- 一 存仁心 乃是良箴
- 二 通禱道 儒醫世寶
- 三 精脈理 宜分表裏
- 四 識病源 生死敢言
- 五 知運氣 以明歲序
- 六 明經絡 認病不錯
- 七 識藥性 立方應病
- 八 會炮製 火候詳細

博施濟眾

道理貴明

指下既明

醫家至此

補瀉溫涼

臟腑洞然

不辨溫涼

太過不及

惠澤斯深

辨書真偽

泄痢可起

始是專門

按時處治

今之扁鵲

恐傷生命

安危所係

- 九 莫嫉妬
- 十 勿重利

因人好惡 當存仁義

天理昭然 貧富雖殊

速當悔悟 藥施無一

一 病家十要

- 一 擇明醫
- 二 肯服藥
- 三 宜早治
- 四 絕房室
- 五 戒惱怒
- 六 息妄想
- 七 節飲食
- 八 慎起居
- 九 莫信邪

於病有裨 諸病可却 始則容易 自然無疾 必須省悟 須當靜養 調理有則 交際當祛 信之則差

不可不慎 有等愚人 履霜不謹 倘若犯之 怒則火起 念慮一除 過則傷神 稍若勞役 異端誑誘

生死相隨 自家擔閣 堅水必至 神醫無術 難以救護 精神自爽 太飽難克 元氣愈虛 惑亂人家

十勿惜費

惜之何謂

請問君家

命財孰貴

一南方人有患病者每延醫至家診視後止索一方今人構藥于市不論藥之真偽有無炮製輒用服之不效不責己之非唯責醫之庸明日遂易一醫如是者數致使病症愈增而醫人亦惑亂莫知其所以悞也吁此由病家之過歟抑醫家之不明與

北方人有患病者每延醫至家不論病之輕重乃授一二金而索一二劑刻時奏效否則即復他求朝秦暮楚殊不知人稟有虛實病感有淺深且夫感冒賤理之疾一二劑可愈至於內傷勞瘵之症豈可一二劑而愈哉此習俗之弊悞於人者多矣惟智者辨之

一醫道古稱仙道也原為活人今世之醫不知此義每於富者用心貧者忽略此非人之恒情殆非仁術也以余論之醫乃生死所寄責在匪輕豈可因其貧富而我之薄厚哉告我同志者蓋福以太上好生之

德為心慎勿論貧富均是活人是亦陰功也

一凡病家延醫乃奇之以生死禮當敬重慎勿輕視貧富不在論財自盡其誠稍疑之則非重命者耳更有等貴義之徒本得醫人之九病愈思財假言昨作何福易某人之藥所為吝財之計終不歸功於一人吁使不得其利又不得其名此人心亦不仁之甚矣

一常見冷時之人每求醫治冷患者臥於暗室惟懷之中並不告以所患止令切脈至於婦人多不之見豈能察其声色更以錦帕之類護其手而醫者又不繫於問縱使問之亦不說此非所以求其愈病將欲難其醫乎殊不知古之神醫尚且以望聞問切四者缺一不可識病况今之醫果必如古之神安得以一切脈而洞知肺腑也邪余書此奉告世之患病者延醫至家聲告其所患冷醫者對症切脈了然無疑則用藥無不効矣昔東坡云吾求愈疾而已豈以因醫為事哉

萬行集

一吾道中有等無行之徒專一談己之長形人之短每至病家不問疾
疴惟毀前醫之過以駭患者謂使前醫用藥足是何復他求蓋為一
時或有所偏未能奏效豈可槩將前醫為庸邪夫醫乃仁道况授受
相傳原係一脈同道雖有毫末之差彼此一當護庇願勿訾毀斯不
失忠厚之心也戒之戒之

一人道至要

- 存心以仁為主
- 起慾以剛為主
- 接物以恭為主
- 衣冠以正為主
- 起居以阜為主
- 游覽以適為主
- 修己以敬為主
- 出語以確為主
- 處事以義為主
- 飲食以節為主
- 步履以安為主
- 讀書以勤為主
- 慎獨以誠為主
- 訓行以清為主
- 容貌以莊為主
- 滋味以淡為主
- 坐臥以常為主
- 作文以精為主

- 窮經以理為主
- 立言以訓為主
- 日用以倫為主
- 贈答以謙為主
- 事君以忠為主
- 子孫以教為主
- 宗黨以睦為主
- 貧乏以濟為主
- 祭神以齋為主
- 處常以經為主
- 御眾以恕為主
- 幽獄以明為主
- 觀史以斷為主
- 學術以儒為主
- 交際以稱為主
- 辨論以直為主
- 事親以孝為主
- 妻妾以分為主
- 朋友以信為主
- 爭鬪以釋為主
- 御下以恩為主
- 處變以權為主
- 行政以德為主
- 使民以時為主
- 吟詩以情為主
- 異端以闢為主
- 宴會以和為主
- 辭受以禮為主
- 兄弟以讓為主
- 男女以別為主
- 故舊以厚為主
- 祀先以恩為主
- 奉上以謹為主
- 守官以廉為主
- 教民以倫為主
- 稅歛以薄為主

刑罪以省為主
民財以惜為主
蚕桑以種為主
盜賊以息為主
士卒以練為主
南賈以通為主
材木以儲為主
橋梁以葺為主
漕河以疏為主

良善以旌為主
民力以寬為主
城廩以完為主
流移以還為主
馬政以寧為主
交易以平為主
魚鱉以蕃為主
道路以平為主
邊塞以防為主

姦宄以懲為主
田土以墾為主
闡闡以寧為主
兵甲以備為主
鹽鐵以均為主
器皿以侈為主
鷄豕以育為主
關市以積為主
夷狄以霸為主

一問評世病

常見人家子弟在於父母之前有因分財產而怨父母不均者有聽妬妻言而怨父母不慈者有撫節已過而怨父母不道者有放肆奢侈

而怨父母拘管者有飲酒嫖賭而怨父母鈔束者有私其妻子而不顧父母衣食者有厚於外戚而薄於父母用度者有弟兄執定輪養而致父母飢寒者有父勞於耕收母苦於井臼夫妻安閑而還說父母不是者有父母患病不請醫藥而信言者疾難治者有父母衰老不行扶勞而輒言應該作蠱者若此之類難以備述嗚呼父母在日不行恭敬視如路人及至歿後却乃披麻戴孝揚聲號哭請僧供佛修齋追薦盛張鼓樂唱戲暖伴置備佳餼異果醇漿待奉賓客恐不盡情枉造樓碑做紙人馬等物炫目壯觀徒有千金之費全無一毫之益語云生事之以禮死葬之以禮祭之以禮不遵太聖之成言且悖文公之家禮不惟取譏於識者抑又博笑於大邦端書言數句以白世人一覽有則改之無則加勉暗室虧心神會搜檢禍福報應不錯半點言雖不文意思淺世病可革古風可遷慎之戒之愚

言可規

一放肆訓

嘗見世人負少年豪氣，習襟高傲，言語剛強，將謂無人，惟知有已。眼空四海，欺侮一方，好議人之醜態，不責己之過失。口勝魚腸，利劍舌賽吹毛快力，尤善于拒諫，飾非難逃。乎鄉評輿論，一日時衰運去，禍起蕭牆，常抱過次之驚，恒懷顛沛之厄，陷入重典，淹禁縲絏，浪費萬貫，難求一生蓋為不仁之所召也。嗚呼！豈若遵禮懼法，屈己右人，存心恭謹，安分脩德，使鄉黨稱為端人乎。

一聞訟訓

竊見今人偶因一言之忿，不忍或錙銖之利，不約輒然，聞毆構訟。夫我欲求勝于彼，則彼求勝於我矣。仇二相結，怨二相報，遭官刑，諸訊自罹重罪。又禁囚圍古不堪言，以致父母憂泣，兄弟愁悲，妻子驚哭，明

友歎負擯于金，而身命不保。畫日計而無可解脫，破家蕩產，禍貽子孫，尚未已也。嗚呼！豈若舍忿一時，後退一步，饒着一步，庶幾安家樂業，得享康寧，使鄉里稱為善人乎。

龔氏家訓敘

經曰：平天下，先治國，治國先齊家。豈古之求治者不欲一蹴至哉。顧王道無近功，誠謂篤近可舉遠也。故天下不自平平於國，國不自治。二於家，余家先邵武人，宦遊撫，因憫寓于谿家世業儒書，有繼美詩禮，相仍素稱雅俗。此來生齒日繁，好尚不一，自入倫日用，以至事物細微，雖未必人二皆悖求之人，二皆不悖，或未然也。余伯父分有公嘗慨支派易睽，本始靡泯，乃竊周官以九兩係民，義自兩自係作之譜，以懸族屬，猶曰：尊祖敬宗之心，未之達也。爰刑祠堂以修祀事，本宗百世不遷，昭穆以世遞降，子孫兄弟望松楸而君尊，有寄霞霜露。

而特揚可伸禮曰尊祖故敬宗二故脩諸斯可以觀伯父志矣夫
 有祠以報本及始有譜以聚族合離二倘人心不齊三首訓之便齊何
 以二道德同風俗祠誠虛器譜亦彌文也余客寓江京聞縉紳大夫
 譚治理每以家先之遂於暇日考諸儒之典酌風土之宜取其近禮
 就俗便於常行者議為二十類題曰龔氏家訓俾吾族人人行之世
 世守之俾臻比屋可封之俗蓋天下國之積國家之積余一家仁讓
 成風祀義範俗家亦矣由是齊吾家以及人之家則一國之家齊一
 國之家齊天下之國治天下之國治天下其平矣乎古人蓋見及此
 也傳曰人人親其親長其長而天下平固孟子意亦孔氏家法訓
 甫成欲刊于族遺僕歸持而詢之家君與夫諸父且第家君曰然仲
 兄敏所侄孫完初暨諸族衆亦咸以為然遂錄之

廿

萬曆十四年歲次丙戌夏四月初六日

宗人廷賢雲林題

●龔氏家訓目錄

- | | | |
|-----|-----|-----|
| 明五倫 | 正名分 | 立教養 |
| 冠禮 | 婚禮 | 喪禮 |
| 祭禮 | 謁祠堂 | 輪國稅 |
| 守法度 | 存天理 | 揚善 |
| 獎賢能 | 勵節行 | 懲惡 |
| 戒爭鬪 | 積陰德 | 勤儉 |
| 保守 | 宴會 | |

●明五倫

一五倫人道之大者不可不知君臣貴乎有義為君者忠信重祿以養
 士為臣者當竭忠効死以報君如孔明之事昭烈稱魚水君臣斯謂

之有義矣。父子貴乎有親，養育之恩等如天地。為父母者亦須慈愛其子，為子者必當竭力盡孝，以事父母。所謂之有親矣。夫嫌，貴乎有別所當遠，嫌古人執雁，蓋取其終身節義不亂。夫嫌者當相敬如賓，不相藝也。所謂之有別矣。長幼貴乎有序，凡于長者之前，侍立應酬之間，當執謙敬。王制曰：父齒，隨行，兄齒，雁行，不相僭踰。所謂之有序矣。朋友貴乎有信，凡言當近於義，庶可復也。且有責善之道，如范張之徒，斯謂之有信矣。

正名分

一宗族原係一休，本當和睦，其尊卑自有名分。所在於禮，必不可于犯。也有等強梁子弟，每恃血氣，或因爭奪財產，或因譴浪忿狠，或有倚酒撒潑者，動輒毆罵，尊長橫惡，恣其莫敢言之。似此禮法壞亂極矣。除已往不咎，自後合族子孫當恪遵家訓，共守禮法，毋犯前愆。如有

仍前肆惡不悛者，輕則治以家法，乃微示其罪，聽其改過。重則送官，如律以戒兇暴。其五服雖盡，而尊卑名分猶存，亦不可以踈遠故犯罪，亦如之。

一兄弟乃分形連氣之人，為人倫之重者，不可不篤。世人多不知是弟之愛，方且幼也，父母左提右挈，前襟後裾，食則同案，學則連業，遊則同方，雖有悖亂之人，不敢不相愛也。及其壯也，各妻其妻，各子其子，雖有為厚之人，不少衰也。噫！人家兄弟無不義者，皆因異姓成家，偏愛私藏，以致皆戾，以使分門割戶，患若寇仇，以此不可不慎也。凡我族人，兄弟者當體父母之心，所難得者，兄弟如手，與足缺之不可續，務須親厚，克敬弟恭。詩云：兄及弟矣，式相好矣，無相猶矣。蓋各盡其禮而已。

立教養

一教養 國家之自務凡我族人有子弟者務在擇師友極力教養達則致用于 朝廷不達亦可以明理于身心人生內有賢父兄外有嚴師友未有不成就者矣

冠禮

一凡子弟冠者先期一日稟聞尊長舉族中一位賢能者作賓閑於禮者執事俱冠者親請至期鳴金爲度闔族人等俱赴祠堂隨行禮公衆出銀錢置禮酒以賀其賓及諸執事惟命冠者拜謝合用香帛之類并本等衣巾俱冠者自備族人有事不到者免罰蓋冠禮由來所尚以責成人定不可廢但古禮人厭其煩多不能舉今擇簡易便宜于行者於此凡我同族子孫務要遵行如抗違私於本家社有罰其不服罰者不許入祠堂華元日之昨爲其不廢古禮之意

婚禮

一夫婚禮自古重之但世情偷薄其家禮納采問名親迎之設廢之久矣今既不能舉就本族倫序定不可廢凡娶婦之家三日先一日請聞闔族男婦至次日姑舅領新婦同衆謁祠行四拜禮及序大小拜見畢禮酒而退新婚者備報名銀若干入衆其合用香帛之類婚者自備族人繁衍請止一次至期鳴金族人有事至期不到者免罰

一凡婚姻當察其婚與婦之行及家法何如苟慕其富貴婚苟賢矣今雖貧賤安知果日不富貴乎苟其不肖今雖富貴安知果日不貧賤乎婚者家之所由盛衰也苟慕一時之富貴而娶之彼挾其富貴鮮有不輕其夫而傲舅姑者春成驕妬之性果日爲患曷有極乎且世俗多較財帛殊不知婚如論財夷虜之道此范又正公之言吾族嫁娶者當熟詳之

一凡生子者至歲除之日俱于祠堂上報名公置薄一本紀一族鬼嬪

名氏不致越序犯諱年終清查一次犯者重責二十板令其改正
一凡生女世人每患出嫁艱難輒用淹溺死於非命更不思女均是我骨肉忍心殺害此不仁之甚也殊不知苟不貪財則針線布亦
可嫁之其娶婦之家亦須隨人厚薄資送當信妻財子祿自有分定
不宜過索以傷兩家之好

一凡嗣所以繼統也自有昭穆倫序先察同父次及周親大功小功總
麻以上俱無應繼之人方許擇立遠房同姓者不可從寡母所願欲
使家亂以起爭端如昭房無嗣穆房尚幼必須待穆房子長成立繼
其穆房年至五十無立繼之人方許立繼不可乘年幼并圖財
鑽繼及之養異姓之子以亂宗枝如有此弊許族眾攻之

喪禮

一喪禮先人悉以文公家禮而行第今族中富有固而貧者尤重然

為風俗之壞專以佛事為尚使古禮多不能舉悲夫殊不知佛乃始
于漢明帝時方有十王受罪之說感亂中國晉漢明帝之前凡千百
世寧無生死輪迴者乎此浮屠誑誘之旨不足信也明矣昔唐李丹
書曰天堂無則已有則君子登地獄無則已有則小人入世人親死
則禱浮屠是不以親為君子何待其親之不厚哉就使其親實積惡
有罪豈能浮屠所能免乎凡我同族子孫務宜恪遵家訓共守成規
毋習流俗之弊枉為無益之費近來有等家本寒微一遇喪事竟不
揣度妄自揭借且兄弟數人貧富多有不同而所費乘乘均出富者
固不足惜貧者聲強未免借貸于人甚至傷產若此於死者何安古
人以貧而厚葬非禮也富而薄葬非禮也今後務在合宜隨其貧富
稱家有無吝其心而已如衣衾棺木礮記磚灰之類此不可缺者
其餘一切妄費慎勿效前令蹈於俗弊也戒之

祭禮

一本族舊於元旦清明除日俱有祭田及合用祭品禮儀并值于為首者悉條陳明白載在家譜吾族子孫務宜恪守成規隨時致祭毋得更敢有失追遠之意

一本族貧富不齊世態炎涼多趨富遠貧此人情之常凡遇富家有喪雖不計而莫不往吊奠者貧家雖和而亦不往吊况於奠于一脉親之義若此蕩然盡矣良可慨夫今議定不拍貧富年過十五以上病故者許即聞尊長勸公眾銀若干置奠儀及用祭文禮生等為之設一路祭或于眾門首或至彼家至發引日合族俱素服隨班行禮讀祝舉哀毋得錯亂祭畢送入墓所凡人生固可喜死尤可哀一且永別其情有不可過者然為世俗之壞莫不得泄其哀衷現親友尚知吊奠而族人乃係一休返視之不如親友者乎今設此奠使生者

得盡其情而死者亦有光矣如有不得其死者不與祭也

謁祠堂

元旦開族男婦俱於辰時至祠堂謁祖男子各於堂上嬭人各立兩房俟到齊男東女西序立恭神四拜禮畢自初而長逐一拜賀行兩拜禮隨給茶餅而退至午闔族俱于祠堂內赴席夫祠堂乃禮義相先之地以明昭穆倫序凡祭祀及進退坐立之間務各以禮自持毋得首簡褻慢參差失禮以取不敬之罪其本日飲酒因而閉歐者罰銀一錢

一祠堂係祭祀之所禮當潔淨祭畢當值者將祭與祭物洗淨同尊長驗過如有失損者估價賠償畢元鑰匙仍付尊長處其盜取與借用失損者及閑人亂入因而失損者并將他物寄頓于內以致狼藉不潔者俱聽法紂其親友往來遊觀不在此限

一男女訓各一條每遇祭祀族人環聚之時吟末冠子弟朗誦畢訓云
為父者必教其子為子者必孝其親為兄者必愛其弟為弟必敬
其兄必克勤克儉必克寬克仁毋恃強凌弱毋倚富泰其母計利以
傷大義毋徇私以防至公毋縱酒以放心性毋恣淫以辱爾庭毋用
嬖言以間和氣毋逞而氣以犯官刑女訓云事舅姑以孝順奉丈夫
以順從待妯娌以和睦育子孫以慈仁惟飲食是議惟机杼是勤毋
淫狎以徇家法毋妬忌以亂儀刑毋奢侈以殄天物毋長舌以離懿
親誦時務宜肅聽毋得誼誼違者罰之

輸國稅

秘稅乃 國家重務遲速必不可免者吾族子孫務宜早亦完納毋
得延挨自取罪辱此亦處敵之忠也

守法度

一法度 朝廷制度森嚴信乎如爐執不可犯三之則身無所至小則
破家大則喪身可不畏哉吾族子孫務宜謹守慎勿輕為徇犯之即
父母兄弟妻子莫能顧之戒之戒之

存天理

一凡子孫不肖不廉遭滅門橫禍者良由祖宗素不積德利己損人滅
天害理之所致也吾族子孫務宜心存天理志見忠良慎勿陰惡陽
善昧已瞞心暗害他人以種子孫之禍

揚善

一尚義疎財者乃有關於風化敦厚之俗也在 朝廷亦命有司旌獎
以優禮待之吾族子孫有尚義出銀濟眾至五兩以上者元日除應
得席外仍加半席出至十兩以上者特加一席以彰其善外豈揚善
簿一本付尊長處凡子孫有能周人之急扶人之危果有實跡許尊

長同族人紀其實至五次者不且除應得席外特加半席至十次者特加一席以旌其善其尊長族人不得嫉妬而泯其善

獎賢能

一凡有子孫能讀書游泮登科甲者此有功於門第宜加優獎元旦除應得席外特加一席以勵其賢有德壽膺冠帶者乃係朝廷息典亦當優獎除應得席外特加一席以彰其盛

勵節行

一族中有孝子順孫義夫節婦禮當表揚如果實行許尊長同子孫在學者呈聞本縣奏請豎坊旌獎毋泯其迹

懲惡

一本族二衆人繁賢否不一有等不肖子孫遊手好閑不務生理結黨成群飲酒賭博夜聚曉散致使衣食不給遂起盜心始則竊人柴蔬

禾稻等物因循日久膽惡漸積無忌遂爲強盜破家殺身固不足惜其累及本族貽辱先人莫大之禍也如此者族人當共誅之凡竊盜本族及外姓之物或訪出或捉獲當尊長及公族人等于祠堂上量所竊之物大小擬罪輕重如柴程蔬果之類重責二十板如魚樹禾稻之類重責四十板仍追原物給主如強盜及偷牛馬者或訪出或捉獲不論輕重當尊長同族人等鄉拿赴山即時埋死公衆立約五紙記其賍証一與尊長一與四大房以防後患其不願自死者并前不伏責者許尊長同族人據情送官如律其奴僕犯者罪亦如之外置懲惡簿一本付尊長處凡子孫有犯前惡者許尊長族人直書其名紀其惡迹至五次者尊長同族人執此經官里治以終其惡尊長族人亦當秉公不許懷私仇其巨惡者不在此限

戒爭閭

一爭聞乃不仁之事孟子云好勇聞很以危父母亦不孝也今後吾族子孫務遵家訓各宜自念諺云忍得一時之氣免得百日之憂此之謂也其果有不可忍之事許尊長分辨是非若尊長不能分其曲直方許陳告如有強梁子弟恃惡不先稟明尊長竟自告官者乃係骨肉相戕許尊長執此經官以違犯教令論然後分割曲直仍責原告

積陰德

一陰德司馬溫公有言積善以遺子孫子未必能積積金玉以遺子孫子孫未必能守不如積陰德於冥之中以爲子孫長久之計斯言信不誣也我族人務須衆行方便廣積陰功勿壞心由以種子孫祖苗歷觀從來凡人家子孫繁衍富貴綿二者未有不由祖宗積德而致之也今不能悉舉其有爲善陰陽之書可鑑之

勤儉

一勤儉爲治家之本斯言信矣夫人一勤則天下無難事其功名富貴無不自勤中來也一儉則勝于求人其布帛菽粟未嘗不是儉中事也爲士者勤則事業成爲農者勤則衣食足爲工者勤則藝業精爲商者勤則財利富君子各務生理勤乎外婦人各務紡績勤乎內如此未有不成家也其懶惰奢侈不破蕩家者吾未之信也

保守

一祭田係合族公舉乃子孫相承之業法不敢廢如有不肖子孫或因事告爭輕易將祭田盜賣者許尊長同族人送官以不孝論并贖還原田

一墳山係祖宗墳墓乃根本之所責任匪輕子孫保守督令每遇祭掃之日務加培整不致被人侵壞如有不肖子孫盜賣墳山者許尊長

同族人送官以不孝論并贖還原山

後龍山乃來龍發脉之所包山為包把護衛之設二者為族人生靈所係尤當豐蓄以助興隆吾族子孫務加嚴禁毋得傷損如有盜砍樹木者重責三十板罰銀伍錢柴薪者重責十五板罰銀一錢其盜砍墳山柴木者罪同

祠堂乃祖宗神主在內門墻為族人防禦之設二者所係不小凡有損壞許即稟尊長責令族人動眾銀修補毋致倒塌

宴會

一宗族子孫行客其本原皆由一人之身而分精神氣脉相為流貫故四時每遇佳節禮宜聯合古人敦睦九族燕享同姓宗廟而行旅酬之禮祭畢而有燕毛之序良有以也吾族舊有田若干所得租稅以供設席之費人將燕享之期聞列于後

正月元日大會合族男女俱登祠堂祭 祖禮畢宴飲 初二日小

會各拜親屬亦宴飲 元宵日 社日 清明日 端午日 七月

十五日 八月十一日神愿 中秋日 廿四日神會 重陽日 冬

冬至日 歲除 俱依舊例設席款敘情誼聯屬藹然親睦但以盡歡為度不許酣酒

放肆以壞家法違者罰之 右數條皆因族人為流俗所弊禮義廢之久矣吾痛懲其弊於是擇其

禮之簡便就俗易于行者綴為家訓以示後之子孫吾子有能遵守

者是為孝子也吾孫有能遵守者是為順孫也勉之望之雖然立訓

者然也体而行之在乎子弟之自勉也若說而不繹從而不改訓之

諄亦空言耳吾亦如之何哉嗚呼豪傑之士尚有不待教而興者

奚忍以吾言托諸空耶

五刻
崇禎甲戌歲春月新刻
萬病回春萃慶堂刊行

正保四年
洛陽三祿寺町誓願寺前
丁亥三月吉日
安田十兵衛開板

五刻
五刻
五刻

