





燈下集目錄

香一 カクシ
 十三 シソ
 降五 シノ
 九七 シノ
 截九 シノ
 升補十 シノ
 當地十三 シノ
 介養十五 シノ
 嘉禾十七 シノ
 木調廿是手卷
 正天廿三
 和股廿四
 補治廿六
 腰皮二 カクシ
 五積四 シノ
 仁王六 シノ
 多養八 シノ
 前清十 シノ
 香養十二 シノ
 生津十四 シノ
 順和十六 シノ
 加四十八 シノ
 初分廿是手卷
 分補廿三
 廣漬廿五
 胃令廿七



疎活 共

加仙 三

清化痰 共

大昇 共

十三天 共

清導 共

清柳 共

无汗潮 共

東泻 共

清肺 共

四芍 共

和中 共

聖 共

加五 共

四物調 共

大七 共

清肺咳 共

参令 共

通明利氣 共

香葛 共

温膽 共

已上 共

独生 共

三痺 共

大元 共

卷風 共

四君 共

二活 共

三五 共

葵洞 共

多調 共

清咳 共

木化 共

真養 共

柴柳 共

東弓 共

二八 共

参榮 共

三回七氣 共

ウ順 共

八解 共

已上 共 秘也

右ノ朱丹丸三方ノ七十一方也。此方ニ
八解ナシ故六十八方ト各々カ。此各ラ
七十一方ト号スルトキニ傳写ノアヤ
リカ

燈下集

香薷散

此方八輕發散之劑也從
香薷十兩重也十兩ヨリ
八腹皮重也腹皮ヨリ九
文重也次第如此

論曰浴四時傷寒頭痛發熱惡寒身
日氣蒸也發散之意者無余行表氣甘
表故有發散之意於發散之內輕劑
也第散氣快氣輕頭之方也

耳鳴頭ハウクマ心悪

胃腸ヲツツクル也

胃口ヲ開テ進食ヲ禁也

不食ス者ニ加シ宿ニ味能食進也

不食頭痛ノフレクト吐逆トスル女目ニ

イナトスニ用テ吉

咳嗽寒熱往來ノ類ニ無驗結

句此輕藥ヨシ

十ツナド用テ虫ニ支テ吐逆トスル用テ

ツカヘニ佳クアリ

勞瘵之咳無汗香ソツク佳也

上戸酒毒胸ニ支テ虫積出キヨクト去テ

香酸トスルニ子肉菔ヲ加用テ佳ク有

勞ト上ノ頭重或頭痛ニツク止メ加テ用テ

有氣鬱故用テヨキ有レ是者其芳

芷香ノ散ト名除氣屈其效諸頭痛

香ノ加テ羌活也也吐逆頭痛春香ノ

三ツ止羌活五苓茄ト補送細散

金沸ト吉蕒羌活冬十補送細散

茱皆豨羊可ナリ

有馬ノ湯ハ冬リ煩ニ用テ佳ク是湯

三升風ヲ引下焦ヨリ氣逆上テ痰

ツカヘトスル佳也

傷寒表証咽乾頭痛ニツク止香ソ

二升葛合ノ用テ佳ク有レ即香葛

也頭痛咽乾一段能胸脇之疼

不正腹痛色赤魚療治不驗此方不

換金之類解表佳也得切切也他

人如此不知也

氣不快頭痛不食寒熱往來或瀉

或吐痛吐止此皆氣痛也是ニ用テ佳

有

頭風カ風毒穢土此方丸菜ヲ二十
五粒与テ愈ナリ

腫痛用ニ是ハ大畧カ氣痛也

男風ヲ引テ後腫氣喉乾頭痛香
蕪ノニ倉加ヘ愈是ハ風故ト見テ加

用風濕兼々証
婦人之病ニシテ用テ多シ胸ツカ背ソ

口寒ク痰少出不快ニ用ソ
上氣喘嗽面目浮腫ヲ治ス

酒毒魚肉積ヲ治ス
是ハ散之菜ノ中輕方ヲ表ニ寒熱

有ニ用惣ノ多年病者ニ重キ菜ヲ用テ
菜ツカ丸ヲタル有ニ用テ佳ソ

惣ノ補菜血菜或附子烏頭ナト
熱菜ヲ用テ永ミ療治ス凡間ニ用テ

菜毒ヲ化シ氣ヲ順菜氣ノ積リテ
有テ散スソ

鼠ノ傷人先日カリノ裏ヘ入肢痛
自汗盜汗黃解ヲ与テ火毒ヤ肢痛

止後カ六ヲ与テ愈黃解ノ丹ヲ去テ
皎白地ナトアリ

是ハ交ナト端居或涼処ニ必シ擾入
風寒ニ感レ清湯出世俗ニ少風引

タナトニ云ニ用ソ
頭痛癰癰瘰癧清湯色不留胸支ナ

トスニ必用ソ 和日此方ハ菜毒ヲ
ケス菜也其故ハ癰癰瘰癧ノ胸ヲツク

此方丸菜ヲ二十
五粒与テ愈ナリ

名故也可秘

▲傷寒裏証ニ用テ有レシ表抑未悉

去裏ヲ早ク致裏ヲ抑サレ表抑不効

甚病重ク見ユニニニ或午ソ用テ

表ヲ發シヤレハヤカテ愈テ有。是人

不知所也。又曰裏契モ表ヲ發シヤム

生復有ソレ釜ノ湯ノ午リウクニ蓋ヲ

トハサス心テ表ヲクソクハ。内契モ

ソレニツイテ去ソ。當流ノ秘更ナリ

▲辛余入常過酒。持寸白。此方ニ成曲

良ヲ加テ用スルソ

膜皮ニ

膜皮ヲ産後ノ腫氣ニ先用

一有産後泄瀉痢病用

一有脹脹ニ用テ效アリ

▲論曰冷四時不正之氣寒疫時氣

山嵐瘴氣雨湿蒸氣或中寒腹痛

吐利中暑冒風吐瀉中湿身重泄瀉

或不服米煮脾胃不和飲食停滯後

外感寒頭痛憎寒或吐逆惡心

腎臟否悶或發熱無汗者並治之

▲奇曰此藥内外ヲ兼合タル全方也

則來朝時分方也此方玉梳傷寒

論ノ処ニテウツテアルノ發散スル藥

正氣ト名ト云々

▲是方ハ二陳ヨリ出タソ。是方ハ十ソヨ

リ八更ニヨリ重イノソト十ノハ咳嗽ヲ
治ス是方ハ霍乱瀉頭痛ヲ治ス故

病ヲ治スル処ハ是方ハ重ク十ノハ輕ク
惣ノ八重ク此方者輕ク傷寒陰証カ

リタルニ用テ佳ク有陰証ハ元氣ノ
虚ナリ陰証八日不了トクタヒレウツ

カリト眼ニヒカリナクレツカナリ此証
ノカロキニ用テ有キツクハ八解トツト

本ノ陰証ナスハ四君子ニ熟ノ附子ヲ
加テ冷服ス熱回寒用ノ法ナリ此ノ

正傳ノ傷寒門詳ニアリ
サテ内傷生冷外傷風寒タキ必用

方ナリ
亦ハ湿霍乱吐瀉腹痛必用

▲傷寒感冒少重キニ用
▲類中風ノ氣中ニ去証ノ俄ニ氣ヲトリ
失フ証ニヨク兼テ用又ハ八味順氣ヲ

用テモアリ
▲風邪ニ感ノ惡寒発熱眩暈頭痛
ニ用テアリ

▲又ハ一忘ノ食傷ニテ腹カサノトタリ或一
忘ノ風寒ノ証ニ用テアリ

▲右ノ氣口緊盛ナルニ食傷トナレハイヨ
クヨシ又内ニ腹朴ナト有ニニ腹ノ

脹ナトニヨシ
▲交月泄瀉五六度瀉霍乱腹上云

必用腹痛脹脹ニ佳ク
▲咳嗽ニニソナソナ上テ不效ニ是方ヲ

用テ佳^一有

▲八解^{ハチケサ}上モノ六君^{シクシクウウヨク}婆娑^{ハハ}淡^{タン}ヲ加ヘタル者ナリ。陰証^{インセイ}表散^{ヘイサン}ノ劑^{ザイ}ナリ大肢^{ダイシ}ノ症^{セイ}ニ氣^キ中^{チュウ}卧^ワ。自汗^{ジカン}アルニ必用^ニル

▲又ハ陰証^{インセイ}脈^{マク}ナキ^ニハ昔^{コト}許^{コト}ウツラク^トトウツケテ^ハアホウ^ノヤウ^ナハ八解^{ハチケサ}ヲ用^テテ脈^{マク}出^シテ愈^スタ^リ有^ル。セテ八解^{ハチケサ}云^フ是方^ハ大^キ肢^シヨリ氣^キヲ補^フフニヨ^リニ脈^{マク}微^ヒ細^{サイ}體^{タイ}ノ中^{チュウ}卧^ワタルカ陰証^{インセイ}ナリ。大成^{ダイセイ}命^{メイ}傷^キ寒^{カン}門^{モン}可^ク考^{カウ}

▲陰証^{インセイ}脈^{マク}微^ヒ細^{サイ}テ口^コニツ^ツフ^クトト^ト妄^{マヤ}語^ゴノ云^フ先^マ小^コ柴^{サイ}ヲ与^ルテ熱^{ネツ}ヲ止^メイテ見^ミテ契^キ不^ク去^ク。後^{ノチ}四^シ君^{クニ}子^シ湯^{トウ}ニ附^ク子^シヲ加^フテ冷^{レイ}服^{ボク}ス。又ハ八解^{ハチケサ}ニテモヨ^クシ。延^{ヒキ}壽^{シユ}ヨリノ相^{ソウ}

傳^{デン}モ八解^{ハチケサ}一^ト也^{ナリ}此^{コノ}証^{セイ}ニ回^{クハ}益^キ氣^キ養^{ヤウ}神^{シン}湯^{トウ}ナ^リモ用^テ佳^クナ^リアリ

▲陰証^{インセイ}ノ傷^キ寒^{カン}ウ^シカ^クト悉^{シツ}ク陰証^{インセイ}ニ^ンナ^ル病^{ビョウ}人^{ニン}アリ。二^ニ十^{シユ}四^シ五^ゴノ男^{オトコ}サレ^ル凡^ニ皆^ニノ氣^キノ脈^{マク}アリ^チヨ^クツ^トヨ^リテ見^ミレ^ハイ^カニ^モ

脈^{マク}緩^{クワン}和^ワニ^ヨク取^リレ^ハ七^{シチ}動^{ドウ}ホ^トナ^リサ^レ凡^ニ右^{ミダ}ノ緩^{クワン}和^ワナ^リトヨ^クカ^ク外^{ガイ}感^{カン}病^{ビョウ}ノ驗^{ケン}ナ^リ。則^{スレバ}四^シ君^{クニ}子^シ湯^{トウ}附^ク子^シヲ加^フテ始^{ハジ}中^{チュウ}終^{シュウ}用^{ユウ}之^ヲ

▲大肢^{ダイシ}ハ必^ニ感^{カン}冒^{ボウ}傷^キ寒^{カン}皮^ヒ膚^フノ病^{ビョウ}ニ^用又^ニ陰^{イン}症^{セイ}ク^クタ^ヒシ^ノウ^ツト^リト。目^メナ^トウ^ツツ^カリ^トモアル^ニ。補^ホ益^キニ^附子^シヲ加^フテ用^フ有^ル

▲又^ニサ^ウク^クト^ノ如^シ秋^{アキ}冬^{フユ}陰^{イン}虛^{キョ}ナ^リ大^{ダイ}陰^{イン}口^コ齒^シ鼻^ビノ間^{カン}ヨ^リ入^ルタル風^{カゼ}ニ^必此^{コノ}柴^{サイ}ヲ^用ス。又^ニ旅^{リョ}行^{コウ}遠^{エン}路^ロヲ^經テ^来テ^病肢^シ泄^{セツ}

或痛ナトスニ用テ右ノ証ニ不換金亦佳

▲瘧初テ発スニ先熱ヲセシメタイトクモヤ
キニ回ニ散邪湯ヲ用。又瘧ヲ感冒
ナト跡ノ養生菜ニ用ルアリ

▲又痢疾ナト或ハ附子ナト用タ某毒
アニ用夏有。香葛丸文ナトモヨク

▲腹痛心痛ニ虫ノ療治ノナラヌ又天豚
或ハ不換香葛ナト毒ヲ散テ佳ト有

▲感冒不正ノ氣ニフラクト眩暈氣
不快惡寒ニ発熱スニ用

▲瘧初発汗ヲ発シ度肢ニ用テ有
食タリン泄利スニ

▲氣鬱ノ背塞也
腫氣脹滿ニ用テ有

▲他医病ニ不答某ヲ用テ某毒有ト
シテ此方ヲ用テ発散ノ。又別ニ其病ニ
合スル方ヲ用スニ

▲治日産後ノ腫氣發熱アルニ用テアリ
止入故ニ用乏也

▲和日如瘧惡寒後發熱頭痛ニ或ハ
汗少出ニ用テ効ヲ得テ有參養食

▲症ト似ル夏アリ
大肚合平ニ降入平合ン用テ得効

▲又日感冒木半愈手心熱或夜間熱
来小便黄。氣熱不快。自汗干時

▲頭痛惡寒如瘧疾初発未分瘧
或感冒及傷寒之時。瘧ニ定テモ用

テ必得効

中并曰秋冬下痢裏急後重不換

加兵木得効云リ

冷日感冒初テ発ニ用テ有

瘧ニ天版ニ兵菓童柴恒テ加テ用

得効有

和曰外感挾内傷ト素ヨリ冒風寒

未発加之飲食勞倦触動スルヲ云

是ニモ外感ノ邪有輕重ヲ可考九

羌ニ去精并用白木之説アリ

如内傷脾胃外感寒邪者是方

可也

和曰内傷ト云テ飲食ト云トカワリ有

吐痰冷ルト云テ加玄杏用ルテアテ喘

息ニ存テ加萊ヲ用テ有

十ノ三

論曰治感冒風頭痛發熱咳嗽色重
涕密稠粘大解肌熱寬中快
膈或勞倦潮熱往來並治之

▲壽日感冒咳氣ノ主方四時共ニ用
ル方ナリ

▲傷寒七八日身熱譫言小便黃
赤ク胃痰ツカレニ用テ効ヲ得ルナリ

▲氣難順旨ニ痰有テ咳スルニ

▲勞熱有テ微咳嗽スルニ

▲胸悸動スル四物ト合ソ用ル有

▲咳嗽吐血スル四物ト合ソ用

▲婦人勞瘵無潮汗足冷上氣スルニ

ツト四物ト合ソ用

▲胸ニ痰有テ或有水則必脈カキル者ソ

積アリテモキルモソ

▲又曰感冒發散ノ主方ナリ

▲小兒痘疹疑似ノ間用テ分葛ヲ用

ルハ勿論也但シ子中川タラハ王氏懼

クニヨシ先此葉ハ痰氣ヲ導ニシタ方也多

クシタハ此葉ノ証衛氣虛ニ用ル心也

又氣ヲ廻サシタ也此葉ヲ用テ斑ノ出ル有

如何トシ表熱甚キ未ハ故ニ出ル有ソ

其時ハ升葛一ニテ可發散ナリ

▲湯寒去日大柴胡湯ヲ用テ妄語ナシ

ルニ是葉ヲ用佳夏有唯表ヲカカリ内熱

カ爾スル故ニ是ヲ用テ熱ヲ外ハ發シ舉テ佳有

又黄解ノ証ノ如ク證言口乾舌ヤケレ
脈数有力或如有力モ有メ黄解ノ
ヲ与テ熱不退ニ表證未除ト見テ
佳トアリ是ニモツト熱ヲ冷シタ文
ヲ加テ佳

回ノ咳嗽門ノ十ノ勞痰トナシテ
シ治ストナリ

痰喘胸苦悶スヲ治
治曰冬月感干寒咳嗽痰如哮喘痰
難切頭痛熱有本方ニ香承ヲ加
テ用テ佳トナリ

小兒驚風ノ初テ発ニ先用テ胸へ
痰ツカヘ否ヲ防ク用テヨシ

感冒ノクラクトナリ咳ニナラ治スソ
懷妊ノ傷寒必用テ佳ナリ
依証此方ヲ用ルニ加ラ去一有又參
ヲ去テ用一入參平大陰ノ經へ入テ火
ヲ助ルニ依テナリ故ニ咳痰ニクテ加
用ハ咳痰ノヨク重クナレトナリ

衛氣甚虚シ氣虚甚キ是方ヲ
用テ不叶トナリ其狀ハ參ヲ加テ用ソ
傷寒裏熱ニ用一ナリ裏熱ツヨケレ
表ノ衛氣ヲ開ルニ依テ熱表衛有
裏熱ハ黄解ナトヲ用テ治除スニ
未退ソテ下医一々裏熱トナテ
大兼ノ類ヲ用イヨク不効ソテテ
或ハ解九丈ノ類ヲ用テ発之効アル

ナリ

裏ノ証ヲ見至ノ十ニ七裏ニ熱有テ
表ニ十ノ一モアリ此表ノ証ハ輕カレハ可
為工夫

尋常頭目不清似痛不痛是方
ヲ用テ効ヲ得ル有

▲中清曰是方去參常ノ合制衣ノ置
病ニ依テ用ニレ不効持テ熱水カクト

ノ氣重不快身熱スニ參多ヲ加テ用
ユルハ汗出効有リ。是ノ理ハ

氣弱ニ依テ衛氣不行邪ノ出ル道
ナレ故ニ參多木之カヲ以テ邪ヲ追

出心ニ上スリ
治曰男子咳痰感冒ノ後上焦尙
熱其痰淡口乾上焦有汗脈細數

十ツ与ニ降合用テ効得ルアリ
▲又曰十ツ雪杏ノ類ヲ加テ咳痰用有

小兒驚風飲或疑似ノ時此方ヲ用
有ノ痘疹疑似ノ時ニ升葛ノ

不發搐升葛之証ナリ又曰十ツヲ
用ル有

又曰小兒脾虛亦元氣甚虛涎不能
如痘如痰涎出モノアリ是四君ヲ白

附或六君ニ白附ノ証アリ
傷寒陰証ニ用是表ヲ發ノカラ療

治スナリ十ツヲ用テ熱ヲサシテ十ツ
用過ト思タル時洗沃ヲ用少クニリカ

熱ヲサシシタ夏有十ツニヨラス九ツ
十ツヲ分別ノ用タツ

和日玄治法即購噎ニ用イラレ冬有

十歳ノ小兒感冒熱退後咳甚用

六君子湯雖咳少止汗多出脉五動

如有力用一方十湯汗止咳亦止

啓曰小兒感冒熱退後甚六君子

用ル一有之故ニ用タレ咳ハ少止タレ

汗多出六君子湯ハ汗ヲ発ス方ニ

テモナキニ何トレタニ汗多出タソト

云ニ前証今少邪氣残タニ依テ六君

ノ補助ヲ得テ邪氣不散多ホヲ

以皮膚ヲ閉塞キ衛熱内ニ蓄シテ

汗外ニ出タル也其眩ナソツ用タレハ

汗止咳亦止ナソノ汗ヲ止ル方ニテモ

ナキ何トレタニ汗止タソト云ニソソ

ニ表氣ヲ順シ衛熱ヲ散シタレ六邪氣

残ハ手ク衛熱ヲナスモ無テ自

然ニ止タルナリ六君子湯ニテ汗出

理ノ自然ナリナソニテ汗止一當流

ノ手タテナリ可秘也

杜年之男感冒發熱及十余日無

汗時ニ譫言口乾尿黄大便順脉

細數右之証啓迪院用參ソ飲

全安

五續四

松曰此方ノ奴麻証ニ依テ

問去一有ソ

論曰治感寒頭痛身熱吐衄或寒濕手脚酸疼

壽曰夕夕々々中寒之方ナリ秋ノ末ヨリ春

初ニ至テ専用方ナルサナカラ命六如

此イハ是ニカワルヘカラス其モ用一

有ソ心ヲ付ヘシ

中寒肢痛上熱下冷腰痛身節痛用ソ

傷寒ニ即病ハ三陽証直ニ中ノ則

去陰ノ証ニ寒中リ足冷肢痛口禁

ナトスルニ用一有或附子理中ヲモ用

ル一有ソ此ニ方少異アリ心ヲ付ヘシ

附一四逆一四逆ハ姜附一ヨリモ方

輕心其入スソ

微寒濕筋挛身節如裂痛ニ

用方ソ

寒熱ノ脚氣ニ加米也用ルソ

女ノ腰ヨリ下冷痛上氣充ニ用一有

婦人經水感寒不行ニ用

冷テ疝氣充充ニ練子膝良候

用一有或七情ヲ用一モアリ

下焦甚冷テ上氣スルニ用ソ

産後ノ惡血トコリ身肢冷肢痛

至ニ用ルソ

冬月或余月身ヲ打血滯リ

冷血滯リ不行痛ニ乳勿或悉

用過還テ中寒ノ証出ルニ用テアリ。
ソレハ元氣弱キニ依テ如此

▲又婦人帶下腰ケニ用テ有ソ。ソレハ
上氣足冷面赤ク火ヲタクヤナル用

赤ハ腰へ水ヲ置タルヤウニ用テ
佳ノ甚ク山并ヲ食タ舌ノヤウニ

痛ニ用テ。或血ヲ破リ。四物ニテ血ヲ
温ルノ故ナリ。不分冬其月腰已下

痛ニ用テ。此証中風ニ似タリ。痺生ルニ必用

テ効アリ元氣弱ケレ也。一老人卒
ニ唇ユルリ。口ヨリ涎流レ出。足冷ニ

用テ愈。此老人中風ニ依テ用方ナシ是寒
改唇ユルリ又ツキ山毛寒濕ノ証

婦人白血長血虚寒屬スニ吳茱
ヲ加ヘテ効有ソ

▲産後惡血残り塊冷心下へ攻上ルニ延
ノ類ヲ加テ用ソ。丹溪ハ是ヲキコヘヌト

云テウチタレヒヨキフ有ソ心ヲ付ヨ
▲一男六月炎天ノ時。三年以來膝ヤ

手ノ筋カニツテ木伸ヤセコケテ骨
ト皮ト許丸ニ用テ効ヲ得タ。炎天

ノ時上云ヘ初寒濕ニ感ノ有ニ用
テ木叶者名復此方ヲ用ニ麻黄ヲ

去テ用ルモノ。然レ此方ヨク成ヘキ
ト思テ其一ニ用タリ

足下冷ニ用方ナリ

滋降ノ脈ハ細數無力。医王ト此方ト
ノ脈ノカカリ。医王ノ下ニ臣之。医王
ノ脈ノ内ニテハ數カ契。此方ノ脈ノ
内ニテハ數カ熱。此文難悟誤乎
ニ潤ヘルユニ細ナリ。火動ユニ
數也

シ降火一五

論曰陰虛火動勞瘵ノ主方ナリ

▲壽日午後ヨリ至夜嗽多者ハ属陰

虛火動。必用テ佳ソ

▲黃昏ニ嗽多ハ火氣浮テ肺ヲ制必

加涼茶用ヨシ

▲火嗽上モノハ有邑。痰少ク面赤身熱

脈數十九モ、ソ

▲乾咳嗽喘痰者是痰附火抑有

肺難治

▲勞嗽ハ盗汗痰ヌク作寒熱。脈數

大無力。右已上四証皆勞力酒色ノ子

ス処ナリ。或憂思鬱結陰虛火動

ノ嗽モノ皆是方佳ナリ

▲全日此方ノ証ニヤキ(ユカヌニ心氣

シテ用テスレバ効ヲ得タリ此沙汰ヲ

分心氣ヲ除下ニ詳ニ有ソ

▲陰虛火動喘スルハ皆心脈熱ニ覺シ

ク先吐血ノ後ニ見痰者陰虛ソ

▲骨蒸勞熱ハ陰虛火動也加六知此

藥ヲ服熱不退炒黒ノ干姜加ヘタ

カヨイソ

▲盜汗不正ニ加色酸ニテ炒用テヨキ有

痰火咳嗽氣急生痰加雪苑今歴

▲乾咳無痰及喉痛生瘡色丸者

准治文菜者貝玄杏雪苑丹喉生瘡

色音不清或咽燥スルモノソ。虛火

盛陰虛火動小腹痛回。木ノ加ヘ去

▲又白根本此証盜汗咳嗽色ヨリ潮

熱尿黃精力ナク五心熱夜公症

重クナリ脈細數ニ無方咳氣ツ

荏弱ソ

▲咳嗽不正盜汗出平素好色為陰虛

之瘰後余熱ノ如ク心熱小便赤并

ノ上氣有テ不快ニ服皮ト本方ト合

用テ佳メ。服皮ニ合テハ酒食或ハ外

感。手腕。有眩ノ酒色外邪無ク本

方可ナリ

▲私白感冒ノ後盜汗自汗皮膚層々

ノ湯感風咳嗽痰ニ熱性米。手

可下

水自生焉治移神勞役饑飽勞役

▲壽且是方脾胃虛弱而胃氣難升

治之藥方

▲脾胃虛弱而胃氣難升自汗盜汗用

▲脉大ニノ力ナク陽虛ノ煩熱此方佳

▲病後虛羸久不愈諸藥不効

▲モ之用テ可也心肺ノ元陽ヲ升セ内

▲不足ヲ補フ藥方ナリ

▲右ニ所謂脉洪而無力上云又變ノ

▲イ主ノ證ニ脉弦有方モ有之堅脈也

▲眼色下ホフノヤウニ目瞳ニハリナクツツ

▲トリトシ自汗盜汗有二寒熱往來レ

▲中氣虛スル氣下焦ノ陰分ニ下陷

▲スルニ依テ如此有之陽氣少ホ時愈也

▲痲痺日久體クタヒレ後重不除大便

▲如結ニイニ加木兵桃工斷ヲ効ヲ得

▲ル有ソ

▲勞役ノ後感冒体虚メアニ加羌屏

▲名益氣養神一如此ナルニ此益氣

▲養一可ナリ

▲傷寒或諸病大半愈元氣不後勞

▲役ヤニカヘスニ此方用ルヲアリ

▲色高氣ガシラシク為火實色微少真

▲氣ノ虚ナリ

▲真元之虚ノ傷寒ニ九文五積ナト用

▲汗多出テ後カト申ツクト

▲熱氣イテ脉虚ヲ少數ナルニ必此方

▲ヲ用テ佳ナリ有

傷寒ノ後元氣虚升ル氣ナキニ大ニ
血下リテ血崩スアルニ必用牡ノ類ヲ
加テヨシ余熱大有テ大ニ血下ルニ黄蘗ニ或
四物ニ合メ用ルモ有。或涼膈ニ用
ルモアリ

▲半産ノ血下ル一三日昏昧不省全夏
イ王加子

▲心痛風百節痛毛用アリ。本方加
羌云七伸痛止則加味ヲ去テ本方ハ方
リヲ用ヨ

▲傷寒ノ表症汗ヲ発ノ後ニ神氣中
卧或妄語身ニ熱アリ或ナレ右ノ関
脈盛大ニ無方ニ用。若脈細數ナスハニ

六君子四物ノ夏ハ夏ニイニナルヲナレ附
子ヲ加用証下類ナル故ニ云リ。夏ノ外

骨ヲ折草卧テ熱氣出テ傷寒ノ
表証ノ如クナルニ誤テ発表ノ劑ヲ用ユ

ハカラス。此証多ク有。後煩ノ者多
カルヘシ心ヲ可附今思フニ西君子ニ附子

ノ類ヲ加用フモ世ニアルハ此證ト又傷
寒陰証ニ身微熱シ夏ノ外神氣ヲ

レ不知久脈或數或平テ無方ナトゾ

▲傷寒愈テ後或房勞或食傷或
勞役ノ病後ス夏ノ外神昏ノ体中卧

脈無方或弦タルニ加附子ヲ用ルモアリ

▲一身麻痺スハ氣虚故ナリ矮木ノ類
シ加テ用テ有。加味益

傷寒發熱日中晴弱ホツチヲタテ。晴弱ヒトニヨク。ワツトリトア

ホフノヤウナルニヨシ。此証ニ小便黃コウキヲ

ハ黃白ワウハクヲ加テ陰火インカヲ下ス

泄瀉痢病セツレキ或ハ瘧マタトモ元氣ゲンキノ虚キス

用ヘシ諸モク可ク心得ココロエ

痢病愈ユ一ハ大半ダイハンニ日ヒ及ツ。ニハタハ十ジュウ五ゴ空クウ

残ノコテ体タクタヒレ膿ノ血ケツ交カウ後ノチ重オモシアルスニ或ハ

大便ダイベン不フ快クワイ結ケツスルニハ矢ヤ桃トウエラ加ケテ用ヨ

秘結ヒキツナリニハ身ミ加ヘテ用テ通スルヲハ

少シ是レハコクク体タ虚キョウ津ジン液エキ尽ツキテ如此ノチ

速スニ通スルニハアラスル葉エフヲ用テ中クウルヲヌ

四五日ニ通スルヲ

痢体リノタクタヒレ後ノチ重オモシ不フ退タニハ肺フイ心シンノ元陽ゲンヤウ

元氣ゲンキ虚キョウシタル水腫スイシュウ脹滿テウマン不フ食シナリトモ

用フアルヲレハ元氣ゲンキ甚シクカレタヲシ

先マ神シン氣キヲ取立テサテ水腫スイシュウノ葉ヲ用テ

モ脾胃イ分リ利スヲナケレトモ用テ脾胃イ

ヲ取タテ後ノチニ治本ホン病ビョウ心シンナリ是レ急キウニシ

ナキハ治其キ標ヒョウ也ナリ素問ソモンノ法ナリ參シン苓レイ

旨シニ支ルモ有リ不フ苦ク後ノチ又マタテ灸背セ上ノヒ

ヲ多ク有ルノレハ必ズ治スヘシ用テモク支

不正フセウハ不治ス

勞後傷寒ロウゴナリトモ元氣ゲンキ虚耗キョウロウ久キウニシ差サ

云フ加ヘテ用此ノ葉エフニハ不フ愈ユニハ加ヘ附フ子シ用ス

ルノ又マタ陰イン症ショウ傷寒キョウカンニハ四シ君クニ子シ加ヘ附フ子シ用ス也

傷寒キョウカン余熱ヨネツ預愈ヨクテ又勞ロウノ熱指サシカヘ

スル有リ此ノ方ホウヨシ

▲小兒痘瘡湯浴ノカセシ引發熱自汗スニ用テヨキナリ有

▲傷寒沐浴ナリ風引熱氣出元氣ク々ヒレ終日妄言不ヤウキモ此益氣ニ養神湯或輕ス膠皮又ハ解不換ノ類證ニレクカツテ可用ナリ

▲傷寒熱甚クヨキニ九文ナリテ大汗

甚クタヒレ熱未退口内テツクハト

妄言ノ脈數大ニ何レシヨウヤウナ

キニ用テヨキナリ。諸病眼腫ヨ

キ人ニ佳ナリ

▲傷寒熱未アムニ多汗ノ陰虛ニ成

有。脈細數ニ咳イテ志ニニリ秋冬

ノ後ノ如ク眼冷フアリカラス熱氣モア

リ盜汗モアリ是ハ陰降ノ証ヲ發

散ノ後滋降医王ノ証ナリニ九フタ

▲傷寒汗吐下ノ愈テ後元氣未復

復シ行ヒ熱出。ウツカリトク居ルニ用ユ

者。此証ハ顔色ヲ見カキ要ナリ。惣ノ

外感ノ証ト内傷ノ証トハヨク心ヲ附

▲医綱ニ陰易陽湯去フアリ本方ニ黒

少ヲ加テ用フアリ

▲又産後ナリ血多下過ルニ方ハ或四

物ノ用テ不正無効ニ此方ヲ切得効

ナリ脈多分細數ニ成。又崩漏ニヨ

レ又血多ラクト下リ脈モ細ナルモツ

子ハ子般テイソ。レテ不効ニ此方

ナリ

ナリ

ナリ

ナリ

可也效黃解之用証モアリ心付ヨ

▲風毒腫膿スル惣ノウニ出テアソコカ
腫十トスル如九文ニ加減ノ用テカ不行

此方ヲ用テヨシ

▲婦人妊一月ニラ子下リテ後血甚下不
正先黃解或四物或涼膈ノ類ニ不
正脈細テ救不知ス莫其早死セントス
ルニ此方ヲ大服ノ用ニヨキフアリ

▲此方ニテ加レハ号飲一内ニ有惣ノ加
テスルニ血下元氣虚スルニ医王ニテ
加ルカ根本加葉ノ上手医療ノ手本
ナリ諸病カ葉スルニ如此心得ヘシ

▲婦人風毒腫ラニ又テ發散不遗体
瘦ユケテククヒレ不食レゴカレ腫
痛脈ハ細數ナリ先用九文結句クク

ヒレテ悪シ始終此葉ヲ用テ良也加
稿々此病人熱ナリ上痛ハ稀下痛
恙上心得ヘシ

▲惣ノ難弁腫物膿スル後ハ医王十
全ノ類カ佳ソ自然其中ニ風ヲ引タラ
ハ香葛或升葛少用テヨシ

▲私言如石風ヲ引大便不通熱甚脈有
方モ六回破傷風ノ脫以方ヨシ

▲又白手負十上モ口サハ廣ク開クハ補
葉カヨシ内ハ深合口少有血カ胸ハ
半リソレハ大延役ノヤク九下ス劑
ノ可用

▲婦人胎下リ三日血多ク下ル莫有ハ

下

七

黄解二面物各用百石下血故身
がたろくよ脈毛無勞此方可

▲老人年高氣虛血下不歪面君
ニ介ヲ加用テヨシ

▲痛風脚氣毛元氣多ヒレタラ此方
ヲ用ヨ惣ノ脈大而無勞者元氣虚ナリ

▲六君子ハ肺經ノ薬医王ハ脾胃ノ薬也
脾磨ノ清氣ヲ上肺へ升ル也。肺氣

弱キヲ補フイハ四君子ナリ
松曰陰証傷寒ニ四君子ニ加附子トイ

玉加附子異アリト見タリ心ヲ付ヨ
男子陰拉腫女子小腹痛滿症ヲ産

後子宮不閉イ玉ニ白芍醋炒沙。日
余熱不退ハ滑。殺胃。見産後閉

九文是方多加モノハ氣弱ノ藥ホカコフク
不成ニ用。此方並中ノ重宝ナリ

四時ノキライナク太陽經ノ表証用也
▲風湿ノ方ナリ又大股ヨリ熱ヲ世ニス

▲癸散スルイ重キ
クタヒレタラ多加テ用ヘシ症ニヨク

▲此方傷寒表証脈弦數四肢通用癸
散ノ薬ナリ

▲又頭痛甚ニ苛ク加用
物ノ本方ハ參芍モ有合十味ナリ九

文トス今ニ味ヲ除テ九文ノ敗毒也
傷寒頭痛癸熱惡寒半表半裏

小柴身キト思トキ此方ヲ用。是方内
症ハ少只表症ニヨキ方ナリ

四時不正之氣感シタルヨシ

疫病ノ方也此方加減必可用。仲景

曰疫病ニ余方ナレ上云リ

風毒腫ニ才ヨシ惣ノ四肢十痛イ

タムトヨロホトクルル此方必ヨシ熱甚キニ

文ヲ加テヨシ上焦ノ風毒腫ニ弁首ヨ

一ノ下焦ニ九文佳ナリ

腸風下血ヨシ是他医ハ不知ソ。他医ノ

療治タル跡ナク此方多分ヨシ遠

血近血ニヨシ

勇平素過酒人也一日俄然吐血數日

三升或為酒毒或為熱或為虛諸

医療不効用入參敗毒散二貼而

立止

勇持端常弁則用三陳加杏雪愈

今案前証用常葉或他療不効。人

參敗毒散立愈

痢病ノ熱サラスニ用或訶子肉菘十上

テ早ク止。熱不去ニ此方ニ加三黃或文

ヲ加テヨシ葉毒解散スルナリ

痢病ノ系ク止過テ熱氣不去ニ加共太

木連文芍ヲ用ルソ

惣ノ頭痛發熱不去痢病ニヨシ

腹疫病ハヤル痢病ニ種連ナト加テヨシ

是合瘰癧散トカトルソ

風眼ニ目赤血多キニヨシ甚腫痛

スルニ三黃ヲ加ハ用ニ或文連許モ加

用ソ

鼠喰丸ニ貝ヲ加テ用ヘシ

痘疹ノ序病ニ熱甚ク葛根一ニテ
不去ニ茶中ヲ加テ用。風濕感ノ有
故也

天頭瘰癧ニ面頰腫痛ニ手子連ヲ加
ヘテ用 咽喉痛モヨシ

癰疽或楊毒瘡ニ上濕毒熱甚ク
頭痛ニ上ル。或身節痛ニ此方ニ土

苓多クソリテ加テ用テ愈タリ。輕ニハ
葛根モヨシ。毒氣ヲ掃ナリ。濕毒ヲ

散ス方也。亦荊防九文猶佳ナリ。又
盜汗ナト有モ。結ウ九文葛根一ニテ

先テ有ソ。此方ニ加静芸艸金銀花
荊防九文上云ナリ

痛風ニテ手足コカシテ走リ痛ムニヨシ
此大界風濕丸故也。面ニ下痛ニ佳ナ

リ可用ナリ。此風毒心ニ云々也。然
レモウツキ痛ニヨシ

加味九文上テ正傳ニ上味九文ニ七味加
葉有見斑門血斑ニヨシ。風呂湯ナトニ

入血ノウキタルトキ。血中ニ風入赤物イ
ニヨシ。血風ト云甚良痒モノソ

加味九文ハ四物ト九文ト大界各合シテモク
田舎人養生ニ上リ惡風惡寒濕

ハ湯ナトニ赤物出瘡ク痛ニ少腫
愚按ニ風濕血中ニ入タルト思テ此ニテ

テ愈タリ
脚氣ニモ痛処ホナリ有ハ先此方ナリ

引而之ラレレ処痛ニ用ト有。此風毒也。
羌活奴ヲクニ入タヨク痛風百節
痛ニ此方ノ証ハ痛処ヲ押テ見レ

ハカチフス熱スルソ

▲風眼混身壯熱頭痛身汗甚ノ

胎上有塊上下丸若如狀架食不

進諸医止汗汗不止日々羸瘦シ

ツカレヌナリ。全此方ニ加苛文用テ平

後ス妙也可秘ス

▲小兒中風ノ口喎三啼キモ云時ヨク喎

ナリ是風濕ニハ有ニシ。ナニソ痛ハ

キカト問ニ少痛有上舌是腫物ニヨ

ト思。此方ヲ用テ愈タツ

▲瘰癧此方ニ加減ヲ用テ

一切ノ大熱症口氣熱スルニ用

▲傷風者此方ナリ

傷寒者正氣ニ五積ニ
寒濕ニ五積ニ

▲有汗不解ニモ此方使ソ

▲或人冬月无熱肢痛甚痼病ヲ患

芍薬一或治劑之劑不効。風濕感

カ蒸熱ト思ヒ此方ヲ用テ効アリ右如

此ノ病ニ夜寐冷スル有。奴朴大

直行ニテ能ク去ル是テツクテ

ノ也カヤウノモ自然ハ有ソ

▲腫物ニ押茶什葉ニ毒氣不去故ニ

周身腫ル有。此方ヨキナリ

▲唐菰滯リ外へ出テカクニ用テ其瘡

ヲ出ス有。亦加硬痛ヲ治スナリ

和曰風熱ノ下血九文濕熱。冷ノ下血不換金用テミルシラ得多又云脾胃、湿氣アツテ虚ヲカ子タル人下血如豆汁ナル胃風イフクヨシ。尤其眩ノハカライニシテ不可謂ニ偏ニ

人参養食取汗熱服
有汗温服

論曰治外感風寒内傷生冷憎寒并熱頭自昏疼肢體拘急不問風寒二証及夾食停痰皆效。兼治飲食傷脾或外感風寒湿氣發為痲瘰瘰及山嵐瘴氣痲疔妙也。如虛寒加附子肉桂入門

此方不換之變方ナリ不換ニ參令菓ノ三味ヲ加タルモ夕

八解ニモ何々方ナリ八解ヨリ少シ是方カロシ又添菓ナリ此方ニ菓精アリ。瘰

截菓云菓一味ナリ

才一先鹿方ナリ憎寒洒トト惡寒

倉々トノ発ノ証輕ニ用方ト可心得寒
多熱多キニ用ナリ

▲外感風寒内傷生冷内外ヲ兼ル方
ナリ

▲感寒湿ノ輕感冒桂寒發熱頭痛方也

▲又感冒ノ傷寒カ瘧疑似ノ煩ニ用
フ妙方ナリ

▲此方ノ内平胃ニ三陳一有故習ツカ
瘵有テ洒トノ腹痛咳嗽方ナリ

内外ヲ兼タユヘツ

▲八解ニモ似タ方ナリ少ノ替ナリ氣虚ソ

淡有ルニ用。六君子ニ淡波ヲ加タル

モノナリ。淡ニテ内ヲスカレ瀉ニテ脾胃ヲ

也此内外ヲ兼ル方ノ八解ニ発散ノ

茶餘リナシ

▲瘧ノ症ハ先洒々ト惡寒熱氣出頭

痛咽乾欠伸汗サツト出テ熱氣サ

ルモノツ此皆瘧ノ症ナリ此方佳也。但

三証モカケルモ有。寒湿勝ル人ハ渴セ

ヌモノナリ。又傷寒ノ症ハ又重シ汗ナ

ト出タルトテサス。但傷風ノ一証ハ前

後自汗スルモノソ

▲滋降ノ症ニ似タル用ルナリ虚許ニ

テハナシト見テ潮熱自汗盜汗凡

此方ニテヨイフ有結夕汗モ止ム也

瘵有テ胸ツカヘキナト有ハナツヲ用
テヨキコトニ有ソ

婦人赤白帶下洒と熱氣去来

咳嗽潮熱无汗逍遥ニノ症ニ初テ

血下下此方ニヨリ有平胃シテ

ルニ外感寒湿ニ内外ヲ兼タソ

▲血下此方ニヒト止ル有。四六

其方加テ用

▲産後三十日許惡寒ニ色セウク

不食發熱自汗始逍遥ニ不効此

方テ治シ多結勻汗止ル有。脈

數ナリ

▲久瘧テ虚シ一日間ニシヨリ。惡寒ニ發

熱脈モ微弱ナリ男女不分逍遥ニ

テ治タリ

婦人血証帶下ニ用ルニ効甚加ヘタル

回カ佳也帶下ニ寒濕ニテ内各生

▲瘧疾此方佳也

咳嗽无文。子ノ滋陰十上テ不効此

方ニ惡寒發熱中三陳アルニテ

瘧ニ能似夕症ニヨリ方ナリ。日ニセカツ

キリトテ各瘧ニ落カタレ唯瘧ニテ

リタルニヨリ瘧ニ虚証ニヨリ。感冒

▲瘧ニ似タルニ佳ナリ

婦人前見并川瘧先血下ニ用テ佳ナリ有。委

見并川瘧テ後ニ養生薬ニヨリ

...

...

...

前清

前上云

九味也明鑑二前二有故二

論畧之按此小柴胡加減也治口苦

咽乾木赤淡則是內熱之症用柴胡

黃芩所以瀉少陽之熱乃前方溫脾

之一變也方名清脾其義可知然後

以草菓木葉寒熱兼用則是未饒

俗也毛拓又方考曰方曰清脾者非

清涼之謂乃攻去其邪而脾部為之

一清也故青皮厚朴去脾部之痰

半復茯苓清去脾中之濕柴胡黃

芩清去脾中熱白朮清去脾蔽之

痰而中菓仁又所以利胃滌之痰也

劉宗原先生曰草菓仁之溫熱而

蓋未達嚴用和氏之清

方分コトク玉抗ニウチ考ニホク

清月ハスレウスルト志テハレ脾ヲキヨク

スル上云心ナリ此方嚴用和方也

此方小柴胡之症二似タモノ小柴胡及方

先才一瘧方也症熱多寒少寒熱

往來頭痛口苦小便赤ノ咽乾脈弦

數此方ノ証ナリ

截葉妙葉用シ思フモ先此方ヲ与

テ執ラサノ後截葉ヲ用ヘシ

太坂淀屋內産後太熱太寒往來甚

腫氣有テ泄シ不食咽モ甚渴太散

魚産後先邪氣ヲサシテハ如何ト思

此方二三劑テ治タリ其後三度再發

後清

七味ナリ

久咳止カ子時ハ惡寒ナト有テ熱来
リ虫ニハセキカトシモフニ是ヲ用テ有
虫ノ脈必細緊ナルモノクモリ世ニ腎
ハサレアル虫ナリ

才一虫瘧ニヨシ本方六味ナカク虫葉也
虫セキニヨシニ陳ニ虫ノ如減シタ心得也
フルイニヨシ。世俗ニ虫ヲヨリ上ニ是也。

本論ニ治脾瘧食瘧ト有先
清ニ執ツテ去ラコリ日ノ五更ニ此方ニ
兵加テ截ヘシトナリ熱少寒多
是治ス

寒熱往来熱ナク用ヘシ
滋降一症ニテ酒々ニシムク虫氣ニテ
腎ツカヘシ降シテサキヘ行又ニ此方ニ

テ月ツツロケタラハ佳ナラント思ハ可用
切ト得効此劫劑上云モノナリ

本ノ傷寒ノ病人ニ柴ホノ記ナリ医イロ
ク寒葉吐下集ニテ。熱サセセモ不効
予見之。不食ノ腎ツカヘシロクトサムカ

リ。脈クラクト細緊也此寒葉ニ正メラ
レ胃中冷虚ノ虫ニタリト見タリ虫
世シツタラハコカレント思ヒ。此方用立

愈也本方ニ烏梅アリ烏梅ハ収斂
ノ虫ノ少キホルラ押下ルナリ

▲勞瘵咳嗽ニシテ十ノ上トテ不効。瘰ニテ此虫少シトシタラハ此方ヲ用一得効也

▲男乾咳カク不レ止。色カ嘔ルニ方考ノ潤肺シ用タル虫ニサリ有テ不効。

此方ニテ虫ヲシツメシト思用タルハ三貼ニニ色モヨク出タリヨク可心得

▲又僧正公咳嗽カク不レ止半年矣イロク瘵治ノモ不効。滋降ノ之類ニテモ不効。此

實火ト思ヒ三黄ニ陳ノ合ニ貼ニ愈タリ三黄實火ヲ下ス也。降ハ

火ニヨシ右症ハ此三黄許ヲモ可レ得ル也。人色嘔ルタ病ス種ノ瘵治メ不効

久不正。胃痛ハ肺癰上可心得。人ニ甚クシクサキハ勿論也。吉更一佳也。

治曰小兒久咳ニ虫ノ処ハ深ク心ヲツテ

テヨレ。大小便不通ニ中全此方ヲ用テ効ヲ

得ラレタソ。コレハ虫太腸ニトクテ大

小便不通ニ用テアリ。此意ハ虫ニテモ小便不通一アル故也。

丁二

後香白養食

回飲食門方也

回日治脾胃不和不思飲食口不知味痞悶不舒

此方才一兩月不食方也脾胃虛冷

不食ヨシ胸キク少脾胃不和ヨ

胃中寒痰有二三腎キクトスソ

ヨク脾胃ヲ和スル某也。和ハ補瀉ノ

中ナリヨキ加減ニスル云也

他病ナリト不食ト余余ノ間ニ用テ

ヨキ一有脾胃ヲ秘メ見タキト思ハ

是方也

瀉ノ病人不食タリ嘔カクハ三

此方ヲ治シタリ

不食ニキキハ脾胃ヒヤクト

是足冷ニ活ニキキハ不行。按スニ不

食ト胸ヒヤクトニ目ヲ付。脾胃虛冷

カトニテ此方ヲ与ヘ立愈タリ

白朮多クハ胃ヲヨクヒラク。辛熱劑。白

朮トノアトナシニモ不食ハ加多トア

リトカク不食ニヨイ某方ナリ

此方ハ香砂平胃ト四君子ト合メ多

木タルモノト是ニ可分別。平胃ハ脾

胃ノ湿痰ヲ除四君子ハ脾胃ノ

虚ヲ補。木ハ上達ス世意ナリ

下

是則東垣脾胃命方也
升補

論曰治飲食不時飢飽勞役胃氣

不足脾胃下滯氣短無力不能寒

熱早飲後昏悶怠惰四肢不收懶

於動作五心煩熱如肢脹及肢窄

狹加厚朴肢中硬加砂仁入門

此方食後ニシテイ子云リ出身ヨク

手足足タルク或食後困沉手足

倦怠ヨシ是脾胃弱キ故也

脾胃ノ和ス方ノ又脾胃ヲ上セ

疾ヲ補フ方也

後以藥アルニ少寒熱又頭痛ニ

頭痛ニ羌活

羌活ハ表ヲ開キ陽ヲ引ク

方ノ條下曰肢脹ニ淡ヲ加ハ肢

堅ニ加胡

五皮散

五皮散

五皮散

五皮散

五皮散

五皮散

五皮散

五皮散

五皮散

五皮散

五皮散

六黄

盗汗ノ聖方

滋降ノ証ニ熱甚主用也。芪ニ表

ヲ堅メ止汗連文ニテ心火之下レ使心

腎既劑方也。竹心ニ血之レ榮ヲ調カ

茲降ニテ盗汗止テ一ツアリ其時ハイ王カ

芪建中一ナモヨシ。又六黄茲降ニテ

至盗汗不止ニ方考ノ正氣湯ヨク止ル方

也。正氣湯百知各一分耳各一分方考盗

汗門ニアリ

茲降ニテ熱准去此方ヨ此方用

汗最多

當地

加各一分令各一分芪各一分知各一分桂各一分

貴各一分參各一分五各一分朮各一分少各一分棘各一分

浮各一分麥各一分下各一分撮各一分水各一分煎各一分温各一分服各一分

此方氣血兩虚ノ盗汗アルニヨシ。畢竟

盗汗ノ症陰虚ノ症ニヨシ玉各一分降ノ

斐方ノ合ノ用度所其終此方ヨ右

ニ方ノ又ステ方也。咳嗽ニモヨイソ

十全大補一ニ似タル方也。盗汗有テ

氣血俱ニ虚スルヲ治

生津補血湯

論曰治年少胃腕血

各半多芍藥多甘草多茯苓多白朮多各五分多 炒歸身多 砂朮多 養氣多 姜東多 瀝多

▲膈方也回三陰虛ノ火動胃痛

▲年少膈前症大便結胸痛ツ

▲膈八陰虛血虛ヨリ生ス火動ニシ

▲膈八血燥テ九ノ故ニ木便結

▲少年久ノ方トシテ必トハ難言ヨリ見

▲令セテ老人ニモ可用ナリ血ヨリ熱強

▲各ニシテ年時用上辛ナト有故ソ又少

▲新有老態ト云フアリ

▲降ノ藥味大畧マルソレ降ノ症ニ

痰ヲヨククツロトナリ

▲降ノ症モ大便結ニトスナリ藥味ツ

ヨク可見分洞見アリ痰嗽有ハレ

降ハニフシ此方ヲ結勺ヨク痰ヲ去ルソ

▲此症ノ根本故トスハ香砂平胃シ不

換金ノルイヨイソ

▲又ノ不食嘔吐飲不欠虛熱ナレ引ア

リ交會時血出先此方ヲ用テ後止

天用ニ吐止後參耑胃ニテ諸症

退テイユ

▲僧兵不食湯菜ヲ三熱ス先香葛ノ順氣

和申ノ大畧愈熱味退尤ナリ糧症ト熱

甚ニ此方用テ愈此心ニテ可谷点者ナリ

夕年ヨリ多ク
方養

介的共令貝姜洞
貴赤淡子各七分
沉五分連八分

▲血虚ヨリ生スル膈ヨシ是モ胸痛血カ

羊カユキナ上ニヨシ

▲老人ノ膈ヨイソ四三詳ナリ

▲氣ヲ多クテ痰ヲ消ス菜味ヲ能見之各
点スヘシ痰ノ多ク入ソ

▲知百ヲ加テ用ルコアリ

▲老人能食ニ瘦皮膚カ羊大便ノ結
スニヨシ

▲老人常ニ痰ツカヘ大便カ羊三日モ不行
上云ニヨシ猶加減ノモヨシ

順和

貴水 煎 煎 煎 煎 煎
令 各 分 連 姜 曲 分 洞 五 分
砂 三 分 煎 少

▲酒膈酒毒ニ

▲又除湿和脾胃消食

▲胸痛血ヲハキ膈カ羊上氣食積ナトルイ
ニヨシ

▲胸ヲ弁カリ上氣患寒痰ナトモヨシ

▲及ナトハ猶以テ用方ソ連ナト有故

▲常ニ嗜酒人八月カラシタリソ三四月ノ

頃ニテ不止肩痛痰ツカヘ不食ニ酒々
トサムクシクヒサシク出トク療治メモ不

愈後ニ水売共ニ不通予見之酒毒
ト患ヒ此方ヲ用ニ貼テ大驗ノ后病人

中叶タルヨツテ去洞加多テホクシクニシラ用テ全愈則
六君ニ加減ノ方リシニタマフ此義異本ニクワ
シクアリ

トカク今子胃痛去者ハ此方佳也香砂
平胃ニ似タル方也

吐血跡ニ痰カラスツカユル者也降下ニタマフ
凡ニ降ヲ難治ハ此方ヨシ

畢竟脾胃ツカレテ函月中ニ湿熱鬱
痰上ナリ食積上ル又湿熱アル故ニイ
テ嘔吐スルノ此方可用

惠膈噎脾胃不和ニ氣痰逆上レ
萬壹胸中ニ痞悶スルヲ治ス

嘉加木汁 弓方ノ方也

脾ヲ調ルイオ也脾胃不和胸ガ不
食嘔吐食胸滯リ胸ノ証ニ用

半井家ニ膈ニ專モツハラ用ルン杷大腹十
トヲ去テ用ク又半井家ニ快氣クイキニト銘イ
砂ハ順氣ジュンキノイ也

弓方ニ參シラ令五膈寬中散此方ヲ及
胃又病右何モ脾胃弱キニ用也

水腫或肢下ルニモ用ケアリトイハ庄庸
医ミ七女シメ難用

啓日脹滿ノ腫氣面ニ少セウ下焦ニ
多在ルニ用セ也

加味四七丸 四ノ梅核氣門

曰治七情氣結成痰氣狀如梅核或如
破絮在咽喉之間咯不出嚥不下或中
脘痞滿氣不舒快或痰涎壅盛上
氣喘急或因痰飲惡心嘔吐此藥取
妙功不_レ述

白_レ医_レ淡_レ姜_レ蘇_レ梗_レ田_レ牛_レ香_レ青_レ星_レ
姜_レ炒_レ洞_レ砂_レ麩_レ炒_レ各_レ白_レ豆_レ蔻_レ六_レ益_レ知_レ
仁_レ各_レ五_レ分

▲根本此方八氣門方之七情氣鬱結
ノ生スル氣不快ヨレ四ニ詳也

▲此症咽ニヒラクトレケルモノ有_レ吐_レ吐_レ不_レ出

此方七情ノ氣ノ解_レ二痞悶_レ云_レニ婦人

ナニ多_レシ吐_レ痰_レ才_レ一_レ方_レソ

▲胃_レ竟_レ膈_レ痰_レ方_レノ氣_レ多_レ傷_レテ痰_レ飲_レヲ

消_レスル_レ葉_レソ

▲清_レ湿_レ化_レ一_レノ証_レノ如_レシ故_レニ清_レ化_レヲ此_レノ

症_レニ切_レ々_レ用_レル_レ有

木調丸

回氣爵門方也

精淡 各一兩

青奴 各一兩

官耳 各一兩

氣爵才一方ノ男婦共ニ用少

氣爵上ノ胃痛胸塞氣不飲上送世

其類也胸痛ト云ハ先此方ヲ用シ

初分

菴 四兩 青 脈 令 枯 官
守 各 一 兩 雪 羌 各 一 兩

曰治男婦諸氣不和多因真愛愁思

慮忿怒傷神或喉食真愛感或度

不遂意使抑鬱之氣由滯不散停

於胃膈之間不能流暢致心胸痞

悶脇助虛脹噎塞不通吞酸噫氣

嘔噦惡心頭自昏眩四肢倦怠面色

痿黃口苦舌乾飲食減少且漸羸瘦

或大腸虛閉或回病之後胸中虛

痞不愈飲食並皆治之

氣ノ煩ニ才一ヨイソ降氣散氣劑ナリ

逆氣ノ上氣ノ下焦冷ルヨシ

五積ノ症ノ妙腰足冷ルヨイソ五積ニ



テ不愈時此方ヲ用ソ畢竟氣鬱ト見タラス諸病此方ヨイソ

▲氣腦ニヨテ病ヨイソ

▲方内ニ翁羌蘘十トルユヘニ氣不順ソ

痛風ノ多ク九症ニ用テ切得効ト有

▲怒氣惱ニ依テノ腫氣脹滿ニ用テタヒ

ク得効也

▲林氏カモノ勞瘵ノ如ク盜汗頭痛五

心ニ熱有テ夜不寐勞トノ心ヨカラヌ

不食咳嗽酒ニ多惡寒暮ヨリニ虛熱

サレ脈沉弦數他医ニ降ヲ用諸方不

効請予治此氣鬱ト思ヒ此方ニ于余

貼用テ全愈羌蘘入タレ盜汗モヨ

▲氣病ト見タラス他症アリ用可

氣カ表ヲ衛護スルハ自汗盜汗モ

自ラ止ルモク

▲ニ降ノ証ニテサキヘユカヌ此方ヲ用シ

ハク得効

▲又蘘子降氣ノハ上氣ノ下冷ニ用

ユナリ

▲又惣メ男婦シロカタス氣病ニ此方

可也

正天 正傳氣門 矮五ト 莎
キ カキ 永 六分五厘

入門日治婦人切諸氣痛或上凌心

骨或攻擊脇肋肢中結塊發渴

刺痛月水日之不調或眩暈嘔吐

往來寒熱胎前產後一切氣症

惡阻ニ才一ヨシ惡阻トハ食物好ナリ

食物之善惡ヲ云イ也香ク善惡ヲ探ク也

シノ寒シナル佳シ方中ニ永有故ナリ

產前產後要某也ト用ソ

產後ニ胸ノ惡寒發熱ス用ニ

血虛ノ惡阻ニ無潮汗カシ

心肢ニ有塊

世醫產前產後ニ四物ノルイ分リ用

ルク知テ正天ナトノ氣某用フシラ

眩暈ナト有シ血虛シヤト血ヲ滋

ス某用タルトハ俄ニ血ノ多クナルト未

可有也可エ夫トニ

二十余之妊婦腹月凡惡寒發熱如

瘧百三四次發九脈弦數右脈浮

滑數与計三貼而安

婦人一切ノ氣病ヲ治ス產前產後ヲ

不分用テ不苦

心肢痛氣痛氣鬱久用ユ

香薷ノ及方也故ニ洒浙寒熱有テ

不食ナトルイニヨシ

正天 四十六

▲此方モ初分心ノ説ヲトクニ用ルリ
又ニ降ノ症ノヤウニモ用ソ

▲膈痛ヨシ氣鬱上才一トラス此方ヨシ
婦人ノ病ニククヤサキ不行ニ此方ヲ用テ
効有ルモノソ

▲今甘ワキノ眩暈心五ニ用テ、効有
ニ活ノ病ノヤウニ用テ、得効畢竟
婦人ノ氣病ニ用ル方ナリ

▲啓迪曰産後吐逆最此方妙也惡聞氣
氣者蘊短炒用之秘更慎之
又謂似五積欲達下焦則加勝

▲此方ニ杜延桃ノ破血ノ末ヲ加テ血塊
又ハ氣塊ニ用ヒヨク治スルソ

▲此方ハ婦人氣鬱ノ症ハ諸病ニ用テヨク

分補心

氣門方也 版炒 沙炒
各五分 各二分 各一分 各一分

酸 杏 各五分 公羽 各一分
奴青 各一分 細木 各一分
其灸少 姜末 右白杏仁

治心氣鬱結為四肢浮腫喘急
腫氣脹滿ノ主方也氣ニ依テノ腫氣
ニトアレ其ニカキラス腫氣ニ用テヨク

▲濕氣ノ腫氣ニ補治ノ佳也

▲医王モ腫氣ニ用テアリ
和服用夏有上氣喘息有ニ

和腹

益

腹平リヨルシヨク和クルユニ
和腹ト名ソ又腹ハ大腹ヲ取
テモ各々ノ

治七情氣結五藏脾胃不和心腹脹

急木小便秘寢食俱廢不消者乃

氣秘耳未可旋以硝黃秘甚再加

枳壳羅蘿蔔子皂角子氣滯腰疼

倍木凡浮腫加車前子葶藶子小便

閉加麥門冬澤瀉入門又治背腹痛

妨食及脚氣攻背腹滿悶大便不

通林 芎藭 羌活 藁 瓜

股各 兵 木 伽 甘 少

滯氣ヲ股筋ニキリヨルニ用ソ

腹氣ノ方也建位必結ノ方也

二三名三和散トアリ此方氣秘ノ方也

血ノ燥キタ潤腸一實秘ニ三黃

此朮工地ノ類也

ヨク食ノ秘スル實秘也兼氣ノ類也

陰味身重劑實ハ物ハ陰也不食

大便不通ハ虛秘也氣秘也此方ハ薄味

輕劑也此義切然ノ三七通ニ委アリ

老人ハ氣順シ難シ此方順氣ヨク大便

ヲウルホシ通スル也

一人大便結イヨク通菜ニテ不効故也

此方ヲ用ニ貼テ立愈

又脚氣ノ方也脚氣腫痛ハ湿ナリ拒痛

一可也亦腫メ筋引ツリカニリ痛ハ氣

滯也此方ヨイソ惚ノ滯氣ノ筋ヒキツ
リ痛ハ脚氣ニラス凡諸病ニ天畧ハヨシ
脚氣ハ風毒ト命タルニ依テ九文モヨキ
一アリ脚氣ノ氣ノ字ニ付ヨ秘之秘之
或人腸腸ノ内ニトキヤワツツミタルヤウニ
是方用テ治ス内ヲラタリクトシタリ
畢竟是ハ筋ヒキツル故ナリ

或人頸ヒキツリ疼痛眩暈不食脉弦
少シモ動ケル痛ハトコロコタヘテ不
起此方ニ大驗アリ其内ニ羌活勝濕
ニ用タツ

▲私氣ニオ一用ソ

或人俄ニ惡寒ノ大熱来リ狂言ニ
脈弦數也醫為湯寒療ス能不愈
予見之不腫痲氣ト見付難ニヨク
クツヌレハ曰臍ノ上ヲリヲ金計ニテレメキ
ルヤウナト云則此方ノ症ト思ヒ二三貼ニ
ノ諸証退テ後小肢ニ大網有ヤウナ
ト云小柴胡ニ加童瓜用テ平愈ス後
夕火ノ毎発セス物ノ病氣ノ症ハキシ痛
小肢ヨリ章門ヘヒキツルナリ又日月ニ
テナリヒヒキツリ痛トサヘス此方ヨク

▲此症ニ惡寒スル外ハ寒ニツカ子云故
也小肢章門ノ筋引ツル厥陰也咽
乾ハ湿熱小便黄ス或淡毛湿熱ナリ
病氣ノ四証上經ハ厥陰脈ハ弦急外
惡寒内ハ湿熱ナリ

▲婦人此方ノ証有テ用テ有

疝氣之症六十九此方用之不効四十九一有是虫

思之七清五用之過半五一有後寒

熱往來不去故示柴胡五一五加青平

愈五今按九清可也

愆別老人骨痛肢痛腰背痛十

ト云氣ノ滞リ上患ハ先此方用テシタ

上ノ筋引ツラス凡用ナリ

▲腫氣脹滿五氣上テ喘急五ニ五子田

クガテ氣五下テヨイ少肺五へ水五ハナリ

▲氣煩五セ多腰脇痛或肢ヨリ痛ニモ用

テヨシ畢竟五ツリ痛五上云ニヨイソ弓大

ニ入ニニ甚五時五ラ五ラ五ナリ

▲熱ノ小便不利五燥熱五

熱ノ小便不利五燥熱五

廣潰五 回鼓脹門五

▲此方ハ東垣脾胃命五方五ソ

▲此方腫脹熱脹五ニ用五ソ

▲此方ハ内積塊有テ腫脹五ヲ生スルニ用五其

内此方ハ熱脹五ニヨシ冷腫五ニハ六七氣五一

補治

微ミ伽カ精シユ貴キ医イ
愛アイ翁ウ飯ヘン文ブン香カウ淡タン

服各一分

是方八丹溪シヤクイセ纂要ノ秘ヒツニセ名方也
元丹溪ゲンシヤクイ力配劑リキザイナリ

此方八脾胃虚メ湿ニ感シ腫脹肺脹

高所タカキトハハアカリテキ上六脾胃虚也

湿氣チ肢下ノ痺ニヨシ

産後ノ腫脹ニモヨシ

女子六月ノ時分三月セウサシノ産ノ後ニ肺
氣脹滿甚ニ此湯用効ヲ得タリ

産後六月ニ血大ニ下リ朝々痰カ咽ノド

因月令

此方泄瀉ノ方ニ食傷ノ泄瀉ニシ
深ツヨクハ訶子ヲ加メルモヨシ

四五ト比ヨリハ九月ニ暑濕熱
氣感メ煩ニヨラ用ルルナリ

平胃ヘイイ方ヘイイハ冬令ニ食シニ方也平胃ハ
食滞ヲ消シ五苓ハ暑熱濕シ小便

ヨリモラスナリ
食シタリテ腹下或ハ咽乾ニハ

必夏ハ筋カレ痛ナリ

此方ノ証ニ赤白木下シヤクハクカアリ
實証ニ腹下リ咽乾カ必赤白木下
脾胃虚メ深ニ渴セハ白木下也

或人脈下り身冷不欲衣是按
内ニ伏暑アリト思此方ニ解毒
合入用テ入念タツ

此方若夜宿ラサト正長夜ニ其後
用テヨシ海湯ノ藥ニ宿天腸辛辛

若痢病先初ニ三度サツクト下
後淡ク其時ハ方者暑熱ナ
故ニ方中ノ方ニ椒ニ海ニト合ソ

水腫ニ加減ノ用テアリ感濕ニ
ナラズテイノム同ニ委アリ

惣利源女痢一ニ正トヨシ世
痢ノ一ニ其同ノ今ニツニ今ニ

諸方ニ下リ之依テ心也
此方中ノ官去テ連テ記テアリ

疎活
此方中ノ官去テ連テ記テアリ

治遍身走痛如刺充足痛最甚无
蠶血多回酒色損傷筋脉虛空被

風寒濕熱感於内熱包於寒則痛
傷筋絡是以昼輕夜重以疎經活

血行濕此非白虎歷節風也
名ニ麦酒炒一畔酒精酒貴桃

澈酒洗弓已洗羌屏分大游酒洗
伏苓其

古今医鑑云疎節活血一上有經字佳
方此方ハ龔廷賢カ方ナリ

酒食ニ傷之テ至經虛ノ受邪痛風
成タルヨシ實ハ血虛ノ感風濕痛ニ

五

夜甚クヨミカレコ痛ニヨシ

▲煩ハ痛風ヲ寒ハ痺症ナリ

▲回日上痛ハ桂文ニシキイロク香下痛ハ凡翁モククモク

エシセタラシクモク塩炒栢屋 各三匙ヲ加ト有

▲婦人夏盗汗有テ脈細數是シヤクモクニ降証

也ニ降ヲ用テ諸症退肩足注痛シヤクモク

一不正此方ヲ用テ治シタツ懷妊ノ内シヤクモク

ナル故ニ臑瘵ヲ去テ用タツ

▲痛ニ夜分リカキラモ不限用テヨイソ

▲中風ニテモ或脚氣ニテモ諸痛共ニ

身薺走痛上モノニ先用イテイタニ

ノクツロケテヨシ其時ハ指合糸ヲヨク

去ヘシ

▲血脈ノ痛ノ有シヤクモク四物シヤクモクニ知シヤクモク百ナト加テ

▲天抵ハシ降シヤクモク症シヤクモクニシヤクモク凶月シヤクモク甚痛痰

ツカヘタル此方用痛ヲクツロケタルシヤクモク後

凡萎洞シヤクモク一ヲ用テ痰ヲ退ケタル也

獨寄生丸

トクワク千セイヤカ

治腎氣虛弱冷汗湿地腰背拘急
筋挛骨痛當風取涼過度風和
流入脚膝為偏枯冷痺緩弱疼痛
牽邪脚重行步艱難并白虎歷節
風痛

搖寄倍而先伸養而細圭子
酌酒煉伏多故其屏各其少

成此三痛二用ル方ソ

或八湿脚氣トテ後ニカレテコサイト云テ
カタク足ノ赤ク成ニ用ル一有大風一ニ

此方在銅地靴氣上裝者死用也
ノナリ

方中ノ伸ハ下焦ノ風湿ヲハラフモノナリ
腰足肩ノ痛ニ羌活アルソ

腰足痛テ至中風ニ此方ヲ古方能
用タ

中風至人不行モノ九ニ三方計テ先難
行筋骨ヲ多クスル葉方ヲ取カク用ヘシ

無寄生代續胡ヨト有リ又五香翹
ト六周ヲ加一ト倍トナリ

寄生ハサルコシカケ上云ハ惡説ナリトレハ
葉草去也葉ニツクノ木ノ枝トソカナ
ニ似タシ夕私ハ寄生ハ葉ノヤドリ木也

カニハツセシタ
加仙カニハツセシタ 回麻木門方也

滋シ子シのシ心シ下シ津シ七シ多シ本シ丸シ倍シ各シ
屏シ羌シ各シ五シ圭シ文シ子シ柴シ射シ各シ分シ酒シ浸シ
伏シ一シ圭シ貴シ八シ田シ七シ

▲麻痺マヒ氣キ虛キョ也也氣キ屈キョク溼シツ痰タン內ナイ有ユ手テ
足シビビレレヒヒルル上ウ痛ツ三サン用ヨウ土ツ畢ヒツ竟キョウ氣キ虛キョ
ナナリリ又マタ十ジュウ八ハチテテ痺シビルルハハ血ケツ虛キョナナリ

▲内ナイ株クサヲヲ喰クタルタルアアトトノノ如ニ身ミガガリリスス也也又マタ繼ツグ
ニニノノシシリリテテ解トク名ナアアトト如ニククヒヒルル上ウ六ロク
此方ヨシ是皆衛症也風濕フウシツ感カン也也

▲右ミダ二方ニハハ虛キョ症ショウニニ用ヨウユユ又マタ氣キ道ダウ不フ順ジュンテテ中チュウ
風フウノノシシレレ痛ツ六ロクツツ順ジュン氣キニニヨヨキキ也也

▲濕シツ痺ヒニニテテ肥ヒ盛セイノノ人ニ六ロク必ヒツシシルル頭カウ出デ
ルルモモノノ也也

▲上ウ体タイ麻マ木ボクハハ氣キ虛キョナナリリ上ウ体タイハハ腰ヨウヨヨリリ上ウ
ヲヲ云イハソソイイ玉ギョクノノルルイイヨヨシシイイ玉ギョクニニ加カ減ケン方ホウ有ユ
身ミ麻マ木ボクハハイイ玉ギョク也也

▲十ジュウ指シ麻マ木ボクハハ濕シツ痰タン死シ血ケツ也也此方コノホウルル也也
氣キヲヲ多タククララセセウウタタメメニニ皆ミナ酒サケニニ制セイシシタタ
方ホウナナリ

▲佳カ勢セノノ矢ヤ夫フ上ウ体タイヒヒルルトト取トル分ブン舌ゼツヒヒ
リリメメイイテテ酒サケ味ミヲヲモモヲヲホホヘヘスス此方コノホウニニ治チ
タタソソ

▲麻痺マヒ痿痺ワイヒヲヲ古コハハ三サン十ジュウ中チュウ風フウトトス

可下
五五

三痺シビタウ 續シビタウ 仲シビタウ 風シビタウ 桂シビタウ 細シビタウ

丸シビタウ 蚌シビタウ 子シビタウ 独シビタウ 倍シビタウ 益シビタウ 各シビタウ 分シビタウ

此方前方ヨリサレク用方ソ

痿痺シビタウニヨキハ血虚シビタウニ也

中風シビタウ十上毛痿痺シビタウニ用フ有

足シビタウシタルク重クシヒレテ不仁シビタウスルヨシ

羸シビタウ味シビタウハ腰シビタウノヌケタト用

クツナヒシビタウヌクルヲモ不知シビタウエカヌ用シビタウラレ

才シビタウ一血虚シビタウニハ三右之症見ル

清化痰シビタウ

四痛風門方 清世全旨

會治周身シビタウ四支骨節シビタウ走注シビタウ疼痛シビタウ

列シビタウ脊背シビタウ又作寒熱喘咳シビタウ煩悶シビタウ或作

腫塊シビタウ痛難轉側シビタウ或四支麻痺シビタウ不仁シビタウ或

背シビタウ心シビタウ一點シビタウ如冰冷シビタウ脉滑シビタウ乃是濕痰シビタウ

流注シビタウ經絡シビタウ關節シビタウ不利シビタウ故也

星シビタウ制シビタウ官貴シビタウ令精シビタウ羌シビタウ文酒シビタウ芷シビタウ

白芥子シビタウ各シビタウ一木シビタウ五分シビタウ研シビタウ其シビタウ三分シビタウ

丹溪シビタウカユカク濕痰シビタウニハ三身百事シビタウ痛

上之症シビタウニ此方シビタウヲ用ル

丹溪シビタウカ依濕痰シビタウ道守結シビタウ上ヨリ此方シビタウ

建立シビタウシタ

痛風シビタウモ寒シビタウニヨラス五積シビタウニ風濕シビタウニ云

九文ヨシ痛風門ヲ可名見痛ニカキ

ラス用下モ有

加四七一ノ証ナトニメサキヘユカヌニ結ウ此方

ヲ用テ痰ヲクツク口ヲクイノ痰氣ツカヘ

梅核ニヨイソ

咳嗽ニモヨシ脇疼ヨク用ノ胸膈痰

自芥子子ヲテ不達ノ筋ハ脇ヨク引

テ行テ痰ニヨシヨク骨ヲクツク口也

三活ノ症テ痰ツカヘ苦シキニ用ソ

痰胸ニツカヘ身ニ痛アラスカヲ又此方ヨ

肩痛肩痰ヨシ

齒月脇ニ痰有テカラスクルヤニメクツ口カニ

大花 三

命曰中風外無六經之形証内無便溺

之阻滯知血弱不能養筋故手足不

能運動舌強不能言宜養血而筋

自榮此方主之

尤弓故的膏独令各一羌

風文芷木 針 半 各五 細 半 其

此方血ヲハナヤカニ筋ヲ養

手足痿腰ヲケ舌大不仁言用ニ是皆

血虚ナリ

中風ノ養生生葉ニヨシ併脈沉微細ニ推

用右膏文入故ノ常ニ息災ノ人ニ脈

浮大数ニタカフテ中風生セント思下キ

養生三用也尤右ヲ五分用ヘレ

▲又此方ノ症ニテ脈微細弱ナルニ回中風

門養榮一ナク用テヨキク

▲緩風ヨイソ四肢麻木ニ肌肉潤動スルニハ

三年内ノ中風ト古人云是緩風ノ先愈症

▲其内又脈ニ見ヘレ表症トス勻氣ニ佳也又

ホクヨク風熱盛トスハ聖ノ症也脈毛

實大熱甚ク久猶以テク夏ナリ

▲惣々頓死ニ口開キ尿利スモノ公死ス也

卒死ス也卒死中風ノ如クテ痰モナク熱

モナキハ中氣ノ中風ニ痰必有モノト

▲此方ハ足痺レ舌強テ難言内ノ養生

業ニヨイノ身元クニ眩暈諸方不効

大舜

盛

筋又治刺後脚弱緩痛

不能行名刺風或兩脚腫痛足旺枯

脂名鶴膝風切麻痺痿軟風濕

挾虛之候服之如神

▲古方内ノ痿症ノ方也

▲濕補方也附仲アルエナリ

▲腰ヌケ身シレ痛脚痛ヨキ方也畢竟血虚

ノ潤燥テ血風ト成シ息時用テヨシ

▲痢久メ腰ヌケル有リ是ニ妙

▲氣ヲクク血ヲ補方ナリ

▲刺後ニ此方ヲ用ニ月付在足弱ク之膝腫

痛ヨシ又痛風濕抗經絡傳至腰脚痛鶴膝

風ト成用之鶴膝風ト鶴膝多ク細ク成テ

命曰去風順氣活血壯

可下

五

卷愈風 卅五

キヤククニフクク

會治肝腎虛筋骨弱語言難精神昏
曠及風濕躄重或瘦而肢偏枯而半
身不遂或恐而健忘喜已多思皆精不
足也宜此安神養志調陰陽不問男婦

治風痲急慢驚風神效 入門

羌甘風 蔓 芎 細 奴 芩 參 麻

苛 菊 敗 苾 知 地 骨 杓 子 獨

芷 仲 苧 柴 守 西 巴 各 下 令 文

芍 骨 精 蚌 各 六 十 枝 一 下 半

天陰兩加姜三片

中風也先表ヲマク之利ヲ通メ後ノシ

目ノ上カクヒクタクニヨシ

脈モタカフ又ニヨイソ

菜味多キ方ハ不尽ノ能有モノク舌人

ノ不載能カ有モノク

雨ケノ時発スル頭痛用テ有又眩暈

頭痛毛用テアリ又此ニ中風ノ心アラス

幸ク也足弱ク中風氣心有ト云一

タシトヨクキクソ

畢竟肝腎ノ虚ニ筋骨痿不計ニヨイソ

個番一也

命曰以二陳湯為主半夏治痰厥頭痛
 陳皮益氣調中升陽麥藁實中
 助胃各半茯苓化度天麻治風虛頭
 旋服黑黃芪芎久補氣止汗人參芎
 芎補中益氣沢瀉利瀉道子濕蒼朮
 除濕各半下白木補中神麴消食蕩滯
 各毛 乾姜温中三分黃柏芎火二分姜煎
 熱服治痰厥頭痛眼黑頭旋思心
 煩悶氣促上喘無方必忘神顛倒目
 不敢開如在風雲中及頭痛如破身
 重如四股厥不得安此入門

此方ハ六君ヨリ出タル方也

痰厥の餌痛を治す

▲氣虚ノ眩暈ニヨレ其暈ノ負舟車ニ乘
 タル如ク風雲中ニ居ル如クフクヨ目
 目ヲ開ク各々ノ骨サキニ熱足冷此ル
 イニヨレノ畢竟氣ク多ヒテ眩暈充ニ
 必此方ヲ用ソヨキ方也
 ▲厥冷ニ永十トウレト
 ▲二活症ノ後養生業ヨレ氣中外脉モ
 無方ニヨレ六君子方中ニ有トハ二
 活ハ沢山ニ准用故ソ
 ▲目ノ心ナク凡氣虚ノ痰ツカハ食ツカハ
 カリ或怔忡十トヨレ畢竟虚症ニ用ソ
 手、イ至十ト木用時ニ用ソ

四君子

世

肥人頭眩者為氣虛濕

痰治氣虛濕痰頭眩

田ノ眩暈門 參加伏苓容 子貴田天麻 吉芷 各等分

氣尽テ眩暈スニヨシ多分ハ十三天ヨク

左曲月脾胃ノ氣消スル故ニ久難用

男患赤瘡毒深而發莖瘡更毒也外

科瘡之入枝葉疼痛甚而難忍

時依婦有怒心恍惚而不知入夏四肢

冷戰慄復更少醒脈沉細遲也教

医見之驚去予四君一貼而全愈

按ニ此病人小瘡便毒ニテ氣虛ニテ

上怒心入不知入躰ナル故ニ此方ヲ用ユ

血ヲ補ヒテ怒リ四肢ナク冷ハ濕瘡

ニナリキ田ニテヨシ天ノ氣虛ノ眩

暈氣絶セントスルニ用ユ二活十三天十

トモハツレヌフソ天ノハモロクノ眩暈

ニ少モハツレヌソ正頭暈ニヨシ言尺氣

ヲ補イ諸葉ヲセテ上行ス少眩暈

ナモ上氣アルユニ用ユ下ハユカヌ葉

ナリ

清心導痰

啓迪院配劑

キ田令卸各ニ星洞文連冊

各一糸各一独各一五ト各一

痰火ニテ眩暈脈弦數實ニヨシ

ニ活ト互ニ相兼用ユ

此方八導痰湯方ニテニテニテ方ソ

痰火上レハ吐逆スモソ

宵ヘ多ツクト痰火アカリ月内イキ

熱スニ佳ソ

痰火ノ疾頭重足輕項太陽經ニ

リ頭ノ多クトスルナリ天テテフラク

テ治シ丹文連ニテ上火ヲサケ羌活多

合テ上焦ヲクツクサレハ眩暈不止ソ

病人振廻眩暈ニテ眩暈吐逆

ス脈實ス此方ヲ用立愈

痰テ宵痛脈滑丸ニヨソ

脈々ニテクル眩暈ニ用ルソ氣虚

ニテ見タラハ四君子トヨ痰火ノ

暈ニ此方必ヨシ

宵ワ多クト自ニ性逆怔忡ナト用ル也

脈滑實ニテタカフニハ右ヲ加用

丹溪右々々証ニ陳ニ知百ヲ加

テ用多全日啓痰火方鳩尾ト

ヲリオカクト有テ熱有寢則足ヲ入トテ

トテ用テ効アリ又此方ニ羌

活独活入レタル心ハ痰生熱ニ生風ノ

心ソ

二活

大下
泉益川烏各二天
附各一水羌二服
獨二木
各七

經曰恐則氣下精怯而上焦閉以羌活獨

活苦溫引氣上行又入太湯為引用故以

為君天麻防風辛溫以散之當散其

中辛甘溫以補氣血之不足又美良

胃氣故以為臣附子川烏益智辛

溫行陽退陰又治客寒傷胃腎主

五液入脛為延以主姜半夏燥濕化

痰沉香辛溫體重氣清去痰安神

故以為度 玉枕

此方六癩癩壞症ノ方ノ壞証上ノ癩

癩癩癩與火局雜用也安神丸用

此方溫補瀉陽之劑也

ソリカヘル六不効スルニ射杏丸ヨシ其間

二清導一ヨシ此方ハ只癩癩ノ症ニ

用ユ痰火ヲ退ル也

此方之症ハ足カラ冷アカルト思フ時ト小腹

ヨリ物カ肉ハムニ上ルヤウニソレヨリ肉カ

タクトトゾリ怔忡或胸塞リ苦ク心沉

三氣トラクナリイカニモ心ホソクアア十

フナリ今死スルカト思ヒ深キ井ハイル

ヤウニ心遠ク氣沉ムソ肉キセクト内

心苦ヲクビヤウニ九煩

又ゾツト寒クヌ毛ノアアモタヤウニナリ

又ホツト熱氣サスソサテ頰ノ太陽ノ經ヨ

リ血氣ニハリノホク有ニヨツテウチン
肩カコハルソ

▲又頭重ク項ヨリ頭目至ヘ引カケ物
ヲヒキアルヤウニメ目ノ上重ク成也頭言

▲上重ク下輕クフラハト舟車ニルカ如ク

▲此証ニ必トクトイ子トスレハヒクトスル
ニ寝入ント九時ニヒツクテ驚クナリ是
ヲ干栗スソ

▲又多分ハ食ヲソケハ胃カキイヨク腹ニ

カナクテ食イソキスルソ又サキモノモ有
起クルトキハ小便スミ坐シタル時ハ結クニ
コル也理ハトクトク上ル故也

▲宝鑑ニ脈沉弦数ト有結ク此方ニテ

動数モ退ク多頭走トト方中ニ有ヨク

▲多分ハ右ノ寸關ヘンテ尤寸關弦ニ成

モノソ此道理ハ風火ノ病ナルニナリ風
火トハ心肝ノ病也故ニ火克金木克土
ナレハ右ノ寸關ヘルソ

▲サテ夜ノ不寢証ソ

▲病証如何ト問ヘハ心虚ノ煩又風痰ト
火ナト云テヨシ

▲大畧ハ俄ニ腎水ヲツカイヌコシタル人必煩ソ

此症ハ男ハ下血ノ後女ハ産後ニヨク此証
有モノク脱血崩漏畢竟血脱ノアトニ
発スルモノ又五味ノ証大畧各有ソコト

可尋サテ脈浮ニシ無力虚ニナルニハ十
三天脈弦實ニテ實証ナク清道ヲヨク

▲此症ニ養生菜ト云ハ十三天佳ノ此方ハ
時々可用久ハ難用ソ

▲此症ニ晚ニ如盛熱サスモノソ

▲十六七ノ女子痢後ニ弁ト煩フ他医
イロク療モ不愈予見之病人曰イ

カモ内心クルキト云ニヨツテ此方ニ症カ

ト思也一トタツヌレハ大畏此症ニカ十ハ

リ珠ニ痢後十レハ血脱ノトト思此方ニ
貼而立愈

▲此症ニヨリ虫出タカルモノ也故ニ漆ヨシ苦楝

根ニシ兵ニシ十ト加テヨキ也

▲疝氣ノ症ニ似タルモノアリ又本疝氣

ト思モ用テヨシ

又此方ニ六味ニシ祀ニシ合ノ用テモヨシ又六

▲右ノ如クナルモノヨリテ三症或五症ニ

テモ十キ人全有可夫

▲又痰火ノ眩暈ニ妙也秘也

清抑

四ノ痛門ニリ心ヲ清レ膽ヲ
ヲサユルト名也

平肝解鬱清火化痰除眩暈諸癩
疾 椒 白芍 酒 芍 令 牛 子 洞 竹 茹
石菖 連 姜 沙 各 一 錢 參 遠
其 各 異 分

此方ハ氣血虛ノ眩暈スル症

導痰ノ痰ノ實症ニヨレ此方ハ氣血

虛ノ脈モ弱キニヨレ

此方補氣血清心火劑也

此方必肢瀉スレテアリ三天ヨキ也又火

ニテ燥テ結スレテモアリ

三五味四

全方解

芍 附 竹 子 步

吉 凶 止 仰 令 地 各 一 錢 沉 蜜 其

以方ハ三ヨレノ秘方松長彈正殿ノ秘方也

血脱メ眩暈スルニヨレ或手負産後ノ

氣付ニヨレ下血ノ上ニモ用ルテ有リ

此方モ二活ノ証ノ如クテ二用スアリ二活

ノ症ニ血又ケタルヲ見ルテ肝要ノ是三テ

一、二、三、エカ又フアリ其トキハ二活ヲ用

テ可也

此方ノ根スハ産後手負血ノ又ケタル

ニ用ユ血ヲシツスルノ妙方也

葉 銘 八 安 柴 一 益 柴 一 養 食 業 一 十 上

打也

▲產後手負血腕ノルイモ用テヨキソ
血タリトタリ目モ三ハ又ニヨシ

▲ツキ疵ハ各別也ツクニ瘀血有ユニ赤
工虎ノ瘀血ヲ破菜ヨシ

▲切瘀ルイ此ルイ補菜ヨシ口ヒラフ故
ニツキ疵ト違フソ

▲散菜ヲ產後手負ノ氣付モスルソ

▲產後才ニ瘀血有テ腹痛ニ或ハ熱氣
出ニ此方ニ虎ヲ加ヘ用ソ手負ニモ血腕
ハ或ハ熱モ有上ニ虎ヲ加テヨイソ

▲身熱脈數士ノ大黃ヲ加產後金瘡
血ヲ鎮ル妙

魚汗潮

伏苓補心也

會治婦人以血旺氣衰為本心生血
肝藏血今血衰而氣盛者由心氣虛
耗不能生血又不能制乎肺金使肺
氣得以柔乎肝木肝之虧損則不
能藏血漸至枯涸不榮經絡故月信
不調矣此菜專補心元之虛抑其肺
氣之盛調和榮衛滋養血脈其疾
自愈兼治去血過多虛勞發熱及
盜衄血咳嗽痰喘上盛胸膈不利
咳嗽潮熱無汗之方也虛勞ノ脱汗
ス熱也大成命ノ氣門ニ降真氣其
經補上云ヨリ建立之方也

下

六七

▲不分男婦心氣力不足ノ血ヲセ
フラス黄^キミヤセテ五心ニ熱有テ或
咳嗽ノ方ニ用

▲時々熱カサレ汗ナキニ用道遙散
表裏ノ劑

▲物ノ心ヲトルニヨレ補心ト銘モ有心歴ノ
今昔キカ有テ咳嗽レ脱血ニ用五物
一ニテ血ヲ行シタシヤウナリ

▲血虚ノ咳嗽ニ方也

▲不分男婦用之愈然專婦用ユ

▲ナソニ四物ヲ合タノ咳嗽吐血無汗潮
熱ノ方也咳ノ後ニ必用

▲血虚ノ胃ヲトルニヨレ補心ユナリ

▲血虚ノ病ノ方カクシテ治ス

▲瘧カ勞瘵カ上ニ結ウ以方ニ治ス
一問クアリ

▲道遙散ハ補心ノ方ウニ血氣血虚ニ虚
ノ有汗ニ用也

▲滋至宝一 道遙散ノ加減方也道
遙ニナト用テ不効寒熱スニ六此加
ヘタイト思トキ滋至一ヲ用ユ

▲私曰吾師啓迪院用此方去寒加沙
是秘夏也

一
六

丸葉萎洞 痰涎ノ方也

治痰結吐咯不出 胃膈作痛不能轉
側或痰結胃膈滿悶作寒熱氣急

并痰迷心竅 數不能言語者皆治之

萎去 洞吉令 復 牛文丹 各二支

飯六寸 宿木 各五寸 廿

痰涎ハ咽口く上云テアヘクモノ也此

方ヨシ

咳嗽骨痛脇へキ痛 酸ヲ加テ用

ノ是症早ク治セサレハ腎癰ニテ丸モノ

ノ久クハ膈ニ癰出テ膿ニテ丸也

夜ノ明方ニ咳嗽スルハ胃中ニ食積有

此病ニ新方ニ後ニ酸軟ノ丸ニ潤肺

一ルイ用也 回ニ三ヶ條 奉タソ

痰火ニ依テ眩暈スル此方ニ加減ノ

用ニ則健忘門ニ見タリ物志ニヨシ

痰火ノニ也

瘥症ニ痰火ニ依テタル此方ヨシ

私日痰喘水腫滿シテ不能安卧此

方用テ小便ヲ通シ治スル間々アリ

痰故ニ右ノ症アルト見タラハ用ルノ是

秘夏也

東瀉白朮

トシニシテクセ

咳嗽日久而肺氣_ノ草_ノ冬_ニ用_ユ

東垣陽氣上_ニ有陰氣下_ニ有去_六命

ナリ

茲降_シ用_テ上_リ肺氣草_ノ冬_ニ此方

用_テヨイ_ソ

凡_ク女_ノ洞_ノ八_ノ實_ノ症_ニ用_テ此_ノ方_ノ虛_ノ症_ニ用

ニ是_レカ_レ目_ノ付_テ胃_ノ中_ニ火_ノ邪_ノ有_テ用_ユ

婦_ノ咳嗽_ノ日久_ノ不_レ已_レ氣_ノ草_ノ小_テ不_レ食_ソ

咳_レ血_{アリ}脈_ニ無_レ力_ノ清_レ咳_レ一_ノ症_{ナリ}ニ

用_テ不_レ企_レ鼻_ノ竟_レ八_ノ肺_ノ氣_ノ力_ノ草_ノ对_テ肺

ニ_火邪_ノ有_テ火_ノ邪_ノヲ_六ナ_レ去_シト_思此_ノ方

ニ_貼用_テ咳_レ血_止也_吐血_テモ_ナシ_ニモ_此心

得_テ在_テ肺_ノ氣_ノ草_ノ又_ク外_ノ方_ノ也

六肺中ノ火邪ヲ去

會_ハ肺_ノ熱_ノ渴_スル_ニヨ_シ

私_ニ白_少毛_風邪_ノ々_九時_不用_先ナ_ソナ

ト_ニテ_去邪_後此_ノ方_ヲ用

桑多木調中 引

入門

此方ハ咳嗽喘急未痊之時脾肺ノ
 正氣ヲタスクルヲ以テ主トスニキル丸萎
 同ノヨシ丸萎洞ノハ熱痰ノ方也
 ▲サテ身ニ汗ナクカワキ咳嗽ナト不正ニ
 當病ニモ用
 ▲サシ出ル其ホコサキノウキクヨカ
 心ヲカナツキニシテ

清肺 引

婦人勞瘵門 毛私ニ今ノコ

ニ失血門

伏キ飯餅 芍天門 愛文
 丹菟膠 雪 各ホ 甘少 梅子
 ▲先痰ヲ吐後監スルニ用ニ畢竟肺氣
 ヲ補益スル菜也肺勞ニ用也或瀉
 白ナトモ用上瀉白ハ肺氣ノ草外ニ血
 ナト出ニヨシ
 ▲茲降ト表裏也
 ▲先吐血レ後ニ痰血充ニ滋降カヨシ
 ▲肺勞トテ久咳不巳ニヨイソ

芍薬 回春方

是八痢之主方也裏急後重膿血ヲ下ニ先用ル方也

此方ノシタテヤハカ河間カ命ニ行血則便濃自除氣則後重自愈ト云

木兵奴氣ヲト、人丈連濕熱ヲ去ル也濕熱ヲ去ハ痢ノ病因治也便濃ヲイヤスニ竹芍ヲ入タ

此方ヨリ、下シタキト思ヒハ正傳方ヨシ但實ナラハナリ虚元可用捨

日久メ不止ニ調和飲

風ノニ加木ヲ用シ木ハ澁不止ニヨシ脾胃盛ノ泄瀉スルニヨシ或ハ澁リ

下血ニモヨキナリ

イコク手ヲ尺ノ脈ノ弦數ニナツタ時和中ニテ佳ク間々有最少レナリ

淡クク膿血出ルニ胃風ニテ不行ニ結勺益中散ノ配劑ニテヨシ

瘧痢ニハ宋冬ノ九味清脾湯

三

木化

木化

木香化滯湯力未考ト有私

二八ノ薬ニ化滯シノス

田^分半^モ草^モ薤^モ其^モ半^モ柴^六木^六半^各四

洞^モ般^モ酒^モ工^下右^モ生^モ姜^モ

此方^ハ痢^病重^急後^重甚^ノ結^夕

腸^胃力^虚冷^ノ芍^薬一^ナ上^三ア^イカ^又ニ

是^方ニ^テヨ^シア^リ寒^業ハ^カ力^故也

和中

平 回 屈 勞 門 又 傳 痢 門

有

皎^多酒^洗白^芍酒^炒伽^上仲^中牛^中連^中

有^紅多^著加^文炒^中其^下木^少許^中

紅^痢加^膠自^痢加^承炒^黑下

痢^病十^ニト^モ不^調胃^クタ^ヒ醬^油

ヲ^タレ^タヤ^ウナ^ニ是^ヲ用^テ度^トヨ^イソ

產^前後^ノ痢^病ニ^此方^ヨシ

其^テ自^痢成^テ行^ニ用^此方^白者^寒

ニ^属ス^上云^方心^ナリ^レヨ^ウフ^ノヤ^ウナ^モ

ノ^ヒツ^クト^レヒ^ツタ^ニ初^中後^用テ^ヨシ

眞養良一五

▲畢竟ハ湿シ踈シナニトモ不行ニ赤

自裏急後重脱肛ナトアルニ腹痛

不止ニトメテニタキト思トキノ方也他

流ニ此方ヲ先ツ用ルソ

▲或考菜一胃風一ニ加米テモ用ナリ

他流ノ療治ナリ勿論見合次才ソ

▲止メテ不正トキハ兼氣一ノルイニテ下

スナリ

聖玉五

▲風熱ノ方也五積ト表裏ノ方ナリ春

夏専用温病熱病ノ方也河間カ

方也

▲仲景桂枝一ノ冬時ニ用如ク夏春

ノ時河間專ニ云方ヲ用タソ

▲益元ニ合メ雙解ニト云ソ

▲中風ノ方也風熱故不知入夏脈洪

数ニ成テ熱有ニ用也

▲明石ノ病人勞々ト煩テ脈洪數有

テヒヨクトメ有ニ用ニ風熱ナリ

玄治此方用ニ氣虚ノ脈弱ハ味煩

氣ニホク物忘スニ味煩氣上此

方ノ症トニキルノ

入^{ホウキ}任氣ニ用ユ任氣ハ皆風熱也常ニ

ハ亡^{ホウキ}ヲ去リ減^{ホウキ}身^{ホウキ}草^{ホウキ}用^{ホウキ}之^{ホウキ}任氣ニ其

終用任氣ニ解毒力先^{ホウキ}此方ヨシ

目ニカトタハ任氣ト可心得或大

兼氣^{ホウキ}トナドモ用皆熱實也三焦ノ

熱ニ黃連解毒^{ホウキ}用

打撲^{ホウキ}ナト用^{ホウキ}虎^{ホウキ}ナト倍^{ホウキ}用

最^{ホウキ}疥癬ノルイニ用虎^{ホウキ}ナト去^{ホウキ}ト^{ホウキ}レモ

其一^{ホウキ}用^{ホウキ}テヨシ

癩瘡^{ホウキ}ニ先此方ヲ用^{ホウキ}ニ^{ホウキ}造散^{ホウキ}ナト用

ルモ後^{ホウキ}此方也

揚梅瘡^{ホウキ}久キモ用^{ホウキ}ナリ

格致^{ホウキ}ノ痘瘡又^{ホウキ}許文^{ホウキ}公^{ホウキ}丹^{ホウキ}淨^{ホウキ}カ

配^{ホウキ}齊^{ホウキ}モ是^{ホウキ}カ

私^{ホウキ}曰^{ホウキ}男^{ホウキ}婦^{ホウキ}實^{ホウキ}症^{ホウキ}ニテ目^{ホウキ}ヲ^{ホウキ}マ^{ホウキ}ニ^{ホウキ}或^{ホウキ}カ^{ホウキ}ス^{ホウキ}或

ウ^{ホウキ}ヒ^{ホウキ}カ^{ホウキ}リ^{ホウキ}別^{ホウキ}ニ^{ホウキ}余^{ホウキ}症^{ホウキ}ナ^{ホウキ}ク^{ホウキ}在^{ホウキ}實^{ホウキ}症^{ホウキ}ト^{ホウキ}サ

ハ^{ホウキ}ニ^{ホウキ}タ^{ホウキ}ス^{ホウキ}此^{ホウキ}方^{ホウキ}五^{ホウキ}十^{ホウキ}貼^{ホウキ}モ^{ホウキ}百^{ホウキ}貼^{ホウキ}モ^{ホウキ}ア^{ホウキ}タ^{ホウキ}ヘ^{ホウキ}テ

愈^{ホウキ}ソ^{ホウキ}秘^{ホウキ}夏^{ホウキ}也

私^{ホウキ}曰^{ホウキ}右^{ホウキ}ノ^{ホウキ}様^{ホウキ}ナ^{ホウキ}ル^{ホウキ}療^{ホウキ}治^{ホウキ}ハ^{ホウキ}下^{ホウキ}エ^{ホウキ}ノ^{ホウキ}ス^{ホウキ}又^{ホウキ}ソ^{ホウキ}七^{ホウキ}女^{ホウキ}ニ^{ホウキ}施^{ホウキ}メ^{ホウキ}人^{ホウキ}ヲ^{ホウキ}コ^{ホウキ}ロ^{ホウキ}ス^{ホウキ}フ^{ホウキ}ナ^{ホウキ}カ^{ホウキ}レ

清咳セウカイ 一ツ 回矢血門レツゲツ

故的桃貝カクキニシホトシレハシ 各二ハシ 麦トシ 加トシ 牡文丹トシ 炒トシ 黑トシ
青吉セウキキ 各五トシ 下トシ 其トシ 二トシ

咳嗽又吐血ス 方也肺氣ス 凉ス 方也此方ス 行ス 右方ス 十ス 用也

柴柳シヤウ

治寡居カク 独陰トクイン 無陽ムヨウ 慾心ヨクシン 萌而モウニシテ
多不遂タフスズ 是以シテ 惡寒アクカン 発熱ハツネツ 全類ゼンレイ

精セイ 莎サ 丹タン 青セイ 六ロク 各カク 一イチ 赫ハツ 柴シヤウ
各カク 二ニ 半ハン 牡トシ 半ハン 子シ 下カ 曲ク 下カ 堯ヤウ 地チ
各カク 五ゴ 十ジュウ 其シ

秦褚澄シンソ 力寡居リキョ 独女トクニョ 方也

羸瘦レイシュ スルニヨシ

勞瘵ラウサイ 方也

加味五香 加味五香一也

此方八本五香ト升葛ト合ノ翹通
虎ヲ加タル方ソ赫ヲ加テ用ル一有ソ
五香翹一ノ輕モ夕故ニ瘡腫物
ニヨキソ

小兒ニ專用ソ

小兒瘡ヲカキト云ニヨシ成瘡多ク
ニ丸子ニ煎ソモフリニモ用ソ

サテ本五香ノ菜味心ハ泉ハ氣ヲ
養木ハ冷ノ虫積ヲ治ノ脾胃ノ氣
ヲ成ニシヨク氣ヲ達スルモノナリ乳子
フト瘡腫物ヲヨク除キ氣ヲ下ノ諸
丁子ヨク虫積ヲ治ノ脾胃ノ氣ヲ

風痰ヲ去テ吐逆ヲ止ルモノノ波ハ
脾胃ノ氣ヲ醒ノ嘔吐ヲ止テ食ヲ
進少醒ストハ熱氣ヲサニスニアラス脾
胃ヲスヨヤカニスルソサテ此ノ五香
一ノ方ハ何レノ書ニ有ト又復ラ不考
ナリ

ツヨ合ノトキハ波ヲ大ニ使テヨシ余菜

水分ナリ

祐安ハ此五香ニ加連童耳而用ラ
レタトナリ連ハ心火ヲ清ノ熱虫ヲ治
ス青ハ癖ノ虫積ヲ治ノ驚風ニヨシ
肝ヲ平ラクルソ

此五香常ニ用レハ瘡腫物痘疹

ノ難ヲニヌカルソ

升葛キウカク一アル故ニ表ヲクシテ瘡ニ
ヨイソ

此方ハ痘疹ナク余熱余毒ヲ治ス
ルソクシテ去テクシテ腫ルナク用ル

畢竟五香翹コカウシキヤウカクノ輕キ劑ソ小兒計
ニチク大人ニモ子フト瘡フカキニ用ル

小兒小瘡及頭瘡或痘後余毒丹
毒瘡尤妙也

沉丁チンテイ各一ホ乳藿木升葛
翹キウ各二モツソク通大トウダイ各三水煎或振出熱

湯用大忌首子味上方怒庵本ニ
テ写之

三八味

氣門方也明監ニハサ三味
ノ流氣飲トアリ

回ニ水腫門ニ木香流氣飲トケ
タツ

版ニ積塊有テ水腫スルヲ治ス

都テ氣塞リ氣滯リ胃膈不利
子クレ版脹不食或喘急咳嗽ノ手
足面ナトツバ心漸々ニ水腫トナリニ
便共ニ治ルニ用テヨシ

水腫脹滿ノ便不通ニヨシ又何トナ
クニ便不通ニモ用テ或熱出咽乾ニモ
用也

肩背脇膈月注痛言ニ丸痛ハ右ハ痛ニ
ウツルナト云ニヨシ

氣ニアリ又ノ有テ痛出タルト云ヨシ
皆氣痛ナレハニ

脚氣或物思ノ骨ノ及ニ怔忡ノ肢脹イ
キタウシクスタクニモヨシ

半井家ニ三種聚専用ソ

厥竜耳ト云テ下ヨリ氣逆上ノ耳不聞
アリ此症ニ必眩暈ソモナリ是ニ必此
方ヨシ方中音耳ト有別耳方へ通ス整
此方ハ明鑑ニアリ 医林ノ方ナリ

回ニ水腫滿積ニヨシトアリ回ニ去
昌波カタシキコクラ加天奴也耳竜耳ナト此方
其保ヨシニ便淡六回ノ方ヨシ又其保
用ニクニカラス

四物調一異

命日治婦女或十五六歳經脈不行

日夜生寒熱手足麻痺飲食少進
頭痛惡心嘔吐腹中忽生結塊中

動者此慎食生冷傷感而致也

酸炒サコノコノシキク柴文チロク奴各チロク个チロク赤チロク
延セウヒ青沙カウクシ毛ニヤシ砂工コノコノカチ其各四ト

婦人月水閉テ肢ニ血塊アルニ用方
也柴文ナトトニテ經ヲ通シニ夕佳ソ

十七八歳ニテ月水不來ノ寒熱往
來ニ頭痛手足麻痺冲動上云テ
塊アル処ヲトルホトノ症ヲ治スル方ナリ

物々調氣養血ハレニシキヤクカクヨシハレニシキヤクカク順其氣調
其經ハレニシキヤクカク上云方也ヨク建立シヨクレタル方ナ
リ

一私曰産後ニモ症ニヨツテ用イタニイ
タフアルハ慎勿膠柱調瑟矣
一私曰吾師啓迪此方産後ニ間々
用ラレタソ

東苦ト至

參ハレニシキヤクカク一ハレニシキヤクカク所ハレニシキヤクカク

芍セキ三ハレニシキヤクカク木ハレニシキヤクカク為ハレニシキヤクカク各ハレニシキヤクカク三ハレニシキヤクカク木ハレニシキヤクカク參ハレニシキヤクカク西ハレニシキヤクカク柴ハレニシキヤクカク文ハレニシキヤクカク

羌ハレニシキヤクカク吉ハレニシキヤクカク各ハレニシキヤクカク三ハレニシキヤクカク木ハレニシキヤクカク周ハレニシキヤクカク菽ハレニシキヤクカク各ハレニシキヤクカク三ハレニシキヤクカク甘ハレニシキヤクカク

▲風眼頭痛ハレニシキヤクカクヨシ又九文ハレニシキヤクカク二三黄ハレニシキヤクカクラ
加ハレニシキヤクカクテモヨシ

▲眼ハレニシキヤクカクニ血多キニヨリカスニ腫痛ハレニシキヤクカクモヨシ
▲ウワヒカリタルハレニシキヤクカクニモヨシ

▲夕ハレニシキヤクカクノ頭痛ハレニシキヤクカクニモヨシ

大七五

積聚有テ腹痛ト小便不通腹脹不食ニ用方也

畢竟積聚才一方也熱積ニ惡心脾痛ニ加烏菜奴脾滯合聖散

熱積ニ回樂平一用此方熱キ者積聚ニヨ

腹ニ積アル故ニ喘息スル此方ヨキナリ

廣潰一八腹ニ積塊有テ熱脹ス少治スルナリ

熱ニナク塊ナ有ニ桂上主茶フルモ也

胃ツカ虫フカ多瘦不食ナ色惡キナトヨシ又共加テ最佳也

方加軍兵治諸般痞積面色痿黃肌體羸瘦四支無方皆綠内有虫

積或好食生米或好壁泥或好食茶炭鹹辣等物者只此一服除根

右刺水煎露一宿定心ニ温服ス不得此少飲食不然則業力減而虫積不

行矣服後食頃腹必痛當下魚凍或長虫或血蠱至日午虫積下盡方

用温粥止之後服綠礬丸一料而愈腹痛ニ用ル尋常ノ復ナリ

▲啓曰此温散ノ利ナリ塊動スヨシ
塊動セサルニモ症ニヨリテヨキ

▲私曰啓公アルトキ東ノトウインノ玄春ニ
語テ白アル人喘息ヲ患諸菜不忌木
七氣ヲ用テ安スト今懐フニ此人
腹中ニ積アル故ニ喘息ヲ患ナリ

▲世話ニ云フ云云症ニ此方用テレハ
効ヲエタソ

二八流弄

生手ノタウキニシテ多シシ
芍 散 芍 風 參 菘 木 桂
吉 芷 矢 淡 烏 水 奴 各 一

甘
乳癰加青

▲又治痘疹余毒作癰瘡

▲氣腫ノ方也氣腫ハ三年ノモサニ膿

不出キルカガリ出ルハ是氣滯也

血腫ハ膿ツフテ膿血ニ成テ多量

ル云フ

▲一切無名腫毒ヲ治ス

▲婦人乳核ト云テ乳ノサノ上ニ基石

ヤツキルモノナルニヨシ甚痛ヲツ此方

士フテハ難治必用ヘレ後ニ乳岩ト云モノニナリ死ス

▲痘ノ余毒トテ痘ノトアレシニ必用
ユキ足ナリ腫ル也或消毒飲ニ加テ
粉ヲヨシ

▲或入初ハ兩痛後クヒスナリ寒熱
往來四方種ト用レモ不効此方ニテ
治タリ

▲此方瘰癧ニ必寒熱アルモノ

▲藤十郎久骨痛後少腫ナリナ
ソ走注是氣痛ト思テ此方ニテ愈
タソ他方ニテ何トモ不驗也

▲又久目ヲ煩疼痛シホレ出タル用
ソ是モ腫物ト思ヒ又氣又ナクテ
ス可然ト思ヒ用テ

氣有テエヘアカリタカモナリトカ
氣ヲ多ク煩ラセ共ヨイソ氣ヲハ血モ
多ク煩ルソ

▲或人目腫痛ヲ共ウニ出タル用テ
治タソ畢竟煩氣ノ方ソ

則十神ノ是方也世に名を知らず正香其燕シラカ

方ノ香葛カウカツ一ニ似多シラカ

▲感冒咳嗽頭痛汗難出ナソト用
ニ毛汗也頭痛甚トキニ用ル方ソ

▲傷寒ノヤウニ久熱氣去カ子テ汗モ不
留口乾頭痛之後ニ斑疹出モ夕時方
必可用慎寒菜ヲ用ル方ト斑出ノ可
然ト思時ニ此方ヲ用テヨイソ

▲右多ク丸症友竹此方ヲ用ラセト六斑
一身ニ出ルノカ多ク復ハ切者ノ方
也其後正意白虎ニ如參用テ一貼ニ
ノ死多ト也可慎

加七 此方医林正傳に心積ニ見

▲治七氣病癸心腹刺痛欲死

田五ト延炒桂各二末 參一末 丹麥 乳

五 薑三片 棗一枚

▲婦人云加散方各一本

▲心氣痛方也是心氣痛方也

▲七氣心痛刺痛及婦人血痛

▲心痛之當死セシトスラ合ス上云方也

▲小女痔腫テ痛ツレテ血甚下リ

俄心痛甚之不能言欲死此方一貼用立愈

▲瘡血多下テ後心痛ス一カチラスア
リ是ニ秘禁也妙也

▲婦人ニ三味ノ加菜ニ音也妙也

清肺セイハイタウ 十回咳嗽門

支シ 天門テンメン 杏コウ 愛アイ 各カク 會クワイ 丹タン

一切咳嗽ヲ治スアリ

回方前二三條奉テ委クアリ

痰嗽ハ咽ニ痰声有クヤクメ痰出テ則止

肺脹嗽ハ呼吸早クノスタクトスルヲ云フ

久嗽不正痰声或咽生瘡是火

傷肺金也右三條皆此方治下有

咳氣ニ三声嘎ニ發散ノ劑ヨシ

寒熱ヲ咳ノ聲ノ乾ノ是

嗽門ニアリ

久咳不止声嘎ハ肺ニ伏火有テ潤ヲ乾

ス故ニ声嘎ル也此方主之又茲降毛

声嘎ルニ用土大夏ノ症也

血虚有汗潮热者也
矣多宋 回经热門

治積勞 虚損四支倦怠肌肉消瘦

而少顏色 汲々短氣 飲食無味也

參 瀲 菖 蜜 桂 心 枳 加 各 一 分 煎 炒

汗 伏 五 味 各 七 分 遠 炒 并 炒

▲血虚之症 热者直汗ヲ治ス又医王ノ少

ラ也イ王ハ氣虚之症 自汗ニヨイソ

▲畢竟ハ本虚損門ノ方也命云キテ

此方ノ建立ハ今至天補一ニ去テ加キ

五味遠々方ノ氣虚ノ汗出ルヲ治ス

心悸物忘夢多々見テ草外タルニヨ

イソ大ニ便々方ノ為ニタル心ハ収斂

キレイ子ニレサル等ノ症ニ用ルナリ

▲此方氣血虚ニ体草外有汗有サリ

表ヲ収斂メ汗ヲ止ル方ナリ

▲婦人痔ノ類膿血多ク出氣甚草外

サシキシ多ク夢ヲ見テ夜ヲ子ス脉モ

虚ス故ニ此方ヲ用テ治タリ養安院

モコノヤウナ症ニ用テ愈タト云レタソ

參多令虚泻飲食入胃即泻水

壳不化脈微弱是也

▲脾胃ヲ調ル方ナリ故ニ脾胃虚其方也

▲病後ニ最調脾胃也

▲脾胃虚ノ泻スル

▲脾胃虚ノ消渴ニ咽乾ニ用テ妙也

▲脾胃津液ヲニス菜ナリ

▲脾胃虚ノ水腫ナト其方粉ヲ用

▲小便ヨリ通ノ腫退クモノ

▲虚勞痰嗽喘熱而泄泻者此方脾

健也右方志方見泄泻

▲補治イ玉ト兼用テ冬ニ水腫ヲ

治タツ

三回七氣

田平令果淡水ニ右生姜

三回ト外六滯内七情又内外因

ナラズ共ニ心腹痛ヲ治スル故ニ各ニ

細ク用テ得効妙トシ

▲壽德菴ハ是方ニ加梅泉炙心痛ニ

タヒク用テ得効妙トシ

通明利氣 益 四耳門方

▲痰氣鬱滯ノ耳不聞ニ用ルノヨ
くトノ痰ツカユルニ用ソ

▲腎虚ノ耳不聞ニ滋腎通耳湯
ヨシ多用テモ不苦方ナリ

▲故モナク一症モ主トスノ不聞ニヨシ
▲厚味ナトテ不聞ニ聖ニナトヨシ

▲ラウクトノ氣草外何トモ症ノシレカ
ス時ニ是方ヲ用テニルソ

四ノ耳門ニ委クナリ

少煩 益

命曰治男婦一切風氣攻注肢節痰

麻雅真言語蹇澁先服此疎氣

道然後進以風葉氣丹為逆除

下為煩ト云氣者正所謂降氣也如
陰積浮腫合五積散麻痺痛極

合三五七散二三年不能行者合極
寄生湯日夜疼痛合老經湯合

▲中風ノ表氣之煩スル者ナリ
▲卒中風セハ味煩六七貼或八十貼ニ
テ用テ氣ヲ多クシテ後此方ヲ用テ

表ク煩ノヨイソ
▲肩膊背叶上麻痺不仁ノ起リクト

夕三カイ十脚氣上云必此方ヨレ

▲回頭痛門ノ回首散項ニ分ヒキツリ

痛クモワラズニ此方加羌活九トヤリ

▲中風ノ口眼方△此方ヲ用テ間々治

レタソ余方未試之

▲子ヲ持タル女ノ子ニキニクヲサセテ風

ヲヒキ中風ノ如ク不仁レレト痛多

分公方ヨシ妙ソ

又至積ノ症モアル

香苜蓿一突

治四肢感冒不正之氣頭痛身疼項

強寒熱嘔吐痰嗽肢痛泄瀉不問

陰陽兩感或風寒濕痺服之如發

熱無汗遍体疼痛加葱白二根豆

鼓七粒煎熱服得汗即解吐去蒼

木加白木枝片霍香散葉中脫脹

滿大便秘加枳實各半有痰加

半夏半咳嗽加五味子七粒鼻塞

加桑白皮三寸版痛加枳壳半片泄瀉

加米凡二片老人產婦嬰兒皆可服

如傷寒不分表裏以此藥道引

經絡不致變動其効非淺如執

口渴心煩藏府堅或加前胡無汗
加麻黃汗太過加干黃根時行寒濕
泄瀉頭疼發熱自汗大効の時令本
正發為疹瘡解腸胃中一切熱毒
皆可服之也。溫熱不時暴吐。梅月
天時行瀉。沙。蘄。貴。周。余。存
精。各。二。五。止。各。一。身。少。

▲秋曰此方八葉毒ヲ解スナリ
啓公腹痛ニ用ラレタリ此亦葉毒
ヲ解ス心モアリ

其配劑記後

▲壯男久服補腦下疔痛脈微按化
虫消積除濕之劑共不効用香葛
湯尋奇効

八解ニ空

治四肢傷寒頭痛壯熱感風多
汗及療勞傷過度骨節酸疼飲
食無味四肢疼倦行步喘面色
痿黃怠惰少力咳嗽寒熱蓋羸弱
自汗胸膈不快嘔逆惡心

此方... 治... 汗... 食... 痿... 自汗...
此方... 治... 汗... 食... 痿... 自汗...
此方... 治... 汗... 食... 痿... 自汗...

