



貝
面
配
劑
下





醫家極秘方下

第十四 中風

第十五 痿痺

第十六 氣

第十七 痰

第十八 癰

第十九 脚氣

第二十 濁症

第二十一 痞滿

第二十二 血症

第二十三 疝氣

第二十四 婦人

第二十五 小兒

第二十六 外科

第二十七 異病

醫家極秘方目錄下



十四 中風

一 五十餘歲男旅行六七里得寒風甚飯家卒然口眼喎斜氣不病如常診脈沉緊

為藥順氣散

用藥二貼口眼喎斜大半減頭重

小便澀滯

去六黃加羌活通

一 五十餘歲之男去春以來言語蹇澀他醫作中風治而無寸效漸加口眼喎斜大便結滯二三日一行如羊屎手足節微痛于時痰涎胸膈咽喉澀滯則益否強難言食進體肥脈緩有力

防風通聖散

一 五十餘歲之男素嗜酒少食體瘦于時旅行七八里感風冷飯家夜中卒欲氣絕把灯看策口眼喎斜脈浮濡四動

流氣飲子 按人多順氣亦可

用藥五貼病症減愈尚請用藥服緩

醫王去辨難加為難

一 六十餘歲之男子去夏患中風他醫治愈及于今常大便堅實難通小便澀滯手足緩弱言語蹇澀關節痛痺食進脈浮大緩有力

防風通聖散

一五十餘歲之婦人一兩年患中風
他医治之病症大半退這比起宴
座中忽神昏眩不省人莫察涎壅
塞手足厥冷脉弦而緩諸醫辭去
于時考一方煎服一貼忽蘇甦痰
涎退去如常人

三生飲

避而請服藥

補中益氣湯

一五十餘歲之男二三年以來中風
諸士治之諸症大半愈至于今所
苦大便常秘小便澀滯關節疼痛
言語于時澀于時順脉浮而有力
防風通聖散

用藥三七日便秘全快利退右方
則便秘如故關節疼痛亦同仍考
一方常服或間進前方

萬室回春湯

一貴人弄鷹野遊至干黃昏飯城飲
食甚味能進少間頭微痛手足寒
痺明且口眼喎斜脉沉弦
焉藥順氣散

十五痿痺

一四十餘歲之丈夫素肥自去年以
來右手足痿痺大便秘結痰嗽厥
沉有力食倍常

穿 獨活湯 四君 二陳

卅五歲之男七年以前春一日過酒翌日入桶湯後於爐邊睡覺畢見遍身手足赤腫班々面鼻耳邊同赤或曰是癩也自亦疑癩丁醫為風症療之赤腫悉退而右手足頑痺不知痛痒今粗魚知痛痒手足軟痺又手足一二指麻木此症四時不變漸及七年又四年以前春初如七年以前赤腫班々及周身面耳手足春末其腫自退如故其後每春初春起發春暮退如泥每春赤腫魚來去手足頑痺一日未止脉四動沉微弦

穿 補氣湯 消風散 四物龍膽

一四十餘歲之貴婦十餘年以來經閉肥白食進如常所苦腰下沉重于時腰腿酸疼于時手指冷痺不覺大小便順脉沉細

合 五苓散 二陳湯

十六氣

一五十餘歲之男素嗜酒近年不大飲小齋三行三四年以來去居旅住氣不順情去年三月以來于時胸膈牽痛飲酒則痛止及于今痛不平愈心胸肩膊膈腹痛或腹脹不食右脇下有塊按則加痛小便如常大便秘澁于時咳嗽顏色痿

黃右寸關細瀯而尺浮弱重手則
弦亢脉三部沉弦三朝診之左右
前同全不遠

木香順氣散 氣

壯歲之男務世業氣常留滯腹有
積塊好用針治腹脹大小便澁滯
不食于時眩暈脉弦

木香順氣散

四十餘歲之男素務職土一兩年
有積塊于時痛于時止此項腹脹
大便秘脇背甚疼難轉側食不進
脉弦

流氣飲子

灸痞根

一老人季腰痛全難轉側大便結閉
及于八日未通脉浮而有力

三和散 加三味

一廿餘歲之僧務學業心勞心下痞
塊不食二便澁秘面自虛浮或去
或增于時微咳于時心腹微痛于
時乱言于時無言無答對脉弦重
按則瀯

分心氣飲

一十五六歲之男子務學業兩年這
比心腹脹痛不食大便于時結于
時瀉于時眩暈身體瘦无脇下有
壅塊脉沉瀯

七氣湯

右病症大半退脉沉遲冷痰少出手足微冷

對金飲子

灸膠愈

卅餘歲之僧素肥白一兩年心胸痛食減于時眩暈目上甚重眼難閉于時吐痰于時嘔吐脉沉瀯大便秘

分心氣飲

一五十餘歲之男子体順去年八月以來耳鳴一陽來復之後卒感寒而絕死一時而甦于時頭痛項強惡寒臍痞塞食不進大便順小便赤淡他医与消風散六七貼病症

皆退去至于當年耳鳴不退正月上旬夜中眩暈与草白芷散眩暈退去其後頭重耳鳴自汗有痰短氣也于常腹堅大便結小便順食如常右診脉緊瀯于時結

分心氣飲

一五十餘歲之貴男素氣結二三日以前旅行七八里飯家腰痛便秘脉沉而結滯不食

三和散

用藥三貼腰痛止大便通氣快于時微痰于時微眩胸膈痞于時胸中微痛于時便秘

七氣湯

一壯歲之男素過食近年有塊塊食不進過食則塊動滯腹脹筋腸脈弦于時結

四七湯

一十七八歲之女心腹疼痛吐不入藥水及四五日數方無寸效脈弦數一貼平愈

紺珠正氣天香

一婦人及于三十無孕有積塊腹脹食如常魚食腹脹不妨脈弦于時結

大七氣湯

一廿餘歲之婦人色白微瘦食如常五年以前初冬上旬之比右外股

之大骨頑痺以指押之痛行步則痛醫治之去冬仲冬為易產以來無月水來後如腫痛當雙氣膝面上重難開胸煩頭節拘牽右目淚落右齒痛有盜汗氣如沉兩足甚冷常大便結于時下血今月十日以來腫赤硬甚痒押之痛于時自痛脈四動按麻木門黃莖湯可乎

瀉氣飲

一四十餘歲之婦人夜中卒胃中少疼諸醫治之而無寸效脈沉細四動

大七氣湯

一五十餘歲之男素商利及于精力

去春以來心下痞悶堅夜不得安
臥不食于時渾身浮腫大便實脉
弦于時加數

分心氣飲

用藥六貼前症半愈微咳夜不得
臥面目浮腫

加吉田西

一五十餘歲男子勞于世衰去筮以
來右脇下在積塊勞于亥則發動
鳩尾胃脘微痛食物進退不同大
便秘于時吐酸水脉弦九小右大
大七氣湯

一廿餘歲之婦左脇有塊因氣發動
作痛月經不同飲食甚進甚退于

時胸膈秘悶作嘔脉弦瀉

消積正元散 脾胃

一四十許之男素肥今瘦雖素為太
酒今禁蓋因有病然也痰涎壅
盛且呼吸促迫而不任于行路胸
膈及右脇甚痛疼而不能轉側食
如常大小便同脉沉濡白云常也

前烏藥順氣散

後異功散

一貴人素嗜酒痰嗽氣喘則弥增嗽
氣胃膈滯痰微痛不食面目虛浮
大小便于時澁于時順

分心氣飲 加半笈桔梗

一四十餘歲之男春來至于今胸膈

痛或胃膈痛止走于肩背脇肋便
秘微咳飲食無妨氣滯則增痛不
食于時面自虛浮二三日以來背
脊痛腫起如手大疼痛夫脉沉弦
有力若欲成瘧歟疑似

木香流氣飲

一卅餘男因世夏氣滯腹脹飲食不
進大便不通腰脇痛脉弦沉

三和散 加如蘿蔔子皂角子

一廿餘歲男時氣筋痛腰下冷痺

三和散

一卅餘女氣積項下身浮腫腹堅咳
痰心苦脉細瀼

分氣補心 鱧水腫有

十七 痰

一卅餘歲之男子素肥白四五箇年
患痰症咽喉膈滯塞發則咽作痰
声眩暈頭痛肩背痛當年氣力衰
世夏懶診脉沉微細軟四動尤微
大右微小

穿二陳 平胃 四君

一桑山内詎殿素肥自勝常人自語
云上氣滯痰甚別無苦患診脉虛
弱細兩寸微大兩尺小

大調中湯

一四十歲之男子平素在痰七八日
以來頭痛發熱咳嗽甚也俗醫以

藥二三貼汗少出心志雖如爲快然動搖則痰類來閉喉脈弱七八至之間一絕

四七湯

一壯歲之男素肥滿盛實一日起酒宴次日痰涎閉咽喉胸膈大便不通用二陳三貼畢吐涎沫數碗胸中平大使通食如常痰涎咽膈滯塞脈沉瀯兩寸大有力

二陳 加礬藥

一壯歲之女子素盛實面赤喘氣脈沉瀯

蘇子降氣湯

一升餘歲之婦人素肥白上氣痰涎

盛足常清冷于時頭微痛感風寒則喘生氣鬱則暈生食如常大小便順脈沉細四動

橫子降氣湯

一男子六旬餘素盛實無病一日起宴飲酒過多翠白魚頭明未起傍人問無對仍親近候之喉中口鼻痰涎壅塞如鋸無言語診脈滑大而無力

瓜蒂散

一壯歲之男去歲以來發狂在他醫治狂止于時發狂診脈右浮大有力尤沉弦素肥白嗜酒胃膈疼痛有痰涎

小調中湯

一四十二三歲之男一兩年痰咽滯
流咯不出吞不入于時帶絲血氣
以無動頭重不食大便微結脉沉
濡

四七湯

大瘧

一廿餘歲之男子疾瘧二發大熱煩
渴魚間日餘發大頭痛脉弦大數
汗甚出大便不通小便順

大柴胡

一十七八歲之男子瘧疾二發則
瘵甚脉弦數

白虎湯

一壯歲之男子患瘧疾二發熱氣甚
壯謔言妄語脉弦洪

小柴胡

用藥三日熱大半退無妄語頭痛
煩渴脉弦數發時變午前

白虎湯

用藥三日頭痛煩渴減去微熱微
寒脉弦遲

弓飯驚甲散 中葉忌食之再發

一十七八歲之男子患瘧疾四五發
他医治之寒熱往來大半退熱少
寒多聞寒氣則欲吐脉弦數

對金飲子

一十八九歲之男癭每日唯時寒寒
而汗出大便瀉心腹堅滿而頭面

四肢浮腫

多養田

十九 脚氣

一廿七八歲之男子右腕以下至足
蹙赤腫痛脈浮弦五動及于十餘
日未愈大小便食物如故

檉蘓散

二十 濁症

一五十餘歲之婦人及于三四年小
便頻數白濁于時腹痛食如常脈

浮于時結于時瀉

草薢分清飲

二十一 痞滿

一卅餘歲之男子食則心下痞滿臍
腹隱痛脈緊瀉

木香化滯湯

一壯歲之男子素哀君勞氣去冬成
客酒食太過中氣虛弱便瀉日三
四行正月自中旬心下痞滿食物
難情心腹脹胃脘痛心腹手足
冷微痰因于時手足煩熱脈浮弦
重手則瀉弱用藥六貼病症皆去
減

木香化滯湯 手胃散

穿

多苓白朮散 加，飯尾 枳實 紅花

六月下旬

一貴人壯歲起長途發行八九日，且鳩尾緊急痛發吐一二次，吐止痛止快然，翌日腹脹全，不食小便澀滯如淋，一医用香茹散三四貼，無寸效，返而加淋澀滯，許曰：香茹利水之性速也，加淋澀如何，脈平，無餘証。

大正氣散

加門 白朮

用藥兩日小便通利，如常退去，飲食常也，止藥一日至夜半，腹微痛，瀉二、三行，微渴，脈弦，知濕症因飲食，因藥力作瀉，痛仍，二味，減二味。

加

三十一 血症

一壯歲之人嗜食肥甘，自多食炙博，翌日衄血數升，衄血止，吐血及四，凡不止，一身溫和，脈有力。

枇杷葉散 血

一五十餘歲之男，素嗜酒，每春鮮血下，及于今歲下血，增益甚，面自浮腫，不食，脈緊數，于時腹微痛，目弦，怔忡，短息。

合地黃湯 劑 胃風湯 血

一廿七八歲之貴男，皮膚順素嗜酒，依病禁之，後廿日以前，至于今日。

吐血碗許與犀角地黄湯而吐血
大半減矣然未全止日二三度
蛤貝一許定常頭重上氣食平大小
便順脉平

合黃連解毒湯 加味瀉白散

一五十餘婦鮮血下及于七八箇年
不愈大便結實難通脉微浮于肘
瀯滯上微大下微小

小薊飲子 去渣石 通牛
加升 地榆 皂角子

三十三 疝氣

一五十餘歲之男一兩日增寒壯熱
及于三日增寒壯熱退去心氣如
素飲食進如常及于日肺膈下甚

疼痛關節挛急難轉側小便澀本
便平診脉右浮大左緊瀯

烏附通氣湯

用藥四貼前症悉愈尤陰囊腫起
如手疼痛煩渴大便秘脉六動

右方 加橘核 兵即 青皮

用藥四貼疼痛大半去便通外移
用針膿血數外病症悉退不食微
渴脉浮緩

神中益氣湯

三十四 婦人

一廿三歲之婦人皮膚順此男行他
邦居住五六年去雙飯家留四五

夕日至九月腹痛十餘日而月水
通來過多以後有腹愧庸醫診之
為孕婦一家不_レ結喜然月經水通
來漸塊大如碗于時動于時不動
按則疼痛未之刻尤腰如痺張月
水色鮮余傍人語則氣不快便澁
脉四動餘而弱

補中益氣湯

去升柴加芎 苓 倍 白木

右病症脾胃虛弱也

一廿餘歲之婦人十六歲之時始妊
淨及于七月生產經一日生子死
矣而于今無孕甚肥滿盛實月經
常火診脉沉四動用藥百餘日月
多通夾一兩月餘而懷妊

合 四君子湯 二陳湯

加 沙 參 苓

一十八九之婦小產畢月復如前唯
所異脉弦而微浮素瘦弱用藥及
于一歲餘始孕生產其考方如左
安胎飲

一十七八歲之婦素盛實肥滿初妊
孕易產崇驚侍女醫雖加治療反
增病咸辭去于時診脉兩寸浮大
有力五動大便閉實小便頻用藥
廿四貼五日異大便快利二三行
神氣和平

初為藥順氣 中防嵐通聖

謂邪崇退畢于時妄語或日呻終
不退平氣脉沉瀟然症診脉浮緩

用藥于時羊年平愈矣

大調中湯

一廿七八歲之貴女稟受怯弱兩次雖有妊孕終不能養胎云年十二月亦小產余來經閉腹塊侍女疑懷妊懶動作手足煩熨晡潮盜汗飲食無味大便微結小便頻脈弦數

茯苓補心

一廿餘歲之女三月上旬增熱月水不調于時頭微痛咳嗽不食腹有塊未子用藥二十貼前症及愈

逍遙散

一廿餘歲之婦人去春產畢病他醫

作咳氣治而不効寒熱往來或日晡發或初夜發或夜中發一身乾燥而無汗若粥食則微汗頭痛不食微渴大便結小便如常五鼓診脈弦而微浮五動發來則弦數

加味逍遙散

一四十餘歲之婦人腹有塊疼痛經水不調面色萎黃不食于時頭微痛脈弦瀯

玄胡索散 摘四物芍

用藥一貼腹痛止頭痛止小便澀大便溲一日五六度

四君子湯

一卅餘婦妊孕四月食鯽魚鱸卒然

腹疝痛陰中出血及二白赤止全
不食則吐脈緊弦數

紫蘇飲

一貼服了前症咸愈腹脹小便澀太
便不通不食脈浮有力五動

平胃散 加只荖

用藥四貼前症咸愈脈浮弦無力
不食于時微渴手足微熱

医王

一四十餘歲之婦人崩漏及二年不
愈渾身浮腫常大便瀉如水全不
食塩味湯洗飲食之脈浮大數

医王 減貴加蒲生地 廿

一廿餘歲之女二年以來帶下或赤

或白或赤白兼下或如豆汁腹痛
腹脹飲食無味大便結滯脈浮弦

伏龍肝散

一壯歲婦女去春產了氣色不常医
用數方數症愈至于今心氣虛弱
勞妄難動則眩暈心悸不定脈
軟細四動于時煩熱來則溼大有
方五動大便微瀉小便清利食無味

妙香散

一壯歲之女姓孕四月去二月洗髮
日脯壯契頭痛腰背刺痛手足節
甚痛微腫他医治而契去頭痛退
日脯增熱煩渴夕部前陰出血肢
微痛弦數

紫蘗飲

壯歲之女子生產後十一日率角弓反張腰痛不省人妄問其故答云無故脈浮數

如聖散 見被傷風

一壯歲之婦妊孕十月已欲產其腹痛手足厥逆嘔吐及三日未產脈緊數

催生五積散

一壯歲之女生產十餘日右感風邪頭痛往來寒熱便瀉脈弦數

三分散

用藥四五貼頭痛缺皆去瀉未止不食脈浮弱四動虛浮

夕苓白朮散

用藥四五貼浮止食進浮腫退昨夜過食腹滿瀉二三行

夕苓白朮 搗平胃散

一十七八歲之婦人懷孕三月去冬廿七八日增寒壯熱頭如破他醫擬數方前症退及于今日晡微渴頭微痛咳嗽全不食月水通來手足節微痛脈弦細五動日晡六動

九味羌活湯

一老婦五十一歲偶然為妊孕故用外術針法數多終絕疑似至臨產諸醫近侍絕產良久渴然為子決慣難易產診脈和平無難候証乎素無異儀于時侍者謂一兩日食

少心微痛行周進通云云

合 平胃 香換

用藥二貼至自未明易產畢胞衣未通脉与氣平

牛膝湯

用藥二貼胞衣下氣暈腹微痛手足微冷脉浮緩

玄胡索散

用藥一貼畢腹痛畢止渾身發熱頭微痛脉同

医王

一廿餘歲之女子六七年前生產終無懷孕面赤如朱如紫于時面熱如烙怔忡驚悸于時妄語脉弦

數食于時進于時不食大小便順月經不調

八味道造散

一卅餘歲之婦人素體瘦月變多少不定期後四五十年以來痞塊遠脘大如碗于時動常微痛足心至爰甚熨乾燥至冬甚冷喜吐唾于時眩暈大便常少結小便頻意此痰出來咽喉不利食如常脉沉細而弱四動

大調中湯 為附通氣湯

灸 脾愈

一壯歲之婦人素瘦黑常患下血甚血色瘀黑于時腹痛去歲姓孕當

年二月安產畢催姙孕後終下血
不下全自愈產後復下血再發血
色前同腹痛甚大便閉結小腹緊
急手足微冷脉沉緊

桃仁 養氣湯

用藥二貼如羊屎者數枚通來腰
痛止手足濕脉弦大便黑血交下
經三日同不食微渴

補中益氣 去升柴倍飯加屠
桃仁 紅花

用藥六貼黑血尽耶赤血通來一
日二三行大便順于時血与便交
出不食脉弦用藥五十餘貼平愈
補中益氣 加芍藹

一壯歲婦人盛實易產畢及于八日

周身走痛忽小腹急痛有二塊按
則痛甚欲絕小便澀大便順脉沉
澹有力

復元通氣散 又大玄胡索散

用藥一貼痛悉止如神

平胃散

用藥一貼惡露通來氣清不食腹
脹脉淨

一十餘歲婦人卒惡寒或有熨大便
秘結十餘日

四物湯 小柴胡

右合与之時与大麻仁圓愈

一安胎散 一切難產橫逆產之子
腹內而死于遊腹痛良也又產

氣ア儿二毛与之

双三分 栝木 芷 苓 各二分
生姜一分

一廿餘歲之婦三四年以來面色干
時如紫于時如紅于時白于時黃
飲食乱或進或不進欲語則心中
悸惕言語不連續室好歌樂餘人
聞之則甚愧之心中不快不食脉
緊數

八味逍遙散

一卅餘歲之婦去夏產畢經十餘日
无之乳房核痛漸長作瘰外科用
針刺膿血流血至干今黃汁不
痛疼大便秘脉浮無力于時微渴

医王

一四十餘婦素肥白三ヶ年已來患
崩帶脐腹冷痛脉浮無力重等則
脉絶久如動其形沉緊用藥五六
貼病症尽愈

伏竜肝散

一婦崩漏大下氣欲絶身冷脉伏

三五

一婦人孕而患惡阻嘔吐不止飲食
不下心中煩燥頭目眩暈諸医以
和脾胃之藥二陳大肚保生湯之
類遍投罔効脉微數氣口數
无汗

三五

小兒

一十四五歲之男子頭痛發熱咳嗽
煩渴干時妄語眼中赤小便赤澀
大便晝夜二三行如水全不食脉
弦數右男赤發痘瘡時痘瘡流行
疑似

一六七歲之女子卒頭痛發熱咳嗽
煩渴他醫治而翌日汗甚出渾身
赤斑咽痛脉弦數二便澀全不食
右女子赤發痘瘡時痘瘡流行疑
似甚危

八味道遙散

右用藥二點畢病症咸退赤斑愈
二便澀滯咽痛

加圖愛奴

一二歲之兒素肥滿盛實無故卒絕
死及于半時赤發脉動身溫和兩
足冷進藥一二口忽獲生

蠟餅餅

一三歲嬰兒卒角弓反張及于終日
未解

蠟稍

一小兒撮口不乳及于明日未解

蠟稍

一小兒直視上竄手足緩縱及于兩
日未解

蠟稍

一三歲兒脾胃虛弱常腹痛泄瀉驚
風腹脹

觀音散

一四歲兒腹脹泄瀉于時腹痛感寒則泄瀉倍常兩足冷

益黃散

一四歲之嬰子常食土炭體瘦大便或秘不行或日瀉三四行

平胃散

一三歲小兒皮膚順去月陰梅發熱泄瀉日五六行煩渴喜飲冷水不食予錢氏白朮散与之熱氣大半

退泄瀉日三行此症世間多諸醫名之得駁遲而奇方所希

銀白散

一三歲之嬰子患慢驚風吐瀉面色

痿黃

觀音散

一三歲兒口眼牽引直視發熱痰涎面色赤大便不通自午刻至夜灯

赤解

蝎梢

一三歲之女子吐瀉及二且不愈心腹膨脹面色痿黃于時甚青于時

驚喘

一二歲嬰子發熱吐瀉渴而引冷水于時搐搦虎口紋青淡紅及三日病症不退

錢氏白朮散

一二三歲小子兩日發熱鼻寒直視

搐搦咳嗽小便頻數虎口紋青

惺々散

一四五歲之小兒去冬患痢病他醫與數方痢漸愈八月下旬一兩日發熱煩渴及于三日手足瘳瘳口眼引針于時吐于時瀉至于全病症不退

多苓白朮散

一歲之女子發熱面色赤撮口于時瘳瘳啼啞不通如呻大小便如常飲乳倍常

加減惺々散

一六七歲之女子卒頭痛發熱咳嗽煩渴他醫治豈白汗甚出渾身赤

斑咽痛脉弦數二便澁全不食右女子未勢瘳瘳項疽流行疑似甚危

八味逍遙散

右用二貼病症咸退赤斑愈二便澁滯咽痛

加圖愛奴

一小兒二三日吐瀉煩渴發熱直視上竄發搐小便自利病症甚危

觀音散

一二歲之小兒母依懷体無乳而克飲食近此腹脹咽澀便瀉醫治脹退便減然滿甚盛引飲無數虎口紋紫色二筋風闕至氣闕不食体

瘦小使嘔大便瀉一日三行

錢白朮

一三四歲小兒病瘵疹愈後身熱渴而飲不知數大便瀉三十行小便利過多如清水不食氣閉右斜文紫色也

升一廣一

一兒生及于二七日卒驚啼吐乳撮口虎口曲雖兩頰青用藥一日忽如常

蝎梢

一二歲之嬰一兩日咳痰吐乳及于今日卒口噤兩赤手足冷痰涎閉塞手足拘急病症甚危

蝎梢

一小兒四歲見車牛數行忽然驚啼契其不欲食全無及于翌日角弓反張直視手足厥冷大小便不通

蝎梢

一童子瘦弱素腹大自去春至于今腹脹如按鼓有青筋絡臍腹脇助大如小指食不進往來寒熱諸醫雖與數方無寸効乃者考一方進之廿餘日甚有可効食進病退大半

合平胃散 小柴胡而 散平胡飲

一十三歲之童子天性手足腕生瘡痛痒乃者至于頭生小瘰癧甚大

便結滯脈浮數

防風通聖散

一三歲小兒二三日發熱微咳于時吐乳小便瀉于時發驚虎口紋見弓反深紅風症歎痘疹歎疑似

升菖葛

一三歲之兒發熱吐瀉于時驚搐及四日未解今朝面見粟點一二赤有光小便清利

七味

貴芍 升菖 葛 苓 苓 甘

一四歲之女子腹痛便結及二日不正

四味

升菖 升菖 升菖 升菖

一六人小兒大小瘡出妙也

一 小兒四五歲昨晡時至于今發熱不退煩渴頭痛手足怠惰腰痛不能轉側目赤時胞瘡流行疑似脈緊數

升菖葛根

用一貼畢行前症咸退手足冷呵欠心不了不食瀉一二行于時吐清水脈同

觀音散

用一貼畢前症咸退至昏過見痘苗二三点脈數減浮弦止服藥兩日食不進于時微嘔腹脹

異功散

一 小兒四五歲吐瀉及于四夕月不

受酒本必方下

正他疾用數方漸愈。然因飲食或吐瀉一日七八行或四行。肢脹手足冷。腹堅如積塊。面色萎黃。神志懶不樂。于時微渴。食于時進。于時退。脈無。雖垂死。用一貼。畢。偶然得大驗來。

益黃散

一五六歲之兒發痘。及于八日吐瀉。黑血痘。色紫。渾身大變危症。俟死期。

黃連解毒一

外科

一卅餘歲之丈夫常患癰。此比渾身

生癰。腫痛甚。用藥四貼。瘡癰悉愈。

復元通聖散 見于脇痛

一四十餘歲之男子落馬。腰痛。肩背甚疼痛。難轉側。大便秘結。及十餘日未平。愈用藥二貼。大便通。一身痛悉愈。

復元通氣散

一四十餘歲之男子夏公。氣滯寒。渾身生癰。七八十大如豆。如疔。核腫痛甚。脈弦。

復元通氣散

一壯歲之男子五六年前。患楊梅瘡。愈後。及于今。頭痛。鼻閉。寒黃。汗如膠。固咽。喉痛。脈弦。

活命飲

一十七八歲之男，夏君素氣鬱滯，耳聾，乃者渾身癩生，大小八十疼痛，難轉側，脈沉實。

復元通氣

一五十餘歲之男，體瘦素嗜酒，十年以前墮高外，左右肩時痛，他醫治而愈，其後患頭痛，于今不退，去去年以來，腰已上痛，夜甚，常有積塊，二便秘結，常有血痔，脈沉而有力，四動。

艱血當飯地黃湯

見于破傷風

一廿七八歲男子，體瘦色白，從四五等以前時，腰痛去，去冬腰痛。

李陰囊腫痛，至二月大如升，他醫治膿出，然絕不潰，連皮厚堅，結至于今，不減，時有痛，于時惡寒，常手足清冷，食如常，大便結，或見血脈細，四動。

十六味流氣飲

一農夫，一兩日頭微痛，渾身緩弱，微渴，及于今夜卒，頭面腫起如大器，大便秘，小便數，脈如有如無，重手則覺緊。

清震湯

一壯歲之男子，常患瘡癩，當手癩甚，灸出渾身七八十癩，不小，大疼痛，難忍，大便閉，實小便頻，于時微熱。

頭微痛食如常脉浮大有力

防風通聖散

一廿餘歲下女十二三年以前喘息
渾身浮腫大小便澁頭瘡多有之
十九歲時風毒腫有之九年以來
思慮多上氣頭痛厥冷右偏從胸
堅物至于季肋季痛亦從胸至于
臍下季痛臍如港項似契常大便
結小便則陰中契月水不通素喘
發則喘促甚有痰六七日一發輕
發則三日瘥重發則二日愈脉寸
微浮尺伏

五香連翹湯

一十四五歲之女子手足發小瘡甚

痒一夕用契湯洗蕩甚快次日頭
面渾身浮腫眼不開脉沉實二便
順食如故

合敗毒散 赤小豆湯

一廿餘歲之女人渾身發小瘡漸頭
面壅滯頭微痛耳鳴眩暈項拘急
脉弦

消風散 見干頭

一四十餘歲之男子發背癰腫及干
十餘日疼痛甚腫色紅赤大便順
食物如常脉弦急

內托十宣散

一十七八歲男子去笈以來遍身生
小瘡痛痒不常于時增寒雖用諸

方無寸效此項後手足增瘡甚痒
膜上有膿如泡豆手足乾瘡小而
如癰脈緊數大便秘食無妨

升广和氣飲

一卅餘歲之婦人素盛實飲食進每
年患瘡大如杏如楊梅許如豆大
頭面肩背手足膜上生成五六个
或十五六个疼痛潰愈而又生追
于春夏秋冬不能止脈緩弦便秘

防風通聖散

一廿餘歲之男癰生腫物大如蓋手
坚硬甚疼痛七八日脈緊瀉

内托羌活湯 見干外科

一五十餘歲之男患腫物外科治之

以針刺去血過多及干數升腫物
半愈及千百餘日未全愈

補中益氣

一婦人灸遍身赤熱甚頭痛口苦煩
渴引飲

合升葛三黃

一婦人疹後溲泄煩渴
錢白加膏

二十七 異病

一廿四五之男自面自謂血流出而
以手摩面自或以水洗浴一日四
五十度与香楨散四貼而愈

一男四五ヶ年之間兩手之脈共代

與生脈散三貼愈

一四十許之男三年之間腹中有塊時胸膈攻上心悶眩暈如乘舟車狀或見山之大小或好聞處惡明處誠怪証也諸醫雖出數方曾無寸効矣於是用此方愈

四君子

加天廣貴桂田若泄瀉加宿有虫加查大便結加兵

一十一歲之女肩背俄如破狐而不物身皮如聚於肩背而不聚其病狀患者難述言語醫亦不能問登發明揚手覆面拳舌呼笑似眩不眩如絕而亦不絕暫明醒而如如一月發二三次諸醫為驚癩雖療無寸減臨食如常二使順心身

常脈五動

為附通氣湯

一五十餘歲之女素瘦身常有積此四五年以來發喘至夏減至冬亦發晝夜吐痰血飲食朝不進夕少進

主方 平胃散

一六十餘女素瘦身色黑十年以來在手掌心如馬皮厚而白如駝破次第皮去後赤如繪裹朱常痛愈亦經十月許如前發每歲六七歲本道外科湯治其外及妙林雖療乏終不得寸驗感寒則甚痛大小便順食進

穿何首烏散 乳香定痛散
常服續散

一婦兒令乳忽自其跡如水陸者出

升葛

一男子卒嘔吐甚百余見之因香砂
養胃湯用二貼無寸効及於其晚
狂言不避親疎或吃於飲水而與
乏則不亡然唯飲忘言于時予悟
云心神虛健胃之証也考一方飲
之安

茯苓湯 回健胃門見

一婦人夫在干他邦聞不快而卒狂
製一丸飲之

酸棗仁 茯苓 各五分

丸彈子大酒与一二九醉寢至干
自醒愈矣病深者三日或四日寢
愈病淺一日或二日愈

右此書者於干醫家雖極秘甚深
依前望難辭借与焉勿外見而已

正保二曆仲夏上浣日

於干武州江戶書寫之無三加
校合訖

承應元年八月日

烏藥順氣散

烏藥

陳皮

各一錢 乾姜 二分半

枳壳

姜蚕

川芎

白芷

桔梗

甘草

麻黄 一錢半

右入姜枣煎溫服

流氣飲子

紫蘇

烏藥

青皮

楮梗 各五分

陳皮

茯苓

當歸

芍藥

川芎

黃芪

枳實

半夏

防風

甘草

大腹子 一錢

木香 一分半

右入姜枣煎服

三生飲

南星 二錢

川烏

附子 各錢

木香 五分

右姜十片水煎服

萬室回春湯

甘草 麻黃 黃芩 防己 杏仁
生地 熟地 川芎 當歸 人參
防風 肉桂 乾姜 陳皮 黑附子
香附子 各一分 白芍 五分 黃芪 三分
沉香 烏藥 各半分 半夏 茯神 各一分
白朮 三川烏

右入藥煎服

補氣湯

白芍 陳皮 各一錢 黃芪 甘草 各一錢
沃瀉 五分

水煎服

四物龍膽湯

當歸 川芎 赤芍 生地 各一錢

防風 六分 草龍膽 防己 各四分

右水煎服

木香順氣散

木香 草豆 蒼朮 各三分 厚朴 四分
青皮 陳皮 益智仁 茯苓
生姜 半夏 吳萸 當歸 各五分
外麻 柴胡 各一分 沃瀉 五分
水煎服

分心氣飲

木通 官桂 赤芍 赤茯苓
半夏 甘草 羌活 桑白皮
大腹皮 青皮 各五分 紫蘇 二分
右入姜枣燈心煎服

七氣湯

半夏一錢 厚朴 桂心 各六分 白茯苓
白芍 各八分 紫蘇 橘皮 各四分 人參 二分
右入姜枣煎服

對金飲子

厚朴 蒼朮 甘草 陳皮
草蓰 各六分

右入姜枣煎服

大七氣湯

三稜 莪朮 青皮 陳皮 霍香
桔梗 官桂 益智仁 各一錢 甘草 七分半
香附子 一錢半

右姜枣煎服

四七湯

厚朴 一錢半 半夏 二錢半 茯苓 二錢

紫蘇一錢

右入姜枣煎服

流氣飲

紫蘇 烏藥 青皮 桔梗 各五分
陳皮 茯苓 當歸 芍藥
川芎 黃蘗 枳實 半夏
防風 甘草 各七分 大腹子 一錢
木香 二分半

右入姜枣煎服

消積湯

白朮 一錢 茯苓 陳皮 青皮
砂仁 麥芽 山楂 甘草 各三分
神曲 香附子 枳實 玄胡索
海粉 各五分

右入姜煎溫服

異功湯

白朮 茯苓各二錢 人參 橘皮各一錢半

右入姜煎服

木香流氣湯

木香 藿香 草菓 檳榔

丁香 大腹皮 蓬朮 肉桂各六分

紫蘇 甘草 厚朴 青皮 陳皮

香附各一錢 赤茯苓 人參 白朮

木瓜 苜蒲 白芷 麥門冬各四分

木通八分 半夏二分

右入姜煎服

分氣補心湯

大腹皮炒 香附子炒 茯苓 桔梗各

木通 甘草炙 川芎 前胡 青皮

枳殼 白朮各七分半 細辛 木香各五分

右入姜煎用

天調中湯 即小調中湯加

人參 白朮 茯苓 川芎

當歸 生地 白芍

蘇子降氣湯

當歸 甘草炙 煎胡 厚朴姜製

肉桂 陳皮去白各七分半 半夏 紫蘇子別研各錢

右作一服加生姜三片大棗一枚

煎溫服

弓歸鯨魚甲湯

鯨魚甲一錢 川芎 當歸 茯苓 芍藥

半夏 陳皮 青皮各五分

右烏梅一箇姜枣煎服

栝蘇散

蘇梗 香附子各二錢 甘草 陳皮

栝柳 木瓜各錢

右入姜枣葱煎服

藜蘆分清飲

藜蘆 石菖蒲 茯苓 甘草

烏藥 益智

右各等分入鹽一捻煎服

木香化滯散

半夏一錢 柴胡 蒼朮各四分

草豆蔻五分 木香 陳皮各三分 歸尾

枳實二分 紅花 甘草各半分

右入姜煎服

參苓白朮散

人參 白朮炒 茯苓 山藥炒

甘草各二錢 白扁豆 蓮肉

薏苡仁 砂仁 桔梗各一錢

地黄湯

生地 芍藥 白朮 黃柏各一錢

地榆五分

右水煎溫服

胃風湯

人參 當歸 川芎 茯苓 白朮

芍藥 肉桂各七分 粟米百粒

右水煎溫服

小薊飲子

小薊 生地 蒲黃 滑石 通草

藕節 甘草 當歸 淡竹葉
山梔 各五分

右水煎溫服

烏附通氣湯

白朮 七分 茯苓 沢瀉 各五分 猪苓
甘草 木香 各三分 烏藥 香附子
當歸 芍藥 山查 橘皮 各一錢
右水煎溫服

安胎飲湯

當歸 芍藥 生地 白朮 各一錢
人參 川芎 陳皮 各五分 紫蘇
砂仁 子芩 甘草 各三分
右入姜煎服

茯苓湯

即四物湯合參蘇飲茯苓

湯

右入姜煎服

逍遙散

白芍藥 白朮 白茯苓 柴胡
當歸 各六分 甘草 減半 薄荷 少許煨
右入姜煎服

加味逍遙散

白朮 白芍 各一錢 白茯苓 麥門冬
生地 各六分 甘草 桔梗 各二分 地骨皮
當歸 各八分 山梔仁 黃柏 各六分

右水煎溫服

玄胡索散

玄胡索 莪朮 當歸 三稜 各一分

紫蘇飲

蘇葉 芍藥 川芎 大腹皮
當歸 陳皮各五分 人參 甘草各三分
右入姜葱煎服

伏龍湯

伏龍肝六分 艾葉 川芎各二錢二分
赤石脂 麥門冬各四分 乾姜
當歸各三分 肉桂 甘草 熟地各二分
右入東溫服

如聖散

白芷 川芎 防風 細辛各五錢
雄黃二錢半 蒼朮二兩 草烏四錢
兩頭尖四錢 右為末茶清或酒少許調下

催生五積散

蒼朮一錢 桔梗五分 陳皮二分 白芷
桂心 甘草 川芎各五分 當歸
乾姜 厚朴 白芍 茯苓 半夏
枳殼 川烏 附子 南星各二分
木香半分 阿膠 杏仁各一分
右為末溫酒調下

九味羌活湯

羌活三錢 防風二錢半 蒼朮一錢 川芎一錢半
細辛三分 白芷 生地 黃芩各二錢
甘草三分
右入生姜三片葱白三根水煎熟服

牛膝湯

滑石八分 木通六分 葵子 牛膝
瞿麥各四分 當歸三分 右水煎服

設諸家經方卷之五 牛膝湯

八味逍遙散

當歸 芍藥 茯苓 白朮 柴胡
甘草各二錢 牡丹 山梔各七分

右水煎服

香蘇散

香附子二兩 陳皮一兩 甘草半兩

右入姜葱水煎服

三分散

合小柴胡湯四物湯四君

子湯

烏附通氣散

白朮七分 茯苓 沢瀉各五分 猪苓

甘草 木香各三分 烏藥 香附子

當歸 芍藥 山查 橘皮各二錢

水煎溫服

桃仁承氣湯

大黃四錢 桃仁三錢 桂枝 芒硝各三錢

甘草一錢

水煎溫服

復元通氣散

陳皮 白朮 甘草 玄胡索各一錢

茴香 穿山甲 木香 當歸各二錢

乳香 沒藥各五分

大玄胡索散

玄胡索 莪朮 當歸 三稜

赤芍藥 川練肉 官桂 厚朴

木香 川芎各一分半 桔梗 黃芩

大黃各五分 甘草一錢 枳殼二分

右水煎溫服

三五七散

附子 細辛 各三兩 山茱萸 炮

乾姜 各五兩 防風 茯苓 各七兩

右為末每服二錢酒調下

竭稍湯

蜈蚣 一條 竭稍乳香 白花地硃

砂 南星 姜蚕 各五錢 麝香 三錢

右為末酒糊作餅人參或薄荷

煎湯磨化下餅

觀音散

人參 一錢 蓮肉 神曲 各三分

茯苓 一分半 白朮 黃芪 木香

白扁豆 甘草 各一分

右入姜之前服

益黃散

陳皮 一錢 青皮 甘草 訶子 各二分 丁香 二分

水煎服

銀白散

升麻 知母 山藥 白扁豆

人參 白朮 茯苓 甘草 各一分

右為末每錢沸湯調服

錢氏白朮散

人參 白朮 茯苓 甘草 木香

藿香 乾葛 各一分

右水煎服

惺々散

人參 白朮 茯苓 甘草 白芍
桔梗 瓜蒌根 川芎 各五分 細辛 一分
薄荷 半分

右入姜煎服

加減惺々散

蒼朮 荆芥 防風 川芎 白芷
細辛 羌活 甘草 當歸 赤芍
天花粉 薄荷 桔梗 各水分
右水煎服

益黃散

陳皮 一錢 青皮 一錢 葶藶 一錢 丁香 二分
右水煎

復元通聖散

穿山甲 瓜蒌根 各四錢 青皮
陳皮 各二錢 甘草 三錢
右為搗酒調服

活命飲

甘草節 赤芍 白芷 天花粉
貝母 乳香 各一錢 防風 七分 歸尾
皂角刺 陳皮 各一錢 金銀花 三錢
沒藥 五分 大黃 五錢 穿山甲 三片

右用好酒瓦罐煎蜜封罐口勿
令泄氣前熟隨瘡上下飲之服
後再飲酒二三盃側臥而睡忌
醋物鐵器

養血當歸地黃湯

當歸 川芎 生地 芍藥 藜蘆

防風 白芷 各一錢 細辛 火許
右水煎服

十六味流氣飲

當歸 川芎 芍藥 白芷 肉桂
人參 黃芪 木香 烏藥 厚朴
枳殼 枳櫛 紫蘇 防風 桔梗
甘草

右煎服

清震湯

升麻 蒼朮 各西 蓮葉 一荷

右每服五錢水煎食後徐溫服

五香連翹湯

連翹 漏竹根 大黃 桑寄生

獨活 木通 升麻 丁香 各七錢 沉香

青木香 各三錢半 生甘草 乳香 麝香 各

右水煎服

敗毒散

羌活 獨活 柴胡 前胡 枳殼
川芎 桔梗 茯苓 人參 各五分
甘草

右入姜煎服

赤小豆湯

赤豆 炒當歸 商陸 沢瀉 連翹
赤芍 防己 猪苓 桑白皮 各五分

右入姜煎食遠服

丙托十宣散

人參 黃芪 當歸 厚朴 桔梗

肉桂 川芎 防風 白芷 甘草各分

升麻 蒼朮 桔梗 各錢 半夏

當歸 茯苓 白芷 各二分 陳皮

甘草 各一錢 乾姜 枳殼 各半分 芍藥 七分

葛 二錢 大黃 五分

右生姜五片燈心十五根煎服

內托羌活湯

羌活 黃柏 各二錢 黃芪 一錢 防風

藜蘆 歸尾 各一錢 連翹 甘草

倉朮 陳皮 各五分 肉桂 三分

右水二盞酒一盞煎至一盞熱服

三黃湯

黃芩 黃連 黃柏

平胃散

蒼朮 二錢 陳皮 二錢 厚朴 一錢 甘草 八分

右入姜棗煎服

何首散

何首烏 荆芥 防風 蔓荊子

葳靈仙 蚶蚶草 甘草 各兩

當歸湯 歸尾 一錢半 紅花 八分 桃仁 七分

甘草 五分 赤芍 烏藥 香附子

蘇木 各一錢 官桂 六分

茯苓湯

赤苓 桑白皮 各二兩 防風 肉桂

川芎 芍藥 麻黃 一兩

右入姜煎服

醫家極秘方

于時寬文四年甲辰九月日
開板之

月下部喜尤衛門



醫家極秘方

目錄

第一

第二

第三

寒

熱

火

痛

瘧

瘧

沉

痛

瘧

瘧

瘧

瘧

