

日用功方巻之三目録

一 泄瀉（セッシャ）
胃苓湯
錢氏白朮散

二 霍亂
藿香正氣散
生津補血湯

三 翻胃（ホンイ）
嘔飯養血湯
順氣和中湯
嘉禾散

四 諸氣（シヨキ）
分心氣飲
正氣天香湯
分氣補心湯
三和散
三八味
加味四七湯

五 鼓脹 廣茂潰堅湯
六 積聚 大七氣湯 紅圓子 人參散
七 補益 補中益氣湯 四君子湯 四物湯

泄瀉 一

○胃苓湯 方後云治脾胃不和腹脹泄瀉水谷不化陰陽不分

朴 蒼朮 陳 沢 木 各一錢 桂二分 甘少

此方ハ泄瀉之方也傷食泄瀉ニ猶吉平胃散内ニ有リ故ニ食ヲ能進又食停ツテイハ猶吉ノ瀉藥ヲ加テモ吉

一此方ハ四五月之比ヨリ八九月三暑ノ濕熱ニ感ジタル泄瀉ニ專ラ用ル方也

一此方ハ平胃散ト五苓散ト合シタル方ノ平胃散ハ食滞ヲ消シ五苓散ハ暑ノ湿熱ヲ小便ヨリ滲ス也

一食々リテ腹下リ或ハ咽乾ク六ツ必ス復此方吉ソ

一復之痛風ニ用是暑湿ニ依テ身節カヽ痛故ソ

一此方之証ニ七味白朮散ト此方トノ差有ト思此方ニ解毒湯ヲ合テ用ユト二貼ニテ平安ス

脊有リ実証ニテ腹下リ咽乾ハ必ス此方ノ脾胃虚シテ瀉咽渇クハ白朮散也

一或人復臍下ノ身冷不欲衣是按スルニ内ニ伏熱有ルニ因テ熱因テ用ヘノ手引也

一此方之内復ハ桂ヲ去トアレトモ少ナル故其ノ位用テ吉又其ノ上至真要大命ニ寒ノ因寒ニ用ヒ熱因テ熱用之心ハ陰陽之薬ニ吉又桂ハ大腸後能開ハ咽乾小便赤澁ル也ト云猶以事也

一復之痢病ニ初先ニ三度サッくト下リテ後泄ル物也其時モ此方佳也暑湿ナル故ノ方中ニ芍ヲ加タル澁リモ止ルソ

一水腫ニモ加減シテ用ル事有感湿ヲ九ハ猶以之事ノ則此方ニ去芍桂胎麹查香附瓜蒌ヲ加タル

者ノ回春ニ委シキ手也

一惣別瀉ト痢ト一ツニ心得テ言前ハ泄瀉門痢門一ツニシテ有ル同方也今ニツニ別故ニ結句惑也能ク心得

一予治ス一人ハ歳之男子ノ百日許ヨリ腫ス小方脈療ヲ不効予ニ治ヲ未ム脈沉細小便少ク大便或ハ溏或ハ泄ス身重クシテ如水中ニ坐食無味先用藿香正気散大半ヲ与後此方二十余貼ニシテ先飯後旧散其後治数人無不験也

一此方中之桂ヲ去テ連ヲ加ルヲ有

○錢伽錢氏白木散　消渇三吉

参　木　苓　藿　木　葛

半各等分

若小兒頻々瀉痢將成慢驚黄連肉豆各一分一片ヲ加フ

一若慢驚已作細末各一竭三ケ白附ヲ加フ

一若冬月小兒吐蚘多ク是胃虚寒ヲ以テ三粒ヲ加フ也

霍乱

○大肚藿香正氣散　治四時不正之氣寒疫時氣山嵐瘴氣雨濕蒸氣或中寒吐利中暑冒風吐瀉中濕身重ク泄瀉ニシテ或ハ不服水土ニ照胃不和飲食傷滯或外感ニ寒頭痛憎寒或ハ嘔逆惡心胸膈否悶或

發熱無汗者並治之ノ
薤　蘇　腹　皆各五分　桔
朴　水　陳　半夏一升　生姜
棗
全云十棗ヨリ發熱ノ證ニ四時ニ
用ユ方ノ即復用ハ脾胃ヲ調方
ノ此方ハ內外ヲ兼テ名譽之方
也雖前殿ヨリ一溪ヘ方病圓ト
被仰時即チ此方ヲ書付テ進メ
ラルヽ也
一王叔和傷寒門ニハ此方ヲ仲景カ打
ク乱ト雖モ氣ヲ正ク乱方也然ニ發散
ト計心得ハ非也トソ生去按ニ內
外トモニ能方也況ヤ此方ハ宋朝

之時分之方也又タ打ク乱ト雖モ十三七ツ八ハ再傷ニモ能
ク前心得十ガ十共ニ發散ト計
心得ハ不合也
一此方ハ二陳ヨリ出咳嗽ヲ治ス
一霍乱ニ專ラ吉或ハ廣痛吐瀉頭痛
發散之方也　此方ハ傷寒陰症
ガ、リタニ可也　陰症ヲ仲景ハ大
陰中寒ト云ヘ云今云陰症ハ元氣之虛
ニテ体草卧如何ニモ靜ニシテウツ
カリトシ眼ニ精無沉ニ物カナシキ体
也眼ニ光無陽症ハ如何ニモサワ
ガシク手足タヽラガズ無正ニ成ヲ云
一本之陰症ト見スヘタラハ八解散吉

扨又重キハ四君子湯ニ熟附ヲ加テ用ユ
ソロリト加テ切々ニ験ヲ得タリ順氣
故ニ汗出ル也今ノ用ウル寒因寒用
之心得也本之陰ノ目付ハ眼精
ナキヲ見ル事肝要也

一凡四五男傷寒陰症ニテ他醫手
ヲ束ヌ予見ルニ其脉如何ニモ靜ニ
取レムレハ七動計有リ也按ニ是胃
氣未絶ト思ヒ四君ニ熟附ヲ沢
山ニ加用ヒタレハ殊外汗出後次ノ
第ニ治リ加様ノ事ハ他医之不
知事也胃脉ハ緩和也心ハタヽ
イ動數有トモサワカシクナキヲ陰
症ト云可シ秘脉ニ有リ動数ニモ靜

ナル故ニ陰症見ル也

一傷寒感胃之少重ニ吉

一濕痺証之瀉ハ腹不痛ト有此方
腹痛之吐瀉ニ必ス吉又腹痛ム
ニ不痛ト此方吉ソロリ

一內傷生冷外傷風寒濕之爲ニ腹
痛吐瀉スルニヨキ方也不食スルニモ
佳也

一類中風之中氣ト云ニ吉症ハ俄ニタ
フレ氣ヲ取失類ハ八味順氣之類
ヲ用テ切々ニ得効也

一中風痰涎有テ入味順氣使フ処ニ
此方能事切々有

一不正之気ニ感而眉ヨリ至頬如

折痛ニ悪寒或ハ眩暈シテ悪症ニ成ニ用ユ

一感不正之気頭痛甚シク発熱咽乾スルニ吉

一婦人春應暖時雪降寒烈甚シクテ水凍ス時遠ク行テ而傷寒頭痛悪寒発熱腰疼是不歩行脈沉細一医用生料五積散其後咽乾腰膝ニ腫氣出ル予ヲ召用此方十五貼而平安ス咽渇ニ同方ニ葛ヲ加咽濇止ム

一食傷ニ吉也右之気口脈緊ナルニ殊ニ以テ吉也

一蔓霍乱腹上云ニ吉腹痛腹脹ニ雀也

一八解散毛六君子ニ朴藿加タルモノ此ニ似タリ此方ヨリ氣ヲ補事重シ此方之症ニ草卧少重クアリ汗之陰症之傷寒ニ吉此方陰症之如クニテ靜カニシテダイニ草卧タヲ治スルニ也

一中風傷寒疑似之時ハ八解散用ルニ事有

一脈二十日計失テアバラニ成タルニハ八解散用テ脈出テ平愈ス

一陰症之傷寒ニ益氣湯モ佳也四春ニ有

一陰症体草卧脈微細妄証ニ小

柴胡湯ナト三テ熱サリカヌル二四君
二附ヲ加ヘ用汗出テ不出トモ佳也
此証ニハ人解散テモ吉延壽院
ヨリハ人解散相傳也四君ニ附
ヲ加予初テ療スル也十蘇ニ附
子加ヘ用事毛余初メテ療スル
也

一咳嗽ナトニ香蘇參蘇ナト用不効
此方用テ吉

一或人傷寒陰症之如ニテ熱不甚
頭痛吐逆心中煩悶腹筋牽引
脈数ニシテ中湯ニ加柴半ノ
不平愈同証也故ニ用此方ニ加テ
香附甘草青皮驗有テ次第ニ

安ン

一霍乱轉筋ニハ木瓜ヲ加フ
一此方ハ大陰吐ニハ不用
ニ口鼻ヨリ風入タルニ吉多ハ陽痛
ハ大陰ニアタル故也必ス此方吉
医亜不知也又胃フクルモノ
一旅行經テ水替リテ煩腹痛腹
下ニ此方或ハ不損金佳也
一或ハ瘧ノ後気不快寒熱或ハ感冒
之後養生薬ヲ云時ニ此方佳也
氣弱ク人參養胃湯
一香蘇散敗毒散大肚香葛湯皆
薬毒ヲ解スル方也誤テ他医附
子ナトヲ用テタヽリテ体草附ニ右

之方皆表ヲ解シテ吉事有
一心痛腹痛氣痛二種々出積之療
治ノモ不驗ニ此方又不換金正氣
散十十三ヲ表解ノ吉事切々有
一酒飲テ傷風熱氣出テ或吐逆スルニ
ヨシ
一中風昏迷ニ吉
一又何之病ニテモ腫氣脹滿ニ小便澁
ハ猪沢ヲ加テ用又或ハ氣脅ノ
胸腹塞リ眩暈ニモ吉
一瘧初發ニ先熱ヲ去ント思フ時此方
ヨシ散飛湯之症ニ用也
一或人云食傷之心多ニハ不換金正
氣散食傷之心少ナキニハ藿香正
氣散用ヤウニタモノ又云不換金
正氣散藿香正氣散常ニ服シテ
除山嵐瘴云云
一私云此方七味清脾湯合ノ腫氣
虫熱氣アルニ佳也又云産後風
症カ、リタル腫氣ニ吉
一感温氣タル水腫ニ不放用予用テ
之取効不可勝計
一三十余婦人産後一膊微熱不
食四肢浮腫此方用テ治スル有多
一酒ヲ呑醉テ風ニ傷ラレ熱氣出或
吐逆ニ吉
二月三日ニ四十余男昨日過酒
感胃頭痛汗出痰出心中痛

ニテ脈浮緊ナレニ此方用テ安シ
一諸病ニ此方用ント思フ時外感重
ク加蒼耳去木
内傷重ク宿曲ヲ加フ私按ニ回
春ニ中暑門云中熱之時納涼ヲ
於深堂大廈涼亭冷館太扇風
車風寒ニ以傷其外或ハ生冷瓜
菓氷水寒涼ヲ食シテ復内ヲ傷
其病頭痛ミ身疼熱惡寒或
ハ惡心呕吐泄瀉腹痛此内傷生
冷外感風寒所致也宜藿香
正氣散治之此非治暑因暑所
致之病也外感重ク加蒼耳
内傷重ク加宿曲云云

二方考ニ曰内傷者調其中ヲ藿
木苓陳甘半朴桔腹皆
調中藥也調中則能正氣干
内外感者疏其表ヲ蘇荊防則能正氣干外
表藥也疏表ヲ則能正氣干外
矣若使表無風寒ニ物亦能發
起脾氣故曰正氣

翻胃三

○生津　生津補血湯　治年少胃脘血
燥故紙　各一錢　熟地　苓々　各一錢
飯　甑　生地　蕪子　貝　各七分
實　陳　連　砂　沉　各五分　姜　棗二
陰虛火動ニテ胃痛ニ吉

一年少之人膈前之証大便結胸痛ムルニ
一膈ハ陰虚血虚ヨリ生ス火動ニ吉
一膈ハ血乾テナルソ故ニ大便結
一少年之人之方トアレトモ必ハ難云ヘカラス
能ク見合テ老人ニモ可用
一此方當皈養血湯ヨリ熟強クサニシテ思時用也生地ナト有故ソ
一少年ニテ有ト老年心ト云事有
一滋陰降火之茶味大方有故ニ
滋陰降火湯之症ニ痰ヲ能クツロクル又滋陰降火湯之症ニ胃ト
イタミアリテ咳嗽甚シク又ハ不食ナトスルニ滋陰降火湯用不治此
方吉故ハ順気之薬方中ニ多キ故ソ又滋陰降火湯之症モ大便結スル也此方佳也實
ナト胃ワ之痰消下レ栽道ヲメクラス茶ナレハ也茶味ヲ能可見分ン實貝有痰嗽有ニハ滋陰降
火湯ハニテレ此方ニテ結句能去ル痰ヲトソ

一此方之症ニ食傷故不食嘔吐吐血ナトスル事有ハ此方ニ加蒼朴麹ヲ或ハ食傷魚肉ナラハ加査
若一吉又香砂平胃散又ハ不換金正気散之類吉
一或ル婦人不食レ吐嘔水飲不入虚熱ノ指引有交會之時血出ス

予問証如上云フ又吐血ス先此
方ヲ用ヒ後正気天香湯用フ吐
止テ後人参養胃湯ニテ諸症平
愈ス

一或老僧不食湯茶ウニク食ノ不入
咽先香蒼湯類順気和中湯用ヒ
大形愈熟未去最尼當皈養血
湯之症ナレトモ熟甚故此方用
テ全ク愈此心ニテ可合点者也

一俄ニ吐逆レ薬ヲモ不受吐逆スルニ
漸尾ヤ一味煎薬ノ如ニシテ全
ツカハルソ是ニ多分食ヲカヘサ
メソ

一想別腸ハ大便燥結スルモノ故ハ
胃脘之血燥故真陰虚レ潤ナキ
ニ依ラ也

一此方雖年少人血燥故ノ腸用決
定スヘカラス能ク医切脉証此方脈
アラハレハ又病悩ニモ見タラハ雖経
千万歳人可用況ヤ百歳之前
後ヲヤ

○介養 當皈飛龍血湯 年老之人陰血
枯槁レ疼火気結升而不降飲食
不下者乃成膈噎之病也

皈 炒 熟地 苓各一錢 貝 菜女
實 陳 香附 朴 苄 蕪子
各七分 沉五分 連八分 姜棗 澤瀉

一血虚ヨリレテ疼火上リ飲食不下

成ル膈之症ヲ治ス是モ膈之痛血
乾キカユキナトニヨシレ
一気ヲクツロケ痰ヲ消スル薬味ノ能ク
見テ可ニ合点一痰薬多ソ知栢ヲ
加ユ用ル事有
一老人能食シ瘦皮膚カワキ大便
結スルニ吉
一老人常ニ痰ツカヘ大便カワキ二三日モ
不行上云人ニ吉レ猶ヲ加減ノモ吉回
春ニハ年老之人陰血枯槁スル用
トアレトモ不可拘老少ニ陰血乾枯ス
人ナラハ可用故ハ方中ニ四物湯滋ニ
養ス眞陰一芩下ス痰火貝蒌醒
血热一サレドモ下ス痰ヲ實陳胃之上

下ロノ痰ヲ消散シ進ニ食一朴ハ抑ル
逆上之氣ヲ香附ハ一切宵中ニ有ル
裡之物一ハ一ハ穌子ハ神脾ヲ并痰
ヲ消ス連ハ病因之火ヲ押ヘ沉
引ニ諸薬ヲ上ノ至ニ項下ハ至ニ足心一薬
一非ニ膈能食ノ瘦皮膚燥キ大便結
スルニ吉レ猶ヲ隨ニ症加減セヨ
○順和 順気和中湯 治ス呕吐翻胃嘈雜
吞酸痞悶噫気喧膈心腹刺痛ミ
惡心吐痰水ヲ
陳塩水浸香附醋ニ浸ス炮各一 苓一半各七分
土炒ル木炒ル八分連姜汁和猪胆汁拌炒 實各五分 砂
三分 茸少姜瀝童便酒毒故之
膈ニ用又除ニ胃中濕熱ヲ脾胃和レ

食ヲ消シ胸痛テ吐益胃イキ上気シ食積ナトノ類ニ吉

一復ナトハ猶以テ用吉 扈連ナト有故ソ

一或人常ニ過酒入月比ヨリ咳逆シ明ル三四月之比ニテ不止胸痛ミ痰ツカヘ不食シ酒ヲトシテノ寒ノ切ヘヲク ヒ出ル色々療治シテモ不治後ハ水売共ニ不通予見之酒毒ト思ヒ此方ヲ用テ二貼ニシテ大験有リヒタモノ用タハ少後ニ尊卧タルニ因テ實ヲ去参ヲ加全ク愈タリ即チ六君子湯ニ加減シタ方也此義異ノ本ニ委ク有リ

一兎角胸痛上云モノハ此方ノ吉香砂類胃湯ニ似タ方也

一吐血之後ニ必ス胸ヘツキ上ルモノ滋陰降火湯トアレトモ滋陰降火湯ニテハ治シ難シ此方吉トソ

一甲竟脾胃ツカレテ胸中ニ湿熱生ノ気鬱痰食積成湿熱有故ニヲサメスノ嘔吐スルノ此等之症ニ吉

一食傷積中脱湿熱生胸イキレテ嘔吐ナトスルニ此方用ヒ可也又香砂平胃散又香砂養胃湯ナト吉ソ

一盗汗之症ニ吉又ハ陰虚煩熱吉滋陰降火湯補中益氣湯二方合ソ用度ト思フ時其ノ侭此方吉ソ右補中益気湯滋陰降火湯タスケノ方ソ又

勞嗽シ滋陰降火湯ノ証如クナレ
ニ
此方吉
一十全大補湯ニ似タ方ノ自汗盜汗
有テ氣不順而逆上シ血虛シタル
好方ノ
一此方陳苓實ハ順行痰水ヲ又香
附ハ呑酸呕吐氣鬱上氣噫氣ス
ル要薬又胃中之敦阜ヲ平和シ
濕熱ヲ降ス薬ノ危ハニ焦之濕
熱ヲ醒砂ハ進食醒脾胃扶右
此薬味合テ和ニノ氣痰逆上
治也
前云コトキ症ヲ
一惠膈噎脾胃不和膈噎痞悶スルヲ治ス

○禾 嘉禾散 治脾胃不和膈噎痞悶氣逆ノ生痰飲食不進
參苓 宿 白蒺藜 枇杷葉 沉香 五味 檳榔 各一分
丁香 木香 各一匁 青橘皮 神麯 各二匁 木七分 半夏 腹子 陳皮 半
姜 棗

脾ヲ調ル事第一也脾胃不和胸ツカヘ不食呕吐又食ノ胸ニ滞ル等之症ニ用
一半井家ニ膈ニ專ラ用ノ枇杷大腹ヲ去用ノ此快氣散 順氣散ト號ヲ打ノ局方カリニハ參苓ヲ五
膈寬中散ヲ用

一此方ヲ反胃又病後何モ脾胃弱キ
ニ用也
一水腫或ハ腹泄下スルモ用併余リ沢
山ニ雑用方也
一此方参苓白朮散如脾胃之虚
冷シタニ用也又腎ニ虚冷ト云リイ
カヽト丹溪ヤ中古之衆云レタレドモイ
タツテハ虚冷スル事有ノ理ハ聞ヘタ
レトモ今世ヲ見ニ有事泄瀉痢病
赤白濁ニ赤白ヲ寒熱ニ分タヲ打タ
ケレトモ後ニ腎ヲ温補セヂハナラヌ事
有ソ
一水腫脹満面赤ノ下ヘサカリテアルニ
此方ヲ之

一恵剤方臚噎脾胃不和ノ痰気逆
上臚噎胸中痞悶ヲ治ストニン也

諸氣 四

○初分 分心気飲 治男子婦人諸気
不和多ク因憂愁思慮忽怒傷
レ神或ハ臨食憂戚レ或ハ事不遂
意ニ使抑鬱之気留滞シテ不散停
於膏臚之間不能流暢致心胸
痞悶脇肋脹噎塞不通呑酸
噫気呕噦悪心頭目昏眩四肢
倦怠面色変黄口苦舌乾飲食
減少シテ日ニ漸ク羸痩シ或ハ大腸
虚閉シ或ハ因病之後胷中痞不
思ニ飲食ヲ並ニ皆治之

半陳湯 青腹赤茯苓桂桑 各一銭半 羌活 蕪荑 各一銭 甘少
気之煩ニ第一吉 降散滞之剤
一逆気シ上気シ下焦冷ルニ吉
一五積之症ノ如ク腰モ冷ヘ酒ヲトノ悪寒スル五積用不治切ニ此方ニテ効ヲ得タリ
一里急気脅トサヘ見タラハ種ニ変ゼウトモ此方用也
一気脳ニ因テ病ニヨシ
一此内ニ逼羌蕪 有故ニ気ヲメクラメ痛風ノヤウナル ニ用テ切ニ得効事有
一怒気ニ脇ニヨッテノ腫気脹満ニ用テ

細ニ得効也
一或人労際ノ如ク盗汗頭痛五心ニ熱有テ夜不寐労ニトノ心ヨカラス不食咳嗽洒ニトノ寒ク暮毎ニ虚熱サシ脈沉弦数他医滋陰降火湯用レトモ不効何モ寄合テ談合スヲ予ガ日皆何モ色ニ療治ナサヒテモ同前ナラハヲ存生事有気脅ヲ自付テ此方用シトヲ存矣上云何モ吉ト申然ニ依テ此方用タリ思ニ気脅ノ表ヲ衛護セスニヨッテ也今此方表気ヲ順行スルニ依テ自汗盗汗止ハソ蕪多入トモ盗汗モ能止タリ
一滋陰降火湯ノ症具テ滋陰降火

用ヒテ不治切ニ有リ其時大抵此
方吉ソ
一蘇子降氣湯上氣ノ下冷スル ニ用ヒ方
ク氣病上サヘ見タラハ男婦不分此
方吉レ
一水腫脹滿ナル上ニモ氣脳ヲ合テ能發スル
ニハ用物ヲ忽ニテ分心氣飲之ヘ脉ハ右之
関上實スルモノ也
一此方風ニモ中ス寒ニモ傷レス又血ノ
氣錯乱スル如ナルニヨレ
一或人三十歳色白クメ大也依テ思ヲ
過火ヲ病ニツヲ漸ク爲ニ大病ト少レ
ナリモ腹立又ハ氣ヲ使ヘハ心下如ノ
膸物攻ノ上リ痛ニヌ又遊フ則ハ氣
快ニテ彼之攻ノ上ル者ナレハ便赤ク
渋リ疼出色ノ治スルニ不止予此
方ヲ用十四貼ニテ進ムル事六十貼ニ
一壯男体熱シ口乾キ胸支不食脉五
動右ノ寸関有リ此方用ヒ安全ス
右此証ニ此用事ハ脉ヲ升セスシテ
ハナルマイソ故ハ熱ノ有ニ桂有口ノ
乾ニ半有此常ノ病ニ換有テ口
乾セハ下ヘ手ハ使ハニイソ
一脉ハ寸口関脉沉實或ハ弦数ナラハ
此方用候ソ是胷ニ七情之氣滞
シテイル故也
○正天 正氣天香湯 治婦人一切ノ諸

気痛或ハ止渋心胃或ハ攻薬脇肋
ニ腹中結塊發滑刺痛三月水自
之不調或ハ眩暈呕吐往來寒熱
脘前産後一切気症ヲ上
烏一錢五分 香附六錢 陳 藁 姜各六分半
此方ハ婦人気鬱シテ發スル諸病ニ
ヨシ産ノ前後不分用テ吉
一悪阻ニ第一吉悪阻ト八食ヲ好ムコ
トナリ
一洒々トシテ寒ク發挽スルニモ吉
一産後ニ胸ツカヘ悪寒ノ發熱スルニモ吉
一血虚之悪阻ニハ柴苓補心湯産ノ
前後トモニ用ル方ソ
一心腹ニ積塊有テ薬気胸ニツカユル
時此方ヲ用テ吉
一俗医産ノ前後ニハ四物湯之類計
用ル事ヲ知正気ナトノ気薬ヲ用ルコ
トヲ知ラズ眩暈ナトニ有ヲ猶以血虚
チヤトテ血ヲ益ス薬計用テ気ヲ順ス
コトヲ不知イカニ補血之剤ヲ用テモ
気壅メ吉道理ハナキソ又血ヲ益ス
薬用タトテ俄ニ血多ク成事不可有
可ニ工夫ス
一二十余之婦姙娠臨月悪寒發熱
如瘧ノ一日二三四發ス左脈弦数
右脈浮滑数予與ニ此湯ヲ三貼ニ
愈ス
一婦人一切之気病ヲ治ス産前後

不以分用ルソ

一臍ノ下ニ用ル塊ツワリニ吉方ソ

一此ノ香薷散変方也故ニ酒漸寒熱有ニ用

一是モ分心気飲之症ノ如久成ニ用也

一滋陰降火湯ノ症ニテ滋陰降火湯用テ不治此方カ香薷散カ吉也

一胸痛ムニテモ鬼角気腎第一ト見タラハ此方ヨシ男婦ヲ不ス分用ルソ秘傳ニ云フ処ノ婦人之字ニ拘ルヘカラス

一婦人之病綿延トシテ先ヘ不行正方用テ切ヘシルシアルモノナリ

一胸サワキテ眩暈シ沉香天ノ湯之症ノ如ナル用テ切ヘ得効アリ有

一婦人頭サワクトテ血ノ道気上云ニ用テ切ヘ得ル効也

一此方ニ桂ヲ加テ五積散ヲ用ル症ニ似タニ用ル五積ヲ下ヘヤリタキハ膝ヲ加用モノソ

一一人怔忡甚ノ眩暈ヒテ沉香天ノ湯証ノ如シ予先ツ与ニ此方ヲハヤト思ヒ用タレハ平安シタソ

一又一人心腹俄ニ痛ミ身冷シテ不知入脉沉伏ス二三方用ヒ甦テ又起此方ニ入姜用ルトト十余貼ノ大ニルシアリ以上五十貼ヒテ不再發

一六十余之婦人ニ七年患衄血赤白帯下ニ今ヤ三年以来衄血赤白帯下止左ノ脇小腹ヨリ上脘ノ左リノ辺ニテ筋強リ發ル時ハ腹大ニ痛ム故ニ塩炒テ腹ヲ濕ムレハ少ク痛ミ止ム或ハ聞高声ニ或ハ行動スレハ胸燥食胸ニ支頭鳴足心捜ヒ脈寸有力関又沉細此方用ユト此貼ノ安全ス

一啓迪曰産後吐逆最モ此方妙也悪聞薬気者ハ蕪烏炒用之秘事慎之ヲ云

○分補　分気補心湯　治心気脾結發

爲四肢浮腫

腹　香附　苓　各一錢　通　芎　各七分　朮　細　木　各五分

前只青木香少

一腫氣脹滿之主方也鑑ニ気脾腫脹ニトアレ共其方ニカギラス諸薬用ヲヨキヨキ

一湿気之腫気ニハ此方用テヨシ

一湿気之腫気ニハ補中治湿湯佳然ヒモ腫気ニ補中治湿湯用不治ノ却テ此方吉事切々有リ此方ニテ治ス

事ハ湿ハ滞気モノノ今湿ハ滞気ニモ気滞ヌ必ゼリ

一補中益気湯モ腫気ニ用事有

一三十余歳之男子気積頃一身浮腫腹堅咳逆出テ脈細濇也此方加桑ハ十貼ニノ安全ス

一二十歳婦人気鬱ノ面浮腫大便
泻シ哺時ニ煩熱ス此方ニ加柴
用ル事五十餘貼而平安ス
一四十余男久ク患咳嗽項口感胃
ノ面目浮腫シ四肢モ亦浮腫ス
泻スル事久ク尿少シテ予用此方ニ
十貼ニシテ安
一三十八歳之男久ク瘧ヲ
用軽粉ノ后便泻数十日不止然
後ニ身腫満ニ便渋滞ス柿中
治湿湯用同前扨此方ヲ与ヘ
速得効弥養生ニ此方ニ参朮
ヲ加ヘ用ル事二十余貼ニ安シ也
○和腹 三和散 治七情ノ気結五蔵

脾胃不和心腹急大小便秘渋
食飲凝リ不渇者乃気秘耳未可
旋以硝大黄秘甚ハ再ヒ加只蘿
蔔子皂角子気滞腰疼倍風浮
腫ニ加車前子葶藶子小便閉
ハ加門沢入門又治背脇偏枯
食及ヒ脚気攻胃腹満悶大便不
通
芎三分 羌活 藁本各九分 茸少一方ニ
陳 茯苓 木瓜各一
加姜宿灯心一ノ
一腹筋ハリコハルヲヨク和ス故和腹ト
名ク又大腹ヲ取テモ名付也
一滞気ニテモ腹筋ヒツハリコル用ソ

一此方順氣之方ノ気不順ニシテ腰脇
痛ミ或ハ腹筋牽痛スル者
ナレ有故ニ大腎ヲ散ノ
一医學入門ニ風秘気秘虚秘ヲ治スル
故ニ号ニ三和散ト也
一是方気秘之方ソ
一血之乾名ハ回ノ潤腸湯實秘ハ三一
黄柴疎紅地之類 滞気之秘結
二此方ヨシ
一實秘ト云ハ能食ノ小便赤久便秘ス
ル八兼気湯ノ類吉如何ト云ハ實秘
ハ物也物ハ陰也故ニ味厚キ重剤
ヲ用ヲ是則陰味ハ海物スルハ也又
不能飲食小便清メ大便不通ハ

虚秘也此方吉如何ト云ハ虚秘ハ
気也故ニ薄味輕剤ヲ用是則陽
気ヲ通スレハ也此義切紙三十七
通ノ内ノ虚實ニ秘之下ニ見タリ愈
以テ切紙ノ義見レハ此方気秘ニ吉キ
事ソ
一老人殊ニ氣虚順只サヘ気骨スル程ニ
大便結ト云ハ此方吉シ能大便ヲ
潤シ通也
一或人大便結色ヶ通薬ニテモ不通
蜜導ドストモ不通モヲ 玄冶此方
可然ケ用レハ二貼而快ク通ヲ
一扨脚気之方也然レトモ脚腫痛ム
ハ濕也粘痛湯可也只不腫筋

ヒツハリカニリ痛ハ気之滞也此
方ヨキノ物ノ滞気ノ筋ヒツハリ痛
ハ脚気ニアラズトモ股ノ間又背ニテ
牽痛ハ大略吉脚気ハ風毒ト論
シタルニ因テ九文モ佳也
一或人脇腸之内ニ玉魚ヲ包タルヤウナニ
此方ヲ用ヒ治タリ用ヒタ心ハ気経筋
ニ滞居ル故ニ如ク右思ヒ用タルハ如ク
案ノヨカッタノ内コフラグワリ〳〵トシタリ
畢竟此ハ筋牽リ痛ム故ニ也
一或人頸ヒキソリコハリ煩ノ有股〳〵モヒキ
ソリ疼痛眩暈ノ不食脉弦也少シモ
動ハ痛ム処ヘコタエテ不能起此方ニ
テ大験有又即千方内ニ羌活勝
湿湯モアル故ソ
一第一病気之方也
一或人俄ニ悪寒ノ大熱往来ノ狂言
妄語脉弦数他医傷寒ト見テ療
スレド不治予見ニ拠何モ一身之
痛処ナクヌキンナト腫痛ミハセヌ
カト問タレハ脇ノ下ノトヲリ張キンヘ
レメツテクルヤウナト云拠此方之証ト
思ヒテ二三貼諸症退ノク事渇
タ時如飲水也後小腹大堀アレヤ
ウナト云ッ故大柴胡湯ニ青瓜ヲ
加用テ平愈ス後又為労生冬ニ
テ二度不起
一病気之症ハキン腫痛ミ小腹ヨリ章

門ヘヒキヅル也

又胸ニテ成ト モ如木筋張引ツリ痛
悪寒發挽スルト云ニ此方之症ソ
必ス疝気ト知ヘシ總別何症ニテモ
筋ハルト云ハ吉ソ

一此方之症悪寒スルハ外カ寒ニツカ子
ラレ内積熱アルニ依テ寒熱争故也
小腹章門之筋ヒキツルハ厥陰也明
乾久濕熱小便黄ニシテ或ハ渋ル モ
濕挽也

一疝気之四証トハ經ハ厥陰肝經脈ハ
弦急外ハ束寒ニ内ハ濕挽是也

一婦人ニ此症アツテ此方用テ治タリ
疝気之症ニ此方用テ不効事有

是虫ト思テ七味清肺湯ヲ用テ通
半吉事有後ハ寒熱往来不去故
小柴胡ニ青ヲ加テ平愈ス今按ルニ
九味清肺湯可然ト云

一有一老人胸腹腰背痛ム色々療
治不愈気鬱ト思ヒ先此方用テ
吉譬筋引攣ラズトモ用ル也

一扨腫気脹滿シテ気上テ喘急スルニ
蘇子半ヲ加テ気ヲ下シテ吉ソ

肺ヘ水気入也

一気不順ニシテ腰股痛ムニモ用テ吉或ハ
腹ヨリ痛ニモ用畢竟ソリ痛ム上云
ニ用テ吉ノ号大ニ入故ニ甚タ腎ヲ
拂也

一熱ニテ小便利ハ濕熱小便不利ハ
燥熱
一秘結ニ殊ニ老人ナトノ氣順リカヲテ
秘結スルニ此方也大腸乾ヒテ秘結
スルニ潤腸湯ヲ與ヘソ
一三十四五婦人色青ク〳〵トシテ鳩尾痛
大便結脉ニ動メニ切レ或ハ四動
五動十動メニ切レ氣奮上達スト思ヒ
此方ニテ大ニ効アリ
一胸痛ヒキツリ痛コウスルノ中ニ主奠
十ノ有樣ニ此方用ヒ不治前清脾
一疝氣之症ニ此方用ヒ不治前清脾
湯不治後滑脾湯又疝氣門神
効湯吉内外ヲ無タ方ソ

○三八味　調順栄衛流通血脉
快利ニ焦安和五藏治諸氣痞
滞不通胸膈膨悶口苦ク喘乾
呕吐食火有散有背腹脇走注則痛
噦急疼嗽面目虚浮四肢腫脹大
便閉結小便亦ク渋又治憂思大
過征忡胷積脚気風濕結聚ニテ
腫痛脹滿瞤急水腫等病並ニ腎
治之

陳二匁四分　青　香附　藿各一匁一分　木　瓜
赤茯　門　黄各一匁半　止　只各三匁　菓
參各五分　桂　蒼　腹　槇　木　沉
丁皮各四分半　通六分　半　井　朴各一匁二分
姜棗

一回春ニ木香流気飲ト挙タノ正傳明鑑ニハ二十四味流気ト有腹穢堀アルモノ水腫ヲ治

一總別気塞リ気滞リ胷膈不利胃フクレ腹脹不食ヲ或ハ喘咳シテ手足固ナトウソハレ漸々ニ水腫ト成カ、リ二便トモニ渋ル用テ吉

一是方ハ水腫脹満之ニ便不通吉又何ト十ク二便不通計ニモ用或ハ挾出咽乾ニモ用

一肩背脇胸注痛ム三ヨシ左ノ痛テ右ヘ痛ミ移ト云ニ吉又胷気ニテ痛出テタルト云ニ吉皆気痛也

一脚気或ハ物ヲモイノ胸ツカヘ悸仲シ臍腹脹イキ、タウレクスダクニモヨシ

一總別半井家ニハ積聚ニ專ラ用ソ

一厥聾ト云テ下ヨリ気逆上ノ耳ニ不聞事有此証ニハ能ク聞ユル故ソ是ニハ必ス此方ヨシ方中ニ藿菖ナト有テ別シテ耳之方ヘ通ル故ソ

菖蒲ニ能明耳目ニ通ス九竅モノナレハ也明鑑ニハ去沉ト黄ニ加我菖蒲藿ト有

一回春ニハ水腫脹満ニ吉ト有去半藿加木黄ト也耳聾ナトニハ此方其侭吉ニ便渋ハ回春之方吉又其侭用テモ吉ソ

○加四七　加味四七湯　治七情ノ気結ス成

痰気ニ狀チ如ク梅核ニ或ハ如ク破絮ノ在ル
咽喉之間咯不出嚥不下ニ或
ハ中脘痞滿気不舒快或ハ痰凝鬱
盛上気喘急或ハ因テ痰飲悪心嘔吐
此藥最モ妙功ニ不可述
蒼朮 神麹各二錢 枳実 桔梗 半夏 陳皮 青皮 各五分 生姜
根本気門之方也故ニ気病ニ使ヒ用
ル之七情ノ気胷結シテ生痰気不快
ニ吉方ノ回梅核門ニ詳也
一此方之症咽ニ物有テビロくトシテ吐
上モ不出呑下モ不下用ユ皆是七
情之気胷悶心痞スル也此等之症
ハ男ニハ稀也婦人ナト二多ソ

一又上気喘息シテ胸ツカヘ呕吐シテ口
ヨリ白キ沫ヲ吐ク也
一痰飲第一之方ソ畢竟腑症痰之
病ニ吉ノ降火下気痰飲ヲ消スル
藥也
一又此方之症ニ清湿化痰湯用吉清
湿化痰ヲ用ヒ治不治時ハ此方ト
清湿化痰湯ハ異味同ノ治スサ
レト毛清湿化痰湯湿塾ニ吉此方
ハ気胷之痰病ニ吉ソ
一婦人胎孕七ケ月咽ノ痛ノ如キ梅
核医風邪故ジヤナド、云テ九文ナ
ト用不治予ヲ召ス見テ曰何モ
腹立思事ナキカト云タレハ火レ思

事有ニ風呂ヘ入タル其後如此十
云故ニ此方去ニ星加桔 蕪ニ出入
十八貼ニシテ安シ此方ヲ玄治家
二ハ大ニ秘蔵スルト也

鼓脹 五

○廣潰 廣茂潰堅湯 治中滿腹脹
有積聚如石ノ堅硬令人坐臥不
寧ニ便渋滞上気喘足或ハ遍
身虛腫

半ニ 連 苓 皈 朴 益 草蔻
各五分 陳 青 麹 沢 柴 升
紅 呉茱 我 芎 生三分 姜

忌酒酢濕麺

此方ハ東垣カ脾胃論之方ソ

一此方ハ内ニ積塊有テ腫脹ヲ生ス
大小便渋ルヲ治其内ニ有ル毛此方ハ
熱脹ニヨシ冷脹ハ大七気湯口乾ハ
加葛

積聚 六

○大七 大七気湯 治五積六聚狀如癥
痕隨気上下發作有時心腹疼
痛上気窒塞小腹脹滿大小便不
利

益 陳 稜 香附 我 各一指
桂 藿 青 各七分半 芎 姜 各一指
等分ニ合ス

一是方ハ積聚之方也積聚有テ腹
痛シ大小便不通腹脹不食スル二

用方ソ

一雖積聚之方熱積ニ悪ク熱積ニ悪キ柴平湯用ソ兎角此方ハ熱ナキモノ積聚ニヨレ

一腹ニ積アル故ニ喘急スル事有此方吉也

一腹茂潰堅湯ハ腹ニ積塊有テ熱腹スルヲ治スソ

一塊十ケ所有ニハ桂ヲ加ヘ本方ニ一多五分其倍ヲ入テヨシ瘀血ヲ破ヲノヘリ

一胸ツカヘ虫フカクニテ痩不食ナトノ色悪キ上ニ吉又梹ヲ加テモ猶吉ソ

一一方ニ加ヘ大棗ヲ治諸ノ疳積向黄瘦衰ヘ四肢カヒナクアルユヘヨリ好生米雖生茶炭醎辣等物ノ食ヲ効方ソ

○紅圓子

陳青莪稜各二 朗耕ベタ于姜十多

一産後之跡腹痛ニ用テ吉

一小児之腹ニ塊有ハ虫也專塊ヲ多タノ青莪稜ヲ加ヘ

一産後ニ瘀血滞テ塊ヲナサントスルニ用ソ

一跡腹ニ此方ニテ手カサル時ハ柚皮ヲ加ヘ一貼水煎ニテ用效也

一赤白痢三毛用テ得効有也

○人參散　血塊腹痛三吉也用ヤウハ酒三テ醉程其人之分量次第一日三二錢ヅヽ用

參　朮　香附　芍藥　陳各三　甘草少　牡丹焙六分

補益七

○醫王　補中益氣湯正傳回春兩目異

患治中氣不足或ハ謀ヲ服ヲ伐ノ藥ヲ四肢倦怠口乾發熱飲食無味或ハ飲食失節勞倦身熱ヲ脈洪大空ニテ無力或ハ頭痛惡寒自汗ニテ或氣高ニテ喘ヲ身熱ヲ煩ヲ脈數弱自汗体倦少食或ハ中氣虛弱ニ倦怠ニテ痞悶等症因脾胃虛而不能愈者或ハ元氣虛弱感胃風寒不勝發表宜用此代之或ハ勞役感冒ニテ後勞役感冒ニテ後入房者急ニ加附子愚按諸人之一身以脾胃爲主脾胃氣實スルトキハ則得肺其ノ氣既盛水自生ス焉治形神勞役ノ過勞役ノ參　朮　甘草各二分　陳一錢九分　芪三錢　升柴各九分　甘少　姜棗

此醫王ハ東垣カ医中之王道ト云心ニテ名ケ此方ニテ脾胃ヲ補フ故ニ東垣カ名高キソ

一自汗盜汗發揲小便赤少眼精之見
樣此方ト滋陰降火ノ見樣肝要也此ノ
方症ハウツカリトシテ精ナレ滋陰降
火湯之症ハスサミシクキヨツ〳〵ト物
カナレキテイソ
一心肺之元陽ヲ升テ內傷之不足ヲ
補フ又心肺之虛ヲ補元気之虛ヲ
補方也
一脈ハ虛大ニシテ無力此大法也或ハ
微細或ハ弦ナル事モ有大ニシテ無
力ハ気虛此方又四君子湯モ吉ソ
一眞気草卜眼ノミハリ弱ウツカリトアル
ウノ樣ナルニヨシ或自汗盜汗丹傷
發揲ヨシ

一是元気之虛気虛也陰分ニ陽気下
陷スル故ニ發熱ス陽気此方ニテ升ハ
吉ト云ニアラヒク二終リナレ
ノ類ニヨシ只眼精ヲ見事肝要也
一小便黃ナラハ梔ヲ少加テ陰火ヲ可
降也
一泄瀉痢癖ナトニモ元気之虛ト見
タラハ可用諸ニ此心得有
一泄瀉痢病日久シテ体草卜結スル二
兼テ紅黑ノ尾ヲ加テ可也故心
肺之陽気下陷スル也
一秘結ニモ紅ナト加用吉ソ元気下陷
ナラハ此方理ハ清気在下濁気不得
下ヘ二清気ヲ入居故ニ不通ソ此ノ

方ニテ下焦ニアル清気ヲ引上セバ濁気ヲ自ラ下ニ依テ大便通ルソ其モ初メ通ー薬ヲ用不通用吉必初メカラ此方不可用

一痢病莫問後重不去ニ心肺之陽気ヲ升テ腎肝之陰気ヲ下故ヨシ

一水腫脹満ニモ或不食スルトモ又胃ノカユル上モ元気草附タルニハ吉ソ其効不可勝計也

一労役之傷寒上テ骨ヲ草附タルニ又黒本ニ益気養心湯ト名ノ是非ヲ不知防相モ有也此方ニテ先ヘ行ズハ熟附ヲ加用ソ熟附ハ補薬ニ能ヲサスルゾ

一傷寒陰症又労役上云ニ良也

一傷寒餘熱アラカレメ養生ニ吉又愈テノチ労役上云テ骨ヲトラレテ薬気サレ返ス事有症四肢怠随ニ或ハ一身モ怠随スル事有此方ヨシ此等ニモ草附ソヨクハ附子ヲ加テ吉ソ但眼精ノ見事肝要也滋陰降火湯ト見分専一也

一傷寒愈テ後徙他侵風湿ニ或ハ沐

浴ナトシ或ハ風引テ再發シテ熱出
元氣虛草卧ムサヽ上同シコトハカリ云ヽ
回春之加味益氣湯カ益氣養心湯
カ叓ハ此方吉或ハ食ダミリシテ打返
シタルニハ藿香正氣散モ吉又ハ解散
モ吉畢竟之理ハ元氣之虛ニ吉ソ
又不虛ハ不換金正氣散參蘇飲抔ヲ
發散シテ吉シ

一眞元之虛ノ傷寒ノ熱往來ナト有ル
九文之類ニテ大汗出ルニ依テ甚
草卧熱モ未タ去有ニ元氣莫卧譫
語ナト有テ脉數大ヲ何ヒヤウ夏
無時ハ此方カ回春ノ養心湯加味
益氣湯佳也眼精ナト夠キハ猶以

之事ゾ

一傷寒汗大ニ出陰虛スルコト尓有脉
細数ニテ色濁リ咳嗽出テ眼精
令衰タリ此滋陰降火湯之症ゾ
發散之後滋陰降火湯補中益氣
湯症ニ成事多シ能切脉問症可ラ
兼ノ

一傷寒汗シ吐下シテ愈テ後元氣未復
時房事ヲ侵セハ小便必ス渋ル也房
事ヲ侵シテ再發シテ熱出ルニウツカ
リトスルニ附子ヲ加テ吉

一傷寒愈テノ千女労役上テ房事侵
シテ煩ヲ云男ハ陰莖腫モノヒリ女ハ小
腹コハリ痛ミ又ハ小便赤ク渋リニナ

ルハ此方ニ車前通ヲ可加或ハ加
桐木良再案ニ回春淋門治五淋
ト骨タノ可見也
一傷寒陰易陽易ト云事有未全ク
愈内ニ房事スレハ互ニウツル事ソ
男ナレハキヤフヲ黒焼ニシテ湯ニテ
服ス陰之アタル処ヲ云也焼視散佳
也医学綱目ニハ益気湯ニ此焼視
ヲ加テ用ト有
一産後ナトニ血多ク下リ過ルニ芍薬湯
四物之類ニテ不止ニ此方加芍切々
効ヲ得ル也脉モ大分細数ニ成モノ
ノ理ハ元気引上セハ吉心ソ又諸病ニ
血下ハ此心持ノ崩漏帯下ニモ此心

有ル大方ノハ芍薬湯ニテ吉又解毒
湯モ吉見合テ佳也
一婦人三月ニシテ子下テ後血甚ク不
止他医先解毒或四物湯或ハ涼膈
散之類ニテ不止脈細ニシテ数ナル故
ヒタモノ寒薬ヲ用最早気絶シ死入ル
時召ヲ此方大貼ニシテ用一貼ニ
テ立ニ愈タノ気飯匙血下モ止ル此ニ
モヲ加レハ芍薬湯モ中ニアリ
一子ヲリテ血甚不止ハ黄連解毒湯
涼膈散吉此ニテ不止ハ芍薬湯四
物湯扨ハ補中益気加芎用ノ
一下血ニテモ崩漏ニテモ或何病ニテモ
血多ク下テ気虚ニテ病ク身タラクト

スル二此方也脉モ無力ハ猶以之事也

一或婦人風毒腫ヲ患ヒ膿ヌケ須気不足ナル故カ発散不足故カ流注シテコヽカシコ腫痛ム予見之ニ熱有之ト思ヒ九文用タレハ結句甚体草卧タヽ然ニ依テ始終共此方ニ羌ヲ加テ無方体ノ又流注ニ愈タリ此病人甚痩不食ノ脉細数体弱ヽヽ敷ニテ吉ソ總別腫痛ミ又ハ項ハ必羌ヲ加テ吉ソ

強ハ大陽經引痛ミ上焦ニ有ハ羌活ヨキソ下焦腫痛ハ少陰經之分或ハ兩之下節ナソ牽痛スルニハ独吉ソ

一想別腫物之後膿血出タルアトニ必ス補風ナト引頭痛挾ナトアルニハ香葛湯用テ吉此内ヘ

一手負ナトモ瘢之口開タラハ必ス補薬吉ナソ則此方也

一瘡疽之類或ハ何ニテモ腫物傷レタルニハ此方可用若脉ハ如何ニテモサヽヘ無ハ此方吉又脉結リナトアテ気不順者ハ十六味流気飲ナト可也若脉ニ結有ヒ元気草卧タラハ此方ニ加減シ扱毒順気之剤可用想別腫物傷膿血出アトニ風ナト引事有香葛湯用テ吉症頭痛熱ナト有ニ吉

一痛風脚気ニ毛吉元気草卧々ス回春
之方後ノ考テ可見
一麻痺スルハ気之虚也此方加青苧
枝烏香附木等之薬加味益
気湯ト云回春麻木門ニ有又回春
麻木門十指尽ク麻レ井ニ両目皆
麻ス此又気虚也加門木香附子
羌防烏一立創也
一気虚ヒテ頭ノ右偏ニ痛ハ頭痛門ニ
黄芪益気湯吉
一此方之症ニ此方用キカヌ時ハ錢氏
白朮散ニテヨキ事有又ハ四君ニ皈
ヲ加フモ有
一補中益気湯之脉ハ虚大ニシテ微細

数ハ虚大ハ陽気陰分ヘ下降スル故
ニ大ニシテ無力ナヒハ元気虚スル故
ニ弱ノ成也数ハ熱脉也今気虚火
計高キ也
一滋陰降火湯ノ脉細数ハ陽虚レテ
ウルヲイ乾ノ故也数ハ火動スル故也
一洪大ハ必火肺ハ王気火克金肺克
スル也或ハ微細ナル毛有
一補中益気湯二升柴ヲ用又陳ヲ用
ハ数二味之薬味ヲ助ケ切ニ能正キ
也陳ハ消痰泄気ニ依也回正傳ニ
加減之方有
一傷寒陰症ニ此方用又陽症ニ滋陰降
火湯ヲ用ル其陰症陽症ヲ見分ル

事肝要也此方之症ハ氣草附目
三ハリ朝クウツカリト
ル三吉滋陰降火湯之症ハイカニモス
サニシクギロ〳〵トシテ白
キ又ドコヤラ物悲キ
一傷寒或ハ後久シテ盜汗或ハ自汗發
熱ナトアリ元氣之虛也又發熱スル
ハ陽氣陰分ヘ下降スル故發熱スルソ
此方ニテ陽氣ヲサヘ引上レハ自汗盜
汗モ止ミ發熱モ退クソ又ハ病後訛
バナクハヤク數サウナニ血多下ル吉或
崩漏滯下小産ナトニモ此方佳也
一ハ只男子ナトニテモ下血スルニ他医黃
連解毒湯ナトアリテ不叶ニ此方吉ソ

皆氣陷血中故引上吉ソ
一産後玉門不閉ニ此方ニ玄ヲ加ヘ冷ス
ルソ回春婦人門ニ見タリ
一婦人崩漏面黃ニ或ハ赤クナリ腰
之間膝下痛四股困倦煩熱不安ス
其經行先發兩脇如束此脾胃虧
損元氣下陷与相火濕熱下迫所
致也此方加防芩炒黑柏百目之
間ヲ脾湯ヲ兼用テ平安ス
一痛風脚氣ニモ元氣草附タラハ此方ニ
膝仲ヲ各一匁已ニ五分加可用
一五十歳男鎭痛風ノ後發熱頭
痛全ク不食尿赤脈五動余ニテカ
アリ藿香正氣散ヲ用テ頭痛熱退

テ後益ス不食気不ス尿黄脉濡ニシテ五動此方ニ相知ヲ加フ全ク安ニ立方本指正傳并惑論方考ノ之文有予茲ニ略ス可考

○四君子　治気虚ヲ

参　朮　苓各ニ等　甘炙ニ等　姜棗

此方気虚体倦ニシテ不食等之症ニ使ソ又胃中虚寒ニシテ物モノカヘズ風ニ弱ヲ浮タル如ク虚空ニフクレ食味ヒ

ナキニ吉方ソ

一傷寒陰症ニ此方ニ加附用事有

藿香正気散之下ニ詳也

一気虚之痿症ニハ此方ニ加ヘ桂　芩

蒼　用ヒ妙ソ

一四養散　童門ニ此方ニ芎　皈　陳

半　天ノ　浩　並ヲ加テ気虚湿痰頭

眩ヲ治スト肩タノ想別肥タル人之

頭眩気虚ニテ湿痰生スル故ノ必ス眩

ニハ四君用テ可也此方ニ半　梟天

ノ湯ト似タ方ソ然レ共天ノ湯ハ并

有リ芽ハ脾胃ノ気消スル故タノ

用ヒカタキソ

一女熱病十余日他医薬ヲ用テ効レ

アラズ按ニ他医依用寒薬ヲ退ノカ

ヘス上息四君子ニ加附大ニ効ヲ得

焚悉ク退ク

一此方ニ加陳半名ケハ君子湯脾

胃虚弱飲食少ヲ思ヒ或ハ久痢

瘧病ヲ患若久ク攻ル時ハ
飲食化シ方多ク作ス酸虚火ニ属スル
治又加美用テ効ヲ速也

一正傳ニ如自汗或ハ小水利スル者ハ
苓ヲ去芪ヲ加フ方考法有

○四物湯　治血虚ノ
飯　熟地　各三匁　白芍　芎　各一匁
五分

諸病血虚ヨリ煩ニハ此方吉

一傳之労瘵門ニ丹溪曰陰虚之熱
久ク不与血病多クアル者ハ其傳屍之

一証不可有無犬法云四物湯加ニ
童便韮姜汁ヲ云ン

一此方ニ加ル香附陳柴牡色一婦人經
逼ヲ後ク調理ニ用テ吉

一安産ヲ後血留テ不通腹虫蛟
如クナルハ瘀血ノヒワザ也此方加ル桃
紅延ノ用妙ゾ予効ヲ得ル勝
計フベカラス

一此方ニ梢蒼ヲ加テ血虚之痿症ニ吉

一治頭偏在ニハ此方ニ合ニ二陳湯ヲ加ヘ
防芪苻　芩　蔓　細一用妙也

一労嗽ハ宜補陰清金此方ニ姜汁竹
瀝加テ妙ゾ

一陰虚火動ヒテ嗽ハ四物湯合ニ二陳ニ用
妙梢知妙ゾ

一咳嗽午後ニ多クハ属陰虚ニ此方ニ
加テ知梢羔其火ヲ降ス

一二十歳之婦人六月中旬安産之

後十二日而脫浮腫ニ二便不通喎
斃ス脉弦數此方加通猪膽桃没
紅渭柴用ヲ腫退ス四肢無力ス
能起此方ニ膝紅瓜木ヲ加ヲ安ニ
一又壯婦墮胎之後心下痛ミ而四
肢浮腫ス此方ニ加乳没桂通
腹知母麟血挾海金砂ヲ用ル事七貼
ニシテ全ク安
一又壯女胎三月ヲ過テ血暈ス此方
參ヲ加テ用ニ貼ニテ本復ス方考ノ
法論并ニ正傳加減有異之
一陰虛喘嗽或ハ吐紅ナル者ハ四物湯
加知柏ニ參門桑枝吉也

一 虛勞
滋陰降火湯
人參養榮湯
茯苓補心湯
滋陰至寶湯
逍遙散

二 失血
清肺湯
清咳湯

三 汗証
當歸六黃湯
當歸地黃湯

四 眩暈
四君子湯

五 癲癇
六 頭痛
七 耳病
八 眼目
九 心痛
十 腹痛

泥香天广湯
清心抑膽湯
半夏白朮天麻湯
通明利氣湯
柴胡川芎湯
加味七氣湯
三因七氣湯
蜘蛛散

十一 痺風
十二 痲病
十三 婦人
十四 瘡瘍

疎經活血湯
三痺湯
清濕化痰湯
加味八仙湯
木香湯
八正散
龍膽瀉肝湯
柴胡抑肝湯
四物調經湯
加味五香湯
十六味流氣飲
五香連翹湯
升麻和氣飲

十五 金撲磕 十五味 覚中圓 蒲黄散

十六 雑方 香正 又方 茯神散 分氣散

小兒紅花連翹湯 治丹毒赤瘡走竄兒一切諸症用之故号五香湯

紅花沉香 烏犀 檳榔 丁香 連翹 薤金 忽冬 大黄 牽牛 枯梗 熱甚者加葛根黄柏 乳吐加丁香倍加宿砂 咳有乳吐去半 右㕮咀 青天

虚労

○滋陰降火湯 治陰虚火動之發熱咳嗽吐痰喘急盜汗口乾 苁蓉一錢三分 飯一錢二分 熟地 生地 八分 陳七分 知母 柏各五分 茸少 姜棗 歴便

此方ハ陰虚火動労瘵之主方也此方之脉ハ洪大或ハ細数也 細ト大トハ陰虚火動ニテ無潤之脉也又数ニテカナク筋ヒツハルハ脉弦也

一補中益気湯ノ脉ノ昏以前二記之補中益気湯之脉之内三ツ大ハ熱此

拠此方之内三ツハ数カ熱也

一陰虚火動也此方之証ハ午後ニ潮
熱ノ盗汗咳嗽大便結ニ小便赤ク
大方色濁ル者ノ悉ク皆ニ有リ

一此方之証ハ初ハ咳嗽ニ似タル故ニ他
人不知浮白散ナトノ薬用ルソ又ハ
初ノ感冒咳出テソ白ク〳〵ト此証ニ成
行此方之証ニナルソ大形咳嗽上モル
ソ又此方之証ニ十薬飲用事有
其ハ却テ剤上テヲヒヤカス薬也胸ナト
クルシクハ猶以テコトナリ

一此方ノ症ハ秋冬之令上同事ナルニ依
テ顔色イカニモ物凄クセイ〳〵トシタル眼
ツキハ赤肉多リ医王ノハイカニモウツカリ
トソ眼ニ無精能見分テ可合点也

一此方之症上医王之症上二症見ヘタリ
ハ二方合シテ可用

一産後尊労ナト云事有産後必ス咳嗽
ナトアツテ労察之症ニ成事有此方
吉ソ産後ナルニ依テ也加様ノ事ハ他
人之不知也可秘スヘシ其ヲ療治シテ
吉シ先東垣泻白散吉若不治此方
吉ソ脾肺ナト虚衰ヲ不知早ク
合点スヘカラス始終可分別若脾肺
之虚モ不考早合点シテ用ルハ結句
アタルソ大険東垣泻白散吉若ヒシ
ト此方佳也

一或人産後ニ脉細数ニシテ咳嗽喘急甚シクシテ有息ニ初中後咽乾キ香薷湯用テ不効最モ滋陰降火湯ノ症ナレ𪜈能思案スルニ脾肺之虚ニテ可有ルト思東垣海白散ニテ肺気ヲ養ハンと思治タリ咽之乾キモ止ム按ニ方中ニ五味子ア故也味ハ能寒潤ヲ止モノ熱渇ハ芩門之類也又味ハ肺気ヲ補フ薬又ハ脾ヲモ養フ薬ノ芩ハ肺中伏火ヲ下シ痰延ヲ散降スルモノ地骨者腎中之湿熱ヲ去青ハ順血行ニ瘀血硬スルノ粳ハ脾胃ヲ大ニ補其余二味順痰快胸之薬参ハ丹溪殿ノ説ノ如ク産後必用ユル薬也陽中之陰血ヲ補フ其ノ説見ヘ天民ニ段間ノ前之如ク海白散用テモ吉ニ若此方ヲ久ク不治故ニ始終ノ分別シテ用ユ云

一此方之証ニ似テ咳嗽スルニ東垣海白散亦ハ参木調中湯ナト用ユ事有能見分テ用ル也私ニ思ニ此方久ク咳嗽ニ佳ナラント思ノ全日味ナト邪気之有内ニ六悪ナト能毒ニモ有也ト云リ然ル間ニ参木調中湯之内参味ヲ去茯苓ヲ加テ用テ吉心ハ参ハ手大陰肺経ニ入テ久ナルニ依テ去参苓ヲ加肺ヲ清フシテ尅サセニシキ為也委ハ十薬飲之下ニモ載タリ

此義可見ヅ

一此方之症三焦強アラス六黄湯ヨリ乾薬也滋陰湯ハ滋陰降火湯ヨリ寒薬也滋陰降火湯ヨリハ六黄湯切々用ル事多シ但薬味ヲ能見テ可合点六黄湯三ヲモ去ガ各二ハ滋陰降火湯解毒湯合シテ用事有

一此方之症三結句返テ腹下事有其時ハ此方之次ニアル清離滋坎湯佳ナリ則此方去陳ヲ加苓朮散之証也者也予用テ切々ニ得効此方ト六味丸ト合タルモノソ

一又泄瀉ツヨキハ参苓白朮散之証也

一痰嗽喘熱ヒテ泄瀉スルハ脾肺之虚也参未調中湯之症也

一或婦人産後三十日ヨリ内ニ房事ヲ侵シ熱来脉洪大数ニシテ煩疾ス其上風ヲ引タリ悪証積リタリ是又之症ナレドモ房事故ニ瀉ヲ倍シ木乗拠ヲ加テ治タリ今按スルニ回瘉門之調和飲モ可然故ハ右之方ニ似タモノソ

一此方ノ症ニ虫アタリ胸ツカヘ咳嗽有七味清脾飲ニテ切々吉事有脉之数動モ引者也

一老婦素ヨリヒハヅニ弱キ人長血ニテ虫指出酒ヘトニテ寒ニ七味清脾湯ニテ治タリ此病人常ニ堀有或ル時

塊甚ク痛ミ色々虫藥之苦辛剤ヲ
用レトモ痛ミ不退異功散姜ヲ不入
用ノ立処ニイタミヤム妙也辛キ菜ヲ
キラフ故ニ姜ヲ不入也

一此方吐血ニ使ソ此方之証ハ先血ヲ
吐テ後見ル痰者是陰虚也滋陰降火
湯可用先吐痰ヲ後之吐血者ハ是ヒ
積熱也回咳門清肺湯又吐血之後
ノ痰ニハ此方ト回春十ト二毛骨タレト
モ自然ニ不治事有其時ハ回反胃
門順気和中湯結句佳也

一腎水発テ相火タガズリ盗汗出ニ用吉

一此証ニ多分ハ感冒ニテ後ニ此方ノ証ヲ
積有テ此方之証ヲ見サハ四精一聚
門六七気湯之薬味不残此方ニ加
可用或ハ又医王之証与積滞ニテ
見ルニハ医王ニ六七気湯加毛可也

一滋陰降火湯ハ脉細数月骨也

一脾弱ニ腎虚上ニタリ上毛滋陰降火湯
ヲ不可用寒剤故ニ脾ヲ傷腹満スル
心也若用ヒ医王ニ合シテ可用又
清坎湯ヲ用ヒ毛有

一三補丸ト与滋陰降火湯用ヒト方
考ニ見タリ冷云虚火ニハ滋陰降火湯
実火ニハ三補丸

一十九歳男七月上旬ヨリ午ノ後頻ニ
不食ニ腹雷鳴盗汗如洗ノ大便結或
ハ泻又小便赤ク不時悪寒食則発熱

脉数此方ニテ治タソ

一夫レ此方之盗汗ハ甚ナド用ルハ別也腎水耗テ相火亢出ル汗也

一陰虚火動シテ喘息スル者ハ心脉数也此方加蘇子沉杏桑竹瀝麥也

一白濁此方應人亦白濁ハ是虚火也加木草蔴尼蓄去芍吉

一此方ニ加テ妙痩痩タル人肥タル人男女共ニ虚熱薫蒸尿少ニ吉

一素弱之人陰虚火動タル小便不通用ル利水茶不効者ハ積痰在肺ニ气ハ爲上膀胱ハ爲下蓋シ上焦閉則下焦塞誠ニ如滴水ノ器上竅通ニ下竅之水出也其時ハ升提気可也医

王類是也

○參朱 人參養榮湯 治積労虚損四支倦怠肌肉消痩ニシテ而少シ顔色汲々短気飲食無味也

參 朮 陳 芪 桂 木 各一錢 芎 熟地 芩 味 各七分半 遠志五分 甘

姜 三片 棗 三枚

一此方ハ医王之裏也医王ハ気虚發熱ニシテ汗アルニ佳也此方ハ血虚ニシテ發熱發汗アルニヨレ

一畢竟虚損門之方也論二十キコトヲ茶三ノ使ノ虚損ニ專ラ用也

一此方之建立ハ十全大補湯ニ去芎加陳昧遠芩大ニ使タ方也芎大ニ

ニタル小表ヲ収斂シテ汗ヲ止ンタメ也

一此方気血虚損体草ニ臥テ晡サウキレ不能寝等ノ証ニ用ル也

一表ヲ収斂シテ汗ヲ止ル方也

一婦人時ヲ煩懊血多ク出気甚草ニ臥テ晡サウキレ多ク夢ヲ見夜ヲイナズ脈毛虚弱有タル故ヲ此方ヲ用テ治タリ養菴院毛加減ナル症有タレハ用ヒテ治タノ有汗ニ延壽院毛用ラレタノ又先師一溪翁玄朔ナド毛此方信セラレ用タノ回春發熱門ヲ考虚損大全諸虚門也

○無汗 茯苓神心湯 回婦人以血旺ニ気衰為本心主血肝藏血ノ今血衰テ気盛ナル者由テ心気虚耗ニ不能生レ血又不能制乎肺金使ニ肺気得以乗乎肝木肝之虧損則不能藏血漸至枯涸不栄経絡故月信不調矣此専ラ補心元之虚抑其肺気之盛ニ調和栄衛滋養血脈其ノ疾自ラ愈熱テ治ス益過多ニテ虚労発熱及吐血衄血咳嗽痰涎上盛胸膈不利

茯苓 芎 陳半夏 各一銭 甘草 各五分 少姜 棗 各一枚 人参 桔梗 前胡 各一銭 黄芩 各一銭 木香 蘇葉 各七分

是咳嗽潮熱無汗之方也虚労ニテ腕ニサス熱吉也大成之気門耗散真

気ヲ調其經ト云ヨリ建立之方也專ラ
婦人ニ用也
一不分男婦心気カ不足シテ血ヲ生スル
事不成黄色ニ痩テ五心ニ熱有テ
或咳嗽之有ルニ用時々熱カサイテ口
乾キ ナトスルニ用逍遥散ト表裏之剤
也總シテ胸ツカエルニヨレ補心湯ト銘ヲ
ウツテ有
一扨心虚シテ今ナサワキ有テ咳嗽シ脱
血スルニ用也扨血虚シテ咳嗽スル第
一之方也
一十穎四物合タル方也内四物湯有ル
故ニ吐血潮熱骨蒸ヲヤギ二古十穎飲
アル故ニ咳嗽吐血無汗潮熱アル方
也咳之後ニ必有者ソ
一血虚ノ胸ヘオトルニ古補心故ソ久咳
シテ後必ス有者ソ又血虚ノ胸カムモ
吉又血虚シテ婦人ヅワリスルニ古
一脹カ労瘵カトス云ニ結句此方ニテ能事
切々有
一吐血ニモ用咳シテ後吐スルニ古
一逍遥散ハ補心湯之裏也気血共ニ
虚シ汗アルニ用也
一婦人胎孕又胎孕ニ非スモ不食吐逆
ナトスルニ吉ソ
一劉尚谷寵夫人有孕患悪阻呼吐
不止飲食不下心中煩悶シテ頭目
眩暈諸医以テ和脾胃之薬或ハ

二陳湯或藿香散保生散之類以
遍投無驗予診脈左微三七ノ気口
猶數此血虚ニ気盛ニシテ火アル也若
不養血則火不降火不降則嘔吐
不止以此湯加姜汁炒連竹茹
三貼ヲ而安シ

一
玄帥患眩暈如坐舟車之上眠ル
時恐懼シテ欹傾キ心中煩三足冷俄
ニ目脗如蒙物補心ニ入姜用事
十余貼シテ安也

一
私ニ曰五師啓迪院用此方去半加
香附是秘事也

○滋至　滋陰至宝湯

五労七傷經脉ヲ調肢体羸瘦此
茱萸ヲ調經水滋血脉補虚労扶
元気健脾胃養
肺潤咽喉清
頭目定心悸安神魄退潮熱除骨
蒸止嗽嗽化痰涎収盗汗住泄瀉
開胸気利胸膈療腰痛解煩渇
散寒熱秘体疼大三有奇効不能
尽述

厚朴　蒼朮　陳皮
香附　地骨皮　各八分
姜　三片

一
此方ハ逍遥散ノ加減之方也逍遥散
十ト用テ不効寒熱十トアル二逍遥散
ニ加減用度ト思フ時此方ヲ用ユ

一
神ヲ労シ腎虚血少股痛ニモ吉也

○逍遥散　治肝脾血虚發熱或ハ潮熱或ハ自汗盜汗或ハ頭痛目眩或ハ怔忡不寧頬赤口乾キ或ハ月經不調或ハ肚腹作痛或ハ小腹重墜水道渋痛ミ或腫痛ミ出膿内熱作渇

甘草　白朮　茯苓　柴胡　芍藥　各一錢　生姜　各一片　薄荷少許

一氣血兩虚發熱有汗此方吉シ

一驚悸屬痰火而熱氣虚者宜清痰火以補虚之方也虚労羸瘦有汗者ハ此方吉シ

一此方ニ加ヘ蜱紅飛藕木遠各ノ加味逍遥散婦人虚歌唱無時垣ヲ穿ヒ屋ニ上ルモノ氷血迷ニ乎心包一ニ致此カヨシ

一二十歳婦人熱往來咽乾キ汗多ク大便少シク泻ル十余日之後微小便黄ミ脉五動皆此方用ヨシ

一中年婦人頭痛徹熱腰亦痛此方ニ加テ香附妙玄冶ノ白此配剤專ラ逍遥散ノ症ノ若此証ニ脉力アラハ茯苓補心湯天香湯五積散四物湯又ハ四物調經湯之類ノ此証ハ局方ニ云熱入血室之証ノ方中之柴胡ヲサニシテ又小柴胡ニ加味ヲモ用フ然レ共小柴胡ハアニリ易シ故ニ先此方用次ニ小柴胡湯吉也

○血清 清肺湯 先吐痰而後見血者ハ
是積熱也
苓 陳皮 生地 芍 天門
門冬 厄 菀 膠 桑各等分
芎少梅 麥
一此方ハ竟ハ肺気ヲ補ヒ益気之薬
也肺労ニモ用或ハ浮日散ナトモ用
也然レトモ浮白ハ肺気衰ヘテ血ナト出
ルニ吉
一此方滋陰降火湯表裏之方也
一先痰ヲ吐テ後吐血スルニ用也是積
熱故ソ
○清咳 清咳ニ初メ咳ニ有出於肺咳嗽
痰ニ帯血也
飯 的 飛 貝銭各一 木 苓 厄
牡丹各八 青 甘各五 斛少水煎
潮熱加柴芩咳嗽吐血之方也
肺気ヲ清涼シ類血降火大方ソ若シ
此方用テイカヌニ前清肺湯又清
咳湯選用ヨ

汗証曰

○六黄 當飯六黄湯 治盗汗之聖薬
也
飯 芪 各一 生甘 芎 連 苓
消各七分 滋陰降火湯之証ニ熱甚
用也芪ニヲ表ヲカタクシテ止汗 連
苓ニヲ心火ヲ下シ使心腎既済方也
飯ハ心血ヲ益シ調エル也

一滋陰降火湯三ヲ盜汗止三サル事有
其時ハ補中益氣湯或ハ黃芪建
中湯ナトヨシ亦六黃湯三ヲ盜汗止ニ
ザル三方考之盜汗門正氣散能上ル方
也即方捐各一知各五分 共五分也
此治陰虛有火令人盜汗之方也
一滋陰降火湯三ヲ熱去カタキ六此方
ヨシ此方切ニ用事多シ
一此方盜汗之聖藥也
一方考ニ曰醒テ出ルヲ自汗睡ノ
出ヲ曰盜汗者ハ自汗ハ陽虛盜汗ハ
陰屈也曰有火者謂其症有面口
乾牛房燥ト便秘ノ色青重脉來數
也然ルニ陰虛者取以テ盜汗者屈

虛之入驅去ルヲ上キハ衛外之陽乘虛
陷入テ陰中表ヲ大其固衛故令
入滅然トシテ汗出人覺ハ則千陽用
事衛気復出于表ニ々實テ而汗即
千止ム矣 私ニ曰是迄云盜汗之出
故也
一立方之旨同前ニ曰飯熟苧艱陰
之品也芩連去火之品也群捐ハ
可以養陰亦可以去火而芪者取
以補表気於盜汗之餘也是盜汗
与傷寒盜汗不同傷寒盜汗是
半表半裏之邪未ダ雜盜汗者陰虛
而已彼以和表爲主此以補陰爲
主明者弁之

○當地當阪地黄湯方後三日盜汗気益ノ
虚ヲ治也
飯芍芎蜱 各一匁 朮 苓 甚 各一匁五分 参 五分 甘少悪 浮麦
知 梔 陳 各八分
此方最気血両虚ニシテ盜汗ニ已ニ甚
竟ハ陰虚之症ニ吉 補中益気
湯滋陰降火湯之変方タスケノ方ニ
方合シテ用多キ処ヘ其ノ侭此方吉右ニ
方之助之方也又咳嗽ニモ吉
一十全大補ニ似タル方ノ鬼角盜汗有
テモ無テモ気血上モ虚スルニ佳也

駄暈 四

○駄四 四君子湯ニ治ニ虚濕痰頭駄
参 朮 苓 甚 各一匁
飯芍 陳 各一匁
田梔 芷 天ナ 各等分甘少姜棗
一男子患小便渋ル餘ニ深ク入テ殺蟲
便毒也外科是ヲ療ノ入ル投茉ノ疼ノ
痛甚シテ難忍時ニ婦有テ怒ル怒ル干
恍惚シテ不知人事ヲ四肢冷テ戦慄
順更少醒脈沉細遅也数医見之
ヲトロキ去全ク与四君子湯ニ貼
ニシテイユ
一又按ニ並ハ頭駄ニヨシ梔ハ気ヲ補諸
茉ヲ兼テ上行スルノ駄暈ナレモ上部
ニアル者故ニ用下部ヘハ行メ茉ノ
此病人小便毒ニテ気虚シタル上ニ
怒テ人ヲモ不知体 草即タル故此
方参 朮 苓 甚ニテ気ヲ補ヒ 飯

芎三ノ血ヲ補ヒ又ト怒四肢ナト
冷ハ濕痰故陳半三ノ吉天ノ ハ
気虛之眩暈気タニ戦慄ニ用ル沉香
天ノ湯 半夏白朮天ノ湯ナトニモハツ
レヌソ天ノハ諸々之眩暈ニヨキ也

癲癎 五

○二活 沉香天ノ湯 治因恐懼發癎病
橘擧痰延有壹目多クハ白朮益項
背ノ一時許脉沉微ニシテ急方ニ醒ニテ
後毋見皐衣人即千發ス多ク服屋
牛腦麝鎮墜之薬已ニ四年餘リ
此証尚有又添行歩動作神思
如痴先灸兩曏ニ壮二七壯次服ス
此若ノ

羌活 独活 各四錢 沉香 芎藭 各二錢 防風 半夏 各三錢 天ノ 各三錢 茯苓 各二錢半 甘草 少

附 天ノ湯 益

美人

此方ハ癲癎之壞症之方ノ壞症ト
癲癎ハ痰ヨリ生スル物ノ安神先用
之証也 東垣以來用ル也

一此方ハ温補温陽之劑也

一此方ソリカヘルニハ不効ノミニハ麝香丸ヨシ

一癎ニハ清心導痰湯吉此方ハタ、癲癎之ニ七ニ用痰火脅火ヲ退ル方也

一此方之症ハ足カラ冷アカルト思フトキ小腹ヨリモノカ胞ヘコミ上ルソヨリ胸ヘ胞ヘカタクくトヲトリ胸サワキ或ハ胞塞リ

ク氣ヲ心汎ニ行遂ク成イカニモ心ホ
ソクアブナク成今死スルカト思也深
井ヘ陥入様ニ心遂ク氣沈ム也胸中
ヤクトシテ再心煩クモユルヤウニ成煩也
扨背ゾクト寒シテモノ穴モタツ様ニテ
ルヌホツト挑氣指ノ頭大陽之經ヨ
ハリ肩ヲサスル物ソサテ頭重ク項ヨリ
頭ヲ卩之上ヘヒキカケ物ヲオヒキスル
様ニテ目之上重クナル也扨上重ク
下輕クグラグラト上ス舟車ニノルカコトシ扨テ
此症ニハ子ヲビヘアルモノゾチイラレシト
スルトキビツクリト驚ク也是肝要ソ
故此頃ノタノ分ニテノケレハ胸キヤク
トシテイヨイヨ腹ニ無力食イヤギスルモ

ノノカハ食急キヲサルモ有サテ起ル時ハ
小便清ニサメタル時ハ結句濁ル也理ハ
下之氣悉ク上ル故也サテ宝鑑ニ脉
沉弦数用ト有然レトモ種々療治
ニテ不治ハ動数有モ用レハ結句此
方ニテ動数モ退ソ頭附ト方中
ニ有ニ依テ動数アルニ用ヒカタキヲモ
結句ヨキソ理ハ厥逆スル故也
一扨此方之脉ハ多分ハ右之寸関ヘソ
テ左之寸関弦ニ成モノソ此理ハ風
火之類風ト火トハ心肝之病ナレハ也
風ハ肝火ハ心也今木克金土
ト魁スル故ニ金土之部右之寸関弦
小ノ心肝火木之部左之寸関弦実

也扨夜之不寐ソ晡時ニ虚熱指者ソ大畧右証者餓ニ腎水ナトヲツカイ過ニタル人煩モノソ

一サテ大畧此証ハ男ハ下血下ル事多ク女ハ産後ニ能此症アルモノソ畢竟ハ血脱之跡ニ右様ナル症發スルモノソ

此方吉若三四貼モ用不治ニハ十五味用可也女之血ノ道上云ニ此症大畧有ソ能可尋出ス

一扨此方之証ニテ脉浮ニシテ無力虚タルニハ半夏白朮天ヶ湯脉モ弦実ニテ実証有ニハ清心導痰湯ヨキソ

一此方用ル間半夏白朮天ヶ湯ヲ用ル事吉又養生茶上云ハ半夏白朮天ヶ吉ソ

此方ハヒツゾメ久ハ用ロガタシ假バ二日此方用ル二日半夏白朮天ヶ湯ヲ用ル也右記スル処之証アラハレタル病人何ノ病ト問ハ心腎虚又ハ風疾ナヾ火之煩ヒト云吉ソ

一十六七之女病後ニムサト煩ヒ他医色ヾ療シテモ不愈予見之何トモ合点不行暫ク案シナニ氏丹心クルシキコトナキカト問バイカニモ内心若キト云ニ又症候之心モ有此方ノ証カト思一ヾタツネタレハ大畧脉症モ叶タリ殊ニ痢後ナレハ血脱ト思此方用タレハ大貼ニシテイユ

一此証ニ能虫タカブルモノ也故ニ漆樓

根梹ナト加テ用又疝気之症ニ似タル事モアリ又本疝気ト思ヒ用テヨレ又此方ニ六味ノ配ノ合レテ用テモ吉又六味計モ吉又針ナドモヨシ右之如此方之証備テ疝気之コトクナルニ右云所此ノ方之証ノ見シテ余不出モアリ

一此症回加味四君子湯之症ニキル、也ウワカノキニシテ胸ソトル目付也

一此方之病人十之物ハ七八ハ能ノ必ス残ル者ノ其ニハ麝香丸ヲ二三丸朝ニ用テ吉ノ必残ルニ虫気ソイタガル者ソ其証ハ虫腹ニ動スル事有或ハ両脇ニ虫動スルヤウニヲボユルノ物ノニ三年モ沉香天丁湯之症ハナラスキワメ吉ナイモノノ右之丸薬ノ用レハ早ナシルモノソ

一婦人月水十ケ月不来常ニ悪寒脚膝痛痺ノ食少シテ身ノ疲心サワギテ時胸痛ス香砂養胃湯加飯芎芩地桂後心中悸動発シテ即悪寒シ皮膚毛立欠伸ス此方ノ用安シ

一二十歳女中気不知人手足冷ヘ食スル頃タニノ醒上気目赤ク背拘急拘痛通ス此方ニテ治タソ

一三十余之男木時ニ眩暈上気シテ面赤心悸シテ盗汗心腹両辺筋引ス此方用事ハ貼而安シ

一五十余高位女御持病ニ頭旋シ痛ム
食后ニ厥逆シテ脇亷ニ四肢冷ヘ心中
煩動ス此方用ル事十五貼ニシテ少シ
愈後加減シテ安シ

一十六歳男子風熱之症三十余日今
俄ニ昏冒シテ不知人暫ク醒心中苦
悶痛少有脉伏此方二貼ニシテ安シ

○清抑　清心抑肝湯心ヲ清シ胆ヲサユルト
云名義也乎ケ肝ヲ解ス清火化痰除
眩暈諸痛之疾ヲ

皈　芍　术　苓　陳　半　実
茹　薑　連　香　各一　門　芩　参
遠各四　苷少　生姜

此方ハ気血虚シテ兼痰火眩暈又痛

症ニ吉又疾ノ実症ニハ回眩暈門之
清暈化痰湯吉

一導痰湯ハ痰之実証ニ吉此方ハ気血虚
シテ脉モ弱キ故ニ吉

一半夏白朮天ノ湯之症ニ熱有ニ此方吉
一此方之症ニ必ス腹浮スル事有リ半夏白
朮天ノ湯吉ノ又此之証ニ大便火ニテ
燥テ結スル事モ有リ清心導痰湯吉
故ハ火ノ元ノ子細也又ハ此方ニ扈苓
加テモ吉

一婦人中毒吐血之後一身ニ斑点發則
悪寒熱シテ不知人此方ヲ用コト十
貼ニシテ安シ

一婦人気膈有脾痛ニ労弦頭痛必ス心

悸發スルトキハ則チ手足痿弱忘志 如ク醉ル如ク風雲之中ニ乗ル如ク居ル所ノ上ノ自ラ開クコトナク胸中ニ熱アリ足冷ル此類也此皆四肢厥冷スルヲ云フゴトク胃気下陷スル故一身之気虚脱暈スルニ吉其脱暈之証ヲアラハスナリ故之証アラハルヽ則ヘ疼有ル故ノ此方吉ソ

一 畢竟気草卧テ脱暈スルニハ必此方ヲ用ルソ

一 厥冷ニハ姜十ヲアル故ソ

一 沉香天ヲ湯ヲ用ルハ間毛此茶雑ヘ用テ吉此方之中ニハ君子有故也是十補一瀉十瀉一補之心也殊ニ況ヤ元気毛少カイナク脈毛欧脈毛少カイナク八猶以テ事也サナク氏沉香天麻湯

頭痛 六

○十三天 半夏白木天ヲ湯 治痰厥頭痛眼黒ク悪心煩閙上喘心神癲倒目不開四肢厥冷スルヲ

半夏 陳茶 各七分半 白苓 芎 各二分半 参 沢蕷 各三分半 曲 朮 各五分 猪苓 天 各三分半 生姜 二片

此方ハ六君子ヨリ出ル方也痰厥頭痛ヲ治スル方也

一 気虚脱暈スルニ吉其脱暈之姿ハ舟

討沢山三二百服モ用事ナリガタキソ

一目ニ一心ナクトモ気虚ニテ疾ソムカヌタカリ或ハ時々症仲ナト有ニソカヌタカリ或ハ時々症仲ナト有ニ吉ソ畢竟気虚無タル疾証ニ用ソ

一補中益気ナトハカリヲ用ソ

一一身皮膚之内ヘ水入テ有ル様ニ流行スル様ニ覚ヘ或ハ米粒之様ニ皮膚之下ニ見其上ニアル様ニ覚ヘ色悪ク気不ノ頭痛ナトアルニ用也

一此方之病症上積聚之病症ナト似タレトモ是ハ腹ニ積有カ無カナト可ノ間ノ是ハ腹ニ積有カ無カナト可ノ間ノ症ナトニキル也

一此方加味四君子湯ノ症ナトニキル也

立ク久シニヨル

一女子癈レ痙惕シ眩暈甚シクシテ不食シ悪心耳鳴小便赤濇此方用ルヿ十余貼ニテ不知人虫衝上シテ不食シ悪心耳鳴小便赤濇此方用ルヿ十余貼ニテ安全也

一男子腎虚上熱シ下冷常ニ頭痛悪心呕吐心下痞滿ス予此方十貼ニテ愈

一此方ハ東垣作ノ范天駟上ニ者之内煩時編タソ脾胃倉ニ詳也

一気ソキテ眩暈スルニ眩暈四君子湯ヨケレ共多分ハ半夏白朮天ヽ湯ヨケレ尼曲茅ハ脾胃之気ヲ消スル故ニ久ク用ヒカタキユヘソ

耳病七

○通利 通肺利気湯 治虚火升上疼

気鬱於耳中或ハ閉或ハ鳴疾久
熾盛ニシテ憂腎癆滿咽喉不利
煩燥シテ不寧 蒼朮 便 生
芎 連 各一錢
芍藥 陳三錢 防風 妙 各二錢 貝
木 芽 姜 澤瀉

一疾気腎滞シテ耳不聞ニ用ルソ
一頭ラウ〳〵トシテ疾ツカユルニ用
一腎虚シテ耳不聞ニハ滋陰通耳湯
ヨシ多用テモ不苦ト方也故モナキ
一病モ不生シテ不聞吉ソ
一厚味十ト三ノ不聞ニハ防風通聖散
十上回春耳門三方委ク有

○東方 柴胡川芎湯
柴 西 桔 参
芩 羌 各一錢
飯 防各二錢 升 甘
芍各三分 枚
三錢 芽少
此方ハ風眼頭痛ニヨシ又九文三二
黄合テモヨシ眼ニ血多クヨリカスミ
腫痛ニモ佳也ウヒカミリタルニモタ
ノ頭風ニモ吉也

心痛 九

○加七 加味七気湯 治七気病テ發心
腹刺痛ニ欲死
半 延 胡各二 参
姜 乳各一 芽少
一婦人ニハ加飯 芍各一匁

一是ハ心氣痛方也

一治心痛欲死方ソ

一小女時腫テ痛ヅヒテ不能言語欲
二十心痛甚フシテ
死此方一貼用テ治タル事アリ

一此方婦人ナト腹盛アツテ心痛欲死
先此方吉也

腹痛 八

○三因七 七気湯

半五分 苓四分 朴三分 薤二分 姜棗ノ

一治虚陽上攻メ上盛ニ下虚メ痰延
壅盛ヲ又名ク四七湯ト

一三因十八方考ニ曰外ハ六淫内ハ七情
不内外内ハ飲食之所為之病也

内上云ントスレハ外ヨリ入邪ヲ外ト
云ンスレハ病内ニ有故ニ不内外因
上云也其心腹痛ムヲ治スル故名ク
三因タリ輒中方也

一壽徳巻ハ此方ニ加梅沉桃心痛
腹痛二切々用テ得効ヲ語フレタリ
予モ治教人無不治妙可秘

一七気相干陰陽不得升降攻衝
作痛者ハ此方主之也

一考ニ七気者寒気熱気怒気恚気
喜気憂気愁気也以三因而曾七
気升降有殊則攻衝テ而痛ム是
方也薤之辛芳可使散七気
朴ノ温苦ヤ可使下七気半ノ辛

温苓ノ次ニ可使乎水穀之相
干スノ之七気ヲ
一虚陽上攻上盛ニ下虚ヲ疾延蹇盛
スルニ此方ニ屈鍼ヲ加ヨ
○蟠葱 蟠葱散
苓 桂 芎 芍藥 甘草 宿 柴胡
丁皮 延 蒼 葱一本 桂 乾
或朱木各一虚寒甚ニ一味
治腑胃虚冷ノ心臓胸肋痛テ胸
痞悪逆及ビ外腎腫痛ニ及ビ女人
血気攻撃腹一切疾痛ニ吉
一婦人産後悪ヲ下ス事少シテ何ヤラン
胸ヘ冲上テ腹痛ム処寒ス状ト如手ヲ
大閙乱ス種々ノ手ヲ与ヘ悪不治ニヨ

ツテ此ヲ用タハ一貼ニ
三升ニシテ安シ
一一人小児食瓜蛟腹ス此方ニ加ヌ
立ドコロニ安全ス

【痛風十一】

○疎経活血湯 治遍身走痛ス如
刺左足痛ミ尤甚シク左ハ属血多
因テ酒色ニ損傷筋脈虚空ニシテ被
風寒湿挽感於内熱包於寒ヲ則痛
傷筋絡ヲ是以晝軽シク夜ハ重シ宜
以疎経活血行湿此非白虎歴

節風ニ也

蒼朮 陳皮 桃仁 蔵谷一銭
芍藥 羌活 防風 各六分 飯一銭二分

芍一錢半　胆六分　芩七分半　姜四分

忌生冷濕物ヲ

古今医統ニハ疎經活筋湯ト有ルハ誤ナリ此方ハ龔廷賢カ方也

一此方ハ實ハ痛風ヲ治スル吉ソ

一酒食ニ傷テ經絡虛シテ風濕痛風ニ成タルニ吉実ハ血虛シテ感風痛風ニ成ニ依テ昼ヨリモ夜甚シク痛ム吉ニハカレコ痛ム吉

一煩ハ痛風テ実ハ虛証也

一左痛ムトイヘトモ右ヲ之痛ニモ用ソ

一婦人復盜汗有テ脉細数也是滋陰降火湯ノ症也故ニ滋陰降火湯ヲ

用テ諸証退ヒテ然シテ後キ痛テ不レ止ハ此方ニテ治ス多ク懐姙之丹ナル故ニ膝桃ニ味ヲ去用也

一痛夜計ニモカギラス用テ佳也

一中風ニテモ或ハ脚気ニテモ諸病成ル尼身節走痛ト云者ハ先此方用テ痛ヲクツロケテ吉其時ハ指合之薬ヲ能ク可レ去又隨其症ニ加減セヨ

一血虛ニテ痛ミノ有ニ四物湯ニ知栢ヲ加テ用ント思フ処ヘハ此方吉ソ但滋陰降火湯ノ証ニテ胞甚タ痛テ疼ムカヘタルニ此方用痛クツロギタルソ後ハ瓜蒌枳實湯用テ疼ム遅ケタルナリ是ハ血虛ノ經絡虛シテ風濕ニ感シ

節ノ痛ヲヨキニ專用ル方也心痛ニモ肩腰之痛ニモ夜ヨモキニハ必用酒好ニ色欲ヲ過シテ虛シタル人身ノ節痛ニ用也

○三痺湯 三痺湯

續仲防 桂細參苓 芍飯芎 蚌獨各一錢 芪縢各二錢 茸少姜棗

治男婦血氣凝滯手足拘攣風痺氣痺等此方ハ細ク前カトヨリ用方ソ

一此方痿痺ニ用テ吉故ハ痿痺ハ血虛

一中風ニテモ又何之病ニテモ足シタルク重ビレテ不仁スルニハ此方吉

一中風ナトニモ痿痺スルハ用ル事ノ

一類栄湯ハ腰ノヌケタルニ吉香風ナト不知ヌハカヌニ吉第一血虛故ニ右之症見ユルナリ

○清化 清濕化痰湯 治周身四肢骨節走注疼痛寒ヲ會ヲ胃脘ニ又作寒熱喘咳煩悶或ハ作腫塊痛難轉側或ハ四肢麻痺不仁或ハ背心一點如氷冷脈滑乃是濕痰流注經絡開節不利故也

星半 陳苓 蒼羌芩 芎瞿各一錢 木五分 甘少薑汁丹溪カ濕痰故百節之痛ニ此方用ノ又依濕痰ニ遍身疼痛スル者ハ

除湿化痰ニヨリ此方健立ニ攻方ノ
一痛風モ寒ニヨルハ五積散風湿ニヨルハ九
文散湿痰ニハ此方吉痛風門ノ可見
痛ニカキラス用ユルコトモ有
一加味四七湯症ナレ先ヘユカヌニハ結句此方
ヲ用テ吉痰気之ツカヘ梅核ニヨキソ
又咳嗽ニモ吉脇痛ムニ能用ルソ白
苓股ヘヨク引テ行胃腑之気ヲ利シ
痰ニヌケクラス
一泥香人湯症ニテ痰ツカヘ胃苦キニ用
一痰胸ニツカヘ身ニ痛有ハ必此方吉
一有痛ミ胸イタムニモ吉
一胸脇ニ痰有テカラヌタル様ニシテクツロ
カヌニ此方用ソ畢竟ハ痰ニ吉ム

○加仙加味八仙湯 治手足麻木或ハ痛
木二銭 苓五分 陳 芎各三分半 守各三分 参 芍各二分半 車二分 枝 芷一分半 姜枣
湿痰内ニアツテ手足ニビレヒリクトシ
痛ニ用ル畢竟ハ気虚也又ナヘテ痺
ハ血虚也山枡ノ如ク食タル口之跡ノ如ク
又シバリテ縄解タル跡ノ如ナル吉畢
竟気虚之症ハ痰テシビル也此方気
虚ヨテ風湿ニ感タル衛症ニ吉
一右二方ハ虚証ニ用又気道不順ニノ
中風ニテシビレ痛ニハ烏薬順気吉ソ
一湿痺ニテ肥盛之人ニハシビル煩出者
ソ此方吉故ハ肥盛之人ハ虚ノ湿

亢者故ニ佳也右独奇此方ニ疎經
活筋湯ハ血虚ニモ氣虚ニモ用也又
気計不順ニメ中風又ハ一身麻痺
スル為ニ烏茎順気散吉ソ
一上体麻木気虚也十ハ腰ヨリ上ヲ云補
中益気湯之類吉一身麻木モ補中
益気湯也
一十指麻木ハ湿痰瘀血也此方吉ソ
一慾別気ヨリ順スルタメニ皆酒ニテ製ス方ヨク取分吉ヒリクキテ酒
一或人上体ヒリクトメ取分ニ此方十余貼ニテ安レ
味ヲモ不覚ニ此方ニ古ハ皆中風トス烏茎
一麻痺痿痺ヲ古ハ皆中風トス烏茎
順気散ナトヲ用然ル先痺麻スル者ニ
此方用テ吉也

○木香湯
木香 通草 桟皮 沢瀉 陳皮 茴香 枳殻 各五ま
裏気凝滞小便淋瀝身冷者名気淋
一俄ニ吐逆シ茶ナトヲ受テ結句吐逆
スルハ鼠尾草一味如常煎ジテ用ヒ
妙也又小便不通ニカタベニ妙也又
イナゴノ黒焼馬口ニヌルトソカタベモ細
ニシテ小便之穴ヘヒネリ入ルトソ
一大便之サレ茶ニハ塩大匙少フクリニ
テ入トソ厚紙ニ包ミカタメテサシ入
ルトソ
○八正散 治心經蘊熱藏府閉結小

便赤ク渋リ隆閉不通及熱淋血淋ノ大瞿通滑 蒼朮 車前子 各等分

一壮年之男淋証有テ不用茉ノ自愈而後腸脚腫脉濡ナルニ此方ニテ吾淋病ニ脚モ腫ノ茉ヲ用テナラハ腫タルト愈々ト云カ目付也

一小便不通何モ可用アナガチ淋病テモ淋病ノ処ニカイハアルニジケヒ自ナク尼腫気有テモ小便不通可用大小便尼ニ不通ニ用ソ

一通茉ト誰モ知タル尼切カニ通茉トハ他医不知ソ

○龍泻 龍胆 泻肝湯治肝経湿熱或ハ

嚢癪便毒下疳懸癪腫痛煩作小便渋滞或ハ婦人陰癪痒痛ノ痛ミ或ハ男子陽挺腫脹或ハ出膿水ヲ

胆 沢瀉 各一匁 車前子 萆薢 各五分 甘草 少 水煎

右方淋病ニ用テ効ヒ有リ小腸膀胱之湿熱ニテ淋有ハ五淋散ト正散ヲ用テ吉ソ肝経之湿熱ニテ淋有ハ竜膽泻肝湯ヲ用テ吉ソ

一壮婦七八年程帯下ヲ患ヒ申柿ノ様ナル物ヲ下シタヅ諸医束手不効此方ニテ愈タソ其内ニ小便渋リ上云ヲ目付ニシテ用タソ是ヒ肝経湿熱故ソ八正散ノ類ヒニテ不効故ニ此

方ヲ用也

一男子患風眼血大ニ三痛不可忍不可能見也竜胆瀉肝湯ニ加芎細辛兼用テ大ニ有効也

婦人 十三

○柴抑 紫胡抑肝湯

厄青防蒼各一銭 香附各一銭 赤朮各二銭半 甘草五分 牡丹皮一銭半 曲五分

一此症八寒熱往来ヲ治ス如癇讝ス之方ソ

一古今医統婦人門ニ云ク治寡居独女之方也

陰無陽慾崩而多クシテ不遂是以憑寒殺熱全ク類癇ニ云云

○四物 四物湯加減 治婦女或八十亜六歳経脈不行日夜生寒熱手足麻痺飲食少ク進ミ頭痛悪心呕吐腹中忽然結塊冲動者此憤ニ食生冷ニ傷感シテ致ス也

飯芍 当帰各一銭 芎 地黄各一銭半 甘草 陳皮各五分 茯苓 人参各四分 香附一銭二分 青皮 延胡各五分 紅花 生姜三片 葱白 三根

婦人月水閉テ腹ニ結塊有ニ用方也延胡ト蘇木ト血ヲ破リ通経ス

柴熱ヲ醒シ安胎スルソ

一十七八歳女子毛月水不来シテ寒

熱往來シ頭痛ニ手足麻痺等ノ症ヲ治ス
云テ堀有ル処ヲトドル等之症ヲ治ス
ル方也委クハ回之本能ニ見ヘタリ
可見合ス

一戀〻月水ヲ調ヘ六回春婦人門之初
方吉調気養血湯也順其気調其
經上云ヨリ建立レタ方ソ則チ方
香附ニ〆烏飯芎芍芎各一匁
各半分

一若有塊不通須与調經丸間服ス

一遍身疼痛ニ加羌独

一咳嗽加杏五味各五分肚痛ニ加香
附乾漆各七分

一瘧疾ニハ加草菓常山ノ

一泄瀉ニ去ニ枳ニ加肉蔻

瘡瘍十三

加五　加味五香湯

沉香　木香　乳香　丁香　藿香　外各一銭　通大各五分

此方ハ本五香湯升麻葛根湯ト合シ
翹通大ヲ加ル方ノ〆赤苓ヲ加ヘ用ル
事モ有又五香連翹湯之輕キ者ソ
故ニ瘡腫物ニ吉ノ小児ニ專ラ用ソ

一小児瘡深キ十ニ云ニ吉或ハ甲瘡或ハ
一身ニ瘡沢山ニ有テ痛痒スル子ニ煎
メモフリテモ用ソ

一扨此加味五香之方ハ何之昏ニアルモ
不知今私ニ按ニ沉ハ気ヲ養風濕ヲ

排痲痺スルヲ治ス木ハ冷之虫積ヲ
治而脾胃之気ヲ盛ニシ散滞気ヲ
ヘ鬱シテ不達ヘヲ之ヲ右ノ二味ヲ以腫
物癤之由ハ気不ル行故出ヲ行気ヲ
テ經ニ有ル風湿順気ノ故ニ散スルソ
乳ハ子ブト癈腫物ヲ能除気ヲ下ソ
痛ヲ止ム活レ死血ヲ消ス癈毒ヲ尤モ吐逆
ヲモ止ソ下ハ能虫ヲ治シテ脾胃之
気ヲ盛ニシ風痰ヲ去テ吐逆ヲ止ル物
ソ蘗ハ解表散風湿ヲ脾胃之気ヲ解
ノ呕吐ヲ止テ食ヲ進ムルモノゾ脾胃之
気ヲ醒スムストハ熱気ヲ醒ニハ不有ラ
脾胃ヲスコヤカニスル事ソ升ハ入陽
明之經ニ解肌肉之門風熱癈腫ニ

腹血ヲ散スル者ソ葛ハ解肌發表醒
熱毒ヲ消シ酒毒胸膈煩熱升胃気故肉
間ノ解癈毒痘癈出カタキヲ觝ク出ヲ
以知ヘシ翹公癈痘癈癩瘰癧悪癈排膿
止痛心家客熱五淋小便不通芍ハ
和血脉癈腫瘡癈血熱甚ニ用ヒ吉
茉ノ右ノ五味血熱風熱ヲ醒清シテ身
十二經絡ニ和ス胃気故ニ癈外ニ出毒ヲ
内ヨリ消スル茉ノ扱木通ハ通利九竅
血脉関節癈之痛ニ胸中之抵物レ
テニ焦熱ヲ下シ下ハ小腸膀胱ニテ火
熱ヲ小便ヨリ通スルノ大ハ諸之実熱ヲ
下シ血打々カレナトシテ滞リ風湿容肌
肉滞テ不散加熟遂ニ爲癈癩已ニ成

近辺之為膿熱毒急攻枯肉アルヲ下シ
彼ノ実熱下スニヨッテ最モ下ル余之血モ又
彼半枯タル血肉モ清潔ニナルソ右
之二味又熱毒ヲ下利スル茅ソ
一雷炎ハ此方ニ連青芎ヲ加テ遣ハ
ル也連ハ心火ヲ清シテ熱ノ虫ヲ治ス
常ニ用ルハ癖腫物ト瘡疹ノ難ヲニヌカ
ルト也青ハ両之虫積ヲ治シテ殺馬ー
風ニ吉肝之大過ヲ平クルソ芎和諸
茅ノ補胃気茅也癖腫物ナトアルハ
食ニ無味痩衰ヲ者ソ芎ヲ以食ヲ
進メ気ヲ強クスルソ
一升麻葛根湯方中ニ有故ニ表気ヲメ
クラメ癖ニ吉ソ

一此方ハ瘡癖十七ノ餘熱餘毒ヲ治ス
ルノ瘡後アレウビト云テ此彼コノ節ヘ
之腫痛ルナト二用方ソ畢竟五香
連翹湯之輕キ剤ソ小児計ニモナク
猶大人ニモ子ブト無名癖又癖深ニ
用吉大歿此方ニ差ヲ加吉ソ

○二八 十六味流気飲

厥芎 芍 芪 参 桂 朴
枳 枳 烏 木 芷 防 蘄
芎各等分 姜棗

治乳岩乳癌加青又治瘡疹餘毒
癌瘤気腫ノ之方也
一扨気腫ト八三四年モ有テサノミ膿
不出黄汁計出ルコトソ是気之滞也

血腫トハウミツブレテ膿血ニ成テ多
血出ルヲ云
一一切之無名之腫毒ヲ治スルソ
一婦人乳核ト云テ乳房之内ニ碁石之
様成者アルニ甚煩者ソ乳岩ナラハ
難治
一瘍之餘热餘毒作ニ腫煩ヲ治ス瘍愈
後必スアレウゾレト云テ手足ナトニ腫物
デルソ此方吉或消毒飲加木用テ
可也傳ニ瘍疹余毒ノ According ニ輕キハ消毒
飲重ハ此方酒炒将ナト加用ル者
消毒飲方 太カ子二分 一錢半 防分
一或人初ハ咽煩後ハ頸筋ヘ上リ寒ソ
热往來ス回春之方色々用レトモ
不ニ効ス此方ニテ治タリ
一此方瘰癧ニ吉ソ瘰癧ニハ必寒热アル者ソ
一或人久腕煩テ後少シ腫上リテ此彼ヨ
走注シ煩ミ他方種々用テ不ニ治是
気煩ト思テ此方ヲ与ヘ治タリ
一或人目ヲ久ク煩ラヒ夜ニ煩シ星出タルニ
用テ治タソ鬼角気ノ煩シタラハ可レ然ル
ト思ヒ用タソ夫目之煩上ニ者逆気ア
ツテ血モ随テ上ニ煩ソ故ニ気サヘ順タラハ
ヨキハズソ気煩スレハ血モ煩スルソ
一或ル人目膿煩ミ膿出タルニ用テ治タ
畢竟ハ煩気之方也
一乳岩乳癌ニ青ヲ加ヘ便フ婦人ニアル

者ノ症ハ乳房ノ内ニ碁石之様ニ物
アツテ甚タ痛ム者ノ此方ニ青ヲ加
用十余之効アリ余方ニハ治シカタキ
ノ後ニカウゾ乳岩ト云者ニ成ノ青ヲ
加ヘ用ル事ハ青ハ入ニ厥陰経ニ疎厥陰
之滞ル也乳ハ属ス厥陰之支ニ故ニ以テ
青入厥陰経諸茉治スルノ次ニ乳
岩乳癌ニ成ル故ノ云ン正傳ニ丹溪カ
日因ニ乳母不調養ヒ致ス也蓋シ乳母ハ
陽明属経乳頭ハ厥陰ニ属ス念テ
要逆鬱悶ニ遇厚味ニ酖釀以テ致
厥陰之気不行故ニ疲閉シテ不通セ
陽明之血沸騰故ニ投甚シテ化シテ
膿トナル或ハ因テ酖乳之子膈間痰

滞ル舎乳而膿ヲ去リ乳燃挽シテ成ス
成結核初便忍疼按シテ汗透可散否則結成ス矣云如此
而後或爲乳癌ト
○五連　五香連翹湯治悪瘡癌疽瘰癧
等病　乳木二ノ五分　荊芥二ノ五分　獨活各七分半　沉二ノ五分　丁四分　大分
廣香不用　甘生少
倣ノ諸瘡門ニ各等分ト有又鑑ノ
瘡瘍三両日甚タ異也
一小児之草或ハ田ノ瘡乳癌ナト患ル
十上二專ラ用ノ熱気有ニ吉一貼ヲ
二ツニ分テ煎茶ニシテ飲スル也投
気十久只虫計ニハ五香連翹湯ヲ

撰アラハ不可用ト云ヘリ

一腫物ニ專ラ用ル方也故ニ人目ニ屋出來ス全曰是モ腫物之タグヒナルホトニ此方可然ト云ヘリ

ソノ樣ノコトハ醫者ノ作意也

○升麻和氣飲　鹽ニ云治ス瘡腫癤疹痒痛

升麻　桔梗　甘草各一錢　陳皮半夏各一分　茯苓　芷乾大只各五分　芍藥半

右水煎服俗ニ云風ボロセニ吉ソ

金樸硝

○三五

參　朮　苓　芎　甘草各一錢　飯　熟芋　桔梗　芷　烏藥　香附便各一分　沉五分

木一分甘少

一異本ニ去香附加大ノ此方ハ三好殿之秘方也　本長殫正殿之秘方ト云也

一血脫眩暈スルニ吉或手負産後之気付ニ吉下血之アルニモ用コトアリ

一此方モ沉香天麻湯之症血多ク脫タルニ何トシテモ沉香天麻湯用ヒ治セザルニ此方吉ニ

一予治ス一人二十歳室女去年九月産而後有憂恐之支俄眩暈シテ倒臥人ヲ不知食スルハカリニシテ難カヘル全ク知覺身冷唇青ク脈沉伏沉香天麻湯用身冷暴冷ス

ルヿ甚シク發スル八則チ心遠ニ用ユル方ヲ
七貼ニテ治ス○安栄湯益栄湯
養血湯十上錠ヲ打テ遣ル也
一此方根本産後手負血脱スル事多
キヲ以テ出ニ血ヲレツムル茶ソ血ヲ
くトタリ止兼目舞ナトスル二效ソ
一ツキ疵八各別也與ニ瘀血アルユヘニ
桃紅大之瘀血ヲ破ル茶ヲ加也
切疵八此方之類ノ補茶ヨレ口開
ルユヘツキテノ疵トハ相違ソ
一散茶ニテ産後手負之氣付ニ用
也産後十二瘀血有テ腹痛ニ或
ハ熱気出ニ八此方ニ桃ナト又ハ紅
皀尾ナド加用ルソ手負ニ血筒

ヘ入捻モ有ト云ハ大火ニ桃紅ヲ加
テ吉ソ
○寛中圓 三皀傳ニ治撲損服之ヘ
痛立トコロニ止ム 巴十粒去皮心如常
百草各三匁 茶各三匁 大連各一朱 幸兵
三四五十丸上八味末シテ●丸ス
一切疵ツキ疵打撲ナトニノ腫痛專ラ
用也扨右之証ニ前茶ハ何ガ吉ヲ
ンヤ云ニ三五味一段吉又沉香湯
ヲモ用ソ一服一匁 參沉大各五分
○蒲黄散
耳火 右方産後手負之氣付也
草全ハ蒲バカリモ用ラレタソ

雜方

○香正　青香附　木朴
苓八分　莪稜　桔各七分　腹
宿半蕪　藿各五分　芥少　姜壹
○又方　香附　宿朴　腹
莪蕪各三分　陳青各一　苓
木稜　兵藿　半桔二分
二朱　芥少
此方ハ通仙ノ配劑也諸ノ蓄積二諸
菜不効二妙也虫積持病之人之風
症二妙也虫積有テ腹脹ヲ目付ニス
ル也又虫積之人咳嗽ナトニテ積熱
又腹脹何ニモシレヌ二吉又俄二耳不
聞胸ツカヘ不食スルハ是積也此方吉

○茯神散　苓參
五分　小豆五分　菖各一　神各
此方治婦人風虛与鬼久ク通ジ妄ニ
有見言語雜乱也婦人狐ト数度會
合ス其ノ後乱心大半ニ右之方ニテ作
効アリ
○分氣散　香附八匁　莪
芥松各一分　芥三分　木
世俗云神効圓也医書大全治一切
氣逆心胸滿脇腹腸虛脹尤甚タ有
神効也

日用功方卷之四終

此書一帙者予師啓迪先
生日用功方也今見傳世
燈下其誤不可勝數悲哉
庸醫陷于謬妄故愚不揣荒
陋加批點鋟梓廣其傳意
可爲治病之一助云
于時寛文五載歲在乙巳
孟春之吉
洛下　金澤氏
謹誌之

寛文拾一年辛亥正月吉日
二條通松屋町
武村市兵衛刊行