





首之卷

序  
凡例  
目錄  
用藥一字銘

自一至初  
自二至初  
自三至初  
自四至初  
自五至初  
自六至初  
自七至初  
自八至初  
自九至初

卷之二

中風  
類中風  
傷寒

初表  
九丁裏

卷之三

中寒  
火症  
中暑付霍亂  
中濕  
內傷  
飲食付痞滿  
痢瀉  
痢病宜與泄瀉交考

初表  
六表  
七表  
十三裏  
十五表  
廿裏  
廿六裏  
卅裏

增補衆方規矩叙

醫方濟世之書古今所  
傳不爲不多矣唯近世  
所行之衆方規矩雖甚  
小簡而萃於高驗妙  
效者也友人永原了の  
鑿生嘗見此書不題病  
門而徒雜記群方恐  
初學者或復求藥方而

新文正入卷序



紛紜莫知適從常以爲  
憂故每有閱舊典分類  
異門間亦補書於要方  
之闕者數百品而名曰  
增補衆方規矩予披看  
之古方之宜今者更互  
演繹而無不兼載且至  
婦人小兒之科而增者  
倍蓰於舊本蓋療病者

雖不必稽古籍隨索得  
之如視掌是亦於救民  
命起沈痾之大功豈小  
補哉一日剗刷氏來謂  
曰永原氏之增補欲以  
鏡於梓請其有魚魯之  
差烏焉之謬者訂正之  
而亦冠其端以數言予  
管見淺學辭而不許遂


塞其需云

昔

延寶丙辰春三月朔旦

洛下後學山田 立朴

題于泉陽旅舍



增補衆方規矩凡例

- 一 舊本不分病部今皆分之
- 一 凡每門先書舊本之方次以增補之方其增書之方首白書補字分舊補固舊本盡無方之病門其病門之上白書補字
- 一 凡記藥方或當前記而後改當後記而前者間有之今不拘前後先書舊本之方次以增方且加減之中亦有可記者題白書補字書其下
- 一 藥劑之分量雜出于諸書者有異同今考止可受用者書後

○一字 二分五厘也

○一銖 四分一厘六毛 即二十兩之一

○一分 即一兩之 二分五分也 四分一也

○一兩 十文也

○一斤 百六十目也

○一觔 即一斤也

○一束 三十目也

○一把 二十目也

○生姜一片

按生姜之分量諸書載之希也今見聶尚恒奇效異述生姜三片為引約重一錢云云依此說則一片之重六分六厘餘也然異述所用藥劑一服之重大抵八錢以下七錢以上也而用生姜太抵一片唯發表之劑用三片今見本邦所用之藥劑一服之重僅不過二錢則生姜一片重用一分六厘可乎此折衷異述所記之分量為則以便幼學

一水一盞

按醫學正傳凡例曰凡云用水一盞即今之白茶盞也約計半斤之數云云此亦異邦太劑之分量也今見本邦所用之前法藥劑少而水甚多

若以正傳所載一盞為止則  
本邦之小劑水一盞僅不及  
三十錢用之者宜詳之

○杏仁十介 去皮尖 九分

○桃仁十介 去皮尖 七分五厘

△和之分量

○一朱 二分五厘也

○一歩 一分二分也

○一兩 四分八分也 或四分○  
或五分○

或四分  
三分也

○一斤 百三十目也

增補衆方規矩凡例終

增補衆方規矩目錄

卷之一 ○中風 初丁  
表

一 八味順氣散 初丁 三 烏藥順氣散 初丁  
裏

二 防風通聖散 滕黃飲子  
三ヲ

四 小續命湯 四ウ 五 大秦朮湯 六ヲ

六 加減除濕湯 六ウ 七 加減潤燥湯 七ヲ

八 勻氣散 七ウ 九 補養榮湯 七ウ

十 三生飲 星附湯  
八ヲ 十一 貝母瓜蒌湯 八ウ

十二 愈風湯 八ウ 十三 加味大補湯 九ヲ

○補類中風 九ウ

十四 附子理中湯 九ウ 十五 木香順氣散 九ウ

十六 加味二陳湯 十ヲ 十七 加味四物湯 同

十八 加味六君子湯 十ウ 十九 補中益氣湯 見內湯  
十一ヲ

○傷寒 附 傷風 虛煩

十二 香蘇散十一 芎芷香蘇散 行氣香蘇散  
香蘇散 正氣天香湯 香葛湯

一十九 參蘇飲十三 二 茯苓補心湯十五

三十九 藿香正氣散二香散 十五 四 人參敗毒散十七

倉廩散 交加散 荆防敗毒散  
平血散 加味敗毒散 祖傳敗毒散  
加減敗毒散 五 升麻葛根湯廿

六十九 不換金正氣散加減正氣散 廿一

七十九 十神湯廿二 八 小柴胡湯柴苓湯 廿二

大柴胡湯 敷和湯 加味小柴胡湯  
陶氏小柴胡湯 和解散 火邪湯

九十九 黃連解毒湯廿七 八寶湯 溫清湯

白虎湯廿八 化斑湯 陶氏白虎湯

一 桃仁承氣湯廿八 三 乙承氣湯廿九

調胃承氣湯廿九 四 小承氣湯廿九

五 大承氣湯卅 六 加味承氣湯卅

七 涼膈散卅 清心湯 雙和湯 八 八解散卅三 萬安湯

九 溫膽湯卅二 竹茹溫胆湯 十 加味溫膽湯卅三

一四 補九味羌活湯卅三 二四 六一順氣散卅四

三四 清火化痰湯卅五 四 芎蘇散卅五

五 麻黃湯卅五 陶氏麻黃湯 六 六神通解散卅六

七 桂枝湯卅七 陶氏桂枝湯 西春桂枝湯 桂氏黃芩湯

八 紫葛解肌湯卅七 九 益氣養神湯卅八

十 梔豉湯卅八 一五 三白湯卅八

二五 加味益氣湯卅八 三五 桂枝大黃湯卅九

卷之二 中寒

一 理中湯初 附子理中湯 治中湯 補中湯 四順湯 陶氏理中湯

三 五積散三 三 補四逆湯陶氏四逆湯

四回陽救危湯五ウ

補火症六ウ

五黃連湯六ウ

七黃芩湯六ウ

六柴胡湯六ウ

八芍藥湯六ウ

○中暑附霍亂七ウ

九五苓散七ウ

十加味四苓散八ウ

二十清暑益氣湯十ウ

五十六和湯十一ウ

七十九君子湯十二ウ

九十藿香正氣散傷寒十三ウ

○中濕十三ウ

四回陽救危湯五ウ

補火症六ウ

五黃連湯六ウ

七黃芩湯六ウ

六柴胡湯六ウ

八芍藥湯六ウ

○中暑附霍亂七ウ

九五苓散七ウ

十加味四苓散八ウ

二十清暑益氣湯十ウ

五十六和湯十一ウ

七十九君子湯十二ウ

九十藿香正氣散傷寒十三ウ

○中濕十三ウ

九獨活寄生湯十四ウ

二補滲濕湯十四ウ

四除濕湯十五ウ

○內傷十五ウ

七升陽補氣湯十九ウ

九正氣補虛湯十九ウ

○飲食附痞滿同

一平胃散調胃散 和氣散

不換金正氣散柴平湯

二香砂平胃散九ウ

四香砂養胃湯九ウ

六消痞湯九ウ

八葛花解醒湯十五ウ

十四行氣香蘇散十六ウ

三除濕羌活湯十四ウ

五加味五苓散十五ウ

六補中益氣湯加味益氣湯同

八補參朮調中湯十九ウ

十三參苓白朮散十九ウ

吳茱萸湯

和氣散

對金正氣散

三養胃湯九ウ

五香砂六君子湯其のウ 養胃湯

七補陶氏平胃散十五ウ

九內消散十五ウ

十四藿香正氣散傷寒十五ウ



二四 枳實大黃湯 世六  
三四 解鬱和中湯 世六

○泄瀉 同  
四四 胃苓湯 同

五四 胃風湯 世  
六四 補理中湯 世八

七四 四苓散 世八  
八四 加味五苓散 世九

九四 香砂平胃散 世  
一五 加味二陳湯 同

一五 參苓白朮散 同  
二五 香砂六君子湯 世

三五 藿香止氣散 同  
四五 升陽除濕湯 世

五五 補中益氣湯 同 見內傷

○痢病 宜與泄瀉交考  
六五 芍藥湯 世

七五 調和飲 世  
八五 參飯芍藥湯 世

九五 和中湯 世  
一六 一方 世

一六 補導滯湯 同  
二六 治痢奇方 世

三六 倉廩散 世  
四六 補中益氣湯 同

四六 八物湯 世  
五六 真人養臟湯 世

卷之三  
○瘧疾 初

一 九味清脾湯 初  
二 七味清脾湯 初

三 人參養胃湯 二  
四 補散邪湯 三

五 正氣湯 四  
六 人參截瘧飲 四

七 七寶飲 常山七寶飲  
八 不二飲 四

九 柴苓湯 五  
十 柴胡芍歸湯 五

一十 參歸鱉甲飲 五  
二十 老瘧飲 五

三十 加味益氣湯 六  
四十 加減十全大補湯 六

五十 參歸養榮湯 六

○諸氣附鬱証 宜與虛損考 六

六十 分心氣飲 六  
七十 七氣湯 加味七氣湯 八

八十 四七湯 八  
九十 加味四七湯 八

十二 三和散 九ヲ

一十九 分氣補心湯 十ヲ

二十九 木香流氣飲 二十四五 流氣飲

三十九 木香調氣散 同 蘇子降氣湯 七

五十九 補上下分消導氣湯 七

六十九 加味四君子湯 七 紫蘇子湯 同

八十九 正氣天香湯 傷寒 七 沉香降氣湯 十三

九十九 柴胡抑肝湯 鬱証 七 補當歸活血湯 十三

二九 香砂平胃散 十四 瓜蒌枳殼湯 同

四九 二陳湯 痰門 同 六鬱湯 十四

六九 解鬱調胃湯 同

七九 痰 宜與氣 痰門 交考 二陳湯 升發 二陳湯 十五

八九 加味二陳湯 十七 同方 同

十 枳縮二陳湯 十八 香砂二陳湯 同

二四 導痰湯 十八 清熱導痰湯 加減導痰湯

三四 瓜蒌枳實湯 十九 補清神湯 七

五九 桔梗湯 同 丹溪加味二陳湯 同

八四 清肺湯 七 參蘇飲 傷寒門 七

八四 咳嗽 可與痰 門 互考 加減瀉白散 七

一五 東垣加減瀉白散 七 補瀉白散 七

二五 橘蘇散 七 東垣加減三奇湯 同

四五 貝母湯 同 人參清肺湯 同

補喘急附吼哮 宜與痰飲 咳嗽 互考

五五 神秘湯 七 定肺湯 同

七五 清肺湯 同 瓜蒌枳實湯 同

又 加味四君子湯 同 理中湯 九

十六 蘇子降氣湯 見氣門 同 大降氣湯

補 饋雜九四

二六 二陳湯同

四六 香砂平胃散同

○嘔吐 附 吞酸 噯氣 呃逆九五

六六 清鬱豁痰湯同

八六 理中湯同

十七 藿香正氣散傷寒七 卷之

二七 加味六君子湯同

四七 治吐清水方同

六七 透膈湯同

八七 二陳湯同

十八 丁香柿蒂湯同

○翻胃 與嘔吐 可交考

一六 化痰清火湯九四

三六 當歸補血湯同

五六 消食清鬱湯九五

七六 補保中湯九五

九六 加味二陳湯同

一七 香砂平胃散飲食 同

三七 白朮湯同

五七 清鬱二陳湯同

七七 加減二陳湯同

九七 理中湯同

一八 香砂和中湯九五

二八 寬中湯同

三八 順和湯卷之

五八 生津補血湯卷之

七八 五噎湯同

卷之四 ○虛損 附 虛勞

一四 君子湯吳功散 六君子湯 香砂六君子湯 衛生湯

二四 物湯參朮白朮散 惺惺散 八味順氣散 四物苦練湯 增損四物湯 加減四物湯 調氣養血湯

三八 物湯同

四 十全大補湯同

五 補雙和散同

五又 歸脾湯加味歸脾湯

六 清離滋坎湯同

八 人參養榮湯同

十 保真湯十四

四八 當歸養血湯同

六八 補安胃湯同

八八 五膈湯同

七 茯苓補心湯十三

九 鱉甲地黃湯同

十 和中湯同

○血症

吐血 衄血 腸癰 下血  
瀉血 肺癰 肺痿 腸癰

二十 加味犀角地黄湯

二十一 補清肺湯

四十 滋陰降火湯

五十 黃芪湯

又 清火滋陰湯

六十 清咳湯

又 清咯湯

七十 清唾湯

八十 補榮湯

九十 加減四物湯

十二 加減逍遙散

一 理中湯

二 解鬱湯

三 治鼻衄方

四 又方

五 清肺湯

六 當歸和血湯

七 敗毒散

八 胃風湯

九 生地黄散

十三 清腸湯

一 桔梗湯

參 參芪補肺湯

三 參朮補脾湯

四 治肺癰方

五 人參平肺散

六 三仁湯

七 牡丹散

八 大黃湯

九 四迷七氣湯

○積聚

一 柴平湯

十四 補潰堅湯

二 青皮湯

二 枳殼散

○水腫 附鼓脹

四 分消湯

五 補中治濕湯

六 五皮湯

七 廣茂潰堅湯

八 補加減胃苓湯

九 加減枳朮湯

十五 行濕補氣養血湯

一 和榮順氣湯

二 寬中養胃湯

三 木香順氣湯

四 分氣紫蘇飲

五 艸豆蔻湯

○黃疸五

六五 清熱除濕湯九

七五 補茵陳湯同

八五 茵陳大黃湯同

九五 腎疽湯同

十六 黃芪湯同

一六 白朮湯九

三六 秦艽湯同

補疝氣同

三六 吳茱萸湯同

四六 神効湯同

五六 烏苓通氣湯同

六六 烏附通氣湯共

七六 五積散同

八六 行氣香蘇散同

九六 三和散同

○汗症同

十七 當歸六黃湯同

一七 當歸地黃湯同

二七 補參芪湯九

三七 茯苓補心湯同

四七 參芪附子湯同

○眩暈附健忘

怔忡驚悸與氣門可互考

五七 清暈化痰湯九

六七 清火安神湯同

七七 補四君子湯世

八七 加減四物湯同

九七 加減二陳湯同

十八 滋陰健脾湯カ

一八 歸脾湯同

二八 四物安神湯世

三八 二陳湯同

四八 養血安神湯同

同又 益氣安神湯同

五八 茯神湯世

補消渴同

六八 黃連地黃湯同

七八 黃芩湯世

八八 麥門冬湯同

九八 滋陰降火湯同

○小便閉大便閉世

十九 潤燥湯同

一九 補導滯通幽湯世

二九 大黃散同

三九 豬苓湯同

四九 參歸升麻湯世

五九 二陳湯同

六九 厚朴湯同

七九 三和散世

○淋症ラ世

八五淋散同

九九八正散世四

一清心蓮子飲世五

一補必効散世五

二益元同真丸世六

三龍胆瀉肝湯世六

○溺濁附遺尿遺精

五百補水火文清飲世七

六百滋腎散世七

七百導赤散同

八百參芪湯同

九百定心湯同

十百清心湯世八

上神芎湯同

十百十味温胆湯同

卷之五 ○頭痛附鬚髮

一坐夏白木大麻湯初

二驅風觸痛湯初

三補當皈補血湯同

四加味二陳湯二

五黃芪益氣湯同

六調中益氣湯二

七川芎茶調散菊花茶調散

八回首散三

九補虛湯

十安神湯同

十補中益氣湯

○心痛即胃脘痛 附腹痛

二十清熱解鬱湯三

三十椒梅湯四

四十姜桂湯同

五十枳縮二陳湯痰門

六十芎朮姜梔二陳湯四

七十一方同

八十四味烏沉湯四

九十開鬱導氣湯五

十二散火湯同

一香砂平胃散同

二温中湯五

三活血湯同

四七仙湯同

五枳實大黃湯飲食

六七氣湯見積聚

○脇痛附腰痛 臂痛

七九 疎肝散 六ウ 八九 通氣防風湯 同

九九 補推氣散 六ウ 一〇三 柴胡芎歸湯 同

一〇一 平肝流氣飲 七ウ 一〇二 柴梗半夏湯 同

三〇 補陰湯 七ウ 四〇 養血湯

五〇 調榮活絡湯 七ウ 六〇 當歸拈痛湯 同

七〇 二陳湯 八ウ 八〇 舒筋湯 同

九〇 加味四物湯 同 一〇四 二朮湯 同

一〇 滋榮調中湯 分 二〇 參合湯 同

三〇 豁痰湯 同 四〇 五積散 見中寒 九ウ

五〇 敗毒散 見傷寒 同 六〇 烏藥順氣散 見中風 同

七〇 木香順氣散 諸氣 同 八〇 三和散 見氣門 同

九〇 獨活寄生湯 見中濕 同 一〇五 滲濕湯 見中濕 同

一〇 活絡湯 同

補脚氣

三〇 當歸拈痛湯 見脇痛 同 四〇 左經湯 麻黃左經湯 半夏左經湯

五〇 防己飲 十ウ 六〇 檳蘇散 同

七〇 烏藥平氣散 同 八〇 治濕熱脚氣方 汁

九〇 三和散 見氣門 同 一〇 敗毒散 見傷寒 同

一〇 五積散 見中寒 同 二〇 四物湯 見虛損 同

○痛風 附麻木 痺症 痿癭

三〇 羌活湯 十ウ 四〇 加味八仙湯 十一ウ

五〇 疎經活血湯 十ウ 六〇 清濕化痰湯 十一ウ

七〇 大防風湯 十二ウ 八〇 補解表升麻湯 十三ウ

九〇 靈仙除痛飲 十三ウ 一〇 治兩手疼痛方 同

一〇 治兩足麻木方 十四 二〇 通氣防風湯 同

三〇 治肢節腫痛方 同 四〇 加味四物湯 十四

五七三痺湯十四

七七舒經湯十五

九七敗毒散見傷寒

○眼目十五

一八洗肝眼目散同

三八補大明散十六

五八洗肝散十七

八八補陽湯同

九八益氣聰明湯同

○耳十八

三九補滋腎通耳湯同

五九蔓荊子散同

六七加味益氣湯同

八七獨活寄生湯中濕

十八補中益氣湯內傷

二八滋腎明目湯十六

四八養心明目湯同

六八四物龍胆湯同

九八地黃湯十七

一九敗毒散同

二九通明利氣湯同

四九荊芥連翹湯十八

六九桂星散同

七九通竅飲同

八九補清血四物湯十九 宜明防風湯同

○口舌唇附牙齒十九

一〇加味清胃散同

二〇加減涼膈散同

四〇瀉胃湯同

六〇定痛散十九

○咽喉同

七〇清涼散同

九〇通關飲同

○痔漏同

一〇〇秦艽羌活湯同

一〇〇治痔瘡腫痛方同

一〇〇補當歸連翹湯同

一〇〇補赴宴散十九

三〇三黃湯十九

五〇當歸連翹湯同

八〇補加味四物湯同

一〇〇牛蒡子湯同

一〇〇秦艽防風湯同

一〇〇乾葛湯同

一〇〇秦艽當歸湯同



補脫肛疔

百參芪湯同

百升陽除濕湯同

癩癩

百清心抑胆湯同

百沉香大麻湯同

百清心化痰湯同

百補養血清心湯同

百加味逍遙散同

百加味二陳湯同

結核附瘰癧馬力瘡

百五香連翹湯同

百補抑氣內消散同

百消解散同

百內消散同

百益氣養榮湯同

百十六味流氣飲同

折傷

百補通導散同

百接骨方同

破傷風

與傷寒可交考

百羌活防風湯同

百白朮湯同

百大弓黃湯同

中毒

百薺朮湯同

百升麻湯同

百砒霜毒同

百巴豆毒同

百班猫毒同

百茵毒同

百河豚毒同

百補解諸草毒同

百豆腐毒同

百諸菌毒同

百六畜肉毒同

百中諸物毒同

百誤吞鐵針同

百吞銅錢同

百誤吞蜈蚣同

百誤吞水蛭同

百魚骨硬同

百犬咬同

百蛇咬同

百鼠咬同

蜈蚣咬同

黃蜂螫同

○癰疽附疔瘡同

十六味流氣飲世

補荊防敗毒散世

托裡散世

補中益氣湯同

八物湯同

竹葉黃芪湯同

補便毒附下疳 楊梅瘡世

龍胆瀉肝湯同

兩解散同

補心湯世

消風敗毒散同

榮衛返魂湯世

千金內托散世

當歸養血湯世

四君子湯世

十全大補湯世

五聖湯世

蘇方散世

消疔敗毒散世

一方同

二十四味風流飲世

補癩風世

○瘡疥世

赤小豆湯同

千金消毒散世

梔子清肝湯同

隔蒜灸法世

補金瘡世 四物湯同

卷之六○婦人科

○雜病世 一 四物調經湯世

二 種二我加味四物湯世 柴胡四物湯

三 調氣養血湯世 四 千金調經湯世

五 大補經湯世 六 經驗調經湯世

七 烏藥湯世 八 益胃升陽湯世

六合湯同 九加減五積散同

十加減四物湯君臣散同 十一養真湯四ツ

二十溫清湯四ツ 三十桑寄生散同

四十涼血地黃湯同 五十黃芪當歸人參湯五ツ

六十加減八物湯五ツ 七十加減六合湯六ツ

八十桂附湯同 九十加味二陳湯同

十一四仙散六ツ 一升陽調經湯同

二升五積散同

○虛勞同

三逍遙散加味逍遙散同 四滋陰至寶湯同

五養老九ツ 六補增味四物湯九ツ

○妊娠同

七紫蘇和氣飲達生散同 八補驗胎散十ツ

九當歸芍藥湯同 十三安胎飲十一

一治胎漏同 二同治十一

三治妊娠心腹大痛氣欲絕者方同

四治妊娠腰脚腫痛方同

五參橘散同 六犀角飲十二

七分氣飲同 八紫蘇飲十二

九治子腫方十三 十四防己散同

一四羚羊角散同 二四安榮湯同

三四冬葵子散十三 四四丹溪參朮散同

補泄痢十四

五四一方同 六四一方同

補瘧疾同 七四一方同

補傷寒同 八四加味四物湯同

○產前十五

九四催生方同

十五催生飲同

一催生散同

十五芎歸湯佛手散

三脫衣散十六

四立効湯同

五生神散同

六生氣散同

四補氣養血湯十六

八保氣散同

二一方同

六一方同

二灸法同

○產後七

九芎歸調血飲同

六補虛方七

一補人參當歸散九

二當歸黃芪湯同

三理脾湯同

四一方同

五一方同

六一方同

七一方同

九八味黑神散

又乳汁方二方七

九瓜蒌散同

十十六味流氣飲七

一荊防敗毒散同

△小兒科○急慢驚風同

二鎮驚散同

三醒脾散七

四補敗毒散同

五天麻散同

六芎活湯七五

八人參湯同

九加味和中湯同

十啓脾散同

一補脾益真湯七

二寬氣飲六

三錢氏白朮散同

○疳疾同

四消疳飲同

五補消疳丸同

○癖疾七

六消癖湯同

七補抑肝扶脾湯同

新文正 卷一百一十五

八 大連翹湯同

九 羚羊角散同

九 生犀散同

九 導赤散同

補感冒同

九 惺惺散同

四 羌活散同

五 大羌活湯同

六 脫甲散同

○ 傷食同

七 消食散同

八 補清中解鬱湯同

九 大和散同

一 銀白散同

補腹脹同

一 消脹散同

二 史君子丸同

補腹痛同

三 腹痛方同

四 乳頭散同

五 六神散同

六 人參散同

七 定吐飲同

補泄瀉同

八 參苓白朮散同

九 四神丸同

十 錢氏白朮散同

十 益黃散同

補痢疾同

十一 清熱化滯湯同

十一 香連丸同

補瘧疾同

十二 七味清脾湯同

十五 養胃湯同

十五 截瘧飲同

補咳嗽同

十七 參蘇飲同

十六 人參平肺散同

補喘急同

補雜病同

十八 人參欬冬膏同

廿 追蟲散同

十九 夜啼六神散同

卅 瀉黃散同

廿 當歸連翹湯同

卅 瀉胃升麻湯同

卅

百瀉心湯同

百一方同

百清胃養脾湯同

百葛蒲丸同

百調元散同

百破故紙丸同

百澄清飲同

百沒藥散同

百茯苓滲濕湯同

百羽澤散同

百四順清冷散同

百甘桔湯同

百化痰降火湯同

百仙方活命飲同

百練陳湯同

百宣風散同

○初生通用同

百五香湯同

百加味五香湯同

補痘疹同

百升麻葛根湯同

百消毒飲同

百快班散同

百如聖散同

百加味四聖散同

百神功散同

百紫艸水香湯同

百保元湯同

百內托散同

百木香散同

百異功散同

百起死回生散同

百馮氏天花散同

百熱眼丹溪方同

百麥門冬飲同

百罩胎散同

百獨聖散同

百安胎散同

補麻疹

百二仙湯同

百犀角解毒湯同

百十仙湯同

增補衆方規矩全部摠目錄終

增補眾方規矩用藥之一字銘

初學者欲易見今以

筆畫之多寡記之

畫一 力牛夢子

子蘇子 小細辛 女菊花

畫二 丹山梔子 水紫蘇 斤當歸 方蘇木

畫三 王牡丹皮 升升麻 木木香 弓川芎

畫四 丑牽牛子 天門冬 井阿膠 文黃芩

畫五 玄五味子 甘草 瓜木瓜 本藜蘆

畫六 史史君子 術白木 田半夏 印地榆

母益母草 奴枳殼 半半夏 令茯苓

牙麥牙 句瞿麥 仲杜仲 元秦艽

守半夏 永乾薑 仲杜仲 元秦艽

朴厚朴 曲神麩 西前胡 多白朮

艾艾葉 灯燈心 决决明子 竹竹茹

畫七 附香附子 伽白木 沒沒藥 芍芍藥

牡牡丹皮 沂當歸 杏杏仁 貝貝母

辛熟地黃 杜杜仲 利桔梗 忍忍冬

車車前子 沉沉香 卑麻黃 芋澤瀉

孫蘊子 走附子 紉藜朮 余芍藥

畫八 門麥門冬 芷白芷 定天麻 芎川芎

佳五加皮 芸防風 官肉桂 乳乳香

地生地黃 虎大黃 芒芒硝 玆玆參

花天花粉 枝桂枝 芥荊芥 良良香

吳吳茱萸 周升麻 辰辰砂 果州藥

芥車前子 泠黃芩 芦蘆薈 芹當飯

行文字...

延 延胡索 青 青皮 皂 皂角 板 板

近 當歸尾 泮 甘草 空 枳殼

九 胡 延胡索 嫩 竹茹 苓 茯苓 泉 沉香

批 批把葉 枳 枳殼 苛 薄荷 芪 黃芪 紅 紅花

星 天南星 芩 黃芩 苑 紫苑 紅 紅花

查 山查子 堯 連翹 神 茯神 酒 黃酒

扁 白扁豆 洞 枳實 砂 砂仁 衍 衍

括 括萎根 茅 茅根 柿 柿蒂 茂 莪朮

洗 檳榔子 削 三稜 珍 草菓 芽 麥芽

首 何首烏 前 前胡 恒 常山 苦 苦參

刺 皂角子 芫 薺 貞 益母 射 射干

十 粉 天花粉 厚 厚朴 涂 芍藥 退 蟬退

泮 熟地黃 陳 陳皮 姜 生姜 桔 桔梗

茱 吳茱萸 羌 羌活 荊 荊芥 柴 柴胡

耐 白附子 匿 茯苓 桂 肉桂 犀 犀角

蚕 白強蚕 芍 芍藥 栢 黃栢 烏 烏梅

麥 麥門冬 倍 牛膝 茹 竹茹 梅 烏梅

桑 桑白皮 益 益智 翁 木通 桓 常山

索 延胡索 羔 石羔 茵 茵陳 苳 黃苳

穿 穿山甲 龍 龍骨 侯 香附子

下 莎 香附子 斷 續斷 參 人參 商 商陸

雪 桑白皮 常 常山 麻 麻黃 連 黃連

側 側柏葉 茵 茵香 莪 莪朮 棋 棋盤

錄 地骨皮 豉 豉子 莞 白芷 斛 石斛

偏 白偏豆 細 細辛 通 木通 宿 縮砂

游 龍胆草 假 荊芥 猪 猪苓 蛎 牡蛎



御嬰粟殼 淡厚朴 液滑石 澆大黃

陽菖蒲根 黑玄參 對姜汁 接續斷

鹿當歸尾 龜龜板 琴阿膠 通通神

鈴鈴羊角 越山梔子

三十 舊石菖蒲 童青皮 獨活 遠志

會五味子 葛菖根 菓草菓 溱黃芩

龜馬兜鈴 貴陳皮 喬丁子 訶訶子

紙破故紙 甦紫蘇 勤貝母 婆藿香

查山查子 椒胡椒 酌蓮肉 酌白芍

寄桑寄生 菊菊花 紅紅花 硝硝石

浪黃芪 琥琥珀 解黃蘗 滑滑石 葱葱白

三十 腹大腹皮 雷知母 槁黃芪 萆遠志

瑞天花粉

軼紫蘇子 稜三稜 齊葛根 梗梗米

椿椿根皮 槐槐花 賊木賊 遊菴朮

愛麥門冬 葶葶藶 欵欵冬 滴茵陳

晞白芥子 節菊花 漣黃連 滌柴胡

葵冬葵子 榆地榆 鈴金鈴子 又川棟子

四十 歲歲靈仙 琴烏藥 蜜木香 蒼蒼朮

銀金銀花 膏石膏 實枳實 圖桔梗

酸酸棗仁 枳赤芍 葉竹葉 靜荊芥

漏州豆蔻 茨荜藶 精蒼朮 藜百薑

蓉肉苁蓉 煖生姜 蝎全蝎 蒲蒲黃

練川練子

五十 蔓瓜蒌仁 餘芍藥 翹連翹 膠阿膠

葡萄葛子 蓮蓮肉 溢訶子 殼枳殼

蔓 蔓荊子 懷 茴香

六 荜 赤茯苓 膝 牛膝 澤 澤瀉 燈 燈心

藿 藿香 路 甘州 麩 神麩 黛 青黛

薑 生薑 葶 姜製地黃

七 鮮 白鮮皮 瀝 竹瀝 蒨 山蒨 蘭 薄荷

慧 慧苳仁 薰 柴胡 薜 草薜 欽 白欽

八 嬰 桃仁 離 防己 藟 香藟 歸 當歸

麴 神麴 斷 續斷 蕪 紫蕪

九 寶 姜黃 蟬 蟬退 糯 紫糯 蘭

十 蠟 牡蛎 乾 葛花 糯 糯米 蘭

十一 顛 天門冬 麝 麝香 爵 爵金 驚

十二 蘿 蘿蔔子 續 續斷 蘇 白蘇皮

十三 蜜 木瓜 一字銘終

合類增補衆方規矩卷之一

永原了的增撰

山田昌殷校正

中風

一 八 味 順 氣 散 治中風先服此

藥以順其氣次用治風之藥

伽 芩 童 芷

陳 參 各二 廿一分

右煎服○或加星蜜以攻痰氣

或痰盛加守二姜片三○氣厥者與

中風相似何以別之風中身温氣

中身冷先以此湯

按有四君子湯補脾胃中氣藥

也芷去手陽明經風發通腎胃

間氣陳理肺氣童泄肝氣若風  
在手陽明而肝肺腎胃之氣實  
者專可用之○卒倒不知人事  
痰涎壅盛癱瘓不仁舌強不語  
與此湯問求驗○卒中風醒後  
七氣拂鬱而手足厥或癱瘓痺  
痛者亦間得奇効○或語云一  
切鬱病氣弱者妙也又云諸病  
共有少眩暈者用之補一方法  
苓陳加定泉水瓜○老人加余  
芎斤莎

三烏藥順氣散

治卒中風手足

不遂言語蹇澁四肢骨節疼痛肩  
膊麻痛筋脉拘攣及脚氣步履艱

辛婦人血氣老人冷氣

麻 芩 陳 各二 芎 蚕  
芷 枳 桔 各一 永 炮 甘 各半

右入姜棗煎服○寒熱頭痛加蔥  
白○身軀不能屈伸為末溫酒調  
下○瘰癧抓之成瘡薄芎煎湯調  
下○中風一身俱麻加參伽斤門  
○久癱瘓去麻加定芸菴守星蜜  
斤○日眼喎斜加連菴芸荊瀝姜  
汁○遍身痛加斤官乳沒○臂痛加  
菴芸官苓蘇○背心痛人行氣香蘇  
散加蒼守苓○脚膝浮腫加膝攝  
佳○腰痛加膝伸茵○眼眩加細  
茶○四肢冷痺加附官○婦人血

風加芸苛荊○胸膈脹滿加實莪  
○虛汗去麻加莨○潮熱去水加  
芩○二三年不能行合獨活寄生  
湯○拘攣加瓜解○濕氣加蒼伽  
栝○心腹刺痛加尚○手足不能  
起床加續葳○陰積浮腫合五積  
散○臂痛因風者或乳婦以臂枕  
兒傷於風寒而致臂痛者宜此湯  
○白虎歷節走注骨節疼痛加瓜  
沒方○四肢冷痛加附官

按卒中風先用八味順氣散六  
七貼以順正氣次與此湯以可  
順表氣○中風口眼喎斜或肩  
膊及背麻痺不仁或脚膝痿弱

或言語蹇澁皆宜此湯○臂痛  
冷起手甚艱五積散合九交湯  
未効則此湯加羌瓜石安○乳  
婦以臂枕兒則其臂麻痺不仁  
疼痛若因風者宜此湯若因寒  
者宜五積散

三防風通聖散

治中風一切風

熱大便閉結小便赤澁頭面生瘡  
眼目赤痛或熱極生風舌強口噤  
或鼻生紫赤風刺癢疹而為肺風  
或為風厲而世呼為大風或腸風  
而為痔漏或腸鬱而為諸熱謔妄  
驚狂並皆治之

芸 芍 斤 芩 虎 芒

翹 芎 麻 荆 伽 丹 各半  
膏 桔 苓 各一兩 滑 三兩

一方去芒加膝參守

右入姜煎○自利去芒虎○自汗

去麻○飲酒中風身熱頭痛如破

加蔥白○咳嗽喘急加守桔苑○

耳鳴因酒過加柴枳桔童星荆○

癩疹通治如身疼加蒼差○痰嗽

加守○一切大風癩狂加嬰地牡

虎○兩耳聾者厚味動胃火加酒煨

虎○膽移熱於腦則辛頰鼻淵加

苛連○頭頂偏腫連一目如半壺

其脉洪大此風乘陽明經氣血俱

多風腫去芒虎加姜蔥豉煎服取

汗以草莖刺鼻中出血其腫立消

○治風熱瘡疥癬久不愈○瘰癧

瘡用本方為末酒浸焙乾凡三次

食後白湯調服日三服至頭有汗

効○小兒身常發熱風斑及脚指

紅腫去芒虎加力漣為末服

按此方雖古法用表裡客熱三

焦實火而其實火用黃連解毒

湯腸胃實熱用大承氣湯風熱

症專用此湯○或語云春夏專

用通聖散秋冬專用五積散是

乃時令表裡之方也○在亂症

解毒湯不効則用此湯此湯若

不効則備急圓可也○打撲者

倍斤虎加紅沒○疥癬楊梅瘡  
 瘡良久者用此湯間有驗補小  
 兒諸風潮搐急慢驚風大便閉  
 結邪熱暴甚腸胃乾澀寢汗咬  
 牙目睛上竄睡語不安傳筋驚  
 悸肌肉蠕動每一兩加虎錢一丹  
 二錢調苓末錢一○肌肉蠕動者調  
 羌活末一錢經曰肌肉蠕動命  
 曰微風○癰疽惡瘡腫毒本方  
 一兩倍堯斤加連匿芪參莞密  
 銀牡各半兩名藤黃飲如瘡  
 在上加沂○發斑熱本方一兩  
 加連五錢○痢後鶴膝風良驗  
 四小續命湯 治卒暴中風不省

人事半身不遂口眼喎斜手足顫  
 掉語言蹇澀肢麻痺精神昏亂  
 頭目眩暈痰涎壅盛筋脉拘攣不  
 得轉側及脚氣緩弱不能動履屈  
 伸諸風服之皆驗東垣曰中風自  
 汗者不可重發其汗故此藥亦不  
 可輕用也

- 芸各半 麻各半 離各半 桂各半 杏各半
- 芍各半 芎各半 參各半 附各半 甘各半

右入姜棗煎服○精神恍惚加神  
 遠○骨節痛有熱倍芍去附○心  
 煩驚悸加犀○骨節痛有寒澀倍  
 加桂附○嘔逆腹脹倍參加守○  
 燥悶大便澀去附倍芍入瀝○臙

寒下痢去離苓倍附加木○自汗  
 去麻杏加木○脚膝弱加膝餅○  
 身疼加朮○腰痛加嬰仲○失音  
 倍杏○中風無汗惡寒加倍麻芸  
 杏○中風有汗惡風倍加枝芍杏  
 ○中風身熱無汗不惡寒加雷膏  
 去附○中風身熱有汗惡風加葛  
 官苓○中風無汗身涼倍附加  
 永○中風有汗熱倍加桂附其  
 ○中風肢節攣痛不仁加羌翹○  
 治剛柔二瘧之通用也○產後中  
 風脚氣最為要藥然手足搐搦者  
 當去附  
 按不可用多汗者太抵身冷或

四肢厥冷而拘急不仁者宜○  
 下婦二十餘歲產後三十有奇  
 日腰足冷腹痛甚膝屈不伸脉  
 沈遲加附得奇妙

**五 大秦朮湯** 治中風手足不遂

舌強不能言用之養血則筋自榮

朮	各一	芍	各一	芎	各一	細	各半
羌	各一	獨	各一	附	各一	地	各半
秦	各一	朮	各一	芎	各一	細	各半

右煎服○天陰雨加生薑○春夏  
 加雷○心下痞滿加實○治  
 血弱陰虛不能養筋筋燥而手足  
 不能運動指爪乾燥屬風熱甚者  
 按此方榮血養筋故脉浮大數

而四肢麻木肌肉羸動則三歲  
內當發中風是其為養生專用  
也若脉微細者回春養榮湯可  
也○俄手足痿腰不立舌軟不  
能言者不分左右專用之也

六 加減除濕湯 治右半身不遂

手足癱瘓筋骨疼痛

佛二斤 赤芍 陳守  
蒼連 茯苓 枳 卷  
芷九分 參 芎 桔 芸 甘  
右入姜煎服○身痛加姜黃○足  
痛加膝離歲

按治氣虛與濕痰兼以久手足  
癱瘓者也予連年試此方一應

癱瘓不相應矣久字專要也次  
方亦然

七 加減潤燥湯 治左半身不遂

手足癱瘓呵欠嚏噴口眼斜頭  
目眩暈痰火熾盛筋骨時痛頭痛

心悸  
洪二斤 芎 佛 苓 星  
守 定 各 陳 鹽 地 芎 酸  
泠 膝 各 八 卷 嬰 芸 桂 各 六  
紅 其 各 四 酒 分

右水煎入瀝姜汁服○手不遂倍  
加芩桂○足不遂倍加栢膝

按治因血虛與瘀血而久手足  
癱瘓者也若久左右手足皆癱



痰者血氣兩虛宜十全大補湯  
方見于  
虛損

八 勻氣散

治腰腿疼手足不能  
屈伸半身不遂口眼喎斜風氣中  
風中氣用風藥而十無一愈即服  
之見効

伽 參 泉  
定 各一  
童 各五  
苳 各三

右入姜棗煎服○心脾疼加苓守  
各二 陳蜜羌 各一 入姜煎服半日効  
按中風症風藥不効則此湯合  
二陳湯數得奇効又腰腿痛者  
亦得尚可有加減消息

九 補養榮湯

治中風血脉四肢

不舉口不能言及痰迷心竅不省  
人事舌強不能言語痰涎壅盛口  
眼喎斜半身不遂

斤 芎 地 貴 參  
洞 苳 麥 羌 連 芸  
光 匿 守 星 蔓 其 各等

右生姜三片 茹一團 水煎服為丸  
用亦可也

按風中血脉者外無六經之形  
證內無便溺之阻隔肢不能舉  
口不能言為在中也

十 三生飲

治中風昏迷痰涎壅  
并口眼喎斜半身不遂

星 川 烏 附 蜜  
錢 各一 分 五

右水煎服○去烏名（附湯）脉沈無熱者宜服

按此方治一切風痰氣痰不省人事初作者通治之劑

三貝母瓜蒌湯 肥人中風口喎麻木左右俱痰世用之

貝 蕪 星 芥 芸 菴  
栢 芩 連 伽 貴 桂  
歲 守 花 茸 各等分

右入姜水煎服

按此方治中風口眼喎斜者調理之劑

士愈風湯 治一切風症卒中初中中腑中臟及藏府俱中已已散

者先宜本病藥治之後用此方調理

參 一錢 伽 同 苓 貴  
守 各一 斤 一錢 芎 八 洞  
芩 各七 分 芎 二 分 茸 三 分

右入姜棗水煎臨臥入瀝姜泔磨蜜調服

按中風症內邪已除外邪已盡當服此藥以行導諸經

三加味大補湯 治左右手足皆

癱瘓

楓 參 伽 苓 斤 芎  
芍 芎 泉 附 密 各二分  
蓼 倍 杜 瓜 芸 菴  
搖 薏 各五分 桂 茸 各二分

右入姜棗煎服

按左右手足皆癱瘓者此血氣之太虛也宜用此方

補類中風

西附子理中湯 治中寒厥倒

附子 二兩 吳茱萸 一兩 桂枝 一兩 芍藥 一兩 甘草 一兩

右入姜棗水煎服○冬月卒中寒氣昏冒口噤肢攣惡寒或口吐涎沫重則四肢強直則先用此湯若不急治則舌強囊縮而死矣

五木香順氣散 治中氣運倒

木香 一兩 砂仁 各五分 枳實 一兩 芍藥 一兩 貴 一兩 守朴 一兩 奴各一 桂 一兩 承 一兩 甘 各三分

右姜片水煎○氣不轉者加泉蘇子

按此方由七情過極氣厥昏冒或牙關緊急者宜用之或宜藿香正氣散

六加味二陳湯 治痰運倒

貴 守 苓 斤 瀉 利 杏 良 砂 密 桂 甘 各三分

右入姜棗煎○氣逆加蘇○元氣虛弱去瀉

按此方因內虛受寒痰氣阻塞手足厥冷麻痺眩暈欲倒脈沈細者宜此湯

七加味四物湯 治血虛眩暈卒

倒不可艾灸驚哭叫動動則乘虛

而死矣

斤 芍 芎 芎

地 芎 芎 槭

參 伽 貴 苓 芥 茸

右棗二枚烏一箇水煎飽悶加

沙砂去槭伽

按此方因平日去血過多虛而成血運脈微滯者宜此湯

天 加味六君子湯 食厥者過於

飲食胃氣自傷不能運化故昏冒

宜此湯

參 七分 伽 苓 貴 守 各二分

莎 二分 蜜 砂 各五分 茸 三分

右入姜二片棗二枚水煎○又宜

行氣香蘇散加蜜童查方見傷寒

凡中卒倒口噤不能言目不識

入四肢不舉等症多者飲食過

度變為異常必須審問明白

五 補中益氣湯 治氣虛卒倒方見傷寒

傷寒 附傷風虛煩

三 香蘇散 治四時傷寒感冒頭

痛發熱惡寒及內外兩感之證春

月宜用之探病

莎 蘇 各 陳 一 亦 半 亦

右入姜蔥水煎服○頭痛加芎正

名 治氣虛頭痛○

頭如劈痛加膏蔥○偏正頭風加

細苛膏○太陽穴痛加靜膏傷風

自汗加枝傷風無汗加麻葛○惡

寒加蒼○發熱加柴苓○寒慄加  
枝○虛熱不退加參○潮熱加參  
苓○咳嗽加桔會○咳嗽不止加  
守杏○鼻塞聲重咽膈不和加桔  
○胸膈痞塞加枳守○氣促不安  
加腹桑○嘔吐惡心不止加喬守  
○飲食不化加砂童○腰痛不能  
彌神加官嬰○腹肚痛加蜜○脾  
寒加良童菓○水瀉即脾泄加藿  
衍○瘧疾加快菓○瘧痢加枳連  
去耳○久瀉加蜜劑○身疼加芍  
官○心氣痛加索發面○感風寒  
發熱頭疼合不換金正氣散○感  
寒頭痛壯熱惡寒身痛不能轉動

合五積散又或合敗毒散○風濕

脚氣加棋瓜各一踈通氣道名之

檀蘇散○春夏氣溢腫而痛加五

加瓜栝鈴○濕氣周遊脚膝痛加

忍密芍○疝氣偏墜疼痛初發憎

寒壯熱甚効加苗蜜稜莪通○內

傷飲食外感風寒夾食夾氣胸膈

脹滿肚腹疼痛頭痛身痛發熱加

發芎麻枳菴名○因濕又

加蒼外感風寒又入姜蔥內傷飲

食又加查曲○小兒傷寒夾食夾

驚四時瘟疫瘧疾加童葛名

散○婦人一切氣作痛或上凌心

胸或攻築脇肋腹中結塊發渴刺

痛月水因之不調或眩暈嘔吐往來寒熱無問胎前產後並皆治之加參平永少煎服謂之

按此方散氣快氣之劑故耳鳴頭響胃或頭痛眩暈或咳嗽痰熱往來或瘧寒多熱少或內寒外熱或寒熱相半或骨節痠痛臍腹作痛或水腫上氣喘嗽面目浮腫或浴溫泉中風氣逆上而面赤頭痛等皆治之○過酒之人其酒毒支胸或嘔或吞酸加喬行○若治酒積加棗姜鹽或曲砂喬○脚氣不腫而痛者氣痛也加楨瓜○小兒痘疹未

成加升葛○婦人足冷上氣或姙婦四五個月而腰下浮腫皆與本方得奇驗○鼠咬而發熱腫痛即連芩丹○一人頭痛咽乾或胸腹脇痛不止合升麻葛根湯取驗今來治數百人故名之

一升 參蘇飲 治四時感冒發熱頭痛咳嗽停飲中脘痞滿嘔吐痰水實中快膈不致傷脾一切發熱及內傷外感諸般咳嗽痰喘或欲成勞瘵並治

陳各一 麩各一 守各一 圖各一 醇各一 齊各一 枳九分 甘五分 參五分 蜜一分

新文

右入姜棗水煎服○初咳嗽加桑杏○久嗽加會梅○口乾加門端○嘔逆加藿砂○脾泄加蓮扁加○頭疼加芎細○若感冒惡寒無汗咳嗽喘促傷風無汗鼻塞聲重咳嗽並加麻杏○肺多有熱加杏○心下痞悶或胸煩熱或停酒不散或情雜惡心加連實倍用葛陳○胸滿痰多加薑○氣促喘嗽加雷貝○衄血加梅門茅○心盛發熱加柴芩○咳嗽吐血加升牡地○勞熱咳嗽久不愈加雷貝門○姪娠傷寒去守加芩○陰虛痰嗽或吐

解今四物湯名  
○痘

疹但覺身熱似傷寒疑似未明宜用之○痘疹冬寒甚初見紅斑不能發起者亦用之

按四時咳嗽風痰胸痛宜用之不傷脾胃進飲食順氣殊感冒發散之方也常去參蜜而用何者參入手太陰肺經為火見雜著心盛者去蜜見必用故新病去一味加芩柴可退內外熱也雖然久病衛氣虛則加參宜順氣也心氣弱則加蜜宜達氣也○表熱甚加蜜則間有斑出故他家必去蜜也○傷寒七八日

熱入裏妄語口乾脉數雖與解  
毒涼膈等而無驗故此方加苓  
連而與則表裏熱退便通而愈  
○衄血七日面赤他瘥無驗予  
診脉浮數故加芎密側冷而五  
貼全安○瘧疾患於旅途熱多  
寒少兼咳嗽故加苓羌得奇効  
○喘促痰盛喉中如水雞加杏  
會○勞嗽無汗潮熱五心煩熱  
加錄○小兒有痰嗽而驚風初  
發可也虛弱加參或感冒發熱  
頭痛痰嗽喘促痞悶專用之  
一男三十餘歲咳痰泄瀉晝夜  
四五行口乾胸苦肌熱去守枳

加薑仰而取驗

〔九〕茯苓補心湯 治男婦血虛無

汗潮熱咳嗽無顏色或心虛爲邪  
氣所傷吐血或心氣虛面黃瘥血  
虛潮熱五心煩熱無汗欬嗽唾血  
或婦人心胸嘈雜或婦女經水不  
調吐血咳嗽發熱口乾喘急胸膈  
痞悶嘔吐痰水或婦人亡血過多  
或氣逆心悶月水不斷或女子血  
虛有汗潮熱者亦宜用之

按血虛而胸跳或咳嗽怔忡咳  
嗽吐血或虛勞潮熱或勞熱如  
瘥或心氣不足面黃躄瘦五心  
煩熱或咳嗽唾血或有汗怔忡



或嘈雜或周身血斑此證多在產後或產後失血眩暈或婦人惡阻或小產可也

**三九 藿香正氣散** 治四時不正之

氣寒疫時氣山嵐瘴氣雨濕蒸氣或中寒腹痛吐利中暑冒風吐瀉中濕身重泄瀉或不伏水土脾胃不和或飲食停滯嘔逆惡心胸膈痞悶或頭疼憎寒發熱無汗者

藿香 三錢 陳 木瓜 各一錢 甘草 各一錢 腹 麩 芷 苓 各一錢 甘 牛 葵

右入姜棗水煎服○霍亂轉筋加瓜○腹痛加芍○寒痛加官○冷甚加承○飲食不化心下痞悶加

沙砂○米穀不化加曲芽○肉食

不化加查○心下痞加洞龍○中

暑冒風加藜扁○時氣憎寒發熱

加柴葛○發熱加門竹葉○口渴

小便不利合五苓散○心腹絞痛

加木○若煩欲登園不通加枳○

寒濕相搏霍亂轉筋煩渴悶亂合

連薤散名之**香散**○感風寒內

傷飲食霍亂轉筋吐瀉合五苓散

轉筋不止男以手挽其陰女以手

牽其乳此千金妙法○夏時受涼

傷外又飲食生冷傷內頭痛身熱

惡寒或腹痛吐瀉若外感重去御

加蒼朮若內傷重加宿曲○林曰

尸厥飛尸卒厥此即中惡之候因  
胃犯不正之氣忽然手足冷肌膚  
栗起頭面青黑精神不守或錯言  
妄語牙緊昏不知人頭旋暈倒此  
是卒厥客忤鬼擊帛死及入廟登  
塚多有此疾以蘇合香丸灌之俟  
甦以藿香正氣散加密星珠驗

按霍亂主方兼內外有譽也殊  
治山嵐瘴氣之第一也○霍亂  
嘔逆去並加守姜汁最霍亂吐  
瀉腹痛者必用之○四時感不  
正頭運鬱胃惡寒發熱專用之  
○夏月泄瀉或傷食濕瀉俱以  
兼腹痛者亦宜○七情過極逆

氣運倒此名中氣亦宜○渾身  
拘急憎寒喘嗽頭目昏重加玄  
杏鹽梅得奇効○出遠方治心  
腹脹滿此方專調榮衛利三焦  
行痞滯消膨脹○腸胃受濕下  
血不止加連梅有奇効○瘧疾  
初發無汗用之則必發汗而愈  
○傷寒感冒頭痛發熱而無汗  
亦可也○寢間風入於口鼻中  
太陰則咽痛多此方主之○飲  
酒而傷風發熱或吐逆亦宜

四九

人參敗毒散治瘟疫四時通用

羌活 獨活 柴胡 枳殼  
芎藭 蒼朮 參苓 甘草

右入姜水煎服此藥治傷寒瘟疫  
時行風濕風眩四肢痛憎寒壯熱  
項強睛疼不問老人小兒皆可服  
或嶺南煙瘴或卑濕之地脚氣痿  
痺此藥不可缺衆人病一般者加  
葛爲妙○傷寒頭疼身痛項強壯  
熱惡寒口乾心中蘊熱加芩○傷  
風鼻塞聲重咳嗽吐痰加守杏○  
頭目眩暈屬風熱加守定○眼目  
腫痛因風寒所感加芸荊歸尾赤  
芍去參苓○酒毒發熱作渴加葛  
連○瘧疾不問先寒後熱先熱後  
寒頭疼身痛加蒼葛果栝○風熱  
濕毒腰痛加續定苛瓜○風熱入

大腸下血不止加桑苛梅姜兼有  
衄血加門若因酒毒加連○足三  
陽經受熱毒氣流注脚踝上焮赤  
腫痛寒熱如瘧自汗惡風或無汗  
惡寒加蒼○皮膚癢痒加蟬○熱  
而紅腫加瓜蒼○大便實加虎○  
風熱上壅咽喉窒塞或痛或不利  
生瘡或如肉癰痛妨悶加芩守翹  
倍加栝時行瘟疫下利赤白發熱  
口乾身痛加倉米連姜棗名倉廩  
散○噤口痢加倉米蓮○痢後手  
足痛加瓜栝○臂痛冷起手甚難  
遂合五積散名交加散加瓜膝姜  
棗○諸般瘡毒腫痛或癰疽疔腫

發背乳癰腫瘡等憎寒壯熱甚者  
頭痛拘急似傷寒加荆芫翹忍冬  
**參名 荆防敗毒散** ○身生瘡膿血  
覺腫極痛且痒或風熱積毒發於  
面頭手足如臙脂色加葛赤芍升  
定蠟苛門地各平血飲 ○小兒急  
驚風初起發熱手足搐搦上竄天  
吊角弓反張並一切感冒及瘡疹  
欲出發搐加定全蝎蚕附錄 ○瘡  
疹癢似三日發熱加芸荆定錄去  
參芫

按病人氣實者去參若氣弱難  
運藥力者加參 ○四時不正瘟  
疫熱毒鼻塞聲重頭面腫痛加

參芫姜 ○頭痛甚者加靜 ○如  
心經蘊熱口舌乾燥加芫 ○傷  
寒頭痛發熱惡寒半表重半裡  
輕者宜用之 若半表半裏 無  
名腫物赤而痛所有發熱世俗  
謂之風毒腫若熱甚加芫可也  
在上宜升麻葛 外科腫物貼  
根在下宜敗毒 ○外科腫物貼  
藥故毒氣不出而周身浮腫者  
宜用此湯 ○下鄉患痢世俗謂  
之腹疫病加粳蓮 ○熱痢與訶  
衍則雖痢止而熱不退此湯加  
三黃或芫宜解散其藥毒 ○腸  
風下血及近血亦得驗 ○風眼  
目赤多血者用之若甚腫痛加

三黃或芩連亦可○下湯風呂  
 等風中滯血故赤斑出甚痒加  
 斤苛或伽芸荊蒼芍地亦宜傳  
 謂之**加味敗毒散**此方宜用癩  
 疹○痛風因風濕者百節痛者  
 脚氣痛處煩熱者俱得奇効○  
 瘡氣有內難發出與此湯則悉  
 發出又因加減內消亦可○太  
 頭瘋病項面腫及咽痛加力連  
 ○小兒急驚風加白附蚕○小  
 兒啼則口眼喎斜願少腫與此  
 湯得數奇○痘疹序病甚發熱  
 與升麻葛根湯其熱不去故此  
 湯加紫州有奇効○一人冬月

患痢無熱腹痛與芍藥湯不効  
 故慮感風濕為痢與此湯得奇  
 妙○或曰鼠咬加貝○凡欲與  
 此湯者先試口氣熱或骨節痛  
 而可也 **補** 本方加斤芍地伽  
 芸假精名 **祖傳敗毒散** 治斑疹  
 ○去桔苓參加芸芥升葛赤芍  
 芷力名 **加減敗毒散** 治天行瘟  
 疫頭面腫盛咽喉不利舌乾口  
 燥憎寒壯熱時氣流傳△愚按  
 謂病人氣實者去參者此偏見  
 也人參敗毒散去人參是古人  
 名方之意似相乖矣可考嘉言  
 父醫門法律

五升麻葛根湯

治傷寒頭痛時

疫憎寒壯熱肢體痛發熱惡寒鼻乾不得眠兼治寒暄不時人多病疫乍煖脫衣及瘡疹已發未發疑似之間宜服

葛根三升 麻黃二升 芍藥二升 甘草二升

右入姜煎服○頭痛加蔥○咳嗽

加桑○上膈熱加芩芩○無汗加

麻○咽痛加桔其○發黃丹毒加

此湯○癰疹者紅點如蚤螫之狀宜

此湯○小兒傷風身熱頭項強自

汗表不和加芩○瘡疹一見苗不

可服慎之○冬月加蘇八○四肢

厥冷加枝○腰痛當知是痘

加枝○時氣發熱太甚乃毒氣盛加力

按治癰疹最上方也○八九年

已前六七月間天下人民多患

紅斑摩之則當手不痛不痒頭

痛發熱惡寒合麤腹散二三貼

而皆愈今以來逢此證則立得

奇効矣○當世人多患小瘡甚

痒故合麤腹散而與之則散沒

然發痰喘心腹強須臾而死矣

遇與不遇勿履覆轍 表熱

加薰○內熱加黃芩○熱甚加

梔連或加翹花○大便硬加枳

虎○頭痛加芎○身痛加羌

胸膈痞悶ハ加ナ利ナ○咳嗽ハ加ナ杏ナ○  
有痰ハ加ナ守ナ○發斑ハ加ナ玄ナ如老人  
去芍ナ加ナ柴ナ苓ナ參ナ

六光ハ不ナ換ナ金ナ正ナ氣ナ散ナ 治四時傷寒

瘟疫時氣ハ山嵐瘴氣ハ寒熱往來ハ霍亂吐瀉ハ下痢赤白ハ若出遠方ハ不伏水土者ハ宜常服之

蒼ナ朮ナ 枳ナ 陳ナ 守ナ 藿ナ 耳ナ

右入姜棗煎服○頭痛加芎ナ芷ナ○

感寒腹痛加姜ナ官ナ○潮熱加柴ナ苓ナ

○嘔逆加喬ナ砂ナ○口燥心煩加柴ナ葛ナ

○氣塊加稜ナ枳ナ檳ナ苗ナ○冷瀉不止加木ナ訶ナ衍ナ○熱極大便不通加

虎ナ芒ナ○瘧疾加恒ナ俱ナ果ナ○腹脹加

莎ナ枳ナ多ナ○癰疾加連ナ枳ナ去ナ其ナ○胸

脇脹滿加實ナ砂ナ莖ナ○咳嗽加桔ナ杏ナ

會ナ○喘急加麻ナ軾ナ桑ナ○兩足浮腫

加瓜腹佳○身休痛加麻ナ枝ナ赤ナ芍ナ

○濕症聲啞加葛ナ○寒症聲啞加

官ナ○腸胃受濕下血不止加連ナ梅ナ

○小兒感冒風濕頭目昏重發

壯熱宜此湯○傷濕重著骨節疼

痛酒浙咳嗽加瓜

按平胃散加藿守之方也是乃

辟瘴之劑故遊官四方水上不

伏或旅途中可服未病之先也

○伊勢參官後瀉痢帶血腹痛

心脹加涂ナ冷ナ蜜ナ枳ナ○旅後憎寒

發熱上吐下瀉兩腿痺四散未  
冷無汗口渴去守其加葛高砂  
永○四十餘日下血不止加芍  
芩連五貼而愈○新久諸瘧加  
柴芩童苓澤枳果梅

**補**回春加莎砂名加減正氣散  
○瀉加伽羅烏炒米○腹痛加  
蜜茵○飽悶加益腹○發腫氣  
喘加軾雪翁猪腹去其○小水  
短赤加翁猪柅朮去守其○內  
寒手足冷脉沈細加永桂

**七光**十神湯 時令不正瘟疫妄行  
或感冒發熱憎寒頭痛身痛無汗  
或欲出疹此藥不問陰陽兩感並

治之

麻 葛 麻 葛 赤芍  
莎 蘇 陳 芷 芩

右入姜煎服○發熱頭痛加蔥○  
中滿氣實加枳○心腹脹滿加實  
守○潮熱加芩門○咳嗽喘急加  
桑栝守○大便秘閉加虎芒○嘔吐  
加藿守○泄瀉加木苓○瘧疾加  
果核○痢病加枳連○腹痛加芍  
○發熱頭痛加細膏○飲食不進  
加砂多○嘔逆加香果○衄血不  
止加梅葛○疹毒加官參苓  
按此方尊芷香蘇散合升葛湯  
加麻故專要在麻黃一味矣○



感冒風寒者發熱惡寒咳嗽頭  
痛甚而無汗者宜此湯○傷寒  
否熱久不退自汗不出口乾頭  
痛是證所出之證即與此湯間  
出而熱退也是乃醫術有明  
者所為矣予蚤歲頃見一病人  
其證肌熱久不退且無汗口乾  
頭痛故與參白虎湯則一二貼  
而火天刑難道者也○東井療  
婦人頭筋強急而腹脹去麻加  
蒼得奇妙爾以來有數苦

八九 小柴胡湯

治傷寒四五日往  
來寒熱胸滿脇痛心煩嘔吐頭疼  
耳聾大便秘澀此在半表半裏也

柴胡 二升

參 各一 守 八分 枳 五分

右入姜棗煎服○小便難潮熱腹  
滿加苓○下後陰虛生熱脈微  
惡寒去苓加芍○腹痛亦然○嘔  
而發熱胸脇滿小便不利去苓加  
苓○飲水過多成水結胸去  
棗加蠟○往來寒熱咳嗽胸  
脇痛去參棗加會各半○渴甚  
去守加參○身熱不渴去  
參加枝○心中飽滿加枳○  
心下痞滿加連實○夜靜而晝發  
熱者熱在氣分加丹連雷錄○晝  
夜發熱者熱在氣血之分合四物  
湯加連丹○下痢身熱挾外感者

必惡寒發熱煩渴身首俱病此在表去參棗加蒼芎陳赤芍姜得微汗愈○傷寒陽症效逆潮熱加陳茹姜○伏暑發熱汗渴暑入心胞不語加苓○瘧熱多寒少或單熱頭痛胸滿咽乾宜此湯去守加參括○瘧發寒熱作渴病在表裡陰陽不分者合五苓散名柴苓湯○無汗加麻○有汗加枝○寒多加官○熱多加苓○口酸而苦者肝膽有實熱加游童其○如膽熱而口苦者謀慮不決也去苓加酸遠錄○由醉飽房勞而後大怒觸動榮血致吐血者加二門○灸後發

熱煩渴加龍骨牡蠣○產後惡露下忽然斷絕寒熱往來晝靜暮劇語言狂亂如有鬼神此熱入血室而顛狂加地○產後虛羸寒熱飲食小腹痛加陳芎芍姜棗○小兒感寒發熱或作瘧宜此湯○痘疹出不快身熱甚者加地○傷寒百合病加雷百合茹粳○本方去參其加芍虎各二實入姜棗煎服名之大柴胡湯治傷寒十餘日不解大便不通身熱煩燥譫言妄語此乃攻裡劑故以利為度如身軀疼痛者表證未解不可服之○倍加芍虎名敷和湯治腹痛大便結

小便澀喜飲冷以手按之痛轉甚  
手不助近或兩手熱腹脾熱

按木柴胡敷和宜實證不宜虛  
證小柴胡傷寒和解之劑也○

夏月發熱煩渴小水不利兼傷  
寒陰陽不分疑似之間者去守

加門會連○下痢赤白腹痛身  
熱加苓芍○如兼惡寒亦得○

熱嗽啜冷水而暫止者加桑杏  
○煩熱加門○嗜臥減食加水

○欬而寒熱往來去參加會水  
○寒熱不調作腹痛去芍加芍

○俄耳聾而頭昏胃合香蘇散  
百發百中○冬後發熱煩悶加

連丹得奇妙○陰囊濕痒加蒺  
童此乃通肝經故也○男婦口

苦兩脇脹或痛加連丹○大飢  
發熱太食傷胃已成黃疸其候

食則腹滿眩暈或心中佛鬱不  
安加實朴丹○婦人傷寒經水

適來適斷發熱惡寒夜則譫語  
此為熱入血室故寒熱如瘧宜

此湯○小壯之人發熱惡寒入  
夜譫語亦宜補本方加丹王名

加味小柴胡湯○又本方加貴  
餘芍名陶氏小柴胡湯○又尋

常感冒用此等分名和解毒○  
加黑豆下撮名火毒湯而治火

邪諸症○傷寒日久不解者熱必傷血攻表惡寒發熱而裡亦實者加桂○胸中煩而不嘔去守加參枳○腹痛加童○痰盛或喘加雪烏○熱盛錯語不眠加丹連栢○少陽陽明合病口燥目疼加餘葛○自汗惡熱譫語煩渴去守合白虎湯○自汗惡風腹痛或寒多熱少脈弱去守合桂枝湯○血虛發夜熱合四物湯見虛損去守加門○舌乾口燥去守加花或勤○脈弦虛無力先因房勞夢遺感寒或病後血氣未固以致咳嗽吐痰晝

輕夜重發熱不止合四物湯去守加門雷栢○脈弦虛無力或浮散發熱煩躁口渴不飲水此為虛熱去守合生脈散方見中暑○嘔逆倍姜加貴○頭痛加羌芩○中暑發熱頭痛加連○瀉瘡加恒洗○小便不利大便泄瀉合四苓散見中暑夾熱而利加炒連芍

**大柴胡湯** 昏亂譫語加連丹○痞滿加奴利淡○舌胎黃赤口燥渴飲水加枳○夏月熱病煩躁脈洪大加雷門羔○發斑加地丹芩○發黃加茵栢○黃

加犀○大便不通加芒

九代黃連解毒湯治大熱不止乾嘔

煩渴錯語呻吟不眠或傷寒汗吐下

後熱不退諸般積熱實火者大効

連一 苓 栝 丹 各二

右水煎○腹滿嘔吐或欲作利者

加守三 朴苓 各二 姜三 ○三焦實

火內外皆熱煩渴小便赤口生瘡

加翹芍柴 各等 ○狂亂喜笑不休

者此心火盛先行吐法而後加守

瀝竹葉姜汁○臟毒下血者必在

糞後名遠血加翹槐細其謂之入

寶湯○婦人赤白帶下屬壯盛而

有寒熱者合四物湯加倍連尤効

名之謂瀉湯

按清熱之劑也○三十餘歲婦

人崩漏如湧身熱口渴合四物

湯煎湯與棕灰而安○又孕婦

有先證合四物湯加升伽而安

補一左加柴胡連翹各等分

卅白虎湯 治傷寒汗吐下後心

胸煩悶渴欲飲水而脈洪大

膏四兩 雷一兩 甘一分 粳一合

右水煎○熱盛煩渴不止及發赤

斑脈虛加參 各一 化毒湯 ○一左加

豉 ○大便不固熱不退加蒼 ○脈

尺寸俱長汗大出身如水石加桂

○老幼及虛人昏冒譫語或小便

赤及狂

澀起則無度或煩而不眠加丹○  
上焦煩渴而不欲多食謂之高渴  
加參或加升相○瘧疾表裡俱熱  
時時惡寒有汗而大渴口乾加參

按此方除熱之劑也○夏因暑  
熱而遺尿加參栝○一男熱不  
甚大便瀉不省人事脈浮大無  
力背出斑是死証加參蒼取驗

而後小柴胡湯合四君子湯而  
調理則全愈補本方加參門玄  
丹姜棗竹葉名曰白虎湯治法

同上○虛煩甚加門○裏熱大  
渴煩躁表熱惡寒脈浮并加參  
桃仁承氣湯 治瘀血小腹急

痛大便不利小便自利或譫語口  
乾遍身黃或血結胸中手不近腹  
或寒熱昏迷其人如在

虎一兩 嬰五各 其二各 桂一各  
右入姜煎五更服

三一承氣湯治瀉渴胃中有熱  
虎 芒 朴 實 耳  
右煎服

補愚按治傷寒雜病內外所傷  
一切風熱風痰濕熱燥熱入裡之  
深大小便閉或難產死胎不下  
小兒斑疹黑陷等証○治消渴胃  
中有熱○又能治肝經王莖中痛

三調胃承氣湯 治太陽陽明不

惡寒反惡熱邪在中焦作滿大便  
秘譫語嘔噦

虎半 芒一々

右上一味水煎入芒再煎一沸服

四卅 小承氣湯

治六七日大便不

通潮熱譫語腹脹滿悶而喘○下

痢赤黃內煩喜欲飲冷水小便不

利者先用三服蕩滌而後調治之

虎二々 朴 實各一

右煎服以利為度

補按活人太全曰裡症脉浮緩

宜下者小承氣湯主之肝之裏

見症者加柴翹心之裏見症者

加赤苓翁脾之裡見症者加葛

丹肺之裡見症者加翹苓腎之裡

見症者加滑栢

五卅 大承氣湯

治胃實譫語五六

日不大便腹滿煩渴舌乾口燥日

晡發熱脉沉實

虎半 朴 實各一 芒半合

右先煎實朴去粗內虎再煎去粗

納芒更煎一二沸服以利為度

瘡疾寒熱轉大者從卯至午發宜

柴胡湯從午至酉發者邪在內宜

太承氣湯從酉至子或至寅發者

邪在血宜桃仁承氣湯下之微利

後更以小柴胡湯撤其邪可也

補愚按活人太全曰裡症脉沈

宜急下者大承氣湯主之肝之  
裡見症者加柴芩心之裡見症  
者加連門脾之裡見症者加芍  
地肺之裡見症者加芩蒸腎之  
裡見症者加雷栢

**六** 加味承氣湯 治瘀血內停胸  
腹脹痛或大便不通

虎芒各二 實朴斤紅各五分  
右酒水半煎服病急者不用

按承氣之類可用壯盛人不可  
用虛弱人若不辨虛實則誤多  
○對症窺下風而與之則得卒效

**七** 涼膈散 治表未解半入裏下  
證赤全懊憹不眠二焦實火煩渴

口舌生瘡謔妄便溺閉結發斑黑  
陷或治上焦熱甚陽明少陽之氣  
中血藥也

翹四各 丹虎 苛  
芩各二 芒一各 甘五分

右水煎○或入竹葉生蜜少煎食  
後服加姜亦可或作末服○桌填  
加栝治諸般鬱熱退六經實火○  
肺金邪熱嗽痰加守○咽喉腫痛  
涎嗽加栝荊○咳而嘔加守姜○  
鼻衄嘔血加斤芍芩○淋閉加滑  
苓○風眩加芩芸膏○酒毒加葛  
連名清湯用蜜竹葉同煎○斑  
疹加葛荊赤芍芩芸桔○陽毒發



斑加斤○咳嗽加桑杏桔○結胸  
心下滿加桔枳○譫語發狂踰牆  
赴井皆陽熱極盛加連柏赤芍○  
眼生翳瘴赤澁流淚加菊賊芎  
○本方合四物湯名**雙和散**能益  
血泄熱

按除積熱實火之劑○一婦譫  
言發狂晝夜不眠不能坐臥飲  
食與則食不與則不食大便秘  
脈細緊而數四物湯加連四十  
餘貼而愈

**八散** 治傷寒感冒頭疼身  
熱惡風多汗嘔逆惡心  
參苓 伽 陳 藿 朴 寧 甘

右入姜棗水煎服

按此方溫劑也傷寒及諸病之  
肌熱以寒劑而不退則與此方  
而其熱退是乃熱因熱用為秘  
中之秘矣○他家去參加桔名  
**萬安湯**是以退諸病之肌熱也  
○灸熱食熱等亦可○醫王證  
輕用之○頭疼發熱身倦或舌  
強不能言語是乃有傷寒與中  
風之疑則宜用之○風勞多汗  
或勞傷過度怠惰自汗或飲食  
無味或嘔逆惡心俱以取驗○  
感風寒頭痛壯熱無汗則加羌  
去參○頰頰及咽腫痛津唾難

吞加桔卷升○咳嗽加西○脾  
胃虛而瀉除朴

**九卅 温膽湯** 治心虛膽怯觸事易

驚夜夢不祥異像致心驚氣鬱生  
痰涎或短氣悸之自汗飲食無味

或傷寒一切病後虛煩不得眠臥

守陳苓實各二分 茹一分 甘五分

右入姜棗煎服 **補加柴利連參**

莎名竹茹温膽湯治傷寒日數

過多其熱不退夢寐不寧心驚

恍惚煩燥多痰不眠者

一方治膽虛痰熱驚悸不眠去

參加姜四分煎服

一方驚悸屬痰火而兼氣虛治痰

火而驚惕不眠

參伽神沂池酸炒門守

實連茹丹各等分 辰五分 甘三分

右入姜一片棗一枚梅一箇瀝

煎調辰末而服

**十四 加味温膽湯** 治病後虛煩不

得睡臥及心膽虛怯觸事易驚短

氣悸之

守三分 陳二分 茹 實各一分 苓

甘各一分 遠玄 參 芩 酸各

右入姜棗煎服

按病後虛煩不眠者選先方得

數奇○一人與主君爲口論

戶丁年餘心熱煩滿痰火心攻

腹脹嘔逆夜不能寢他醫皆言  
陰虛火動而治不應予謂氣鬱  
生痰而然加味溫膽湯加連而  
安○姪婦心驚煩悶不眠溫膽  
湯加參門柴而安

一平補丸味羌活湯不問傷寒傷風  
寒熱頭項筋腰四肢強痛并四時  
感冒疫癘晚發等症雜病亦可通  
治此方不犯三陽經禁解利補方

羌 芸

精各二芎 芷

芎 地

各二錢

甘各五

右入姜棗水煎○此方發春夏秋  
三時表症代桂枝麻黃青龍各蓋  
三時暄熱傷寒則不敢用冬月麻

黃而發表故代以羌精傷風則不  
敢用冬月枝而實表故代以芸伽  
芎芷辛發表以代杏地救血以代  
芎加芎以順天時也○太陽症加  
羌本○陽明症加周葛芷○少陽  
症加柴芎守○太陽症加精朴洞  
○少陰症加利雷栢○厥陰症加  
芎柴○夏月加羔雷○有汗去細  
○服此湯後不作汗加水○惡風  
自汗加枝○夏月去枝加芎○汗  
後不解加虎○嘔逆加姜汁○有  
痰去地加守○肌熱加葛柴○喘  
而惡寒身熱加杏地○虛煩加雷  
門茹○胸中飽悶加枳利○中風

行經加附○便閉加虎○中風兼  
五痺等症各隨一經內外上下  
寒熱溫涼四時六氣加減補瀉用  
之○渴加雷羔

赤水玄珠云此方予每用加柴  
胡乃總治傷風各經之活套也  
今人只知其治四時傷寒如神  
不知加柴胡總治各經之妙云

六一順氣散 治傷寒傳裡太

便結實口燥咽乾怕熱擗衣譫語  
狂妄揚手擲足斑黃陽厥潮熱自  
汗胸膈滿硬遠臍疼痛症  
柴胡 芍藥 枳實 芒硝 甘草  
柴胡 芍藥 枳實 芒硝 甘草  
右水煎服入欬秀水三匙

按代大承氣小承氣調胃承氣  
太柴胡三乙承氣大陷胸等湯  
之神藥也舉世無人知此奇妙

清火化痰湯 治熱痰在胸膈

間不化咯吐不出寒熱氣急滿悶  
作痛者名痰結

連芩丹 貝 萸 利 枳 貴  
守 芩 丹 芒 雪 甘 蜜 杏  
右入姜煎入瀝姜汁

按年力壯盛先用吐痰法後服  
此湯此方治痰嗽之劑

四芩 芩蘇散 治四時傷寒頭痛發

熱惡寒其外治孕婦傷寒傷風  
芩 二 老 水 葛 各 三 利 守

蘇好

枳 費各一柴 苓各二分 甘草少  
右入姜棗水煎

按類香葛湯治四時傷寒時行  
疫癘表証

**五甲 麻黃湯** 治太陽症頭疼發熱

惡寒脊強身痛無汗脉浮緊而喘  
又治太陽八九日不解以此發汗  
必衄乃解及不得汗發衄又治太  
陽陽明合病喘而胸滿腹不滿邪  
在表分不出下者又治陽明脉浮  
無汗而喘凡脉但浮無餘症者皆  
宜服之

麻二錢 枝一分 甘草六分 杏仁十個

右姜煎○本方加升芎芷芸羌本

姜蔥豆豉名陶氏麻黃湯治法同

上○若本經寒熱頭痛無汗而喘  
去升加葛○本經寒熱身痛去杏  
加精芍○本經寒熱身痒面赤不  
得小汗者去杏芷升加柴芍○本  
經寒熱頭痛胸中飽悶加枳刺○  
蓋麻黃陽性熱惟冬及春初兼病  
人素有寒者乃用正方夏至後服  
必發斑黃在胸○如夏月得太陽  
証惡寒發熱頭痛脉浮洪盛無汗  
以子和六神通解散代之

按此方治太陽膀胱經無汗辛  
溫發表之劑

**六甲 六神通解散**

精三各一滑苓各一麻七分苳五分

右水煎○春加苳○太陽發熱無汗惡寒漸變為剛痊者加赤芍亦分乾葛一錢豆豉二錢入葱白同煎○傷寒中濕身躄痛身目俱黃去枝加翹二錢雪赤豆各二錢入生姜大棗同煎○傷寒即病少陰經脉沈微身躄痛得汗則已本方中去枝杏其加細一錢二分附一錢○傷寒大下後脉沉遲尺脉不至咽喉不利唾膿血厥逆泄利不止者雖日難治去杏加升各一錢雷苓藜蘆各半錢羔伽芍顛苓各七分次第取微汗而愈○即

病少陰經無表裡症去枝杏倍上

加附一錢二三服後得微汗而愈

○風濕相搏脉浮一身盡痛去枝

加薏一錢得微汗而愈

**桂枝湯**治太陽傷風衛實榮虛

自汗頭痛鼻塞項強乾嘔面惡寒

酒洒惡風翁翁發熱或熱多寒少

面色光而不慘煩躁身痛手足不

冷脉浮緩寸大尺弱者宜如無汗

溺數手足冷不惡寒者忌用夏月

誤服麻桂必發黃發斑在悶而死

枝芍各三 苳一錢 右水煎

○加防芎各一卷本姜棗名各一

○如汗多加伽○汗不止加苳

喘加柴杏○胸中飽悶加枝

按此方治太陽膀胱經有汗辛  
溫實表之劑

**桂枝湯** 回春

桂 芍 芩 苓 芍  
各等分

右水煎 加芍名程枝黃令湯

**八平柴葛解肌湯**

治足陽明胃經

受症日痛鼻乾不得眠眼腫痛脉  
來微洪宜解肌屬陽明經病其正  
陽明腑病則別有治法

柴 葛 芍 芩 芍  
芩 芍 芩 芍 芍

右入姜三片棗一枚水煎○本經

無汗惡寒去芍加麻

按此方治陽明胃經解肌之劑

**九平益氣養神湯**

治傷寒新瘧方

起勞動應事或多言勞神而微復  
發熱者曰勞復宜服之

參 斤 湯 門 雷 丹  
西 貴 升 甘  
各五分 各五分 各五分

右入棗一枚水煎服

**辛梔豉湯**

治汗吐下後心膈滿

悶或痛或微汗虛煩不得眠反復  
顛倒心中懊憹及噪熱佛鬱於內  
而氣不宜通

紅梔子 淡豆豉 右水煎

○少氣虛滿加甘○嘔噦加姜黃

○有宿食而煩燥者加虎○下後  
脹滿而煩加洞淡○下後身熱而  
煩加其永○差後勞復加洞

按此方治懊憹之劑

一三白湯 治虛煩或泄或渴實

調理內傷外感之奇方也

餘 伽 苓 各一 廿五分

右水煎服

二加味益氣湯 治躄虛弱兼乏

勞而染感冒傷寒頭痛發熱者

樞 參 各一 伽 貴 斤 各七

柴 一 升 三分 酒 七分 卷 半

芸 一 老 廿五分

右入姜水煎服○冬月加細○熱

甚脉滯有力加落

三桂枝大黃湯 治足太陰脾經

受症腹滿而痛咽乾而渴手足温

脉來沉而有力皆因邪熱從陽經

傳入陰經也

枝 虎 芍 柴 洞 廿

右入姜棗水煎臨服入洗○喘者

加腹

按此方治太陰脾經腹痛之劑

新改正合類增補衆方規矩卷一終



合類增補衆方規矩卷之二

中寒

二理中湯 治五臟中寒口噤失

音四肢強直兼治胃脘停痰冷氣刺痛及膿毒下寒泄利腹脹大便或黃或白或黑或有清穀

參 加炒 永炒 甘草

右入姜棗煎服○若為寒氣濕氣所干者加附名附子理中湯若中

附毒者甘草乾姜等分或黑豆煎湯解之不可不知也○霍亂吐瀉

加童陳名治中湯嘔吐者治中湯

加喬守姜○泄瀉加陳苓名補

湯○瀉泄不止者補中湯加附○

不喜飲食米穀不化加砂附陳苓

○霍亂吐下心腹痛手足厥冷去

加加附名四順湯 ○心膈

急痛手不可近加實苓 ○渴欲飲

水加瑞 ○霍亂轉筋加膏 ○臍上

築者腎氣動也去 加桂 ○悸多

加苓若寒加承 ○腹痛去 加附

○飲酒過多及炙煖熱食發為

加芎 ○腹滿下利脉沈遲而微 加

附 ○痼冷症加附桂苓 ○胃寒嘔

吐清水冷涎脉沉遲加苓附官 霍

喬守砂姜梅 ○若寒極手足冷脉

微吐不出加附去官 ○噦氣有胃

寒者去 加蜜益陳朴莎 ○虺厥

者胃寒所生加椒棋 ○口舌生瘡

飲食少思大便不實此中氣虛也

手足冷腹痛加附 ○躄虛感雨濕

而嘔吐加童陳守婆 ○去其加陳

守入姜煎服治胃氣虛寒作惡心

亦治船暈

按此湯治寒之劑也 ○乾霍亂

心腹絞痛不吐瀉足冷脉沉欲

絕者先用鹽湯探吐而後加婆

朴蒼砂莎蜜枳陳桂腹痛 額頭

皤黑手足收引脉無氣以息者

此中寒暴死也加附 ○臟腑停

寒腹痛身怯泄瀉青黑不止加

陳婆苓桂梅 ○若寒極手足冷

脈沉細去桂加附○腹痛滿去  
參加砂朴木嘔噦惡心去桂加  
喬守○瀉不止加蒼預○虛汗  
去藿桂加苓○飽悶去桂加朴  
砂○飲食不節過食生冷腸鳴  
泄下加童陳砂○急陰證手足  
冷指甲青少腹痛囊縮加附陳  
守喬苓多曲沈入姜棗鹽少煎  
服如急陰不省人事用猛填臍  
中灸艾灸之以醒為度○傷寒  
自利不渴寒多而嘔或腹痛下  
利霍亂吐瀉手足厥冷者用附  
雖諸證皆退而吐不止則百無  
一○生補本方加桂貴苓各陶氏

**理中湯**

治方同上○吐多去附  
加姜○下多還用附○悸者加

苓○渴者加倍附○腹痛裡虛  
倍參○寒者倍永○胃虛則氣  
壅腹滿去附加附○嘔吐不止  
減芩加姜汁○吐就去芩加烏  
○飢逆加喬柿○噦逆加蜜○  
寒濕發黃加茵○肺弱泄不止  
瀉不利倍參伽合五苓散  
○腎氣動急去附加桂

**三**

**五積散** 治感冒寒邪頭痛身

疼項背拘急惡寒嘔吐或腹痛又  
傷風寒發熱頭疼惡風無問內傷  
生冷外感風寒及寒濕客于經絡

腰脚酸疼及婦人經血不調或難產並治之

蒼八分 圖六分 野樹 陳

桂 守 各四分 廿二分

右人姜蔥水煎服○冒寒用煨木

○挾氣加吳○足浮腫加五加腹

○遍身疼加乳沒細○已成風痺

加羌搖芸○四肢濕痺合烏藥順

氣散○腰痛加嬰苗○手足攣拳

加栝瓜膝○咳嗽加杏雪○婦人

調經催產加艾醋○難產加麝桂

○腹痛綿綿無增減因寒者宜治

○腰痛感寒濕脾胃氣閉加嬰○

寒濕傷腎經胃痛不可挽仰加水

嬰○感風寒濕臂膊痛或遍身麻

木者用之遍身壯熱四肢骨節痛

因虛寒者加羌搖穿○秋冬脚膝

腫滿疼痛因寒濕流注經絡加瓜

膝栝吳○醉飽後色慾不節觸傷

小腹成疝氣其疝自小腹痛連腰

膝下心頭吊痛額上汗出加索○

又虛弱人中寒疝氣作痛亦宜○

婦人遇經行時身痛手足麻痺或

寒熱頭疼目眩去水加羌搖膝姜

蔥○咳嗽加杏玄○瀉泄去枳加

行伽○赤白帶下屬虛寒加莎茜

吳○新產後以此湯除敗血生新

血無寒熱之患去卑○熱加芩○  
小兒痘疹天時嚴寒不能起發或  
紅斑初見者除桂枳外十三味慢  
火炒令攤冷入一味加生姜水煎  
熱服則為貫膿

按夏至去卑此方除寒濕故有  
痛者必用○頭疼臂痛腹痛腰  
痛脚氣痛風等皆有發熱而足  
冷則與此湯可也○寒滯脾腎  
肝三陰而四肢百節痛有奇効  
○因滯氣而腹筋張加童○寒  
疝加吳○因打撲而血滯冷痛  
立得効○冬月腰不立上氣面  
赤下冷又腰已下冷如冰面上

火熱背憎寒並宜○婦人兩腿  
痛甚有汗足絛冷加附三貼安  
○婦人淋病加車通可秘○婦  
人身冷經水不來者可○赤白  
帶下屬虛寒有痛加吳侯○難  
產腰腹甚痛時寒天加附得妙  
又腰腹痛破水下未產經宿亦  
得○產後餘血攻心或有冷塊  
攻心上氣則取驗若無驗則正  
氣天香湯有太奇○死胎腹痛  
大熱脉數加永附二貼而立下  
○躰虛作瘡寒多無汗加枳果  
**補**腹痛或挾氣加吳○躰薄有  
汗去精卑○氣虛去枳利加參

伽○產後餘血入遍身肢節腰  
脚疼痛去卑加參瓜嬰商

三補四逆湯治即病太陰自利不  
渴及三陰症脉微欲絕手足厥冷

永カキ五カキ附シ生シ廿シ一シ兩

右水煎○或加參○加參伽苓貴  
守桂玄名陶氏四逆湯○利止脉  
不出加參○腹痛加芍○嘔吐不  
止加姜汁○泄不止加升菴○咽  
痛加利

按此方治中寒温熱之劑

四回陽救危湯治傷寒初起無  
頭加無身熱便就怕寒四肢厥冷  
或通於肘膝或腹痛吐瀉或口吐

白沫或流涎或戰慄面如刀刺  
引衣倦臥不渴脉來沈遲無力即  
是寒中陰經真寒証不從陽經傳來

參伽苓貴守附玄  
永桂カキ廿シ一シ兩

○嘔吐涎沫或小腹痛加吳コヒラ鹽シ炒シ○  
泄瀉不止加芪升○嘔吐不止加  
姜汁○若倉卒無藥不便可用葱  
熨法或艾灸關元氣海二三十壯  
按此方治虛寒温補之劑

補火証

五黃連湯治心火舌上生瘡或  
舌上腫燥裂或舌尖出血舌硬  
蓮丹サシ地チ斤ハ門カ芍シ各シ二シ錢

藜蘆 各五分 右水煎

六 柴胡湯 治肝火盛水氣實或脇痛或氣從左邊起者或目紅腫

痛俱肝火也

柴芍 芎 遊 斤 童

翹丹 各二分 右水煎

七 黃芩湯 治肺火咳嗽吐血痰

血鼻血咽喉腫痛乾燥生瘡或鼻孔乾燥生瘡或鼻腫痛

芩丹 利芍 雪門 假

藜蘆 各五分 右水煎

八 芍藥湯 治脾火或消穀易飢

或胃熱口燥煩渴或唇生瘡 芍丹 連 翹 藜蘆 各二分

右水煎

中暑 附 霍亂

九 五苓散 治汗後中腸燥燥小便不利而渴

澤 一 半 伽 赤苓 猪 各 一 桂 半

右為末 滿米飲調服或入姜棗煎服

○熱甚去桂加芩 ○中暑煩渴身熱頭痛霍亂泄瀉小便赤少心

神恍惚宜此湯或為末熱湯調下愈妙加滑石甚可 ○喘咳煩心不

得眠加膠 ○恍惚加辰 ○伏暑身熱大渴未解合人參白虎湯 ○濕

熱所傷身熱煩渴小便赤少宜此湯 ○身腫無汗倍加羌 ○黃疸發

熱倍加茵○水腫從腰以下俱腫  
加蜜茵○虛寒小便不通加斤枳  
膝通其燈○小便虛弱不禁者合  
四物湯加會山菜○男婦赤濁合  
妙香散名香令散用天麥二門煎  
湯而下○濕瀉者瀉水多而腹不  
痛腹響雷鳴脈細加預陳蒼衍訶  
砂其姜梅燈○傷寒三四日往來  
寒熱自利者本方合小柴胡湯入  
姜棗名柴苓湯一切發熱憎寒者  
邪在半表半裡宜此湯○瘧發寒  
熱病在表裡陰陽不分亦然○無  
汗加麻有汗加枝其寒多加官熱多  
加芩○去桂名四苓散○小便不

禁有熱加連和會山菜○飲酒伏  
暑鬱發為疽煩渴小便不利加茵  
補本方加枝其滑丹燈去桂名  
陶氏五苓散○中濕身目黃加  
茵○水結胸加燈翁○陽症去  
桂○陰症加附子○溫熱病加  
其○熱發黃加茵○頭目痛  
加芎藭○咳嗽加五味○熱吐  
加守○熱瀉合小柴胡湯加連  
○狂言亂語加辰○小便閉加  
瞿麥滑○大便難加芩○勞復  
加利○水氣加葶○發虛熱加  
參芪門○腹痛加蜜○氣壅加  
茂削○鼻衄加芩○尿血加丹



○身痛加精○煩燥去桂加參  
○心煩不眠加阿膠○初痢加  
虎○心氣不足加參閱○喘急  
加兜雪○五心熱如勞加利柴  
○有痰有熱加雪參西○霍亂  
轉筋加薤瓜○疝氣加茴桂練  
洗姜蔥○女子紅汗加嬰王○  
嘔吐去桂加守姜

**十一**加味四苓散 火瀉者腹痛一陳  
瀉一陳後去如湯後重如滯瀉下赤  
色小水短赤煩渴脉數是也用此湯  
丹 陳各五分 梅一 茶心  
右入燈草煎服○飽悶加朴砂去

預○腹痛去伽加朴砂密茵○嘔  
噦惡心加藿梅蓮砂參○小水短  
赤去澤加通車○口燥煩渴去澤  
蒼加連門蓮梅葛○瀉多元氣虛  
脫昏倦去澤蒼加參芪○夏月暑  
瀉加藜扁○瀉多煩燥去蒼澤加  
連參辰梅○瀉多不止去澤丹加  
衍參○發熱脉數加柴苓

按治濕之劑殊視小水不通或  
澁而可與此湯也四苓散治火  
瀉熱瀉發熱五苓散治濕瀉退  
下濕柴苓湯治瘧疾寒熱皆其功  
有數多故不舉治例而可知者也

**十二**十味香薷飲 治伏暑身體倦

急神昏頭重吐利

藟一各參 陳 伽 苓 芪  
瓜 朴 扁 甘 各半各

右煎服○暑風去芪加羌一各半

脉虛弱加參玄門此三味名

散○心煩加連丹○胸脹加桔枳

○夾痰加星守○嘔吐加藿姜汁

少○渴加葛瑞○有瘧加羌

按伏暑退散之劑○夏月躰倦

頭目昏重腹痛瀉下甚得數奇

○夏月煩熱頭身痛小水赤去

參芪加連羌而安○夏月躰

四肢倦怠晝夜汗出如浴咽乾

心煩加連瑞而安

三 清暑益氣湯 治長夏濕熱蒸

入四肢困倦精神短少懶于動作

胸滿氣促肢節疼痛或氣高而喘

身熱而煩心下膨悶小便赤而數

大便澀而頻或痢或渴不思飲食

自汗躰重

芪 密 蒼 周 各 參 伽

曲 陳 澤 葛 各 五 斤

門 膠 董 甘 各 三 玄 九

右煎服○汗多倍芪○飽悶加砂

多○惡心加梅蓮梗○噦加茹○

煩燥加辰酸茹○小水短赤加通

丹○胃腕不開不思飲食加朴多

益砂蓮○腰痛加仲茵紙○腿酸

無力加膝伸○皮焦加錄○頭目眩暈加芎○虛汗加酸○夢遺加預蛻辰○口苦舌乾加丹梅葛

按清暑益氣之劑○一女子十

七八歲夏末羸瘦骨立四肢倦

息食少肌熱聲嚶嗜卧形如虛

怯脉細緊而數他療不効加續

連三十餘貼而為全人○一男

半歲患頭痛甚而晝夜不寢

少中頭於枕則氣上於氣衝而

欲絕故常不側卧倚箒息捧兩

手抱頭他治不効予六月初試

脉細數無力加芎細本酸五六

十貼而全愈○又一男大腸頭

破四形如錠甚腫痛下血時六

月中旬加冷桑杏核得奇妙其

後再三發每發皆得

**生脉散** 滋生精氣培養真

元補心潤肺

參 門各三 女 十 泄瀉加伽

水煎○本方加斤芪地各

**脉散**○生津止渴加芪栢○身重

疼痛者用人參敗毒散加蒸連○

按此方元氣虛脫者可用此湯

**參歸益元湯** 治注夏病

參五分 玄 十粒 栢 雷 貴 各七份

耳 芎 斤 芍 門各一錢

右棗一枚烏一箇炒米一撮水煎

○飽悶加砂多○惡心加烏藥炒  
 米○噦加茹○煩燥加辰酸茹○  
 瀉加加炒 瀉砂烏去雷栢芎○小  
 水短赤加翁丹○胃腕不開不思  
 飲食加朴多益砂藥去栢栢雷○  
 腰痛加仲紙苗○腿酸無力加膝  
 仲○皮焦加地骨皮○頭目眩暈  
 加芎○虛汗加芪伽酸○夢遺加  
 蠟辰椿○虛驚煩熱加辰酸茹○  
 口苦舌乾加丹烏葛

按此方五心煩熱口苦舌乾精  
 神困倦無力好睡飲食減少胸  
 膈不利形如虛怯脉數無力是  
 名注夏宜此湯

**五 六和湯** 治暑傷心脾霍亂轉

筋嘔瀉寒熱痰嗽痞喘頭目昏痛  
 肢躄浮腫便澀胃暑背寒伏熱厥  
 冷瘡痢中酒煩渴畏食又暑毒客  
 上焦胸膈痞塞上氣喘急渴藥入  
 口即吐磨少許

守砂 杏 參 甘 各一 赤苓  
 藿 各四 菜 朴 各八 右入姜棗  
 水煎○如日間冒暑夜感風露加  
 芎菴○婦人胎前產後亦用宜

**六 理中湯** 治乾霍亂心腹胞脹

絞痛不吐不瀉脉沉欲絕  
 藿 精 朴 砂 莎 蜜

枳 貴各廿 甘 桂 各五分

右入姜水煎○夏月乾霍亂不吐瀉胸腹絞痛煩渴自汗不可用姜桂○心腹絞痛面唇青手足冷脉伏欲絕加附苗去精○心腹胞悶硬痛結實者加洗洞查萸芻去其枳精○胃寒嘔噦發呃加喬茴莎良去桂甘精○虛汗加附去婆精外用炒姜渣

按此方治霍亂屬虛寒者宜之乾霍亂之主方也

七九君子湯 治霍亂已愈煩熱

多渴有痰小便不利 貴 守 門 苓 參 小麥

甘 各五分 齏 一箇 右入姜水煎

按此方治霍亂痰喘煩渴

天 白朮散 治霍亂及一切吐瀉

煩渴氣弱妊娠之霍亂

伽 苓 參 婆 密 葛 二 甘

右水煎○又妊娠之霍亂用五苓散香茹散亦可也

按此方治傷寒雜病一切吐瀉

煩渴霍亂虛損氣弱保養衰老

及治酒積嘔噦

五 藿香正氣散 四時通用 傷寒

三 人參白虎湯 治夏月中暈即

中熱舌燥生胎刺

參 五分 甘 三分 伽 貴 各七分 羔 雷 各一分

扁八 苓 芍 藜 丹 附 子

右蓮肉十個烏梅十個水煎

按此方治身熱頭痛洒然毛聳微寒口開前齒燥舌燥生胎大煩渴

中濕

一尤 獨活寄生湯 治腎氣虛弱冷

濕地腰背拘急筋攣骨痛當風

取涼過度風邪流入脚膝為偏枯

痺緩弱疼痛牽引脚重行步難

艱並白虎歷節風痛○中濕而偏

枯冷痺者腎氣虛也

搖 寄 他 續 膝 伸 先

細 桂 芍 芎 芩 苓

參 斤 各 半 各 等 分 甘 牛

右入姜煎空心服○夫腰痛者皆

由腎氣虛弱臥冷湿地當風得之

不速治喜流脚膝為偏枯冷痺緩

弱疼痛或腰痛攣脚重痺宜急服

此○治肝腎虛風濕內攻兩脛緩

縱痛痺弱不仁足膝攣重又治

白虎歷節風神效

是腰痛之主方也按因虛而為

中濕脚氣痛風腰痛此之四症

並治兼以癱瘓中風亦取驗

二尤 補 滲 濕 湯 治中濕腹脹滿邪

入裡者兼治一切濕症

精 伽 苓 各 一 貴 芋

猪 各 一 莎 芎 砂 各 七 分

朴各七分 苳各三分 姜一片 燈艸一團

右水煎○脾虛發腫滿氣急喘嗽  
去伽其加腹皮枳實蘇子桑蘿○  
面目浮腫去芎澤朴莎加預芎倍  
蒼燥熱勝濕則豁然而收○瀉不  
正加衍泄梅永○嘔噦去朴莎芎  
加預梅炒米甚不止加煨永○濕  
症身躄重痛手足麻木酸軟腫痛  
或枯細痿弱筋脉拘攣去莎芎朴  
猪澤加斤地芎蜜乳桂膝苓菴芸  
按此方治寒濕所傷身體重著  
如坐水中小便赤澀大便溏泄  
三九 除濕菴活湯 治風濕相搏  
身盡痛

蒼各一分 本各一分 菴七分 廿六  
升各五分 柴各五分 右水煎服

四九 除濕湯 治寒濕所傷身重腰

脚酸痛大便瀉小便或澀或利

蒼各二分 守各二分 婆各二分 陳各二分 苓  
伽各一分 苳各一分 右入姜棗水煎服

按傷濕發熱惡寒身重自汗骨  
節疼痛腰脚痺冷皆因坐卧卑  
濕冒雨露或者濕衣所致宜此湯

五九 加味五苓散 治濕勝身痛小  
便不利躄重發渴者

卽五苓散加菴一儂方見中晷

### 內傷

六九 補中益氣湯 治中氣不足飲

食勞倦滯氣下陷以致脾胃虛弱  
發熱頭疼四肢倦怠心煩肌瘦日  
漸羸弱此藥能升元氣退虛熱補  
脾胃生氣血

芪一各 參 仰 芩各七

陳五分 柴 周各三 茸

右姜棗煎服○頭痛加蔓○痛甚  
加芎○頂痛腦痛加本細○諸頭  
痛並用此四味足矣○痰厥頭痛  
加守姜○額疼加芷葛周○善嚏  
者勝理不密外邪所搏加芷芎○  
耳鳴目黃頰頰腫頸肩膈肘臂痛  
面赤脉洪大加羌芩本其通其經  
血加芩連洩其腫加參芪益元氣

○噤痛頰腫脉洪大而赤加芩其

桔○口乾噤乾加葛○夏咳嗽加

會門○冬咳嗽加麻不吐秋涼亦

加春月天温加芩欬○嗽加桑○

○久病痰嗽肺有伏火去參○食

不下乃胸中胃上有寒或氣滯滯

加童密陳○如冬加益漏○如夏

加芩連更加棋漏砂多○春初猶

寒加益漏○心下痞悶加芍連痞

腹脹加實砂朴○寒少加水或桂

○心下痞覺中寒加附連○不食

而痞加姜陳○能食而痞加連實

○脉緩有痰而痞加守連○脉弦

四肢滿便難而痞加連柴其○腹



痛加芍其○如惡寒覺冷痛加桂  
 夏腹痛不惡寒不惡熱加苓其  
 ○寒涼時腹痛加守益瀉○脇下  
 痛或脇下滿急加柴其○臍下痛  
 加芩如不已者太寒也加桂○虛  
 勞發熱去周加守苓苓錄會○陰  
 虛火動加栝雷飲酒人元氣虛弱  
 無力飲食減少面紅加守芍葛曲  
 朮枳○小便閉加門○大便閉加  
 嬰紅麻仁○元氣虛弱腰痛加栝  
 雷膝芍○夢遺加蠟龍○下部無  
 力加膝牡○脚弱加瓜離○泄瀉  
 加芍澤苓○汗多去升柴加酸夜  
 間不睡亦如之○精神短少加參

會○用心太過神思不寧或怔忡  
 驚悸加神遠酸薑楨子○大病後  
 元氣未復而胸滿氣短加陳實芍  
 ○男婦骨蒸勞熱加芍會○內傷  
 氣虛自汗久不止加附麻根淨麥  
 ○十指盡麻並面自遍身皆麻此  
 氣虛也加水莎門羌芸葵○咽喉  
 腫痛口舌生瘡勞而愈盛是屬內  
 傷不足加芩酒雷栝○中氣不足  
 脉虛微氣不相續而發呢加參門  
 會栝以降陰或少加附○氣虛有  
 汗潮熱者或內傷發熱者並宜○  
 婦人因勞耳鳴頭疼身倦此氣不  
 足加門玄○孕八箇月胎下墜或

動而黃弊倦飲食少此脾氣虛弱  
倍伽再加蘇梗三十餘劑而安○  
婦人每交接出血作痛此肝火動  
解用此湯而愈○金瘡腫痛出血  
不止寒熱口乾此氣虛血無所附  
加玄門○小兒諸疳癆瘵久治不  
愈多服尤効○痘瘡結痂而誤犯  
風寒惡寒發熱尤宜○酒慾過傷  
而成淋者用此方補元氣則水道  
運行故淋不作矣

按治內傷不足清氣下降之方  
也番歲頃與一應之不食頭痛  
發熱四肢倦怠而時時憊人且  
重其證生眩暈為胸塞而已爾

以來察脉與眼精而知可與醫  
王之法矣洪大而數緩大而無  
力急大而數時一瀰是乃心脾  
肺之虛脉也眼色見張弱虛然  
無精是其所為也○一切病後  
元氣未復精無情脉虛大則宜  
使加減消息而調理矣○傷寒  
愈後因勞力再發其症頭疼身  
痛寒熱往來腰腿酸疼沈困無  
力加稍差芸若未効則加附蓮  
補藥力也名之**加味益氣湯**○  
傷寒愈後為沐浴感風再發熱  
元氣虛宜加味益氣湯○傷寒  
愈後元氣未復於是犯房勞則

必小便澀肌熱沉困加附得奇  
 効○平素不足兼勞役內傷挾  
 風寒暑以致癘疾寒熱交作  
 躄倦怠加芩芍守○痢疾久不  
 愈不能起床不食疲弱之甚者  
 加芩密砂卵去柴○婦人風毒  
 腫愈後上下流注而腫痛躄瘦  
 乏力發熱不食與此湯腫痛在  
 上加搖在下加差而得愈按其  
 流注者初為發散不足之故歟  
 ○金瘡腫痛其口開則此湯尤  
 宜若其口閉則宜用茯苓補心  
 湯也癰疽亦然○內傷氣血溢  
 汗不止兼乾咳肌熱加酸門芩

栢○予之父八十歲時冬月大小  
 便不通莖中及肛門甚痛數方  
 不効故灸氣海翌朝小腹腫起  
 三寸許二穴痛益甚於是予嚼  
 然以醫王煎汁與六味丸則塊  
 刻小水通至夜燥屎下終四五  
 日而安○一男面白鼻流清涕  
 不聞香臭二年予以為肺氣虛  
 加門丹而愈○半產氣虛下血  
 不止昏暈不知人事加芎水○  
 產後下血不盡與芎歸湯四物  
 湯之類不止故用此湯以得奇  
 効諸下血崩漏帶下等亦見氣  
 弱躄倦則亦當與此湯○或詰

云痛風百節痛加本卷芸七仲  
若痛止則去加味可用本方也

**七**升陽補氣湯 治飲食不時飢

飽勞役胃氣不足脾氣下陷氣短  
無力不能寒熱早飯後轉增昏悶  
頻要眠睡怠惰四肢不快懶倦動  
作五心煩熱

朴二分 升 卷 檉 芸

酌 茸 澤各五分 地七分 柴二分

右入姜棗煎服○腹脹及窄狹倍  
補○腹硬加砂分三

按此方治食後頭痛少有寒熱  
四肢怠惰氣不快欲睡眠者是  
乃脾胃虛弱故也

**八**補參朮調中湯 濕熱補氣止

定喘和脾胃進飲食

補中益氣湯去斤柴升加桑分五

玄九分 籙門分各二 苓三分 童一分

按此方治氣虛之劑

**九**止氣補虛湯 治內傷飲食七

情兼外邪所襲寒熱頭痛身疼腰  
脚軟弱轉筋自汗肢冷麻痺男婦  
諸虛通用婦人產後感寒最宜

參 婆 朮 芩 芷 斤

芎 芎 神各五分 桂 玄 佛

守 附 喬 麥 永 甘各二分

右入姜棗水煎服  
按此方治血虛之劑

光參苓白朮散

治脾胃虛弱飲

食不進或嘔吐瀉利其大病後補助脾胃此藥極妙

參 佛 苓

薏 蓮

各一兩 右水煎

治噤口痢用石蓮

又加石菖蒲

或有加蜜兩 ○別方加砂一兩

按此方治脾胃虛之劑

飲食 附痞滿

一光 平胃散

治脾胃不和飲食不

進常服則暖胃消痰

蒼 八 朴

陳 各五 廿二支

右入姜棗煎服或為末鹽湯點服

亦可也 ○瀉脾濕加苓 喬 佛 各調

胃散

丁法加藿 守 痰嗽瘧疾加

守 ○瘧疾寒熱加柴 ○本臟氣痛

加荷 ○水氣腫滿加桑 ○婦人赤

白帶加莖 ○子宮久冷加桂 ○酒

傷加喬 ○飲冷傷食加良 ○滑泄

加衍 ○小便赤澀加苓澤 ○風痰

四肢沉困加荆 ○腿膝冷痛加膝

○渾身虛壅拘急加錄 ○脾胃困

弱不思飲食加菘參 ○白痢加吳

○赤痢加連 ○頭風加本 ○胃寒

嘔吐加薑苓喬 ○氣不舒快中脘

痞塞加莎砂薑 ○胸中不快心下

痞加枳木 ○太便秘加虎芒 ○遇

夏加苓炒 脉洪大亦加苓連 ○小

腸氣痛加鈴茵遇雨水濕潤時

加苓澤欲進食加曲芽吳蜀椒

永名吳茱萸湯治傷寒吐利加本

名和氣湯加本桔名和氣湯加藿

守名不換金正氣散治傷寒吐痢

瘧疾寒熱者加柴飲食不進身

躄沉重肢節酸痛皮膚微腫米穀

不化腹脹本方兩桑炒兩入姜名

對金飲子積塊屬熱者合小柴

胡湯加童枳曲查稜莪名

關格吐逆小便不通者合五苓散

散加藿按治脾濕之方也

小便不利或發黃合五苓散加

茵得奇驗補本方加曲麥查名

加味平胃散冷熱氣痛加茵

蜜五勞七傷有熱加苓柴

手足酸疼加發洗

香砂平胃散治宿食不消飲

食自倍者是乃脾胃傷也

莎蒼陳各一枳藿各一

砂木甘各五分右入姜煎服

○肉食不化加查果○米粉麵食

不化加曲芽○生冷瓜果不化加

永童飲酒傷加連葛梅○吐瀉

不止去積加苓○守梅吞酸吐

酸去枳木加連炒丹吳○因心痛

服熱藥過多後吞酸加連炒○食

鬱而饋雜去枳藿加連炒丹芎芍  
辰○右脇下有塊作痛飽悶者食  
積也去藿蒼加青查芽永煥○腹  
痛甚而瀉瀉後痛減脉弦是食積  
也先用備急圓而下之後用此湯  
按治食積之方也○腹痛而瀉  
瀉後痛減去霍加朴查曲官永  
得數驗○丁婦人噯氣作酸每  
夜寢間不覺浸二尺白布六七  
胸腹飽悶或痛惡食不思二年  
大抵去霍加朴查芽曲永尚隨  
時加減經二年餘而安殊去臘  
生丁男也

養胃湯 治脾胃虛嘔逆惡心

腹脇脹痛腸鳴泄瀉或寒熱如瘧  
骨節煩痛

藿 朴 守 苓 各一兩 藁

附 陳 參 各七分 伽 五分 草 少

右入姜梅煎服○心下痞滿而不  
能食去果參附加莎砂木實多○  
瘦人去守加連 肥人加蒼 食  
積去伽守加曲查芽○血虛去守  
加斤芍○氣虛去守加參○痰痛  
中瀉去伽守加薑貝桔歷○脾泄  
中瀉去守加蒼芍

此方在內傷不足按先方去蒼加  
附伽也予常去附代莎而治老人  
小兒之瘧疾則十得八九奇妙

四香砂養胃湯 治脾胃不和

不思飲食口不知味痞悶不舒

伽各莎 砂 蒼 朴 陳

苓各八分 參 蜜各五分

右入姜棗煎服○脾胃寒加木官

○肉食不化加查果○米粉麵食

不化加曲芽○生冷菓不化加

枳永○胸腹飽悶加枳腹葡萄○傷

食胃口痛加木實益○傷食泄瀉

加永梅伽○傷食惡心嘔吐加薑

喬守梅永

按此方平胃散合四君子湯加

砂莎多蜜故除濕痰補脾虛進

飲食矣予與此方則連年有試

胸滿清冷而不食是所以脾胃

虛冷而不和殊胃中有寒痰也

雖諸病而胸清冷而不食則止

本藥用此方進飲食且又與本

病藥也若此湯有支胸者可與

枳茂之類丸藥矣○久瀉日夜

五七行胸冷不食咽渴參苓白

朮散不効用此湯得奇妙○老

男心腹痛全不食脉平和服藥

皆吐數醫束手予謂是脾胃虛

冷此湯一貼而吐止五貼而食

進得奇名○婦人不食胸悻而

冷眩暈足亦冷沉香天麻湯不

効故與此湯而愈



五卅 香砂六君子湯

治脾虛不思飲食食後致飽悶

砂 參 木 益 其各五  
朴 各一 砂 參 木 益 其各五

右入姜棗煎服傳志六君子加莎霍砂○胃口

有寒嘔吐不止去木益加喬薑各

藿香安胃湯○脾瀉者食後到飽

瀉去即寬脈細去守多木益加芍

蒼預入姜梅煎服○腹痛去參預

加木茴○渴加永梅○小水赤短

加通車○嘔噦惡心加藿守○夏

月加連芩扁○冬月加永去芍○

按此方治因脾胃虛寒而致損

傷者矣不舉治例切所以得奇

効也去守益加水蒼則前所謂

香砂養胃湯

六卅 泔痞湯

治中氣虛弱不能運

化為痞者飲食痰積不能消化為

痞者濕熱太甚為痞者

參 木 苓 陳 守 朴

實 蓮 砂 澤 右入姜煎服

按治痞滿之主方也

七卅

補 陶氏平胃散治食積類傷寒

蒼 一 棗 朴 陳 伽 各七

甘 一 永 杏 曲 各二

珍 三 連 瀉 各四 蜜 少許

右入姜水煎服○腹痛加嬰痛甚

大便實熱去查曲菓姜加虎下之

○如心中兀兀欲吐無奈者用滾  
鹽湯調皂莢末五分探吐

〔八〕葛花解醒湯 治飲酒太過嘔  
吐痰逆心神煩亂胸膈痞塞手足

戰慄飲食減少小便不利

多砂 龍各五分 陳

猪參 各一分 伽曲

澤生 乾各二錢 童蜜各五分

右水煎服得微汗則酒病去

按此蓋不得已而用之豈可恃

此醜飲成病自損元氣耶

〔九〕內消散 治過食寒硬之物食

傷太陰或嘔吐痞滿脹痛

陳守苓 洞查曲 沙

砂劑 茂 右入姜水煎

按此方治冷積

〔十四〕行氣香蘇散 治內傷生冷飲

食厚味堅硬之物肚腹脹滿疼痛

外感風寒濕氣頭疼身熱憎寒遍

身骨節麻木疼痛七情惱怒相悖

飲食不下心腹氣痛方見傷寒○外感

風寒加蔥根○內傷飲食加查曲

按此方治內傷外感七情四氣

和解表裡之劑

〔一〕藿香正氣散 方見傷寒

右二方飲食之主方也

〔二〕枳實大黃湯 治胸腹有食積

大便不通者

實朴 虎 楨 甘 各等分

右水煎以利為度○腹痛甚加蜜

按此方治飲食停積痞脹作痛者

解鬱和中湯 治胸膈痞滿內

熱夜不安卧則愈

貴 枳 殼 莎 州 連 麴

朴 各七分 田 前 各八分 青

甘 各四分 右生姜五片水煎服

按此方七情氣鬱不思飲食挾痰火等証宜此湯

泄瀉

胃苓湯 治脾胃不和暑濕停

飲泄瀉腹痛水穀不化陰陽不分

不伏水土一切治泄瀉之總劑也

蒼 陳 朴 猪 飴 苓 澤

瀉 連 同六 甘 右入姜棗煎服

○氣虛加參○虛寒加朮○水

瀉加滑○食積加曲芽查○痰多

加守○勝濕加芸升○暴痢赤白

相雜腹痛裡急後重加水楨○久

瀉加升○腹痛加官○黃胖者飲

食無味四肢無力行步倦怠脈澀

而滯是也減桂加藿守腹查葛稜

莖童○脾胃不和而黃腫去芍連

加桂如小便赤澀加滑

按此方五苓散與平胃散等分

故傷食之泄瀉專可用焉若瀉

不止加訶○夏月之泄瀉去桂

加芍連予常桂半減用之何者  
桂大腸之引經也○夏月雖先  
瀉下而後瀉滯當用此湯○夏  
月瀉下身冷咽乾不欲衣按伏  
熱在內故合解毒湯而安○夏  
月患痛風按因暑濕而身躄骨  
節痛故用此湯而愈○水腫小  
便澀少大便結是乃食滯與濕  
熱所爲也加枳曲查砂腹莎入  
姜燈煎服而安○或語云此方  
四五月至八九月專用之何者  
治暑濕之故也

**五評**

**胃風湯**

治風冷乘虛客於腸  
胃水穀不化泄瀉腸鳴腹痛及腸

胃濕毒下如豆汁或下瘀血○又  
曰風瀉者瀉而便帶清血脈浮弦  
參 芎 芍 芩 芍 桂  
右入粟煎服○腹痛加木

按古今傳所謂下膿血則專用  
此湯也○腹痛瀉痢如煤血後  
重窘迫故伽減半加木枳得數  
奇下清血則○老人曉瀉二三  
行腹微痛脈緩加砂○小兒瀉  
下如豆汁腹痛身熱去桂加柴  
泠○產後當風致泄瀉腹痛宜  
此湯○或語云冬月之脫肛下  
血加木此妙術也理最可然

**六評**

**補理中湯**

治寒瀉

參 伽 永 各一 桂 其 各五  
貴 婆 苓 良 各七 烏 一个

右入姜棗燈州煎服○寒極手足冷  
脉沉細加附去良桂○腹痛加砂  
朴蜜去參○嘔噦惡心加喬田去

良桂○瀉不止加精黃○瀉多不  
止加衍訶附去良桂○虛汗加棗  
去藿桂○飽悶加朴砂去參良桂

**四苓散**治火瀉熱瀉火瀉者腹  
中痛陣  
瀉一陣後去如湯後重如滯瀉下  
赤色小水短赤煩渴脉數是也

匿 伽 猪 精炒芋 撰  
芍炒丹 貴各一 其五分 烏一个

右入燈州水煎服○飽悶加朴砂  
去藿○腹痛加朴砂蜜苗去伽○

嘔噦惡心加藿烏药砂參○小水  
短赤加翁菜去芋○口燥煩渴加

連門药烏葛去芋精○瀉多元氣  
虛脫昏倦加參芪去芋精○夏月

暑瀉加藜扁○瀉多煩渴加炒連  
參辰烏去精芋○瀉多不止加參

烏衍去芋丹○發熱脉數加薰炒  
芩烏 △ **五苓散**加芍連去桂用

亦可也 方見  
中書  
**加味五苓散** 治濕瀉 濕瀉者  
瀉水多

而腹不痛腹響  
雷鳴脉細是也  
芩 仰 猪 芋 藿 貴  
衍 精 砂 訶 官 其 各五分

右入姜烏燈水煎服

九 香砂平胃散

治食積瀉食積瀉者

腹痛甚而瀉瀉後痛減脈弦是也方見于飲食

本方去洞加柳苓又加珍查芽

傷熱食加麩傷酒暴泄者理中

湯加雙葛傷麵宜入參養胃湯

加薊傷水飲瓦五苓散

五 加味二陳湯

治痰瀉痰瀉者

不瀉或少或多此因痰流或瀉或肺中以致大腸不固也

貴守苓柳精藺

砂柴絲朴各等分

右入姜烏燈水煎服瀉不止加

衍訶去朴灸瀉泄不止百會穴

天樞穴中脘穴氣海穴

辛 參苓白朮散

治氣虛泄瀉并

產後之泄瀉

參柳苓藺砂藿

貴永藪訶各等分

右入姜燈水煎服嘔噦惡心加

守烏元氣虛脫昏倦加芫周

去砂藿飽悶加厚去衍訶

水短瀉加翁芥去永瀉甚不止

加精烏熟附少許用四君子湯

加蜜砂藪陳糯米久者加周芎

香砂六君子湯治脾瀉

後到飽瀉去即寬脈細也方見飲食門

辛 藿香正氣散

治七情瀉腹常

虛痞欲去不去去不通方見于傷寒

本方加丁子砂仁良姜又以

木香調氣湯七氣湯調其氣則  
瀉自止△按此方治暑瀉之劑

四<sup>辛</sup>升陽除濕湯治脾胃虛弱不思  
飲食腸鳴腹痛泄瀉無度小便黃  
四肢困弱

周<sup>辛</sup>薰<sup>辛</sup>芸<sup>辛</sup>曲<sup>辛</sup>芋<sup>辛</sup>猪<sup>辛</sup>  
精<sup>辛</sup>一<sup>辛</sup>冬<sup>辛</sup> 貴<sup>辛</sup>芽<sup>辛</sup> 甘<sup>辛</sup>各<sup>辛</sup>二<sup>辛</sup>

右入姜棗水煎服○胃寒腸鳴加  
益田非腸鳴不得用

五<sup>辛</sup>補中益氣湯遇飲食勞倦即發而  
肢體酸軟沉困泄瀉者宜此  
痢疾 與泄瀉可通考

六<sup>辛</sup>芍藥湯治下痢赤白初起積  
滯不行裡急後重頓上圖而去則

少腹痛

芍<sup>辛</sup>二<sup>辛</sup> 芹<sup>辛</sup> 連<sup>辛</sup> 苓<sup>辛</sup>各<sup>辛</sup>一<sup>辛</sup> 虎<sup>辛</sup>七<sup>辛</sup>分

棋<sup>辛</sup> 蜜<sup>辛</sup> 桂<sup>辛</sup> 甘<sup>辛</sup>各<sup>辛</sup>五<sup>辛</sup>分

右煎空心服回春去虎桂加枳○

後重窘迫甚者倍虎加芒一冬○

痞滿氣不宜通加實一冬○藏毒

下血加極一冬○壯盛人加虎一冬

○虛弱人去虎○按用此方而行

血則便膿自愈和氣則後重自除

補按婁氏綱目曰自古治裡急後

重但用楸榔木香調氣及木黃下

積至丹溪始用桃仁滑石滑其死

血如鼓應桴實發前人所未發也

七<sup>辛</sup>調和飲治紅白痢○下痢稍

久者宜調和

芍三斤半 芎 連 苓

嬰各一升 右煎空心服

○紅痢依本方○白痢加吳 各一

赤白痢加伽苓陳莎 各一 ○按治

諸痢用通利藥後未已直服此方

調理而愈

八平參歸芍藥湯

治痢久一二升

日去多不止者

芍一斤 參 斤 苓 陳 各一

砂七分 甘 右入燈草烏蓮

煎服○噤口痢不食者胃口極熱

加連參蓮梅梗○腹痛裡急後重

者是熱積氣滯加蜜楨○未除者

加升少○痢作痛者熱流下加苓

炒○痢後發熱不止或虛坐努力

者俱是血虛倍加斤芍芩○積中

有紫血是瘀血加芍紅○按下痢

久不止者用此方宜調養氣血

按三方皆治痢之主藥也初痢

宜芍藥湯日久不止用調和飲

氣血虛弱者參歸芍藥湯○脾

胃虛而膿血不止者胃風湯

上 瘧痢兼作者柴苓湯 方見五

等 皆因加減以取卒效若未愈

則宜用和中湯不有不愈者也

九平和中湯

痢疾百方不應脾胃

彌虛弱而下如醬油脉弦數或白



變紅州者專可用此湯也

餘大朴 枳 童 婆 中 砂  
蜜 承 各 其 少 右煎服

○此方產前後痢病得數奇

又方 和中湯不效則宜此湯

必有奇妙

餘三斤 芎 各二 嬰 一  
五分  
栝 蜜 各一 附 七分 右煎服

○此一方東井叟之配劑也

一婦新產十餘日後腹發熱微  
痛大便不通去周加枳芩四五  
貼而愈又一婦患前證故前劑  
三貼而下滯血更得平安

六 補 導 滯 湯 治血痢疼痛

地 芍 伽 栢 各一 印 五  
分

右水煎服○腹痛加奴朴○後重  
加液 △按此方行血和氣

一 治 痢 奇 方 此方或紅或白或

紅白相兼裡急後重身熱腹痛者  
俱可服噤口亦可用

芍生連 芩 查 各二 洗  
童 各八 斤 甘 印 各五 紅 三  
蜜 二 分 嬰 一 右煎服

○單白無紅者去印嬰蜜加貴滯  
澁甚者加澆○如延至月餘覺脾

胃虛滑者用酒炒芩連芍 各六 貴  
朴蜜 各三 醋炒印 分 紅 二 斤 參 佛

半 各五 ○胎婦去紅嬰洗

卒倉廩散治痢疾赤白發熱不退

腸胃中有風邪熱毒及時行瘟疫

門闔境皆下痢噤口者服之神效

即人參敗毒散加連陳倉米百粒

方見傷寒

痢後手足痛加洗瓜方見傷寒○噤口痢加

爵方見傷寒○赤白潮熱煩渴小柴胡湯去

參棗加雙芍方見傷寒○赤黃

內煩欲飲冷水小便不利者宜小

承氣湯見傷寒○不問赤白相雜壯

痛裡急後重渾身發熱口乾發渴

宜六一順氣湯方見傷寒

空補中益氣湯凡痢疾日久者

主之方見內傷

四八物湯凡休息痢經年日月不

差有過服涼藥以致氣血虛者本

方加貴琴琴連少許或宜十全大

補湯方見虛損

五卒真人養臟湯治大人小兒冷

熱不調下痢赤白或如膿血魚腦

裡急後重臍腹疼痛或脫肛下墜

酒毒便血並皆治之

桂枝參斤蜜訶甘

衍芍炒加方見傷寒御方見傷寒

右煎食前服○噤寒者加附子

新改正合類增補眾方規矩卷

