



正改

萬病回春
六





萬病回春目錄

義集卷之六

婦人科 二丁又

經閉 九

血崩 十四

帶下 十七

虛勞 二十一

未嗣 二十四

妊娠 三十四

產育 四十

小產 四十六

產後 四十七

乳病 六十一

乳巖 六十二

婦人諸病 六十三

萬病回春卷六目錄終



新刊萬病回春卷之六

義集

大醫院醫官金谿雲林龔廷賢子才

編輯

門人 醫官同邑胡廷訓

慈谿羅國望

弟醫官廷器

姪 懋官同校

金陵書坊對峰周曰校刊行

婦人科

脈經曰寸關調如故而尺脈絕不至

者月水不利當患小腹引腰痛氣滯

上攻胸臆也○寸口脈浮而弱浮則

為虛弱則無血○尺脈來而斷絕者

月水不利○尺脈滑血氣實婦人經

脉不利

肝脉沉主月水不利腰痛

少陰脉弱而微則血少

脉來至狀如琴弦若小腹痛主月水

不利孔竅生瘡

胃脉濡少陰脉微而遲微則無精遲

則陰中寒濇則血不來此為居經三

月一來

少陰脉滑而數者陰中生瘡

少陰脉數則氣淋陰中生瘡

少陰脉弦者曰腸必挺核

少陰脉浮而動浮則為虛動則為痛

婦人則漏下

婦人生死脉訣

脉經曰婦人漏血下赤白目下血數升

脉急數者死遲者生

婦人漏下赤白不休脉小虛滑者生

太緊實數者死

婦人新生乳子脉沉小滑者生實大

弦急者死

婦人疝瘕積聚脉弦急者生虛弱者

死

婦人生產因中風傷寒熱病喘鳴而

肩息脉實而浮緩者生小急者死

婦人生產之後寸口脉疾疾不調者

死沉細附骨不絕者生

金瘡在陰處出血不絕陰脉不能至

陽者死按陽而復出者生

懷胎六七月脉實大牢強弦急者生
若沉而細者死

丹溪曰產前脉細小產後脉洪數者死

又曰產前當洪數既產而洪數如故

豈得不死此亦大縣訛之極

調理

婦人諸病者多是氣盛而血虛也

○調氣養血湯專治婦人室女血氣不和胎前產後諸病蓋婦

女以血為主殊不知因氣先不

香附米炒二錢 烏藥 砂仁

當歸 川芎 白芍酒炒

熟地黃姜升浸煨各一錢 甘草炙三

右剉一劑生薑棗煎服或丸或散皆

可○氣痛加吳茱萸○痰感加二陳

湯

婦人經水或前或後或多或少或踰不

來或一月兩來者俱是不調之故也

○千金調經湯治婦人經水不調或前

癩腹痛吐酸或發熱小腹急痛手足

當歸 川芎 白芍酒炒

人參 阿膠炒 牡丹皮

肉桂 吳茱萸各一錢 麥門冬去心

半夏姜製各一錢半 甘草五分

右剉一劑生薑煎服

經水先期而來者血虛有熱也滋養補

經水後期

當歸一錢 川芎五分 白芍酒炒

生地黄 一錢 阿膠 五錢 艾葉 三分

條芩 一錢 黃連 八分 黃柏 五分

知母 五分 香附 一錢 甘草 三分

右剉一劑水煎空心溫服

經水過期少來作痛有血虛有寒也

治遺濕經養血痛自止也

當歸 一錢 川芎 五分 白芍 一錢

熟地黄 一錢 桃仁 二十箇 去尖

紅花 三分 香附 一錢 肉桂 五分

蓬朮 一錢 蘇木 一錢 木通 八分

甘草 五分

右剉一劑水煎空心溫服

經水將來作痛者血實氣滯也

當行經順氣痛自止也

當歸 川芎 白芍

生地黄 黃連 香附

桃仁 去尖 紅花 減半 玄胡索

牡丹皮 莪朮 各等分

右剉一劑水煎空心溫服發熱加柴

胡黃芩

經行着氣作心腹腰脇疼痛者乃瘀血

也 治滯順氣消瘀痛自止也

當歸 川芎 白芍 生地黄

紅花 青皮 莪朮 桃仁 去皮

玄胡索 右剉一劑水煎溫服

經水過期而來紫黑成塊者氣鬱血滯

也 治滯順氣經自准也

當歸 川芎 白芍

生地黃

紅花

牡丹皮

青皮

桃仁去皮

香附

玄胡索

甘草

右剉一劑水煎服

經水過期而來色淡者痰多也治當活

經自調也

當歸

白芍

川芎

生地黃

半夏姜炒

陳皮

白茯苓去皮

甘草各等分

右剉一劑生薑三片水煎服

經水過期而來作痛者血虛有熱也

治當生血清熱痛自止也

當歸

川芎

白芍酒炒

生地黃

牡丹皮

桃仁去皮

紅花

木香

香附

玄胡索

甘草

右剉水煎溫服

經水過多久不止者成血崩也治當涼

經自止也

當歸

川芎

白芍酒炒

生地黃

白木

條芩

山梔炒

阿膠炒

白茯苓去皮

荊芥

地榆

香附

右剉水煎空心服久不止者加枳實

根汁磨墨同服

經水行後作痛者氣血虛也治當調養

止也

當歸

川芎

白芍酒炒

熟地黄 人參 白朮 去蘆
白茯苓 乾薑 炒 甘草

右剉一劑姜棗煎服

經水去多久不止發腫滿者是脾經血

虛也 治當補血使脾利

當歸 川芎 白芍 酒炒

熟地黄 茯苓 白朮 厚朴 姜汁炒

砂仁 木香 陳皮 木通

大腹皮 蘇子 猪苓 玄胡索

香附 牛膝 去蘆 甘草

右剉一劑水煎溫服

經水月久不行發腫者是瘀血滲入脾

經也 治當活血使脾行氣腫自消也

當歸 川芎 白芍

薤仁 去皮 紅花 牡丹皮

乾薑 枳殼 炒 厚朴

肉桂 木香 香附

牛膝 去蘆 玄胡索

右剉劑水煎服

經水月久不行腹脇有塊作疼者是血

結癥瘕也 治當調經止痛塊漸消也

當歸 川芎 砂仁

木香 小茴 乳香 厚朴 姜炒

枳實 炒 薤仁 肉桂

紅花 牡丹皮 牛膝 去蘆

香附 玄胡索 牛膝 去蘆 雌雄子去

右剉一劑水煎溫服 如全效子

錯經妄行於口鼻者是大載血上氣之亂也
治當滋陰降火順氣調經
佳也脈必花濇久而不治及成
崩也

當歸 用等 白芍

生地黃 黃芩 山梔

牡丹皮 犀角 阿膠炒

門冬 去心 陳皮 白茯苓 法皮

右剉一劑水煎溫服

經行身痛麻痺寒熱頭疼者乃觸經感

冒也

○加減五積散 治婦人遇經行時
身痛身熱頭疼手足麻痺或生寒

熱頭疼身眩此乃觸經感冒
依本方去乾姜加羌活獨活牛膝姜

葱煎服方見中寒

經水不調或腹痛白帶或淋瀝不止或

肌瘦者此血氣俱虛也

○大補經湯 治婦人氣血虛弱血海寒

痛或下白帶如魚腦髓或似米泔不

信期每月淋漓不止面色痿黃四

肢無力頭自眩暈肌體羸瘦

當歸 酒洗 白芍 酒炒 香附 各六分

川芎 熟地黃 各五分 白朮 去蘆

白茯苓 去皮 黃芪 陳皮

玄胡索 各四分 人參 砂仁

阿膠 炒 沉香 別研 小茴 酒炒

吳茱萸 炒 內桂 粉草 各

右剉一劑姜棗煎服

○經驗調經湯 治婦人經水或前
或後或多或少
當歸 熟地黃 香附 各一分

白芍酒炒 吳茱萸炒 大腹皮

紫荊皮 肉蓯蓉各二錢 川芎

條荊各七 粉草五分

右剉一劑生薑三片棗二枚水煎待

經至之日服起一日一劑服至四劑

而止經即對

○艾附暖宮丸 治婦人經水不調小腹

時痛赤白帶下子宮虛寒

南香附采一斤 湯浸 四兩童便

北艾葉 席乾搗爛去灰醋浸炒四兩

當歸 川芎 白芍酒炒

熟地黃 姜汁炒各一兩

玄胡索子 炒二兩 甘草生用 八錢

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每

服七八十丸空心米湯送下或酒亦

○調經八物丸 養血調經如期除

當歸酒洗二兩 南芎 鹽湯浸 白芍酒炒

熟地黃酒浸 白茯苓 去皮一兩

白木 米泔浸 橘皮 搗湯洗 條荊酒炒

牡丹皮 玄胡索酒炒各一兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服

八九十丸空心淡鹽湯下寒月酒下

一婦人補氣或血崩半載矣或用順

氣清執等劑不應更加寒熱自時欲

作嘔余以為鬱怒虧損脾胃虛火錯

經妄行而然耳遂朝用補中益氣湯

夕用六味丸各數劑半載而痊方見補益
一婦人經行遇怒其經即止甚則口噤筋攣鼻衄頭痛痰氣搐搦瞳子上視此肝火熾甚以小柴胡湯加熟地黃山梔釣藤鈎而愈方見傷寒

一婦人多怒經行旬餘方止後淋瀝無期肌體倦瘦口乾內執送汗如洗目瞽熱甚皆由肝脾虧損無以生發元氣用補中益氣湯加茯神遠志酸棗仁麥門五味丹皮龍眼肉治之獲痊方見補益

一婦人經行感冒風邪晝則安靜夜則譫語此熱入血室也用小柴胡方見傷寒加生地治之頓安但內熱頭暈用補

中益氣方見補益加蔓荊子而愈後因怒惱寒執譫語胸脇脹痛小便頻數月經先期此肝火血熱妄行用加味逍遙加生地而愈方見婦人虛勞

經閉

婦人壯盛經閉者此血實氣滯宜專攻也

○通經丸 治經閉並乾血氣

班固二干箇 大黃五錢 桃仁四十

右爲末酒糊爲丸如梧桐子大空心酒下五七丸甚者十五丸如血枯經閉者用四物湯送下

○通經甘露丸 治婦人經血不通崩漏

淋產後積血男女五勞七傷及小兒骨

蒸勞熱夫婦陰血陽精不交諸疾神效

大黃 四兩用頭紅花四兩入水煎

鹽二錢浸一百取出晒乾不用童使四

兩用好酒浸一日令軟切片如杏核

大晒乾入已豆去皮三十五粒同炒

黃色土去豆不用四兩用當歸四兩入

淡醋浸一日晒乾不用當歸

右四分共合一處入南木香一兩百

草霜五錢共為細末以當歸醋紅花

水煮米糊為丸如梧桐子大每服三

四十九空溫酒下

取經丸 治婦人經閉不通不論新久

乳香 沒藥 孩兒茶

巴豆 去殼 芫白 各五 班猫 五箇

右為末共搗為丸綿裹三層繫放筒

上將線繫住送入陰戶內三四寸許

俟一炷香時經水即下

一粒仙丹 治婦人乾血勞并赤

巴豆 一百二十箇去殼用新磚一箇

穿山甲 五錢油煎 班猫 六十箇去

苦苧蘆 大黃 末各一兩

右合一處以棗煮去皮核丸藥如彈

子大用綿繭張開裹藥在內穿入三

寸竹筒上頭後仍留係二三寸餘挽

一轉不令藥氣出外用時先以溫水

洗陰內令潔淨拭乾却以葱汁浸濕

藥頭送入子宮極深處整一日一夜

取出藥不用此藥用後少間耳冷氣

下行發寒發熱如傷寒之狀不怕飲

食任意食用無妨半日即通或鮮血
或死血一切惡物悉下忌生冷發物
自此子宮和暖而交媾則有孕矣
婦人虛弱經閉者此血枯竭宜補經

自通也

○通經調氣湯 治婦女經閉虛弱者

當歸 酒洗 川芎 白芍 酒炒

生地黄 浸 香附 童便炒 柴胡

牡丹皮 知母 酒童便 黃芩 酒炒

黃柏 酒炒 牛膝 去蘆酒洗各六錢

桃仁 紅花 二味量

右剉作十劑水煎空心一服臨卧下

服

○牡丹皮湯 治室女經閉咳嗽發熱

當歸 一錢半 川芎 八分 白芍

生地黄 陳皮 白朮

香附 各一錢 牡丹皮 一錢 柴胡

黃芩 各七分 甘草 四分

右剉一劑水煎服

○養真湯 一婦人經閉不通脘下一塊已

數劑經行又投數服而塊消矣

當歸 酒炒 川芎 白芍 酒

熟地 姜汁炒 山茱萸 去核 白茯苓 去

梔子 炒 小茴 酒炒 益母草

香附 酒醋米泔童便四棟浸 陳皮 各等

右剉六劑水煎服盡經通後此作丸

服

○六味地黃丸 治婦女經閉發熱或咳嗽

嗽等症方見補益依本

方加菴仁經

婦人半虛半實經閉者宜攻補兼施也
○通經湯 治婦女經閉者

當歸 川芎 白芍 生地

大黃 官桂 厚朴 枳殼

枳實 黃芩 蘇木 紅花

烏梅 右劉一劑薑棗煎服

○調經養血丸 治婦女經脈不行或不調或前或後赤白帶下久不成就服此有孕任服

香附 十二兩酒醋搗湯草

白芍 二兩 當歸 二兩 川芎 一兩

生地黃 二兩 茯苓 去皮 白芷 一兩

牡丹皮 二兩 乾姜 炒一兩 肉桂 一兩

紅花 一兩 薤仁 泡去 玄胡 六錢

沒藥 一兩 半夏 香油 阿膠 二兩 炒成珠

小茴 錢 義木 煨醋 甘草 炙各五錢

右為末醋糊丸每服八十九空心白湯黃酒任下

婦女經閉有積塊者宜養血破積也

○四物調經湯 治婦女或十五六歲經脈不行日夜生寒熱手足麻痺飲食少進頭痛惡心嘔吐腹中忽然結塊冲動痛者此俱食生冷傷感而致也

當歸 酒洗 川芎 白芍 酒炒

柴胡 黃芩 枳殼 各八分

熟地 酒浸 陳皮 義木 醋炒

三稜 醋炒 白朮 去蘆 白芷

小茴 鹽水 玄胡 各五分 香附 錢二分

青皮 炒 砂仁 紅花

甘草 各四分

右到一劑生姜三片葱白三根水煎

温服若有塊不通須與調經丸間

服通身疼痛加羌活獨活咳嗽

加杏仁五味子各五分肚痛加炒乾漆

七分癰疾加草果常山泄瀉去

枳壳加肉蔻

○調經丸

當歸 酒洗 二兩 川芎

熟艾 姜汁炒

青皮 麩炒 陳皮

枳殼 去穢 麩炒

白朮 去蘆 厚朴 姜汁炒

小茴香 炒

艾葉 去筋 香附 醋炒

三棱 煨醋

義木 煨醋 砂仁

白芷

牛膝 去蘆 玄胡 各一兩

粉草

琥珀 各五錢 別研入

右為末醋打糊為丸梧桐子大每服

八九十九丸米湯下酒亦可若肚痛以

蒼朮去白朮

婦人經通之後宜調理之劑也

○加減四物湯加香附陳皮之類 補益

○滋陰百補丸 治女人勞傷氣血不起

腰疼痛不思飲食 陰陽不和 寒熱心

香附 一斤炒去毛 分四製酒醋鹽

益母草 半斤搗末 當歸 六兩酒湯

川芎 熟艾 酒洗 白朮 去蘆各

人參 去蘆 茯苓 去皮 玄胡索 各二兩

白芍 三兩 甘草 炙一

右為末煉蜜丸梧桐子大每服六十

丸空心宿砂湯下或酒醋白礬水任

一婦人胃氣素弱為哭母吐血咳嗽發

熱盜汗經水三月不行余以為悲則

傷肺思則傷脾遂朝服補中益氣方

補加桔梗貝母知母夕用歸脾湯方

健送六味丸而愈方見補益

一婦人久患瘡瘡作則經不行形虛脉

大頭痛懶食大便泄瀉小便淋瀝口

乾唇裂內執腹脹蓋由久瘡正氣已

虛陰火獨旺用補中益氣治之尋愈

惟不時頭痛乃加蔓荊子而痛止又

兼用六味丸而經行方見補益

魏憲副寵夫人患逆經吐血不止予診

六脉微瀦有力此血虛火盛也以四

物去熟地黃用生地黃共一兩加酒

蒸大黃一兩同煎入童便服之服後

血止經通矣

徐憲副寵夫人患經閉人皆擬有孕至

七八箇月漸覺黃瘦腹中左右有塊

如鼓發熱面赤不思飲食余診六脉

微瀦此血枯氣鬱也以四物湯加香

附牡丹皮白朮之類十數服又加菴

仁紅花又數服方與四炒枳殼丸不

三四服打下血塊若許始愈



脈中脉多浮動虛遲者生質數者重

崩漏者有新久虛實之不同也

屬實執者宜解毒也

黃芩 黃柏 生地黃

蒲黃 右剉水煎空心服

○治婦人血崩 年四十已上悲鬱大甚

上焦不通熱氣在中故血走而崩面

黃肌瘦憤不可服燥熱之藥蓋血熱

而流先行先以黃連解毒湯後以涼

膈散合因物湯調治効

○溫清飲 治婦人經脈不在或如豆

痛寒熱往來崩漏不止

當歸 白芍 熟地黃

川芎 黃連 黃芩

黃柏 梔子 各一錢半

右剉一劑水煎空心服

○益母湯 治婦人血崩

當歸 川芎 白芍 酒炒

熟地黃 條芩 陳皮

阿膠 蛤粉炒 香附 醋炒 益母草

白木 去蘆各一錢半 玄參

蒲黃 炒各八分 甘草 四分

右剉一劑水煎空心服

○五灰散 治血不正成血崩

蓮蓬殼 黃絹 血餘

百草霜 棕皮

燒灰加山梔炒黑蒲黃炒黑墨

血竭共為細末調以前藥服之或煉

蜜爲丸每服五十九清米湯送下

○秘傳經驗治血崩雜方

○一方用乾黑驢糞爲粗末入堽內燒煙冷崩婦坐其上烟薰久久自愈

○一方用黑京墨燒烟盡爲末服二錢黃酒調下

○一方用管仲燒存性爲末黃酒調下

○一方用刺刺芽汁加童便和酒服

○一方用乾漆燒灰三錢五靈芝二豆大爲末同黃酒下

○一方用柿餅燒灰二錢白熟水下

○一方用棉花子仁炒黃甘草黃芩等分爲末每服二錢空心黃酒下

○一方用香附炒四五靈芝炒二歸尾歸尾

○一方治崩漏如神
或米糊爲丸梧桐子大每服五十九空心醋湯下

○一方治漏不止
用槐子燒存性爲末空心温熟米送下三錢立止

○一方治崩漏如神
童子髮焙乾小芥紅子不拘多少共爲細末黃酒送下

○一方治紅脉不止
狗頭骨燒灰爲末羅細用好徽州酒一鍾用灰一分二鍾用一分三鍾用三分如不止者照常加至七鍾用七分神効

○一方治紅脉不止
狗頭骨燒灰爲末羅細用好徽州酒一鍾用灰一分二鍾用一分三鍾用三分如不止者照常加至七鍾用七分神効

一婦人崩漏面黃或赤時覺腰間臍下痛四肢困倦煩熱不安其經行先發寒熱兩脇如束此脾胃虧損元氣下陷與相火濕熱下迫所致用補中益氣湯加防風芍藥炒黑黃柏兼服歸脾湯而愈

補中益氣湯方見內傷

一女子漏下惡血月經不調或暴崩不止多下水漿之物或白帶脫漏不止皆因飲食不節勞倦所傷或素有心氣不足致令心火乘脾必怠惰嗜臥困倦乏力氣短氣急脾主滋榮週身者也脾胃虛而心胞乘之故漏下月水不調也况脾胃為血氣陰陽之根蒂也當除濕去執抑風氣上伸以勝

其濕又云火鬱則發之用補中益氣湯去陳皮人參白朮加蒼朮本防風羌活獨活蔓荊子

補遺方

○樗白湯 治崩漏不止

樗白皮 一錢半 梔子 一錢半

熟地黃 一錢 補血 地榆 一錢 收血

當歸頭 一錢 半止血 川芎 一錢

白芍 酒炒 八分 生地黃 七分

伏龍肝 一錢 艾葉 炒 六分

右剉一劑水二鍾醋一匙煎八分空心服三五劑即止

帶下

婦人赤白帶下者皆因月經不調房色

過度或產後血虛胃中濕痰流下
入膀胱而滯也腰酸頭暈眼花小腹
脹痛四肢無力困倦而虛用八物湯
加減吞下止帶丸肥人多痰有帶症
瘦人多火亦有之帶與遺同法

帶下屬氣血虛者

○加減八物湯 治婦人赤白帶下

當歸 川芎 白芍 酒炒

生地黃 人參 去蘆 白朮 去蘆

茯苓 去皮 山藥 杜仲 酒炒

香附 炒各 甘草 減半 烏梅 一箇

右剉一劑姜棗煎食前溫服○肥人

加半夏○瘦人加黃柏○飽悶去人

參加砂仁○腹痛加小茴玄胡去人

參○冬加煨乾姜 少許

○止帶丸

當歸 酒洗 川芎 白朮 去蘆

人參 去蘆 山藥 杜仲 姜汁酒

香附 醋炒 青黛 減半 牡蠣 火煨

破故紙 酒炒 續斷

椿根皮 此藥大治白帶酒炒各等分

右為細末煉蜜為丸梧桐子大每服

五十丸空心清米湯吞下○腹痛加

玄胡索茴香去人參○飽悶加砂仁

去人參○夏月加黃柏○冬月加煨

乾姜少許○肥人加姜制半夏○瘦

人加酒炒黃柏

帶下屬虛寒者

○五積散 治婦人赤白帶下方見甲寒

依本方加香附子小茴香吳茱萸

○四仙散 治婦人白帶

蒼朮 一兩酒浸去
白芷 黑皮炒乾

川芎 麵包煨去皮
大附 膠各五錢

右為末每服五分空心好酒調下

○香木丸 治婦人白帶腹痛

香附 醋浸煮 乾八兩
蒼朮 米泔浸 四兩
陳皮 醋浸煮 四兩

當歸 酒洗 白芍 酒炒 川芎 酒洗

熟地黃 姜汁酒浸焙各二兩

右為末酒糊為丸如梧桐子大每服

三十丸空心温酒送下

帶下屬濕痰者

○加味二陳湯 依本方加蒼朮
白朮升麻柴胡

帶下屬濕熱者

○固經丸

黃柏 酒浸炒各 山梔 炒黑

敗龜 酒蒸各 白朮 去蘆 酒炒各

山茱萸 酒蒸去核 椿根皮 酒炒各

貝母 去心 乾姜 炒各 苦參 五錢

右為末酒糊為丸梧桐子大每服八

十丸空心滾熟水下

○加減六合湯 治婦人上有痰火
下有白帶腹痛

當歸 一錢 白芍 八分 川芎 七分 鹽水浸

熟地黃 酒洗焙一錢 橘紅 鹽水洗去

白茯苓 去皮七分 甘草 炙四分 半夏 姜製

貝母 去心糯米 白朮 去蘆

黃柏 酒炒七分 知母 酒炒六分 椿根皮 酒炒

右劉一劑生姜三片水煎空心熱服
若上痰火盛加枯苓七分臨臥服

○收帶六合丸 一名益氣固腸丸治赤白帶下肚腹疼痛和脾

胃燥中官之濕提下陷之氣化痰清火

白木 米泔 蒼朮 米泔 白茯苓 去皮 浸煨

陳皮 薑水洗 當歸 酒洗 白芍 酒炒各 去白 二兩

熟地 酒洗 半夏 姜製

椿根白皮 洗煨各 牡丹皮

黃柏 酒炒各二兩二錢 甘草 炙一兩

防風 九錢 升麻 八錢

右為末酒糊丸如梧子大每服百丸
空心米湯下鹽湯亦可一方加香附

枳殼 治臍後氣下陷或白帶 小腹痛滿痛甚等症

○滋榮收帶丸 治臍後氣下陷或白帶 小腹痛滿痛甚等症

當歸 酒洗 白芍 酒炒 蒼朮 米泔製

白茯苓 去皮 黃柏 酒炒 椿根皮 煨各 一兩

白木 二兩 半夏 姜製 川芎 鹽湯浸 切七錢

香附米 鹽水浸炒六錢 防風

外麻 青皮 醋炒各五錢

木香 大甘草 炮各四錢

右為細末酒打糊為丸如梧子大
每服一百二十九丸空心鹽湯米湯白

湯任下

○雙白丸 治白帶如神

石灰 一兩 白茯苓 二兩 為末水丸每

服三十丸空心白水下

○專治赤白帶下

蕎麥麵不拘多少用雞子清為丸每

服三五十九丸白湯送下即愈

一婦人頭暈吐痰胸滿氣喘得食稍緩

苦於白帶二十餘年諸藥不應此氣

虛而痰飲也痰飲愈而帶自愈遂朝

用六君子湯夕用六味丸不月而驗

方見補益

一婦人帶下四肢無力余曰四肢者土

也此脾胃虛弱濕痰下注以補中益

氣歸脾二藥治之而愈

一婦人年踰六十內熱口乾勞則頭暈

吐痰帶下或用化痰行氣前症益甚

飲食愈少肢體或麻恪服祛風化痰

散體常麻手足或冷或熱自漸消瘦

余曰症屬脾氣虛弱而不能生肺祛

風之劑復損諸經也當滋化源遂用

補中益氣加茯苓半夏炮姜二十餘

劑脾氣漸復飲食漸加諸症頓愈見

補益

虛勞

脈來數大或虛細弦急

虛勞者多因氣結憂思恐驚或情慾動

心或經水不調變生諸病上盛下虛

脚手心熱或皮焦骨熱或午後怕寒

夜間發熱或日夜不寐盜汗減食體

雜怔忡區臆煩燥胸腹作痛飽悶作

瀉痞塊虛驚面白唇紅頭目眩暈腰

背酸痛四肢困倦無力小水赤色重

則虛火上攻兩頰頰赤骨蒸勞熱陰

虛火動也治之宜養血健脾以治其
本降火清鬱以治其標以逍遙散扶
苓補心湯之類選而用之

虛勞吐血者

清肺飲子 治婦女虛勞發熱咳嗽吐血
血先服此清熱止血後服
逍遙散加減調理

當歸 酒洗 川芎 黃芩

知母 蜜水 貝母 去心 阿膠珠

蒲黃 煨 陳皮 各八分 生地黃

白芍 酒炒 天門冬 去心 麥門冬 各一

枳殼 炒 薄荷 六分 前胡 一錢

藕節 十片 甘草 炙二分

右剉一劑水一鍾半煎至一鍾食後

徐徐溫服

虛勞熱嗽有汗者

逍遙散 治肝脾血虛發熱或潮熱或
自汗盜汗或頭痛目眩或怔
忡不寧或赤口乾或月經不調或肚
腹作痛或小腹重墜水道澀痛或腫
痛出膿肉熱作渴

當歸 酒洗 白芍 酒炒 白朮 土炒

柴胡 酒炒 甘草 炙五分

右剉一劑煨姜二片薄荷許水煎服

○加牡丹皮梔子炒名加味逍遙散

○滋陰至寶湯 治婦人諸虛百損五勞

瘦此藥專調經水滋陰補虛勞扶
元氣健脾胃養心神潤燥除熱止喘
定心化痰安神退潮熱除骨蒸止喘
喘化痰涎收益汗任泄瀉開鬱氣秘
胸膈痞脹腹痛解煩渴散寒熱
祛體痰大有奇效不能盡述

當歸 酒洗 白朮 去蘆 白芍 酒炒

當歸 酒洗 白朮 去蘆 白芍 酒炒

當歸 酒洗 白朮 去蘆 白芍 酒炒

當歸 酒洗 白朮 去蘆 白芍 酒炒

當歸 酒洗 白朮 去蘆 白芍 酒炒

當歸 酒洗 白朮 去蘆 白芍 酒炒

當歸 酒洗 白朮 去蘆 白芍 酒炒

白茯苓去皮 陳皮 貝母去心

知母生用最能濕 香附童便炒

地骨皮去骨 麥門冬去心各

薄荷 柴胡酒炒 甘草各三分

右剉一劑用 煨生薑三片 水煎溫服

虛勞熱嗽無汗者

○茯苓補心湯 治婦人血虛氣衰為

衰而氣盛者由心氣虛耗不能生血
又不能制乎肺金使肺氣得以乘肝
肝木用之虧損則不能藏血漸至枯
澀不榮經絡故胎信不調矣此藥專
補心元之虛抑其肺氣之盛調和榮
衛滋養血脈其疾自愈兼治去血過
多虛勞發熱及吐血衄血
咳嗽痰喘上壅胸膈不和

當歸 川芎 白芍酒炒

熟地 陳皮 半夏姜炒

白茯苓去皮 桔梗去蘆 枳殼姜炒

前胡去蘆 乾葛 紫蘇各七分

人參 木香各五分 甘草三分

右剉一劑 姜蜜煎服

○滋陰地黃丸 治婦人經水不調或不

便血發熱咳嗽盜汗痰喘

熱地黃 姜汁浸 白茯苓去皮

山茱萸 酒蒸去核 山藥 各二兩

牡丹皮去骨 澤瀉去毛各

天門冬去心 生地黃酒洗

麥門冬去心 知母去毛酒炒

貝母去心 當歸酒洗

香附米 童便浸炒各二兩

右為細末煉蜜丸梧桐子大每服百

凡空心塩湯下痰唾淡薑湯下

○烏骨鷄丸

治婦人虛弱咳嗽吐血或
骨蒸勞熱或赤帶下或經
水不調形體瘦倦無力或口乾舌燥

人參 去蘆 當歸 酒洗 熟艾 姜汁浸焙

白芍 酒炒 白茯苓 去皮各一兩

秦艽 川芎 陳皮

香附 童便浸炒 玄胡索

貝母 去心 牡丹皮 七錢 甘草 五錢

右俱剉成飲片聽用

用黃芪為末拌飯喂烏鷄至肌肥

眼生眵縊死燥去毛破開取出腸胃

好酒洗淨入前藥飲片在鷄肚內線

縫住用酒醋等分煮鷄爛如泥撈起

結乾或酒乾為細末將鷄汁打細糊

為丸梧桐子大每服五十丸空心清

米湯吞服

一婦人為哭母吐血咳嗽發熱盜汗經

水不行此悲傷肺思傷脾朝服補中

益氣加桔梗貝母知母夕服歸脾湯

亦見健忘送下六味丸而愈

一女子懷胎素鬱胸滿食少吐血面赤

用六味丸及歸脾加山梔貝母芍藥

而愈

一婦人素勤苦冬初咳嗽發熱吐血盜

汗遍身作痛或寒熱往來用化痰降

火之藥口噤筋攣此血本虛而藥復

損之耳余用八味丸為主佐以補中

益氣麥門五味山藥年餘而痊

一婦人患勞嗽不時發熱或時寒熱或
用清熱之劑其熱益甚吞汗口乾兩
足如炙遍身皆熱昏憤如醉良久熱
止方甦或肺熱至巨方止此陰血虛
而陽氣弱也余朝六味丸料夕用十
全大補湯日餘諸症稍愈更兼以補
中益氣湯兩月餘而愈已上方俱



脉 求嗣之脉專責於尺右尺偏旺火動

好色左尺偏旺陰虛非福惟沉滑勻
易為生息微瀦精清兼遲冷極若見
微瀦入房無力女不好生亦尺脉瀦
一氣既分兩儀肇判萬物之中而惟人
最靈通天地之幽微達聖賢之蘊奧

審神仙之法術窮造化之根源無所
不知矣自盤古及今逮羲農之為帝
分陰陽運會之源流有夫婦人倫之
道理故普天率土之姓貴賤窮達之
人無子履穿絕嗣者寧不測然而痛
哉則夫男女之生本陰陽自然之奧
理若非智術勉強之為也但世情早
立嗣者以為常末立嗣者以為變誦
瀆鬼神齊僧佈施以求獲嗣其愚甚
矣其實萬戶之俟無能以繼百畝之
田無後孰能與守是誠可悲也無嗣
有不動心而求者寡矣故孟子曰不
孝有三無後為大誠哉是言也求嗣
者不若求之於己其理甚明人所易

曉愚竊聞皇帝之論驗百家之傳方
秘訣雖乃不經之言是或一種之道
惟取其生者立昭之理胎月合配之
妙虛陰老陽之說其道專生乎男其
訣不生乎瘡疹其子且壽而弗夭胎
連生女而轉男之嗣者效之每每經
驗百無一謬好事者潛心於此不惟
得嗣子凡興陽採戰固精取藥養身
之術無不在其中矣豈指事論事而
已哉人間大道乃我衆仙師之秘訣
誠不可輕泄而易露也珍之重之軒
轅曰婦人有微老不生男女者何也
多因房事損動臟腑或天癸不運子
宮挾寒或男子事在陽弱清少清寒
不能射又不既濟而相勝此所以不
生長故也或有正生產常年便斷六
七年數歲不生何也亦由女人上有
數疾勞損身體以致經脈不調雖有
亦微弱亦難以容納陽精如主請客
而無備客來多而不管待比賓主不
能相歡客何以久留此又難以生長
也須要陽事舉經脈乃子宮煖精純
執且壯射而相濟然後可成故足月
生者中道不足月生者會薄適月生
者其子貴重矣

交合月日時刻佳期論

凡女人生長十三歲爲始至四十九
歲爲終五十歲生者四十九歲受胎

來也每年十一月有生男生女之月

不同按婦歲數有三十七圖交合可

揀生男之月以待婦人經水來時有

兩日半淨者三日淨者亦有女人血

旺氣盛六七日淨者不可拘定但觀

寶由着經水之顏色何如耳乃以繫

白之物或絲或帛夾之于戶口取而

則之金色者乃佳期也鮮紅者未淨

不及也淺淡者太過也惟以敗血去

淨新血生如金者為佳期此時交合

無不成矣若先期而交者縱使施精

則金水太盛子宮於寒且無受精之

處胎亦難成後期而交者則子宮已

閉施精亦無門而入胎豈有成也哉

所謂敗血已淨子宮空虛新血復生

正等陽時乃是乾道之日此時施

精如爐煉金如聚點腐立胎箇箇成

矣又云經水淨後單日下種則成男

雙日下種則成女四日以後不成矣

施精亦要在子時後方可也蓋子時

後夜氣清明一陽發生古語云一陽

動處外興工是也以時施精順則成

入也此時脩煉逆則成丹也此時再

遇天晴月朗風日清和又是成定吉

日又逢天月二德合自行房不惟成

子而子且貴神氣清秀聰明必過入

矣或揀生女月交合却生男揀生男

月交合却生女何也蓋陰陽運會之

差以致胎氣之錯如女胎當以男名喚男胎當以女名呼易各呼喚可保長生矣

結胎交合妙訣

美子要摘金丹先要點穴動情結胎若要都成須明交合之道要與陽要動情要柔戰要採藥要頓挫要斟酌要謹慎要用功然後其胎可成未交之先要種子先將紅印紙剪下燒灰無根水調女人面東服之然後交接使夫婦各飲微醺乃有興趣或以言語引戲手足撫摩挑挽皮面相猥女人面赤用手抱樓可見慾動矣如男子陽事未舉却取月華秀氣以意運

下興陽再戰暗挑猥癩鐘劍走馬撫琴以招鳳至然後交合望鳳而進龜第一要藏神只可體交不可神交合則器端臍正臥甚勿偏斜如泄精却用五字之訣 靄 靄 靄 靄 靄

以使神於利害怒惡之地進退交合以待女人樂生果見目與身顛兩頰赤熱鼻口涼氣兩手若緊抱美子亦開兮鼻口接吸女人真氣却用神交着力深入直撞鳳凰靈臺女人肢體不收滑精流溢此則女人快美之極子宮正開之際男子亦泄精陽先至畏陰定生女陰先降包陽定成男此所謂陰陽固濟相盛一種一子百種

百男胎皆成也均記泄精之時猛交
女人上唇令其自驚仍用男呼女吸
如忍大小便之狀則精始混融而成
胎矣殊不知子宮有二穴男在左穴
女在右穴入爐偏於左施精亦在於
左交合畢冷女人穩睡勿動屈左足
而左側臥者男胎多成若屈右足而
右側臥則女胎多成頓飯時節不可
動身始交之時冷則器先去小便交
後不可小便此胎定成無錯矣且若
不用壯陽敗陰之手段假若陰盛之
婦而遇衰老之夫將何以使陰精之
先至而必于生男哉

胎成禁忌秘訣

胎既成矣則陰陽之精且純渾融一
氣已無雜氣脉精血蓋嫩而未老動
之易尅而易化第恐風邪感入損傷
胎氣切記復後連交挾持重物過險
超轍深怒大笑大驚高語是何也蓋
以胎嬰之結一月如白露二月如奔
花三月之後男女分可當靜以守之
逸以時之故曰靜而有常故也且如
連交一次則胎息反被動搖感受風
邪入于子宮譬如果木開花若遇風
寒露露花定不能結果縱有結成必
定生虫風落結胎後若要連交亦不
能以成子耳縱有一成亦不能結實
完真非小產則胎風非生虫落而何

將產若連交則胎受毒穢產後澗頭
生瘡之必然也慎之忌之

未及三月轉女成男妙訣

東南桃作新斧柄親夫張目自作成
孕婦床下刃向上無入見男孕成若
置抱鷄巢下安滿巢盡是鸞之雄雄
黃一塊墜騎當真陽朝上產仙即宜
男萱草髮左簪此花珮帶產兒童子
弦繫腰白且間轉女成男有萬子夫
髮手足指甲剪身鋪席下男即轉雄
鷄長尾枝二莖挿安床下男即定軒
轅野雲傳至今此訣種種皆曾應人
倫大道是真訣不遇明傳莫與命

畫八卦筭生男女歌 返而未出之
解種子訣

父母之年上卡舉 坐胎之月為中主

乾坎良震定是男 巽離坤兌決是女

筭男却生女 三六九歲死

筭女却生男 終又鬼來纏

若是正胎者 壽考不須言

婦人之道始於求子求子之法莫先調

經每見婦人之無子者其經必或前

或後或多或少或將行作痛或行後

作痛或紫或黑或淡或凝而不調不

調則血氣乖爭不能成孕矣

婦人無子多因血氣俱虛不能攝養精

氣故也

肥人痰多軀脂滿溢閉塞子宮治須消

痰養血順氣四物湯加白朮茯苓陳

皮根實半夏砂仁香附甘草竹瀝
瘦人火多子宮乾燥無血治宜清熱補
血四物湯加入參茯苓黃芩山梔香
附生地陳皮甘草

○調經種子湯 調經種子百發百中
當歸 酒洗 川芎 其萊萸 炒各
熟地黃 香附 炒各 白芍 酒炒
陳皮 白茯苓 去 牡丹皮

玄胡索 各三錢
若過期而經水色淡者乃血虛有寒
也加官桂炒乾姜熟艾各二錢
若先期三五月色紫者加條芩三錢
右剉作四劑每一劑用生薑三片水
一碗半煎至一碗空心溫服渣再煎

臨臥服待經至之日服起一日一服
藥盡經止則當交媾即成孕矣縱未
成孕經當對期俟經來再服四劑必
孕無疑矣
○種子濟陰丹 當服順氣養血調經脈
益子宮療腹痛除帶下
種之屢驗

香附米 四兩四製一兩醋一兩酒
一兩粘漉一兩童便各浸
三日焙乾為末 益母草 二兩
當歸 酒洗 一兩半 川芎 一兩
白芍 蓋酒炒 熟地黃 二兩姜
一兩三錢 汗炒
陳皮 去白一兩 半夏 姜汁浸香
白茯苓 去皮一兩 阿膠 蛤粉炒成
白木 去蘆土炒 艾葉 醋炒一兩
條芩 酒炒一兩 麥門冬 去心一兩

麥門冬 去心一兩

牡丹皮 酒洗一兩 小茴 鹽酒炒五錢

川續斷 酒洗一兩 玄胡索 四錢

沒藥 五錢 吳茱萸 泡炒五錢

炙甘草 三錢

右為細末酒糊為丸梧桐子大每服

百丸空心米湯下

○蠶斯勝寶丸

治婦人經水不調臍腹
令痛赤白帶下一切虛
寒之疾久無子息服之即孕屢用屢驗

黃芪 蜜炙 人參 去蘆 白朮 去蘆

白茯苓 去皮 當歸 酒洗 川芎

白芍 酒炒 大附子 麩裹火燻
去皮臍

肉桂 乾姜 炒 胡椒

小茴香 鹽酒炒 艾葉 醋炒 破故紙 酒炒

烏藥 炒以上 吳茱萸 三兩 鹽水炒

香附米 醋炒 蒼朮 四兩 米泔浸炒

甘草 炙一兩

右剉作片用白毛烏骨鷄一隻重一

斤半或二斤者吊死水泡去毛腸屎

并頭脚翼尖不用將鷄放砂鍋裏將

前藥片蓋上入好酒煮爛為度取去

骨同藥在鍋焙乾為末將煮鷄酒汁

打稀米糊為丸如梧桐子大每服五

十丸空心好酒吞下

○女金丹

當歸 酒洗 川芎 白芍 酒炒

人參 去蘆 白朮 去蘆 白茯苓 去皮

桂心 藜蘆 白薇

白芷 牡丹皮 赤石脂 別研

玄胡索 沒藥 別研 甘草 各等分

右各等分除右脂沒藥別研其餘皆

以醇酒浸三日烘乾酒亦可為未足

秤十五兩外用香附米 醋浸三日水

煎為末足 右共十二味和合重羅篩

避煉蜜為丸彈子大磁器收封每取

七丸空心鷄未鳴時服一丸先以薄

荷湯或茶灌漱咽喉後細嚼以溫酒

或白湯送下鹹物乾果壓之服至四

十九丸為一劑以癸水調平受孕為

度孕中三月一丸產後後一二月一丸

百日上盡入事而不育焉天矣一方

去沒藥加沉香治婦人久虛無子及

胎前產後一切病患男子積年血氣

手脚麻痺半身不遂血崩帶下產後

腹中結痛吐逆心痛并婦人諸虛不

足心腹痛痛益治一方去桂用熟地

黃丸如梧桐子大每服五十九丸空心

溫酒或白湯送下以乾物壓之

○百子建中丸

女服此藥調經養血安胎順氣不問

胎前產後月事參差有餘不足諸症

悉皆治之

香附米 十二兩并去皮毛醋浸炒乾

真阿膠 蛤粉炒 斷艾葉 去筋槌

當歸 南川芎 白芍藥 醋者并

熟地黃 姜汁浸焙各二兩

右為細末煉蜜為丸梧桐子大每服

...

...

...

八十丸空心白沸湯點醋少許下肉
寒者溫酒下

○六味地黃丸 方見補益治婦人久無子
便炒用殊効

男子無嗣必用之藥

○固本健陽丹 凡人無子多是精血虧
或或稟賦薄弱間有壯
盛者亦是房勞過度以致腎水欠
不能直射子宮故令無子豈可盡歸
咎於母血之不足與虛寒耶

兔絲子 酒煮一兩半 白茯苓 去皮木
山藥 酒蒸 牛膝 去蘆酒洗
杜仲 酒洗去 當歸身 酒洗
肉苁蓉 酒浸 五味子 去梗
益智仁 鹽炒 嫩鹿茸 酥炙以上
各一兩 熟羊 酒蒸

山藥 酒蒸 去核各三兩

川巴戟 酒浸去心二兩

續斷 酒浸 遠志 製

蛇床子 炒去壳 加入參 二兩

枸杞子 三兩 殊効

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每
服五七十丸空心鹽湯送下酒亦可
臨臥再進一服若婦人月候已盡此
是種子期也一日可服三次無妨如
精不固加龍骨牡蠣火煨鹽酒淬三
五次各一兩三錢更加鹿茸五錢

劉小亭公年四十無子患陽事痿弱精
如冰冷未治於予曰君留神調理倘
生子願當重報因診兩寸脈洪兩尺

劉小亭公年四十無子患陽事痿弱精
如冰冷未治於予曰君留神調理倘
生子願當重報因診兩寸脈洪兩尺

劉小亭公年四十無子患陽事痿弱精
如冰冷未治於予曰君留神調理倘
生子願當重報因診兩寸脈洪兩尺

劉小亭公年四十無子患陽事痿弱精
如冰冷未治於予曰君留神調理倘
生子願當重報因診兩寸脈洪兩尺

劉小亭公年四十無子患陽事痿弱精
如冰冷未治於予曰君留神調理倘
生子願當重報因診兩寸脈洪兩尺

劉小亭公年四十無子患陽事痿弱精
如冰冷未治於予曰君留神調理倘
生子願當重報因診兩寸脈洪兩尺

劉小亭公年四十無子患陽事痿弱精
如冰冷未治於予曰君留神調理倘
生子願當重報因診兩寸脈洪兩尺

脈沉微無力此真元衰憊乃斷喪過
度所致也以固本健陽丹加入參附
子枸杞子覆盆子各二兩製一料服
盡覺下元溫暖如前又製一料服至
半料而乃正果孕生子子渠甚悅遂
成莫逆焉後傳之於劉相亭劉敏庵
俱服之皆生子

妊娠

脈雄孕初時寸微五至三部平勻久按
不替雄孕三月陰搏於陽氣衰血旺
脈正相當肝橫肺弱心滑而洪尺滑
帶散久按溢強或關滑大伏止尤怔
渴且脈遲其胎必傷四月辨質右女
左男或浮或沉疾大實兼左右俱盛

胎有二三更審經脈陰陽可參但疾
不散五月懷胎太急太緩腫漏為殃
六七月來脈喜實長沉遲而濇墮胎
當防脈弦寒執當煖子宮八月弦實
沉細非良少陰微緊兩胎一傷勞力
驚仆胎血難藏冲心悶痛色青必亡
足月脈亂反是吉祥

經脈不行已經三月者人脈不正則是

胎也

○驗胎散

川芎為末每服一錢空心艾葉煎湯
調下覺腹內微動則有胎也若服後
一月不動非胎必是經閉

○艾醋湯

雄過月難服無
如月數未足難明

用好醋攪服半盞後腹中者大痛
是有孕不為痛定無
安胎者養血健脾清熱也

○素有執者宜

當歸 白朮 各二錢
香附米 一錢半
益母草 一錢
蘇梗 一錢
砂仁 五分
甘草 三分
黃連 八分
生地黃

右剉一劑生薑三片水煎溫服

○安胎丸 妊娠常宜服之

當歸 川芎 白芍

條芩 各一兩 白朮 去蘆五錢

右為末酒糊丸梧桐子六每服五十

丸茶湯任下空心服日進三服此方

養血清熱之藥也瘦人血少有熱胎
動不安素慣半產者皆宜服之以清
其源而後無患也

○素虛弱者宜

黃芪 人參 白朮 當歸

白芍 乾薑 阿膠 川芎

五味子 杜仲 木香 甘草

右剉劑水煎服

○千金保胎丸

凡女人受胎經三月而
胎墮者雖氣血不足乃
中衝脈有傷中衝脈即陽明胃脈也
應胎孕至此時必宜飲食絕忌
慾慮免小產之患服此可以保全

當歸 酒洗 川芎 一兩 熟地 姜汁炒

艾葉醋煮 砂仁炒 五錢 條芩炒

阿膠蛤粉炒 益母草各二兩

杜仲去粗皮 姜汁酒炒 白木土炒 各四兩

續斷酒洗 二兩 陳皮一兩

香附米 二兩 酒醋 鹽水 童便 各 辰 三 日

右為細末煮棗肉為丸梧桐子大每服百丸空心米湯下

惡阻者惡心阻其飲食也

當歸 白芍煨 陳皮

香附炒 白木去蘆 半夏姜湯河香湯 過不傷胎氣

白茯苓去 藿香 神麥炒

砂仁各等分 甘草減半

右剉劑生薑三片棗二枚水煎溫服

子煩者心神悶亂也

白茯苓去皮 二錢 防風一錢

麥門冬去心 黃芩各一錢半

右剉劑竹葉五片水煎服

子癰者目閉口噤也

當歸 川芎 防風

獨活 五加皮 薏苡仁

酸棗仁 茯苓 羚羊角

甘草 杏仁 木香

右剉劑生薑五片水煎服
子懸者心胃脹痛也 胎前諸病總宜此方加減

當歸 川芎 白芍 人參

紫蘇 陳皮 大腹皮洗 甘草

右剉劑生薑五片葱白七寸同煎服

○腹痛加香附木香 ○咳嗽加枳殼

桑白皮○熟加條苓
○嘔加砂仁
○瀉加白木茯苓

子腫者面目虛浮也

當歸 川芎 白芍 茯苓
熟地黃 澤瀉 白木 條苓
梔子 麥門冬 厚朴 甘草

右剉劑水煎服

子氣者兩足浮腫也

天仙藤即青木香 藤洗畧炒 紫蘇
陳皮 香附 烏藥
木香 甘草

右剉生薑煎服加蒼朮尤良

子淋者小便澀也

麥門冬 赤茯苓 木通

淡竹葉 右剉水煎空心服

轉胞者卒不得小便也

冬葵子 山梔子 各五錢
水通 三錢 滑石 五錢

右剉一劑水煎溫服外以冬葵子山梔子

梔子石為末田螺肉搗膏或生葱汁

調膏貼臍中立通

崩漏者屬虛血漏下也

○芩歸湯 治胎漏下血不止或心腹脹

當歸尾 川芎 各五錢

右剉一劑酒煎入童便一盞同服

○膠艾四物湯 一名安胎飲治胎漏下血腹痛

當歸 川芎 白芍 酒炒
熟地 阿膠 炒 條苓

白木去蘆砂仁炒 香附炒
艾葉少許

右劉劑糯米一撮水煎空心服

胎動者因有所傷也

○佛手散

治妊娠五七月因事築蓋
靜胎或子死腹中惡露下痛
不巳口噤欲絕用此藥探之若不
眠痛止子母俱安若胎損即便逐下

當歸六錢 川芎四錢 益母草五錢

右劉劑水煎入酒一盞再煎一沸

濕服如人約行五里再進一服

胎逆喘急者火動也

條芩 香附

右各等分爲末每服二錢白湯調下

妊娠傷寒護胎法

井底泥 青黛 伏龍肝

右爲末攪勻塗於孕婦臍中二寸許

如乾再塗上以保胎孕也

一妊婦下血服涼血之藥下血益甚食

少體倦此脾氣虛而不能攝血余用

補中益氣湯而愈後因怒而寒熱其

血仍下此肝火旺而血沸騰用加味

逍遙散血止用補中益氣湯而安

一妊婦下血發熱作渴食少體倦屬脾

氣虛而肝火所侮用四君加柴胡此

梔血止因怒復作六君加柴胡山

梔外麻而安

一妊婦胎六月體倦懶食面黃晡熱而

胎不長因勞欲墜此脾氣不足也用

八珍湯倍加參朮茯苓三十餘劑脾

胃漸健胎安而長矣

一 妊婦墮胎昏憤不時吐痰自用養血化痰之劑昏憤不省自汗發搐痰涎壅出彼以為中風欲用祛風化痰

曰此屬脾氣虛寒所致遂用十全九補湯加炮姜二十餘劑毒愈

一 妊婦因怒吐血兩脇脹痛小便淋瀝此怒而血蓄於上隨火出也用小柴

合四物四劑血止用六君子安胎飲調理而安

一 婦人經閉八月肚腹漸大面色或青或黃用胎症之藥不應余診視之曰

面青脉濇寒熱往來肝經血病也此驚怒傷脾肝之症非胎也不信仍用

治胎散不驗余用加味歸脾逍遙二藥各二十餘劑諸症稍愈彼欲速效

別服通經丸一服下血昏憤自汗惡寒手足俱冷嘔吐不食余用人參炮

姜二劑漸愈又用十全大補湯五十餘劑而安

劉尚書寵夫人有孕患惡阻嘔吐不止飲食不下心中煩燥頭目眩暈諸醫

以和脾胃之藥二陳湯藿香正氣散保生湯之類

數氣口數此血虛氣盛有火也若不

養血則火不降火不降則嘔不止以茯苓補心湯加姜汁炒黃連竹茹二

服全愈

一婦人每懷孕至三箇月必墮不肯服藥予以四五年老母湯入紅糖小黃米煮粥食之不數而胎固至月滿而生男

產育

脉臨產六至脉號離經或沉細滑若無即生浮大難產寒熱又頻此時凶候急於色微面頰唇舌黑與青面赤母活子命必傾若胎在腹子母歸冥

夫產育之難者此由產婦不習預聞講說生育道理臨事惶惶用力失宜遂有難產之患是故有逆產者則先露足有橫產者則手先露坐產者則先露其臂此皆用力太早之過夫當臍腹痛之初兒身纒轉而未順用力一逼遂致橫逆若手足先露者用細針刺兒手足心一二分深三四刺之以鹽塗其上輕輕送入兒得痛驚轉一縮即順生矣或足先下者謂踏蓮花生急以鹽塗兒脚底又可急搔之併以鹽摩母腹上則正生矣

凡胞衣不下乃母生兒訖流血入衣中衣爲血所脹故不得下治之稍緩脹滿腹中以吹七中心胸疼痛喘急必致危篤若遇此症急繫臍帶急斷之以物隊住使其子血脉不潮入胞中則胞衣自當痿縮而下縱淹延數日亦不害人只要產母心懷安泰不可

輕信巫覡妄用手法多因此而損者
良可嘆哉又胞衣不下因產母元氣

衰弱者用等歸倍程以溫之自下

凡妊娠欲產痛陣尚疎經三兩日不生

或產母氣血虧損產道乾澀致令難

產纔覺腹痛但破水後便可服以五

積散加杏仁七粒木香磨順流水姜

棗煎調百草霜末一錢服之未經破

水者勿服

凡生產先知此十証庶免子母之命折

於無辜也世之收生者少有精良効

手多致傾命予因傷痛而備言之

一曰正產

正產者言懷胎十月陰陽氣足忽然作

陣疼痛胎至谷道漿破血下兒即正

產

二曰傷產

傷產者言懷胎未足月有所傷動以致

忽然臍腹疼痛或服催藥過早或產

母努力太早逼兒錯路不能正生凡

分娩頃待兒身轉順頭對產門努力

一送兒即正生

三曰催生

催生者言欲產時見頭至產門方服藥

催之或經日久產母困倦難生宜服

藥以助其血氣令兒速生

四曰凍產

凍產者言天氣寒冷產母血氣凝滯兒

不能速生故衣裳宜厚產室宜煖背
心亦宜溫和庶兒易生

五日熱產

熱產者言盛夏之月產婦常溫涼得宜
熱甚產母頭面赤暈特產室
八衆熱氣蒸逼亦致前患名曰血暈
若夏月風涼陰雨亦當謹避

六日橫產

橫產者言兒方轉身產母用力逼之故
也凡產母當令安臥仰穩婆先推
兒身順直頭對產門以中指探其肩
不令臍帶羈扳方用藥催之繼以產
母努力兒即生

七日倒產

倒產者言兒未能轉身產母努力故也
當令產母仰臥穩婆推入候兒自順
若良久不生令穩婆手入產戶一邊
撥兒轉順近產門却服催藥并努力
即下

八日偏產

偏產者言兒回身未順生路產母努力
逼兒頭偏一邊產雖露頂非也乃額
角耳當令產母仰臥穩婆輕手正其
頭回產門令產母努力子即下若
兒頂後骨偏任穀道露額令穩婆以
綿衣炙煖裹手於穀道外傍輕手推
正令產母努力兒即生

九日礙產

礙產者言兒身已順門路已正兒頭已
露因兒轉身臍帶絆其肩以至不能
生令產母仰臥穩婆輕推兒向上以
中指按兒肩臍帶仍令兒身正順
產母努氣即生

十日坐產

坐產者言兒之欲生當從高處牢繫手
巾一條令產母以手攀之輕輕屈坐
令兒生下不可坐祇兒生路

十一日盤腸產

越都運恭人每臨產則子腸先出然後
產子其腸不收名曰盤腸穩婆以醋
水各半盞飲之產婦面背方收不
向不知

子死腹中

夫子死腹中者多因驚動太早或觸犯
禁或抱腰太重或頻探試水胞衣先
破血水先盡而胎乾涸故耳其候產
母唇舌青黑者子母俱死若舌黑或
脹悶甚者然其子已死矣先以平胃
散一兩酒水各半煎却投朴硝半兩
即熟服或用硝一兩以童便調下亦
妙

○平胃散

蒼朮 米泔浸

厚朴 姜汁炒

陳皮

甘草

右剉一劑酒水煎加朴硝再煎一二
沸溫服

如因難產或大寒時急以大油紙燃徐
徐斷其臍帶雖兒已死冷暖氣入腹
多不得復生切不可用刀斷之產難
者燥濕散飲也催生只用此湯
最穩當又効捷

○催生飲

當歸 川芎 大腹皮 洗

枳殼 麩炒 白芷 各等分

右剉一劑水煎溫服此五味下胎催

生立應

○柞木飲 催生亦治橫生逆產死胎爛

柞木生枝如小指大者一握淨洗剉

碎一葉一刺處處有之甘草五寸

右剉一大劑水一碗半砂鍋內紙二

重窰封慢火煎至一半候產母腹痛

甚時溫飲一盃不過一二服覺下重

即生

催生湯 候產母腹痛腰痛

桃仁 炒去 赤芍 牡丹皮 淨

官桂 白茯苓 去皮各一錢

右剉一劑水煎服

如神散 催生緊效靈妙於理

臨產時令人路上尋草鞋一隻取耳

燒灰溫酒調下三錢如得左足者生

男右足者生女覆者兒死側者有驚

此藥委是神奇

催生散 治難產并胞衣不下

白芷 伏龍肝 百草霜

滑石 各等分 甘草 減半

右為細末用等歸湯入酒童便少許
調前未服之三次立効
脫衣散 治胞衣不下

川牛膝 三錢 歸尾 二錢 木通 三錢
滑石 四錢 冬葵子 半錢 加積殼 三錢

右剉劑水煎服
有胞衣不下因產母元氣虛薄者
用等歸倍桂以温之自下

補遺方

○治婦人難產用蛇退二錢焙存性為
朱黃酒調下即生

治橫生逆產

服諸符藥不下者灸右足小指尖頭

三炷艾炷如小麥大

○治死胎不出

射香 五分別研 官桂 末三錢

作一服黃酒調下源更如手推下効

○治胎死腹中疼痛不已

鹿角燒灰存性為末每服三錢温黃

酒送下

一孕婦交骨不開產門不開皆由元氣

虛弱胎前失於調攝以致血氣不能

運達而然也交骨不開陰氣虛也用

加味等歸湯補中益氣湯產門不開

氣血虛也用十全大補湯加味等歸湯

兩加身死龜板一箇酥炙婦人頭髮一
握燒存性為散每服五錢水煎服如人行
五里即生如胎死亦下炮過龜板亦同

小產

小產重於大產將息當過十倍大產
 果熟自脫小產如採生栗破其殼殼
 斷其根蒂非自然者蓋胎臟損傷胞
 繫腐爛然後胎墮豈不過於大產但
 多以小產為輕以致殞命大抵小產
 宜補虛生肌肉養臟氣生新血去瘀
 血

○補氣養血湯 治小產氣虛 血不止

人參 黃芪 當歸
 艾葉 白朮 白芍藥
 川芎 炙甘草 阿膠
 青皮 香附 砂仁
 右剉一劑水二盞煎至一盞去渣溫服

○補血定痛湯 治小產瘀血心腹
 疼痛或發熱惡寒

當歸 川芎 熟地
 白芍 玄胡索 桃仁
 紅花 香附 青皮
 澤蘭 牡丹皮
 右剉一劑用水一盞半入童便酒各
 一半盞煎至一盞溫服

若以手按腹愈痛此是瘀血為患宜
 用此藥

若按之反不痛此是血虛宜用四物
 湯參苓白朮
 若痛而作瀉此是脾虛宜六君子加
 破故紙 肉豆蔻 姜棗煎服

產後

脈產後緩滑沉細亦宜實大弦牢瀄疾皆危

婦人產畢飲執酒童便共一鍾閉目少坐
上床倚高立膝仰臥不時喚醒及以醋塗鼻
或用醋澆炭及燒漆器更以手從心擇至臍下使惡露不滯如
此三日以防血暈血逆酒雖行血亦不可多恐引血入四肢且能昏暈宜
頗食白粥少許一月之後宜食羊肉猪蹄似許仍慎言語七情寒暑梳頭
洗足以百日為度若氣血素弱者不計日月否則患手足腰腿痠疼等症
各曰產勞最難治療初產時不可問是男女恐因言語而泄氣或以愛憎
而動氣皆能致病不可獨宿恐致虛驚不可刮舌恐傷心氣不可刷牙恐
致血逆須血氣平復方可治事犯特微若秋毫成病重如山嶽可不戒哉
產後諸疾以未治之大補氣血為王也

○芎歸調血飲 治產後一切諸病氣血
不行或去血過多或飲食失節或怒氣相悖以致發熱惡寒自汗口乾心
煩喘急心腹疼痛脅肋脹滿頭暈眼花耳鳴口噤不語昏憤等症

- 當歸 川芎 白朮 去蘆
 - 白茯苓 去皮 熟地黃 陳皮
 - 烏藥 香附 童便 乾姜 炒黑
 - 益母草 牡丹皮 甘草
- 右剉一劑生姜一片棗一枚水煎溫

服看病如減于後

一產後惡寒發熱頭疼體痛脉大無心者是氣血俱虛也

依本方加入參黃芪去川芎牡丹皮益母草

一產後早起勞動發熱惡寒

依本方加入參黃芪

一產後惡露不盡胸腹飽悶疼痛或腹中有塊惡寒發熱有惡血也

依本方加桃仁紅花肉桂牛膝枳殼木香玄胡索童便姜汁少許去熟地黃惡血去後腹不滿不硬不痛但虛熱不退

依本方加入參去牡丹皮益母草

一產後惡露不盡瘀血上冲昏迷不醒腹滿硬痛者當去惡血

依本方加桃仁紅花肉桂玄胡索牛膝童便姜汁少許

一產後腹軟滿不硬痛者不是瘀血乃是脾虛故也

依本方加入參砂仁厚朴去益母草牡丹皮

一產後惡露不盡敗血流入脾胃二經或腹脇刺痛或發腫滿依本方加遠志紅花厚朴玄胡肉桂青皮木香去熟地黃久不愈成血鼓

一產後血去不止是血虛血熱

依本方加入參黃芪生地黃炮桐子

前茶阿膠烏梅去益母草牡丹皮烏
藥血甚不止加地榆入茅根湯磨
調服

血以不止成血崩服五灰散
一產後去血過多太腸乾燥無血大便
閉結不通

依本方加麻黃生地桃仁杏仁黃芩
枳殼厚朴紅花去川芎白朮茯苓烏
藥乾姜益母草陳皮

一產後氣大脫血虛極昏暈不醒者切
不可驚哭叫動則驚散真氣乘昏暈
死可用熱米湯布按元氣復甦

依本方加人參黃芪去牡丹益母烏
藥先將執醋薰乾即醒
一產後泄瀉脾虛發腫

依本方加人參蒼朮砂仁厚朴猪苓
木通大腹白芍炒去熟地川芎烏藥
益母草牡丹皮瀉甚不止加肉蔻柯
子烏梅去厚朴久不愈成產後脾瀉
中滿

一產後食傷脾胃飽悶泄瀉後變痢者
難治

依本方加砂仁木香山藥蒼朮厚朴
白芍炒去熟地川芎益母草牡丹皮
烏藥瀉甚不止加肉蔻椰子煨烏梅
去厚朴木香

一產後惡心嘔噦不止若去血過多乃
是脾胃虛寒血少之故

依本方加人參半夏烏梅法益母草

牡丹皮香附烏藥

一產後惡露去少嘔噦惡心胸脹或膈

膈疼痛是惡血冲胃依本方加肉桂

砂仁厚朴紅花去熟地白木茯苓

一產後因怒傷肝胸脇刺痛飽脹不進

飲食發熱

依本方加砂仁木香厚朴青皮玄胡

索茴香去熟地黃白木茯苓益母草

牡丹皮

一產後血虛發煩燥虛驚睡臥不寧錯

語失神

依本方加人參酸棗仁竹茹炒山梔

麥門冬辰砂去烏藥牡丹皮益母草

乾姜

一產後口眼喎斜手足瘳引或筋惕肉

瞤或驚悸戰掉不止或作寒熱脈或

大無力或虛細皆是氣血俱虛不能

榮養筋脉依本方加入參黃芪辰砂

去烏藥乾姜益母草牡丹皮若脉來

浮緊有力恐血虛中風本方去黃芪

辰砂加防風荆芥羌活不可全作風

治以風散氣悞矣有痰加竹瀝姜汁

少許半夏薑炒去黃芪二三服藥除

防風荆芥羌活依本方加減調理

一產後心血空虛神無所依或因悲思

鬱結怒氣憂驚驚則神舍空舍空則

生痰是神不守舍使人驚悸煩亂

罵欲走悲歌妄笑頭搖手戰

一產後

依本方加入參竹茹酸棗仁死門冬
山梔貝母枳實辰砂竹瀝薑汁去芥
芎烏藥乾姜益母草牡丹皮

一產後血少脾虛生痰痰迷心竅使人
昏迷不能言語

依本方加瓜蒌貝母枳實人參石菖
蒲桔梗竹瀝姜汁少許去香附烏藥
乾姜益母草牡丹皮

一產後心血空虛心無血養口不能言
精神短少

依本方加入參酸棗石菖蒲遠志茯
神生地桔梗麥門冬竹瀝姜汁少許
去牡丹益母草烏藥乾姜香附

一產後去血過多血虛發腫者

依本方加砂仁大腹皮厚朴猪苓木
通去牡丹皮益母草烏藥乾薑

一產後惡血去不止流入脾經發腫滿
者

依本方加紅花大腹皮厚朴砂仁木
香猪苓木通去益母草烏藥白木茯
苓

一產後脾虛飽悶不進飲食

依本方加砂仁白豆蔻厚朴益智木
香去川芎益母草牡丹皮烏藥乾姜

一產後血虛煩渴不止津液枯竭

依本方加入參麥門五味子天花粉
葛根蓮肉烏梅白芍去川芎乾姜牡
丹皮益母草烏藥香附

一產後脾虛發痰喘氣急

依本方加沉香木香蘇子厚朴白芍
砂仁枳實貝母竹瀝姜汁少許去益

母草牡丹皮乾姜白木香附烏藥

一產後因去瘀血過多遍身骨節痛難

轉側是血虛不能榮養筋骨

依本方加生地白芍紅花人參牛膝

乳香薄荷桂少許去益母草牡丹烏藥

乾姜

一產後因去血過多血虛發瘧者

依本方加人參黃芪生地白芍去益

母草牡丹皮姜汁烏藥發熱加柴胡

黃芩少許有痰加瓜蒌貝母枳實竹

瀝姜汁少許去乾地黃

一產後形體壯盛手足癱瘓遍身疼痛

難以動縮者是血虛有風痰也

依本方加貝母枳實薄桂牛膝炒黃

芩羌活蒼朮白芍竹瀝薑汁少許去

益母草牡丹皮乾姜烏藥白朮

一產後初起腹中有塊升舉作痛無寒

熱者俗云兒枕七日痛自已或腹滿

硬痛作寒熱者痛不移處是死血痛

當去惡血痛自止矣

一產後初起蒸乳發寒熱者

依本方加青皮枳殼通草

○益母丸

治婦人胎前產後或難產胎

盤俱可服之
五月五日午時取益母草陰乾搗爲

細末煉蜜為丸如圓眼大每服一丸
童便好酒各半研化服之不飲酒者
湯化下

○回生丹 長葛 孫樹 亭 經 驗

大黃 一斤為細末

蘇木 三兩 剉用河水五碗煎汁
三碗去渣不用存汁用

紅花 三兩 炒黃色入好酒一大盞同
煎三五滾去紅花不用存汁用

黑豆 三外煮熟取汁三碗
去豆不用此用豆皮

先將大黃末以好米醋三四碗攪勻
以文武火熬成膏如此二遍次下紅
花酒蘇木湯黑豆汁攪開太黃膏入
內又熬成膏取出如有銅靶再焙乾
入後藥

當歸

川芎

熟地黃

香附米

白茯苓 皮 蒼朮 米泔浸

烏藥

玄胡索 桃仁 別研

蒲黃

牛膝 去蘆 白芍 酒炒

甘草

陳皮 木香

三稜

五靈脂 羌活

地榆

山萸 酒蒸去核各五錢

人參

白木 去蘆 青皮 去穢

木瓜 各三錢

良姜 四錢 乳香

沒藥 各一錢

右為細末用大黃膏為丸如彈子大
每服一丸酒頻化通口服

若產後頭疼身熱有汗謂之傷風加

桂枝末三分姜葱煎湯頻化服之

若產後頭疼身熱無汗謂之傷寒加

蘇黃末三分姜葱煎湯頓化服之
若產後無乳加天花粉三分當歸尾
三分穿山甲炙三分黃連三分為末
同入酒內頓開不拘時服冷乳母將
乳頭揉千餘轉其乳如湧泉自出
保生論回生丹功效

養胎益血和子治妊婦失宜勞役胎動
或胎漏惡露時下臍虛寒久不成胎
痿燥不長逾期不產日月雖滿動作
無力或致損墮產時未至惡露先下
胞絡枯燥致令難產或逆痼悶亂連
日不產子死腹中腹上米冷口唇青
黑出冷沫惡露上攻昏悶不省喘促
汗出及血未盡臍腹冷痛寒熱往來

或因產勞虛損身羸面黃體瘦心怯
盜汗飲食不進漸成勞疾入月常服
壯氣養胎順產滋陰養血調和陰陽
密煖理實臟腑治風虛實痼冷閉門
寶鑑經驗醫方治妊婦胎前產後崩
漏帶下室女經閉月水不調

第一子死腹如何

答曰妊母因染熱病六七月經傳臟
腑執樞以致子死腹中墜臍下不分
離命在須速急服回生丹三九便生

第二難產如何

答曰緣胎氣已成子食母血臨月足
餘紅血成塊俗呼為兒枕臨產時兒
枕先破及將生時枕破血裹其子故

難產但服此藥遂去敗血真與自生
橫生逆產同治

第三產後胎衣不下如何

答曰母子分解既訖母受其寒產血
入于衣中被血所脹此胎衣不下冷
入脹悶飲食不進遂去衣中敗血自
然下矣

第四產後血暈起止不得眼見黑花如
何

答曰產後三日血氣未定還走五臟
奔克於肝腎人不識呼為暗風差矣
宜此丹治之即愈

第五產後口乾心悶如何

答曰產後七日以來血氣未定因三

日食麪麵與血結積聚在心是以煩
渴醫人不識呼為胸膈壅悶但服此
藥萬無一失

第六產後寒熱似痛如何

答曰產後虛羸血入于心肺熱入于
脾胃則寒熱極反渴醫人不識呼為
癘疾悞傷產婦不可勝記若服此救
之百發百中

第七產後四肢浮腫如何

答曰敗血走注五臟轉滿四肢停留
回轉不得乃化為浮腫遂致四肢俱
腫醫人不識遂為水腫與血腫不問
水腫氣閉而小便澁血腫氣渴而四
肢寒先服此丹去敗血後用冰氣

藥

第八產後血邪如見鬼神癲狂言語無度如何

答曰產後敗血執極中心所以煩燥言語顛狂醫人不識呼為風邪若以風治之是庸醫誤人若急服此丹萬無一失

第九產後失音不語如何

答曰心有七孔三毛敗血充心流入孔中被血所閉言語不得醫人不識呼為脫陽脫陽失音甚是為難無方下藥除不審視產婦敗血行與不行順與不順今血氣妄行流入心孔却反為難語若服此萬無一失

第十產後泄痢腹痛如何

答曰姪婦未滿月悞食酸冷堅硬之物與血相搏流入太腸不得消化或泄膿血或作汚刺不得安穩但服此即愈

第十一產後百節酸疼如何

答曰生產姪婦百骨脂中間張產後餘血流入經絡停留日久結聚不散壅滯虛脹是以百節酸疼醫不識此呼為濕症用藥誤損者多矣但服此丹二三服去其滯血即痊

第十二產後小腸尿血如雞肝如何

答曰產婦月中將理失宜飲食不得應時兼以氣怒以致餘血流入小腸

閉却水道是以小便澀結血似鷄肝
流入大腸閉却肛門逆致大便澀難
醫人不識呼為五臟淋澀傷損心肝
以致瘀血成塊形如鷄肝殊不知敗
血流入大腸閉塞水穀以致如此但
服此藥立瘥

第十三產後下血似崩中如何

答曰產後敗血惡露盡止之間亦當
服藥以調五臟或食酸鹹之物寒熱
不一因此榮衛不得調和以致腹中
便作崩漏形如肝色薄身潮熱背膊
拘急心中煩悶醫人不察云為崩下
但婦人癸水將至暴下不止忽期過
度故曰崩下產婦血氣正行失于保
養以成此疾但服此丹其病即瘥

第十四產後胸膈氣滿嘔逆不定如何

答曰產後血停于脾胃食充氣充心
氣不安胸膈脹滿嘔吐偏多醫人不
識呼為翻胃口不容受飲食故曰翻
胃况妊婦血停於脾心氣相冲而為
嘔逆如何謂之番胃但服此丹二三
元百不一失

第十五產後咳嗽寒熱往來如何

答曰產後不能食谷食麵結痰為塊
上喘咳嗽四肢寒熱心悶口乾渾身
煩燥睡夢多驚體虛無力經水不來
名曰血閉腸痛面赤因此難治變作
骨蒸治須仔細若服此丹不應雖虛

醫不起

第十六產後喉中似蟬聲如何

答曰敗血衝過於心轉入肺氣與血並結成塊入喉中作聲似蟬鳴人以爲怪產得此病者十不救

第十七產後面黃舌乾鼻中流血遍身色點生姪如何

答曰產後敗血入五臟六腑皆滿流入肌膚敗血出入流走四肢執結留注轉還不得故有此疾可畏可慎產後有此十無一活但此疾百中無一二如遇此丹可保無虞

第十八產後眼溢腰痛似角弓如何

答曰產婦百日之後方得脫體今在月中七日以來食麥爽口之物以致煩熱不得安寧因循不肯服藥調理兼百日之內過傷房事或久病或坐臥當風取其一時快樂殊不知產後血氣虧損倘一犯之則不能免此患也

第十九產後小便澀大便不通如何

血入腸中誰得知小便淋瀝大便遲乍寒乍熱常多汗如醉如痴似鬼迷花發目前如碎錦病纏身內總成虛只消一粒回生藥產婦從今免困危

產後諸疾補遺

一產婦累聞音響其汗如水而昏憤諸藥到口即嘔余以爲脾氣虛敗用參

附未為細丸時含三五粒隨液嚥下

乃漸加之至錢許却服參附湯而痊

一產後生腸不收皆由氣虛血弱所以

懸下但養氣和血其物自收用補中

益氣湯去柴胡陳皮加川芎升提之

用熟羊心常熨腰肚但腰肚氣暖其

物自收

一產婦陰脫腫痛尿消數飲作膿也

全大補湯而膿成又數劑而潰但小

便頻數患處重墜此元氣虛而下陷

也用補中益氣湯而尋愈

一產婦王門不閉發熱惡寒用十全大

補加五味數劑而熱退用補中益氣

加五味數劑王門閉

一產婦血崩因怒其血如湧仆地口禁

目斜手足搐搦此肝經血耗生風余

用六味丸料一劑諸症悉退但食少

晡熱佐以四君子柴胡牡丹皮而愈

一產婦泄瀉四肢面目浮腫喘促惡寒

用六君加姜桂而泄瀉愈又補中益

氣而脾胃健

一產婦泄痢腹痛口久形體骨立內熱

晡熱自汗盜汗口舌糜爛吐痰脉洪

大重按全無此命門火衰脾土虛寒

而不能攝痰歸元用八味丸補火以

生土用補中益氣湯兼補肺金而痊

一產婦牙關緊急腰背反張四肢抽搐

兩自連劄此去血過多元氣虧損陰

火熾盛用十全大補加炮姜一劑而

麩數劑而安

一產婦筋絡臂軟肌肉抽掣皆屬氣血
虛用十全大補湯而痊 俱見補益

乳病

乳汁不通結核成餅不散寒熱作痛者

宜速探散乳汁一通餅核自消如不

消結成乳癰急用連鬚密掃成餅搭

乳上用灰火一罐蓋葱上須臾汗出

立消

乳汁不通者有盛有虛也

○盛宜

桔梗 二錢 藿麥 柴胡

天花粉 各一錢 通草 七分 青皮

木通 赤芍 白芷

連翹 甘草 各五分

右剉一劑水煎服更摩乳房

○虛宜

王不留行 木通 天花粉

當歸 川芎 白芍 酒炒

生芩 各等分

右剉一劑用積猪蹄傍肉四兩煎湯

二鍾入藥同服先將葱湯頻洗乳房

○湧泉散 治乳汁不通不問虛實先用

穿山甲 煨熟 白姜 蚕 炒

肉豆蔻 麵包 煨熟 皂角 五錢

胡桃仁 去皮四兩 芝蔴 炒半升

右為細末每服不拘多少溫酒調下

任意食之

○治乳汁不通

王不留行

天花粉 甘草 各二錢

當歸

穿山甲 酥炙各五錢

右為細末每服三錢猪蹄湯或執酒調下其乳即通

乳癰發痛者血脉凝注不散也

天花粉 金銀花 皂角刺

穿山甲 當歸尾 白芷稍

瓜蒌仁 貝母 甘草節

右剉酒煎服此方治吹乳乳癰痛腫

不可忍者

○瓜蒌散

治婦人乳疽乳癰切勞

黃瓜蒌 子多者不去皮焙研爛

當歸 五錢 乳香 一錢研

沒藥 一錢研 生甘草 五錢

右合一劑好酒三碗於銀石器中慢

火熬至碗半分為三次食後服如有

乳勞便服此藥杜絕病根女毒氣已

成能化膿為黃水毒未成即內消痰

甚者再合一服以愈為度

○婦人吹乳

用黍子一合黃酒下即散

治婦人吹乳硬腫身發熱增寒疼痛

難忍不進飲食者服之良驗

鹿角一兩炭火煨存性研細分作二

服先將未藥五錢入鍋次下無灰酒

一碗滾數沸倒在碗內乘熱盡飲臨

臥服汗出即安

○治吹乳仙方

用葱一大把搗成餅一搗厚攤乳上用灰火一罐覆葱上須臾汗出腫痛立消

一產婦勞役勿心乳汁如湧昏昧吐痰此

陽氣虛而厥也灌以獨參湯而甦更

以十全大補湯數劑而安方見補益

一婦人氣血方盛乳房作脹或無兒飲

脹痛增寒發執用麥芽二三兩炒熟

水煎服立消其耗散氣如此何脾胃

虛弱飲食不消方中多月

乳岩

婦人乳岩始有核腫如鷲棋子大不痛

不痒五七年方成瘡初便宜多服疎

氣行血之藥須情思如意則可愈

成之後則如岩穴之凹或如人口有

唇赤汁膿水浸滯胸腹氣攻疼痛用

五灰膏去蠹肉生新肉漸收飲此

疾多生於憂鬱積忿中年婦人未破

者尚可治成瘡者終不可治宜服斗

六味流氣飲

治乳岩

○十六味流氣飲

治乳岩

當歸 川芎 白芍 黃耆

人參 官桂 厚朴 桔梗

枳殼 烏藥 木香 檳榔

白芷 防風 紫蘇 甘草

乳癰加青皮○亦治瘰癧餘毒作癰

右剉一劑水煎食遠臨臥頻服

婦人諸病

婦人與鬼交通者由臟腑虛神不守故
鬼氣得為病也

其狀不欲見人如有對暗時獨言笑
或時悲泣是也脉息遲伏或為烏喙
皆鬼邪為病也又脉來綿綿不知度
數而顏色不變此亦是斯候也
穴以患人兩手相指相並用線繫此
當合縫處半肉半甲間灼灸七壯
若果是邪祟病者即乞米免灸云云
自去矣

○茯神散 治婦人風虛與鬼交通

白茯苓 一錢 白茯苓 去皮 人參

石菖蒲 錢 赤小豆 五分

右剉一劑水煎服外用辟邪丹祛之

方見瘟疫

婦人傷寒發熱經水適來晝則明了暮
則識語如見鬼狀此為熱入血室也

○小柴胡湯 方見傷寒

依本方加生地黄

○一方用四物湯去孰黃用生地黄加

柴胡各等分前服亦治此症

婦人陰腫者是胞絡虛為風邪所客也

○黑白散 治陰中腫痛

小麥 朴硝 白礬

五倍子 葱白

右件煎湯頻洗○一方用馬鞭草搗

爛塗之

婦人陰痒者是虫蝕陰戶也

○治陰痒用蛇床子白礬煎水淋洗即止

○一方用半肝或猪肝三寸納入陰中其虫盡入肝內取出立効

婦人陰中生瘡者是濕熱也

○療女人陰中生瘡

杏仁

雄黃

礬石

各二分

麝香二分半

右研細傳入陰中○一方單用硫黃

研細付之亦効

一婦人素鬱悶陰內痛痒不時出水飲食少思肢體倦怠用歸脾湯加丹皮

山梔芍藥柴胡生草主之而安

一婦人病愈後小便出尿此陰陽失於

傳送名大小腸交也先用五苓散二劑而愈又用補中益氣湯而安

一婦人陰中寒冷小便澀清腹中亦冷

飲食少思大便不實下元虛寒治以

八味丸月餘飲食漸加大便漸實又

月餘諸症悉愈

一婦人每交接出血作痛此肝火動脾

而不能攝血用補中益氣濟生歸脾

二湯而愈若出血過多而見他症但

用前藥調補肝脾

一婦人陰中擬出一條五寸許悶痛重

墜水出淋瀝小便澀滯夕與龍膽瀉

肝湯分利濕熱朝與補中益氣湯升

補脾氣諸症漸愈再與歸脾加山梔

補脾氣諸症漸愈再與歸脾加山梔

茯苓川芎黃柏開服調理而愈後因
勞役或怒氣下部濕痺小水不利仍
用前藥即愈亦有天許者亦有生諸
虫物者皆用此治

一婦人小便自遺或時不利且腫甚
此肝熱陰挺不能約制用六味丸料
加白朮酒炒黑黃柏七分知母五分
大劑諸症悉愈若誤用分利之劑愈
損真陰必致不起

一婦人有孕小便不利小腹腫脹幾
於殆用八味丸一服小便淋滴再以
前丸之料加車前子二劑即利肚腹
頓然而安

一妊婦無故自悲用大棗十枚甘草小
麥各三兩分三劑水煎服而愈後復
患又用前湯佐以四君子加山梔而
安

一婦人身顛振口妄言諸藥不効余以
為鬱怒所致詢其故蓋為素嫌其夫
而含怒久矣投以小柴胡湯稍可又
用加味歸脾湯而愈

一婦人驚悸怔忡無寐自汗盜汗飲食
不甘怠惰嗜臥用歸脾湯而愈至年
餘懷抱鬱結患前症兼血便血仍
用前湯而愈

一婦人忽昏憤發謔語自云為前某類
某人銀兩其神責我將爾起解往城
隍理問兩脚膝膝皆青腫痛不

可忍口稱苦楚次日方甦痛尚不止
用全銀燕兩許水煎服即愈
一女子年二十歲未婚為見男子解
咬處不放後昏倒陰戶流出冷精頃
間即醒其厥陰肝脈弦出寸口乃陰
盛思男子不可得也予治其父母用
穉痛責使之思痛而失慾也後服柳
陰丸而愈

新刊萬病回春卷之六終

