



重刊醫方大成論目錄

風一	傷寒五	泄瀉九	痰氣十三	翻胃十七	頭痛廿一	脚氣廿五	諸淋廿九	脹滿卅三	虛煩卅七
寒二	瘧六	霍亂十	喘急十四	諸虛十八	心痛廿二	五痺廿六	消渴三十	積聚卅四	健忘卅八
暑三	痢七	秘結十一	氣十五	癆瘵十九	眩暈廿三	五疽廿七	赤白濁卅一	宿食卅五	癩癩卅九
濕四	嘔吐八	咳嗽十二	脾胃十六	咳逆二十	腰脇痛廿四	蠱毒廿八	水腫卅二	自汗卅六	陰癩四十

重刊醫方大成

目錄

卷之五

五十五



- 痼冷 四一
- 積熱 四二
- 吐血 四三
- 下血 四四
- 痔漏 四五
- 脫肛 四六
- 遺尿失禁 四七
- 咽喉 四八
- 眼目 四九
- 耳 五十
- 鼻 五一
- 口唇 五二
- 牙齒 五三
- 舌 五四
- 五藏內外所因證治 五五
- 瘰癧 五八
- 折傷 五九
- 癰疽瘡癤 六五
- 瘡疥 五七
- 孕育 六二
- 胎前 六三
- 產後 六四
- 婦人 六一
- 胎前 六三
- 產後 六四
- 小兒 六五
- 胎前 六三
- 產後 六四
- 急慢驚風 六九
- 胎熱胎寒 附盤腸 七十
- 感冒四氣 七一
- 疹痘 七二

目錄畢

此書言風曰種風也... 風有傷中之別或在皮毛為輕傷... 胎前產後... 胎前產後... 胎前產後...

中風非外來風邪... 中風非外來風邪... 中風非外來風邪... 中風非外來風邪... 中風非外來風邪...

醫方大成論

風

風為百病之長故諸方首論之岐伯所謂大法有四
 一曰偏枯半身不遂二曰風痲於身無痛四肢不收
 三曰風懿者奄忽不知人也四曰風痺者諸痺類風
 狀此特言其大槩而又有卒然而中者皆由氣體虛
 弱榮衛失調或喜怒憂思驚恐勞役以致真氣耗散
 腠理不密邪氣乘虛而入及其中也重則半身不遂
 口眼喎斜肌肉疼痛痰涎壅盛或癱瘓不仁舌強不
 語精神恍惚驚惕恐怖治療之法當詳其脈證推其

醫方大成論

卷之...

所感之原若中於肝者人迎與左關上脉浮而弦面
目多青惡風自汗左脇偏痛中於心者人迎與左寸
口脉洪而浮面舌俱赤翕翕發熱瘖不能言中於脾
者人迎與右關上脉浮微而遲四肢怠墮皮肉潤動
身體通黃中於肺者人迎與右寸口脉浮濇而短面
浮色白口燥多喘中於腎者人迎與左尺中脉浮而
滑面耳黑色腰脊痛引小腹隱曲不利中於胃者兩
關脉並浮而大額上多汗膈塞不通食寒冷則泄凡
此風證或挾寒則脉帶浮遲挾濕則脉帶浮濇二證
俱有則從偏勝者治之用藥更宜詳審若因七情六

淫而得者當先調氣而後治風邪此嚴氏至當之論
倉卒之際救此急證宜先以皂角細辛搐入鼻內通
其關竅次以蘇合香圓擦牙連進以生薑自然汁并
三生飲俟其甦醒然後次第進以順氣之類排風續
命之類中在經絡脉微細者生入于藏府口開手
散眼合遺尿髮直吐沫搖頭直視聲如鼾睡者難治
又有中之輕者在皮膚之間言語微蹇眉角牽引遍
身瘡癬狀如蟲行目旋耳鳴又當隨證治之

寒

寒為天地殺厲之氣故見於冬則為冰為霜草木因

中寒則舍在感寒其病
即發而暴傷寒之人
因其舊有熱熱凡寒
不來肌腠自發熱

二、寒中寒也、岐伯曰在天為寒、在地為水、在人為藏、為腎、丹溪曰仲景論傷寒、未及
半中寒先地、治宜大寒而發、用附子理中湯而安、其說則得之矣、曰傷風中寒、
謂有、其異同者、因思傷寒有即病、必大發熱、邪循經而入、以漸而深、

黃桂枝湯其初也... 以病休不... 之人其脈... 一身受邪... 熱可發溫... 胃氣之甚... 熱雖甚不... 急道去生... 構蓋可見... 手足厥全... 倦言動者... 氣自皮膚... 昏倒四肢... 冷與中風... 脈不動為... 且

閉ラレテ病公者... 中暑ノ症... 病頭痛發熱... 行農夫等... 炎暑ニリテ... 病者也今... 霍亂ト云... 辨メ言フ... 者ニ度月ノ... 煩渴胸中煩... 咽

之而摧敗鳥獸各巢穴以自居氣體虛弱之人或調
護失宜衝斥道途一時為寒氣所中則昏不知入口
噤失音四肢僵直攣急痰痛或洒洒惡寒身發熱
面赤若有汗五藏之虛者皆能有所中也其脈多遲
而緊扶風則脈帶浮眩暈不仁兼濕則脈濡而四肢
腫痛治療之法只宜以薑附之藥溫散寒氣切不可
妄有吐下如舌卷囊縮者難治

暑

暑之為氣在天為熱在地為火在人臟為心是以暑
之中入先著於心凡中之者身熱頭痛煩渴口燥甚
三暑病ニ於テ長和泰古並ニ東垣以來中暑ノ辨アリ得者ヲ曰中暑
動テ不得モノヲ曰中熱其暑ノ著テ於心ガ為ニ深堂大塚トニ入テ
動テ不得モノヲ曰中熱其暑ノ著テ於心ガ為ニ深堂大塚トニ入テ

暑邪が肺ヲ犯セバ... 胞瀾スルハ逆ノ濁... 且脾ハ肌肉ヲ主... 肺管ハ呼吸出入ノ... 道路タリ故ニ暑邪ハ... 生スルヲ詳考セヨ
○飲食多ク用テ且... 小便頻數ナルヲ云... 節ヲ抑セバ其ノ真... 節下ニ隠伏スル也... 凡ノ暑ハ陽熱ノ... スルハ陽氣ヲ散... 故ニ暑ハ陽邪外邪... 冬目者ニリテ神... 昏テ中ニリテ者ハ... 抑ニ冷水ヲ與ハ濕地ニ... ト然レバ暑症ハ反... 元陽ヲ散虚ス故ニ... 此章ハ上ノ冷水ヲ與... 濕地ニ與ヒテカシ... 云ノ意明セリ中暑

則昏不知入手足微冷或吐或瀉或喘或滿入肝則
眩暈頑痺入脾則昏睡不覺入肺則喘滿痰壅入腎
則消渴其脈多沈伏一時昏中者切不可便與冷水
并臥濕地古法當以熱湯先灌及用布衣蘸熱湯熨
臍下及氣海續續以湯淋布上令煖氣透徹臍腹候
其甦省進以黃連香薷散五苓散若體虛者冷香飲
子霍亂吐瀉來復丹二氣丹夾食則用胃苓湯若挾
風則其脈沈而浮證有搐搦當於黃連香薷散內加
羌活煎服却不可作驚癇治之多致不救此方乃嚴
氏累用之而有驗者若旅途中卒然暈倒急扶在陰

一晴一暈ヲ温ノヨリ也... 歸サシテテ放スル也... 此中言者、テ一時ニ昏クシテ者ノ治也

透徹セシムト也透徹透也徹也... 立醒 白扁豆原和黃連也... 五苓散ハ澤瀉散也... 五苓散ヲ以テセヨト也

濕

濕之為氣冲溢天地之間流注四時之內體虛之人或為風雨所襲或卧卑濕之地遠行涉水或感山澤蒸氣或汗出衣裏冷則浸漬脾胃皆能有所中傷著腎者腰痛身重如坐水中小便不利著脾則四肢浮腫不得屈伸若挾風則眩暈嘔噦心間煩熱兼寒則拳攣掣痛無汗惡寒帶暑則煩渴引飲心腹疼痛面

氣也感於外有人氣濕天陰濕土之所化也... 動於中云云... 証者有內濕有外濕... 濕之體虛者有... 自然中者也外中濕者或山嵐瘴氣或被雨濕... 蒸氣或遠行涉水或久臥濕地或汗出衣裏... 鞋則濕從外而中矣內中濕者皆因生冷水食... 或厚味醇酒過多停滯脾胃不能運化... 於三焦注於肌肉滲於皮膚則濕從內而中矣... 用藥則指此手圖天濕... 有自外入者有自內出者必審其方土之致... 東南地下多陰雨濕氣必從外入多自下起故重脚氣者多治濕汗散又則涉泥西地地高無濕人多食濕麵渣乳酒醱以飲多吸食為害或酒後寒氣神熱耐濕不得起病從內生故多腹皮腫痛水鼓浮腫如記之病治須宜利二便甚則速求驅之其根在內也南北內外受濕亦互

但多少不同耳與學者究之

垢惡寒凡感濕之證其脉多沈緩而微其證多四肢倦怠不舉法當疎利小便為先決不可輕易汗下并用火攻若有泄瀉等證又當於各類求之

傷寒

傷寒之證固有天疫流行一時所感病無老少率相似者然多是體虛勞役之人冬月衝斥道途不謹調護以至為風寒所傷其毒藏伏於內不即發見或為熱所擊搏然後發而為病故經云冬感寒春發温者是也其為證有陽有陰有表有裏又當知受病不同傳變不一其發也未有不自頭疼發熱自汗惡寒而

外感發熱者因陽於寒... 散其寒則陽氣泄而熱自除矣... 傷寒解... 尹才嘗問世之言寒病者不迫曰傷寒性命死生在平旬日之間... 因同百格古曰古人以白病皆為難病惟傷寒各曰行病云云... 屠隆文亦死云傷寒之病曰霜露之疾... 採集要曰古今最嚴寒為殺厲之氣萬類深藏君子固守不虞於寒... 陽明藏支動之觸... 有寒毒入於腠理傳於榮衛壯者氣行不結... 有者成病也夫中即

不渴也此亦寒濕也
濕二寒濕下溫
熱トアリ温熱症ハ使
赤蓋ニ入温ス今此ハ
寒濕故ト小便自利又
不渴ナリ

者アリ其ノ濕スルヤ
夜ノ五更七時ニ必ス
下ナリ

症ニハ飲食ヲ受ツケ
又者ナリ若シ五虛ヲ
見ト雖五或ハ少シテモ
飲食ヲ受ツケルコト
アリテ其ト從テ
泄瀉モ少シ止リコト
ニナリ者ハ胃ノ氣未
絶者ナリ故ニ治法ヲ
得テ治ヘキ症トナリ

腰脚冷痺小便自利不渴其下黃黑色當以滲濕湯

藿香正氣散調之因停食而泄者下必臭類抱壞雞

子或噫氣作酸先服感應圓推其食積而後理脾氣

體虛弱及年高之人脾氣虛敗而自利者又當投以

四柱散蔻附圓若脾腎氣虛清晨泄下一二次二神

四神圓主之又有腎氣虛而泄者又須金鎖正元丹

以固之凡治瀉之法先理其中焦分利水穀然後斷

下醫之太法如此若脚氣泄瀉各以類求之滑泄一

證最忌五虛五虛者脉細皮寒少氣前後泄利飲食

不入者是也若得粟粥入胃泄瀉止則可治也

霍亂

霍亂之證多兼乎吐瀉皆由飲食不節或過飧飴膈
乳酪之物傷于五藏停積胃腕脾弱不能運化又為
風寒之氣所干陰陽隔絕揮霍變亂而成此證輕則
上吐下瀉兩脚轉筋甚者遍體轉筋腹肚疼痛手足
厥冷若欲絕者倉卒之際宜於臍中灼艾及用藜一
把煎湯泡洗次投以薑附湯理中湯之類其脉洪大
者易治脉微腎縮舌捲者難治又有霍亂而不吐瀉
者止其類吐不吐類利不利頃刻之間便致悶絕當
多灌鹽湯引其必吐宿食殆盡然後以嚴氏加減理

霍亂ハ四時但二病也病因七外邪ニテモ發スル也上ハ吐瀉ニ下ハ大便瀉利ノ吐瀉一時ニ發スルヲ霍亂ト云此温霍也
花柳ト云ハ
ニテ發スル也均會ニテナリト云フ
ニテ發スル也均會ニテナリト云フ
ニテ發スル也均會ニテナリト云フ
ニテ發スル也均會ニテナリト云フ

中湯治中湯。欬欬調之。既愈之後。煩熱多渴者。以麥門冬湯調之。夏月中暑。亦能令人霍亂吐瀉。臨證復當詳審。

秘結

七

秘八問也。大便ノ秘結テ難通ヲ云也。大便秘結モ其ノ因種種アリ。詳ニ治ラ用ニモシ

秘結之證。不問氣虛體實之人。攝養乖理。三焦氣澁。運掉不行。壅結於腸胃之間。皆有秘結之患。有風秘。寒秘。氣秘。熱秘。濕秘。及因病發汗。利小便過多。以致津液枯竭。并婦人產後失血耗氣之餘。皆成秘結。但當審人氣體虛實。脈息沈數若何。然後用藥治療之法。熱實者通利之。寒虛者溫行之。氣結而澁者潤滑。

一風秘ハ風疾大腸ニ結シ秘テ通セス風ヲ散セヨ
一氣秘ハ氣滯ニ依リ後重セリ痛ニ煩悶脹滿ノ大便ヲススヲ通スベシ
一寒秘ハ老人ノ腸豆或ハ津液虛シ血少ノ腸胃カハキ澁ル潤滑スベシ
一熱秘ハ大腸實熱ノ氣塞リ通セス心腹煩悶ノ大便ヲ熱ヲ涼フスベシ
一濕秘ハ腸胃濕鬱ヲウケテヒス濕ヲ通初セヨ
一陽結スルヲハ散スベシ
一陰結スルヲハ温スベシ
一小便自利ノ大便カクハ下スベカラズ必ス潤スベシ
一食物ヲラ大便ケツセハ是ヲ下スベシ
一宿食熱シテ秘セバ心ス海セヨ
一大便秘結スルヲハ温スベシ
一小便自利ノ大便カクハ下スベカラズ必ス潤スベシ
一食物ヲラ大便ケツセハ是ヲ下スベシ
一宿食熱シテ秘セバ心ス海セヨ
一大便秘結スルヲハ温スベシ
一小便自利ノ大便カクハ下スベカラズ必ス潤スベシ
一食物ヲラ大便ケツセハ是ヲ下スベシ
一宿食熱シテ秘セバ心ス海セヨ

之風濕而秘者。驅利之。津液枯竭者。補益之。臨證更

宜詳審虛實用藥。不可一槩而論。

咳嗽

咳ハ和ニヒキセト説クハ有聲無痰和ニヒキセト咳ハ有痰無聲和ニヒキセトトハ誤也
義ハ未周論ニ詳テ今此ノ論モ亦多ク論ヲ以テ文ヲセリ凡ソ咳嗽ニハ四傷アリ
外傷アリテ病因多端也詳ニ分別メ可ナリトス

肺為五藏之華蓋。聲音之所從出。皮毛賴之而潤澤。腎水由茲而生。養腠理不密。外為風寒。暑濕之氣所干。皆能令人咳嗽。傷風則脈浮。憎寒身熱。自汗煩躁。鼻引清涕。欲語未竟。而咳傷寒則脈緊。而無汗惡寒。煩躁不渴。遇寒而咳。傷熱則脈數。而煩渴引飲。咽膈乾燥。咳唾稠粘。傷濕則脈細。咳則四肢重著。骨節煩疼。又有七情之氣傷于五臟。六脈

醫方選要作肺 尅于肺經

一咳ト嗽トノ分別ハ
聲アリテ疾ヲ肺氣
アテテ涼シラス
○嗽ハ疾アツテ聲ナシ
脾濕其ノ疾ヲ動ス
○咳嗽ハ邪肺ヲ破
故モアリ疾モアリ
石ノノ分別ニテ疾ヲ
ホクハ脾濕ヲ疾モ
多クハ肺氣ヲスシ
フスベシ
一五志五藏ノ咳嗽
心ヲ傷レハ疾中ニ物
カハリハ肺氣ヲ傷
○怒テ肝ヲケレハ雨
ノ腸痛ニ章門
ノ痛吐スノ思テ
ヲアレバ右ノ腸痛
有脊ニヒキスノ憂
テ肺ヲアレハ喘咳
ソキニ血ニハルリ
○怒テ腎ヲアレハ腰

亦能致咳喜傷心者咳而喉中介介如腫狀不已則
小腸受之咳狀與氣俱失怒傷肝者咳而兩脇下痛
不已則膽受之嘔吐苦汁思傷脾者咳而右脇下痛
引至肩背不已則胃受之嘔吐痰沫憂傷肺者咳而
喘息有聲甚則唾血不已大腸受之咳則遺尿恐傷
腎者咳而腰背相引痛不已則膀胱受之咳而遺溺
咳而不已三焦受之咳則腹滿不欲食治療之法宜
詳審其脈證若外感邪氣止當發散又須觀病者之
虛實用藥若內因七情而得者又當隨其部經與氣
口相應脈浮緊為虛寒沈數為實熱弦濇為少血洪

滑則多痰咳嗽之脈浮大者易治沈微者難愈大緊
以順氣為先下痰次之又有停飲而咳者又須消化
之切不可輕用罌粟殼等藥澁之又有寒邪未除者
亦不可便用補藥最忌憂思過度房室勞傷否則多
成瘵疾之證謹之謹之

痰氣

人身之痰如長流水貴乎順行又賴土為之堤防偶
為風所逆或為物所壅滯則使有聲可以過顙故痰
之為疾或由脾土虛弱不能攝養金肺或為四氣七
情所干氣壅痰聚發而為喘為咳又有水飲停滯胃

情所干氣壅痰聚發而為喘為咳又有水飲停滯胃
情所干氣壅痰聚發而為喘為咳又有水飲停滯胃
情所干氣壅痰聚發而為喘為咳又有水飲停滯胃

脾虛土生金
肺主聲
能通利氣滯
津液不行
痰生

俗語云
咳之為疾
不可不察
其源也

亦能致咳喜傷心者咳而喉中介介如腫狀不已則
小腸受之咳狀與氣俱失怒傷肝者咳而兩脇下痛
不已則膽受之嘔吐苦汁思傷脾者咳而右脇下痛
引至肩背不已則胃受之嘔吐痰沫憂傷肺者咳而
喘息有聲甚則唾血不已大腸受之咳則遺尿恐傷
腎者咳而腰背相引痛不已則膀胱受之咳而遺溺
咳而不已三焦受之咳則腹滿不欲食治療之法宜
詳審其脈證若外感邪氣止當發散又須觀病者之
虛實用藥若內因七情而得者又當隨其部經與氣
口相應脈浮緊為虛寒沈數為實熱弦濇為少血洪

滑則多痰咳嗽之脈浮大者易治沈微者難愈大緊
以順氣為先下痰次之又有停飲而咳者又須消化
之切不可輕用罌粟殼等藥澁之又有寒邪未除者
亦不可便用補藥最忌憂思過度房室勞傷否則多
成瘵疾之證謹之謹之

人身之痰如長流水貴乎順行又賴土為之堤防偶
為風所逆或為物所壅滯則使有聲可以過顙故痰
之為疾或由脾土虛弱不能攝養金肺或為四氣七
情所干氣壅痰聚發而為喘為咳又有水飲停滯胃
情所干氣壅痰聚發而為喘為咳又有水飲停滯胃
情所干氣壅痰聚發而為喘為咳又有水飲停滯胃

脾虛土生金
肺主聲
能通利氣滯
津液不行
痰生

俗語云
咳之為疾
不可不察
其源也

喘ノ諸病皆如夜方之喘
風寒暑濕ノ邪氣肺ヲ
ハメ脹滿メ喘スル情
ノ氣五藏ヲ傷リ鬱積
トシ生メ喘スルノ脈
トニ虚シ體弱ニシツテ
身ノ疾ヲ収メ養食ハス
喘スル者アリ。肺虚ノ
風邪肺ヲ傷リカキ
留リ外リ付テ喘スル者
○渾温腫滿シ水氣脈ニ
乘メ喘スル者アリ
○諸喘ハ熱タリ火熱ハ陽
スミ急シ事ヲ主ル火
動メ喘急ハ發ルナリ
息短クメアラキカハ喘
熱タルハ夏ノ熱也
治例風寒傷ハ必ス上
急ニメ子ヲス咽ノキ
アリ或ハ色出スハ三焦
神秘湯ヲ用スベシ喘
産後ニ下ストクメ熱
ニツキ衛ヲタリクメ獨
是シテ孤陽絶ト名ツク
○久シキ病ハ氣虚ノ喘
膠ノ類ノ新病氣實ノ喘
依テ腹脹滿メ喘聲家
外ニキコユ母臥スルコ
便澀リ氣急ノ脈ノ大ナル
食ノ熱トニヤブテ温熱
ノ火盛ニ赤テ肺ヲセムル
内經ニ曰ク肺ハ氣ノ逆
上スルヲ苦シム急ニ苦
シテ急ニ苦シテ急ニ

攝失宜或爲風寒暑濕邪氣相干則肺氣脹滿發而
爲喘呼吸坐卧促迫不安又有因七情之氣干於五
藏鬱而生痰或體弱之人脾腎俱虛不能攝養一身
之痰皆能令人發喘治療之法當究其源如感邪氣
則驅散之氣鬱則調順之脾腎虛者温理之又當於
各類而求凡此證脈滑而手足温者生脉瀋而四肢
寒者死數者亦死謂其形損故也此嚴氏之說故再
述于此喘ノ諸病皆如夜方之喘風寒暑濕ノ邪氣肺ヲハメ脹滿メ喘スル情ノ氣五藏ヲ傷リ鬱積トシ生メ喘スルノ脈トニ虚シ體弱ニシツテ身ノ疾ヲ収メ養食ハス喘スル者アリ。肺虚ノ風邪肺ヲ傷リカキ留リ外リ付テ喘スル者○渾温腫滿シ水氣脈ニ乘メ喘スル者アリ○諸喘ハ熱タリ火熱ハ陽スミ急シ事ヲ主ル火動メ喘急ハ發ルナリ息短クメアラキカハ喘熱タルハ夏ノ熱也治例風寒傷ハ必ス上急ニメ子ヲス咽ノキアリ或ハ色出スハ三焦神秘湯ヲ用スベシ喘産後ニ下ストクメ熱ニツキ衛ヲタリクメ獨是シテ孤陽絶ト名ツク○久シキ病ハ氣虚ノ喘膠ノ類ノ新病氣實ノ喘依テ腹脹滿メ喘聲家外ニキコユ母臥スルコ便澀リ氣急ノ脈ノ大ナル食ノ熱トニヤブテ温熱ノ火盛ニ赤テ肺ヲセムル内經ニ曰ク肺ハ氣ノ逆上スルヲ苦シム急ニ苦シテ急ニ
氣
氣ハ人身ノ精神ノ主也凡ソ精神ノ盛衰ハ氣ノ盈虚ニ由リテ示スルコトナリ氣ハ五臟六腑ノ主也凡ソ五臟六腑ノ運轉ハ氣ノ升降ニ由リテ示スルコトナリ氣ハ天地ノ主也凡ソ天地ノ運轉ハ氣ノ升降ニ由リテ示スルコトナリ氣ハ人身ノ精神ノ主也凡ソ精神ノ盛衰ハ氣ノ盈虚ニ由リテ示スルコトナリ氣ハ五臟六腑ノ主也凡ソ五臟六腑ノ運轉ハ氣ノ升降ニ由リテ示スルコトナリ氣ハ天地ノ主也凡ソ天地ノ運轉ハ氣ノ升降ニ由リテ示スルコトナリ
人稟天地陰陽之氣以生藉血肉以成其氣一氣周
人稟天地陰陽之氣以生藉血肉以成其氣一氣周

陳皮ハ苦温ニ體輕ク浮フ故ニ是
ノ若家ニテ實滿ヲス
流ス此ノニ味ヲ使トセリ
細末メ薑湯ヲ調下ス
服三テ病ハ半減スニ服テ
喘愈タリ只胸イキ熱
口乾ハ喘ハ咳ス如痰瀉白
散ニテ老愈タリ

流於其中以成其神形神俱備乃謂全體故婦人宜
耗其氣以調其經男子息養其氣以全其神惟氣得
援則行貴乎宜流調攝非宜致生多證故內因七情
而得之喜怒憂思悲恐驚者是也喜傷於心者其氣
散怒傷於肝者其氣擊憂傷於肺者其氣聚思傷於
脾者其氣結悲傷於心胞者其氣急恐傷於腎者其
氣怯驚傷於膽者其氣亂雖七證自殊無踰於氣又
有體虛者外爲風冷乘之入於腹中遂成諸疝發則
小腹疼痛或繞腸或逆搶心甚則手足厥冷自汗
嘔逆或大小便秘澀疝氣之證亦有七種厥疝癥疝

醫方大成論

或曰胃中溫陽之氣虛也
胃中冷熱時不能消化
入胃于下不能消化
或曰胃中溫陽之氣虛也
胃中冷熱時不能消化
入胃于下不能消化

證又當於各類求之略述此以為養生者之助

翻胃

附五噎五隔

翻胃之證其初也未有不由五噎五隔而始者五噎

五膈者喜怒不常憂勞役驚恐無時七情傷於脾

胃鬱而生痰痰與氣搏升而不降飲食不下蓋氣留

於咽嗝者為五噎結於胃膈者為五隔治瘵之法當

順氣化痰溫脾胃久而不治則氣體虛弱脾胃冷

絕致成翻胃食罷即反或一日二日而反至此亦甚

危矣非硃砂墜痰化積兼以剛劑暖胃不足以瘵此

證如水穀並不能下方便集中一方用丁香附子為

末於掌心舐喫亦一法也如跌陽脈緊而滿者為難

治之證又有下虛之人氣上控膈令人心下緊滿痞

急肌中苦痺緩急如刺不得俯仰名曰解痞其證類

乎五膈又當以嚴氏瓜蒌實丸治之臨證又宜詳審

諸虛之與勞極雖曰皆由體氣虛弱心腎有虧水火

不自外降而致此疾然各有所因不可不究諸虛

者或稟賦素弱又為寒暑勞役所傷或色慾過度俱

能戕賊真氣以致肌體羸瘦腰膝無力小便頻數大

便滑泄目眩耳聾遺精自汗甚則虛炎上攻面紅發

赤

赤

赤

赤

赤

赤

赤

赤

赤

藥劑相宜桂枝湯等
胃中冷熱時不能消化
入胃于下不能消化

胃中冷熱時不能消化
入胃于下不能消化

胃中冷熱時不能消化
入胃于下不能消化

胃中冷熱時不能消化
入胃于下不能消化

胃中冷熱時不能消化
入胃于下不能消化

胃中冷熱時不能消化
入胃于下不能消化

胃中冷熱時不能消化
入胃于下不能消化

胃中冷熱時不能消化
入胃于下不能消化

胃中冷熱時不能消化
入胃于下不能消化

胃中冷熱時不能消化
入胃于下不能消化

胃中冷熱時不能消化
入胃于下不能消化

胃中冷熱時不能消化
入胃于下不能消化

胃中冷熱時不能消化
入胃于下不能消化

胃中冷熱時不能消化
入胃于下不能消化

胃中冷熱時不能消化
入胃于下不能消化

胃中冷熱時不能消化
入胃于下不能消化

胃中冷熱時不能消化
入胃于下不能消化

喘此皆諸虛之證勞極者七情傷乎五藏也盡力謀慮勞傷乎肝應乎筋極曲運神機勞傷乎心應乎脉極意外過思勞傷乎脾應乎肉極預事而憂勞傷乎肺應乎氣極矜持志節勞傷乎腎應乎骨極此五勞應乎五極者也勞極精氣變生諸證其脉多弦治療之法虛者補煖之勞極者溫而精而安其五藏又隨其冷熱調之故素問云形不足者溫之以氣精不足者補之以味凡滋補之藥當用平和不可驟用峻補緣腎水枯竭不足以當之又恐愈甚上炎之患慎之慎之

癆瘵

十九 癆瘵之證非止一端其始也未有因氣體虛弱勞傷心腎而得之又外感風寒暑濕之氣先為瘧疾以致咳嗽寒邪入裏失於調治又不能保養過於房勞傷於飲食久而成癆瘵之候其為證者冷入肌肉羸瘦皮毛乾枯寒熱盜汗遺洩白濁或腹中有塊或腦後兩邊有小結核或聚或散或咳嗽痰涎或咳唾膿血及傳變則為二十四種或三十六種或九十九種又有所謂五尸者曰蜚尸遺尸寒尸喪尸尸注者是也其名形雖不同傳變雖不一其實所傷不過五

癆瘵之證非止一端其始也未有因氣體虛弱勞傷心腎而得之又外感風寒暑濕之氣先為瘧疾以致咳嗽寒邪入裏失於調治又不能保養過於房勞傷於飲食久而成癆瘵之候其為證者冷入肌肉羸瘦皮毛乾枯寒熱盜汗遺洩白濁或腹中有塊或腦後兩邊有小結核或聚或散或咳嗽痰涎或咳唾膿血及傳變則為二十四種或三十六種或九十九種又有所謂五尸者曰蜚尸遺尸寒尸喪尸尸注者是也其名形雖不同傳變雖不一其實所傷不過五

藏故傳於肝者面白目枯口苦自汗心煩驚怖傳於
心者面黑鼻乾口瘡喜忘大便或秘或洩傳於脾者
面青唇黃舌強喉哽吐涎體瘦飲食無味傳於肺者
面赤鼻白痰吐咯血喘咳毛枯傳於腎者面黃耳枯
胃滿肝痛白濁遺瀝又有二十四種勞蒸者亦可以
因證驗之蒸在心也少氣煩悶舌必焦黑蒸在小腸
也腹內雷鳴大腸或秘或洩蒸在肝也目昏眩暈躁
怒無時蒸在膽也耳聾口苦脇下堅痛蒸在腎也耳
輪焦枯腰脚酸痛蒸在右腎也情意不定洩精白絮
蒸在肺也喘嗽咯血聲音嘶遠蒸在大腸也右鼻乾

疼大腸隱痛蒸在脾也唇口乾燥腹脇脹滿畏寒不
食蒸在胃也鼻口乾燥腹脹自汗睡卧不寧蒸在膀
胱也小便黃赤疑濁如膏蒸在三焦也或寒或熱中
腕腫中時覺煩悶蒸在膈也心胃噎塞疼痛不舒蒸
在宗筋也筋脉縱緩小腹隱痛陰器自強蒸在回腸
也肛門秘澁傳道之時裏急後重蒸在玉房也男子
遺精女子白淫蒸在腦也眼眵頭眩口吐濁涎蒸在
皮也肌膚鱗起毛折髮焦蒸在骨也版齒黑燥大杼
酸痛蒸在髓也肩背疼倦脇骨酸痛蒸在筋也眼昏
脇痛瓜甲焦枯蒸在脉也心煩體熱痛刺如針蒸在

發夕死夕發且死非藥物之可療今之體氣虛弱者
或為風寒之氣所侵邪正相搏伏而不散發為偏正
頭疼其脉多浮緊又有胃膈停痰厥而頭痛蓋厥者
逆也逆壅而衝於頭也痰飲之脉時伏時見亦固有
腎虛而氣厥并新沐之後當風露卧皆能令人頭痛
治之當詳其所因風邪則驅散之痰聚則溫利之腎
虛則補暖之尋常感冒頭痛發熱又宜隨證治之

心痛

心為五臟之主一身之所聽命也宜處安靜不可使
有所傷傷之則痛若痛甚手足青過節者是名真心

心痛之類有三運神痛又
真心痛神痛神痛神痛
一身主人公心此三痛
痛人痛主若主下云是
邪心三在云心外脈絡
コト有上難云真心中邪
コト不若或ハ真心痛
痛神真心痛ト云痛中
ニ在テカヲ以テサケカ
如スルト且タニ在リ
其邪直ニ心ヲ攻傷ル
故也厥心痛真心痛ノ
義モホク厥痛名ニ問
答アリ

痛且發夕死夕發且死非藥物之所能療脉經云脉
浮大弦長者死沈細者生凡心痛之病醫經所載其
種有九一曰蟲痛二曰疰痛三曰風痛四曰悸痛五
曰食痛六曰飲痛七曰寒痛八曰熱痛九曰來去痛
名雖不同其實皆由外感邪氣內傷生冷結聚痰飲
停於心胞傷於經絡重則心膈引痛輕則怔忡而已
蓋心乃藏血之府憂思勞役太過耗散真血心帝失
輔亦能令人怔忡以致膽氣虛怯變生驚悸或因事
聞聲卒然戰怯又夢寢之中忽墮層崖精神恍惚如
有所見治法宜詳其所因若內外之氣相搏則宜

トニツテ

散邪氣溫利痰飲心血有所虧損又當補益其勞血寧其心志壯其膽氣如此調之病無不愈矣

眩暈

眩暈之證發於卒然之間眼目昏花如屋旋轉起則眩倒雖經云諸眩掉皆屬於肝肝風上攻而致眩暈然體虛之人或外為風寒暑濕之氣所干內為七情之氣所結鬱而生涎皆能令人一時眩暈目暗口噤頭痛項強臨病之際宜詳以脈證辨之風則脈浮而有汗寒則脈緊而掣痛暑則脈虛而煩悶濕則脈細而重著加以吐逆如氣鬱生涎而暈者多令人眉稜

而重著加以吐逆如氣鬱生涎而暈者多令人眉稜

角痛眼不可開寸脈多沈有此為異至若疲勞過度上盛下虛金瘡吐衄便利去血過多及婦人崩傷皆能眩暈各隨所因施以治法

腰脇痛

此四者皆由腎氣不足也... 夫腎受病則腰帶而痛故經云腰乃腎之府轉搖不能將憊矣要知腰痛之疾所感不一有因風寒暑濕傷干腎經發為腰痛者又有墜墮險地閃腰脇氣血凝滯而痛者其為痛也或引於項脊傍及兩脇不可倏仰或腰下如有橫木如坐水中多令人面目

夫腎受病則腰帶而痛故經云腰乃腎之府轉搖不能將憊矣要知腰痛之疾所感不一有因風寒暑濕傷干腎經發為腰痛者又有墜墮險地閃腰脇氣血凝滯而痛者其為痛也或引於項脊傍及兩脇不可倏仰或腰下如有橫木如坐水中多令人面目

如坐水中... 腰脇痛... 腎氣不足... 治法...

鰲黑腹脇脹滿大抵腰痛之脈皆沈弦又須明沈弦

四節ハ腰節ニツクニ故ニ腰月
積豆備心ニ血耗散ニ精血
不足ノ腰節ノ筋脈ヲ養
コト不能ガ故ニ筋脈ヲ養
痛ヲ致ス者有リ

而緊者為寒沈弦而浮者為風沈弦而濡細者為濕
沈弦而實者為凝滯各推其所因感邪氣者驅散之
凝滯者順其氣而調其血如此治之病無不愈又有
腎經虛憊心血耗散不能養其筋脈以致腰痛又當
補其心腎筋骨自壯矣此論中脚氣ノ重キ者トノ論スルヲ見ニ此等ノ脈症ニハ辨ニ難シ見ル者コレヲ見テ其ノ脈症トシテ

脚氣

此五脚氣ノ症ハ虛實寒熱ノ不同アリト雖多ハ足ノ大陽及ノ陽脈ノ濕熱ニ屬ス蓋脚氣ニ屬ス者皆
此論中脚氣ノ重キ者トノ論スルヲ見ニ此等ノ脈症ニハ辨ニ難シ見ル者コレヲ見テ其ノ脈症トシテ

脚氣之疾雖惚之曰氣而古今證治實為多端故千
金論脚氣皆由感風毒所致又經云地之風寒暑濕
皆作蒸氣足常履之遂成脚氣古來無脚氣之說黃
帝時名為厥兩漢之間名為緩風宋齊之後始謂之

脚氣其名雖不同其實一也今之所感未有不由脾
腎兩經虛弱坐卧行動之間為風寒暑濕之氣所干
流注而成此疾得病之始多不令人便覺會因他病
乃始發動或奄然大悶經三二日方乃覺之先從脚
起或緩弱痺痛行起忽倒或兩脛腫滿足膝枯細或
心中忪悸小腹不仁大小便秘澁或舉體轉筋骨節
酸疼或惡聞食氣見食吐逆或胃滿氣急壯熱憎寒
其為候也不一治之須詳審乃可否則誤以為他疾
治之若入腹攻心鮮不致危矣大抵脚氣之證發於
外者大同而小異必須以脈辨其風寒暑濕然後施

以治法若寒氣中三陽經者患處必冷暑中三陰經者患處必熱又以其脈浮而弦者起於風濡而弱者起於濕洪而數者起於熱遲而濇者起於寒風者汗而愈濕者溫而愈熱者下而愈寒者慰而愈又當順四時調理不可拘一春夏疾盛者宜汗利之秋冬以後又須量人氣體虛實微加滋補防其遇寒暄再作此皆嚴氏詳論及此又如無汗走注為風勝攣急掣痛為寒勝腫滿重著為濕勝煩渴熱頑為暑勝四氣兼中者但推其多者為勝分其表裏施以治法亦三因至當之說古人得脚氣之初多用針灸最忌用熱

藥蒸泡恐逼邪氣入于經絡為難治也今之治脚氣者有一方偶合於所患之證服之得愈便以為秘方其後遇病更不審其脈證所因又服以前藥藥證既殊非徒不能愈病適足以重病戒之戒之

五痺

廿六痺內經論詳也後世謂白虎歷節痛風トハ是ナリ痺ハ閉也風寒濕ノ三邪交リ合セテ經絡血氣ヲ閉ルガ故ニ痛ヲ致ス痺症ニ五種アリテ筋痛内ニ見ヘリ然レテ後世ニハ痺ヲ以テ筋痛トス經骨ト異也今此ノ論ハ痺ヲ以テ筋痛トス雖死意ハ從フニシテ筋痛トス

凡痺疾自有五種筋痺脈痺骨痺皮痺肌痺是也多由體虛之人腠理空疎為風寒濕三氣所侵不能隨時驅散流注經絡久而為痺其為病也寒多則掣痛風多則引注濕多則重著其病在筋者則屈而不能伸應乎肝其證夜卧多驚飲食少小便數其病在脉

者則血凝而不流應乎心其證令人痿黃心下鼓氣卒然逆喘不通噎乾善噫其病在骨者則重而不能舉應乎腎其證手足不遂而多痛心腹脹滿其病在皮者多寒遇寒則急逢熱則縱應乎肺其證皮膚無所知覺氣奔喘滿其病在肌肉者多不仁應乎脾其證四肢懈怠發咳嘔吐診其脉大而濇或來急而緊俱為痺之脉也治之當辨其所感風寒濕三氣注于何部分其表裏須從偏勝者主以藥餌又有停畜支飲亦令人痺又當隨證治之至如白虎歷節遍身痛者無非風寒濕三氣乘之巢氏云飲酒多當風汗出

入水遂成斯疾久而不愈令人骨節蹉跌恐為癩癩之病如有此證治之宜早為貴

五疸

此疸黃病也一身黃色二成云黃疸也疸五種アリ故五疸ト云黃疸ノ病ハ中焦ノ濕熱ニ生テ腎ハ癭ノ如シ五穀ヲ聚テ故蓋シ濕熱然則ノ其黃色ニ成ト同ニ故小便ヲ利スルヲ以テ治法ノ要トス

黃疸之疾諸書所載其證雖繁究其方治不過五疸一曰黃汗二曰黃疸三曰穀疸四曰酒疸五曰女勞疸是也黃汗之證身體俱腫汗出不渴狀如風水汗出染衣黃如藥汁此由脾胃有熱喜自汗汗出入水中洗浴故汗秘熱結其汗黃也黃疸之證食已即飢遍身皮膚及爪甲面自小便俱黃卧時身體又帶赤帶青者必發寒熱此由酒食過度藏府熱極水穀相

併積於脾胃復為風濕所搏結滯不散熱氣薰蒸所致若發於陰部其人必嘔發於陽部必振寒而後熱穀道之證食畢即頭眩心中怫鬱不安而遍體發黃此由脾胃有熱大飢過為飲食所傷胃氣衝蒸所致也酒疽之證身自發黃心中懊痛足脛滿小便黃面發赤斑此由飢中飲酒大醉當風入水所致女勞疽者其證身自皆黃發熱惡寒小腹滿急小便不利此由過於勞傷又於極熱之中房事之後入水所致如多渴而腹脹者難治大槩五種之病多是脾胃經有熱而後發黃治法各當究其所因分利為先解毒次

之又有時氣傷寒傷風伏暑解散未盡亦令人發黃如疽狀口淡怔忡耳鳴脚弱微寒微熱小便白濁又當作虛證治之不可妄投涼藥愈傷血氣臨病之際辨之可也

蠱毒

凡八人三毒ヲ用テ殺ラ云俗ニ云毒蠱也易ク全蠱ト云老女感小男ト云ノ義ト同ク人ヲ感シタラハト云ト云云此論ハ解毒ノ法ヲ述ル也毒ヲ制スルノ論ニハ非レナリ

蠱之為毒醫書所載雖有數種而中土少見之今古相傳多是閩廣深山之人於端午日以蛇虺蜈蚣蟻蟻三物同器貯之聽其互相食啖候一物獨存者則謂之蠱欲害其人密取其毒於酒食中啖之若中其毒者令入心腹絞痛如有蠱咬吐下血皆如爛肉若

蠱ト云毒蠱也易ク全蠱ト云老女感小男ト云ノ義ト同ク人ヲ感シタラハト云ト云云此論ハ解毒ノ法ヲ述ル也毒ヲ制スルノ論ニハ非レナリ

其人ノ三ノ様ニ寄石ノ毒ヲ取テ酒食ノ中ニ雜入テ彼ノ毒ヲ入ルニ吸ハシム

如爛肉ノ毒ヲ毒物ニテ糞ノ毒ヲ腹中ニ毒物ニテ腹内ヲ咬傷ガ如ク云見テ口ニ血ヲ吐キ二便ニ血ヲ下ス其ノ下ノ物皆爛レル其ノ如シ此ノ其毒毒腹中入テ毒ヲ生ズト生ズ毒府ヲ破力故ナリ

有緩有急石ノ毒物ノ一有急トモナリ有緩トモナリ亦成毒法注テ死スル其ノ毒氣ヲカクハラテ親類等ニ流注シ傳テテ毒人中毒テ死スル其ノ毒氣ヲカクハラテ親類等ニ流注シ傳テテ毒人中毒テ死スル

皮膚ノ毒ヲ治スル必以須審而後行試而後可也蓋症ニ能ク似タル者アリ故ニ必以須審而後行試而後可也蓋症ニ能ク似タル者アリ

不即治食人五臟即死然此毒中入有緩有急者十數日便死緩者待以歲月氣力羸敗食盡五臟而後死死則其毒流注於傍人亦成蠱注太抵試驗蠱毒之法令病人咳唾水中沈者是毒浮者非也或含一大豆其豆服皮脫者蠱也豆不服皮不脫者又非也又以鵝皮至病人脚卜勿令知覺病甚者是也否則非也治療之法必須審而後行試而後可今人凡有積聚脹滿之病類乎蠱者便以為蠱尤為非也世說閩廣深山之人專有以蠱行毒於人者若欲知其姓名以敗鼓皮燒灰米飲服方寸匕須臾自呼蠱家

性各令已上二十一字呼喚將去其病自愈又一說病者善能知元中毒於何物之中終身不服此物其毒亦不復作雖相傳如此俱未之見謹用載之以備搜覽

淋閉之疾其證有五氣石血膏勞是也氣淋為病小便澀常有餘瀝石淋為病莖中痛尿不得卒出膏淋為病尿似膏出勞淋為病勞倦即發痛引氣衝血淋為病遇熱即發甚則溺血候其鼻頭色黃者小便難也大槩此證多由心腎不交積蘊熱毒或酒後房勞

諸淋 廿九 淋病也淋病二數品アリ故三諸淋也淋疾ノ病因モ亦數種アリト雖元大依之氣滯極熱

腹滿ノ腹脹痛ヲ蠱病ニ類似スル者アリト便ナリト蠱病ト云テ治スル者アリト此を非ナリト又腹脹痛ト云テ治スル者アリト此を非ナリト

以備搜覽 傳言ト難托ノ孫也賢ト都ノ者ナシハ遂ニ蠱毒ヲ見タルトナリト此ニ謹テ世説ヲ用テ此ニ書キ載テ若シ如ク病ニアラ後人ノカクトテ考ヘ覽ニ備フルノミト云

腹滿ノ腹脹痛ヲ蠱病ニ類似スル者アリト便ナリト蠱病ト云テ治スル者アリト此を非ナリト又腹脹痛ト云テ治スル者アリト此を非ナリト

腹滿ノ腹脹痛ヲ蠱病ニ類似スル者アリト便ナリト蠱病ト云テ治スル者アリト此を非ナリト又腹脹痛ト云テ治スル者アリト此を非ナリト

腹滿ノ腹脹痛ヲ蠱病ニ類似スル者アリト便ナリト蠱病ト云テ治スル者アリト此を非ナリト又腹脹痛ト云テ治スル者アリト此を非ナリト

人之五藏六府俱各有精然腎為藏精之府而聽命於心貴於水火升降精氣內持若調攝失宜思慮不節嗜慾過度水火不交精元失守由是而為赤白濁之患赤濁者心虛有熱多因思慮而得之白濁者腎虛有寒過於嗜慾而得之其狀漩面如油光移不定漩脚澄下凝如膏糊治法當以赤白究其病源心虛者當清心調氣腎寒者溫補下元仍須清上使水火既濟陰陽叶和精氣自固矣凡思慮過度不特傷心亦能病脾脾生虛熱而腎不足故土邪干水亦能令入便下渾濁史載之云夏則土燥而水濁冬則土堅

而水清腎多峻補其疾愈甚只宜以平和之藥療之水火既濟脾土自堅其流清矣

水腫

世水腫之症八周身面目手足皆腫言皮膚裏二水ヲ聚ガ如ニ似タリチヲ以テ其ノ腫ヲ按ハ指ニ從テ四ニ指入指ヲ與レバチニ從テ傷腫起ル者ハ直ノ水腫也又浮腫メ水腫ノ如ク難危チヲ以テ按ハ入リチヲ與レバ指處ノ腫ニ指ニ從テ起ル者ハ直ノ水腫ニ非ズ寒ニ從テ起ル者ハ直ノ水腫ニ非ズ

岐伯所謂水腫有膚脹鼓脹腸覃石瘕者是也名雖不一皆聚水所致故人身之脾屬土五行論之雖曰剋制腎水然非土則又不能防其泛濫水腫之疾究其所因皆由脾土有虧不能防制以到腎水浸漬脾土凝而不流遂成此疾其為證也發見之初裹裏微腫有若卧蠶纒起之狀微而至大以手按之則隨手而起如裹水其內上則喘急咳嗽下則足膝胫腫面

上下腫ヨリ始テ下腫ニ至テ也風水ハ上腫ヨリ始テ上腫ニ至テリ又腫脹ノ水腫ト脹滿ト相兼者脹滿ハ腹ノ三脹大ニシテ手足ハ不腫チ足腫レテ腹モ亦脹者腫脹チ多ハ腫脹相兼チ病公也

脇腰痛連上下或頭痛嘔逆胃滿不食大小便為之不利其脉浮者易治脉虛小者為難至如積聚之證亦由膨脹而始又當以脉證辨之從五積治法更有水疽水氣脚氣及婦人血膨皆能令人脹滿又當各以類求之

積聚

五積六聚也積聚ノ詳義ハ内經ノ五癭篇上膈篇邪氣藏之府病形篇二見ハタリ
冊四亦難經ノ五十五難五十六難二見タリ
此論モ多クハ難經ヲ主トメ論スル積ハ五藏ニ屬ス聚ハ六府ニ屬ス藏ハ陰也府ハ陽也陰ハ不動陽ハ動也故五積ハ其ノ塊ノ所ヲ定メテ不移六聚ハ塊ノ所ヲ定メテ移リ耶ト詳義ハ論中ニ見ハタリ

五積六聚者五藏六府之有所積聚其為病也諸書所載皆以內為喜怒憂思七情之氣尅制五藏結而不散乃成積聚之證故憂傷肺者以所勝傳之肝遇夏則脾土旺傳尅不行故成肝積名曰肥氣其狀在

左脇下大如覆杯似有頭足診其脉弦而細其色青兩脇下痛引小腹男子為積疝女子為瘕聚矢志傷腎者以所勝傳心遇秋則金肺旺傳尅不行故成心積名曰伏梁其狀起於臍上天如臂循梁之橫架於胃膈間診其脉沈細而芤也其色赤腹熱心煩面赤咽乾令人食少羸瘦甚則吐血怒傷肝者以所勝傳脾遇冬則腎水旺傳尅不行故成脾積名曰痞氣其狀見於胃脘大如覆杯痞塞不通診其脉浮大而長其色黃遇飢則減遇飽則見腹常滿而足腫兼以嘔泄久則肉削令人四肢不收喜傷心者以所勝傳肺

遇春則肝木旺傳尅不行故成肺積名曰息賁其狀覆在右脇下大如杯樣喘息奔溢診其脉浮而毛其色白氣逆背痛目喜閉而膚寒皮中時痛如刺或如風緣思傷脾者以所勝傳腎遇夏則心火旺傳尅不行故成腎積名曰奔豚其狀發於小腹或湊心上下無時有若奔豚之狀診其脉沈而急其色黑飢則見飽則減小腹裏急腰痛骨冷眼昏口乾久則令人骨痿少氣到如六聚之在六府其痛上下亦無常處在上則格在下則脹旁攻兩脇如有坏塊易於轉動此其與五積爲異耳雖曰氣之積聚而成此證余付

度之必是因氣結聚痰飲或積聚之物而後能堅硬如此發萌之初早能辨其脉證投以藥餌或以導引之法尤云庶幾若其見形於皮膚之下藥入腸胃熏蒸之所不及誠爲難治之證凡積聚之脉實弦者生沈小者死

宿食

卅五

宿止也住也食物ノ胃中ニ宿止メ不消ラズ也食滯ナリ

人之有身藉五穀以生故胃以納之脾以尅化之脾胃喜暖不宜以生冷傷之體虛者不善調養飢飽失時或過飡飲食并一切生冷之物脾胃怯弱不能尅化停畜胃脘遂成宿滯輕則吞酸嘔惡胃滿噎噫或

付

泄或利其臭如抱壤雞子或米穀不化甚則積聚結而為癥瘕之病治之須究其源又須量人之氣體虛實病證淺深投以藥餌病之淺者則消化之甚者必須推利而後調補脾胃或有因挾寒暑之氣而泄者又當以脈證辨而料理

自汗

自汗自然出汗云或曰汗之動也或曰汗之出也非自汗之出也事見卅六卷自然二出也此者謂之自汗人身之腠理不固者汗氣也即謂之自汗云此汗能令衛氣不足也肺小皮膚薄者汗多也

心之所藏在内者為血發於外者為汗蓋汗乃心之液而自汗之證未有不由心腎俱虛而得之者故陰虛陽必溼發熱而自汗陽虛陰必乘發厥而自汗此固陰陽偏勝所致又有傷風中暑病濕兼以驚怖房

室勞極麻節腸癰痰飲產辱等病亦能令人自汗如睡中不覺汗出者是名盜汗亦心虛所致其脈多微而濡濡而虛治之宜斂心氣溢腎水使陰陽調和水火升降其汗自止自汗之證若兼以他病又當各類求之

虛煩

虛煩者相火之動也三焦中煩熱不安是以臥起俱躁躁者不安也口乾舌燥身不覺熱此謂之虛煩也初症二類似多病後之餘熱二生

虛煩之疾非止一端究其大槩多是體虛者攝養有乖榮衛不調使陰陽二氣有所偏勝或陰虛而陽盛或陰盛而陽虛素問云陽虛則外寒陰虛則內熱陽盛則外熱陰盛則內寒此固不易之論而今虛煩之

寒則肛門脫出此三因之論又有婦人產育用力過多及小兒久痢後臟寒皆能使肛門突出治之必須溫肺藏補腸胃久則自能收矣

遺尿失禁

四十七 遺尿失禁之出也其出也禁制之止也其出也禁制之止也其出也禁制之止也其出也禁制之止也

人之漩尿藉心腎二氣之所傳送蓋心與小腸為表裏腎與膀胱為表裏若心腎氣虧陽氣衰冷傳送失度則必有遺尿失禁之患故經云膀胱不利為癃不約為遺是也治之宜補煖下元清心寡欲又有產辱不順致傷膀胱及小兒胞冷俱能令人遺尿失禁又當隨證施治

咽喉

附重舌

咽喉者為一身之總要與胃相接呼吸之所從出若胃膈之間蘊積熱毒致生風痰壅滯不散發而為咽喉之病喉内生瘡或狀如肉鬻為腫為痛室塞不通吐熱不下甚則生出重舌治之尤宜先去風痰以通咽喉然後解其熱毒遲則有不救之患又有熱毒衝于上腭而生瘡謂之懸癰及肺寒亦能令人咽閉吞吐不利臨病須詳審其證施以治法

咽喉者為一身之總要與胃相接呼吸之所從出若胃膈之間蘊積熱毒致生風痰壅滯不散發而為咽喉之病喉内生瘡或狀如肉鬻為腫為痛室塞不通吐熱不下甚則生出重舌治之尤宜先去風痰以通咽喉然後解其熱毒遲則有不救之患又有熱毒衝于上腭而生瘡謂之懸癰及肺寒亦能令人咽閉吞吐不利臨病須詳審其證施以治法

眼目

四十九 眼目總稱目也俗云二目也詳義論中三アリト雖元龍本論ヲ以テ五輪八廓ヲ辨ズルカ

人之有兩眼猶天之有兩曜視萬物察纖毫何所不

齒牙
同

至日月有一時之晦者風雲雷雨之所致也眼之失
明者四氣七情之爲害也大抵眼目爲五藏之精華
一身之至要故五藏分五輪八卦分八廓五輪者肝
屬木曰風輪在眼爲烏睛心屬火曰血輪在眼爲二
眦脾屬土曰肉輪在眼爲上下胞肺屬金曰氣輪在
眼爲白睛腎屬水曰水輪在眼爲瞳子至若八廓無
位有名膽之府爲天廓膀胱之府爲地廓命門之府
爲水廓小腸之府爲火廓腎之府爲風廓脾胃之府
爲雷廓大腸之府爲山廓三焦之府爲澤廓此雖爲
眼目之本根而又藉血爲之包絡五藏或蘊積風熱

或有七情之氣鬱結不散上攻眼目各隨五藏所屬
而見或腫而痛羞澁多淚或生障膜昏暗失明其證
七十有二治之須究其所因風則驅散之熱則清涼
之氣結則調順之切不可輕用針刀點割偶得其愈
出乎倖償或不然爲終身之害又且不可過用涼
劑恐冰其血脉凝而不流亦成痼疾當量入老少氣
體虛實用藥又有腎虛者亦能令人眼目無光或生
冷翳止當補煖下元溢其腎水北方之人患眼最多
皆是日冒風沙夜卧熱坑二氣交蒸使殊浴之多用
涼藥北方稟受與南方不同故也疹豆之後毒氣鬱

於心肝二經不能自已發於眼目傷于瞳人者素無治法

耳

五十大位耳ノ腎ノ主ト雖ニ七竅配合ニテ所主ニ不同也七竅ノ小ハ眼耳ノ所主ニ腎ノ主トス九竅ノ大ハ口鼻ノ所主ニ心ノ主トス然則耳ハ心腎二氣ノ主トス故ニ耳疾ハ心病ノ者アリ耳病ノ者アリ

夫耳者腎之所候腎者精之所藏腎氣實則精氣上通聞五音而聽矣若疲勞過度精氣先虛於是乎風寒暑濕得以外入喜怒憂思得以內傷遂致聾聵耳鳴熱壅加之出血出膿則成貯耳底耳之患候其額頰色黑者知其耳聾也亦有手少陽之脉動厥而聾者耳內輝輝焯焯也手太陽脉動厥而聾者耳內氣滿也大抵氣厥耳聾尚易治精脫耳聾不易愈諸證

既殊治各有法

鼻

五十一 鼻ハ肺ノ竅ニテ香臭ノ通スル所也故ニ鼻病ハ肺ニ屬スル者多存ス

夫鼻者肺之候職欲常和和則吸引香臭若七情內鬱六淫外傷飲食勞役致鼻氣不得宣調清道壅塞其為病如為衄為癰為息肉為瘡瘍為清涕為窒塞不通為濁膿或不聞香臭此皆肺藏不調邪氣鬱積於鼻清道壅塞而然也治之之法寒則溫之熱則清之塞則通之壅則散之無越於斯但時氣鼻衄不可遏止如出三升已上恐多者方可斷之活人書所謂衄血者乃解蓋陽氣重故也此又不可不知

口唇

五十一 此口唇諸疾論議之九口中焦脾胃ノ氣ノ通スル所也唇ハ肌肉ノ本ニ此モ亦脾胃ノ氣ニ屬ス故ニ口唇ノ病ハ多ク脾胃ニ生スル者也

夫口者足太陰之經脾之所主五味之所入也蓋味入口藏于胃脾乃運化津液以養五藏五藏之氣偏勝由是諸疾生焉且鹹則為寒酸則停滯澁則因燥淡則由虛熱則從苦從甘也口臭者乃府藏燥腐之不同蘊積於胃膈之間而生熱衝發於口也口瘡者脾氣凝滯風熱之而然至於唇者亦脾所主經合於脾胃胃受邪則唇為之病蓋風勝則唇動寒勝則唇揭脾勝則唇乾熱勝則唇裂氣鬱則生瘡血少則藩濟生方而無色治法內則當理其脾外則當敷以藥作藩

無不效矣

牙齒

五十二 牙ハ鼻ノ上下ニ生スル者也齒ハ前ノ上下ニ並ニ生スル者也コレニ牙齒ノ所主經藏所生スルノ病ヲ詳論セリ

齒乃腎之餘氣骨乃腎之所主呼吸之戶門也精氣強則齒自堅腎氣衰則齒自豁且手陽明大腸之脈入於齒灌注於牙倘風寒壅熱之氣鬱滯心胃衝發於口則齒為之病矣輕則宣露斷頭浮腫甚則為疔鑿齲脫之證也亦有腎氣虛壅齒痛宜露當以補腎藥以治之

舌

五十三 舌ハ心氣ノ所通也且脾腎ノ兩經及肝筋ノ所繫也故ニ舌病ノ所屬モ數品アリ一途ニ取テ不能也然レ心脾ノ兩藏ニ屬スル病ニ多ク存ス

經曰心氣通乎舌舌和則知五味矣蓋舌者脾脉之

外眼耳鼻口之病也
時內於其因之來所ハ
有之所致ノ病證多ク
ヲ辨メ其ノ治療スルニ
ヲ所因證治ト云也假令
外鼻ニ病アル者ハ内ハ肺ニ
所因ノ病證多クヲ知
スルノ類ナリ此蓋ニ眼耳
鼻舌口ノミラズ一切ノ形體
各内ニ所生ノ根本アル處
具ナラズ求メテ技藝ヲ治
療スベキヲ示ス者也

所通心氣之所主和則知味資於脾而榮於身者也
二藏不和風寒中之則舌強而不能言壅熱攻之則
舌腫而不得語更有重舌木舌舌胎出血等證皆由
心脾虛風熱所乘而然矣

五藏内外所因證治

五五 凡五藏之内三在者必其氣之外三發之其所
外舌三通三四三脾アハ其ノ氣ハ外ハ鼻三通三四三心アハ其ノ氣ハ
通三四三肝アハ其ノ氣ハ口三通三四三肝アハ其ノ氣ハ外ハ眼三

人身之有形於外者必有諸内故五藏之受病於内
而發於外者必見之眼耳鼻舌口牙之間心經蘊熱
則口舌生瘡唇口裂并脾與胃相通故受熱則噎氣
臭穢腎受冷則耳不能聽或兼風則牙痛頰腫肺受
風邪則皮毛瘙痒積毒則發為癰疽肝受病則目不

能視髮乃血之餘焦枯者血不足也此皆病在内而
應乎外也凡有其證必須考其所自來辨其冷熱虛
實治之

癰疽瘡癤

癰疽 癰疽者九卷癰疽篇ニ詳論アリ癰ハ癰也血氣皮膚ニ凝
五五 癰疽者九卷癰疽篇ニ詳論アリ癰ハ癰也血氣皮膚ニ凝
五五 癰疽者九卷癰疽篇ニ詳論アリ癰ハ癰也血氣皮膚ニ凝

凡瘡之痛痒自屬虛實寒熱故痛而實者為熱虛痒
者為寒經云諸瘡痛癢皆生於心以心主血而行氣
氣血凝滯而為癰疽瘡癤闊大一寸以上曰癰疽一
寸以下曰瘡癤諸瘡之中惟背疽疔瘡最為急證其
初發也使身體或先熱而後惡寒或先癢而後痛若
其不痛最為惡證且如背疽始生如黍粟粒大纔有

諸瘡癰疽熱火ノ留滯
寒アルトモ七七七七七七
口瘡大ニノ瘡ト云也
府ヲ損傷スニ至ラズ瘡癤
口ハ廣大シテ瘡ト雖正屬入
ヲ深ク前骨藏府ヲ蓋損
傷メ血ヲ破ル者多ク存ス瘡
癰疽初ノ總名也瘡癤外科
集驗方曰瘡癤其總名瘡
ハ有頭小瘡也ト和倍ノ所論
子ト云ハカミラハ此ノ瘡癤
諸瘡癰疽瘡癤若我ヲ詳論
スルガ故ニ癰疽瘡癤ト云

理心血祛散風熱外則敷洗理無不愈

瘰癧

瘰癧之病即九漏是也古方所載名狀大槩不一

難_レ以詳述及其生也_{スレ}多結於項腋之間累累大小無定發作寒熱膿水潰漏其根在藏府蓋肝主狼漏胃主鼠漏大腸主蝮蛇漏脾主蜂漏肺主蚘蟬漏心主蟻蠓漏膽主浮蛆漏腎主瘰癧漏小腸主轉脉漏原其所因多因寒暑不調或由飲食乖節遂致血氣壅結而成也巢氏所載決其生死反其目以視之其中有赤脉從上下貫瞳子見一脉一歲死見一脉半一

瘰癧之病即九漏是也古方所載名狀大槩不一

歲半死見二脉二歲死見三脉半三歲死見四脉三因云有是說驗之少有是證理宜然

折傷

五十九

一初外ヨリ損ヒ傷レタル打身クギ金上捨湯火之瘡等ヲ論セリ折傷ハ外ヨリ傷ラル、總稱ナリ

折傷者謂其有所傷於身體者也或為刀斧所刃或墜墮險地打撲身體皆能使血出不止又恐瘀血停積于藏府結而不散去之不早恐有入腹攻心之患治療之法須外用敷貼之藥散其血止其痛內則用花葉石散之類化利瘀血然後款款調理生肌或因折傷而停鬱其氣又當順之或因湯火所傷并具一

二方以備搜討

急救諸方

卒

或自縊或凍死或水溺死スル所ノ急
症ヲ救法ヘキ諸ノ上方法ヲ舉論スルナリ

救自縊法凡自縊高懸者徐徐抱住解繩不得截斷
上下安被卧之以一人用脚踏其兩肩手挽其髮常
令弦急勿使縱緩一人以手擦按背上數上數摩動
之一人摩捋臂脛屈伸之若已強直但漸屈之先按
其腹如此一時頃雖得氣從口出呼吸眼開仍引按
不住須臾以少杜湯或清粥灌令喉潤漸漸能嚥乃
止更令兩人以管吹其兩耳此法最好無不活者自
且至昏雖冷亦可救暮至且陰氣盛為難又法緊用

兩手掩其口勿令透氣兩時氣急則活

經驗方救凍死法四肢直口噤只有微氣者用大

釜炒灰令煖以囊盛熨心上冷即換之自開氣出然

後以粥清稍稍進之若不溫其心便將火灸則冷氣

與火爭必死孫真人救落水死急解去死人衣帶艾

灸臍中即活

經驗方救溺水法凡人溺水者救上岸即將牛一

頭却令溺水之人將肚橫覆在牛背上兩邊用人扶

策徐徐牽牛而行以出腹內之水如醒即以蘇合香

圓之類或老薑擦牙若無牛以活人於長板橙上仰

卧却冷溺水人如前法將肚相抵活人身上水出即活

婦人調經衆疾論

全

經月經之經水也並三女人月水之名也或八月信正月華正也經八常也女人每月時而定常三來也故三月經云經水八血

夫女子十四則月水行男子十六則陽精益此皆合乎陰陽之數各及其時故男子之精氣宜盛女子之月水宜調調經之道貴乎耗其氣以行其血血盛氣衰是謂之從從則百病不生孕育無損矣且婦人之病四時所感六淫七情所傷悉與男子治法不同惟胎前產後七癥八瘕崩漏帶下之證為異故別貯方究其所因多由月水不調變生諸證大槩婦人之疾

不生也名之病アリト雖死治之易也故三婦人八月經ヲ調ハシ以テ不月經ヲ調ハシハ此ヨリ諸病ヲ生ハス只經水調ハシハ衆疾不發也發スレバ治シ易コトヲ論辨セリ

以經候如期為安或有愆期當審其冷熱虛實而調之先期而行者血熱故也法當清之過期而行者血寒故也法當溫之然又不可不察其有無外邪為之寒熱而後投藥且經行之際與產後一般將理失宜為病不淺若被驚則血氣錯亂經脈斬然不行逆於上則從鼻口中出逆於身則為血分勞瘵之疾若其時勞力太過則生虛熱變為疼痛之根若恚怒則氣逆氣逆則血逆逆於腰腿心腹背脇之間遇經行時則痛而重著過期又安若怒極而傷於肝則又有眼暈嘔吐之證加之經脈滲漏於其間遂成竅穴淋瀝

不止。凡此之時中風則病風感冷則病冷久而不治
崩漏帶下七癥八瘕可立而待若能治病於未然當
以調經為先故首論之各備諸方依次于後

孕育

六十二 婦人子ヲ孕テ十月ノ間養スルヲ孕育ト云セ
○案スルニ此ノ論ハ實ハ求嗣ヲ論スルニ似タリトセ

生育之道陰陽二氣交感而成胎若陰血先至陽精
後衝血開畏精陽內陰外陰抱陽胎而男形成矣若
陽精先入陰血後參精開畏血陰內陽外陽抱陰胎
而女形成矣又曰婦人月信初止一日二日五日及
男女生命旺相陽日陽時交合則有子多男若二日
四日六日又值男女生命休囚死絕陰日陰時交合

有子多女過此之外皆不成胎又有所謂轉女成男
法女子但懷娠始三月名曰始胎血脉不流象形而
變是時男女未定故令於味滿三月間服藥方術轉
令生男也

胎前

六十三 婦人孕テ十月ノ間養スルヲ胎前ト云
産前也産前ノ養食生調理ノ法ヲ論辨セリ

人之夫婦猶天地也天地之道陰陽和而萬物生焉
夫婦之道陰陽和而男女生焉故婦人先須調其經
而百病不生百病不生而成孕育然猶當知氣盛血
衰則無孕血盛氣衰乃有孕須以抑氣生血為先若
有胚腫則服安胎順氣之劑及善將理以候分免如

胎前產後變生諸證皆由不善調攝所致茲詳具各方于後臨病之際又當對證求藥若外感四氣內傷七情以成諸疾治法則與男子無異當於各類求之但胎前治病損動胎氣之藥尤當避忌

產後

六十四

婦人產後三子產出三子後養生詳論

凡婦人生產畢且令飲童子小便一瓊不得便卧且宜閉目而坐須臾方可扶上床仰卧宜立膝高倚枕頭厚鋪茵褥使無賊風吹著兼時時令人以軟物從心擗至臍下使惡露不滯如此者兩三日常令產婦聞醋炭氣或燒乾漆煙若無乾漆以破舊漆器燒之

以防血逆迷運之患分免之後須臾且食白粥一味不可令大飽逐日漸增之仍時與童子小便一瓊飲之或童子小便以好酒和半瓊温服三日過後方可進醇酒并些鹽味及喫爛猪蹄肉或雌雞亦不可太過若纔產便與酒恐產母藏府方虛不禁酒力必引血进入四肢致生諸證或熱酒入腹致昏悶况不善飲者乎纔產食肉太早緣藏府方虛恐成瀉瀉或變積滯亦不可喜怒憂思動力太早恣食生冷及不避風寒或冷水洗濯當時雖未覺大損滿月之後致病百端或成產後諸疾不可虛羸失於將補便成大患

終身悔而不及其產後倘有諸證不論巨細并有藥可療

小兒論

六十五 小兒疾病總論也凡內經難經二小兒病論又詳於此古ハ小兒ヲ療スルハ...

蓋小兒初生受胎氣之厚者疾病自少稟賦怯弱者又藉藥力以扶植元氣何況養護不謹或受驚觸或飲食過度衝胃寒暑以致變生諸證調治之法又須察脈觀證審之而後投以藥餌略備數方于後

臍風撮口

六十六 臍風ハ病因也撮口ハ病證也凡小兒母腹中三有レヤヲ臍ヲ以テ蓋シ...

小兒初生一七日內忽患臍風撮口十無一活坐視其斃良可憫也有一法極驗世罕有知者凡患此證

極難寸餘ハリ有レ此レハ三月ノ中自然ト腐テ落也其ノ狀ハ丸ノ臍ノ中ニ腐チ...

兒齒齦上斷同齒根肉也有小泡子如粟米狀以溫水蘸熟帛裹手指輕輕擦破即口開便安不用服藥

口瘡重舌

六十七 小兒ノ口古ニ細小ノ瘡ヲ生ス其ノ色赤トシテ...

小兒夜啼要飲乳若口到乳上即啼而不乳者必身額微熱急取燈照口若無瘡舌必腫也隨證施治

夜啼客忤

六十八 夜啼ハ前ト云キ也客忤トハ客ノ意也忤ハ犯也小兒ノ側ニ人ノ息氣ニ忤テ...

夫小兒胎熱則心躁而喜夜啼或腹熱啼時有汗而身仰或口舌瘡腫不能吮乳故夜啼不止也客忤者見生人氣忤犯而啼也

急慢驚風

六十九 急驚風慢驚風ト云ハ急驚風ハ陽證トシ慢驚風ハ陰證トシ...

臍ヨリ把テ解經ニ傳ヘ小兒ノ口ヲメ察テ撮ミ...

急慢驚風ト云ハ急驚風ハ陽證トシ慢驚風ハ陰證トシ...

驚風有陰陽二證。身熱面赤而發搐搦上視牙關緊
硬者陽證也。因吐瀉或只吐不瀉日漸困面色白脾
虛或冷而發驚不甚搐搦微目上視手足微動者
陰證也。陽證急驚風用涼藥陰證慢驚風用溫藥不
可一槩作驚風治也。又有一證欲發瘡疹先身熱驚
跳或發搐搦此非驚風當宜解散。

胎熱胎寒

七十 小兒母腹中三時三母熱胎受生者胎熱也。寒邪受生者胎寒也。詳義八論中二見。

凡小兒胎中受熱生下則多驚啼身熱或大小便不
通胎中受寒生下則身青體冷或腹痛盤腸內吊須
察其候而治之。

感冒四氣

七十一 感冒四氣者風寒暑濕四氣也。此小兒四氣感冒之
病也。詳義八論中二見。

凡小兒之病與大人不殊。惟臍風夜啼重舌變蒸客
忤驚風解顛疳積數證大人無之。其如感冒四氣傷
風傷寒斑瘡濕痢嘔吐等證則一。但藥劑大小輕重
之不同耳。諸方煎已類編可披而得是。

疹痘

七十二 疹痘方東垣先生
試效方論

本二此下二按東垣先生試效方論
疹痘方論

夫小兒斑疹始之證必先見面燥腮赤目胞赤呵欠
煩悶乍涼乍熱咳嗽嚏噴足稍冷多睡驚並瘡疹之
證或生膿胞或生小紅癩或生癩疹此三等不同蓋
諸證皆太陽寒水起右腎之下煎熱左腎足太陽勝

本論東垣先生作也小兒疹
疹之由一經一經二至
東垣論也○疹之病者
其公論之形也青豆如
也疹中二膿也包三水也
二成也故三疹者一也
也疹也和三云八也其
也又水疹也一和二也
也云云也疹之藏也
疹之藏也云云

