



廉集 七 集 八

小兒科急驚 慢驚 疳疾 癩疾  
 諸熱 感冒 傷食 腹脹 嘔吐  
 泄瀉 吐瀉 痢疾 痧疾 咳嗽  
 喘急 小兒疳積 雜病 目錄是後  
 痘疹 麻疹

癰疽 瘰癧 疔瘡 便毒 下疳  
 楊梅瘡 癩瘡 疥瘡 癬瘡 疥癩  
 癩風 厲風 諸瘡 杖瘡 折傷  
 骨癢 五絕 膏藥 通治 奇病  
 雲林暇筆凡十一條

龔氏家訓凡三十一條

萬病回春





萬病回春目錄廉集卷之七

小兒科

驚風

慢驚

疳疾

癰疾

諸熱

感冒

傷食

腹脹

嘔吐

泄瀉

吐瀉

痢疾

癩疾

咳嗽

喘急

小兒初生雜病

胎熱

胎寒

驚風

撮口

胎驚

夜啼

中惡

天疔

鵝口

口瘡

重舌

木舌

疳疔

疳疔

愛吃泥土

疳疔

疳疔

疳疔

眼痛

膿耳

鼻瘡

頭瘡

癩瘡

諸蟲痛

尾骨痛

遺溺

疝氣

盤腸

脫肛

遺溺

尿濁

便血

下淋

吐血



小便不通四十一 大便不通四十一  
 水腫四十一 黃疸四十一 自汗四十一 發斑四十一  
 解顛四十一 鶴節四十一 行遲四十一 髮遲四十一  
 語遲四十一 齒遲四十一 龜胸四十一 龜背四十一  
 痘瘡四十一 麻疹四十一

耻集卷之八

癰疽四十一 瘰癧四十一 疔瘡四十一 便毒四十一  
 下疳四十一 楊梅瘡四十一 膿瘡四十一 疥癬四十一 疥瘡四十一 疥癩四十一  
 諸瘡四十一 杖瘡四十一 折傷四十一 金瘡四十一  
 破傷風四十一 湯火四十一 虫獸四十一 中毒四十一  
 骨癆四十一 五絕四十一 膏藥四十一 通治四十一  
 奇病四十一 雲林暇筆四十一 凡三十二條  
 龔氏家訓四十一 凡三十二條

新刊萬病回春卷之七

廉集

太醫院醫官金谿雲林龔廷賢子才

編輯

門人 醫官同邑胡廷訓

慈谿羅國望

弟醫官廷器

姪 懋官同校

金陵書坊對峰周曰校刊行

小兒科

小兒神色總論

凡小兒病宜先觀形症神色然後察脈  
 假如肝之為病則面青心之為病則  
 面赤脾之為病則面黃肺之為病則  
 面白腎之為病則面黑先要分別五  
 臟形症次看面色受胎氣虛實明  
 其標本而治之無不可者



三關脈紋主病歌

紫熱紅傷寒 青驚白是疳  
黑時因中惡 黃即困脾端

又

青色大小曲 人驚併四足

赤色大小曲 水火飛禽撲

紫色大小曲 傷米麵魚肉

黑色大小曲 脾風微作搖

手指脈紋八段錦

Y 魚刺形主驚風痰熱

I 懸針形主傷風泄瀉積熱

《 水字形主食積咳嗽驚疳


乙 乙字形主肝病驚風

虫 蟲形主疳蟲大腸積積

环 環形主疳積吐逆

乱 亂紋主蟲 珠形主死

虎口三關脈紋圖



風關第一節寅位

氣關第二節卯位

命關第三節辰位

虎口又手處是也

小兒至三歲以上乃用一指按寸關尺

三部當以六七至為率添則為熱減

則為寒浮洪風盛數則多驚沉遲為

虛沉實為積

小兒脈法總歌

小兒有病須辨脈 一指三關定息數

遲必數熱古今傳 浮風沉積當先識

左手入迎主外証 右手氣口主內疾

外候風寒暑濕侵 內候乳食痰積致

洪緊無汗是傷寒 浮緩傷風有汗液

浮洪多是風熱盛 沉細元因乳食積

沉緊腹中痛不休 弦緊喉間作氣急

緊促之時疹痘生 臥數之際驚風至

虛軟慢驚作瘵癎 緊實風癎發搐搦

軟而細者為疳蟲 牢而實者因便閉

脈乳大小便中血 虛濡有氣兼驚悸

滑主露濕冷所傷 弦急客忤君須記

大小不勻為惡候 二至為脫三至卒

五至為虛四至損 六至平和曰無疾

七至八至病左輕 九至十至病勢極

十一至死無疑 此訣萬中無一失

小兒死候歌

眼生赤脈睛瞳人 顴門腫起又作坑

指甲黑色鼻乾燥 鴉聲忽作肚青筋

唇舌出口咬牙齒 目多直視不轉睛

魚口氣急啼不得 蚊蟲既出死形真

手足攣搖驚逆節 靈丹十枚一無生

魚目定睛夜死 面青唇黑晝亡

啼而不哭是痛 哭而不啼是驚

驚前不安是煩 啞啞不定是燥

急驚

急驚風症牙關緊急壯熱涎潮

顫動唇日眉眼昏引口中熱氣煩赤

唇紅二便閉結脈浮洪數緊此內有

寒熱外披風邪當驚風定搖若痰熱

尚作仍微下之痰熱既世急宜調養

胃氣指定而痰熱少退

宜調補脾氣此大法也

急驚屬肝風邪痰熱有餘之症也

症也治宜解毒表散毒散主之若急

驚肚腹腫脹靈砂丸萬應丸之類

敗毒散治急驚風初起發熱手足搐

切感胃風寒頭疼發熱咳嗽喘急鼻

塞声重及瘡疹欲出發搐並宜服之

人參 羌活 獨活 柴胡

前胡 扶苓 桔梗 去骨

川芎 枳殼 天麻 去穢

全蝎 姜蚕 白附子 煨

地骨皮 甘草 減半

右劉生姜三片水煎服

○靈砂丸 治小兒風痰驚積 至危驚者如神

南星 半夏 巴豆 去穢 酒煮 三次各五錢

全蝎 朱砂 一各三錢 為衣 各三錢

姜蚕 輕粉 少許

右為末水和丸如黍米大每二次三

丸如驚風金銀湯下其餘姜湯下

○龍腦安神丸 專治大人小兒驚風 語澀舌強久不瘥者及傷寒大熱不

解火無汗者大人服二九并花水調

雄黃四五分送下或細篩或研下小

兒一歲已下者四之一二三歲三之

一四五歲已上者二之一神效

牛黃 五分 片腦 三分 白茯神 三錢 去皮

烏犀角 朱砂 飛過 人參 去骨

地骨皮 麥門冬 桑白皮 各二

甘草 麝香 馬牙硝 二分

右各為末分兩秤停合為一處煉蜜

為丸每兩作十丸金箔四張為衣

陰乾磁器內放用黃蠟作蓋恐泄腦

麝之氣此方百發百中

○千金散 治小兒一切痰喘急慢驚風 雖至死但能開口灌下無不

全蝎 姜蚕 朱砂 四分

牛黃 六厘 冰片 黃連

天麻 膽星 甘草 各二

右為末每用五七厘薄荷燈心金銀

煎湯不拘時調下

○保生錠 治小兒急慢驚風痰涎壅盛 胎驚內吊多啼夜間恍惚不

寧火患癩癩咳嗽發熱夏月中暑 發搐皆治服鎮驚安神寧心

牛黃 三錢 天竺黃 辰砂 各一兩

雄黃 三錢 麝香 五分 片腦 五分

琥珀 一兩 珍珠 五錢 大赭石 三錢 煨七次

蛇含石 三錢 煨七次 金銀箔 各四

天麻 防風 甘草

茯苓 去皮 人參 各三錢 姜蚕

血竭 各五錢 遠志 三錢 陳皮

牛膽 南星 各一兩

右為細末用米粉糊為錠辰砂為衣用薄荷湯化下

○大聖奪命金丹 治小兒急慢驚風癲

惡及初生疳風撮口著緊胎驚胎痛牙關緊急驚風痰熱搐搦顛反引驚視昏悶不醒但促一切驚風危惡緊急之症並皆治之其効如神其他驚藥俱不及此真起死回生之良劑也楊柳兩傳

天麻 炮 全蝎 去毒 姜蚕 炒

膽星 防風 去毒 羌活

白附子 炮 茯神 去皮 川芎

遠志 泡去 桔梗 炒 石菖蒲

半夏 姜製 人參 去芦 白朮 去芦

茯苓 去皮 酸棗仁 炒 荆穗

細辛 各五錢 川烏 炮去皮 烏蛇尾 酒浸去

大赤足蜈蚣 一條 薄荷 甘草 炙

沉香 犀角 羚羊角

辰砂 水飛 珍珠 琥珀 各三

天竺黃 一兩 牛黃 一錢 雄黃

麝香 各一錢 金箔 三十片 銀箔 四十

右為末姜汁打糊為丸如芡實大朱砂為衣每服一丸用金銀同薄荷煎湯研化不拘時服

一 小兒潮熱發搐痰涎上壅手足指冷

申酉時尤腮青色隱白用補中益氣

湯調補脾肺六味丸滋養肝腎而痊



二方見  
補益

一 小兒三歲因驚搐發熱痰盛久服抱龍丸等藥面色或赤或青此心肝二經血虛風熱生痰也用六味丸滋腎生血用六君柴胡升麻調補脾胃而安二方俱見補益

**慢驚**

慢驚症因病後或吐瀉或藥餌傷損脾胃肢體逆冷口鼻氣微手足瘰癧昏睡靈睛此脾虛生風無陽之症也

慢驚屬脾中氣虛損不足之病也慢驚者除症也治宜固真

醒脾散

治小兒吐瀉不止作慢驚風脾困昏沈飲飲不食

人參 去芦 白朮 去芦 白茯苓 去皮

木香 全蝎 去毒 大麻

白附子 煨 姜蚕 炒 甘草 炙

右剉生薑三片棗一枚水煎溫服

一方去天麻姜蚕加南星 泡半夏 泡

陳倉米 百粒煎服累効

○黃芪湯 治小兒慢驚風之神藥也

黃芪 二錢 炙 人參 一錢

炙甘草 五分 加白芍 一錢 炒

右剉一劑水煎食遠服

○治小兒吐瀉脾驚 一二歲可服

朱砂 五厘 二歲已上一分

全蝎 一個 去足翅毒 一

右為細末乳汁調服

凡慢驚元氣虛損而至昏憤者 急灸

若待下痰不愈而後灸之則元氣脫散而不救矣此乃臟腑傳變已極總屬虛處惟脾受之無風可逐血散可透此因脾虛不能攝涎而似痰也

○紫金錠子 治急慢驚風涎潮發搐或吐或瀉不思飲食神昏氣弱

人參 去芦 白朮 去皮 白茯苓 去皮

白茯神去皮

山藥炒

乳香

赤石脂醋煨

辰砂各三錢

麝香一錢

右為末以糕一兩為丸如彈子大金丹為衣每一粒薄荷湯研化服

一 小兒傷食發疳服發表之劑手足搐搦服抱龍丸目睛疼盛余謂脾胃虧損而變慢驚也無風可祛無痰可逐只宜溫補胃氣遂用六君加附子下劑而愈方見補益

一 小兒抽搦痰涎自流或用驚風之藥益甚視其面色黃曰余用六君補中益氣二湯補脾肺而愈二方俱見補益

混元丹治小兒急慢驚風痰嗽喘逆吐瀉見通

後調理

○牛黃鎮驚丸

治驚起後調理安心補養氣血和平預防之劑

天竺黃研

麥門冬去心 當歸身酒洗

生地黄酒洗

赤芍藥煨 薄荷

木通去皮

黃連姜升炒 山梔仁炒

辰砂別研

牛黃別研 龍骨火煨各二錢

青黛別研

右為細末煉蜜為丸如菉豆大每服二三十九丸淡姜湯送下

一 小兒五歲因着食見粧鬼臉被驚嚇兩眼黑睛奮回裏白睛奮回外視物微覺三線諸醫不能治未治於余余曰此子曾出痘疹否對曰未俟出痘疹可治逾月痘疹盛行其子發熱似看將出之絕其家果召余治以綿膠脂將水泡出升慢火熬成膏塗兩眼胞上下二日全兩次益至痘疹收

醫後其眼復舊

**痲疾**

夫小兒痲病由乳母寒熱失理動止乖違飲食無節其肥過度喜怒氣亂醉飽傷勞便乳兒者故成痲病又因久吐之後久瀉之後久痢之後以致久渴久汗久熱久瘡久嗽下血久瘡之後皆能亡失津液益成痲病錢氏云痲皆脾胃傷亡津液之所作也

凡養小兒宜戒酸酒肉油膩偏生病生冷硬物凉水漿不與自無痲癖病癖者肥甘厚味所致而壯大青筋也

○消痲湯 治小兒大便色白小便渾濁或澀之如米泔此痲病也

- 山查肉 白芍 黃連 姜汁
- 白茯苓 皮 白木 去蘆 澤瀉 各一錢
- 青皮 四分 甘草 生三分

右剉一劑薑棗水煎服

○消痲丸 治五疳皮黃肌瘦髮直尿白物或吐或瀉腹內積塊諸蟲作痛

- 蒼木 木泔 陳皮 厚朴 姜汁
- 枳殼 麩炒 枳柳 神麩 炒
- 山查 去子 麥芽 炒 三稜 煨
- 莪木 煨 砂仁 茯苓 去皮
- 黃連 炒 胡黃連 蕪荑仁
- 史君子 夫 蘆薈

石各等分爲末史君子殼煎湯泡蒸饒爲丸如彈子大每服一丸清米湯化下

○肥兒丸 治疳積積廢癯清熱伐疳補

- 人參 三錢 白木 去蘆 茯苓 去皮各
- 黃連 姜炒三錢 胡黃連 五錢
- 史君子 去殼 神曲 炒

麥芽 炒 山查肉 各三錢 甘草 炙 三錢

蘆薈 二錢 半碗 盛 泥 封 固 置 坑 中 四 五 日 煨 熟 火 煨 透 用

右為末黃米糊為餅米湯化下或作  
丸黍米大每服二三十丸米湯下看  
兒大小加減

快活丸 治小兒一歲至五歲皮膚瘦弱  
骨露如柴肚大青筋小便澀  
睡臥驚亂神氣昏沉常服健  
脾化積進食肥壯其效如神

蒸餅 一兩 頂開一錢 取餅入青  
蒸五分仍以餅屑填緊外以濕紙包  
用炭火內煨透乾取出候冷用之

右為細末別以肥小棗用米泔水浸  
經一宿飯上蒸熟去核皮爛杵如糊  
同餅餅末杵勻為丸如黍子大每服  
三五十丸不拘時清米湯送下或研  
化米湯調服亦可

○蘆連消疳丸 治小兒五疳痞塊痰積  
肚腹壯 脾胃消 飲食不  
化 肝火磨  
積塊

蘆薈 胡黃連 宣黃連 酒炒各五錢

白木 米泔製焙 白茯苓 去皮

當歸 全身用酒洗各一兩 白芍 酒炒八錢

人參 神麩炒各六錢 史君子 夫殺曬乾

山查肉 各七錢 無萸 炒

檳榔 各五錢 大耳草節 去粗皮生用四兩

右為細末湯泡蒸餅打糊為丸菜豆  
大每服五六十丸臨晚米湯送下或  
煉蜜為丸如龍眼大每晚嚼化一丸  
或米湯下或酒亦可

一 小兒疳疔白膜遮睛筋疔瀉血腎疔  
身瘦瘡疥骨疔喜臥冷地又治胃怯  
不言解顛併年長不能行者用六味  
丸各等分煉蜜丸久服神效方見補益  
一 小兒四肢消瘦肚腹脹大行走不能  
頗能飲食作渴發熱去後臭穢此脾

臟傷也用異功散方見補益肥兒丸調理而愈

小兒面色痿黃眼胞微腫作渴腹脹飲食不思腹中一塊或移動小便澄白大便不實此脾疳之患用四君子方見補益加山梔無兼肥兒丸而愈

一 小兒尿濁如米泔余以江南做酒小麴炒為末酒調下三服愈

**疳疾**

錢仲陽云疳塊者僻於兩脇痞結者否於中脘此因乳哺失調飲食停滯邪氣相搏而成或乳母六淫七情所致古人多用剋伐痞疳既久飲食減少脾氣必虛久而不愈必先以固胃氣為主使養正則積自除若欲直攻其結不惟不能善消抑亦損其脾土凡

脾土虧損必變症百出矣當參各類及隨見症而主治之若疳塊日久元氣脾胃俱虛宜朝服補中益氣湯夕服千金消癖丸間與混元丹兼服治之獲效者多矣

癖者生於皮裏膜外也

○淨府湯 治小兒一切癖塊發熱口乾小便赤或瀉瀉

柴胡 白茯苓 去皮 猪苓

澤瀉 三稜 醋炒 莪木 醋炒

山查 去核 黃芩 白木 去心

半夏 姜製 人參 各八分 胡黃連

甘草 各三分 右剉一劑薑棗煎服

○肥兒丸 治疳如神方見再疾

○千金消癖丸 治小兒癖疾積塊在殊効

蘆薈 阿魏 別為 青黛

木香 檳榔 厚朴 姜炒

陳皮去白 麥芽炒四錢 史君子去殼

胡黃連 山查肉 香附水浸

三稜醋炒 莪木煨醋炒 水紅花子微炒

神麴炒各四錢 人參去芦 茯苓去皮

白木去芦 甘草炙一錢

右為末，將阿魏一錢，研水和麵打糰，為丸，菴豆大，每服四五丸，米飲白湯任下。

○益兒餅治小兒疳疾

水紅花子 史君子去殼 山查肉各五錢

白木去芦 棋柳一錢 木香一錢

神麴炒二錢半

右為末，入黃蠟，麴水和作餅，乾吃。

○至寶丸

真阿魏三錢 蘆薈 天竺黃

胡黃連 雄黃 沒藥

川山甲炒 沉香 白草烏泡

硃砂各二分

右為極細末，用好酒和成，塊入銅鍋內，再入酒半茶鍾，熬成膏，勿令火大，恐傷藥力，量可丸取出，丸如豌豆大，每丸黃酒化下，十歲已上服二丸，臨臥時服，待其自然汗出，三日服一次，重者五七服，輕者二三次，丸熱即退，塊亦消，須要忌口，如服後熱不止，可後服金花丸，如羸弱，不進飲食者，可先服平胃散。

○癘疾方

全蝎去毒 班蝥去頭 阿魏

紅娘子去頭尾足翅

蠟蟲去足 血蝎 雄黃

硃砂 蘆薈 木香

當歸尾酒浸 三稜醋煮 莪朮醋煮

香附米炒 白豆蔻去反 蘿蔔子各一錢炒

麝香一分

右為細末醋糊丸如梧桐子大每服三五十丸或酒或溫水下壯盛者可服

○癰疾方

蘆薈五分 阿魏五分 水紅花子一錢

急性子即小桃紅子一錢 猴燒灰一錢

黑白牽炒錢

右為細末每服二分黃酒送下三帖全好

○癰疾方

牛黃四分 雄膽四分 血竭一錢

蘆薈四分 蘆茸石五分 天竺黃五錢

黃蠟五錢 淨皮硝兩 蜂蜜四兩

右將蠟化開與蜂蜜一處滾熟在火傾入細磁碗內涼冷後將群藥為細末方入蜜蠟內攪勻每日常服先服用筋頭蘸吃後多服不怕十日全消忌酸冷油膩之物

○癰疾方

核桃仁一兩 檳榔二十個 礪砂一錢

大黃一兩

右三味為細末入桃仁水煮下炷香水滾時陸續入皮硝半斤香盡礪亦盡止食桃仁亦好

○清香散

治癰疾生牙疳潰爛臭穢

乳香 沒藥 孩兒茶

輕粉炒 象皮燒灰 象牙煅 紅褐燒灰 珍珠煅 海巴煅

右為細末搽患處立時痛止生肌如

神

○桃花散

治疔氣上攻牙腮唇爛

桃花信一塊桑柴火內燒紅浮入細茶濃滴內如此七次去信將茶滴入雄黃一塊研末入滴內用鷄翎頻掃患處止痛生肌立時見效

○尅堅膏

專治小兒疔塊發熱疔瘻者

木鱉子 穿山甲 川烏

其遂 其草 當歸

右各八錢先用真香油一斤入鍋內將煎藥熬成灰濾去渣再慢火熬滴承不散左下黃丹八兩熬滴水成珠左下細藥入內再不見火

蘆薈 阿魏 硼砂

皮硝 水紅花子 各五錢

礪砂 三錢 麝香 一錢

右為細末入內攪勻不致難為膏藥貼時先用皮硝水流皮膚以膏貼癰二三日後覺肚內疾作疼四五日發瘡後有膿血之物是其驗也

○抓癩膏

李滄溪傳

香油 桐油 生豬腦子 斤半

男子血餘 灰水洗淨不拘多少

桃仁 白蠟 各四錢

右俱下鍋內文武火熬的腦子盡用布絹瀝去渣次下飛過黃丹十四兩熬成膏待溫下

胡黃連 香白芷 蘇木

紅花 三稜 莪朮 各三錢

當歸尾 礪砂 各五錢 麝香 一錢

各為細末照法兩重羅入前膏內攪勻收貯勿令泄氣如有積塊先用皮



硝煎水洗患處令淨次用生薑擦之  
方用絹帛攤藥貼上貼後用熟鞋底  
炙熱熨之五七十遍覺肉熱方可如  
貼後癰即消縮如神

○灸法

穴在小兒背脊中自尾骶骨將手揣  
摸脊骨兩傍有血筋發動處兩穴每  
一穴用銅錢三支壓在穴上用艾炷  
安孔中灸七壯此是癰之根貫血  
之所灸之癰即發即可見效灸不著  
血筋則癰不發而不效矣

○化癰如神散

治癰塊  
蟾酥 黃蠟 各二錢  
牛黃 麝香 各五分 羚羊角 一錢  
硃砂 水片 各一分  
巴豆肉 一錢

右為末凡如菜子大每用一丸用扁

頭針或患處刺破皮入之用膏藥貼  
上一伏時揭起其痞化膿血出盡服  
調理脾胃藥

一 小兒患痞癰服枳實黃連  
之類痞益甚余曰此脾經血虛痞也  
不可剋伐遂用六君子加當歸數劑  
胃氣漸復諸症漸愈乃朝用五味異  
功散加升麻柴胡夕用異功散加當  
歸芍藥而愈方見補益

諸熱

小兒諸熱辨例

傷寒熱手足絳冷發熱惡寒而無汗  
面色青慘而不紅額有青紋  
傷風熱手足稍微溫自赤面赤而光  
傷食熱目胞腫右額有青紋身熱而  
頭額腹肚木甚夜熱晝涼面黃或吐

利腹疼

驚風熱面色青紅額正中青紋手心有汗時作驚傷手脈絡微動而發熱

風熱身熱倍能食唇紅頰赤大小便秘潮熱如水之潮候時而至

變蒸熱身熱上下而蒸熱上氣虛驚耳令微汗唇上下有白泡狀如珠子重者身熱脈亂腹痛啼叫不能乳食或吐兇迴歲以後無此症也

潮熱發熱有時驚熱顛叫恍惚夜熱夕發且止餘熱寒邪未盡食熱肚背先熱再熱骨蒸赤汗甘熱一向不止煩熱心躁不安積熱煩赤口瘡風熱汗出身熱虛熱困倦少方客熱來去不定痲熱涎嗽飲水寒熱發如癩狀血

熱辰巳時發疹熱耳鼻夫冷熱得之各有所歸其間有二兩症交互者宜隨其輕重而治之

諸熱為病者宜清解也

○大連翹飲 治小兒傷風感冒發熱咳嗽喉赤癰癢眼自赤腫口舌生瘡咽喉疼喘小便淋瀝胎毒瘡疹餘毒一切熱毒並治

連翹 龍麥 滑石

車前子 牛旁子 赤芍 各八分

梔子 木通 當歸

防風 各四分 柴胡 黃芩

荊芥 各一錢二分 蟬退 五分 甘草 一錢六分

右剉竹葉十個燈草十莖水煎不拘時溫服○風痰熱變蒸加麥門○實熱丹熱加大黃○胎熱痘疹餘毒加薄荷葉○癰癩熱毒加大黃芒硝

五福化毒丹

治小兒痘積熱毒唇口臭頰赤咽乾煩燥并痘疹餘毒未解或頭目身熱多生瘡癩

犀角 桔梗 去芦 生地黄 酒洗

赤茯苓 去皮 牛旁子 微炒各五錢

朴硝 連翹 玄參 黑

粉草 各六錢 青黛 二錢研極細

右為末煉蜜丸如龍眼大每服一丸薄荷湯化下兼有驚加朱砂為衣



感冒者宜發散也

惺惺散 治外感風寒鼻

人參 白朮 白茯苓 桔梗

瓜蒌根 細辛 甘草 薄荷

右剉水煎服

○羌活膏 治小兒風寒外感驚風內發發熱喘促咳嗽痰涎潮熱搐

癇并痺疹初作

人參 羌活 獨活

前胡 川芎 桔梗

天麻 各五錢 薄荷 地骨皮 各三錢

甘草 二錢

右為細末煉蜜為丸如芡實大每服

一丸薑湯研化下

一 小兒八歲患傷寒頭痛身疼發熱口

乾面赤無汗諸醫以傷寒治之百藥

罔効已經旬日袖手待斃余以龍腦

安神丸一服其汗如雨即瘥

一 小兒外感風邪服表散之劑汗出作

喘此邪氣去而脾肺虛也用異功散

而汗喘止再劑而乳食進 方見補益

一 小兒沉默昏倦肢冷驚悸其絃如弓

之向裏此屬胃氣虛而外感寒邪也

先用惺惺散以解外邪調胃氣諸症

頻愈但手足逆冷又用六君子湯調  
補元氣而安異功散六君子湯俱見補益

**傷食**

傷食者宜消導也

○萬億丸治小兒乳食生冷傷食  
熱肚脹諸症方見通希

○消食丸又名消乳丸  
治宿食不消

砂仁 陳皮 三稜炒

神麴炒 麥芽炒各五錢 香附炒

加白朮炒五錢

右為末麴糊為丸如麻子大食後白

湯送下大小加減

○消食餅治小兒時常傷食皮黃肌瘦  
肚大腹脹用此焦餅令常食之

蓮肉去皮 山藥炒 白茯苓去皮

神麴炒 麥芽炒 扁豆炒

右各等分為末每四兩入麴一斤水

同和烙焦餅用

一 小兒傷食嘔吐發熱面赤服消導清  
熱之劑飲食已消熱亦未退余以為  
胃經虛熱用六君子升麻柴胡四劑而  
痊

一 小兒十四歲傷食發熱服消食丸胸  
腹膨脹發熱作渴此脾氣復傷也先  
用四君子升麻柴胡飲食漸進用補中  
益氣湯而愈後因勞心發熱少食用

四君子升麻柴胡而愈

一 小兒傷食發熱抽搐嘔吐喘嗽屬脾  
肺虛氣虛有熱用六君子炒黑黃連梔  
子而愈右方俱見補益

**腹脹**

腹脹者脾胃氣虛也

○消脹散治小兒腹脹

蘿蔔子炒 蘇梗 乾葛

陳皮 枳殼各等分 甘草少許

右劉水煎服食少者加白朮

一 小兒傷食腹脹胸滿有痰余用異功散而痊後復傷食腹脹作痛或再藥下之痛雖止而脹益甚更加喘粗此脾氣傷而及於肺也用六君加桔梗調補而痊

一 小兒停食服通利之劑作嘔腹脹此脾胃復傷也用補中益氣湯而愈右丸俱見補益

**嘔吐**

嘔吐者乳食傷胃也

○定吐飲治吐逆投諸藥不吐服此神效

半夏湯泡透切片焙乾為末 生薑洗淨和皮

薄桂上粗皮

右薑切作小片與如棗同煎半

夏和勻入小鍋內慢火順手炒令香熟帶乾方下桂再炒勻微有香氣以紙攤開地上去火毒候冷略搗去黑焦末每服二錢水一盞姜三片煎七分空心少與緩服

○定吐紫金核治嘔吐

丁香 木香 藿香

半夏姜湯泡七次 人參去芦 白朮去骨各二錢

右為末薑打打糊為丸如棗核大用沉香朱砂各一錢為衣陰乾每用一丸用棗一枚去核用藥丸在內姜片夾濕紙裹灰火內煨熟去姜糸嚼吃用米飲壓之

一 小兒傷食發熱面赤抽搐嘔吐氣喘而唾痰此飲食傷脾肺氣虛弱所致用六君子湯炒黑黃連山梔各二分

劑類愈方見補益

**泄瀉**

泄瀉者乳食傷脾也

○參苓白朮散

治脾胃虛弱飲食不進  
多困少力中滿痞宣心  
中氣喘嘔吐泄瀉此藥中和不熱久  
服養氣益神醒脾悅色順正祛邪

人參

白朮

茯苓

山藥

甘草

白扁豆

一錢半姜汁浸炒

蓮肉

薏苡仁

砂仁

桔梗

右為細末每服一錢棗湯調下量兒

歲數加減

○浴脾丸

消食止瀉止吐消痰消積  
消脹定腹痛益脾健胃

人參

白朮

白茯苓

陳皮

蓮肉

山查肉

山藥

澤瀉

甘草

右為末煉蜜為丸梧桐子大每服二

三十九空心米湯下或米湯研化服

亦可小兒常患傷食服之立愈

○一方益元散加白朮末

一兩每服一

二錢米湯調下止小兒泄瀉殊效

○一方治瀉泄用柿餅

燒熟食之即止

○治小兒水泄不止

五倍子為細末陳醋調稀熬成膏貼

臍上即止

○水瀉痢疾方

生薑

真香油

各四兩 黃丹 二兩

熬成膏藥貼臍立效

一 小兒飲食後即瀉先用六君升麻神

麩山查而止又用五味異功散加升

麻而痊後吐瀉腹痛用保和丸一服

又用異功散調補脾氣而安

一 小兒傷食作瀉腹脹四肢浮腫小便

不利先用五苓散方見中加木香旬餘諸症漸退又用五味異功散為王佐以加減腎氣丸又旬日二便調和飲食漸進浮腫旋消乃以異功散調理而安

一 小兒因驚火瀉面色青黃余謂肝木勝脾土也朝用補中益氣湯夕用五味異功散加木香子母俱服而愈

一 小兒久瀉兼脫肛小腹重墜四肢浮腫面色痿黃時或兼青諸藥到口即嘔吐審乳母憂驚傷脾大便不實先用補中益氣湯五味異功散及四神丸調治其母不兩日子母並愈右友俱見

**吐瀉**

上吐下瀉者脾胃俱傷也

○白朮散治吐瀉或病後津液不足中乾倦渴和胃生津止瀉利將欲成慢驚風者均

人參去白朮去茯苓去藿香去

木香 乾葛 甘草各

右剉劑水煎服○若小兒頻瀉瀉痢

將成慢驚加山藥扁豆肉豆蔻煨各一錢

薑一片木煎服○若慢驚已作加細

辛天麻各一錢全蝎個三白附子煨八分○

若冬月小兒吐瀉多是胃寒胃虛所

致加丁香三粒○如胃虛不能食而大

渴不止者不可用淡滲之藥乃胃中

元氣少故也以此湯補之加天花粉

○若能食而渴者白虎湯加入參○

如中氣虛熱口舌生瘡不喜飲冷服

之即効

○燒針丸治小兒吐瀉

黃丹 朱砂 白礬 枯過

右為末，棗肉為丸，如黃豆大，每服三四丸，截針尖，上燈焰上燒過，涼米泔研爛，調服。瀉者食前吐者無拘時，外用菟豆粉以鷄子清作膏，如吐塗兩脚心，如瀉塗額門，上止則去之。

○又方 治吐瀉

四君子湯加藿香陳皮，一劑而愈。

○助胃膏 治元氣脾胃虛弱吐瀉不思飲食及久瀉虛寒

人參 白朮 去芦 茯苓 去皮

甘草 炙 白豆蔻 去殼 木香

山藥 炒 肉豆蔻 炒 煨 糯米

砂仁 炒 丁香 官桂

藿香 各三錢 陳皮 五錢

右為細末，煉蜜為丸，彈子大，每服一

丸米湯化下。

○秘方 治小兒水瀉

白礬黃丹各五錢，用葱白同搗爛，塗臍上即止。

○治小兒吐瀉

小丁香 陳皮 各等分 水煎溫服。

一 小兒數歲間每停食，輒服峻利之藥，後肚腹膨脹，嘔吐泄瀉，先用六君子湯，諸症漸愈，又用補中益氣湯而安。

一 小兒腹脹，飲食後即瀉，手足逆冷，此脾氣虛寒也，先用大參理中丸，後用六君子湯而愈。

一 小兒吐瀉，乳食色白不化，露睛氣喘，此脾肺不足，形病俱虛也，先用異功散，加桔梗柴胡，頓愈，再用補中益氣湯而安。

一 小兒因驚吐瀉，腹脹，先用六君子木香

湯而安。

湯而安。

湯而安。

湯而安。

湯而安。



柴胡治之，得時又以五味異功散而愈。後因驚搐甚，或用鎮驚化痰之藥，倦怠不食，而泄益甚。先用異功散加木香、釣藤、鈎、四劑而愈。方俱見補益

一、小兒面黃肌瘦，泄瀉無度，腹脹如鼓，不思飲食，百藥不效。予教用好生白木酒磨濃汁，以溫酒調空心服，三三日即愈。

**痢疾**

東垣云：白者濕熱傷氣分，赤者濕熱傷血分，赤白相雜，氣血俱傷也。痢者腹中食積也。

○萬億丸 治小兒下痢赤白腹一痛初起者一服即愈

○一方治小兒痢，用鷄子一個，冷水下鍋煮一二沸，取出去白，用黃研碎，以生薑汁小鍾半鍾和勻，與兒食之，忌

**茶**

○薑茶煎 治痢疾腹痛，不問赤白，冷熱皆可用之。

老生薑三錢 細茶三錢 用新汲水煎服。

○一方用生薑細茶連根韭菜三味同搗汁酒調服立止。

○仙梅丸 治痢疾發熱發渴者為

細茶 烏梅 水洗剝去核晒乾

為末，用生蜜搗作丸，彈子大，每一丸水冷熱隨意化下。

○鐵門拴 治赤白痢疾五種泄瀉

文蛤 炒黃色一兩 白礬 生米煨共三錢 黃丹 二錢

右為細末，黃蠟一兩溶化為丸，如素豆大，每服大人十五丸，小兒五七丸，茶一錢姜二錢煎湯下。

○瀉痢方

五倍子炒黃色為末，烏梅肉水浸為

九如彈子大每服一丸白痢冷米湯下赤痢姜湯下水瀉冷水下

○水瀉痢疾方

飛白礬二錢 丁香五分

共為細末水瀉白水下痢疾薑酒下

○石蓮散治小兒噤口痢

石蓮肉炒去心二兩

右為末每服一二錢陳倉米飲調下

如嘔加生薑并二匙同服一方山藥末半生半炒米飲調下

○香連丸

黃連十兩用吳茱萸五兩水拌濕入磁壺頓滾湯中半日炒焦黑

木香二兩

右為末醋糊丸如赤

豆大每服二三丸白湯下

○固腸丸治紅白痢日久不止

黃蠟一兩 黃丹水飛一兩 共化一處為

丸如黃豆大每服三丸粗細甘草白痢乾薑紅白痢下空心服

○治水瀉痢疾用鳳眼草蜜水炒為細末每十錢水煎空心服立止

一 小兒患痢脫肛色赤或痛用補中益氣湯送香連丸而愈後傷食作瀉復脫肛不入仍用煎湯更以革麻仁研塗頂門而愈

一 小兒患痢口乾發熱用白朮散煎與恣飲時與白朮散送下香連丸而安

一 小兒久痢裏急後重欲去不去手足

冷此胃氣虛寒下陷也用補中益氣湯加木香補骨脂倍升麻柴胡而愈

愈

疝疾

癰者膈上痰結也

○萬億丸 方見通治

○芫花散 治小兒瘧疾

芫花根為末每用一二分三歲兒用三分以鷄子一個去頂入末攪勻帝糊頂口外用濕紙裹灰火煨熟嚼吃

○天靈散

天靈蓋燒存性為細末每服五厘黃酒調下立止

○消癖丸 治瘧母停水結

芫花 各等 朱砂 各等 右為細末

煉蜜為丸小豆大每十丸蜜湯送下

○祝由科 治瘧疾不愈

咒曰

吾從東南來路逢一池水水裏一條龍九頭十八尾問伊食甚的只喫瘧疾鬼右念七遍吹在果子上念七遍在上

令病人於五更雞犬不聞時面東而

立食訖於靜室中安臥已食瓜菜暈

肉熱物此法十治八九無藥處可以

救人果者謂桃杏棗栗之類

一小兒先因停食腹痛服峻厲之劑後

患瘧日晡而作余以為元氣下陷欲

治以補中益氣湯不信泛行清熱消

導前症益甚食少作瀉余朝用煎湯

夕用異功散加當歸月餘而愈 方見補益

一小兒每午前寒後熱久不愈用六

君子加炮姜丸於實大每服一丸旬

餘而愈 方見補益

咳嗽

咳嗽者肺傷風也

○參蘇飲 治小兒四時感冒發熱頭痛

重涕嗜稠粘及內傷

外感一切發熱喘嗽

紫蘇 陳皮 前胡

桔梗 半夏姜汁 白茯苓去皮

乾葛 枳殼麩炒各

甘草 人參二味 木香少許

右剉生薑三片水煎食後服○若肺實有邪去入參加黃芩桑白皮杏仁

○參花散 治咳嗽發熱氣喘吐紅

人參 天花粉各等

為末每服五分蜜水調下

○蜜梨膏 治咳嗽痰喘

鮮梨一個刀切勿斷入蜜於內麪裹灰火煨熟去麪吃梨

○一方治小兒喉中痰壅喘急

用巴豆一枚去殼搗爛作一丸以綿花包裏男左女右塞鼻中痰即除

○一方治傷寒潮熱痰咳男婦小兒皆可用

鬱金 石膏煨過

右共為末每服一匙清茶送下

一 小兒傷風咳嗽發熱服解表之劑加喘促出汗余謂脾肺氣虛欲用補中

益氣湯加五味子補之不信乃自服

一 陳桑皮枳殼而發瘡痰湧仍用前藥加鈞藤鈞而痊



喘急者痰氣盛也

○一拾金 治小兒風痰吐沫氣喘咳嗽肚腹膨脹不思飲食

小兒肺脹咳嗽 多人看作為風喉

大黃枳櫚牽牛 人參分兩等分

五味研成細末 蜜水調量稀稠

每將字下咽喉 不用神針法灸

右其症肺脹喘滿胸高氣急兩脇搖

動墮下作坑兩鼻發張悶亂嗽湯聲  
嘔不鳴痰涎潮塞俗云馬脾風若不  
急治死于旦夕也

○治小兒喉中痰壅喘甚

用巴豆一粒搗爛作一丸以綿花包  
裹男左女右塞鼻痰即墜下效

一 小兒患喘服發汗之劑汗出而喘益  
甚用異功散煎愈又用六君子湯而

全愈方見補益

一 小兒有哮喘其母遇勞節發兒飲其  
乳亦嗽用六君桔梗桑白杏仁治之  
母子全愈方見補益

**小兒初生雜病**

一 小兒初生宜先濃煎黃連甘草湯急  
服軟頰或絲綿包指蘸藥櫃出口中  
赤血尚或不及即以藥湯灌之待吐

出惡沫方與乳吃令出痘亦稀小

一 初生三五月宜綳縛令臥勿豎頭抱  
出兒致驚癇

一 乳與食宜相遠不宜一特混吃令兒  
生疳癖痞積

一 宜用七八十歲老人舊裙舊襖改作  
小兒衣衫真氣相滋令自有壽富貴

之家切不宜新製綺綾羅縐絨之  
類與小兒穿不惟生病抑且折福

一 小兒生四五個月止與乳吃六個月  
以後方與稀粥哺之周歲以前切不可  
吃薑桂并生冷之物令兒多疾若  
待二三歲後臟腑稱壯纔與薑桂方  
好

延生第一方小兒初生臍帶脫落取置  
新瓦上用炭火四圍燒至烟將盡放

土地上用瓦蓋之類蓋之存性研為細末預將朱砂透明者為極細末水飛過臍帶若有五分重朱砂用二分五厘生地黃當歸身煎濃汁一二蠟殼調和前後兩味抹兒上臍間及乳母乳頭上一日之內晚至盡次日大便送下穢汚濁垢之物終身永無瘡疹及諸疾生子則得子十分妙法也

滌穢免痘湯

用練樹子一升至正月初十日子時父母只令一人知將練子煎湯待溫洗兒全身頭面上下以去胎毒洗後不出痘疹如出亦輕或只三五顆而已

一方用五六月間收經瓜小小蔓藤陰乾約一兩半重收起煎湯洗

稀痘萬金丹

治嬰兒未出痘時胎毒在臟腑因時氣而發也如每在春秋二分每服一丸使痘毒漸消而時氣少如過出痘時氣身一發熱即磨服一丸毒從大便而出若有黑脂倒磨化下丸即起死回生如痘出至七日若服此丸元氣多修合者不可加減以取小效

麻黃根 升麻 各一兩半 羌活

樺皮 茜草根 括婁根

鼠粘子 天麻 連翹 各一兩

當歸 芍藥 川芎 各七錢

右剉作片用米五升煎至半升去渣入銀器內以湯煨成膏入煉蜜少許調均入後藥

朱砂 五錢 水片 雄黃 各五

蝦蟆灰 麝香 七分 全蝎 十四

右為末入煎藥和勻分作十丸以蠟

封之如彈子大臨服時猪心血或兔血調勻熱酒調下溫服

凡初生小兒口腭并牙根生白點名馬牙不能食乳此與鵝口不同少緩即不能拔多致大傷急用針縛筋頭上將白點挑破出血用好京墨磨薄荷湯以手背擦母油頭髮離墨通口膈擦之勿令乳食待睡一時醒方與乳食再擦之

小兒心脾變蒸者異常也蒸者發熱也所以變換五臟蒸養六腑須要變蒸多變氣血方榮骨脉始長情性有異則後來出痘輕可凡變蒸不宜服藥或因傷食因傷風因驚嚇等項來雜相值而發令人疑惑亦須守候一二日俟病勢真的足食則消食是風則行痰是驚則安神若變蒸而妄投藥餌則為藥引入各經症遂難識而且纏綿不脫反為藥所誤也

一 小兒月內發搐鼻塞乃風邪所傷以六君子湯加桔梗細辛子母俱服更以葱頭七葉生薑一片細搗攤帛上合置掌中令熱急貼額門少頃鼻利搐止

一 小兒未滿月發搐嘔乳腹脹作瀉此乳傷脾胃用五味異功散加漏蘆令每服之子亦服匙許遂愈

**小兒雜病**

胎熱胎寒者稟受有病也

○胎熱 小兒生下身熱面赤服閉口中氣熱焦啼燥熱

甘草 一錢 黑豆 二錢 淡竹葉 五個

右剉一劑燈草七根水煎頻頻少進

令乳母多服

○胎寒 母孕時受寒，兒生下，面色青白，身起，四肢厥冷，大便青黑，口冷腹痛，寒懷。

當歸 炒 黃芪 蜜 桂心 黃芩 炒

細辛 龍骨 研 白芍 煨 各

右為細末，每服一字，以乳汁調下。

○臍風撮口者胎元有毒也

○臍風 多因斷臍之時，被風濕所乘，或視按其臍，必硬直，定有臍風。必自臍發出，一道青筋，行肚，却生兩筋，行至心者必死。於青筋初發，急用燈心蘸酒，然於臍上，自青筋頭并為行盡處，燎之，以截在，不致致心。更以艾灸中脘，三壯，內服萬應丹一二粒，以泄其胎毒也。

○五通膏 治小兒臍風撮口

生地黃 生薑 葱白

蘿蔔子 田螺肉 各五分

右件共搗爛，搭臍四圍，一指厚，抱住。

一時許，有屁下泄而愈。

○治小兒斷臍不如法，七日內有風出

用直姜蚕二三條，炒去絲，為末，蜜調敷口，或乳頭上，帶下亦可。

○香螺膏 治臍風腫硬如盤

田螺二個，入麝少許，搗爛，搭臍上，須臾再易，腫痛立消。

○宣風散 治初生兒臍風撮口

多喘，不乳，口出白沫。

全蝎 二十八個，頭尾全者，麝香 一字

去毒，用酒炙為末。

右同和勻，細末，每用半字，金銀煎湯調服。

○撮口

由胎氣挾熱，風邪入臍，毒流心，臍之經故，令舌強，唇青，聚口，啼聲不出，當視其齒齧之上，有水泡子，如粟米狀，急以溫水蘸青綿布，裹指輕輕擦破，能開口，便安。甚者用半黃一分，將竹瀝調滴入口，即愈。

胎驚夜啼者邪熱乘心也

○胎敬宜



○鎮驚散 治小兒在胎中受驚，故生下未滿月而驚。

朱砂八分 牛黃少許

取猪乳汁調稀抹入口中入麝香少許

○夜啼宜

○花火膏 治邪熱相乘焦燥夜啼。

燈花三顆以乳汁調抹兒口或抹母乳上令兒吮之

一方用燈心燒灰傅乳上令兒吮之

一方加朱砂一字共研末用白蜜調待兒睡抹兒口內

○蟬花散 治小兒夜啼不止狀若鬼祟。

蟬退七個下半截為細末用薄荷湯調入好酒少許食後服或者不信將

上半截為末依前法服復啼如初古語人立法莫知其妙小兒觸犯禁忌而

夜啼者宜醋炭薰服蘇合香丸

○一方用火柴頭一個長四五寸削平

面用朱砂寫云撥火杖撥火杖將來捉神將捉着夜啼鬼打殺不要放急急如律令

○小兒夜啼不止將朱砂書寅寅二字

貼床頭即止

中惡天吊者冒犯邪氣也

○中惡宜

○辟邪膏 治小兒卒中惡毒心腹刺痛悶亂欲死等症。

降真香 白膠香 沉香

虎頭骨 鬼白 龍膽草

人參 白茯苓 各五錢

右為細末入雄黃半兩麝香一錢煉蜜為丸乳香湯下

○天吊宜

○鈎藤散 治小兒天吊潮熱。

鈎藤

人參

犀角

鈎藤各五錢

全蠍

天麻

各二錢半

甘草

各一錢半

右剉一劑水煎服

鵝口口瘡者胃中濕熱也

○牛黃散

治小兒口中百病驚口口瘡重腫不能吮此及咽喉腫塞

一切熱毒

牛黃

冰片

硼砂

辰砂

各一分

雄黃

青黛

各二分

牙硝

一分

黃連

黃柏

各一分

右共入乳鉢內研勻每用少許敷入

口內

○瀉心湯

治小兒口瘡

淨黃連為椽細末蜜水調服

○一方治小兒白口瘡用黃丹巴豆仁

同炒焦去豆用丹搽口瘡上立愈

重舌木舌者脾經實火也

○重舌

乃舌下生

○當歸連翹湯

治小兒心脾有熱舌下

重舌及唇口

兩傍生瘡

歸尾

連翹

白芷

大黃

煨

甘草

各一分

右剉劑水煎食後頓服

○千金方

竹瀝青

黃柏末

二味和勻無時點舌上即退

○又方用蒲黃塗之即瘥

○又方用膽礬研細敷之

○又方用百草霜芒硝滑石共為末酒

調敷之

○木舌

乃腫硬不柔熱也

○雪硝散

治木舌

朴硝

五錢

真紫雪

二分

塩

半分

右為末入竹瀝二三點用白湯調敷  
噤津無妨

○瀉黃散 治小兒木舌弄舌

藿香葉 七分 山梔 一錢 軟石膏 五分

防風 四分 甘草 七分

右剉一劑水煎不拘時服

走馬牙疳者氣虛濕熱也

○立効散 治走馬牙疳

青黛 黃柏 枯礬 五倍子 未各一錢

右研細末用米泔水先繳口內搽貼

患處

○清胃升麻湯 治小兒齒腫流涎腮腫馬牙疳主陽明之熱

升麻 川芎 白芍

半夏 湯泡各七分 乾葛 防風

黃連 酒炒二分 生甘草 各一分 軟石膏 煨一錢

白朮 七分 白芷 三分

右剉一劑水煎食後熱服能救即含

漱而吐之漱藥不用白朮半夏

愛吃泥土者脾臟生毒也

○清胃養脾湯 治小兒愛吃泥土及脾虛胃熱所致此藥主之

黃芩 軟石膏 陳皮 白朮 去皮

茯苓 去皮 甘草 右剉等分水煎服

○砂糖丸

膩粉一錢和砂糖為丸如麻子大米

飲送下瀉出其土立愈

○黃金餅 治小兒好吃泥土

乾黃土為末濃煎黃連汁和為餅服

乏

丹毒者火行于外也

赤腫者遊走遍身也

○犀角消毒飲 治風毒赤紫丹瘤壯熱狂燥睡臥不安胸膈滿悶咽喉腫痛九道有血妄行遍身丹毒及痘疹已出未出不能快透或已

毒及痘疹已出未出不能快透或已

出熱不解  
急宜服此

牛旁子

四錢

荊芥穗

防風

黃芩

各一錢

犀角

甘草

右剉一劑水煎不拘時服如無犀角以升麻代之

○水黃散

治赤遊丹毒

土硝

大黃末

各五錢

右合二處新汲水調白用鷄翎蘸藥頻頻塗掃

又方用狀龍肝不拘多少用鷄子清調敷患處專治赤腫赤毒火毒走注

○泥金膏

治一切無名腫硬癩赤但是諸般丹瘤熱癩濕爛大人亦同此

陰地上蚯蚓糞乾段硝蚯蚓糞三分之二共一處研細新汲井水濃調厚敷患處乾則再上

喉痺者執毒也

會厭兩傍腫者為雙乳鰓是易治。佛腫者為單乳鰓難治。乳鰓者小者為喉痺熱結於咽喉且麻且痒腫遠於外者纏喉風。喉痺是發暴死者名走馬喉腫。

○甘桔湯

治小兒咽喉腫痛風熱等毒

桔梗

三錢

防風

荊芥

薄荷

黃芩

甘草

右剉一劑水煎食後頻頻溫服

○碧雪

治心膈積熱上攻咽喉腫痛閉塞水漿不下或生瘰癧重舌不舌金

碧雪真青黛

硼砂

蒲黃

甘草末俱生等分摻咽喉

眼痛者火盛也

○拔毒膏

治嬰兒患眼腫痛

用熟地黃一兩以新汲水浸透搗爛貼腳心布裹在有效

○通天散

治赤眼暴發腫苦痛

芒硝 五錢 雄黃 三錢 共為細末

吹入兩鼻內流水雙自流淚即效  
膿耳者腎氣熱衝也

○羽澤散 治耳中出膿或疼痛或出水

枯礬少許為細末吹入耳中即愈  
一方用五倍子燒存性為末吹入耳亦效

一方用抱出鷄卵皮炒黃色為細末香  
油調灌耳內即時止

○黃龍散 治停耳小兒因沐浴水入耳  
成膿 中木濕停留搏於血氣醱醱

耳 枯礬 煨 龍骨 煨 黃丹 木機  
胭脂 燒研 麝香 少許 海螵蛸 煨

右為細末先將掛條拭乾濃水後以  
藥摻入日日用之勿令入風

○治停耳膿耳不問新久痛不止用黃

蠟如皂角子大搓成條外用好綿艾  
搥熟裹蠟條火燒着烟薰患處痛止  
任薰

鼻瘡者風濕氣攻也

○鼻瘡 熱毒傷肺肺王氣通於鼻風濕  
故鼻下兩傍瘡濕痒爛是名鼻患其  
瘡不病汁所流處即又成瘡澤瀉散  
主之

○澤瀉散 治鼻瘡

澤瀉 鬱金 山梔仁 甘草 各  
右為細末用甘草煎湯調食後服

頭瘡者熱毒也

○一掃光 治小兒頭上肥瘡或多生風  
子搔痒成瘡膿水出不止

細茶 三錢 水銀 八分 牙皂  
花柳 各二錢 右為細末香油調搽  
○臘油膏 治小兒頭瘡

臘猪油 半生 雄黃 水銀 各等

右研三味和勻先將水洗淨濃汁後敷藥

臍瘡者風濕也

○枯礬散

治小兒因臍腐外傷於風邪以致臍瘡不乾

枯礬

龍骨

各五分 共為細末每

用小許乾糝臍上

小兒臍中汁出并痛用枯礬末乾敷或黃柏末傅之又垂爾空燒灰存性摻之亦可

諸蟲痛者胃氣傷也

○追蟲散

治小兒蟲積痛凡腹疼口中出清水者蟲積也

史君子

用肉二錢

檳榔

右剉為一劑水煎食遠服

○一方用史君子

檳榔

各一錢 雄黃

俱為細末每服一錢苦練根煎湯調

下

○靈礬散

治小兒蟲咬心痛欲絕

五靈芝

枯礬

共為末每服一錢水煎不拘時服當

吐出蟲即愈

○練陳湯 治小兒蛇蟲

歌曰

蛇蟲出口有三般 口鼻中來大小堪 如或白蟲兼黑色 靈丹縱服病難安

苦練根皮 陳皮 半夏

茯苓 甘草

右剉一劑生薑煎服

○錢氏白朮散

治小兒冬月吐瀉多是胃寒田疳所致

人參

白朮

茯苓

木香

甘草

乾葛 丁香

右剉每服一二錢水煎溫服

尾骨痛者陰虛痰也

小兒尾骨痛乃是陰虛痰火所致若

陰虛而痛者宜補陰降火湯王三  
痰火作痛宜化痰降火湯王三  
○補陰降火湯 治陰虛骨節痛

當歸 酒洗 川芎 白芍 酒炒

熟地黃 酒炒 黃柏 酒炒 知母 酒炒 各

右剉少用官桂為引或以前胡木香  
為引如痛不止加乳香沒藥

○化痰降火湯 治痰火尾骨節痛

陳皮 去白 半夏 姜汁 茯苓 去澤瀉

黃柏 酒炒 知母 酒炒 甘草 各等

右剉必用前胡木香為引蓋陰虛故  
痰盛也若痛不止加乳香沒藥

陰腫如氣若寒所鬱也

○秘方 治小兒偏 五倍子燒存性為末

以好酒調服出汗立愈

○又方 治小兒外 牡蠣不拘多少為末

用鷄子清調塗即消

○又方 治陰囊忽腫或坐地多

蟬退半兩水一大碗煎湯洗腫處其

痛立止若小消再煎再洗後服五苓

散燈草煎服

○又方用葱園內蚯蚓糞以甘草汁調

塗腫處或薄荷汁調亦可

○仙傳方治風熱外腎赤腫痛日夜

啼叫不數日退皮如鷄卵殼愈而復

作用老杉木燒灰入膩粉清油調傳

患處即効

盤腸氣痛者風冷所搏也 小兒盤腸氣

嗜額上有汗是也小兒為冷氣所搏而

然其口開脚冷或大便青色不實上

唇乾者走也此多因生七洗遲感受

風冷而致也急用葱湯淋洗其腹擦

○乳香散 治盤腸氣痛

沒藥 各等分

共為細末以木香煎湯調服  
脫肛者大腸虛冷也

小兒脫肛皆因久患瀉利所致大腸  
頭自萎門出而不收宜用葱湯薰洗  
令軟送上或以五倍子為末敷而頻  
托入又以楮子煎湯洗亦可又以醬  
頭燒存性香油調敷云以此物燒  
烟薰之入自收又以東壁土泡湯先  
薰後洗亦効

○提肛散 小兒大腸氣虛肛門脫出

龍骨 錢 訶子 煨去 沒石子

赤石脂 嬰粟殼 上帶機醋 炙各等分  
右為末用米飲調食前服仍將葱湯  
薰洗令軟效托上

○一方用草麻子搗爛貼頂上腸收即  
去之

○脫肛洗藥

苦參 五倍子 陳壁土  
右等分水煎湯洗次用木賊末搽口

遺尿者膀胱冷弱也

○鷄腥散 治小兒遺尿

鷄腥 一具 煨 雞腸 一具 煨 猪胞 炙  
右為末每服一錢黃酒調服男用雌  
女用雄

○破故帛散

破故帛一兩炒為末每服一錢熱湯  
調下

○桂肝丸 治小兒脾中遺尿不自覺者

官桂為末雄鷄肝一具等分搗丸如  
小豆大溫水送下每日進三服

尿瀝者濕滯脾胃也

○澄清飲 治小兒大便自小便或瀝之如米泔



白朮

茯苓

白芍炒

黃連

姜汁 澤瀉

山查各一錢

青皮

馬分 甘草生三

右劉一劑水煎空心服

便血者熱傳心肺也

凡初生嬰兒七月之內大小便有血

出者此出胎氣熱盛之所致也謂母食酒麵炙煖熱毒等物流火入心胎兒在胎內受之熱毒亦傳於心胎且女子熱入心故小使有之男子熱入胎胎故大便有之治法以生地黃取自汁入蜜以許和勻溫服男女皆效或甘草飲兼服尤効

○甘露飲

治小兒胃中客熱牙宣口臭其欲飲食及目赤腫痛不任藥口舌生瘡咽喉腫痛及身面皆黃腹臌微腫大便不調小便赤澀

熟地黃

生地黃酒洗

天門冬去心

麥門冬去心

枳殼麩炒

茵陳

黃芩

酒炒

枇杷葉

石斛

甘草

各等

右劉水煎食後臨臥服

○一方用生蒲黃油頭髮燒灰各一錢

為末生地黃汁或米飲乳非調同服

下淋者膀胱鬱熱也

○五淋散

治膀胱有熱水道不通淋瀝或冷淋如膏或熱淋如血或如沙石

赤茯苓

赤芍藥

山梔仁各二錢

條黃芩

當歸

甘草各五錢

右劉劑每服三錢燈心一團水煎服

○一方用生地澤瀉木通滑石車前各

二錢

吐血者榮衛氣逆也

○黃金丸

治小兒吐血衄血下血

黃芩不拘多少為末煉蜜為丸如鷄

頭實大三歲兒每一丸

鹽湯化下

○栢枝散

治小兒衄血吐血

栢枝

晒乾

藕節

晒乾

各等分為末

三歲者服半錢藕汁和蜜一匙調白湯下

○一方用山梔子炒黑每用三錢生薑煎服

○又方治咯血吐血用白芍藥為末磨犀角汁調服

○秘方治小兒吐血不止用黃連末一錢豆豉二十粒水煎溫服

小使不通者膀胱火也

○神通散治小便不通或去血小使閉澀不堪言為用昆茶末一錢扁蓄煎湯來送下霎時溲使湧如泉

○五苓散  
猪苓 澤瀉 茯苓  
白朮 各等分 官桂 祇半 右剉下劑

本煎食前服加直前子燈草尤効

大便不通者臟腑熱也

○萬億丸治大便不通如神  
沒藥散治小兒風與熱帶留餘上焦瀉高起大便不通

沒藥 枳殼 枳實 大黃 枳殼 枳實 枳殼 枳實

枳殼 枳實 枳殼 枳實 枳殼 枳實 枳殼 枳實

枳殼 枳實 枳殼 枳實 枳殼 枳實 枳殼 枳實

枳殼 枳實 枳殼 枳實 枳殼 枳實 枳殼 枳實

枳殼 枳實 枳殼 枳實 枳殼 枳實 枳殼 枳實

枳殼 枳實 枳殼 枳實 枳殼 枳實 枳殼 枳實

枳殼 枳實 枳殼 枳實 枳殼 枳實 枳殼 枳實

枳殼 枳實 枳殼 枳實 枳殼 枳實 枳殼 枳實

少用線串起陰乾收貯用時取一個  
要全者放淨磚上四面以灰火烘乾  
以刀從腰切斷如大便閉用上半截  
小便閉用下半截一便俱閉全用為  
細末新汲水調服

水腫者土壅水旺也

○加味五皮飲 治小兒四肢腫滿  
腸水陰水皆可服

五加皮 地骨皮 生薑皮

大腹皮 茯苓皮 各錢 加姜黃

木瓜 各錢 右剉一劑水煎服○

一方去五加皮加陳皮桑白皮

○牽牛散 治小兒諸般腫脹

黑牽牛 半生半炒 取頭細末每服一二匙

桑白皮煎湯磨末香汁調服

黃疸者脾胃濕熱也

目俱黃小便不利  
不得安臥不思食

茯苓 茵陳 山梔 黃連

黃芩 防已 白朮 蒼朮

陳皮 青皮 枳殼 朱苓 各錢

澤瀉 三分 右剉水煎徐徐溫

服○如小便不通加水通○如食傷

不思食加砂仁神麩 炒 麥芽 炒

汗者陰陽偏勝也

○團參湯 治小兒羸汗或心血液盛  
亦發為汗此藥收斂心氣

新羅人參 川當歸 各三錢

右細剉用雄猪心一個切三片每服

二錢猪心一片并木一盞半煎食前

作兩次服

○止汗散 治小兒羸而自汗

故蒲扇灰 如無扇只將  
舊蒲燒灰 為末溫酒調

服

○牡蠣散 治小兒盜汗因食生冷之物過度或熱水淘飯大能損土為木之所傷則不能制其津液故或汗自出也

牡蠣 煨 二錢 黃芪 蜜炙 各一 生地黃 各一

右剉劑水煎服

班者陰陽毒氣也

○治小兒身常發熱風斑及脚指常紅腫此脾經風熱也用防風通聖散去硝黃加鼠粘子酒炒黃連為末亦用防風白芷薄荷黃連黃芩黃芪黃柏煎湯浴之宜避風

解顯鶴節者胎元不全也

○解顯宜

○八物湯有熱加酒炒黃連黃芩甘草水煎服外綿帛緊束及以白芩末敷之

○人參地黃丸 治小兒顯顯開解頭縫主骨髓而腦髓海腎氣不盛所以腦髓不足故不能各

人參 二錢 懷熟地 四錢 嫩鹿茸

乾山藥 白茯苓 牡丹皮

山茱萸 去核 各三錢 右為細末煉蜜為

丸英寶大用人參煎湯研化食遠服

○鶴節宜

○當歸地黃丸 治小兒血氣不充故肌瘦薄骨節呈露如鶴之膝

懷熟地 酒蒸 八錢 山茱萸 酒蒸 去核 山藥 蒸

澤瀉 去毛 牡丹皮 去木 白茯苓 去皮

當歸 酒洗 各三錢 一方加鹿茸 酥炙

牛膝 酒洗 各二錢

右為末煉蜜丸英寶大每用熟水研化食前服仍以天南星炮去皮臍研細末入米醋調敷緋帛上烘熱貼之亦良法也

行遲髮遲者氣血不充也

○行遲宜

○調元散 治小兒稟受元氣不足顯顛  
遲行遲手足如筒  
神昏昏慢齒生遲

乾山藥錢五 人參去淨 茯苓去皮

茯神去皮木 白朮一錢 石菖蒲一錢

白芍各錢 熟芋 當歸

川芎 黃芪錢半 甘草各錢半

右劉生薑三片棗一枚同煎不拘時  
服嬰兒乳母同服

○錢氏地黃丸 治肝腎虛弱骨髓不充  
不能行依本方加酒炙  
鹿茸牛膝五加皮同服自然  
髓生而骨強即能漸行也

語遲者邪乘心也

○菖蒲丸 治小兒語遲

石菖蒲 人參 麥門冬泡去

川芎 遠志車水 當歸

乳香 硃砂 別研各

右為末煉蜜丸黍米大每服十丸食  
遠粳米飲送下

齒遲者腎不足也

○芩薊散 治小兒齒遲

川芎 乾山藥 當歸

白芍炒 甘草炙各二錢半

右為細末每服二錢白湯調下食後  
服將此乾藥末擦牙齦即生

龜胸者肺熱脹滿也

○龜胸丸 治小兒龜胸高如覆掌

川大黃煨六分 天門冬去心 百合

杏仁去皮尖 木通去節 枳殼炒

桑白皮蜜炒 甜葶芳隔 軟石膏各一錢

右為細末煉蜜為丸如棗豆大每服  
五丸溫水化下食後臨臥服仍宜炙  
兩乳前各一寸半上兩行三骨間六

處各灸三壯春夏從下灸起秋冬從上灸起依法灸之

龜背者風邪入脊也

○龜背丸 治小兒龜背

枳殼 楚炒 防風 去芦 獨活

大黃 煨 前胡 去芦 當歸

麻黃 去節各三錢

右為細末麵糊丸黍米大每服十五六丸看兒大小以米飲下食後服仍灸肺俞穴在椎下兩傍各一寸半心俞穴在五椎下各一寸半膈俞穴在七椎下兩傍各一寸各灸三壯以小兒中指節為一寸又炷以小麥大粗灸三壯而已

小兒行遲齒遲解顛顛填五軟鶴膝腎

氣不足當以六味丸加鹿茸補之若因精氣未滿而御女以通多致頭目眩暈作渴吐痰或發熱足熱腰腿酸軟或自汗盜汗二便瀉痛變生諸疾難以名狀余常用六味八味二丸及補中益氣之劑加減用之無不奏效

方見補益

一 小兒五歲不能言咸以為廢人矣但其形色悉屬肺腎不足遂用六味丸加五味鹿茸及補中益氣湯加五味兩月餘形氣漸健將半載能發一二言至年許始發音如常 方見補益

**痘疹**

小兒痘疹何以知腮赤眼胞赤赤時呵欠噴嚏及驚怖耳尖手指水如之證作三日瘡不見升發之藥不可遲敗

毒葛根堪選用解熱表并最為宜寒  
涼之劑慎勿用臟腑一動致災危  
小兒患痘瘡臟腑虛寒者見證  
惡寒寒熱往來 自汗惡風 手足厥冷  
面青 面色既白 目睛青色 糞色青白  
身淨 怠墮嗜臥 一硬清利 吐瀉不渴  
昏瞶 口鼻氣冷 飲食不進 乳食不化  
腹脹 聲音微弱 足脛冰冷 精神懦弱  
懶言 吐乳瀉清 脉浮細而虛  
脉沉細而遲 乃裏虛

小兒患痘瘡臟腑實熱者見證  
面赤 大便閉 身熱壯熱 毛焦唇燥  
唇紫 小便赤 手足極熱 驚悸譫語  
眼黃 口氣熱 吐利而渴 狂亂叫哭  
鼻塞 流清涕 大便焦黃 腹脹不食  
頭痛 身熱痛 煩燥痰壅 胸膈痞悶

喉乾燥 咳嗽喘促 上下失血  
脈浮數而實大 表 脈沉實而數 裏  
痘有十候發熱 初出 出齊 起之

行漿 漿足 回水 收靨 結痂 還元

○初發熱宜  
○加味敗毒散 初起發熱即服此藥神效

柴胡 前胡 羌活 獨活  
防風 荊芥 薄荷 枳殼  
桔梗 川芎 天麻 地骨皮  
右古方除參冬忍補早助火也宜加  
紫草 蟬蜋 蘇葉 麻黃 姜 葱 白帶根  
鱗 執 表 汗 泄瀉 加 猪 苓 澤 瀉 去 此 參 草  
水煎熱服出汗為佳

○升麻葛根湯 發熱之初未分麻痘傷  
皮無 寒傷食等証宜此解散  
慎事

升麻 葛根 白芍各錢 甘草一錢

右到一劑生薑三片水煎服○寒月加蘇葉八分○四肢逆冷加桂枝

一錢半○腰痛當知是痘加桂枝錢半○時氣酷烈發熱太甚乃是毒氣盛加牛旁子一錢半只服前敗毒散

○痘初出宜

○神功散治痘出毒氣太盛血結下片血或吐瀉七日以上前諸症可服解毒

黃芪 人參 白芍

紫草 生芩 紅花

牛旁子各等分 前胡 甘草減半

右到水煎米狗時服○熱甚加黃連

黃芩各一錢未退者再加大黃研入

○有驚者加蟬蜋一個去翅足○若

頭粒淡黑者有寒乘之加官桂一錢

○胡荽酒痘初出時宜用此酒通噴即飲能辟穢毒又以淨脂點兩眼魚防痘入眼

胡荽一束銅錢大細切用好酒熟和與服須更渾身通暢過一二時以帛蘸床油點照於無痘處又出如珍珠光亮數十顆矣如無胡荽即用胡荽子研亦可

○痘出齊宜

○保元湯

人參二錢 黃芪嫩者 甘草一錢

右到一劑生薑一片水煎服四日以前有寒症其色黑慘宜用保元湯加官桂

一五日以後有寒中子裏者用附子理中湯不甚只宜保元湯加官桂



腹痛者毒盛也神功散主之  
面紅不退地界不分者神功散倍前  
胡吐者毒成乘火炎而宜也神功散  
主之泄瀉者火盛而奔越也服神功  
散即止

却用升麻以升提之不可用止瀉  
之藥惟解其毒則自止矣

渴者紅花子湯加牛旁子雖口中如  
烟起即解發渴者或用人參麥門  
冬湯飲之亦可切不可用棗湯大

渴者取真黃土百沸湯碗蓋泡取  
水少加沙糖調飲立止

汗不止者而身已涼乃血隨氣溢也用  
當歸 五錢 黃芪 三錢 酸棗 一錢

其剉一劑水煎溫服立止  
痰用白附子水磨服切不可用二陳

湯使燥陽明經使孤陽無陰不能  
施化也嗽用杏仁煎湯磨白附子  
服

三月內頂陷者非虛也乃火盛陽極  
反為陰降如當午樹枝向下宜用

九味神功散退其火

三四日色慘不明宜用神功散活血  
退火使其瑩滿光明

或有失治不知解毒五六日間以燈  
照之生氣未戕其毒太盛作熟地

界紅燥宜用神功散治之隨觀其  
變而施治猶或可救一二過此則  
不能施其神功矣

認痘法 故曰氣尊血分者生謂火靖

而後出氣得其令頭粒尖而白根顯  
紅而不散譬如一顆珍珠放在胭脂

上疔頭粒白于上見氣升而尊根紅  
干下見血附而安其分也故生故曰  
毒參陽位者死謂帶天而出氣不得  
令頭粒紅紫地界不承譬如解血猪  
肝勢極而不返故死若朱砂胭脂色  
者生息之氣由存可治者也

痘不治法

初出勇壯者不治 出如蚕種者不治  
隨出隨沒者不治 如蚊蟲咬者不治  
氣血相失者不治 倒出者不治  
飲水如促鼻者不治  
與肺氣不能疏理也

大凡七日以前為真實不可投溫燥之劑能助毒也  
八日以後為裏虛不可投寒涼之劑能伐生氣也

起之宜

當起之而不起用川山甲炒成珠研

二錢溫酒調服

血弱不起根底淡薄用保元湯加丁

香三肉桂一錢當歸二錢川芎一錢水煎服

凡痘不起脹灰白色頂陷者氣血不足

虛寒症也宜托裏散加丁香

凡痘紫紅不起脹者火盛血熱宜服內

托散去桂加紫草紅花熱盛加黃芩

若此重陷伏用此藥調川山田炒成

珠為末五分同服

○內托散 治血氣虛損或風邪穢毒初出而不勻快此藥活而包氣調胃補虛內托磨毒使之盡出易收易脫

黃芪 人參 當歸 各二錢 川芎

防風 桔梗 厚朴 白芷

甘草 木香 官桂

各二錢 各三錢

右方於紅紫黑陷屬熱毒者去桂加紫草紅花黃芩○若淡白灰黑陷伏屬虛寒者加丁香救急管桂救表○當貫膿而不貫膿者倍參芪當歸煎熟臨服入入乳汁好酒同參溫服此貫膿之功法也○泄瀉加丁香訖薑肉蔻

行漿宜

八日漿不行其根虛薄血少故耳蓋以初起時毒載血妄行未免躍進其血弱矣至此不能成膿急以歸茸湯益之

○歸茸湯

鹿茸酥炙 當歸五錢 剉酒煎服

凡痘屬虛寒八九白色尤白如水泡頂

○回陽酒

鹿茸酥炙 大附子麵包煨 嫩黃芪去膻皮 當歸酒洗 右剉好酒煎服○兼

有咳嗽加牛膽南星  
灰陷黑陷嘔吐白沫為表虛用木香散寒戰咬牙痒癩泄瀉為重蓋用異功散嘔甚用木香散加白豆蔻  
泄瀉甚異功散加肉豆蔻此正治也  
若未嘗解毒別有法  
乾嘔屬胃虛裏熱異功散

○木香散

木香磨 前胡 黃芪  
白茯苓皮去 白朮 厚朴姜汁炒  
訶子煨取肉 陳皮各一錢 肉桂八分  
人參 丁香雄者五粒

右剉一劑水一鍾煎六分溫服

○異功散

當歸

川芎

人參減半

黃芪

白朮去芦

白茯苓去皮

訶子煨取

大附子麩包煨

去皮

半夏姜汁炒

厚朴姜汁

肉桂各八分

小丁香七粒

右剉一劑水一鍾煎至八分溫服

漿行而作痒此內熱而外為風寒所

束用荊芥穗桑葉緊擦糊粘於頭令

不散燈上燒過却於桌上吹去灰快

放手指定痒處頭用荊芥穗火點痒

處一下即放退患者自以為妙每痒

痘悉點之立止

行漿行足而發疥認定是黑疔痘或

黑而硬或有紅絲或為大此發泡未自

解毒者仍以神功散加雄黃黃芩黃

連大黃煎服却用點法雄黃一錢研

胭脂重浸水令濃調雄黃水點疔痘

項上立時即出紅活亦神法也蓋雄

黃能拔毒胭脂能活血水

漿足宜

此時有效逆胃氣上越欲絕也以真

黃土鼻邊聞之立止

九日而寒者異功散甚者宜姜

九日寒戰大附子半個炮煨熟七

錢乾姜炒黑五錢白朮五錢人參

三錢水煎溫服

此時漿滿或為寒所逼一時痒俱紫

里煎如紫葡萄樣不必驚恐急以

肉桂磨湯服之立見如舊

回水宜

九日十日回水之時元氣重恐真陽

連化其水自然消燥此循環之妙理也其有未曾解毒至此時水不能化反歸于胃與所伏之毒伏于陽明則脾胃受我宜以定中湯治之

○定中湯用真黃土能鎮安胃氣收斂中土取真正黃色不雜者用一塊在碗內百沸湯泡即以磁蓋少傾出用如冷傾入釜內外以熱水頓熱用酒兩盞和藥末研細五分能鎮心胞絡使小腸不奔也雄黃研細一錢能解毒使胃氣寧也二味用和勻以黃土湯以加砂糖溫服二服立止

煩燥悶亂發渴定中湯加片腦半分  
牛旁子湯二盞和服

自寒戰交并等症宜用附子理中湯

有擦破周身不能回水急以新瓦搽作粉搽在破處立收此妙法也

收斂宜

若解毒不盡或未經解毒到當斂而不斂發熱蒸者用甘露回天飲砂糖半酒盞晉沸湯調一大碗溫服立時熱退痘壓萬發萬中回夫之力也

若痘壓時濕壓身外潰之痘淋漓粘滯者宜以甄陶散傳之新瓦不拘多少為細末篩過絹袋包撲患處若乾茄堆積不落內又膏膿即以瓦粉用鴨蛋清調敷立收而落當壓時腹痛不屬其痛着在中院乃熱毒凝滯瘀血作痛也

○手捻散

牛旁子 白芍 桃仁

大黃各一錢 紅花八分 桂枝五分

右剉一劑水煎溫服一服立愈

若將屬時其痘一時盡黑非屬也乃

火極攻裏即凶矣

結痂宜

外潰不結痂者輒陶散傳之

結痂而誤犯風寒惡寒發熱者以補

中益氣湯

○補中益氣湯

當歸 黃芪錢 人參五 白朮八分

紫胡 升麻 乾葛各五分 甘草五分

右剉一劑生薑一片水煎服

結痂後虛煩者宜加味保元湯

○加味保元湯

黃芪二錢 人參一錢 麥門冬去心二

知母一錢 梔子炒一錢 甘草五分

右剉一劑水煎溫服

結痂後有餘熱者以前藥加牛旁子

一錢 白附子一錢

還元宜

痂落血氣尚虛無方宜調理八物

湯主之或十全大補湯

○還元痂落有餘毒覺其癢于臟腑時

復作執腹內疼痛宜牛旁子飲主之

○牛旁子飲

牛旁子 前胡 黃連 黃芩

連翹 白附子 玄參 赤芍各一錢

羌活 防風 甘草各五分

右剉一劑水煎溫服

○五福化毒丹

祖傳經驗秘方 此方見前諸熱 癰毒發 凡痘後不問 經初起 紅腫等用

黑業赤二豆以酸醋浸研漿時時以  
鴨翎刷之隨手退去效

**補遺秘方**

○治小兒痘疹不起發

用李樹上津膠每用此須教米飲之  
即起

○復生丸

小兒痘疹不起發紫黑陷伏  
伏非痘疹初作已發未發服之  
其毒即解五日已前可服其效如神  
大梁鍾雲山傳

當歸 白芍 西葶

升麻 葛根 甘草各五錢

嫩紫草一兩 辰砂二錢

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服  
一丸米雪兩三水送下如無河水亦  
可或糯米湯入酒一匙送下亦可

○桃紅痘疔方

雄黃一錢 紫草三錢

右為細末胭脂汁調將銀簪挑破黑  
疔將藥點入內即效

○發痘方

穿山甲 用前嘴炒 麝香 少許

右為細末六七歲者熱酒調下二分

不可多用蓋被片時通身汗出

○牛黃散

治痘黑陷癰  
牛砂一分 牛黃二厘

右為細末蜂蜜打溫胭脂汁取蜜調  
藥用銀簪刺黑陷上塗之三次一日  
塗一次去黑

**麻疹**

麻疹乃六腑腸胃之熱蒸於肺外感內  
傷併發與痘症表似同裏實異初熱  
三日出脹共三日出而又沒沒而又  
出一週時奇重者遍身緋脹眼亦封

閉有赤白微黃不同仍要紅活最嫌  
黑暗及面目胸腹稠密咽喉纏綿者  
逆發不出而喘者即死與太科癰疹  
相似又與發班相似如錦紋有空缺  
處如雲頭狀麻即如麻遍身無空但  
疎密不同耳仍有夾班夾丹夾瘡同  
出者

初起呵欠發熱惡寒咳嗽噴嚏流涕頭  
眩宜升麻葛根湯加紫蘇忽白以解  
肌切忌太汗班不紅者亦宜乃麻症  
初起之神方潮熱甚加芩連地骨皮  
譫語調辰砂六一散咳嗽加麻黃杏  
仁麥冬石羔咳甚別用京膈散加桔  
梗地骨皮泄瀉宜四苓散便血合犀  
角地黃湯吐血衄血加炒山梔小使赤  
加水通寒熱似瘧小柴胡湯

初起全類傷寒但面赤中指冷為異耳  
已出煩燥作渴者解毒湯合白虎湯喘  
便閉者前胡枳殼湯加赤茯苓大黃  
甘草五味水煎服便閉三四日者小  
承氣湯防風通聖散譫語溺閉者導  
赤散如洩者四苓散加車前木通譫  
語如狂者解毒湯調辰砂六一散木  
便血小便亦見血者犀角地黃湯合  
解毒湯吐血衄血解毒湯加炒山梔  
童便泄瀉解毒湯合四苓散喘兼泄  
瀉瀉瀉者柴苓湯煩渴作瀉者白虎  
湯加蒼木猪苓湯熱盛乾嘔解毒湯  
傷食嘔吐四君子湯夏月因暑作嘔  
四苓散加入參已用豆蔻木香姜桂  
熱藥

府症初起已出已渡及一切雜症與瘧



毒大同但始終藥宜清涼雖麻喜清涼痘變溫賤不易常道虛則補實則瀉醫家活法故治麻亦有血虛而用四物湯氣虛用四君子湯天寒傷冷則溫中理中之藥一時之權也麻症沒後餘熱內攻循衣摸床譫言妄語神昏喪志者死如執鞭餘毒未除必先見諸氣色雖預防之始終以升麻葛根湯為王或消毒飲解毒湯隨症選用仍忌魚腥葱蒜之物

○升麻葛根湯 方見痘瘡

○辰砂六一散 即益元散方見中暑加辰砂二錢名辰砂六一散

○涼膈散 方見火證

○四苓散 即五苓散去利方見中暑

○犀角地黄湯 方見吐血

○小柴胡湯 方見傷寒

○解毒湯 即黃連解毒湯方見傷寒

○白虎湯 方見傷寒

○小承氣湯 即大黃枳實厚朴水煎服

○防風通聖散 方見中風

○導赤散 即生地黃木通甘草淡竹葉七片水煎服

○柴苓湯 即小柴胡湯合五苓散是也

○四君子湯 方見補益

○四物湯 方見補益

○理中湯 方見中寒

○消毒飲 即牛勞子防風羌活甘草水煎服

新刊萬病回春卷之八

耻集

太醫院醫官金谿雲林龔廷賢子才

編輯

門人 醫官同邑胡廷訓

慈谿羅國壑

弟醫官廷器

姪 懋官同校

金陵書坊對峰周曰校刊行

癰疽

脉癰疽脉數浮陽沉陰浮數不熱但惡

寒侵若知痛處急灸或針洪數病進

將有膿滲澄實緊促內消可禁宜托

裏者脉虛濡遲或托瀉微潰後亦宜

長緩易治短散則難結促代見必死

無疑

瘡瘍之症當察經之傳受病之表裏人

之虛實而攻補之假如癰痛熱渴大便閉結者邪在內也疎通之瘡癰作痛寒熱頭疼者邪在表也發散之癰癰痛甚者邪在經絡也和解之微癰微痛而不作膿者氣血虛也補托之漫癰不痛或不作膿或膿成不潰者氣血虛甚也峻補之色黯而微癰痛或膿成不出或腐肉不潰者陽氣虛寒也溫補之若泥其未潰而驟用敗毒復損脾胃不惟癰者不能成膿而潰者亦難收斂七惡之症蜂起多致不救經云諸痛癢瘡瘍皆屬心火若癰赤燥燥發熱引冷便閉作渴脉洪數實是其常也雖在嚴寒之時必用太苦寒之劑以瀉熱毒若脉微皮寒為病陽弱飲食不入嘔吐無時手足

逆冷是變常也雖在盛暑之時必用太辛溫之劑以助陽氣經曰用寒遠寒用熱遠熱有假者反之雖違其時必從其症

癰疽大按乃痛者病深小按便痛者病淺按之處腫不復者無膿按之處即復者有膿不復者可消若按之都牽強者未有膿也按之半軟者有膿也又手按上下不熱者無膿若熱甚者有膿凡覺有膿急當破之無膿但氣腫若有血慎之慎之不可針破也癰者大而高起屬乎陽木肺之氣所生也

疽者平而內發屬乎陰五臟之氣所成也

凡癰疽未破毒攻臟腑一毫熱藥不敢用若已破潰臟腑既腐飲食少進一

毫冷藥不敢用也

腫瘍者癰疽未見膿而腫也

腫瘍內外皆壅宜以敗毒表散為主  
說欲行大黃者宜審其虛實之原

癰疽初起之時宜

○灸法 癰疽發背初起

凡人初覺癰疽發背已結未結赤熱  
腫痛先以濕綿覆其上立視候其赤  
先乾處即是結疽頭處取大蒜切成  
片如三箇銅錢厚安在頭上用火艾  
壯灸之三壯換一蒜片痛者灸至不  
痛不痛者灸至痛時方住最要早覺  
早灸為上方發一二日者十灸十愈  
三四日者六七愈五六日者三四愈  
過七日則不可灸矣若有十數頭作  
一處生者用火蒜湯成膏作餅子鋪

瘡頭上聚艾燒之亦能安也若背脊上

初發赤腫內有一粒黃如粟米者即

用獨蒜切片如煎灸法治之次日去

癰膿自潰也

竹筒吸毒方 諸般惡瘡並治

用苦竹長一二寸用頭節剝去青

皮似縑薄為佳其大小隨瘡斟酌應

毒瘡初發時用

白茯苓 蒼朮 烏柏皮

白子朴 各五錢重

右四味剉片用木一椀同煎竹筒煎  
麩以藥將乾為度乘竹筒熱以手按  
之於瘡上須之其筒口粘在瘡上不  
必手按也仍更用藥分兩再煎候  
煎竹筒冷以手按去再換執者如煎  
法其膿自吸入筒中而瘡愈矣

○荊防敗毒散

治癰疽疔腫發背乳癰等症增寒壯熱甚者頭痛拘急狀似傷寒一二日至四五日者一二劑即愈其毒輕者內自消散

防風 荊芥 牙疔 獨活

柴胡 前胡 薄荷 連翹

桔梗 枳殼 川芎 茯苓

金銀花 甘草 大便不通

加大黃芒硝熱甚痛極加芩連

右挫生薑煎服瘡在上食後服在下

食前服

○千金漏蘆湯

治一切惡瘡腫毒丹瘤瘰癧疔腫魚睛疔發癰疽初起一二日便如傷寒頭痛煩渴拘急惡寒肢厥四肢沉重恍惚悶亂坐臥不寧皮膚腫壯熱大便閉結小便赤黃急治難癒勿服

漏蘆 白欬 黃芩 麻黃

枳實 升麻 芍藥 大黃

甘草 芒硝 連翹

右剉作劑水煎服

○追風通氣散

治癰疽發背腦疽流注腫毒疔瘡壞病治外則強患於未萌之前按根於既愈之後此藥順氣舒血祛積胃本不傷元氣滌蕩邪穢自然通順不生癰疽治打破傷折筋氣血不和氣諸氣痞塞塊痛腰痛一切痰飲為患

當歸 何首烏 木通 去毒

赤芍 白芷 小茴香

烏藥 枳殼 甘草

右剉劑酒水各半煎病在上食後服在下食前服

一癰疽初萌必氣血凝滯所成為日既久則血積於所滯而後盛作故病人氣血成者減當歸多則生血發于他所再結癰毒生生不絕矣

一腦疽背發在上者不通惡導虛下

元為上成下虛之病難於用藥

一癰疽生痰有二一胃寒生痰加半夏

一癰疽生痰有二一胃寒生痰加半夏

一癰疽生痰有二一胃寒生痰加半夏

一癰疽生痰有二一胃寒生痰加半夏

健脾化痰二乃鬱而成風痰加結梗  
生薑

一流注可加獨活流注者氣血凝滯故  
氣滯則血留而凝加獨活者可以動  
一身血脉血脉既動豈復有流注乎

一方以醋浸藥貼痛處以椒搥之即消

一流注起於傷寒傷寒表未盡遺毒於  
四肢經絡溢於所滯而後為流注也  
如病尚有潮熱則裏有寒而未盡散  
加升麻蘇葉熱不退加乾葛頭痛加  
川芎薑葱無汗用酒水各半煎大能  
行血生氣故也

一發背既久不愈乃前醫用涼藥過也  
涼藥內傷其脾外冰其血脾主肌肉  
脾既受傷飲食必減顏色痿痺肌肉  
不生血為血絡血一受冰則氣不旺

肌肉糜爛故必理脾脾健肉自生本  
方去木通少用當歸加厚朴陳皮盛  
則加白豆蔻

凡病癰疽之人有泄瀉者不可便服  
此藥宜先服蠟燭丸止瀉後用此

一腸肚內癰宜十宣散與此方相間服  
之金宜加忍冬藤

一腫毒堅硬不穿加川芎獨活麻黃連  
鬚葱煎服出汗即穿

一打傷折在頭上去木通加川芎陳皮  
經年腰痛加葶藶玄胡索酒煎

一脚氣加木瓜檳榔穿山甲木煎  
一痰飲為患或喘或咳或暈頭痛睛疼

遍身拘急骨節痺攻胸背頭項肢膝  
腰腿手足聚結腫硬或痛或不痛按  
之無血潮雖或有微紅亦淡薄不熱

堅如去破之無膿或有薄血或清水  
或如乳汁又有壞肉如波絮或又如  
瘰癧在皮肉之間如鷄卵可移動軟  
活不頑破之亦無膿血針口弩肉突  
出惟覺咽喉痰實結塞作寒作熱加  
南星半夏

○神功散 治癰疽發背一切疔毒并瘰癧  
癰等症已破未破或患毒神效

川烏 炮去 川黃柏 炙去粗皮

右爲細末用唾調成膏如唾少漱口  
水亦可發背癰疽等瘡縫起者敷患  
處留頂候藥乾用淘米水時常潤濕  
每日藥敷一次如瘡已成重患將潰  
爛者先將槐枝艾葉煎湯頓溫將瘡  
洗淨用絹帛展去膿血以香油潤患  
處用綿紙仍照患處前成員錢留頂  
貼上後用藥全於紙如乾依前用淘

米水潤日換一次聽其自然流膿不  
可手擠如敷藥後病人瘡覺作痛減  
熱卽愈如生肌則腐肉自落腐如不  
落者剪割亦可最不宜用針發背不  
宜貼膏藥片醫瘡并去別醫止飲別  
藥方可治忌氣怒房事勞復并芋眼  
體氣飲酒之人飲食忌酒并羊雞魚  
肉瓜茄姜辣之物若因氣怒反復發  
腫依前治之如治對口并癰疽不必  
洗去舊藥逐次添藥恐動瘡口惡風  
也一腫毒加南星赤小豆等分醋調  
塗立消姜汁亦可

○真人活命飲

治一切癰疽疔腫不問  
陰陽虛實善惡腫潰大  
痛或不痛然當服此未潰之先與初  
潰之際如毒已大潰不可服初用  
劑太熱已退然後隨症調劑  
治其功甚捷成仙方也

穿山甲

三大片切蛤  
粉炒成珠

天花粉

甘草節

乳香明透元

赤芍

白芷各一錢

防風

貝母各七

沒藥

皂角刺各五分

陳皮

歸尾各一錢

金銀花三錢

右剉一劑好酒煎空心熱服能飲者服後再飲酒三五盃再煎服在背俞倍皂角刺○在腹膜倍白芷○在腳次加瓜蒌仁二錢○在四肢倍金銀花

○呂洞賓仙傳化毒湯治二疽發背乳毒初起服之立消已下成已潰服之立愈

防風

甘草節 白芍

茯苓

貝母 黃芩

連翹

白芷各一錢 天花粉

金銀花各一錢 半夏七分

乳香

沒藥各五分

右剉一劑好酒煎胸前飯前服背上飯後服下部空心上部食後俱要出汗為度如無汗用末香薰脚膝腕內被蓋汗出而愈

○神仙排膿散治惡瘡毒風毒方瘡背花瘡小兒惡瘡膿血俱從大便中出赤治氣滯腹脹及婦人經閉不通此方壯實之人可用羸弱者當慎之

大黃

十二兩酒浸

沒藥

白芷

沉香

木香

乳香

川山甲

陳壁土炒

右各為細末量入虛實用之實者不過三錢虛者二錢半臨臥用好生酒調服服後禁飲食湯水半日五更覺腹內收痛重三五次以稀米粥補之



服此藥內有川山甲熟令人作嘔須  
忍之即嚼生葱可止凡後以此藥要  
誠意不可令婦人鷄犬見又不可多  
合恐久放則不効矣

○芙蓉膏 治瘡疽發背諸毒

芙蓉葉 或皮或根亦可 黃荊子

右各等分入石臼內搗極爛用雞子  
清調搽於瘡上留頂不過二次收功  
頂如烟起立時止痛其効如神

○一方 治疥癬瘡疔不問已潰未

白全鳳花科連根帶葉搗爛先用陳  
米醋洗淨患處後敷藥一日一換瘡  
將好用桑葉醋煮丁滾即撈起貼瘡  
上即生肌收口而愈

潰瘍者癰疽之膿已潰出也

瘡貴內不外皆虛自以補接為主設欲

行香散首宜防其虛實之失由是言  
之則癰疽之腫時與潰時不同

癰疽已潰之後宜後方 李氏云疽疾將

全大補湯以補氣血宜切

○托裏消毒飲 治一切癰疽六七日未

潰已成即潰能壯氣血固脾胃使毒

氣不能內攻使毒膿易潰肌肉易生

切不可早用生肌之藥恐

毒未盡反增潰爛難愈

金銀花 三錢 黃芪 三錢 天花粉 各二錢

防風 白芷 當歸 酒洗

川芎 桔梗 厚朴 姜

穿山甲 煨成 皂角刺 三錢 陳皮 各

右到一劑酒水各一盞煎服瘡在上  
食後服在下空心服後用水煎服

○千金內托散 治瘡疽癰毒未成者速

出無用毛格惡肉自去不用刀針服

藥後疼痛頓減此藥活血勻氣調胃

補虛祛風邪辟穢氣乃王道之劑宜多服之太効

黃芪蜜炙 人參 當歸酒洗各二錢

川芎 防風 桔梗

白芷 厚朴姜升 薄荷

甘草生用各一錢 加金銀花亦好

右為細末每服二錢黃酒調下不飲酒木香湯調下亦可或都作二劑用酒煎木香五錢○癰疽腫痛倍白芷不腫痛倍官桂○不進飲食加砂仁香附○痛甚加乳香沒藥○水不乾加知母貝母○瘡不穿加皂角刺○咳加半夏陳皮杏仁生姜五片○太便閉加大黃枳殼○小便澀加麥門冬車前子木通燈草

○十全大補湯治癰疽潰後補氣血進飲食實為切要凡膿血出多陰陽兩虛此藥有相生起死之功但不小經絡不載時令醫者觸類而長之可也

或見腫平痛實遂以為安慢不知脊無補調養之功愈後虛証復見因而轉為他病而危劇者多矣

○神僊蠟燭丸 治癰疽及肺癰腸癰能消毒固臟腑止疼補護脂膜止渴消化膿癰疽潰後宜兼治諸瘡毒粉瘤瘰癧核三五丸者半料即消不問惡瘡新起者亦効

黃蠟二兩 白礬三兩

右為末溶蠟為丸梧子大每服三十丸酒下不飲酒熟水下一日服三次肺癰蜜湯下咳嗽薑湯下

五善七惡王治 夫善者動息自寧飲食知味便利調勻膿漬腫消水鮮不臭神彩精明語聲清明體氣和平是也此屬腑症病微邪淺更能慎起居節飲食勿藥自愈

惡者乃五臟虧損之症或因汗下失宜榮衛消鑠或因寒涼尅伐氣血不足或因峻厲之劑胃氣受傷以致真氣虛而邪氣實外似有餘而內實不足法當純補胃氣多有可生不可因其惡遂棄而不治

若大渴發熱或泄瀉淋閉者邪火內淫一惡也竹葉黃芪湯氣血俱虛八珍湯加黃芪麥門五味山茱萸如不應佐以加減八味丸煎服

若膿血既泄腫痛尤甚膿色敗臭者胃氣虛而火盛二惡也人參黃芪湯如不應門五味補湯加麥

若目視不正黑睛緊小白睛青赤瞳子上視者肝腎陰虛而目系急三惡也六味丸料加炒山梔麥門五味子如不應門五味補湯加炒山梔麥門五味

若肩背不便四肢沉重者脾腎虧損五惡也六君子加大棗生薑如不應門五味補湯加參平肺散降火傷肺六味丸加五味子煎服

若不能下食服藥而嘔食不知味者胃氣虛弱六惡也六君子湯加木香砂仁如不應急加附子

若聲嘶色敗唇鼻青赤面目四肢浮腫者脾肺俱虛七惡也補中益氣湯加大棗生薑如不應附子或用十全大補湯加附子炮薑

若腹痛泄瀉咳逆昏憤者陽氣虛寒氣內淫之惡症也急用托裏溫中湯後用六君子湯加附子或加薑桂溫補

若有潰後發熱惡寒作渴或怔忡驚悸

盜汗不寧牙關緊急或頭目赤痛自汗盜汗寒戰咬牙手撒身熱脈洪大

汗盜汗寒戰咬牙手撒身熱脈洪大

汗盜汗寒戰咬牙手撒身熱脈洪大

汗盜汗寒戰咬牙手撒身熱脈洪大

汗盜汗寒戰咬牙手撒身熱脈洪大

按之如無或身熱惡衣欲投於水其脈浮大按之微細衣厚仍寒此氣虛極傳變之惡症也

若手足逆冷肚腹疼痛泄痢腸鳴飲食不入吃逆嘔吐此陽氣虛寒氣所乘之惡症也

若有汗而有惡寒或無汗而惡寒口噤足冷腰背反張頭項勁強此血氣虛極變症之惡症也急用參芪歸木附子救之問有可生者

大抵五善見三則吉七惡見四必危虛中見惡症者難治實症無惡候者易治

○六味丸一名六味地黃丸此壯水之劑夫人

之生以腎為主凡病皆由腎虛而致此方乃天一生水之劑無有不可用者世所罕知若腎虛發作渴小便淋

閉痰氣壅盛咳嗽吐血頭目眩暈小便短少眼花耳聾咽喉燥痛口舌瘡裂齒不堅固腰腿痠軟五臟齊損肝經不足之症尤當用之水能生木故也若腎虛發熱自汗盜汗便血諸血失瘖水泛為疾之聖藥血虛發熱之神劑也

熟地黃用生者自製八兩 山茱萸酒浸去核取肉

山藥各四兩 白茯苓去皮

牡丹皮 澤瀉各三兩

右地黃酒蒸黑杵膏餘為末煉蜜丸

梧子大每服七八十九滾水下

○八味丸治命門火衰不能生土以致

症不能消滯收斂或飲食不思或食而不化膈腹疼痛夜多漩溺即六味先加肉桂附子各一兩經云益火之源以消陰翳即此丸也

○加減八味丸治瘧疽瘡瘍瘰癧後及將瘥口乾渴甚舌或生黃

及未患先渴此腎水不能上潤致心  
火上炎木不能既濟故心煩燥小  
便頻澀或自濁陰痿飲食減少肌膚  
瘦削諸症服此以生腎水降心火諸  
症頓止及治  
舌生蒼苔不絕

山藥 一兩

山菜黃 去核淨肉 酒浸拌膏

桂心 去粗皮

澤瀉

白茯苓 去皮各五錢

五味子 二兩半

牡丹皮 五錢

熟地黃 用生者八兩 酒拌研細蒸

搗膏

右為末入膏加蜜少許同丸梧子大  
每服六七十丸五更初未言語前或  
空心用鹽湯送下

○補中益氣湯

治元氣虛損或因起伐  
惡寒發熱肢體倦怠飲  
食心思或不能起發消散生肌收斂  
或兼飲食勞倦頭痛身熱煩燥作渴  
脈洪大或虛  
或微細軟弱

黃芪 蜜炒

人參

白朮 去蘆

甘草 炙各一錢

當歸 一錢

陳皮 五小

升麻

柴胡 各二

右到一劑薑棗煎服

○四君子湯

治脾胃虛弱或因起伐脾  
以補脾胃諸症自愈若誤用攻每七  
惡隨至脾胃虛弱飲食不思或食而  
難化或欲作嘔或大便不實若脾胃  
氣虛瘠山出血吐血便血尤宜用之  
蓋氣能攝血故也凡氣血俱虛之症  
宜此湯但加當歸脾胃既壯飲食自  
進陰血自生若用四物湯沉陰之劑  
脾胃復傷諸症蜂起若命門火衰而  
脾土虛寒必用八  
味丸以補土母

人參

白朮 去蘆

茯苓 各二

甘草 炙

右到劑姜棗水煎服

○六君子湯

治脾胃虛弱或寒或熱  
此湯以壯榮氣諸症自愈  
即四君子湯加陳皮半夏

○八珍湯

治脾胃傷損惡寒發熱煩燥  
膿水清稀久不能愈  
即四君子四物合方

○十全大補湯

治瘡瘍氣血虛弱腫痛  
自汗盜汗食不進或瘡瘍膿消寒熱  
眩暈似中風狀即八珍湯加黃芪肉桂

○托裏溫中湯

治霍亂膿瀉元氣虛寒

或因冠伐胃氣脫膈腸

鳴腹痛大便滯泄神思昏

蹟此寒寒內陷緩則不治

羌活 附子 炮去皮脂

益智 丁香 各一錢 乾薑 炒三錢

沉香 木香 茴香

○人參黃芪湯

治瀉瀉飲食少

思無睡發熱

人參 白朮 陳皮

麥門冬 蒼朮 各五分 升麻 各五分

黃柏 炒四分 右剉水煎服

○竹葉黃芪湯

治瀉瀉氣血虛

胃火盛而作渴

淡竹葉 黃芪 麥門冬 黃芩 炒

芍藥 人參 半夏

石膏 甘草 生地黄 二錢

右剉作三劑水煎服

○人參平肺散

治心火剋肺傳為癩痿

隔痞滿咽嗌不利若因肝木太過而

治當補肺若因腎水不足而患當補

脾肺若因心火旺而

而自病當利小便

人參 茯苓 陳皮

地骨皮 甘草 各一錢 知母 炒七分

五味子 青皮 去穢 天門冬 去心各四分

桑白皮 炒一錢 右剉三劑水煎服

一癰疽發背諸瘡出膿潰爛日久不愈

飲食少思身體倦怠口舌乾燥或寒

熱往來驚怖少睡用補中益氣湯去

柴胡加蒼朮麥門冬神麴五味子黃

柏以睡加炒酸棗仁瘡肉生遲加白

麩一錢肉桂五分如膿多或清倍加

黃芪人參當歸白朮

外治敷貼之藥

○琥珀膏 治癰疽發背諸腫毒久年頑瘡

香油四兩下沉香一錢燂浮待油熟去之次不嫩松香八兩文武火不在手攪如琥珀色在火入乳香沒藥銀珠血竭各一錢為末攪入膏內令勻退火毒用油紙攤貼神効

○白龍膏 治背疽及曠瘡背効

香油四兩煎數沸入官粉二兩研細次入黃蠟一兩溶化攪勻退火待藥將乾面用厚連四紙剪大小不一拖藥在上收候若貼時先將葱鬚煎湯洗淨貼之

○治發背

官粉不拘多少研細用槐枝艾挺剉碎并沙官粉黃色玉龍艾母各一兩

入銀珠一錢研勻用泪蠟油調攤舊

棉花上貼之

一瘡瘍肌肉不生若赤色而不生者血熱也四物湯加牡丹皮若膿水清稀氣血俱虛也十全大補湯食少體倦脾氣虛也補中益氣湯煩熱作渴起居如常胃火也竹葉黃芪湯煩熱作渴日哺熱甚腎虛也用加減八味丸



遠頂起核名曰蟠蛇癰○延及胸腋  
下者名曰瓜藤癰○左耳根腫核者名曰惠榮癰○右耳根腫核者名曰蜂窩癰

結核連續者為癰癰也形長如蛤者為馬刀也

夫癰癰初發必起於少陽經不守禁戒必延及陽明經大抵飲食厚味鬱氣之積曰毒曰風曰熱皆此二端招引

變換須分虛實被實者故易自非痛  
 斷厚味與發氣之物雖易亦難殊為  
 慮以其屬膽經主火斷有相火而且  
 氣多血少婦人見此若月信不作寒  
 熱可生稍久轉為潮熱其証危矣自  
 非斷欲絕慮食淡雖神聖不可治也  
 瘰癧先從結喉起者

紫蘇 烏藥 枳殼 桔梗

柴胡 前胡 防風 羌活

獨活 川芎 芍藥 茯苓

大腹皮 甘草各等分

右剉水煎食後服

瘰癧先從頂上起者

紫蘇 連翹 桔梗 枳殼

防風 柴胡 羌活 獨活

白芷 當歸 川芎 芍藥

甘草各等分

右剉水煎食後服

瘰癧先從左邊起者

紫蘇 厚朴 防風 羌活

枳殼 桔梗 前胡 當歸

川芎 芍藥 蘿蔔子

蘇子 甘草 右剉水煎食後服

瘰癧先從右邊起者

紫蘇 香附 青皮 烏藥

半夏 厚朴 桔梗 茯苓

柴胡 防風 羌活 甘草

右剉水煎食後溫服

人稱壯者宜

○內消散 治瘰癧結核

朱砂 血竭各錢 斑蝥去翅足三

右為細末每服一分空心燒酒調服



一日一服未破者三五立消已破者  
內服此藥外用金頭蜈蚣一條焙研  
極細末用麻油一小鍾浸三日夕搽  
患處其瘡即腫潰過一二日腫消可  
貼膏藥瘡勢大者二十日瘡小者十  
餘日可保平復

○琥珀散 治瘰癧結核內消神效

滑石 白牽牛頭

黃芩 姜蚕 各一

琥珀 二錢 木通

連翹 枳殼

赤芍 柴胡 各五

斑貓 去翅 甘草 各三

右剉作六劑水煎服

○斑貓散 即神效散

斑貓 去翅足 川山甲 土炒

姜蚕 去頭 丁香

白丁香 苦丁香

紅小豆 磨刀泥 各一

右為細末每服一錢五更無根水調  
服至末時打下毒物其形如鼠後用  
田中野菊花焙黃色為末陳醋調貼  
瘡上一日一換七日全安

○赤白丸 治瘰癧未破

白礬 三兩 朱砂 九錢

右為細末酒糊為丸菜豆大每服二  
十丸清茶送下日進三服藥盡即消

人虛弱者宜

○益氣養榮湯 治瘰癧 瘰癧流注  
或四肢患腫肉色不變  
或日晡發熱  
或潰不斂

黃芪 人參 白朮 各一

當歸 川芎 白芍 各半

生芩 陳皮 香附

貝母去心各一錢 柴胡

桔梗炒 地骨皮 甘草炙各五分

右剉一劑水煎食遠服○有痰加橘紅○脇下刺痛加青皮木香○午後有熱或頭微眩加炒黃柏○膿水清倍參芪當歸○女人有鬱氣胸膈不利倍香附貝母月經不通加牡丹皮當歸

○抑氣內消散 治瘰癧并諸痛結核

當歸 川芎 白芍酒炒

白木去蘆 青皮去穢 陳皮

半夏姜汁炒 桔梗 羌活

白芷 獨活 厚朴姜汁炒各八錢

防風 黃芩 烏藥

香附 檳榔各一兩 蘇葉一兩

沉香二錢 木香 人參

粉草各五錢

右剉水煎溫服服十餘劑即瘰癧若再服照分兩製酒糊為丸如梧桐子大每服七十丸酒下

瘰癧外施之藥

○神品膏此膏久不愈瘰癧瘡神效

真香油一斤 官粉二兩 黃蠟二兩

乳香 沒藥 孩兒茶

血竭各四錢 胡椒六錢

先將香油熬滴水不散方下官粉熬成膏下黃蠟再熬滴水成珠離火方入細藥瘡久者胡椒加半攪勻入磁器內收貯退火毒油蠟紙攤貼每用先將葱鬚花椒艾槐條熬水洗瘡淨後貼之

○奇効膏 此膏能去毒

真香油一斤二兩 大黃六兩入油燻  
胡蘆去渣慢火下淨黃丹半斤慢火  
再熬滿水成珠下古石灰炒過五錢  
乳香四錢沒藥四錢黃蠟二兩成膏  
用湖暹紙攤貼

○治瘰癧鼠瘡甚効

嫩槐條一斡艾四兩川椒三兩  
右三味用新太砂鍋一箇盛水滿煎  
至七分去渣待溫將所患之瘡徐徐  
洗一炷香去膿水并甲用軟白布按  
乾待至午時仍將藥渣入水一鍋又  
煎至六分去渣照前洗一炷香按乾  
待晚仍將藥渣洗一炷香次日用大蒜  
搗切薄片圍瘡止用麥子大艾炷灸  
蒜上如瘡再灸以痛為止漸漸自愈

○烏龍膏 治瘰癧潰爛久

水驚子帶壳炒存 柏葉炷  
人中血即亂髮 青龍背即銅牌面  
帛錢灰 飛羅麵各  
右俱為末用好陳米醋調成膏塗瘡  
上外用紙貼

○瘰癧膏

真香油四兩象皮二錢熬熟去滓入  
黃蠟三錢官粉一兩五錢離火燒溫  
入沒藥乳香各三錢孩兒茶一兩龍  
骨一錢伍分血竭一錢攪勻以磁器  
收貯任意貼之

馬力瘡者項側有瘡堅而不潰是也

○柴胡通經湯

柴胡 連翹 當歸尾  
黃連 黃芩 牛蒡子

三稜各一錢 桔梗二兩 生甘草一錢  
紅花小許

右剉水煎食後服已昏藥泄大便

散腫潰堅湯治馬刀結核硬如石或以

在上或於腋下皆屬手足小陽經及

瘰癧通於頰下或至頰重堅而不潰

在足陽明所出或瘡已破出水並皆

冷之兼治癰漏大如升久不潰者

昆布洗 海藻微炒 黃柏酒炒

知母酒浸 天花粉 桔梗各五錢

龍膽草四錢 三稜酒炒

莪朮各三錢 連翹 黃連

黃芩酒炒 乾葛 白芍酒炒各

升麻 柴胡各五錢 甘草二錢

歸尾五分

右剉每一兩水二盞先浸半日前至

一盞去渣熱服於臥處仰定在高處

頭微低每盞一口作十次嚥下至服

畢依常安臥取藥在胸中停留之意

也別攢半料作細末煉蜜為丸蒸豆

大每服百丸或百五十丸用此藥湯

留下口送下

一婦人瘰癧後遍身作痺脈大按而虛

以十全大補加香附治之而愈大凡

潰後午前痛作氣虛午後瘰癧作血虛

若作風症治之必效

一儒者瘰癧愈後軀瘦發熱晝夜無定

此足三陰氣血俱虛用六珍加來門

五味三十餘劑又用補中益氣加麥

門五味及大味丸而愈

**疔瘡**

疔瘡皆生四肢發黃泡中或紫黑必先

瘡後痛先寒後熱也

其中或此黑色有條如紅絲直上

瘡

卒之際，急以針於紅絲所至處，必刺出毒血，然後以蟾酥可藥於刺處，塗之。針時以病者知痛出血為好，否則紅絲入腹，攻心必至危矣。疔瘡者，風邪熱毒相搏也。

○追疔奪命湯 專治疔瘡

防風 細辛 各八分 羌活

獨活 黃連 甘草節

姜蚕 各一分 赤芍 六分 蟬退 四分

澤蘭葉 五分 青皮 金銀花

獨腳蓮 紫河車 各一分 各 七分

右到五錢，先服倍益銀花一兩，澤蘭

一兩，以用葉 生姜十片，同葉搗爛好

酒，銚執泡之，去渣，執服，不飲酒者水

煎亦可，然後用酒水各一斗，煎生姜

十片，熱服出汗，病退減後再加大黃

五錢，同煎，執服，以利三五天去餘毒

若有膿，加何首烏、白芷、菴。○在脚加

檳榔、木瓜。○要通利，加青皮、木香、大

黃梔子、牽牛。

○龍芽一醉飲 治疔瘡如神

龍芽草五月端午採收，陰乾，將好酒

浸搗取汁，量加乳香、沒藥、金豆粉入

汁內，同飲，將渣敷瘡上，此日不許吃

一匙茶水，只可飲酒，就洗面亦不可

用水。

○秘傳妙方 治誤食廬牛馬

用柏油、樹葉搗爛絞汁，一二碗頓服

得大瀉，毒氣乃愈。如冬月無葉，控取

嫩根研水服之，以利二三次為度。

○神効丹 即點舌丹，治傷寒初起，諸般

身痒痛，又治傷風咳嗽，鼻流涕，喉痛，又

嗽小兒痘瘡，異胎不起，喉閉腫痛，又

治毒毒并  
破傷風

雄黃

朱砂

片腦各分

乳香

沒藥

輕粉分

血竭

真蟾酥

射者當

右共為末用酥油或乳汁為丸扁豆  
大每一丸嚼化用好酒嗽嚥下

○飛龍奪命丹

治疔瘡腫痛皆發乳癰  
惡瘡服之便有頭跡不痛者服之便  
痛已成者服之立愈此皆惡証乃藥  
中至宝危者  
服之立安

雄黃

蟾酥

乾者二錢

銅綠

乳香

沒藥

膽礬

寒水石

朱砂研為

血竭

輕粉

片腦

麝香

蜈蚣

黃一條酒浸炙  
去首足

蝮牛

台件俱為細末先將蝮牛連殼研如

泥和藥為丸如菜豆大如丸不乾入

酒打麵糊丸之每服二十丸用葱白

三寸令病人嚼爛吐於男左女右手

心將丸藥裹在內用無灰熱酒三四

盞送下於避風處以衣被蓋之約人

行伍里之久再用熱酒二三盞以助

藥發熱大汗為度如重者無汗再進

二丸汗出即効如疔瘡走黃過心者

并出汗冷者難治病人不能嚼者

研爛裹之與服瘡在上食後服在下

食前服忌冷水黃瓜茄子油膩鷄魚

肉濕麵一切發物不可食

○神仙解毒丸

治一切疔瘡發背魚口  
諸般惡瘡無各腫毒初  
發一二服  
即消

白礬不拘多少溶化作丸如菜豆大  
硃砂為衣每服十丸用連翹葱七小

根木煎至一碗送下汗出立愈已成者不傷未成者即消

疥瘡外施之藥

○蟾酥丹

用大癩蝦蟇以針破背脊上<sub>手</sub>捻出酥干油紙上或桑葉上用竹篾刮下然後搗在背陰處自乾取用  
蟾酥以白麵黃丹等分搗和凡如麥粒狀針破患處以一粒內之

○類聖散

治一切疥瘡惡毒厚腐神效

川烏 草烏 細辛 白芷

蒼朮 薄荷 防風 甘草 各五錢

右為細末鷄子清調塗患處留頂

○追毒膏

治諸般反毒及無名腫毒

廣木香 乳香 各五錢 青木香

沒藥各一兒茶二錢血竭一分

芙蓉葉 白芨 各四兩

右各為細末勻在一處臨用時有瘡大小以生蜜調塗患處以綿紙附之不過三五次即消

○疔毒方

急將毒用針刺破葱白搗爛敷上手<sub>指</sub>繫在人行五里之時其疔出然後用靛醋洗淨

○一切反瘡

用黃花苗老葱蜂蜜共一處搗爛貼瘡即好

○治疔瘡方

核桃仁一箇古銅錢一箇二者細碎黃酒送下至死不過二服其效如神

○小奪命散

治腦疽及疔瘡惡毒無名腫毒其效如神

千頭子 即掃帚子 槐花子 地丁

右三味各等分水煎通口溫服加糖  
酥酥許許木木奴奴

○鐵柱杖

治疔瘡發背頭風

用草烏頭不拘多少去皮淨為末用葱白去鬚葉搗爛為丸豌豆大以雄黃為衣每一丸先將葱細嚼熟酒下或惡心吐三四日冷水一斗止之即臥以被厚蓋汗出為度

一男子患疔服奪命丹汗不止而瘡不痛熱不正而便不利此汗多亡陽毒氣盛而真氣傷矣用參芪歸木芍藥防風五味子二劑諸症悉愈惟以小便不利為憂余曰汗出不宜利小便汗既止陽氣復而自利矣仍用前藥去防風加麥門倍用當歸黃芪四劑便行瘡潰而愈

灸法治疔瘡惡毒用大蒜搗爛成膏余腫處四圍留露腫頂以艾炷灸之以燥為度如不燥辨則難愈宜多灸百餘壯無不愈者

便毒

便毒一名騎馬癰此毒經衝任為病而癰見於厥陰經之分野其經多血又名血疔或先有疔瘡而發或卒然起核攻痛而發皆熱鬱血聚而成也初發宜疏利之即散成膿後如常用托裏內補之藥

便毒是厥陰濕熱因勞倦而發用射干三升以生姜煎食前服得行二三次立效凡射干用開紫花者是便毒者生兩腿合縫之間也

歸尾

赤芍

金銀花



天花粉 白芷各一錢 木鱉子十箇  
姜蚕 芒硝各一錢 大黃三錢

川山甲三片 土炒 煨成珠

右剉一劑好酒二碗煎至一碗次入硝黃再煎二沸連蘆露一宿五更溫服厚蓋出汗利一二天即愈

○神奇散 治便毒魚口

穿山甲二片 土炒 煨 木鱉子去壳 三箇

牡蠣 大黃三錢 黃連

黃芩 黃柏 金銀花

連翹各一錢半 黃蠟二錢

右剉一劑酒水各半煎空心服

○班白散 班猫夫翅足 煨 焦二錢 白芷

右共為細末每服六分空心黃酒送下即利立効

○龍膽瀉肝湯 治用經濕熱或囊癰便毒下疳惡瘡腫痛飲

作小便澀滯或婦人陰癢痒痛或男子陰癢腫脹或出膿水

龍膽草酒洗 各一錢半 木通

車前子 歸尾酒拌 各一錢 山梔

生地黃酒拌 黃芩 甘草五分

右剉一劑水煎空心溫服

便毒潰破即魚口瘡也

大黃 金銀花各二錢 姜蚕

川山甲煨 各一錢 五靈脂煨 各一錢

右為細末每服二錢空心黃酒調下

○立消散 治魚口便毒

大蠟一箇 剉 去皮 連腸 搗爛 入葱 五錢 再搗 敷腫處 却用皮 覆貼 其上

**下疳**

下疳者陰頭腫痛而生瘡也凡厥陰經主

病宜

○消痔敗毒散 專治下疳瘡

防風 蜀活各六 連翹

荆芥 黃連 蒼朮

知母各七 黃柏 赤芍

赤苓 木通 龍膽草各九

柴胡一錢 甘草稍

右到丁劑燈草二十四根水煎空心  
熱服如有便毒量入虛實加大黃一  
二錢

○涼血解毒丸 先服升麻葛根湯發其  
毒毒出後服此丸即愈  
不必服輕  
粉之類

苦參八兩 黃連四兩 連翹三兩

牛房子 生地黃 白芷各二

防風 石膏各一 大黃二兩

右為末荆芥煎湯打糊為丸如梧桐  
子大每服百丸空心溫水送下

下疳外治之藥

○珍珠散 治下疳瘡如神

枯白礬 雄黃 珍珠

黃柏 官粉煨過各

右為末以米泔水洗瘡令淨後搽藥

○治痔瘡

蝸牛焙乾一錢 枯白礬一錢

右為細末濕則乾搽乾則以香油調  
付上即愈

○治下疳 并玉莖蝕肉也長出來如初  
去抹上藥也  
長全有效

黑鉛伍錢化開即投汞二錢伍分研  
不見星入寒水石三錢五分真輕粉  
二錢五分好硼砂一錢共為極細末  
聽用如遇此患用葱艾花椒熬水洗  
患處若相洗將湯入瓶內將龜頭向  
瓶口薰之止了痛再洗拭乾搽上此

藥若治古咬去先以乳香沒藥煎水  
口噙止痛後上藥即長也

○洗痔湯

川練子 黃連 瓦松

花椒 葱根 艾葉

右到各等分煎米傾入盆內用青布  
展洗瘡上立效

○治下疳

用皮硝一碗乳香雄黃孩兒茶各五  
分入小煨內外用乾牛糞火煨執煨  
其硝自化薰之晚上使心口涼為度  
○下疳方 抱過雞卵殼略炒為末孩  
兒茶末各一錢和勻先用茶洗淨後  
搽藥

楊梅瘡

楊梅天泡者風濕熱毒也

初起宜

○消風敗毒散

歸尾 川芎 赤芍 升麻

生地黃 乾葛 黃芩 各一錢

黃連 黃柏 連翹

防風 各八分 羌活 金銀花

甘草 各五分 蟬退 二個

初服加大黃二錢 芒硝一錢半通利  
忌物去後

勿用

右到一劑水煎熱服

毒發出宜

○二十四味風流飲

防風 荆芥 連翹

白芷稍 歸尾 川芎 上蘇 蒼朮  
有倍用

赤芍 黃芩 黃連

梔子 地骨皮 五加皮

白蘚皮 木通下部發 宜用木瓜

苦參 金銀花 皂角刺

薏苡仁 蟬退 姜蚕

黃柏 白茯苓 甘草

土茯苓白實者 三斤 瘡痛加羌活獨活○

體虛加人參茯苓去梔子

右剉作五十劑每日服二劑水煎

牛肉燒酒鹽宜炒過食則不生癬

○茯苓湯

土茯苓四兩 搗碎 桔梗 防風各一兩

乳香 沒藥各五錢

右剉水五碗煎至三碗溫服一日服

盡已茶水諸物五貼全除已鐵器

○茯苓糕治楊梅瘡毒

土茯苓去粗皮為細末一斤白蜜

斤糯米粉一斤三味和勻蒸糕食之

○雄黃敗毒丸

雄黃 朱砂 輕粉

孩兒茶各一錢 苦參一兩 淨末

右為細末粳米飯為丸梧桐子大每

服二十九丸米湯送下日進二服口瘡

菘豆湯

遺毒為患宜

○香鯨湯治楊梅節骨疼痛 人不愈者尤効

茜草 麻黃 烏藥

細茶 魚鱗三錢用項麻 同炒成味

槐子炒 花椒各五錢 乳香一錢

右剉一劑水二鍾姜五片葱五根煎

至一鍾通口溫服二三貼即愈不發

○通仙五寶丹

凡人病過楊梅天庖棉花等瘡致成

一切難以名狀之疾，或楊梅瘡爛，見  
骨經年不收口者，或筋骨疼痛，舉發  
無時，或遍身疙瘡，不消或手足皴破  
出血，或遍身起皮，發壓好一層起一  
層，或赤癩白癩，鵝掌風，癩或皮好骨  
爛，口臭難當，及久年癩瘡，不愈一切  
頑瘡惡毒，並皆治之。

鍾乳粉分三 大丹砂分二 琥珀

水片各五厘 珍珠二厘

右為細末，每服五厘，別入飛白霜二  
分半，炒過合作二服，每一料分作十  
二貼，每一日用土茯苓一片，用水煎  
作十二碗，去渣清晨以一碗入藥一  
帖，攪勻溫服，其茯苓湯須一日服盡，  
不可別用湯水并茶，日日如是，服盡  
一料以十二日即愈，或有不效，則而

愈者如病重須再服一料無不愈也

百發百中忌雞鵝牛肉房事服藥完

不忌此方乃王若泉遊查廣東傳來  
極真治楊梅瘡乃天下古今第  
一仙方也幸  
寶之寶之

○西聖復原丹治楊梅瘡後腫塊經年  
破而難愈以致垂危百  
方不効用此如神此方  
乃扶溝寶林僧傳殊効

乳香 沒藥 兒茶

丁香焙各一兩 阿魏 白花蛇

血竭各四錢俱為末 白麵炒一

蜂蜜六兩煉熟 香油四兩煎熟 棗肉水煮去  
皮核

○茯苓餅治遠近頑瘡爛  
不斂口血治

防風 人參 五加皮  
白蘚皮 當歸 川芎

下皮 木瓜 皂角刺

海桐皮 乳香 沒藥

金銀花 甘草各一錢 土茯苓半斤

右共為細末將藥末四兩對麥麩四兩水和一處作餅焙乾熟用不拘時外將末細粗末煎作湯飲以瘡好為度

楊梅天庖愈後疤痕紅黑用大黃白礬二味等分同研擦患處其痕即去色亦如舊

○玉脂膏 治楊梅愈後發出疥瘡風癩起自皮去二層發一二層久不愈者

者

牛油 香油 柏油

黃蠟各一兩化 銀珠 一錢

官粉 二錢 麝香 五分

以上三味為細末入油內攪勻火烤

癰令熱將藥擦上再烤再擦即效

○秘方 治楊梅毒

官粉二錢入一文錢豆腐將粉抄于

內重湯煮食立瘥

灸法 治楊梅毒初起那一箇灸三五壯後不

再發

**廉瘡**

廉瘡腫痛有風熱濕毒也

○荆防敗毒散 方見癰疽

○三香膏 治浪生近日一切廉瘡

乳香 二錢 松香 三錢

共為細末用香油調用包粽子箬葉薄者密密刺孔將藥攤其上用箬葉貼患處藥居中上用完箬葉蓋之烏托住當時止痛生肌

○黃柏散 治廉瘡濕毒及遍身熱瘡



五倍子炒為末加百草霜化黃蠟入  
內攤隔紙膏貼之效

一男子腿患癰服尅伐之藥虧損元氣  
不能成膿余為托裏而潰大補而斂  
若大便結燥用十全大補湯加麥門  
五味而潤月餘仍結自服潤腸丸而  
瀉不止余用補中益氣湯送四神丸  
數服而愈補中益氣湯見補  
益四神丸見泄瀉  
鳴臚霍少孫兩癰生瘡漸至遍身發熱  
吐痰口燥咽乾盜汗心煩溺赤足熱  
日晡益甚形體日瘦此腎經虛火也  
用六味丸不月諸症悉退三月元氣  
平復方見癰疽

**疥瘡**

五疥者乾濕虫砂膿也五疥皆由五臟  
蘊毒而發也

○防風通聖散治風熱瘡疥久  
不愈方見中風

○仙子散治通身瘡疥  
經年舉發者

威靈仙 蔓荊子 何首烏

荆芥 苦參

右各等分為細末每二錢食前溫酒  
調服日進三服忌發風物

○赤靈丹服此可以除根

苦參糯米泔浸一  
日晒乾二兩 白芷

白鮮皮炒各  
兩 枳殼麩炒

連翹 羌活 梔子炒

當歸 荆芥各七  
錢

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服  
五十九粒滾水下

○斷根方

治未患瘡疥之前用此服之永不生  
瘡或已生瘡服此亦好用田螺不拘  
多少水浸熟去腸屎取淨肉用酒磨



炒熟食之能除一生之瘡疥也神效

○一掃光

枯白礬一兩 硫黃七錢 五倍子炒

花椒各五錢 硃二分

右為末用香油煎鷄子令熟去鷄子不用只用油調藥擦瘡

○金不換治血風瘡癬疥疥疥疥虫瘡及生疥瘡疥癩等瘡並効

蛇床子 大楓子去殼 水銀二錢

白錫 枯白礬各一錢

右各為末先將錫化開次入水銀研勻不見星再入末藥相油共研勻擦瘡宜乾此或無相油臘猪油亦可  
○治疥癩瘡痒先用藥水洗後用薰藥被蓋薰之

防風 荆芥 馬鞭草 白礬

花椒 苦參 野菊花

右剉水煎頗洗

○薰藥

苦參五錢 蒼朮二錢 半夏

大黃 雄黃各二錢 熟艾葉

右為末分作筒以熟艾綿紙捲筒每筒一筒被蓋薰一筒

○又方

銀珠 雄黃各一錢 木鱉子一筒

好香一錢 艾三錢

右為細末以綿紙捲筒被蓋留頭在外薰之大小便亦要包裹

○治男婦小兒遍身生疥癬并脚上瘋塊痛痒不止

硫黃 蛇床子 白礬各二錢

水銀渣三錢

右為細末用生姜汁調擦患處立已

○治滿身生牛皮疥癩

花椒 人言 雄黃

艾一兩 巴豆仁八箇 大楓子去壳六箇

右共為細末將艾搥熟入藥紙捲作

二筒每晚薰一筒被蓋露頭在外仍

要包裹大小便免傷毒氣作瓦二片

陰陽放藥盛于中放脚腕下薰甚者

不逾二次愈

○補遺方

○祛熱搜風飲 治疥及膿疱瘡

苦參 金銀花二味為君 柴胡

生地 片苓 荊芥

黃柏炒 黃連炒六味為臣 連翹

薄荷 獨活 枳殼炒

防風五味為佐 甘草蜜炙為使

右剉水煎食遠熱服

○癬瘡

五癬者濕祖風馬牛也 疥癬皆血分熱

於皮膚曹浮淺為疥深沉者為癬

○防風通聖散 治癬瘡去硝黃加浮

○浮萍散 治諸風癬疥瘡

浮萍 當歸 川芎 赤芍

荊芥 麻黃 甘草各二錢

右剉二劑葱白二根豆豉五六十箇

煎至八分熱服出汗

○治乾濕癬

雄黃一錢 班貓七箇 輕粉四分

硫黃三分 蛇床子 金毛狗脊

寒水石各五分 芒硝三分

右為末香油調搽濕則乾擦

○治鷲掌風癬層層起皮且痒且痛用

此一洗立愈

川烏 草烏 何首烏

天花粉 赤芍 防風

荆芥 蒼朮 地丁各一

艾葉 四兩

右到煎水先薰後洗立愈

○又方 治鴛掌風癬

核桃殼 鮮皮 鷓鴣蛋等分煎水頻洗

立痊

○又方用白菀豆丁升入練子同熬水

早午晚洗每七天全愈

○治鴛掌風并癬

用黑鉛不拘多少打成片熬丁炷香

時入菘豆一碗再煮爛去渣以水乘

熱洗數次立効或搽上亦可

○治癬方

用蒜瓣煮水洗浴展乾再用生桐油

搽抹炭火上炙即愈

○治癬瘡方

枯白礬 四錢 朝腦 二錢

為末用極好醋調起將癬抓破搽上

即愈

○治癬瘡方

雄黃 煨過 川樅樹皮 白欬 各

右為細末用無根水調在飯鍋上頓

以赤色為度癬瘡小可抓破忌七八

日不可見水神効

右用小磁器罐一箇用搨泥封置雄

黃在內用燈蓋蓋定將鐵線縛緊周

圍以木炭灰泥固完封口慢火煨過

半炷香黃升蓋上取用

**底瘡**

○防風通聖散

方見中國形癩頭瘡用  
本方為末酒浸焙乾凡

三次食後白湯調服  
日三服至頭有汗即止

小兒頭生白瘡

○陀僧散

鷓鴣糞一兩炒研 蜜陀僧五錢  
硫黃一錢 花椒五錢 人言半分

右為細末香油渣調搽患處晚間洗去

○治男婦小兒頭生白瘡

公鷄屎鴨乾半斤 人言二錢火煨  
塘中黑泥鴨乾飾過 蛇床子五錢  
白礬根三錢 硫黃五錢  
五倍子炒五

右為細末先用雞蛋二箇香油煎餅

熟貼在頭上引出虫去盡用白礬培子煎水洗一次後用香油調前藥搽頭上日搽一次搽過一七即愈

○掃雪膏 治小兒瘡癩

松樹厚皮燒灰 黃丹水飛

寒水石細研各 枯礬

黃連 大黃各五

白膠香熟飛傾石 輕粉二分

共為末熟熬油調傳瘡上須先洗淨瘡咖後傳藥

○治瘡瘡黃水瘡薄皮瘡羊鬚子瘡

槐枝不拘多少截四指長用真香油放鍋內浸過槐枝為止熬數沸將槐枝拿出一根稍兩截看內查黑色通去槐枝加黃香些須入油搽之

○治瘡瘡方

用花椒艾熬滾湯放深盆內將瘡頭倒放熱湯泡浸如湯冷再換將瘡甲洗淨用枯礬黃丹葱汁蜂蜜調搽包

佳不許見風

**癩風**

白癩紫癩一般風 附子硫黃最有力  
姜汁調勻茄蒂擦 但患痒處並無跡  
右先將鹿布擦洗患處令淨以茄蒂  
蘸擦之一說白癩用白茄蒂紫癩用  
紫茄蒂

○追風丸 治白癩風

何首烏

荆芥

蒼朮米泔  
浸

苦參各等  
分

右為細末用好大肥皂去皮弦剉碎  
煮汁瀝去渣入麵少許打糊為丸如  
梧桐子大每服五十九空心茶清送  
下忌一切動風之物

○治汗斑

用蜜陀僧為細末以隔年醞醋調搽

班上隨手而愈

○治黑白癩風

硫黃

蜜陀僧各一  
錢 信六分

以上三味俱生為細末用隔年陳醋  
調和擦之一二天即愈脫間搽上次  
早洗去

**癩風**

厲風者天刑之疾陰陽肅殺之氣砭人  
肌膚傷人肢體初起白屑雲頭紫黑  
吃磨流膿甚者鼻崩肉陷致此危矣  
初見雲頭皮木就當施治患者屏絕  
慾情清淡飲食十日一二否則難治

○通天再造散

鬱金

五錢

皂角刺

黑大

大黃

各  
一兩

白牽牛

頭末六錢  
半生半炒

右為細末每服五錢日未出時無灰

酒送下面黃服之當月必利下惡物  
或臭不可近或虫或膿如虫口黑色  
乃是多年赤色乃是近者數日後又  
進一服無虫乃止

○洗大風方

地骨皮 苦參 荆芥 細辛

防風 蒼耳子

右剉片水煎薰洗遍身血出為效如  
洗務要寬湯浸洗良久方佳多洗數  
次為妙

○灸法 治大風斷根方

於大指指筋骨縫間約半寸灸三炷  
香以出毒氣

諸瘡

○防風通聖散 治諸瘡腫毒神

○隔蒜灸法 治一切惡瘡毒大痛或不

痛不痛者灸至知痛而止其毒隨火  
而散蓋火有暢達之義此從治之法  
也大有回生之驗

用大蒜頭切二支錢厚安瘡頭上用  
艾壯於蒜上灸之三壯換蒜復灸未  
成者即消已成者即破大執不能為  
害如瘡大用大蒜搗爛攤瘡上將艾  
鋪上燒之蒜敗再換如小瘡或不作  
膿不起發或陰毒瘡更宜多灸灸而  
仍不痛不作膿者不治此氣血虛也

○葱熨法 治虛怯人患腫塊或痛或不

痛或四肢筋攣骨痛又治流注跌撲損  
傷腫痛搗打刺痛及婦人乳陰症  
腹痛手足  
厥冷金冷

用葱頭細切杵爛炒熟敷患處冷則  
易之再敷腫痛即止如神

○豆鼓餅 治瘡瘍腫硬不潰及潰而

不斂并一切惡瘡惡瘡  
用江西豆鼓為末以唾調作餅子三

文錢厚置患處上將艾壯灸之乾則易之如瘡勢大及背發用水漱口水調作餅覆患處以艾鋪餅上灸之如未成即消已成即敗其毒勢易愈如有不效者氣血虛也

一切無名腫毒

○洪寶丹 治一切腫毒散血消腫及湯

効

天花粉 三兩

白芷

赤芍 各一兩

鬱金 一兩

右為細末熟毒用茶調冷用酒調塗患處○衄血不止冷水調塗後頸項上此藥最絕血路

○三白散

治一切腫毒諸瘡疼痛

白芨

白歛 各一兩

白礬 煨五錢

右俱為末用時入藥於水碗中即沉

底外用桑皮紙拖水搭於患處熱則再易連易連搭直待其腫處水冷將藥敷上立時消散

○千金消毒散

治一切惡瘡無名腫毒發背疔瘡便毒初發脈

洪敷效實腫甚欲作膿者

連翹

黃芩

赤芍 各二錢

歸尾

金銀花 各一兩

皂角刺

牡蠣

天花粉

大黃

芒硝 各三錢

右劉酒水各半煎服

○祛毒湯

治一切無名腫毒瘡痛疔起神効

貝母

川山甲

土炒或珠

姜蚕 各一錢

大黃 三錢半

右判作劑水煎熟入好生酒一盞攪勻空心熱服渣再煎服以利為度

一切惡瘡洗法

○洗毒湯治一身惡瘡疥癩地膚子卽掃箒子用半升煎湯頓浴數次漸愈

○滌法 洗諸般瘡毒  
艾葉 細茶 葱白  
挑柳枝 花椒  
右剉水煎入搥少許頻洗

**杖瘡**

一杖後卽飲童便和酒一鍾以免血攻心再用熟豆腐鋪在杖紫色處其氣如蒸其腐卽紫後易之須得紫色散盡轉淡紅色爲度

○又方用鳳仙花科連根帶葉搗爛塗患處如乾又塗一夜血散卽愈如冬月無鮮的秋間收起陰乾的爲末水調塗上亦效一名金鳳花

○又方并打傷皮不破內損者用羅蔔

**搗爛塗之**

○又方用猪膽汁塗之亦妙

○又方用菜豆粉微炒鷄子清調塗上

○又方用隔年風化石灰不拘多少取新汲井水一碗銀簪子順攪半餘下

如膏搗翎刷上患處卽佳

○烏龍解毒散 已杖之後服此

如人受杖責不拘輕重致於伏不能動起者及疔甲爛肉連腿前面青疼痛難忍晝夜無眠渾身增寒壯熱神魂驚怖此藥可治卽時可止疼痛善能動履及疔甲痛腫其効如神  
用木耳四兩入淨砂鍋內炒焦存性爲末每服五錢熱黃酒一碗調服服藥後坐待少時其藥力行開至杖瘡上從肉裏面往外透如針刺痒甚不



時流血水或以藥水洗淨貼上膏藥  
其杖處疼痛腫硬次日即消散破歐  
用熟麻油黃酒各二碗同煎數沸服  
畢臥火燒熱地上二夜或止消腫無  
振打傷人者仇家陰令術士以  
此治之次日驗即無一毫傷痕

○救刑妙方

土鱉

在上焙乾

沉香

末二

銀珠

五分

右三味為末合一處刑後隨用好酒

調溫服消腫去毒止疼神効隔宿

退血止痛飲治杖後腫痛瘀血不散

歸尾

赤芍

生地黃

白芷

防風

荆芥

羌活

連翹

黃連

黃芩

黃柏

梔子

薄荷

枳殼

桔梗

知母

石膏

車前

甘草

一方加大黃

右剉劑水煎溫服

○生血補氣湯治杖後潰爛

人參

白朮

炒倍

茯苓

當歸

白芍

熟地黃

陳皮

香附

貝母

各等

桔梗

甘草

減半

右剉劑水煎服○寒熱往來加柴胡

地骨皮○口乾加五味子麥門冬○

膿清加黃芪○膿多加川芎○肌肉

遲生加白斂肉桂

○棒瘡疔甲膏藥止痛收血水

乳香

沒藥

孩兒茶

雄黃

各三錢

輕粉

一錢

官粉

黃蠟

各兩

先將猪脂入鍋煉出油冷定却將諸

藥研成細末入油攪勻隨將黃蠟化

開收入一處又攪勻用油單紙攤成

膏藥貼患處量瘡大小貼之極能去

疔甲收膿水消腫止痛內宜前先用此藥水洗好的更快

防風 荆芥 苦參

各等分煎水洗用前藥水先後搽藥

○生肌散

乳香 沒藥 孩兒茶

各等分爲細末撒上卽止痛生肌

○去疔甲藥

用鷄子清加麝香少許銀簪打成稀水照疔甲處輕輕用簪子尖點上上不多時其疔甲化爛取去上散藥外

貼膏藥一日一換化盡死肉之後三四日換一次不數日如初

○鬱金膏助林瘡一切腫毒

生豬脂熬去渣淨鬱金四兩

生地黃忌犯鐵器

咀片入豬油內煎枯去藥渣又入淨黃蠟半斤化開又入好朝腦一兩磁罐收入每用一兩加官粉二錢溶化攪勻攤油單紙上貼之

○英雄丸

乳香 沒藥 蜜陀僧

自然銅燒紅淬七次地龍即蚯蚓焙乾

木鱉子去壳花椒各等分

右爲末煉蜜爲丸如彈子大每一丸以酒化服或臨刑方用打不覺痛任打血不浸心妙不可言

**折傷**

折傷者多有瘀血凝滯也宜先用童便和而溫服最能散瘀消滯

○通道散治跌撲傷損極重大小便不通心腹悶亂至死者先服此藥打下來血瘀血然後方可服補損藥不可

用酒煎愈不通矣  
亦真入虛實而用

大黃

芒硝

枳殼各二

厚朴

當歸

陳皮

木通

紅花

蘇木各一

甘草五分

右到一劑水煎熱服以利為度惟孕  
婦小兒勿服

○麥斗散

治跌傷骨折用藥一匣黃酒  
骨接之有聲初跌之時整理如舊對  
任綿衣蓋之勿令見風丸服藥休移  
動端午日製忌婦人  
雞犬等物孫都督傳

土鱉

一箇新瓦  
上焙干

巴豆

一箇  
去壳

半夏

一箇  
生用

乳香

沒藥

各半  
分

自然銅

火燒七次醋淬  
七次用些酒

右為細末每服一匣好黃酒送下不  
可多用多則補得高起神効

○天靈散

天靈蓋用柴火燒存性為末每二錢  
黃酒調服神効

○接骨効方

山梔

生為末  
五分

飛羅麵  
三錢

姜汁調和搽患處二日夜皮肉青黑  
是其驗也○一方治跌撲傷損逆氣  
作腫痛不可忍者用梔子白麵為末  
井水調搽乾則梳水即効

○接骨膏

當歸

七錢  
半

川芎

骨碎補

沒藥

五錢

乳香

二錢  
半

廣木香

一錢

川烏

四錢  
煨

古錢

三錢  
火煨

酒淬  
七次

黃香

六兩

香油

一兩  
五錢

右先將各藥為末和油成膏用油紙  
攤貼患處如骨碎筋斷用此復續如  
初

○白膏藥 治跌打或刀斧所傷候血盡乾敷藥不必包果其妨如神

白芨 一兩 猪脂油 兩六 芸香

樟腦 各四兩 輕粉 乳香

沒藥 孩兒茶 錢五 片腦 五分

右各為末將油銅鍋化開先下白芨次下芸香樟腦兒茶一二時取出離火方下乳香等藥候冷又下片腦輕粉此方不但生肌凡瘡毒皆可貼之膏成將磁罐內成之每用油紙攤貼患處

○接骨散 治跌打損傷能接筋續骨

用蒿芎子不拘多少微炒碾細末每二三錢同好酒調服

○接骨方

白蒺藜炒為末每服一錢熱酒調下

被蓋汗出即愈

○神效葱熨法 治跌撲傷損

用葱白細切杵爛炒熟敷患處如冷易之腫痛即止其效如神

一入墜馬腹內作痛飲酒數盃翌早大便自下瘀血即安此元氣充實挾酒勢而行散也

男子墜馬腹有瘀血服藥下之致發熱盜汗自汗脉浮瀆余以為重劑過傷氣血所致投以十全大補湯益甚時或譫語此藥力未及而然也以前藥加炮附子五分服之即睡覺來頓安再劑而痊

金瘡

○熟粘皮 治金瘡出血不止

龍骨 煨三錢

五倍子 二兩半生半炒

白礬 半生

無名異 各一

乳香

沒藥 各二

右共為末乾，搽患處，不作膿，小疔風，立時止血，任痛生肌如神。

○軍中一捻金 治金瘡傷破出血光

礦古灰不拘多少，炒研生，韭菜連根同搗作餅，陰乾為末，搽上止血生肌。

○出箭方

花蓋石其形似硫黃，出在陝州，有白班點者，一味火煨七次為細末，撒在傷處，周圍箭頭即出。

○止痛生肌散 治刀斧傷出血不止

乳香 沒藥 兒茶

象皮 炒 龍骨 木飛 石膏 煨水

黃丹 木飛 三七

右八味各等分，共為細末，用之。

○金瘡出血不止

用楮樹葉為末，搽上血即止。

梁閣老姪金瘡腫痛，出血不止，寒熱口乾，此氣虛血無所附而血不歸經也。用補中益氣湯，五味麥門冬之陽氣復而愈。方見

破傷風

破傷風症，河間云：風者善行，數變入臟，甚速，死生在反掌之間，宜急分表裏虛實而治之。

破傷風邪在表者，則筋脈拘急，時或寒熱，筋惕搐搦，脈浮弦也，宜散之。

○羌活防風湯 治破傷風邪初在表者，則邪入於裏，與藥不相合矣。

羌活 防風 甘草 川芎 藁朮 當歸 白芍 各錢 地榆

細辛 各五分

右剉一劑水煎熱服

破傷風邪在半表半裏者則頭微汗身無汗也 宜和之

○羌活湯 治破傷風在半表半裏者宜服此湯稍緩邪入於裏不宜用

羌活 菊花 麻黃

川芎 石膏 防風

前胡 黃芩 細辛

甘草 白茯苓 枳殼

蔓荊子 各五分 薄荷 白芷 各二分半

右剉一劑水煎服

破傷風邪傳入裏者舌強口噤項背反張筋惕搐搦痰涎壅盛胸膈滿悶便數而弦也 宜導之

○大芎黃湯 治破傷風在裏宜服此湯

川芎 羌活 黃芩

大黃 各二分

右剉一劑水煎溫服臟腑通和為度  
一人闕眉稜被打破傷風頭面腫大發熱以九味羌活湯熱服取汗外用杏仁搗爛入白麵少許新汲水調作瘡上腫消熱退而已

金刀如聖散 治破傷風

蒼朮 八錢 白芷 川芎

細辛 麻黃 各九錢 川烏 炮

草烏 炮 各四錢 薄荷 一錢

右為末每服一錢熱黃酒調服蓋覆遍身汗出有驗如治痛風加滴乳香一錢

○玉真散 治破傷風及金刀傷打撲傷損并癩狗咬傷能止痛生肌

天南星 為防風 防風 各等

右為末破傷風以藥敷瘡口然後以

温酒調三錢如牙關緊急魚子反張  
用藥二錢童便調下

一打傷欲死但心頭微温以童便灌  
下二錢并進一服

一癩狗咬破先口嚼漿水洗淨用綿  
拭乾貼藥更不再發無膿大有功

○一方 治破傷風

槐子一合炒黃好酒一碗煎八分熟  
服汗出為愈

○一方 治破傷風

用野蘇子半生半炒為末煉蜜凡如  
指頂大每服一丸熱黃酒下

破傷外治之法

○治跌打破頭面及刀傷破手足大口  
血流不止

瀝青即松香不拘多少碾為細末將所

傷破瘡口用手捏湊一處用藥末厚  
敷上將淨布帛扎住不怕風不怕水  
旬日即痊

治破傷風

○甘草其遂各等分研成末將蜂蜜并  
隔年老葱頭共搗一塊將瘡甲搗起  
微將麝香先撒於上然後搭藥在上  
點香至四寸渾身汗出即愈

灸法 治破傷風及癩狗咬

用核桃殼半邊內填稠人糞滿仍用  
槐白皮襯扣傷處用艾灸桃壳上灸  
之若遍身汗出其人大困即愈若年  
遠只在瘡上灸之亦愈

湯火

○治湯火傷

蛤蠣殼不拘多以炙煨黃色研細末

用生香油調膏敷之如木仍無痕跡  
一方以蜜調敷之痰立止不膿不痂  
効

○治湯火傷

用桐油二分水一分攪令勻調入黃  
丹石膏末敷之効

○黃白散

用榆樹根白皮為細末一兩黃丹二  
錢攪勻着瘡大小用井花水調勻敷  
患處若乾再以凉水敷之不惟止痛  
三五日即痊或人家失火燒了牲畜  
照患處塗之須臾流水出可治不流  
水是燒得太重不可治也然人被燒  
亦同此効

○湯火瘡方

槐子燒灰為末香油調上即好用槐

皮炒為末香油調上亦好

男子火傷兩臂焮痛大小便不利此  
火毒傳於下焦用生地黄當歸芍藥  
黃連木通山梔赤茯苓甘草一劑二  
便清利其痛亦止乃以四物參芪白  
朮甘草而壞肉去又數劑而新肉生  
一男子因醉被熱湯傷腿潰爛發熱作  
渴飲水脉洪數而有力此火毒為患  
用生地當歸芍連木通葛根甘草十  
餘劑諸症漸退却用參芪木芍歸芍  
灸草白朮木瓜新肉將完因勞忽寒  
熱此氣血虛而然也仍用參芪之藥  
加五味酸棗而安又月餘而瘡痊  
一人夜間回祿烟薰致死者以蘿蔔搗  
汁灌之即甦

蟲獸



一 狗咬傷

杏仁甘草口嚼格傷處又宜銀杏塗傷處○又宜葷藤子五十粒去殼以井花水研成膏先搥水洗傷處後敷此藥

二 癩狗咬傷

用班貓七箇去翅足為末酒調服於小便桶內見衣沫似狗形者為効如無再服須六七次無狗形亦不再發甚効○又宜以班貓去翅用糯米一撮同炒黃去米將班貓研末麵糊丸如菘豆大每七丸温酒下○又宜番水蟹即馬前子磨水吃即着腦頂上有紅頭髮急宜摘去○又宜用艾炙蒜切片一二七炷五倍子末撒上面勿見風

一 蛇咬傷

用雄黃五錢五靈脂二兩共為末每服二錢好酒調服仍敷患處良久再進一服○又宜貝母去心好酒服○又宜白芷為末麥門冬湯調服立愈

○又宜扛板歸不拘多少其藥四五無葉尖青如犁頭尖樣藤有小葉有子圓黑如暗味酸用藤葉搗汁酒調隨量服之立愈

○又方治蛇咬食蒜飲酒更用蒜杵爛塗患處加艾於蒜上灸之其毒自解凡毒虫傷血効

一 蝎螫傷

○妙化丹治蝎螫此傷宜端午日製忌婦人雞犬見之

乳香 沒藥 輕粉

海漂消 雄黃各五錢 硫黃二分

右為細末左邊被傷點左眼右邊被

傷點右眼神効

○六神散

治疔瘡疔痛不可忍者

川烏 草烏 南星

半夏 香白芷 九節菖蒲

右為末每用少許先以涎唾抹傷處  
即將此藥擦之立止如神

一蜘蛛咬成瘡

用雄黃一錢麝香半分為末用蓼藍  
汁和塗瘡上如無蓼藍汁以青黛五分  
入水內和塗之立愈

○治塌瘡方

川烏 草烏 狼毒 半夏

南星 雄黃 膽礬

右共為細末五月五日午時以醋糊  
丸如鼠糞大塗患處立愈

一臭虫方

用蕎麥糶熬水膠淋其中即效

○蟬花散

治夏月大傷及諸損傷蛆  
虫極盛臭惡不可近者

晋州吳推府佃客五月收麥用驟車  
碾載一小厮引頭被一驟跑倒又咬  
破二三處痛楚不可忍五七日膿水  
臭惡難近又蛆蠅極盛藥不能救無  
如之何臥于大門外車房中一化飯  
道人見之云我有一方用之殊効我  
傳與汝修合服之蛆皆化水而出蠅  
亦不敢近又以寒水石末敷之旬日自  
愈為神故錄之

蟬退 青黛 各五錢 蛇退 一兩 燒

華陰細辛 五分

右為細末每服三錢黃酒送下

中毒

脈人為百毒所中傷者脈大者生微

細者死又曰洪大而遲者生微細而數者死

○大凡百毒所中

用甘草煮豆水煎服之能解百毒

○又方不問一切諸毒急宜多服無慮

○解毒丹

治諸毒其飲食中若見毒即吐急用膽礬三分研水灌之即吐若在腹中宜下後服此

黃丹

水粉

青黛

煇硝

紫豆粉各等

右為細末以小藍接水調下瘰癧倍黃丹豆粉并花水調下

○解砒毒神方

用江西豆豉一兩乾蚯蚓一兩為末

涼水調服不拘多少立效又官軍

黃連煮水反并上藥熬成膏子出

牛膽停對加蜜少許調稠得所入磁

瓶內每用涼水化下入口即活雖不

言但心口動者還活得○又宜硫黃

四錢紫豆粉五錢共為末冷水調服

緩緩服之冬月溫水服如肚痛再加

一服待不痛用鷄毛探吐吐後用溫

溫稀粥下四五日不可食飯粿

○慢吞木屑捨喉不下死在須更用鐵

峇磨水灌下即効

○慢吞銅錢銅物多食核桃或葶薺共

銅白爛

○慢吞針蚕豆煮熟同葶薺吃下針同

藥從大便而出

○慢吞水蛭宜食蜜即化為水○又宜

用田泥作瓦如櫻桃大每十九白

下水蛭即抱泥同下○一方用濃茶

多服亦效

○誤吞金銀銅鐵等物不能化者以礮仁濃煎湯服之其物自下

○白衣丸 治男婦小兒誤吞大芒針刺喉閉腫痛死在須臾

烏賊骨魚 白茯苓 砂仁

山豆根 甘草 姜蚕 各五錢

管仲 一兩五錢 硼砂 麝香

珍珠 象牙 腦子 各等分

右為細末飛羅白麵打糊丸梧桐子大用蚌粉為衣陰乾每用二丸冷水浸化頗頗嚼服又將一丸口嚼化尤妙

○治誤食粉毒用伏龍肝水為丸百草霜為衣淋桿灰水送下即解

一男子偶然低頭往暗處藏身不言問

亦不吞飲食俱背人竊食人見之則食不下諸人以為中邪用三牲祭之其物經宿乃妻食之病亦如是諸醫莫識予思必中鼠涎蓋鼠涎有大毒也以其菜葉塞入猫口猫涎自出將菜葉令夫婦服之悉愈

一藥室家人正對藥忽仆地不省人事諸人以為中風痰厥乃託於余予曰此非病也必藥氣薰蒸中於藥毒令與甘草煎湯灌之立醒

一婦人將燒酒貯于錫壺內經旬取服止飲一小鍾即醉悶不省衆莫識其症予曰此中鉛毒也令以陳土攪水澄清入甘草煎湯灌之即醒

**骨酸**

○神仙釣骨丹 治諸骨酸使其骨自隨藥帶下或吐出如神

朱砂 丁香 各一 血竭

磁石 龍骨 各五

右為細末黃蠟二錢為丸朱砂為衣每服一丸香油煎好醋吞下如要吐用矮荷煎好醋吃後用濃茶任服如無矮荷以桐油代之

○治諸骨酸喉以象牙末吹之妙○又宜將狗倒吊起涎出碗盛徐徐嚥下其骨化水如神○又宜燈心以竹筒填滿火燒過取燈心灰用米糖化開調灌下勿犯牙

○治骨酸白飴糖大口嚼嚥即下○又宜礪砂太塊者水洗淨日夜嚥化嚥其骨自軟

治鷄骨魚骨酸用霜梅肉槌成指大作丸子將綿裹用線穿在內冷茶送

下扯住線頭在手一嘔即出○又宜胡荽略搗拌醋并渣嚥下即解

五絕

五絕病者一曰自縊死氣已絕二百墻壁屋崩壓死氣已絕三日溺水死氣已絕四曰鬼魘死氣已絕五日產乳死氣已絕並可救治又治至死井中風不省人事等証半夏為末如黃豆大吹入鼻中即活心頭溫者一月可治

○一自縊死者自且至暮雖已冷仍可治自暮至旦則難此陰氣成故也然夏月夜短於晝又熱猶應可治又云心下若微溫者一月已止猶可治之當徐徐抱解不得截繩上下安被臥之一人以脚踏其兩肩手挽其髮

常令弦急勿使縱緩一人以手按探  
胸上數摩動之一人摩將臂脰屈伸  
之若已僵直但漸漸強屈之并按其  
腹如此少頃雖得氣從口出呼吸眼  
開仍按莫置亦勿勞之須臾可以溫  
飲粥灌之更令兩人以管吹其兩耳  
此法最效

一自縊者切不可斷繩宜以藤蓋或  
用手厚裹衣物緊頂谷道抱起解繩  
放下揉其項痕搖鼻及吹其兩耳待  
其氣回方可放手若便泄氣則不救  
矣

一自縊死者宜從容安定心神徐緩解  
下慎勿翻繩繩抱取心下滑溫者刺  
雞冠血滴口中即活男用雌女用雄  
○一方鷄尿白如棗大酒半盞和灌

吸鼻中尤妙千金方以藍汁灌之餘

法同上

卒墮壓倒打死心頭溫者皆可救將  
本人如僧打坐令一人將其頭髮控  
放低用半夏末吹入鼻中如活却以  
生姜汁清油攪勻灌之

○一枚溺死方取甕中灰兩担埋之從  
頭至足水出七孔即活

○一溺水者放太堯上臥着將脚後凳  
端起二磚却蘸鹽擦臍中待其水自  
流出切不可倒流水出此數等但心  
頭微熱者皆可救治○又方溺水死  
者過一宿尚活搗皂角末綿裹內下  
部須臾水出即活一方急解者死人  
衣帶艾灸人中即活  
○一枚鬼魘死不省并中惡者皂角為  
末如菜豆六許吹入鼻中即寤則氣

通而活

一壓死不得近前喚但痛咬其脚跟及嚼其面不省者移動此少臥處徐徐喚之元有燈則存無燈則不可點燈用皂角末吹兩鼻即活

一卧忽不悟勿以火照之殺人但以痛驚大搦指甲除而嚼其面則活取韭汁吹鼻孔冬月用韭根搗汁灌口中

一卒魔用雄黃末吹鼻孔中即活

一從高墮下瘀血冲心欲死

淡豆豉一盞水煎去渣服若便覺氣絕不能言取藥不及壁開口以熱小便灌之

一枚冬月墮水凍死凡四肢冷口不能言只有微氣者不可便以火灸用布

袋盛熟灰放在心頭冷即換熱者待

眼開却用流酒或姜湯灌之

一救快者死不可使冷水冷之即死宜

用溫湯常摩洗其心腹間如路途急

切用路上熱土置腹臍間令人小便

其臍中即活凡路上熱土人蒜等

節

言藥

章德府 趙王府秘傳

○萬病無憂膏

治風寒溫氣所傷跌撲閃挫傷損

一切疼痛皆貼患處心腹痛俱貼患處

哮喘喘嗽貼背心瀉痢貼臍上頭疼

眼痛貼太陽穴及治一切無名腫毒

癰疽發背疔瘡疔毒流注濕毒腫毒

初覺痛疼貼患處即消已成亦能

止痛神效 長肉生肌 百發百中 其功  
不能盡述

川烏 草烏 大黃 各六錢

當歸 赤芍 白芷

連翹 白欬 白芨

烏藥 官桂 木鱉子 各八錢

槐 桃 柳 桑 棗枝 各四錢

加苦參 皂角 各五錢

右劉散用真香油二斤浸藥一宿用  
火熬至藥焦色以生絹濾去渣不用  
將油再熬一滾入飛過黃丹十二兩  
炒過陸續下槐柳棍攪不住手滴水  
成珠為度離火次入乳香沒藥末各  
四錢攪勻收貯退火毒聽用一方加  
蘇合香二錢尤妙

○萬應紫金膏 治跌撲傷損手足肩背  
并寒濕脚氣風毒痛不

瀝青 二斤 威靈仙 二兩

車藤子 一百粒 木鱉子 二十八箇

乳香 一兩 沒藥 一兩

黃蠟 二兩 生薑 二斤

生葱 梅汁一碗

麻油 夏二兩春秋三兩冬四兩

右將瀝青研末同一汗下鍋熬化着  
二汗盡時却起火桃柳條不住手攪  
却入前靈仙油同熬再下水鱉子車  
藤子搗勻入內攪勻又下乳沒黃蠟  
再攪即成膏矣每用好厚綿紙攤貼  
先將姜擦患處後貼上即用烘熱  
底發之瀉痢貼丹田咳嗽吐血貼背  
心心疼貼心上風損貼患處

○海仙膏 治風損諸瘡  
癰腫毒金効



赤葛

苦參 各等分

右二味剉碎用香油浸過前至焦枯  
瀝去渣秤香油一斤淨再煎沸徐徐  
入蜜陀僧水粉各四兩

○千槌膏

松香 明淨者不拘  
多小為末 革蘇子仁同入石  
臼內搗爛成膏如稀則加松香如稠  
則加麻仁須要稀稠得所取出入水  
中批拔數次再入乳香沒藥血竭孩  
兒茶各為末少許頑瘡加輕粉龍骨  
再批令勻磁器收貯每用時重湯化  
開綿帛攤上貼患處神效

通浴

丹蓬頭祖師秘傳混元丹

專治夫人小兒諸虛百損五勞七傷  
小兒百病隨後引用之

詩曰

百花未放此花先 修合成丹號混元  
能除腹內諸般疾 安神定志最延年  
嬰兒胎毒驚風症 疳積瀉痢嘔痰涎  
立奏奇功真可羨 老無風疾少無癩

又曰

乘鶴西風出華州 袖藏千載混元球  
紅鉛黑汞東西產 白雪黃芽次第收  
孔子泣麟周道否 卜和識玉楚王休  
藥中消息誰人會 脫却紅塵自在遊

混元衣 乾者二錢  
按中央

梅花 三錢按北方明白  
專解疔毒方一兩

辰砂 甘草一兩水浸過半自一兩  
研細為衣按西方去甘草

滑石 六兩牡丹皮二兩煎水去丹  
皮用汁煮乾為度按北方

甘松 四錢去毛  
按秋金

粉草 一兩去皮  
按東方 莪朮 二錢火煨  
遇按東方

縮砂三錢去皮 益智仁六錢去

人參一錢按西方 木香一錢按南方

黃芪一錢按西方 山藥一錢五分按北方

香附一兩按東方 桔梗一錢按東方

白茯苓二錢五分按北方

白茯神二錢五分按北方

遠志一錢五分 甘草水炮去心

麝香三分按中央 丑玄三分按中央

空箇玄一錢按西方 金箔三幣為衣按西方

右共為細末煉蜜為丸如龍眼大

人大小加減用之

中風痰厥不省人事姜湯研下

傷寒夾驚發熱葱姜湯研下宜出汗

停食嘔吐大便酸臭腹脹姜湯下

霍亂紫蘇木瓜湯下

赤白痢裏急後重陳倉米湯下

大便去血槐花陳倉米湯下

小便不通車前子湯下

夜出盜汗浮小麥湯下

發熱金錢薄荷湯下

痘疹不出升麻湯下

中暑煩渴燈心湯下

喘急咳嗽麻黃杏仁湯下

積聚腹痛姜湯下

虫痛苦練根皮湯下

疝氣偏墜小茴大茴湯下

夜喘不止燈心灰湯下

急驚搐搦薄荷湯下

慢驚人參白朮湯下

諸病後無精神少氣力不思飲食姜

棗湯下

胎寒手足冷口氣涼腹痛腸鳴姜葱

湯下

面目四肢浮腫面黃茯苓皮陳皮桑  
白皮大腹皮姜皮湯下即五皮散

瘡疾槐柳枝各五寸姜三片煎熟一  
宿五更溫熱送下

痺熱身瘦肚大手足細大便或淋或  
泄小水如海陳倉米湯下

救封通微顯化真人即赤髯張三  
降神仙所授

○神仙萬億丸

朱砂透喉鏡  
而者佳

巴豆去壳  
心膜

寒食麵於清明前一且各寒食用  
白麵不拘多少好酒和麵  
一塊包細乾麵  
在內蒸熟聽用

右各伍錢先將硃砂研極細以入巴  
豆又研極細却將寒食麵去包皮取  
內細麵用好酒打成糕蒸熟入藥內  
仍又同研百餘下為丸如黍米大每

服三五丸貧人太小加減用之各隨  
證引用于后

感冒風寒發熱姜葱湯下出汗

內傷飲食生冷茶下

心痛艾醋湯下 腹痛淡姜湯下

霍亂吐瀉薑湯下

赤痢茶清下 白痢姜湯下

赤白痢疾姜茶湯下

瘡疾作寒熱姜湯下

心膨氣脹薑湯下

伏暑傷熱冷水下

諸虫作痛苦練根皮湯下

積聚發熱茶清下

大便閉結茶清下

小便不通燈心湯下

咳嗽痰喘姜湯下

急慢驚風薄荷湯下

○神應救苦丹

治諸風百痛如神

大川烏

炮 肥草烏

青皮

去穢 生地黃 西芎

枳殼

麩炒 白芍 各五錢 五靈芝 二兩

右共為細末酒打糊為丸如彈子大每服一丸細嚼熱酒送下汗出即效若為小兒亦可不飲酒者冬月熱水下

一治頭風腫痛

心腹痛

脚根痛

疝氣痛

手背痛

遍身骨節痛

破傷風痛

棒瘡痛

癰疽發背及一切惡瘡痛

**疔**

一疔上生瘡如櫻桃人有五色瘡破則

皮斷但逐日飲牛乳自消

一寒熱不止經月後四肢堅如石以物

擊之一似鍾磬日漸瘦惡用茱萸水

香等分煎湯飲即愈

一太腸頭出寸餘痛苦直候乾自退落

又出名為截腸病若腸盡乃不治但

初截寸餘可治用脂麻油器盛之以

碎星之飲天麻子汁數升愈

一口臭中腥臭水流以碗盛之有鐵色

鰾魚如糝米大走躍不任以手捉之

即化為水此肉壞矣任意饌食鷄肉

愈

一腹上麻痺不仁多煮葱白吃之即愈

婦人小便中出大糞名交腸服五苓

散效如未盡愈可用舊撲頭燒灰酒

服之

一兩足心凸如腫上面生黑色豆瘡硬如釘子釘子履地不得經骨破碎眼髓流出身發寒顛唯思飲食此是肝腎氣冷熱相吞用炮川烏頭未傳之前並子湯服効

腹脹經久忽為數升晝夜不止服藥不驗乃為氣脫用益智子煎棧湯服立愈

一四肢節脫但有皮連不能舉動名曰經解用酒浸黃蘆三兩經一宿取出焙乾為末每服一錢酒調下服盡安一玉苾硬不痿精流無歇時時如針刺壁之則脫乃為腎精漏疾用韭子破故紙各一兩為末每服三錢水一盞煎至六分作三次飲之愈前住服一咽喉間生肉質骨相疊漸漸腫起不

痛多日乃有發子臭氣自出遂退飲食用臭橘葉煎湯連服愈

一腹中如鐵石臍中水出旋變作虫行之狀繞身呓啞痒痛難忍撥掃不盡用濃煎蒼水浴之以蒼木末入麝香少許水調服効

一眼前常見諸般會虫飛走以手捉之則無乃肝膽經為疾用酸棗仁羌活玄明粉青箱子花各一兩為末每服二兩水一大盞煎至七分和渣飲一日三服

一大腸虫出不斷斷之復生行坐不得用鶴虱末水調五錢服之自愈

一眼睛垂出至鼻如黑角色痛不可忍或時時大便出血名曰肝脹用羌活煎汗服數盞自愈

腹中有物作聲隨人語言用板蓋并  
一盞分五服服之又名應聲中當服  
雷丸自愈

有飲油五升以來方始快活又得吃  
財安不爾則病此是髮入胃被氣血  
裹了化為虫也用雄黃半兩為末水  
調服虫自出如虫舌者置於油中透  
巡間連油滾之長江

治臥於床四肢不能動只進得食好  
太言說吃物謂之失說物望病治法  
如說食猪肉時便云爾吃猪肉丁頓  
病者聞之即喜遂置肉令病人見歸  
要却不要吃此乃失他物望也當自  
睡中涎出便愈

手十指節斷壞惟有筋連無節虫行  
如榕心長數尺餘遍身綠毛卷名曰

血餘以茯苓胡黃連煎湯飲之愈

遍身忽皮底混混如波浪聲痒不可  
忍服之血出不能解謂之氣奔以人

參苦杖青蘆細辛各一兩作一服水  
二碗煎十數沸去渣飲盡便愈

一眼白渾黑見物依舊毛髮直如鉄條  
雖能飲食不語如醉名曰血漬用五

靈芝為末二錢酒調下

著艾灸訖大痂便退落瘡內鮮肉片  
子飛如蝶形狀騰空去了痛不可忍

是血肉俱熟用大黃朴硝各半兩為  
末水調下微利即愈

一臨臥渾身虱出約至五升隨至血肉  
俱壞每宿漸多痒痛不可言狀雖與

水臥床晝夜號哭舌尖出血不止身  
齒俱黑唇動鼻閉但飲鹽醋湯十數

碗即安

一眼赤鼻孔大喘渾身出斑毛髮如銅  
鐵乃胃中執毒氣結於下焦用白礬  
滑石各一兩為末作一服水三碗煎  
至半冷不住飲候盡乃安

有虫如蠅走於皮膚下作聲如小兒  
啼為筋肉之化用雄黃雷丸各一兩  
為末搽在猪肉片上熟吃盡即安  
手足甲忽然長倒生肉刺如錐痛不  
可忍吃葵菜自愈

鼻中毛出晝夜可長一二尺漸漸粗  
圓如繩痛不可忍雖以痛摘去一莖  
即後更生此因食猪羊血過多遂用  
乳香礬砂各一兩為末以飯丸如梧  
子大空心臨臥各一服水下十粒自  
然脱落

面上及遍身生瘡似貓兒眼有光彩  
無膿血但痛痒不常飲食減少久則  
透脛名曰寒瘡多吃魚鷄韭葱自愈  
腸破腸出臭穢急以香油摸腸用手  
送入煎人參枸杞淋之皮自合矣喫  
羊腎粥十日即愈

鼻中氣出盤旋不散如黑墨色過  
十日漸漸至岩胸與肉相連堅勝金  
鐵無由飲食此多因瘡後得之前澤  
瀉湯日飲三五連服五日愈

遍身忽肉出如錐既痒且痛不能飲  
食此名血擁若不速治潰而膿出以  
青皮葱燒灰淋洗契鼓湯數盞自安  
眉毛搖動目不能視交睫喚之不應  
但能飲食有經中不効者用蒜三兩  
取汁酒調下即愈

一毛竅節大血出若血不出皮脹脈如  
鼓須臾眼鼻口被氣脹各此名脈溢  
飲生姜水汁各一二盞即安

一勿然氣上喘不能言語口中汁流吐  
逆齒皆搖動氣出轉大則悶絕蘇復  
如是名曰傷寒併執霍亂用大黃人  
參末各半兩水二盞煎至一盞去渣  
熱服可安

口內生肉色臭惡自己惡見有根線  
長五寸餘如銀股吐沫出飲食了却  
吞其線以手輕捏痛徹於心困不可  
言用水調生麝香一錢服三日驗  
一渾身生瘡泡如甘棠梨每箇破出水  
內有石一片如指甲大泡復生抽盡  
肌肉不可治急用荆三棱蓬莪木各  
五兩為末分三服酒調連進愈

一頭面發熱有光色他人手近之如火  
燒用蒜汁半兩酒調下吐如蛇狀遂  
安

一人自覺自形作兩人並臥不辨真假  
不語問亦無對乃是離魂用辰砂人  
參茯苓濃煎湯服之真有氣爽假者  
化也

一男子自幼喜飲酒至成下後日飲一  
二升不醉片時無酒吐呼不絕全不  
進食且就衰羸其父用手縛住其  
手足不令動搖但扶以立卻取生辣  
酒一盞灑於其口邊打開其酒氣  
衝入口中病者必欲取飲堅不可與  
之酒更口中忽吐物一塊直下雲中  
即用紙封裹口用猛火燒盡約酒  
乾一半即開視之其一塊如猪肝樣



約三兩重週回有小孔如針眼不可  
數計藥之於江飲食復舊雞滴酒不  
能飲矣

一 夜間飲水俱吞水蛭入腹經停月餘  
中必生下小蛭能食人肝血腸痛不  
可忍面目黃瘦全不進食若不早治  
能令人死用田中乾泥一小塊炙魚  
三四箇將豬脂溶攪勻用巴豆十粒  
去殼膜研爛入泥內為丸菜豆大用  
田中冷水吞下十九小兒只用二丸  
至五丸須更大小水蛭一時皆瀉出  
却以四物湯加黃芪煎服生血補理  
補益

一 婦人產後忽兩乳伸長細小如腸  
下直道小肚痛不可忍愈感良名  
曰乳懸將川芎當歸各二斤半斤

散於瓦石器內用水濃煎不拘時候  
多少溫服餘一斤半剉作六塊用香  
爐慢火逐旋燒烟安在病人面前泉  
子下要烟氣在上不絕令病人低伏  
泉子下將口鼻及病乳常吸烟氣直  
候用此一料藥盡有病證如何或未  
全安略縮減再用一料如前法煎服  
及燒烟薰吸必安如用此一料已盡  
雖兩乳略縮上而不復舊用冷水磨  
草麻子一粒於頭頂心上塗片時後  
洗去則全安矣

一 婦人臨產服催生藥驚動太早夫肉  
離經而用丸太過以胃膜有傷產後  
水道中垂出肉線一條約三尺長牽  
引心腹痛不可忍以手微動之則痛  
欲絕先服失笑散數服仍用老生薑

三片淨洗不去皮於石鉢臼內研爛  
用清油二斤拌勻入鍋內炒熟以油  
乾魚爲度先用熟絹袋約五尺長搗  
作結方今穩重婦人輕輕成疋肉線  
使之屈曲作一團納在水道口卻用  
絹袋兜裏候油姜稍溫傳在肉線上  
薑薑姜漸冷又用炭火熨熱使之  
常有姜氣如姜氣已過除去又用新  
者如此薰炭一日一夜其肉線已縮  
大半再用前法越兩日其肉縮盡入  
腹中其病全安却再服失笑散等歸  
湯補理切不可使肉線斷作兩截則  
不可醫

一 人患勞瘵兩年諸藥不効一日聞肉  
味其腹痛不可忍又恐傳染移在空  
房候其自終經停二百病者腹痛氣

息將絕思憶肉味之急忽有人患雞  
子三枚其病人俛仰取火低頭取尾  
銚煎熟吹火屢燃屢滅鼻中如有所  
碍將熟間忽噴噴一聲有紅線一條  
自鼻中出牽拙約一尺長越下尾銚  
中病人知是怪物急用碗覆前銚中  
盡乃燒火不往其銚欲裂方任火開  
銚祝之乃是小虫一條頭自背具已  
煨死如鐵線樣卽以示家人後棄之  
於江其病卽安

居民逃避石室中賊以烟火薰之欲  
死迷悶中摸索得一束蘿藦煎汁下  
喉而甦又炭烟薰人往往致死含蘿  
藦一片着口中烟氣不能毒入或煎  
曬乾爲末備用亦可或新水搗爛乾  
蘿藦飲之亦可

一自行擗穿斷台心血出不止以米醋  
用雞翎所斷處其血即止仍用真  
蒲黃杏仁去皮大研砂以許研為細  
末煉容調藥稀稠得所發化而安  
身上及頭面上浮腫如蛇狀者用兩  
湖培藥上各痕一錢水化開噉蛇頭  
上立消

一病人齒無色舌上白或喜睡不知痛  
痒處或下痢宜急治之下部不曉此  
者但攻其上不以爲意則下部生虫  
食其肛爛竟五臟便灰燒艾於管中  
薰下部令烟入更入臥雄黃良  
一入被蜘蛛咬腹大如孕其家棄之乞  
食於道有僧遇之教飲羊乳未幾月  
而平

一妖魅猶鬼病人不意巨鬼方鹿角屑

一擗末以水調服方寸匕即實言也

一蛟龍子生在片米上食之入腹變成  
龍子須慎之用錫糲米杏仁乳餅菴  
粥食之三升三服吐出蛟龍子有兩  
頭

一鬼擊之病得之無漸卒者如刀刺狀  
胸脇腹內切痛不可抑按或即吐血  
或血下血一名鬼排斷白犬頭取熟  
血一升飲之

一馬希聖年五十餘性嗜酒常痛飲不  
醉糟粕出前發便溺出後發六脉皆  
沉溫與四物湯加海金沙木香檳榔  
木通苑仁服而愈此人酒多氣肆酒  
升而不降陽極虛酒濕積久生熱煎  
熬血故陰亦大虛陰陽偏虛皆可補  
接此人中年後陰陽虛時斷可活者

以其形實酒中穀氣尚在二百後其  
人必死後果然

醫家十要

凡十二條

一醫家十要

存仁心  
傳施濟衆  
二通儒道  
道理貫明  
三精脈理  
指下既明  
四識病原  
醫家至此  
五知運氣  
補瀉溫涼  
六明經絡  
臟腑洞然

乃是良醫  
惠澤靡深  
儒醫世寶  
羣書莫考  
宜分表裏  
沉痾可起  
生死敢言  
槍是專門  
以明歲序  
按時處治  
認病不錯  
今之扁鵲

七識藥性  
不辨溫涼  
八會炮製  
太過不及  
九莫嫉妬  
天理昭然  
十勿重利  
貪富雖殊

立方應病  
恐傷生命  
火候詳細  
安危所係  
因人好惡  
速當悔悟  
當存仁義  
藥施無一

病家十要

一擇明醫  
不可不慎  
二肯服藥  
有等愚人  
三宜早治  
履霜不謹  
四絕房室

於病有神  
生友相隨  
諸病可却  
自家擔磨  
始則容易  
堅米即全  
自然無疾

倘若犯之

神醫無術

五戒惱怒

必須省悟

怒則火起

難以救護

六息妄怒

須當靜養

念慮一除

精神自爽

七節飲食

調理有則

過則傷神

太飽難越

八慎起居

交際當祛

紛若勞役

元氣愈虛

九莫信邪

信之則差

異端詭詐

惑亂人家

十勿惜費

惜之何謂

請問君家

命財孰貴

一南方人有患病者每延醫至家診視後止索一方令人搗藥下車不論藥之真偽有無炮製輒用服之不効不

責已之非惟責醫之庸明日遂易

醫如是者數致使病症愈增而醫人亦惑亂莫知其所以誤也吁此由病

家之過歟抑醫家之不明歟

北方人有患病者每延醫至家不論病之輕重乃授一二金而索一二劑

雜時奏効否則即復他求朝秦暮楚

殊不知人稟有虛實病感有淺深且

夫感冒騰理之疾一二劑可愈至於

內傷勞瘵之症豈可以一二劑而愈

哉此庸俗之弊悞於人者多矣惟醫

者辨之

一醫道古稱仙道也原為活人今世

醫多不知此義每於富者用心貧者

忽略此非入之恒情殆非仁術也以

余論之醫乃生死所寄責任匪輕豈

可因其貧富而我之薄厚哉告我同志者當以太上好生之德為心慎勿論貧富切是活人是亦陰功也

凡病家延醫乃事人以生死禮當敬重慎勿輕視貧富不在論財自盡其誠辭藥之則非重命者耳更有等背義之徒本得醫人之力病愈思其微言昨作何福易某人之藥所為吝財之計終不歸功於一人即使不得其利又不得其名此輩之心亦不仁之甚矣

一常見今時之人每求醫治令患者臥於暗室惟幙之中並不告以所患止令切脈至於婦人多不之見豈能察其聲色更以錦帕之類護其手而醫者又不棄於問縱使問之亦不說此

非所以求其愈病將欲難其醫乎殊不知古之神醫尚且以望聞問切四者缺一不可識病况今之醫未必如古之神安得以一切脈而測知臟腑也邪余書此奉告世之患病者延醫至家聲告其所患令醫者對症切脈了然無疑則用藥無不効矣昔東坡云吾采愈疾而已豈以困醫為事哉一吾道中有等無行之徒專一誇己之長形人之短每至病家不問疾病權毀前醫之過以駭患者設使前醫用藥盡是何復他求蓋為一時或有所偏未能奏効豈可驟將前醫為庸邪夫醫乃仁道况接受相傳原係一體同道雖有毫末之差彼此亦當護庇慎勿訾毀斯不失忠厚之心也戒之

一人道至要

存心以仁為主  
 慎獨以誠為主  
 出語以確為主  
 接物以恭為主  
 容貌以莊為主  
 飲食以節為主  
 起居以早為主  
 坐臥以常為主  
 讀書以勤為主  
 窮經以理為主  
 吟詩以情為主  
 立言以訓為主  
 日用以儉為主  
 宴會以和為主

修己以敬為主  
 克慾以剛為主  
 制行以清為主  
 處事以義為主  
 衣冠以正為主  
 滋味以淡為主  
 步履以安為主  
 遊覽以適為主  
 作文以精為主  
 觀史以斷為主  
 學術以儒為主  
 異端以闢為主  
 交際以稱為主  
 贈答以謙為主

辨論以直為主  
 事君以忠為主  
 兄弟以讓為主  
 妻妾以分為主  
 宗黨以睦為主  
 故舊以厚為主  
 爭鬪以釋為主  
 祭神以齊為主  
 奉上以謹為主  
 處變以權為主  
 御衆以恕為主  
 教民以倫為主  
 使民以時為主  
 刑罪以省為主  
 發先以懲為主  
 民力以寬為主

辭受以禮為主  
 事親以孝為主  
 子孫以教為主  
 男女以別為主  
 朋友以信為主  
 貧乏以濟為主  
 祀先以思為主  
 御下以恩為主  
 處常以經為主  
 守官以廉為主  
 行政以德為主  
 斷獄以明為主  
 稅斂以薄為主  
 良善以旌為主  
 民財以恤為主  
 田土以限為主

蚕桑以種為主	城廓以完為主
鬬鬪以盛為主	盜賊以息為主
流移以還為主	兵甲以繕為主
士卒以練為主	馬政以孳為主
鹽鐵以均為主	商賈以通為主
交易以平為主	器皿以備為主
林木以儲為主	魚鱉以蓄為主
鷄豕以育為主	橋梁以葺為主
道路以平為主	關市以稽為主
漕河以疏為主	邊塞以防為主
夷狄以霸為主	

一聞評世病

常言大家子弟在於父母之前有因分財產而怨父母不均者有聽如妻言而怨父母不慈者有嫉妒已過而怨父母不道者有放肆奢侈而怨父母拘管者

有飲酒飄賭而怨父母鈔束者有私其妻子而不顧父母衣食者有厚於外戚而薄於父母用度者有弟兄執定輪養而致父母饑寒者有父勞於耕收母苦於耕田去妻安閑而還說父母不是者有父母患病不請醫藥而借言老疾難治者有父母衰老不行扶養而轉言應該作蟲者若此之類難以備述嗚呼父母在日不行孝敬視如路人及至歿後却乃披麻戴孝揚聲號哭請僧供佛修齋追薦盛張鼓樂唱戲贈伴置備佳餚美饌果果醇漿待奉賓客恐不盡掩扎造樓碑做紙人馬等物炫有壯觀徒有千金之費全無一毫之益語云生事之以禮死葬之以禮祭之以禮不遵太聖之成言且悖文公之家禮不惟取譏於



識者抑又傳笑於大邦端書茲數句謹  
自世人一有則改之無則加勉  
虧心神會搜檢禍福報應不鏘半點  
雖不文意思浮淺世病可革古風可遷  
慎之戒之愚言可聽

一放肆詭

嘗見世人負少年豪氣脚襟高傲言語  
剛強將謂無人惟知有已眼空四海欺  
侮一方好讓人之醜態不責已之過失  
口勝魚腸利劍舌賽吹毛快刀尤善于  
拒諫飾非難逃平鄉評輿論一日時衰  
運去禍起蕭牆常抱造次之驚恒懷顛  
沛之厄陷以重典淹禁縲紲浪費萬貫  
難求一生蓋為不仁之所召也嗚呼豈  
若遵禮懼法庶已石人有心恭謹安分  
脩德使鄉黨稱為端人乎

一鬪訟訓

竊見今人偶因一言之忿不忍或錘銖  
之利不均輒然鬪訟構訟夫我欲求勝  
于彼則彼亦勝於我矣仇仇相結怨怨  
相報遭官刑考訊身罹重罪久禁囹圄  
苦不堪言以致父母憂泣兄弟愁悲妻  
子驚哭朋友歎息擲千金而身命不保  
盡百計而無可脫破家蕩產禍貽兒孫  
尚未已也嗚呼豈若含忍一時後退一  
步饒讓一着庶幾安身樂業得享康福  
使鄉里稱為善人乎

新刊萬病回春卷之八終

萬病回春後序

嘉靖丙辰歲六月

十有一日

世宗肅皇帝遣平江

伯陳王謨偕諸司

持

節授冊襲封余爲王

時值溽暑祇乃事

罔恤勞瘁症中痰

火頭眩喘嗽膝趾

腫痛不能動履四

時疾作苦楚莫禁  
余嫡長子朝陞偏  
延諸醫治皆罔効  
誠墮痲病也萬曆  
丙戌五月復熾始  
岌岌矣長子晝夜  
驚怖籲天身代皇  
皇無措天假良緣  
適金谿龔生雲林  
以應撫臺洪溪  
衷公之聘卽泮邸

獲與荆識叩其學  
術卽迺父西園公  
家傳儒醫奕業鳴  
世久矣余忻然景  
慕遂隆禮幣延生  
爲入幕上賓生感  
其誠迺曰可謂  
者務爲良相佐  
聖主成雍熙之世  
顯方脉者務爲良醫  
躋生民登仁壽之


域余弗類不克爲  
良相以光輔太平  
願以良醫濟世保  
王躬享遐齡增上  
壽以永國祚復沉  
潛診視植方投劑  
獲効如響不旬日  
而漸離榻又旬日  
而能履地又旬日  
而康復如初三十  
餘禩沉疴一旦起

而全愈之噫亦神  
矣哉生其聖於醫  
者乎因悉叩其生  
平蘊籍出古今醫  
鑑種杏仙方二帙  
已刊行于世覽之  
者人人擊節歎賞  
如醉春風矣然尤  
以爲未展盡其底  
蘊又括百家奧旨  
成萬病回春一集

其精微玄妙諸名  
公已序其首矣夫  
復何言顧余感其  
惠深嘉其用心之  
仁敢僭一言以續  
于後夫集以萬病  
回春名之者數總  
于萬也病而曰萬  
則無不該括時和  
于春也春而曰回  
則無不發生如萬

物當嚴凝肅殺之  
餘挽之以陽春大  
和之盛天之造化  
生斡旋之矣行且  
大有補于世道醫  
國醫民何忝于良  
相乎是宜售諸梓  
以廣其傳云  
萬曆二十五年歲次  
丁酉孟秋之吉

周藩海陽書院勅撰



貞享四稔太歲

旅丁卯五陽月成焉

植村藤右衛門刊

