





卷之八

小兒科

表一 急慢驚風

原

製六 鎮驚散

製七 醒脾散

製七 附 曾氏醒脾散

製七 附 準繩醒脾散

製七 附 大醒脾散

補

製七 敗毒散

製八 芩活湯

製八 加味和中湯

製八 附 啓脾丸

製十 寬氣飲

製十 疳疾

原

製十 消疳飲

製六 附 南極壽仙散

製七 附 吉州醒脾散

製七 附 加味醒脾散

製七 附 湯氏醒脾散

製七 天麻散

製八 人參湯

製八 啓脾湯

製十 補脾益真湯

製十 錢氏白朮散

製十 附 肥兒丸



補 表 消疳丸

裏 瘵疾 附熱証

原 表 消癍湯

補 裏 抑肝扶脾湯

表 大連翹飲

裏 羚羊角散

裏 生犀散

表 秘旨安丸

表 秘旨補脾湯

表 導赤散

表 加味導赤散

裏 補感冒

補 裏 惺惺散

表 羌活湯

表 大羌活湯

裏 脫甲散

裏 嬰童百問脫甲散

裏 傷食

原 裏 消食散

表 附醫鑑消食散

神 表 清中解鬱湯

裏 大和散

裏 銀白散

表 嬰童百問銀白散

裏 腹脹

補 裏 消脹散

裏 史君子丸

裏 腹瀉

補 裏 治小兒腹瀉

裏 乳頭散

裏 湯氏乳頭散

裏 六神散

裏 人參散

裏 定吐飲

裏 泄瀉

補 裏 參苓白朮散

裏 四神丸

裏 錢氏白朮散

裏 益黃散

裏 附砂仁益散

裏 正傳益散

裏 附醫鑑益散

裏 痢疾

補 裏 清熱化滯湯

裏 香連丸

裏 嬰童百問香連丸

裏 瘡疾

補 七味清脾湯 養胃湯

截瘡飲

補 咳嗽

補 參蘇飲 人參平肺散

附 小兒直次人參平肺散

喘急

人參款冬膏

補 雜病

補 夜啼六神散 乳頭散

追虫丸

當歸連翹湯

附 瀉黃散

附 補脾散

清胃外麻湯

附 立効散

瀉心湯

一方

清胃養脾湯

附 壽世保元

昌滿丸

調元散

破故紙散

澄清散

沒藥散

茯苓滲濕湯

羽澤散

四順清涼散

甘桔湯

化痰降火湯

仙方活命散

練陳湯

宜風散

補 初生通用

補 五香湯

小五香湯

加味五香湯

附 五香連翹湯

痘疹

補 惺惺散

外麻葛根湯

參蘇飲

敗毒散

五積散

加味敗毒散

連翹外麻湯

明醫雜著方

消毒飲

快班散

如聖湯

加味四聖散

原方四聖散

神功散

紫草木香湯

保元湯

大保元湯

吳昆保元湯

十奇散

吳昆內散

木香散

異功散

起死回生散

馮氏天花散

熱眼丹溪方

麥門冬飲

單胎散

獨聖散

安胎散

補麻疹

二仙湯

犀角解毒湯

十仙湯

訂補衆方規矩大全卷之八

小兒科

察視總論

夫自初生至十四歲謂之幼科初生者曰嬰兒三歲者曰小兒十歲以至十四歲曰童子兒有大小之不同病有淺深之各異形聲色脉之殊望聞問切之間若能詳究於斯可謂神聖工巧者蓋望者鑑貌辨其色也聞者聽聲察其症也問者問病究其原也切者切脉察其病也望聞問切四者醫家之大法也

察望

小兒諸病但見兩眼無精光黑睛無運轉目睫無鋒芒如魚貓眼狀

或兩眼閉而黑睛昧者死或外
若昏困而神藏於內不脫者生其
有病篤而眼神氣不脫者猶可治
眼者五臟六腑神氣之所發神氣
已脫脈雖僅存亦未能保黑珠滿
輪睛明者少病眼白多睛珠或黃
或小者稟弱多病目內赤者心熱
淡紅者心虛熱青者肝熱淺淡者
肝虛黃者脾熱無睛光者腎虛白
而昆者肺熱○左臉屬肝一云眉
稜上下又云太陽其色青者為順
白者為逆若色赤主肝經風熱發
熱拘急青黑主驚風腹痛淡赤主
潮熱痰嗽○右臉屬肺又云太陰
其色白者為順赤者為逆若赤色

甚者主咳嗽喘急悶亂小便赤澀
或淋閉不通○額上屬心一云顴
臉其色赤者為順黑者為逆若青
黑主驚風腹痛瘰癧啼哭微黃主
盜汗頭髮乾燥驚疳骨熱○鼻屬
脾一云人中其色黃者為順青者
為逆若色赤主脾經虛熱飲食少
思深黃主小便閉而鼻燥衄血○
頰屬腎一云耳輪其色黑者為順
黃者為逆若色赤主腎與膀胱有
熱而小便不通○肝病則面青肺
病面白心病則面赤脾病則面黃
腎病則面黑○面赤風熱青驚風
黃脾怯白色光虛寒黑色腎敗命
須亡多睡者內熱○手如數物兮

肝風將發將手抱頭者死面若塗
朱兮心火似炙肚大脚小脾困而
成疳○髮黃焦槁血虛臍小臍高
肉不就髮稀色脆短色啼遍躰青
筋俱不壽○雙足冷手中指熱心
是傷寒知有熱肚皮未鼻與中指
冷是麻痘耳冷風執症渾身皆熱
是傷寒上熱下冷傷食病五指稍
頭冷驚來不可當

察聞
肝病則聲雄肺病則聲促心病則
聲大脾病則聲緩腎病則聲沉又
大腸病則聲長小腸病則聲短胃
病則聲速膽病則色清膀胱病則
聲微○聲輕者氣也弱也重濁者
痛也風也色急者神驚色塞者痰

聲戰者寒也聲嗜者氣不順噴嚏
者傷風驚哭聲沉不響者重舌濁
沉靜者疳積○啼聲直往來無淚
者是痛連聲不絕而多淚是驚
好食酸則肝病好食辛則肺病好
食苦則心病好食甘則脾病好食
鹹則腎病好食熱則內寒好食冷
則內熱○坐臥愛暖風寒之久伸
縮就冷煩熱之攻

察切
小兒初生至半歲看額脈周歲至
三歲看虎口二關二歲已上以太
指上下滾轉分取三部診寸口三
部脈○額脈者額前眉上髮際下
以無名指中指食指三指按之俱
熱感寒邪鼻塞色粗俱冷吐瀉臟

不安食指執胸中滿無名指執乳
難消食脂中指執則上熱下冷無
名指中指執便是來驚之候○虎
口三關虎口又手處是也食指第
一節名風關第二節名氣關第三
節名命關謂之三關以男左女右
手爲主左陽右陰故也然陰陽男
女均有兩手亦當參驗左應心肝
右應肺脾凡脈紋見風關爲輕見
氣關爲重過命關則難治矣紫熱
紅傷寒青驚白色疳黑者中惡黃
者脾之困也淡紅則寒熱在表深
紅必主傷寒痘疹紋亂則病久紋
細則腹痛多啼乳食不消紋鹿直
射指甲必主驚風惡候紋黑如墨

必難治○及二歲以上乃以一指
按三關寸關常以六七至爲率添
則爲熱減則爲寒若脈浮數爲乳
癩風執或五藏壅虛濡爲驚風緊
實爲風癩緊弦爲腹痛弦急爲氣
不和牢實爲便秘沉細爲冷大小
不勻崇脈或小或緩或沉或細皆
爲宿食不消脈亂身熱汗出不食
食卽吐爲變蒸也浮爲風伏結爲
物聚革細爲疳勞小兒但見憎寒
壯熱卽須問曾發斑疹否此大法也
通評虛實論曰帝曰乳子而病執
脈懸小者何如岐伯曰手足溫則
生寒則死帝曰乳子中風執喘鳴
肩息者何如岐伯曰喘鳴肩息者

脈法要訣

脈實大也緩則生急則死○張介
賓云愚按此二節之義可見古人
之診小兒者未嘗不重在脈也即
雖初脫胞胎亦自有脈可辨何後
世幼科如水鏡訣及全幼心鑑等
書別有察二關之說於脈則全置
不問夫三關乃手陽明之浮絡原
不足以候藏府之氣且凡在小兒
無論病與不病此脈皆紫白而兼
乎青紅雖特有濃淡之異而四色
常不相離也何以辨其雷驚人驚
水驚獸驚之的確乎即余初年亦
用此法然惟則摸疑似終屬茫然
奈何近代醫家習此為常全不知
脈欲濟其危胡可得也及備考內

經則並無二關名目惟經脈篇有
察手魚之色者若乎近之然乃藥
言診法亦非獨為小兒也又云二
關之說特後世之異端耳不足憑
也故凡欲診小兒者在必察氣口
之脈面部之色呼吸之聲或兼察
手魚亦可也且小兒之脈原非太
方之此不必多岐但求於太小緩
急虛實六者之間可以盡之診得
其真取如反掌既明且易豈不大
愈於彼哉

治不

眼生赤脈貫瞳人顙門腫起又作
坑指甲黑色鼻乾燥鵝聲忽作吐
青筋虛舌出咬牙齒目多直視
不轉睛魚口氣急啼不得蛔蟲既

出死形真手足擲插驚過節靈丹
十救一無生

急慢驚風

急驚脈浮數洪緊○慢驚脈沉遲
散緩

論

再

閱甫翁醫方問餘曰曾氏曰急驚
之論前代書所不載惟曰陽癇又
云治慢驚者考之古書亦無所據
惟載陰癇而已蓋慢驚屬陰陰主
靜而搖緩故曰慢王宇泰曰小兒
急慢驚風古謂陰陽癇也急者屬
陽陽盛而陰虧慢者屬陰陰盛陽
虧錢仲陽曰急者實熱慢者虛熱
故俱侵寒涼劑已曰驚風則知是
心膽受風寒心主神膽主驚心膽

素有積熱而陽氣盛偶感風寒則
陽不發故神志昏亂驚跳搖擗瘰
癧上竄角弓反張臏腹凸起此皆
陽鬱之狀也急驚者太邪入心膽
陽神為邪其發也卒暴也慢驚者
稟賦怯弱心膽陽神不甚感邪之
中之亦不甚故其發也不暴烈或
醒或發搖擗亦不甚剛故俱皆保
神志祛風寒兼宜致阻邪侵脾土
之慮然太邪中心則縱得一愈或
半年一季內神志未復又微感邪
卒然而死若早治之神志未衰者
及年長為癇而終身無愈此論實
足破千古之惑好生之君子宜深
察深省矣

治不

急驚眼睛翻轉口中出血兩足擺
跳肚腹搖動或神緩而摸體尋衣
或証篤而神昏氣促噴藥不下通
關不噉心中熱痛忽大呼者不治
○慢驚四肢厥冷吐瀉咳嗽面黯
神慘鵝聲胃痛兩脇動氣口生白
瘡髮而搖頭眼睛不轉涎鳴喘喘
頭軟大小便不禁手足一邊牽引
者皆不治

方治

鐵驚散

治驚風搖榻痰嗽喘熱

星 芸 蟬 苛 甘

右入姜煎服

按急驚之主方也初發時予與

九文見此加定香錄而取驗多

補訂

南樹亭仙散可按此方却風痰

驚之劑也○喻昌醫門法律癩病
論云如不見之體脫神性不耐外
感壯熱多成癩病後世矣以驚風
立名有因症生候之鑿說實則
指瘧病之卒口禁脚響急者為驚
風之極樹指瘧病之頭搖手動者
為驚風之抽掣指瘧病之背反張
為驚風之角弓反張引利翕然宗
之病家坦然在之不治外為之邪
反投金石腦癩之藥勾引外邪深
入則穢干中干死從未有救者
可慨也矣此實為超世之論醫者
見急驚之証仔
細省之而可也

醒脾散

治小兒吐瀉不止作慢

驚風脾困昏沉默默不食

參 伽 苓 蜜 全 蝎

定 喬 白 附 甘

右姜棗煎服

按慢驚之主方也

補訂

按去丁子甘中加僵蚕各用州醒
脾散天丁子加石首蒲石蓮肉各
曾氏醒脾散治疳瀉脾困不食痰
作驚風有熟去木香或加南星半

夏陳皮陳米又此方加蓮肉石菖
陳皮山藥南星茵豆蔻縮砂各加
味醒脾散治小兒慢脾風內虛昏
迷不醒因院加附子白薑又(準綱)
醒脾散止吐瀉進飲食去木香全
蝎天麻白附子甘草姜盞加藿香
南星砂仁右碎每服一錢水一木
盞姜三片冬瓜子仁在拾粒搗碎
慢火煎七分空心服之急必吐又
去天麻下子加陳皮半夏南星陳
米各湯氏醒脾散又去天麻白木
下子加南星陳皮陳米蓮肉各(天
醒脾散)醒脾散類其多皆補脾
神之劑也從症候輕重宜擇用
補敗毒散 治急驚風初起發熱
手足搐搦上竄太吊角弓反張并
一切感冒風寒頭痛發熱咳嗽喘
急鼻塞聲重及瘡疹欲出發搐並
宜服之
本方加定蝎蚕附錄各等方見元
天麻散 治急驚脾胃虛弱或變
慢驚者

守分定二分 甘炙令 伽各二
右入姜三片磁器內水煮候乾為末
每服一錢五分姜棗湯調下
補訂 劉純曰此溫脾養胃之劑非止於
陳風脈痰藥也太抵小兒血氣未
充體虛者多或因初後發宜與
凡調理而不為峻劑下脂轉成燥
證者此等方
則度幾矣

芳活湯 治急驚風角急反張
參 杏 羌活 甘草
桂 芍 升 枳
右入姜水煎服

補訂 按此方小續命湯之變
也宜參考而知方意
人參湯 最能利驚

小柴胡湯加防風枳殼
加味和中湯 治小兒慢驚風
參 伽各五 貴 蝎各五

田 定 錢 各 七 分 芍 甘 各 三 分 細 二 分

右入姜棗水煎服

補訂 按此七君子補虛兼餘味驅風痰鎮驚治慢驚之良方也

啓脾湯 百病愈後俱用此藥調

脾爲主

茵 兩 伽 二 錢 芩 兩 參 兩 猪 兩 芋 兩 麥 兩 蜜 斤 煎 破 各 三 分 行 各 三 分 貴 二 分 甘 一 分

驚風後加辰滑各二

爲未任意姜湯調服○初生兒

塗乳頭上服之

補訂 按此方止吐瀉消食補不足健脾

胃之劑是啓脾丸之加味也○啓

脾丸消食止泄止吐消疳消黃消

脹定腹痛益元氣健脾開胃入赤兩

白木兩山查陳皮澤瀉甘草各五錢

白茯苓山藥蓮肉各兩石爲細末

煉蜜爲丸如棗豆大每二十四丸

空心米飲送下或爲餅以米飲研

化服亦可小兒常患食傷諸疾服之立愈

補脾益真湯 治小兒胎稟怯弱

外實裡虛因嘔吐乳妳糞色青而

成慢驚風氣逆涎潮眼珠直視四

肢抽掣或因變客忤而作或因

持拘驚嚇而作或因懼服鎮心寒

涼藥而作

蜜 斤 參 三 錢 芪 三 錢 喬 三 錢 訶 三 錢

貴 斤 朴 三 錢 行 三 錢 甘 三 錢 珍 三 錢 苓 三 錢

伽 三 錢 桂 三 錢 守 三 錢 附 各 七 分 蝎 一 錢

右入姜煎服○渴者去附喬行加

參倍苓○瀉者倍喬訶○嘔吐者

倍貴喬守○腹痛者加枳良○腹

脹者加朴喬西奴○咳嗽者加西

玄去附桂珍衍○痰喘加西奴枳

去附喬衍珍○足冷加附喬朴○
氣逆不下加西奴去首附衍○惡
風自汗加芪桂

補訂按此方去寒消乳食，益解補元氣之劑也。

寬氣飲 治小兒風痰壅滯風傷

於氣不能言語

奴 參 定 羌 蚕 甘 半

右每服一錢用末一盞姜片煎五

分不拘時服

按予治慢驚口眼拘攣手足攣

攣甚者用此湯得數効見準繩

幼科

補訂按脾胃弱肝膽素熱盛偶感風寒，閉塞陽氣不振發成手足攣攣，眼拘攣不能言語等語者，用此方得効矣。若夫元氣虛脫者非此方之所及焉。

錢氏白朮散

慢驚通用 方見中暑

疳疾

論疳論脈 脈訣啓蒙曰小兒脈單細為疳勞，虞搏曰內經曰數食肥令人內熱，數食甘令人中滿蓋其病因肥甘所致故命名曰疳若夫襁褓中之乳子與四五歲之孩提乳哺未息胃氣未全而穀氣尚未乏也父母不能調攝惟務姑息猷犢之愛遂令恣食肥甘與夫瓜果生冷及一切烹飪調和之味朝飧暮食漸成積滯膠固以致身熱瘵瘦面色痿黃或肚大青筋虫痛瀉利而諸疳之証作矣治法當以補為先兼消積止瀉利○五疳者五藏之疳是

也曰肝疝亦名風疝亦名筋疝為其症也白膜遮睛瀉血而瘦心疝亦名驚疝為其症面黃頰赤身壯熱口內生瘡愛飲冷水喜伏眠於地脾疝亦名食疝亦名肥疝為其症面黃腹大食泥土湯氏曰脾疝食不消胃疝多吐肺疝亦名氣疝為其症氣喘口鼻生瘡大腸不調頗頗泄利糞帶出米口有腥氣右腮既白腎疝亦名急疝亦名骨疝為其症極瘦身有瘡疥喜臥冷地腦熱如火脚冷如水五疝症候甚多此略記其大概然不過極於五藏所屬也

益后

一曰疝乾二曰疝渴三曰疝勞四

方治

曰疝瀉五曰疝痢六曰疝腫○又一日蛔疝二曰腦疝三曰脊疝四曰無辜疝五曰丁奚疝六曰噴露疝

消疝飲 治小兒疝疾身熱面黃肚大青筋瘦弱

參 加 胡 連 曲
蓮 靛 陳 硃 甘

右水煎服○傷食加查○有蟲加史按諸疝通治之方也

補訂

按此方主意在脾疝壽世保元曰五疝病關五藏要亦脾家在二藏有積失治而傳其餘也脾家病法餘藏皆已乃此之謂也然疝症非一端此一方豈盡其變乎○本方去青皮陳皮瓜仁加麥牙山查芦蒼史君等名肥兒疝消疝化積磨癰清熱化疝補脾進食殺蟲潤肌膚養元氣真王道也

補消疝丸

治五疝皮黃肌瘦髮

直尿白壯大青筋好食泥炭茶米之物或吐或瀉腹內積塊皆由痛

蒼 貴 朴 奴 棋 曲
查 形 解 茂 砒 令
連 胡 蓮 蕪 夷 史 芦

右為末史君子殼煎湯泡蒸餅為

丸如彈子大每服一九清米湯化下

補訂

按此方一名大蘆薈丸治疳消食積肉積蟲積攻擊之劑也脾胃甚虛者可斟酌之思謂小兒之疳症其源屬於脾家至於其變而有各走難辨者若守若一其味全功也恰似以管窺天不可不審方藥方矣

瘵疾 附熱症

脈沉細為瘵積

論瘵

回春曰錢仲陽云瘵塊者僻於兩脇痞結者否於中脘此因乳哺失調飲食停滯邪氣相搏而成或乳

母六淫七情所致古人多用尅伐

瘵癰既久飲食減少脾氣必虛久

而不愈必先以固胃氣為王使養

正則積自除若欲直攻其結不惟

不能善消抑亦損其脾土凡脾土

虧損必變症百出矣當參各類及

隨見症而主治之若瘵塊日久元

氣脾胃俱虛宜朝服補中益氣湯

夕服千金消瘵丸間與混元丹兼

服治之獲効者多矣

方治

消瘵湯 治小兒瘵疾發熱口乾

尿赤

參 木 苓 守 柴 芩
猪 澤 胡 蓮 門 稜
我 查 甘

右姜棗煎服則立効
如癰病日久元氣虧損此方不効
宜多服醫王卷三養正積自除

按小兒癰積之主方也

補訂此方原無麥門冬醫鑑各淨府散
回春保元等亦各淨府湯乃西園
公之製也治小兒腹中瘕塊發熱
憎寒口乾小便赤大便稀溏或腹
脹腫滿或痰嗽喘熱不思飲食面
黃肌瘦四肢困倦等症此冀延賢
之論也

補抑肝扶脾湯 治小兒癰疾日

久不消元氣虛弱脾胃虛損肌消

能壯大青筋發熱口乾吐腹脹滿

參五分 佛手 游茶 查各

貴童曲柴胡連各

甘各三分 連姜制一

右入姜棗煎服

補訂按此藥雲林製之補元氣健脾胃
退熱消癰之方也○右二方并改
半補之劑直對證選用蓋非積癰
塊等病將王道治之而可也勿需
速効矣

大連翹飲 治小兒傷風感冒發

熱痰核顯赤癰瘡眼目赤腫口舌

生瘡咽喉疼痛小便淋瀝胎毒痘

疹餘毒一切熱毒并治

堯句 滑朱 力藜 分分

冊翁 介芸 柴芥 分分

假各一分 蟬五 甘一 竹葉 十分

燈草 十莖

右水煎服○風痰骨蒸加門○實

熱丹熱加虎○胎熱痘疹餘毒加

詩○癰癰熱毒加虎芒

補訂華氏曰治小兒心經邪熱心與小
腸受盛乃水竇之處常宜通利壅

則結滯則脫熱則瀉盛則淋平涼
心火三焦自順不待疾作而解証
成而療者疎待有之矣十五味
加湯使用總覺溫熱客熱寒邪風
邪胃之肺經心將受之不受則解
傳於小腸或閉或瀉或赤或白淋
瀝不通榮衛不行壅滯作疾其發
多端以致肝熱眼目赤腫唇口白
瘡津液不生涕唾稠盛須在表裏
俱得其宜驚風悉能散之痰執亦
自消除連翹之功可謂大矣

羚羊角散 治夜啼及多驚熱
羚羊 犀 神 愛 甘 少

右水煎服
按此方解熱安神鎮驚之劑也心
經有熱而驚啼者可用之若夫錢
氏所謂小兒夜啼者脾藏冷
而痛也當以溫中之藥矣

生犀散 治心經虛熱
犀 二 錄 赤 煎 柴 葛 兩 甘 五 錢

右水煎服
小兒直訣薛鎧校註云按前方云
治心經虛熱然其所用多屬瀉心

瀉肝脾之劑蓋虛熱二字以心傳瀉
之誤候如心經自病而血虛執者
用秘青安神丸脾虛奪心之氣而
熱者用秘青補脾湯肝水不能生
心火而虛熱者用地黃丸○秘青
安神丸治心血虛而驚悸或
受驚嚇而作人參半夏酸棗仁炒
茯神各錢當歸橘紅赤芍藥炒七分
五味子五分梓甘草炙三分右為末姜
汁糊丸茶實大每服一丸生薑湯
下○秘青補脾湯治人病面黃肌
瘦變牙目斜頭髮稀以誤藥所致
人參白朮各錢白芍藥酒炒白朮
苓各八分陳皮川芎各六分甘草
蜜炙當歸酒洗各四分
右每服二三錢姜水煎

導赤散 治小兒小腸實熱小便
秘赤

右入淡竹葉水煎服
薛鎧曰導赤散瀉心小腸實火之
劑蓋心為脾母脾為心子然心既
病則脾土益虛矣用者審之○本
方加人參麥門冬竹葉燈心各加
味導赤散治小便黃赤口乾煩渴
者吳昆曰內熱故用生地黃小便

補訂
薛鎧曰導赤散瀉心小腸實火之
劑蓋心為脾母脾為心子然心既
病則脾土益虛矣用者審之○本
方加人參麥門冬竹葉燈心各加
味導赤散治小便黃赤口乾煩渴
者吳昆曰內熱故用生地黃小便

黃赤故導以木通作導燈薪口乾
煩渴故潤以人參麥冬甘草乃氣
化而津液
自生也

補感冒

論病

凡小兒之感冒瘧痢泄瀉嘔吐喘
咳腹痛傷食等諸症與大人同法
唯有大小輕重之不同而已若夾
胎毒疳驚等證者各宜隨其証而
處治之也

治

惺惺散 治外感風寒鼻塞痰嗽

發熱

參 佛手 茯苓 利 細 甘
芎 藜蘆 各等

右水煎服 一方加芍

補

按服此藥而惺惺醒故各名之○果
也仍細辛桂枝梗所以疏其陽天
粉白芍藥所以和其陰○宜春翁

曰四君子補元氣細辛桂枝散以
陰之邪天花粉止搐掣均藥和肝
調血故瘧瘧將初發之時不用散
毒散升麻葛根湯類多用此方愈
後無害脾胃傷元氣今醫
不知反用涼解劑大不可

羌活湯 治風邪所傷頭目昏眩

痰涎壅滯肢節煩疼

羌 四 甲 苓 芍 甘
蔓 芥 奴 細 羌 女
芸 各等

右水煎服

天羌活湯

羌 搖 離 芸 苓 連
蒼 伽 甘 芍 細
雷 地 各一

右水煎服

補訂

按右二方涼解之劑
若元氣虛者不可也

脫甲散

治小兒發熱頭疼日久

不愈

甲柴 斤 雷 遊 各三
參 芍 各二分 甘 四兩

右入姜棗水煎服○表不解加甲裡不解加虎

補訂

嬰童百問方無麻黃入連翹葱白一寸其論云治嬰兒傷寒體熱頭目昏沉不思飲食夾驚夾食寒熱大小便閉澀或赤或白煩燥作渴冷汗矣流夾積傷滯膈滿脹急青黃體瘦日夜太熱及療傷風傷寒傷暑驚病客忤骨節腎臟疳氣等熱並宜服之此方散熱扶表救裏表虛令汗不安行重熱令氣不開結外即通開內即閉渠通關流行經絡開渠不壅藏府熱在表裏之間施無不可

傷食

方治

滯食散 治小兒傷食腹痛或脹滿或宿食不消面色黃目無睛此

藥能調和胃氣乳哺消化

查曲 砂 芽 伽 陳
青 甘

右入姜煎服○受寒作痛加藿吳○有熱加芩

按兒傷食之主方也

補訂

醫鑑曰治小兒腹痛多是飲食所傷治宜和脾消食即本方有香附米七分餘藥各著分兩右為細末每服一錢七分量兒大小清米飲或白湯任下且作有熱加芩黃連

補清中解鬱湯 治脾氣虛弱飲食停滯鬱熱生痰或身熱赤暈

伽 苓 貴 冊 查 曲
芽 芍 利 甘 各等分

右水煎服

補訂

按此方治宿食生鬱熱者也○巢氏曰夫宿食不消者脾胃冷故也

小兒乳哺飲食取冷過度冷氣積于脾胃脾傷於冷則宿食不消既沉者傷食不化故也
右証不宜消解矣

天和散 治內傷乳食肚腹脹痛

外感風寒頭眩發熱宜服

水 貴 赤 卷 蒼 芎
奴 查 曲 芽 甘 各等分

右入姜水煎

補訂

按此外解內消之劑龔氏曰若內停於食或外感寒邪者則人迎氣口俱緊盛宜以天和散主之
之○脾胃虛弱者不宜用

銀白散 升雷預扁參伽苓甘 各等分

右為末每一錢沸湯調服治小兒百病加減出入○如慢驚搐搦麝香飯湯下○急驚定後陳米湯下○驚吐不止丁香湯下○天柱骨倒脚軟濃米湯下○夾驚傷寒薄

補訂

荷葱白湯下○疳氣肚脹氣急多渴白合湯下○壯熱面赤驚叫金銀薄荷湯下○赤白痢不思飲食及諸病後倦怠不思食姜棗湯下○喫食不知飢飽不長肌肉芽姜湯下○暴吐蘊瓜湯下○神形脫語言不正及大人吐瀉藿湯下○若稟受氣怯小兒可每月一服最妙
按此局方之方也簡易方有木香黃芪白附子姜棗糯米藿香天麻無知母共十四味各著分兩治法同○嬰童百問銀白散治時後胃虛將發慢驚者糯米扁豆各二兩香白木各分丁香云蘇甘草有為末紫蘆米飲調下加天麻破仁白茯苓飲腫正色直指方加炮自附全蝎木香石蓮生薑

補腹脹

消脹散 治小兒腹脹

治

葡萄水 齊貴 奴甘

右水煎服○食少者加伽

訂按此消導順氣之劑也真眠壯實者潮風之若也乎而然小兒腹脹多因脾胃虛弱飲食所傷勿犯虛虛之戒焉

史君子丸 治藏府虛滑及疳瘦

下利腹脇脹滿不思乳食

史一甘 笑 朴 訶半片 煨 黛各五分

貴五分

右為末煉蜜凡太實大每服五片米飲化下

補腹痛 附嘔吐

凡小兒腹痛 多是飲食所傷

宜此湯

伽二分 貴 童各七分 查 曲

破 牙各一分 廿分

右為末米飲或白湯下○有寒加

雀巢有熱加琴 此方乃前消食散也重出

乳頭散 治夜啼不止腹中疼痛

長 蜜各等分

右為末以許著乳頭上使吮乳就服之

補計 按湯氏乳頭散有當歸甘中芍藥五味各等分

六神散 治腹痛啼哭面青口中

冷氣四支亦冷曲腰而啼或太便

泄瀉青白糞及不吮乳

四君子湯加預扁方見四卷下

右人參棗木煎服

凡腹痛通用大七氣湯見四卷七種聚香砂

平胃散見二卷內傷宜用

人參散 治嘔逆

參 伽 守 永 雪
貴 各 等 甘 火

右入姜棗水煎服

〔定吐飲〕 治吐逆投諸藥不止服

此神効

守 二兩 桂 一兩 桂 三錢

右姜切作小塊如菽豆大，同前半夏和勻，入小鍋內，慢火順手炒令香熟，帶乾方下桂，再炒，以微有香氣，以紙攤開地上，去火毒，候冷，略搗去黑焦末，每服二錢，水一錢，姜片煎七八分，空心少與緩服。

〔補泄瀉〕

〔參苓白朮散〕 治脾胃虛弱飲食不進，多因以方中滿痞噎，心中氣

〔方治〕

喘嘔吐泄瀉，此藥和中不熱，久服養氣，精神醒脾，悅色順正，辟邪。

參 伽 苓 朮 芎 藭 白 朮 各 二 錢
扁 豆 半 斤 薏 苡 仁 一 斤 砂 仁 一 斤

右為末，每服二錢，棗湯調下，量兒歲數加減。

〔四神丸〕 治脾胃虛泄瀉，不食或不時去後，不實或乳母患此，致兒為患。

衍 玄 骨 子 吳 一 兩

右為末，水二碗，姜兩，紅棗百枚，煮熟，取棗肉和末，麻子大，每服二三十片，空心食前白湯下，子母并服。

〔神訓〕

凡脾胃之氣，其元虛弱，不能消化，飲食而泄者，非其本君，是益補中，氣湯見二五，下二神在四神丸，滋其本源，致不極。

錢氏白朮散

治吐瀉或病後津

液不足口乾作渴和胃生津止瀉

利將欲成慢驚風者

參 伽 苾 藿 蜜 葛

甘 各等分

右水煎服頗瀉瀉將慢驚風加

預扁衍○慢驚已作加小定蝎白

附○吐酸胃寒加香○胃虛不能

食而大渴不止者加瑞○能食而

渴者白虎湯加參○中氣虛熱口

舌生瘡不喜飲冷者宜此湯

益黃散 治脾上虛寒嘔吐泄瀉

方見驚 吐瀉肢厥顛陷加藿喬

風門 ○驚啼瘈瘲臥不安加蝎鈎藤白

附○赤白痢加白朮○白痢加水

○泄瀉加貴朴○傷風加芩芸羌

小○發瀉加葛枳瓜

補訂

按本方云見驚風門而不載蓋

傳寫之誤也今補之且有同各異

方列序下後○益黃散治脾上虛

寒嘔吐泄瀉陳皮青皮訶子肉桂

錢丁香益母草各二錢右為末每服

一二錢水煎服方考去甘草加木

香砂仁各一錢益黃散吳昆曰仲

景云邪在中焦則既吐且瀉故用

陳皮青皮理其脾丁香木香溫其

胃訶子所以止瀉砂仁所以消食

正傳益黃散無木香四味而已又

各補脾散治小兒脾胃虛寒脾疳

鼻生瘡等證天氏曰愚每於本方

加參木各一錢効疾鑑直加人參

一錢白朮二錢為八味○益黃散

治胃中風熱黃芪二錢陳皮人參

治

清熱化滯湯

治痢主方

連 吳茱萸 芍 貴 苓 奴

湯 拌炒 貴 苓 奴

宜與大人痢門參考之

苓 片

右入姜水煎服○初起積熱正熾
 加虎芒○血痢加茯苓印○白痢
 加朴奴○赤白并下加芍斤嬰紅
 消貴永多辛多苦○白痢久虛加御芪令
 去苓連奴○赤痢久虛下後未愈
 去苓連加斤芍琴琴○裏急後重
 加蜜洗○腹痛加芍保元廷奴○
 小便赤以加翁猪澤○下如豆汁
 加御蒼芸○食積加查洞牙曲○
 久痢氣血兩虛加參芪斤芍升行
 ○下後二便流利惟後重不去者
 氣陷于下以升當有提之麻字

香連托

連十兩用吳茱五兩水并濕入
 磁罈燒滾湯中半日炒焦出

蜜 一兩

右為末醋糊丸如赤豆大每服二

三九白湯下

補訂

百問方有訶子此二味治釀積瀉
 又治藏熱毒痢○右二方禁於冷
 痢及虛
 弱者

○凡脫肛色赤或痛用補中益氣

湯見二七送香連丸○久痢裏急後

重欲去不去手足并冷者用補中

益氣湯加蜜膏脂倍升柴

補瘧疾

宜參考大人瘧門

方治

七味清脾湯

治食瘧嘔吐痰沫

及時行瘧瘧不問先寒後熱諸瘧

通用見三卷三

小便赤加猪芋

養胃湯

治停食感寒熱發瘧及

中脘虛寒嘔逆惡心等症見三四瘧

截瘧飲

伽精 貴童 董空
猪芋 常甘

右入姜棗水煎露一宿服○有汗而熱多者加參芪西雷○無汗熱多者加齊水○寒多者加永珍○痰多加守母當作貝○食積加洞查曲芽○夜發者為陰分加斤周○二日三日一發者加參芪伽烏去精○單寒加永附參去薰空猪芋○腹痛加淡洗○室女熱入血室合小柴胡湯用方見一卷卅二葉

補咳嗽

宜參考大人病門

百治

○若肺實有邪去參加文雪杏

人參平肺散

治心火剋肺咳嗽

喘嘔痰涎壅盛膈胸痞悶

參 貴 廿 炙 錄 各 五 厘
雷 玄 童 門 各 四 錢 炒 一

右水煎

按直訣無麥

補喘急

宜參考大人病門

人參欬冬膏

小兒脾胃虛寒久

嗽不止咽膈滿悶咳嗽痰涎嘔吐惡心肚腹膨脹腰背倦痛虛勞冷嗽諸藥無効者宜用之

欬 冬 參 苑 杏
玄 各 八 水 洗 蜜 各 五
母 當 作 利 苑 各 二

為末煉蜜為丸如龍眼大每一丸姜湯化服

百治

補雜病

治

夜啼六神散乳頭散共見于前十八

追虫丸 治小兒虫積痛凡腹疼

口中出清水者虫積也

史二分洗一分

右水煎服

當歸連翹湯 治小兒心脾有熱

舌下有形如舌而小者名曰重舌

及唇口兩傍生瘡

犀 麋 芷 各三分 虎 甘 各一分

右水煎服

瀉黃散 治小兒木舌弄舌方見熱証

○凡弄舌得病後最難療之惡証也

按本方云見熱証者虛証也此書

於小兒門不載熱証亦無瀉黃散

今補之○瀉黃散治脾胃實熱山

施一錢藿香七分石膏五分防風四分甘草

七分半右水煎服○木舌乃舌腫硬

不柔粘脾經有實火也此方主之

○弄舌小兒舌微露而即收名弄

舌屬心脾虧損用補脾散補之又

舌舒長而收緩各吐舌乃心脾積

熱以用前瀉黃散主之○補脾散

治弄舌人參白朮各錢一分芍白茯苓

各八分陳皮川芎各六分黃芪當歸

甘草各四分右

生姜煎服

清胃升麻湯 治小兒齒腫涎流

腮腫可看馬牙疳

升 芎 芍 守 葛 芸

升 芎 芍 守 葛 芸

升 芎 芍 守 葛 芸

升 芎 芍 守 葛 芸

升 芎 芍 守 葛 芸

升 芎 芍 守 葛 芸

補訂

按小兒牙疳者陽明之熱也此方

主之○小兒走馬牙疳牙齦自爛

者宜用散主之青黛黃柏枯礬五

倍子各二錢右為細末用水消水先

漱口內擦

入患處

瀉心湯 治小兒口瘡

連 為末蜜水調服

○一方 治小兒滿口白爛口糜
伽令 猪羊翁地
桂 甘各等分

右水煎服

清胃養脾湯 治小兒愛吃泥土

乃脾虛胃熱所致此藥主之

本 羔 貴 伽 令 甘 各等分

右水煎服

昌蒲丸 治小兒在胎其母卒有

驚怖那乘心舌本不通長四五歲

猶不能言

參 葛 門 蕪 芎 斤 各等分
乳 辰 各一

右為末煉蜜丸如麻子大每服十

丸米飲下

調元散 治小兒稟受元氣不足

顛顛開解肉肌消瘦腸大而腫語

遲行遲手足如筒神色昏慢齒生遲
預五 參 方 芎 斤 芪 各二
令 神 各三 伽 各半 葛 各一 甘 一錢

四春方有川芎二錢半

右入姜棗水煎服

破故紙散 治遺尿 此証勝此

紙一炒為末每服一錢熱湯下

澄青散 治小兒大便白小便濁

或澄之如米泔

伽 連 姜 澤 查 童 各 分 甘 三

右水煎服 保元有白

沒藥散

治小兒風與熱滯留蓄

上焦胸膈高起大便不通

沒モウ 虎コ 奴ヌ 利リ 各各 蜜ミ 甘甘 各各 錢錢

右入姜煎服

○小便不通 五苓散見二卷

茯苓滲濕湯 治小兒黃疸寒熱

嘔吐而瀉欲飲冷水身熱面目俱

黃小水不利不得安臥不思食

今今 茵茵 丹丹 連連 苓苓 離離

伽伽 蒼蒼 貴貴 青青 奴奴 赫赫 各各 二二

芋芋 三分 保元保元 赫赫 作作 猪猪 苓苓

右煎服○小便不通加翁毛○食傷

不思食加砂曲シ 弄弄

羽澤散 治耳中出膿或疼痛或

出水 柏柏 礬礬 山山 許許 為為 末末 吹吹 入入 耳耳 中

即愈

一方用抱出雞卵皮炒黃色為末

香油調入耳內即時痛止

四順清涼散 治藏府有熱煩赤

作渴四支驚製大便秘瀉或風熱

結核頭面生瘡目赤咽痛一切有

餘之症

粉粉 斤斤 甘甘 虎虎 各各 等等 分分

右水煎服

月桔湯 治小兒咽喉腫痛風熱

等毒

利利 各各 芸芸 假假 苓苓 甘甘 苛苛 各各 錢錢

右水煎服

化痰降火湯 治痰火尾骨節痛

貴貴 田田 苓苓 羊羊 栢栢 雷雷

甘 各等分

右劉必用前蜜為引若痛不止加乳沒

仙方活命飲 治一切瘡毒未成內消已成即潰此消毒排膿止痛之聖藥也若膿出而腫痛不止者元氣虛也當補之

鯨 芷 芸 沒 甘 芍
斤 乳 瑞 貝 各五 銀
貴 各三 皂 一各

右酒水各半煎服

練陳湯 治小兒吐蛇虫

練 貴 田 苓 各一 甘 五分

右入姜煎服

宣風散 治初生兒臍風撮口多啼不乳口出白沫

蠅 二十个 頭尾全 麝香 一字

右同和以細末每用半字金銀煎湯調服

初生通用

五香湯 治毒氣入腹托裏若有

異證於內加減

喬 蜜 沉 乳 各一 麝 三各

右煎空心服○若嘔去麝加霍

○渴加參 兩 ○一方本方去喬加

霍翹 各一名小五香湯

補訂

千金云治熱毒氣卒腫痛結作核或似癰癤而非使人頭痛寒熱氣急者數日不除殺人并以滓傳腫上●和劑謂升降諸氣宜利三焦疎導壅滯發散邪執治陰陽之氣滯不消以致前症者●東垣曰總錄聖惠千金外臺治諸瘡腫方中皆載此方大同小異大抵專治毒氣入腹煩悶氣不通者其餘熱渴昏昧口燥咽乾大便硬小便澀者

未
與脈

加味五香湯

治瘡癰無名腫毒

專小兒用之

泉 蜜 乳 喬 婆 升
葛 翹 通 虎 分

右煎服○小兒帛包此湯拂出熱湯而服

按大人小兒瘡毒入腹則托裏

之方也壽法印和五香加連童

甘而常藥小兒即感脾胃止吐

逆清心火治蟲積道瘡癰瘡疹

補訂

友松子曰倭朝風俗凡小兒初生即
用五香湯而謂能解胎毒及小兒發
班丹毒小瘡多用五香知者以為未
然矣考諸千金方小兒瘡科標五香
連翹湯用青木香熏陸雞舌香沉香
麝香麻黃黃芩連翹海藻射干升麻
枳實竹瀝治小兒風熱毒腫腫色白
或有惡核瘰癧

附骨癰疽節解不舉白丹走竟身
中自癰癢不已云前方加味五香
湯治無名腫毒小兒專用之言本
自千金之變法也然而小兒純陽
而虧陰香竄之劑宜小心斟酌用
之可也况其藏府嬌脆氣血未周
四知之中欠其間切唯以望聞神
聖之法用治一誤輒害百年用其
方者審思之也

補痘疹

論脈

痘以發熱至起脹時毒從內出陽
之候也脈宜浮大而數不宜沉細
而遲自收靨以後毒從外解陰之
候也脈宜和緩不宜洪數

論病

痘疹之證治不可容易著言也昔
宜春先生有一部之書迢越於世
俗之說今也載要論一以示同
志者其詳說略之不宜不博學擇
約者而施治矣○宜春翁曰原痘

出來未明白穢血厚味滯火三說
紛紛而難定孰以蒼蒼大塊裏現
化萬象雖痘是亦陰陽鑪鎔之所
治鑄而出也又腔子血氣之所凝
結而生也故不可言非滲氣之所
感焉又不可言非胎毒之所由焉
血穢厚味滯火三者和滲氣而後
出者也然則或穢血或厚味或滯
火其出也可異形色而痘之形唯
一色如豆者何也穢血滯火者父
母之所食其毒氣存母之血中子
之在胎母血之所養遂歸子之胞
中也故三毒皆從子之胞中而出
其痘形似豆實如腎精結成之色
矣曷亦足疑惟哉又曰豆疹及疹
皆發於傷寒時疫階巢元方已論
之詳矣然則治療亦無異于傷寒
所以異之者仲景即曰瘡家不發
汗此即所以異也然諸賢以為元
已後無治法無論之者而值此病
則無所據而周繹局方升麻葛根
湯已曰大人小兒瘡疹已發及未
發疑貳之間並宜服之得已見則
不問可不可戴欣戴與其後例用
之何失函菴哉諸賢未閱病源論
耶闕之未及之耶尋所以不周闕
則河間丹溪曰多屬火病之魔已
塞胸中聞論寒候書則捨之無闕
所以不遂知也然則巢氏已論之
則其治從仲景例汗吐下和補各

用之適所宜則無不愈之理而亦諸賢誤用解毒清裏之藥多害者亦可知也○嬰童百問云仲陽云瘡疹候回燥腮赤目胞赤呵欠煩悶乍涼乍熱咳嗽噴嚏手足稍冷夜卧驚悸多睡煩躁發熱臉赤唇紅身痛頭疼痰涎傷寒症類有之並瘡疹症此天行時氣之病始發之時因傷風傷寒而得者有因時氣傳染而得者有因傷食嘔吐而得者有因跌撲驚怒蓄血而得者或為驚眼禁牙驚搐如風之症或為口舌咽喉腹肚疼痛之狀或為煩躁發熱臉赤狂悶昏睡譫語之形或自汗或下利或發熱或不發

痘症類

熱症候多端卒末易辨方論所載以耳冷熱冷足冷驗之蓋謂瘡疹屬陽腎臟無證耳與熱足俱屬于腎故腎所部獨冷然疑似之間或中或否小若視其耳後有紅脈赤縷者為真于此可驗其脈洪大而弦數診脈之際身略戰動是症也夫痘熱蒸三日放標二日起脹二日貫膿二日收靨三日此病之正也輕者不拘常數重者則出常數之外固不可一例而視但得痘色明潤根窠紅活飲食二便如常又無表裏雜証雖遲數日不妨設有當出不出當起不起當膿不膿當靨不靨者須詳察之或為元氣虛

弱不能運行則神其凡氣或為雜証攻剝不能通貫則去其雜証凡痘以出標一且為始六日九日為變又十一日十四日為變此決生死之定期也但証有寒熱故死有遲速王節齋曰重証屬虛寒若毒少而氣血不足不能貫膿成就必九日後變証而死或延十數日方死屬實執者不過六日而已蓋痘毒自內出外三日方齊毒尚在內出至六日則當盡發於表七八日成膿而結痂矣若毒盛不能盡出至六日反內攻藏府而死又有二三日而死者由毒氣不能發洩府藏受傷故其死最速此虛實輕重

之分也○逆証不治之証詳于保赤全書今略之凡痘瘡欲出而未出因發搔者外感風寒之邪而內發心熱也宜懼惺散見地或升麻葛根湯或參蘇飲見九敗毒散見三等冬月大抵用五積散見于加減加味敗毒散初起發熱即服此藥神效本方加芸假定錄去參苓宜加紫草蟬水早吞葱解熱表汗○泄瀉加猪芋去紫草水煎服此汗為佳

升麻葛根湯發熱之初未分麻痘傷寒傷食等証以此藥解散庶無誤事見卷正丁傷寒一寒月加水○四

支逆冷加枝○時氣酷烈發熱太甚乃是毒氣加力○加翹名連翹

升麻湯

補訂

湯本齋曰升麻葛根湯攪和劑正
為常談不問小兒虛實冷熱自煎
至尾率多用之甚者方發而不快
既發而復隔亦以升麻湯為常用
之劑其為害可勝嘆哉何散葛根
解表升麻差寒小兒氣盛熱多服
之可以消毒萬一內虛胃弱則以
未濟水寧不虧損水凝血脈而瘡
疹轉為逆證乎夫古人所謂未
發者方身熱尚疑似之時也所謂
已發者既透微欲成痲之候也且
常以發而不快與發而復隔為可
用升麻散若不辨明殆恐世俗相
傳枉死
者半矣

痘初出之特色白者當大補氣血

參 加 芪 芍 周 葛
甘 蜜 喬 斤 芍

如大便泄瀉加行訶此雜著之

消毒飲

痘疹欲出及未出已出

熱未解急宜服之

加 假 甘 芩 各五分

右水煎加犀木奴○虛熱加蘇○

壯熱加芩紫草○痘已出未勻減

復○出不快及痒加蟬○有汁加

雲○減食加參杏○便秘加虎○

氣虛加參御○血虛加斤芍

補訂

吳山甫曰咽喉腫痛膈上熱盛者
此方主之牛房子疏喉中風壅之
痰用芥穗清膈間風壅之熱生甘
草緩喉中風壅之氣乃防風者散
諸風不去之邪也○若
夫大便便利者不宜服之

快班散 治痘出不快

紫草 蟬 參 芍 各五分 翁

甘一分

右水煎服○一方去翁加蘇治痘

已出被風復入

補訂

按有驚熱出未透者此方治之凡有蟬退故也

如聖湯 治痘瘡已出未出身熱

如火頭疼臉赤呵欠鼻瘡

芍藥 周 葛 各五分 甘草 紫草

翁 各三分 查 二分

右入姜葱水煎服○心煩加門粉

○煩渴合生脈散○身熱如火加

洪錄

補訂

按是升麻葛根湯之加味也虛寒者不宜引

加味四聖散 治痘出小快又變

陷倒靨小便赤澀餘熱小除一切

惡候或痘出被風吹復不見入皮

層內發熱不散

紫草 翁 蜜 芪 芎

甘 參 各等 蟬 減半

右水煎服○便閉加奴○便調加

糯米

補訂

原方四聖散紫草黃芪甘草木通共四味而已治小兒痘子口乾下層未透用此藥發痘

神功散 治痘出毒大盛血紅一

片不分地泉如蚊蚤種或諸失血

或吐瀉七日以前諸証可服解毒

芪 參 芍 紫草 地

紅 加 各等 西 甘草 減半

右煎服○熱甚加連苓未退者再

加虎○有驚加蟬○頭粒淡黑者

有寒乘之加官

補訂

按回春用此方治諸症曰腹痛者毒盛也神功散主之面紅不退地

泉不分者神功散倍前胡吐者毒盛乘火炎而宜也神功散主之泄

瀉者火盛而奔越也服神功散即止却用升麻以升提之不可用止瀉之藥惟解其毒則自止矣二月內頂痛者非虛也乃火盛陽極反為陰降如當午樹枝向下宜用九味神功散退其火三四日面色慘不明宜用神功散活血退火使五臟六腑光明或有失治不知解者五六日間以燈照之生氣未散其毒太盛作熱地界紅燥宜用神功散消之隨觀其變而施治猶或可救一二過此則不能施其神功矣又云行漿行足而發疔認定是果疔疔或黑而硬或有紅絲或為大紫泡未嘗解毒者仍以神功散加雄黃黃芩黃連太黃煎服却用煎法雄黃一錢研胭脂重浸水令濃調雄黃末點疔疔頂上立時即出紅活亦神法也蓋雄黃能拔毒胭脂能活血水

紫草木香湯 治痘出不快大便

泄利

紫草 蜜 參 伽 令

甘 各等 糯米 三十粒

右煎服○或隱見者加薑

補訂

按瘡疹出未快之時病泄瀉者用此方猶可也紫草通腠理利九竅涼血活血故為療家欲出未出必用之藥若已出透而太便利者忌之

保元湯 治痘不起脹

參 芪 甘 一各

右水煎服○當起脹而不起加鯨

魚○血弱不起根底淡薄加喬桂斤

芍○一二月初出圓暈成形乾紅

少潤加桂○治血加斤芍○勻氣

加貴○解毒加參力○二三月根

巢雖圓而頂陷者加芍桂○根窠

雖起色不光澤加芍桂糯米○五六

日氣盈血弱色昏紅紫加蜜斤芍

○六七日氣交不旺血雖歸附不

能成漿加桂糯米○七八日毒雖

化漿而不滿為氣血有疑不能大

振加桂糖○八九月漿不冲滿血
附線紅加糖○十一二月氣血冲
滿血盡漿足濕潤不斂者內虛也
加御苓○十三四日毒雖盡解漿
老結痂之際或有雜症相仍宜此
湯○痘瘡發渴加門玄如不止宜
參苓白朮散○痘瘡不起發膿漿
不厚加芍夏月加糯○頭額不
起脹加芎○胸膈不起脹加利○
腰膝不起脹加膝○兩手不起脹
加枝

補訂

保赤全書加川芎官桂白朮各天
保元湯如氣不行去桂加木香若
不食加人乳半鍾又方加白何首
烏黑豈水者○果昆方考加肉桂
云氣虛陷頂者此方主之氣者長
養萬物者也氣盛即物壯氣弱即
物衰故痘瘡陷頂者責之氣虛也
魏崑自論云人參益內甘草和中

實表宜用黃芪助陽須憑官桂前
二味得三才之道體後一味扶一
命之顛危○博愛心鑑曰保元湯
即東垣所製黃芪湯見蘭室秘藏
小兒方夫是湯之劑不越人參黃
芪甘草而已然此藥大抵性味甘
溫專補中氣而能瀉火故虛火非
証不去也三味之劑借以合痘以
人參為君黃芪為臣甘草為佐上
下相濟治雖異道則同嗚呼製方
之義何其妙哉予嘗計其藥性之
功用黃芪能固表人參能固內甘
草能解毒究其痘之宜治必須此
三味之神品偶用他方而更察察
性味善惡之可否裁劑而成雖全
前人之旨非為陋竊東垣之製也
云○幼幼集曰保元湯辨人參止
渴生津液和中益元氣黃芪溫肉
分而實腠理補三焦而托瘡膿系
甘草之甘溫以健脾胃合藥性而
不走失此三味為保元湯固其裡
實其表誠確然之至論矣但以此
而治虛症何施之不得若煩燥發
渴引飲壯熱二便不通者可以保
元湯施治乎舌心焦黑六脈沉滑
夾斑夾疹失血發泡者可以保元
湯施治乎是以治痘者須當分別
寒熱虛實表裡氣血隨症處方而
治療焉云

內托散 治氣血虛損或風邪穢

毒中觸使瘡毒內陷伏而不出或

出而不勻快此藥活血勻氣調胃

補虛內托瘡毒使之盡出易收易醫

芪參 斤各二錢 芩 錢
利朴 並 甘 錢各一
蜜 桂 各三

右水煎服○紅紫黑陷屬熱毒者

去桂加紫草紅華○若淡白灰

黑陷伏屬虛寒者加喬救裡加桂

救表○當貫當有而不貫膿者倍

參芪斤煎熟臨服入人乳汁好酒

同參溫服此貫膿之巧法也○泄

瀉加喬承衍○又名十奇散

補訂 吳昆方考有白芍其十一味曰表虛裏實氣血皆弱者此方主之在

表者瘡頂灰陷為氣虛瘡根色淡為血虛若息重氣粗則為裏實氣虛故用人參黃芪甘草血虛故用當歸芍藥川芎然防風白芷肉桂能引諸藥自內而托之瓜外木香桔梗厚朴能調壅實以歸于利

木香散 治灰白黑陷嘔吐白沫

為表虛

蜜 四 枳 附 訶 腹
參 五 貫 圭 守 喬 五 粒

右入姜水煎

補訂

薛鏡日按前方若瘡瘡已出未愈之間其瘡不光澤不起發不紅流五七日內泄瀉作渴或肚腹作脹氣促作喘或身雖熱而腹脹足指冷或身熱作渴或驚悸腹脹或汗出不止或寒戰咬牙瘡不結痂此皆脾胃虛寒津液表以急用此藥治之若誤認為實熱用寒涼之藥及飲蜜水生冷瓜果之類必不治

異功散 治寒戰交牙瘡場泄瀉

為裏虛

右入姜水煎服
田 錢 淡 圭 蜜 參 喬 粒
斤 多 貴 伽 附
附 附 附 附 附

補訂 薛鏡曰按前方若痘疹不尤薄不
起發不紅活不結靨謂之表裏俱
虛宜用此藥治之若悶亂煩渴吐
瀉不食腹痛腹脹痰喘氣急謂之
表裡虛寒急用此藥送豆蔻丸或
十白至十一日當服不壓煩渴咬
牙手足冷飲湯救之亦在後
陽虛脫脂急用此湯救之亦有後
生者○宜春先生曰陳文仲製水
香散異功散其意取溫神脾腎除
寒邪群集溫熱氣味大熱燥鳴症
夾用之其見識卓越於諸賢而勝
于錢仲陽也遠矣蓋其方共用桂
附則元陽虛弱寒毒甚者必宜用
之然則可以氣味之偏不可以氣
味之兼然此劑衆多而氣味兼弱
或其中一二中病不中病物必
遺毒焉知此理者不害人焉

起死回生散 治痘瘡至七八日
忽然變黑收入腹內遍身抓破吮
喘死在須臾服此從新別發出立

可回生

斤 芽 餘 地 周 紅

右半水半酒煎服○上階加正下
階加倍遍身黑階加單○脚下有
黑疔至七八日用針挑去以大乙
膏貼之

補訂 按此方活血清血殺熱毒成表之
劑也○活幼心法云痘出八九日
漿滿或為寒所薄一時痘俱紫黑
如紫葡萄色不必驚恐急以上好
肉桂磨湯或煎湯
服之立見如舊

馮氏天華散 治痘後失音

瑞 利 岑 訶 陽 甘 等

右為末用 當有調半匙在碗內外
以水竹七莖黃荆七條縛作一束
點火在碗內煎臨臥服

補訂 按熱毒傷肺發而失音者用此方
乃生津利竅收肺出音之劑也

熱眼丹溪方 治痘瘡傷眼

丹 決 赫 斤 連 芸
堯 周 利

右水煎服

補訂

按是清解風熱之劑也蓋夫痘疹
蘊肺毒感感冷氣而發荷氣血弱而
不能逐毒則火內鬱而脈道逆行
斯痘毒入於目矣况熱毒生風肝
應於木而目病出茲作焉
其症有數種宜隨証治之

麥門冬飲 治痘毒發熱作渴咽痛

愛分文 參 杉分甘 銀分

右水煎服

補訂

按咽痛者加桔梗此解熱
止咽痛生津液之劑也
凡孕婦身發瘡宜馮氏尊胎散若
胎動不安宜獨聖安胎二方身熱
甚宜參蘇飲或瘡稠密宜十奇散
倍餘斤減圭加沙焚如胎已五月

則田心之屬俱不必禁

尊胎散

薑 齊 赫 伽 斤 餘 赫
貴 荆 奴 利 空 芸
糯米 芷 甘 芳 砂 麥

大熱加爵

右細切作一服水一盞半煎至一
盞乾柿蒂七片野苧根七寸甜瓜
蒂一箇用銀器煎以荷葉盪定
熬至八分去粗仍用荷葉盪覆空
心瀝服

補訂

吳昆曰以孕婦而痘則血氣大虛
矣故用當歸川芎芍藥阿膠以養
血又用入參白朮茯苓甘草以補
氣乃黃芩砂仁紫草桔梗所以安
胎解毒柴胡乾葛防風荆芥白芷
所以利表疏邪養血補氣則安其
內解毒疏邪則利其外
安內利外治道畢矣

獨聖散

用蓮奴當作礶火炒去

殼為末每半匙熱湯調下胎動則

服服後覺胎熱則安矣

補訂

吳氏曰妊娠出痘胎痛者此方主之胎痛者熱而氣滯之故也縮砂辛溫利而不滯故可以安胎

安胎散

腹參貴伽斤

芳蒨便礶水苓甘餘

右入燈草糯米水煎服

補詞

吳山甫曰氣血熱則胎不安氣血滯則胎不安是方也人參自木茯苓甘草所以補氣當歸川芎芍藥所以養血黃芩所以清熱礶仁香附紫蘇陳皮木

凡妊娠痘瘡者以安胎散為主加

苓伽天寒有表症者間用五積散

去麻田厚姜桂換伽於赫加柴苓

麥參糯等分○痘出不快者消毒

飲○痘出後血虛者芳飯湯加芍氣虛者保元湯加芍○熱盛恐胎隨者單胎散胎動者安胎飲或單礶仁炒為末酒調服之後覺胎熱則安

補麻疹

論病

麻即疹也疹軫也出軫軫然生如芥子麻出如麻亂撓為絮皆以其形而名也是亦感風寒而發生死只在三日間出則乾餘熱四五日而全痊矣治法以能出之為上策乾後有諸症則於各類宜治

方治

凡麻疹初起呵欠發熱惡寒咳嗽噴嚏流涕頭眩宜升麻葛根湯見七傷寒潮熱甚加苓連錄咳嗽加甲杏

門羔咳甚別用涼膈散見卷四十加蘇

利○泄瀉宜四苓散見四卷○便血

四苓散合犀角地黄湯○吐衄犀

角地黄湯見四卷加丹小便赤見卷

○寒熱似癰宜小柴胡湯見卷又

柴苓湯○初起全類傷寒但面赤

中指冷為異耳已出煩燥作渴者

解毒湯合白虎湯解毒見卷五○便閉

三四日小養氣湯見卷八防風通聖

散見卷譫語溺閉者導赤散見前

如滑者四苓散芩翁○譫語如

狂者解毒湯調辰砂六一散○煩

渴作泄者白虎湯加蒼又猪苓湯

見五卷○熱盛乾嘔解毒湯○傷食

嘔吐四君子湯見四卷○夏月因暑

作嘔四苓散加參忌用術蜜姜桂
熱藥

二仙湯 治麻疹已出而又沒或

出不盡心慌哭啼不止十分危症

死在須臾或下痢腹痛

芩 芍 苓 等

右水煎服

犀角解毒湯 治麻疹已出大便

下血或小便下血衄血或小便閉

澀澀疹稠密熱渴赤痛

犀 地 王 芍 連 芩

相 丹 各 一

右水煎服○如吐血衄血加炒丹

童便

凡麻疹前後有執潮不退等証并

為血虛血熱可服四物湯見四卷
發渴加愛屏見五卷○嗽加葶見五卷○有痰加
倍當作見字貴見字○麻疹正出之時雖不
進飲食但得麻疹淡紅澤潤真正
不為害加曲礪用○麻疹已出之
時如色紅紫乾燥暗晦乃火盛毒
熾用地加紅冷○麻疹已出既過
三日不能沒者乃內有虛熱宜本
方如失血之症加犀汁解之○麻
疹退後若有牙根腐爛鼻血橫行
并為失血之症急用本方加茵翁
犀之類以利小便如疔瘡色白者
死○孕婦出麻木方倍加伽苓艾
安胎清熱為王如胎上冲急用芎
根艾煎湯磨生稗服之更以本方

大進之

干仙湯 治疹後餘毒

柴葛 妙連 苓 丹
貴苓 奴地

右入姜水煎服

○麻症初起已出已沒及一切雜
症與痘毒大同但始終藥宜清涼
雖麻喜清涼痘愛溫暖不易常道
虛則補實則瀉醫家活法故治麻
亦有血虛而用四物湯氣虛用四
君子湯天寒傷冷用溫中理中之
藥一時之權之○麻症沒後餘熱
內攻循衣摸床謔言妄語神昏喪
志者死如熱輕餘毒未除必先見
諸氣色雖預防之始終以升麻葛

根湯為主或消毒飲見一五五解毒湯隨症選用仍忌魚腥葱蒜之物

補訂
按此門之治法也都屬清涼與尋常之所聞者大徑庭矣皆不明病由之故也若夫內弱衛氣虛難出者投寒涼之劑有反掌之患焉有司命責者深思之矣

訂補衆方規矩大全卷之八大尾

貞享三乙丑歲九月吉日刻刷成就

書堂

文臺屋治郎兵衛
和泉屋八右衛門

增補衆方規矩之書也方數若干肯悉等治例具記加減而似于欲為醫門之集錄者也故俗醫守之以為法病者恃之以立命世茲雷同乎然顧此書則亦所謂可以據證檢方昂方用藥

者也全類于和劑局
方之書而不足法之
且夫駁雜訛謬恐枉
斃生靈也好生之士
庸其得忘言乎雜予
怕愁之才不敢任祭
揮之寧略陳其少概
則可矣於是乎卒訂
補之以註補鴻之大

意庶幾乎免實實虛
虛之禍也然又非自
謂美而且盡言矣賢
哲再正予之不韙幸
甚

皆貞享三乙丑孟秋日

泉南

遊福菴道竹 撰





