



醫方大成論諺解卷之五

⑤五臟內外所因證治五臟ハ内ニ隠テ見ヘ又故

ヲ考テ内ノ病ヲ知ナリ所因ハ病因ナリ

人身之有形於外者必有諸内人身ノ外ニ見ヘタル眼耳鼻舌ノ類ハ必ス其

源ハ内源ハ内故五藏之受病於内而發於外者必見之眼

耳鼻舌口牙之間ソレ故五藏ノ病ハ外ニ見ヘタル眼耳

心經蘊熱則口舌生瘡唇口裂折心ノ經蘊熱スレバ口中唇サケルナリ

脾與胃相通故受熱脾ト胃ト相通スル故ニ心

則噎氣臭穢胃中ニ火熱アレバ噎氣臭穢ノ氣口ヨリ



通ズル故是ノ如シ臭穢ハ腎受冷則耳不能聽或兼風
臭クケカラワレキニホヒナリ
則牙痛頰腫腎ノ藏衰テ冷ハ耳聞又耳ノ腎ノ氣ノ
養ヒニテ強シ面部ノ位ヲ五藏ニ合スレバ頰ノ腎ノ部
位ナリサルニヨツテ風邪ヲ引ソユレバ牙痛三頰腫ルナリ
肺受風邪則皮毛癢積毒則發爲癰疽皮毛ハ肺
肺ニ風邪ヲ感スレバ皮毛癢ナリ肺ニ熱
毒ヲ積ハ熱毒皮膚ニ發シテ癰疽生ズ
不能視髮乃血之餘焦枯者血不足也肝受病則目
不血ノ餘リ人ノ髮トナル肝ハ血貯元源ナルニ因テ焦
色ニナリ油ヲ氣ナク枯テ見ユルハ肝血ノ不足ナリ
此皆病在內而應乎外也凡有其證必須考其所自
來辨其冷熱虛實治之有其證トハ右ニ云眼耳ノ病
ナリ所自來トハ內ノ根元ノ

ソレノ主リノ藏ヲ云外ニシテノ病證見ヘタラハ內ノ根元
ノ藏何レノ病ト云フヲ考テ冷カ熱カヲ探リテ治セヨトナリ
○癰疽瘡癤毒氣淺シ疽ハ五藏ノ毒氣ノ沮ナリ
ヨリ生ズ小ク見ユレドモ內ニ籠ル毒氣深シ瘡ハカ
サ一切デキモノ總名瘡ハ子ブト以上一切ノ腫物ヲ云リ
凡大癰大瘡之痛痒自屬虛實寒熱一切ノ腫物ノ痛
寒熱ノワザ故痛而實者爲熱虛痒者爲寒實ハ氣血滯リ
ニ因テナリ熱ノワザ氣血虛シ經云諸瘡痛癢皆生於心以心主
熱ノワザ氣血虛シ經云諸瘡痛癢皆生於心以心主
テ痒ハ虛寒ナリ
血而行氣氣血凝滯而爲癰疽瘡癤要ハ素問至真
諸痛痒瘡皆心ニ屬スト本ハ心ニアリ一切ノ腫物ノ痛痒
ハ心ノ藏ノワザト素問ニ云ヘルハ心ハ火ニ狀ドツテ血ヲ主
リ一身ノ氣ヲ運スサルニ因テ心熱盛ニレテ開大一寸以
テ氣血滯レハイロクノ腫物ヲ生ズナリ

上曰癰疽一寸以下曰瘡癤腫物三寸以下曰疔瘡

類諸瘡之中惟背疽疔瘡最為急證疔瘡初起粟粒

內ノ根深ク開キナリ痛ニ拜カ常ノ腫物ヨリ甚ク數日ノ

後ゼシクニ身熱起リ惡寒頭痛煩渴スルナリ日ニ隨テ

カレク見ユナリ背ニ生ズルヲ背疽ト云フ瘡ハ疔瘡トモ

書ナリテキ初メ鉗ノホウシガレラノヤウニホソキトテ

瘡ト云ヘリ是モ細ク見ユレドモ根深ク其初發也

毒深シテ取分テ大事ノ腫物ナリ其初發也使身體

或先熱而後惡寒或先癢而後痛若其不痛最為惡

證痛ニハ胃ノ氣ノ虚且如背疽始生如黍粟粒大纔

有覺時使用艾於痛處灸之痛則灸至痒痒則灸至

痛使毒氣隨火而散且上ハ發語ノ辭ニテ扱ナリ摠ヒテ

太事ノ腫物ツトスコシナリトモ身ニ覺ル時灸シテ痒キ腫

物ガ痛ム時灸ヲ止メ痛ニ痒クナルニテ灸シテ内ノ毒氣

ヲ灸ノ火氣ニツシテ發散セヨトナリ蒜若失之於初瘡

灸ナドニテ效アル一諸書ニ見ヘタリ其時ハナニ事シテモ

勢已成廣ガリテムツカシキナリ其時ハナニ事シテモ

又當審其虛實寒熱熱毒ノワザトメタト剛キ藥

ヘ熱實則清之熱實シテ癰ハ熱毒虚寒則温之虚寒

ハ先氣血ヲ補ヒ温メヨ得毒消膿潰方為可治之證

濃出テカライキヤサウハ疔瘡者必發於手足之間

疔瘡者必發於手足之間疔瘡者必發於手足之間

肉ナリ其中或紫黑色有一條如紅線直上倉卒之際

腐タルソノヤキアリ一ノヤキアリ一ノヤキアリ

ガヒニ出ルモ尤モ難儀ナリ生黃泡疔ノ遮リ黃ナルアワ

リワケテ手足頭面骨ノツ生黃泡疔ノ遮リ黃ナルアワ

急宜以針於紅線所至之處刺出毒血又ハ下瘡ノ色
中ニ赤キ線ノヤウナ血筋一條其中心ヨリ上ニ上ルアリ是ヲ
紅線并ト云フ急ニ其血筋ノ行先ヲ針ニテ斷切テ其毒
血ヲ出セトナリ其後蟾酥
遅ケレハ死スルゾ 然後以蟾酥乳香膏等丹ト云ヘル藥
アリ蟾酥ハヒキガルノ油ナリ其方ハヒキガルノ骨頭ノ尖
タル處ヲ針ニテ指破リ油紙ノ上ニホリ出シカゲホシニテ
白麵ト丹ト二色等分ニ入テ能程ニ子リ調へ麥ツボホドニ
越ジテ腫物ヲ針ニテ破リ其出ヘ一粒イルナリ△乳香膏
ハ白羊腎ト腫物半斤煎シ滲シテ杏仁一兩半地黄
ノ汁ニ合黄蠟二兩ヲ入シ蠟トケテ油ト一ツニナルトキ
乳香一兩別ニ粉ニシテ食鹽松脂各一兩半粉ニシテ蠟
ノ中へ入レ煎シ糊ノ木ノヘラニテカキセ好ホドニナリテ器
ニ入レ腫物ニ一日ニ於正瘡上塗之正瘡トハ腫物ノ一ツ
ニニ度付カヘルナリ於正瘡上塗之正瘡トハ腫物ノ一ツ
ニニ塗ルト云フ事
針時以病者知痛出血爲好否則紅線入腹攻心必

致危困右ノ紅線ヲ針ニテ斷切ル時病人意ヲ知ル程ニ
足ヨリ腹ニ入り心ニ攻入レバ至若瘰癧頸癰豚癰之類
大事ニナリテ治セラレヌゾ 至若瘰癧頸癰豚癰之類
皆毒氣鬱積於内發而爲此瘰癧ハ下ノ瘰癧門ニ見ヘ
タリ頸癰ハ頸ヲ取レワシ
豚癰ハ肉癰ナリ
生ズ俗ニ頸切癰ト云ニ焦ノ經ノ病ナリ豚癰ハ肉癰ナリ
イドコロニ生ズル腫物ナリ足ノ太陽膀胱ノ濕熱ナリ皆
熱毒ノ積リガ治之右ノ癰皆須解毒潰膿若氣血弱
發テ是ニナル 治之右ノ癰皆須解毒潰膿若氣血弱
者又須生之此一定之法毒氣ヲチラシ膿血ヲ出セヨ
如シ瘰癧キ病人ナラバ毒ヲ解
シ膿ヲ潰スヨリ早ク氣血ヲ生ズル藥ヲ瘡癰疥癬之類
腫ヨ是毒ヨリ一塗ニ定リタル治法ナリ 瘡癰疥癬之類
隨其藏府所受冷熱調之是等ノ出來物藏府ノ所
冷カ熱カラ考テ能調ヨ所
貴第一能ト氣血宜流自失其痛痒矣氣血生シテ
宜流スルヲ

好トスルナリ氣血生スルバ如脚外廉瘡脚ノ三里ノ下ニ

自然ト痛痒ハナクナル二云ハハキ瘡ナリ向フズ子ニヒロガリ久年不愈者多是腎

濃血出テ肉爛數年愈ガルナリ水流注又有脾水潰溢治各有方隨證選擇右ノハバ

カヌルハタフン腎ノ邪水ノ毒リニ流レシテ是ノ如シ腎經

ハ内股ノ後廉ヲ循ルニ因テナリ又ハ脾土弱テ堤切レ

脾土ノ邪濕セキ込テ是ノ如クナルモアリ脾經ハ内踝

ノ前廉ヲめぐルニ因テナリ右何レモ藥方ハツレクニ有

撰用ヨ瘡疥附癢疹瘡ハカサノ總名疥ハヒセガサノ類ナ

俗ニ云クサノ類ナリ諸痛痒瘡皆屬於心

迷惑ガル物ナレドモ輕キ病ニテ人ヲ瘡疥之爲病雖苦不害人然而至難可者多矣

損ゼヌナリサレドモ愈カスル物ナ素問ノ文ナリ前ノ多由心氣鬱滯或飲食不節毒蘊

癰疽門ニ見ヘタリ於腸胃發見於皮膚素問ニ一切ノ瘡ハ心ノ藏ヨリ初ル

食物ノ滯タル毒氣脾胃古方所謂古ノ方藥ノ書ヨリ馬疥

二積テ身ニ出ルナリ病源候論集驗方ニ火疥ヲ入レテ五ツアリ此大成論

ニ火疥一證ヲチタナリ其證赤クナリ痛ミ又ハ痒ク膿

アリ柳テ是馬疥ハ皮ノ内ニ水疥合搔ハ水出ルソ乾疥

アリテ搔トモ痛ヲ覺ヘヌナリ今之所謂今時

痒シ搔ハ皮濕疥常ニ汁氣アリテニメル熱瘡心煩躁スルナリ

今之所謂惡瘡赤ク爛レ腫身熱シ汗多ナリ反花ノ頭ヲ破ハ

五

ヒツクリカヘリテ木ノ子毒瘡風邪鬱シテ熱トナリテ種類

ノヤウニ肉出テ血ハシル生ス俗ニ云唐瘡ナリ

不一生於手足乃至遍體或痒或痛或聾響ノ字ハ

起ル去聲ナリ腫或腫或皮肉隱憐高卑ウチリタツナリ

或抓之凸起腫起ル或瘡癩ツブクト豆粒或膿水浸

淫テハウクヘヒロガル治之内則當理心血祛散風熱

則敷洗敷ハ付藥洗理無不愈是道理テハ愈

夫瘰癧之病即九漏是也漏ハ穴ヲ生ジテ汁ヲ出ス

夫瘰癧之病即九漏是也漏ハ穴ヲ生ジテ汁ヲ出ス

古方所載名狀大槩不一難以詳述及其生也多

結於項腋之間累累大小無定結トハ生ズルナリ

其大小不一其根發作寒熱膿水潰漏潰漏ハ膿流

在藏府其病ノ根ハ藏府ニアル下ノ文ニ肝ハ蓋肝

主狼漏其病ノ根ハ藏府ニアル下ノ文ニ肝ハ蓋肝

胃主鼠漏食物擇ニスメツタナル物ヲ

太腸主螻蛄漏草木ノ實ヲ食シテ虫ノアルヲモ

脾主蜂漏飽食辛勞シテ其毒鬱ジテ

生腫テ潰ルヤウニテ又瘡ヲ生ス瘰癧ハ又ワキニ生スル

ナ 肺主蚘蟄漏 寒ニ因テ漏トナル頸ニ生ジテ熱ツヨク傷
 リ 肺主蚘蟄漏 寒ノ如シ又ハ疥癬ノゴトクナルモアリ
 心主蟻蝻漏 恐秋心ニ思案ツモリテ生ズ頸ニ生ジテアト
 ナタ移ル 胆主浮蛆漏 怒リニ因テ氣結ボレテ生ズ頸又
 寒執アリ 腎主癰癧漏 八濕氣ノアル處ニ坐シテ
 無ク寒熱シテ 腎主癰癧漏 八濕氣ノアル處ニ坐シテ
 生ズ頸ニ生ジテ常 小腸主轉脈漏 酒ニ酔テ夜子グル
 二膿流シ寒熱スル 原其所因多因寒暑不調
 生ズ頸ニ生ズルナリ 初メ多クシテヨリカシク
 脈躍リ身振イ寒熱スル 寒夫暑氣ニ不養生シテ寒
 熱調ラズシテ氣血虚スルナリ 或由飲食乖節 食物ヨキカ
 ゾム 遂致血氣壅結而成也 右ノ不養生
 キ 巢氏所載決
 其生死 隋ノ巢元ガガ大業六年ニ勅ヲ奉ツテ病源
 候論五十卷ヲ編リ其内ニ載テアル癰癧ノイ

キル證死スル證カツキト見ワク 反其目以視之其中有赤
 ルアリ下ノ文ニ見ヘタリ 脈從上下貫瞳子見一脈一歲死見一脈半一歲半
 死見二脈二歲死見二脈半二歲半死見三脈三歲 死見三脈三歲
 死赤脈不下貫瞳子可治 眼ヲ開カセテ見ルニ眼ノ中ニ
 ノ中ニ入ル赤脈一筋アレバ一年スキテ死ス一筋半人 見ニ入レバ一年半ニ死ス二筋ハ二年ニ死ス二筋半ハ二
 年半ニ死ス二筋ハ二年ニ死スルナリ毒氣ノ緩キホド赤脈 多シ毒氣深ク集ルホド赤脈スクナキゾ瞳子ニ赤脈ノ
 無ハ治セ 三因云有是說驗之少有是證 陳無擇ガ二
 ラルソ 脈瞳子ヲ貫ヌク多キ少キニ因テ一年ニ死ス
 二年ニ死スナドノヤウナ病證終ニ見ヌトナリ 理宜然 因
 尤モ聞ヘタナリ

〔无〕折傷 折ハクジクトヨム打身ナリ傷上ハ

折傷者謂其有所傷於身體者也 折傷ハ身ヲ損 或

爲刀斧所及 所及トハ切ルナリ刀ニサカ 或墜隨險地

打撲身體 險處ヨリ落テ 皆能使血出不止 金瘡モ打

リテハ止 又恐瘀血停積于藏府結而不散去之不早


恐有入腹攻心之患 死血堅リテ有ハ早ク其血ヲ去

ツキアガリテナ 治療之法須外用敷貼之藥散其血

止其痛 付藥ニテ死血ヲチラシ 内則用花藥石散之類

化利瘀血 死血ノ堅リシ化シテトリ通利サセテ痛ヲ止

ヨ花藥散ノ方ハ花藥石アラクト粉ニシテ一兩硫黃粉ニ
シテ四兩右ニ味一ツニ調合セ土鏝ニ入テ子バ土ニテ封シ
内ニテ熱スルホドアグリ封シタル土乾ヒテ後平瓦ノ上ニ鏝ヲ
置其瓦ノ上ニ八卦五行ノ文字ヲ書



後緝羅ニテフル粉ニシテ磁器ニ入レ用ル時 瘻口ニヒナリ
カクシバ痛止ル臍ニ瘀血有ニ童便ヲ沸シ酒ヲ少し入レテ

細ニシロシ其
ノ藥ヲ取出シ
冷テ扱其中
スナリ土鏝能
テ火氣ヲサニ
出シ又一夜置
テ火キヘテ取
タテ、一夜過
下カラ炭ヲ起
時ヨリセンノ
積重子巳午ノ
炭ヲ用テ其ノ
瓦鏝ノ四角ニ

一、久程入レカキタテ、飲ムナリ婦人ノ産後ニ惡血心ニノ
ボラハ童使ニテ用ユル熱血水トナリテ小便ヨリ出ル
然後款款調理生肌 款款トハ漸々ナリ其後セシクニ或
因折傷而停鬱其氣又當順之 金瘡打身ノ養生ノ
鬱スルナラハ其氣或因湯火所傷 熱湯ニテ身ヲ損シ火
ヲ順ラヌヤウニセヨ 二テ手足ヲ損シタルヤケ
ドク、并具一二方以備搜討 何レモ一二種ノ藥方ヲ具
ナリ

卒急救諸方

頸ヲククリ水ニ溺レ凍死是等公急ニ救
ハ子バ死ヌルナリ醫者ノ知テ置ベキ
ナリ方ハ法ナリ

救自縊法凡自縊高懸者徐徐抱住解繩不得截斷

徐々ハセンクナリソロクト下ヨリ抱カニテ繩ヲ手ニテホド
ケユメク繩ヲ切テ解ナ繩ヲ切レバ再ビヨミカヘラヌゾ

上下安被臥之 夜ノ物ヲ下ニ敷上ニ蓋以一人用脚踏

其兩肩手挽其髮常令茲急勿使縱緩 扱ワキヨリ一
タルモノノ兩ノ肩ヲフミヘ手ニテ縊タル者ノ髮ノ毛ヲ急ニ引ハル

死人ノ氣ヲ付シ爲ナリ 一人以手據按胸上數上數摩

動之 又獨ハ軟カニ手ニテ縊タル者ノ胸ヲササリ 一人摩拊

臂脛屈伸之若已強直但漸屈之并按其腹 屈伸ハ
脚脛ヲワキヨリムヘカメ

如此一時頃 一時ガ 雖得氣

從口出呼吸眼開仍引按不住 開クトモ猶右ノ如

須臾以少桂湯 藥方ニ見ヌ但

ル、ヲヤムルナ

入タルヲ云カ内桂ハ血脈ヲ通ズル物 或清粥ヲナリ俗ニ子

故ニ溢タル者ノ氣血ヲ順サシタメカ 灌令喉潤漸漸能嚥乃止 灌ハ右ノ湯ヲ飲シムル

ト云 按一ヲ更令兩人以管吹其兩耳此法最好無不活

者又二人ノワキヨリ竹ノ管ニテ縊タル者ノ耳 自且至昏

雖冷亦可救 輒夕縊テ昏放ニテアルハタトヒ冷テモ晝ノ陽

暮至且陰氣盛爲難 暮ニ縊テ輒夕ニテ有ハ夜ノ陰氣

又法緊用兩手掩其口勿令透氣兩時氣急則

活 又縊タル者ヲ救法ニワキヨリツヨク其死人ノ口ヲ掩

急ニイキニク時ハ生ルナリ縊タル者ヲ俄ニ氣ヲ通シサス

レバ一度ニイキ出テアトニイキ飯又故死ス故ニツヨクイ

キヲ閉テソロクノ氣 經驗方救凍死法 羅天益ガ作タル

テアリ 四肢直口噤只有微氣者 手足少レイキノカヨ

イ有者 用大釜炒灰令煖以囊盛熨心上冷即換之

先大釜ニ灰ヲ入レ炒テ煖クナリタル時囊ニ入テ死人

ノ心ノ上ヲ熨火シテ温メヨ冷タラバ又熱キ灰ヲ入カヘテ

目開氣出然後以粥清稍稍進之 目開イキ出ハ粥

ト飲 若不温其心便將火灸則冷氣與火爭必死 若

右ノ如ク心ヲ熨火シ温メスレテ直ニ火ニアテ、死人ヲ

人救落水死急解去死人衣帶艾灸腹中即活 孫忠

水ニ溺タルヲ救法ニ早ク死人ノ帶ヲ解テ臍ニ灸 經驗

セヨ即チ臍ナリ腹中ハ誤ナリ臍中ニ改ムベキナリ

孫忠

方救溺水法 經驗方ニアル水 凡人溺水者救上岸
者ヲ川岸ニ 即將牛一頭 牛一頭上ハ却冷溺水之人
將肚橫覆在牛背上兩邊用入扶策徐徐牽牛而行
以出腹內之水 於ヨリ扶策ト手定テ取抑ヘ落サヌヤウ
ニ隨テ腹ノ水ヲユリ出スナリ 如醒 氣付テヨ 即以蘇合
香圓之類 蘇合香圓ハ後ノ 或老薑擦牙 老薑ハ陽ヲタ
水氣ヲ去ル故 若無牛以活人於長板橙上仰臥却冷
ニ牙ニスリスル 若無牛以活人於長板橙上仰臥却冷
溺水人如前法將肚相抵活人身上水出即活 若無
ハ別ニ無病ノ人ヲ長キ板橙トテ几腰カケノ屬ノ板ノ
上ニアヲケニナリテ扱死人ヲ前牛ニノスル法ノ如ク

橫サ三肚ヲ無病人ノ身ニ當
水ヲユリ出ス即チ海ルトナリ

空

婦人調經衆疾論

婦人調經衆疾論 婦人調經ノ疾七癥ハ疲癯

漏帶下ノ類ナリ

夫女子十四則月水行

惣シテ女ハ陰血ヲ以テ生ズレ
トモ中ニ必ズ陽氣ヲ含ム故ニ

少陽ノ七ツノ數ヲ以テ七歲ニテ腎氣成盛ニナリ齒カワリ

二七十四歲ニシテ胎水通ジテ交合スレバ子ヲ生ズルナ

リ陰バカリニテ故又故

男子十六則陽精益 男ハ陽氣

中ニ少シレ陽ヲ含ムナリ

ズレドモ陽バカリニテハ立又故中ニ少シレ陰氣ヲ含ムテ少陰

ノ八ノ數ニテ八歲ニテ腎氣實シテ齒カワリニハ十六

ニシテ陽精盛ニ溢シテ交 此皆合乎陰陽之數

合スレバ子ヲモウクルナリ

各及其時 女モ男モ陰陽自然ノ時

然ノ數ニカナフナリ 精溢ルモ皆陰陽自 然ノ數ニカナフナリ

故男子之精氣宜盛故先精氣ヲ盛ニスルヤウニセヨ

女子之月水宜調女ハ陰ニ狀ル故陰血カカニヨウニセヨ調經

之道貴乎耗其氣以行其血血盛氣衰謂之從從則

百病不生育無損矣故血滯ルナリ故ニ其鬱氣ヲ

耗レテ血ノ行ルヤウニセヨ鬱氣耗散レテ陰血行ルヲ從ト

產難産且婦人之病四時所感六淫七情所傷悉與

男子治法一同且ハソモクナリ惣レテ女ノ六淫七情ノ

惟胎前産後七癥七癥ハ七イロノ堅ニリナリ暴癥

八瘕瘕瘕是ナリ委八瘕黃瘕青瘕燥瘕脂瘕狐瘕

崩漏崩中ハ胎水流出テ斷ヌナリ俗ニ云フ長血ナリ帶下便

之證為異右ノ病證ハカリ故別貯方ニ

究其所因多由月水不調變生

諸證根元ハ胎水ノ識ラヌヨリ大槩婦人之疾以經候

如期為安期トハ毎月遲モ早モ無ラ無病トスル或有愆

期當審其冷熱虛實而調之愆期トハ常ヨリ先期而

行者血熱故也法當清之血熱ヲ得レハ早ク行ル故ニ

過期而行者血寒故也法當溫之血寒ニ

然又不可不察其有無外邪為

冷ナリ濕ムル藥ヲ用ユ

大槩婦人之疾以經候

崩漏ハ胎水流出テ斷ヌナリ俗ニ云フ長血ナリ

婦人門ノ藥方ヲ別

之寒熱而後投藥 切又月水ノ遲早ハ血分ノ寒熱ト
因テ寒熱スルカラカク 且經行之際與產後一般將理失宜
見テ藥ヲ用ヨ 後ト同レ養生アレケルハ病ヲ生スル一重大カ
爲病不淺 後ト同レ養生アレケルハ病ヲ生スル一重大カ
ナラヌナリ 一般ハ一様ナリ 若被驚則血氣錯亂經脈斬
リ將理ハ身養生ナリ 若被驚則血氣錯亂經脈斬
然不行 若驚サレテ血氣亂ルハ軀然 逆於上則從鼻口
中出逆於身則爲血分勞瘵之疾 上部ニサカノボル鼻
口ヨリ血出ルナリ身ノ中ニ逆スルハ血分トテ婦人ノ月水
通ゼズニテ後ニ水腫スルヲ云フ勞瘵ノ證ハ後ニ見ヘタリ
若其時ノ時勞力太過則生虛熱變爲疼痛之根
辛勞スル一過ハ虛火ノ熱生ジテ 若患怒則氣逆
ソレガ後日ニ變ジテ身ノ痛ノ根トナル

氣逆則血逆逆於腰腿 心腹背脇之間遇經行時則
痛而重著過期又安 腹ヲ立レバ氣サカカ上テ血モ又サカノ
カノボリ止テ月水ノ時痛テ身重クヨダ 若怒極而傷
ルキナリ月水ノ時ヲ過ルハ又痛ニ止ナリ 若怒極而傷
於肝則又有眩暈嘔吐之證 若ツヨク腹ヲ立テ肝ノ
證出 加之經脈滲漏於其間 其上ニ月水時ナラ 遂成
竅穴 玉門ノ外ニ別ニ淋瀝不止 血流レテ止ヌゾ淋瀝
凡此之時 中風則病風感冷則病冷久而不治
崩漏帶下七徵八瘕可立而待 待如ク右ニ云病カ
生シ 若能治病於未然 未然ハ病ノキザメ又前ナ
トナリ 若能治病於未然 未然ハ病ノキザメ又前ナ

生シ 若能治病於未然 未然ハ病ノキザメ又前ナ
トナリ 若能治病於未然 未然ハ病ノキザメ又前ナ

調經為先故首論之月水ヲ調カ肝要ナルニ因テ婦人門ノ初ニ先彫水ヲ調テ述
各備諸方依次于後婦人門ノ先ニタシクニ記ダグ

（三）孕育婦人ノ予ヲ孕テ論ズル

生育之道陰陽二氣交感而成胎予ヲ生ズル道理ハ

氣交リ動テ陰血陽氣和若陰血先至陽精後衝血

開裹精陽內陰外陰抱陽胎而男形成矣若交感ノ

血先至リ男ノ陽精後ニ子宮ニ入リ陰血開テ陽精

若陽精先入陰血後參精開裹血陰內陽外陽抱陰

胎而女形成矣又男ノ陽精先ニ子宮ニ入テ女ノ陰血

又曰婦人月信初止一

日三日五日及男女生命旺相又男女ヲ生ム時アリ

其夫婦ノ生レ時性ニカナウタサカユル月ナリ驗ハ木性

火性ハ丙丁ノ性ハ戊巳是ナリ陽白 庚壬ノ日ナリ

時寅ノ時ヨリ未ノ時交合則有子多男 皆男子ヲ生ソ

若二日四日六日又值男女生命

休囚死絶休囚死絶トハ譬ハ木性ノ人ハ戊巳ノ日カ木

囚日ナリ火性ノ人ハ庚辛ノ日カ火金トテ死日ナリ

推見ヨ死ト云ハ我カ木性ナレバ戊巳ノ日ニ勝日ヲ死日

ト云我性カ其日ノ干ニ勝云囚トハ其日ノ干我性ニ

勝ヲ云木性ノ人ハ庚辛ノ日カ因日ナリ
 殘モ是ニテ察セヨ 休絶ノ二字ハ併字ナリ
 日陰時申ノ時ヨリ至 交合有子多女 是日時ニ六又レハ
 過此之外皆不成胎 右ノ月限ノ外ハ 又有所謂轉女
 成男法 又女子ヲ胎タルト思フ時其 女子但懷娠始
 三月名曰始胎 血脉不流象形而變是時男女未定
 故令於未滿二月間服藥方術轉令生男也 胎テ三
 胎ト云フイニダ血脉ユキワタラザル故ニ象形變スル
 胎キナリ是時ハ男ノ形モ定ラヌ間服藥方術
 手ダテニテ男ニ轉シカユルナリ其法ノ斧ノ及ラウヘニ
 テ人ニ知セズ其女ノ寢ユカノ下ニ置又テ菘ヲ帶ニサス
 ベシ其外イロ
 イロアリ

胎前 產前

人之夫婦猶天地也 男ハ陽ニシテ陽精ヲ施シ女ハ陰ニ
 天地ノ如シ 天地之道陰陽和而萬物生焉 夫婦之道
 陰陽和而男女生焉 天地ハ陰陽和合シテ草木萬物
 子女子 故婦人先須調其經而百病不生 百病不生
 而成孕 經脈調ハ無病 然猶當知氣盛血衰則無
 孕血盛氣衰乃有孕 須以抑氣生血爲先 婦人ハ血ヲ
 要ナルニ因テ氣ヲ抑ヘテ 若有肝脾 胎テ一月ヲ肝脾ト
 血ヲ生スルヲ第一トス 胎ヲ安ラカニスル藥氣 及善將
 則服安胎順氣之劑 胎ヲ順スル藥ヲ服セヨ

理ソレニ能身以候分免右ノ如クシテ産ノ時ノ穢子ヲ

如胎前産後變生諸證皆由不善調攝所致茲詳具

各方于後臨病之際又當對證求藥産ノ前後ニイロ

ハカ子テ産前ニ不養生ナル故ナリ此婦人門ノ奥ニ藥

若外感四氣内傷七情以成諸疾治法則與男子無

異當於各類求之産前ニ四氣七情ノ病ハ男トカワル

ノ病門ヲ考ヘ但胎前治病損動胎氣之藥尤當避忌

サリナガラ藥ヲ用ル時熾胎ノ子ヲ損シケガスル林示物ノ

藥アリ尤モ其藥ヲ避テ用ヒヌヤウニ禁セヨ烏頭

- 附子 天雄 烏頭 側子 牛黄 巴豆 大戟
- 牛漆 藜蘆 薏苡 苦硝 二稜 桃仁 等ナリ

委クハ婦人良方ニ見ヘタリ考フベシ

産後 俗ニ直ニ産ヲ呼テサシ

凡婦人生産畢且令飲童子小便一瓊先童便ヲ瓊

一盃ノ一セヨ童子ノ小便ハ十二歳以下ノ無病ノ不

得便臥且宜閉目而坐睡ハ氣耗ル故横ニ寝サセヌナ

故ニ目ヲ閉 須臾方可扶上床仰臥扶上床トハワキヨリ

テ寢所ニ 宜立膝膝ガヒラヲ臍ノキワニヨセ 高倚枕頭

枕モトヲ高クシテ 厚鋪茵褥茵褥ハ 使無賊風吹著賊

身ニ中ヌヤウニセヨ 兼右ノ外 時時令人以軟物從心

スキノ風ナリソレガ 兼右ノ外 時時令人以軟物從心

擗至臍下使惡露不滯如此者兩三日擗ワキトヨリ時軟ナル物ニ

滯テ産婦ノ心ヨリソロソト臍ノ下ニテサスリヲロレテ惡露

常令產婦聞醋炭氣或燒乾漆煙切常ニハ炭ヲ

燒煙ヲ聞スレハ血氣ノ目イナキナリ若無乾漆以破

舊漆器燒之以防血逆迷運之患乾漆無ハ舊キヌリ

聞セテ血上リ目イニスル用心ニセヨ塗物ハ朱分免之後須

更且食白粥一味不可令大飽逐日漸增之産後

時與童子小便一瓊飲之或童子小便以好酒和半仍

瓊温服童子ノ小便ニ好酒半瓊ヲ加ヘタルハ童便ハ三日

過後方可進醇酒并些鹽味二百ノ後少シ鹽氣ヲ臍

及喫爛猪蹄肉牝猪ノ足ノ肉ヲヨ

或雌鷄黒キ牝鷄ナリ血亦不可太過亦

若纔產便與酒恐產母藏府方虛不禁酒亦

力必引血進入四肢致生諸證是ヨリ産後ノイミレヲ

或熱酒入或熱酒入

腹致昏悶目ヲ無聲況不善飲者乎ナドナラバナラ大事

ナキニ酒ヲ與ハ産母ハ産スル女ナリヨロビレテハ藏府モ

虚ニ易キ故酒ノ強キ熱性ニヨタヘス藏氣負クレバ酒

ハ血ヲ引テ四肢方々ニ狂ヒメグル故イロク

癩瘡起ルナリ進ハ酒性方々へ打散ラ云フ

ノ事 纒産食肉太早緣藏府方虛恐成泄瀉或變積
滯産シテ纒ニ間モナキニ肉ヲ早ク食スルハ藏府虚シテ
滯運ラスノモナラヌヨリ又ハ滯テ積
滯ナドノ證ニ 亦不可喜怒憂思 氣ヲ耗ス 動力太
變ゼントナリ
早 骨働早 恣食生冷 生令ハ後ニ現ヘタリ 及不避風寒
不避トハ風寒ノ申 或冷水洗濯 冷水ヒテ手足ヲ
又樹ニヨゲザルナリ 當時
雖未覺大損滿月之後致病百端 右ノ如クスレバ其當
覺子ドモ數月ツモリテノ後癩ノ生スルイロ 或成産後
イロ一度ニ起ルツトナリ百端トハ百品イロナリ
諸疾 又ハ産後ノイロノ病 不可虚羸 擗産後ニハ氣
カレヌヤウ 失於將補便成大患 將補トハ養生ヲ云フ養
ニ養生セヨ 生アレテ六六トノ病

トナ 終身悔而不及 終身一生涯ナリ一代悔 其産後倘
有諸證不論巨細并有藥可療モ小病モ比自藥が療
法アルナリ

⑤ 小兒論 イトケナキ子ノ總名

蓋小兒初生受胎氣之厚者疾病自少 癩ハ胎内ニテ
氣血ヲ受ル一少キニ因テ病ナリ胎内ニテ 稟賦怯弱者
ニテ氣血ヲ受ル一厚ケレバ病ハ少キナリ 稟賦怯弱者
又藉藥力以扶植元氣 生レ付葺キ者ハ藥ノ力ニ
況養護不謹 右ニ云ル如ク小兒ハモロキ者ナルニテ
驚觸 音高ナル一ニ驚カレ氣 或飲食過度 食物ヲ
或受

寒暑 衝冒ハ寒氣ニ向ヒ 以致變生諸證 右ノ不養生

ヲ生スル 調治之法又須察脉觀證審之而後投以藥

餌略備數方于後 略トハ大要ナリ藥方ハアララシ後ニ

備ルトナリ 臍風撮口 臍風トハ小兒臍ヲ斷時外邪入テ

臍風撮口

危フキ 證ナリ

小兒初生一七日內忽患臍風撮口十無一活坐視

其斃良可憫也 斃ハ死スルナリスヘキ手タテ無クトリミワ

リ誠ニカナ 有一法極驗世罕有知者 去ナガラ一ツク

シキ一ナリ 凡患此證 臍風撮 兒齒齲上 斷ノ字

法ナリ世間ニ知 凡患此證 臍風撮 兒齒齲上 斷ノ字

有 小泡子如粟米狀 其子ノ齒グキニホソキミツ

テ粟ヤ米 以温水蘸熟帛裹手指輕輕擦破 熟帛ハ

キヌナリ 熟帛ヲ湯ニヒタシ指ノサキヲ包ミ輕クトハ手

即口開便安不用服藥 其兒ノ口開テヨキ

口瘡重舌

ア儿ヤウ ナラユラ

小兒夜啼要飲乳若口到乳上即啼而不乳者必身

額微熱 小兒ノ夜啼乳ヲホシガル故ナリ若乳ノキワニ

急即刻取燈照口急即刻取燈照口燈ノ光テ口中若無瘡舌胎腫也

舌トギナラフ子バ舌トギナラフ子バ隨證施治

夜啼客忤夜啼客忤夜啼ハヨナキ客忤ハ見ナレヌ人ヲ

夫小兒胎熱則心躁而喜夜啼夫小兒胎熱則心躁而喜夜啼受ハ心イキレ其故ニ

能夜啼或腹熱啼時有汗而身仰或口舌瘡腫不能能夜啼或腹熱啼時有汗而身仰或口舌瘡腫不能

吃乳故夜啼不止也吃乳故夜啼不止也或ハ腹熱シ啼時身ヲ仰クナリ

又故夜啼客忤者見生人氣忤犯而啼也又故夜啼客忤者見生人氣忤犯而啼也忤ト云ハ

見ナレヌ人ヲ見テヲコロシ氣ニ思テヲレヨリヲビエテ啼ナ見ナレヌ人ヲ見テヲコロシ氣ニ思テヲレヨリヲビエテ啼ナ

急慢驚風急慢驚風急驚風ト慢驚風ナリ急驚風ハ身熱

證ナリ慢驚風ハヒクスクー少ク少シツツラヌツカヒ證ナリ慢驚風ハヒクスクー少ク少シツツラヌツカヒ

驚風有陰陽二證驚風有陰陽二證陰證ハ慢驚風ナリ陽證ハ急驚風ナリ

搐搦上視牙關緊硬者陽證也搐搦上視牙關緊硬者陽證也是陽證ナリ即チ急驚

因吐瀉或只吐因吐瀉或只吐風ノ搐搦トハ手足カ

不瀉日漸困面色白脾虛或冷而發驚不甚搐搦微不瀉日漸困面色白脾虛或冷而發驚不甚搐搦微

微目上視手足微動者陰證也微目上視手足微動者陰證也因トハ驚風ノ痲因ヤミ

又ハ吐シテ瀉セズ肝ニクタビシ顔ノ色白ク肺弱テ不又ハ吐シテ瀉セズ肝ニクタビシ顔ノ色白ク肺弱テ不

陽證急驚風用涼陽證急驚風用涼ツキガ吐瀉シ腹瀉シ

陰證慢驚風用温藥陰證慢驚風用温藥急驚風ハ肝木ノ風邪盛

藥ナル故涼藥ヲ用テ瀉セヨ藥ナル故涼藥ヲ用テ瀉セヨ慢驚風ハ

風ハ脾土ノ不足ヨリ生シ不可一槩作驚風治也陰證陽證

ノワカチモナク一ツマウニ驚風ト又有一證又驚風ニ似タ

ハカリ心得テ治スルナリ 又有二證一證ガアル

欲發瘡疹 痘瘡麻疹ナリ 瘡疹 先身熱驚跳或發搐

搦此非驚風 驗本女ニ云元如ク驚風ニ似タトモ身

ハ驚風 當宜解散 サヤウナルハ解散

二非ス 胎熱胎寒 孀妊ノ母熱物熱藥ヲ服シテ

凡小兒胎中受熱生下則多驚啼身熱或大小便不

通 是ハ胎熱ヲ云ヘリ 胎中受寒生下則身青體冷或

腹痛 是比皆寒冷 盤腸 盤腸痛ナリ小腸ニ寒氣鬱シ

吊 是モ小兒ノ疝氣ナリ胎中ニテ風邪結シテ其上

須察其候而治之 候トハ胎熱カ胎寒カト云見

凡小兒之病與大人不殊 惟膈風夜啼重舌變蒸小

ノ十變五蒸ノ證ナリ凡小兒生レテ二十一日毎ニ藏

府智慧一タビ變スルナリ十變シテ藏府全ク定ルナリ

六十四日ニ蒸ス變ハ五藏ヲ生シ蒸ハ六府ヲ養タツ

ル故ニ變ハ上氣シ蒸ハ身熱ス大抵其様子身熱シ

脹亂シ申遊シ汗出テ煩啼傷寒ニ似タリ輕ケレ

ハ五百ニシテサマルゾ重キハ七八日メニサマルナリ 客忤驚

風解顛 解顛ハ小兒ノ頭骨ノロクメキ合又 疳病小兒ノ

ナリ其證 數證大人無之 右ノ五六種ノ病ガカク身ニ 其如感

冒四氣 外題ニ 傷風 傷寒 斑瘡 發斑ノ一ナリ蚊ノ

出ル後ノ傷寒 瀉利 痢疾 嘔吐 後ノ嘔吐ノ 等證則一但

藥劑大小輕重之不同耳 右ノ癰 大方ヲトナト同シ

府弱キ故藥ノ服 諸方前已類編可披而得之 傷寒

等ハ大人ト同キ故別ニ小兒門ニ載ヌナリ前ガニ

疹痘ノ事 痘ハ瘡瘡ナリ此論ノ始ヨリ 熱火故也ト云ニテガ彦明公カ宣明披粹ガ論

テガ東垣ノ試効ガ方ノ論ナリソレニ因テ 外題ノ下ニ披粹ガ方試効ガ方ト記セリ

夫小兒癰疹始之證 癰疹ハ瘡瘡ヲ云瘡瘡ノ始

見而燥腮赤目胞赤呵欠煩悶乍凉乍熱咳嗽嚏噴

足稍冷多睡驚並瘡疹之證 右ノ證瘡瘡ノ出

胞或生小紅癰或生癰疹此三等不同 間ニ有テ蚤ノ

食タル痕ノヤウナ相火肺ニ入テ膿胞トナリ脾 蓋諸證皆

太陽寒水起右腎之下煎熬左腎足太陽膀胱寒水

夾脊逆流上頭下額逆手太陽丙火不得傳導逆於

面是壬癸寒水逆尅丙丁熱火故也 此段ハ瘡瘡ノ

太陽寒水上部ノ太陽ノ火ヲ起スル故面ニ發スト云フ
命門ノ相火ニ引立ラシ左腎ノ水ヲ煎じ熬ナリ是足ノ
太陽膀胱ノ經ハ頭ヨリ足ニ至ル經ナレドモ相火ニ引立ラ
レ下カラ上ニ升ル故ニ逆流ト云フ是經背ノ兩脇ヲハ
サシテ額ニ至ル手ノ太陽小腸ハ心ト表裏ニシテ兩下ノ火
ヲ王ル右ノ膀胱寒水相火トツレテ手ノ太陽兩下ノ火
小腸ニ戰ヒ逆ス故ニ手ノ太陽ノ兩火足ノ太陽寒水ニハ
越サレテ傳導スルナラス水火面部ニ戰テ瘡瘡出ルナリ壬
癸ト八足ノ太陽膀胱ハ腎ト表裏ニシテ水ヲ引トル故壬癸
ト云フ **小兒瘡疹之由** 病由ト由來ト **皆始生之時啼聲一**
發口中所含惡血隨吸而下還於右腎包絡之胞中
是ヨリ東垣ノ試効方ノ論ナリ 披粹方ト試効方ト瘡
瘡ノ見タテテ後ト爰ニ載多凡ソ瘡瘡ノ根元ハ其子ノ
生ル時口中ニアル惡血啼時引イキニツレテ吞ミ込ナリ
包絡ハ心包絡ナリ右腎モ相火ノヤドル處ナリ胞ハ命

門ナリ右ノ惡血吞ミ込テ相火ノ其瘡之發下焦相火熾
ノヤドル命門ニ引込ナリ **也** 下焦ノ命門 三等之瘡 膿胞小紅斑 皆出於足太
陽寒水之經 足ノ太陽膀胱寒水命門ノ相火ニツレテ
外爲大寒內爲二火交攻化血肉爲膿 外ハ大寒ニ傷
相火ノ二ツニ互ニ攻ラレテ **寒爲發寒邪可令內瀉二火**
血肉ガ變ジテ膿トナルゾ **又令濕氣上歸本位** 濕氣ハ足
寒邪ヲ散シテ内ノ君ヲ **水ナリ君相ノ二火ヲ瀉スレバ逆流ノ寒水**
本ノ居處ニ歸ナリ是療治ノ手ヲダテナリ **三服瘡疹即**
愈 二服ハ一ニ服ノ書誤ナリ右ノシカケ **已後再無二番**
瘡出之患損生命者矣 瘡瘡ハ餘ノ瘡トカワリ一度愈
テ其已後再出テ生命ヲ損

スル
無ア

醫方大成論諺解卷之五終

貞享二年乙丑五月吉辰

二條通大恩寺町

書肆武村新兵衛板行



佐藤氏

可奉

