




瘡疥

急救八

子胥十三

小兒十八

夜啼

感冒四氣

疹癰

醫方大成論諺解卷之五

五臟内外所因證治

ヲ考テ内ノ病ヲ知ナリ所因ハ病因ナリ
病出ス根元ナリ證治ハ病證治法ヲ云フ

人身之有形於外者必有諸内
 人身ノ外ニ見ヘタル眼
 耳鼻舌ノ類ハ必ス其

源ハ内ニアル
故五藏之受病於内而發於外者必見之眼

耳^ミ鼻^ニ舌^ヒ口^セ牙^ウ之^ケ間^ノ
 二^ア見^ラハス禾^イ女^メ細^{カイ}ハ下^シノ^モ文^シ二見^ミヘタ^ル眼^メ耳^ミ

心經蘊熱則口舌生瘡脣口裂折舌ハ心氣ノ通ズル處

心ハツト脾ヒト常トニ其レ六氣リクキ通スル故ニ心ハツ經キョウ鬱ウツ熱ネツスレバ口コ中チュウ唇シヅサケルナリ

脾ヒ與ト胃イ相アイ通ツウ故ニ受ウケ熱ネツ

嘔氣臭穢イッキニラエス
 胃中ニ火熱アレバ嘔氣臭穢ノ氣口ヨリ
 出ルナリ口ハ脾ノキエドリ胃ト脾ハツノ氣

來辨其冷熱虛實治之

ナリ所^{ナリ}自來^{ヨシテキタル}ハ内^{ウチ}ノ根元^{ネノ}ノ

此皆病在內而應乎外也

凡有其證必須考其所自

ス血^チノ餘^アリ人ノ髮^{カミ}トナル肝

肝血貯元源カニ因テ焦
ヲ見テ肝血ノ不足ナリ

不能視髮乃血之餘焦枯

者血不足也肝藏血目視

肺ニ風邪ヲ感ズレバ皮毛癢
毒ヲ積ハ熱毒皮膚ニ發シ

肝受病則目

肺受風邪則皮毛癢痒積

毒則發爲癰疽

養ヒニテ強シ面部ノ位ナリサルニヨツテ風邪ヲ引

牙痛三領腫ルナリ

則牙痛頰腫腎ノ藏衰ニ通不處ニ因ノ

牙^ハ齒^ハ骨^ハノ餘^リ腎^ノ部^所
 牙^ハ齒^ハ骨^ハノ餘^リ腎^ノ部^所

臭クケがラワレキニホヒナリ

受冷則耳不能聽耳者腎之氣所

大成謹解

卷之三

名上
湯
明
三
ズ
アタ
キカ
七
徳
戎
東
風

ソレ^{ソレ}主^ミリノ藏^{クラ}ヲ云^{イフ}外^{ガハ}ニラ^ニレ^レノ病^{ヤマ}證^シ見^ミヘタ^タフ内^{ウチ}ノ根^ネ元^{ゲン}
ノ藏^{クラ}何^{ナニ}レノ病^{ヤマ}ト云^{イフ}フヲ考^{カガ}テ冷^{ヒヤ}カ執^ツカヲ採^{サゲ}リテ治^チセヨトナリ

癰疽瘡癰

癰ハ六府ヨリ生ス腫大キニ見ユレドモ
毒氣^{ドクケ}浅^{アサ}シ疽^{ジュ}ハ五藏^{ゴザウ}ノ毒氣^{ドクケ}ノ沮^{シュ}アリ

凡^{ヲヨシ}大^{ヲイカニ}方^イ大^イ瘡^{カサ}之^ノ痛^イ痒^イ自^{ソウ}屬^{ゾク}

虚實寒熱
下切腫物
八屬上八虛實

寒熱ノワザ
故痛而實者爲

ヲツトモヨメカニキモノヲス
熱虚痒者爲寒氣血滯リ
實ニテ痛ハ

熱ノワザ氣血虛ニ
テ痒ハ虚寒ニナリ
經云諸

瘡痛癢皆生於心以心王

血而行氣氣血凝滯而爲

癰疽瘡瘍 經ハ素問 至真真
要論ノ文也

諸痛痒瘡皆心ニ屬スト本ノ
ハ心ノ藏ノワサト素問ニ云

又ニアリ一切ノ腫物ノ痛癢
ハ心火ニ狀トツテ血ヲ主

テ氣血滯^{キケツ、トコラ}ハイロクノ臍

物又生スナリ
大

大威詳解
卷之三

上曰癰疽一寸以下曰瘡癤腫物三寸以下曰以生ハ
類諸瘡之中惟背疽下瘡最爲急證疽ノ初ハ粟粒ホ
内ノ根深ク闊キナリ痛ニ痒カ常ノ腫物ヨリ甚シ數日ノ
後ゼンニ身熱起リ惡寒頭痛煩渴スルナリ且ニ隨テツ
カレク見ユナリ背ニ生ズルヲ背疽ト云フ瘡ハ疔瘡トモ
書ナリデキ初メ鉗ノボウシガレラノヤウニホソキトテ丁
瘡ト云ヘリ是モ細ク見ユレドモ根深其初發也使身體
毒深レテ取分太事ノ腫物ナリ或先熱而後惡寒或先癢而後痛若其不痛最爲惡
證痛ニスハ胃ノ氣ノ虚且如背疽始生如黍粟粒大纔
有覺時使用艾於痛處灸之痛則灸至痒痒則灸至
痛使毒氣隨火而散疽ノ生初ハ黍粟程アル時はハ

急宜以針於紅線所至之處刺出毒血又ハト瘡ノ色

中ニ赤キ線ノヤウナ血筋一條其中心ヨリ上ニ上ルアリ是ヲ

紅線并ト云フ急ニ其血筋ノ行先ヲ針ニテ斷切テ其毒

血ヲ出セトナリト云フ然後以蟾酥乳香膏等丹ト云ハル藥

アリ蟾酥ハヒキガハノ油ナリ其方ハヒキガハノ骨頭ノ尖

タル處ヲ針ニテ指破リ油紙ノ上ニホリ出シカデホシニテ

白麵ト丹ト二色等分ニ入テ能程ニナリ調ヘ麥ツボホドニ

ハ白羊腎ト臘脂半斤煎シ沸シテ杏仁一兩半地黃

ノ汁ニ合合黃蠟二兩ヲ入シ蠟トケテ油ト一ツニナルトキ

乳香一兩別ニ粉ニシテ食鹽松脂各一兩半粉ニシテ蠟

ノ中へ入シ煎シ蠟ノ木ノヘラニテカキセ好ホドニナリテ器

ニ入シ腫物ニ一日ニ於正瘡上塗之正瘡トハ腫物ノ一ツ

ニ二度付カヘルナリ於正瘡上塗之正瘡トハ腫物ノ一ツ

針時以病者知痛出血為好否則紅線入腹攻心必

致危困右ノ紅線ヲ針ニテ斷切ル時病人痛ヲ知ル程ニ

足ヨリ腹ニ入り心ニ攻入レバイタキ至若瘰癧頸癰脉癰之類

皆毒氣鬱積於內發而為此瘰癧ハ下ノ瘰癧門ニ見ヘ

生ズ俗ニ頸切癰ト云ニ焦ノ經ノ病ナリ脉癰ハ肉癰ナリ

イドコロニ生ズル腫物ナリ足ノ太陽膀胱ノ濕熱ナリ皆

熱毒ノ積リガ治之右ノ癰皆須解毒潰膿若氣血弱

者又須生之此一定之法毒氣ヲナラシ膿血ヲ出セヨ

隨其藏府所受冷熱調之是等ノ出來物藏府ノ所

貴第一能ト氣血宣流自失其痛痒矣氣血生レテ

宣流スルハ

貴第一能ト氣血宣流自失其痛痒矣氣血生レテ

宣流スルハ

好トスルナリ氣血生スルバ如脚外廉瘡脚ノ三里ノ下ニ生ズル瘡ナリ俗
 自然ト痛痒ハナクナル三云ハキ瘡ナリ向フス子ニヒロカリ久年不愈者多是腎
 膿血出テ肉爛數年愈ガルナリ
 水流注又有脾水潰溢治各有方隨證選擇右ノハ
 カスルハタフン腎ノ邪水ノ妄リニ流レシニテ是ノ如シ腎經
 ハ内股ノ後廉ヲ循ルニ因テナリ又ハ脾土弱テ堤切レ
 脾土ノ邪濕セキ込テ是ノ如クナルモアリ脾經ハ内踝
 ノ前廉ヲメグルニ因テナリ右何レモ藥方ハソレニ有
 病ニ因テ撰用ヨ

⑤瘡疥附癰疹 瘡ハカサノ總名瘡ハヒゼガサノ類ナ
 俗ニ云クサノ類ナリ 癰疹ハ皮ヒトニ生スル小瘡ナリ

瘡疥之爲病雖苦不害人然而至難可者多矣瘡疥ハ人ノ

迷惑カル物ナドモ輕キ病ニテ人ヲ諸痛痒瘡皆屬於心
 損ゼヌナリサレドモ愈カスル物ナ 素問ノ文ナリ前ノ多由心氣鬱滯或飲食不節毒蘊
 癰疽疔ニ見ヘタリ 於腸胃發見於皮膚素問ニ一切ノ瘡ハ心ノ藏ヨリ初ル
 食物ノ滯タル毒氣脾胃ニ積テ身ニ出來ルナリ 古方所謂古ノ方藥ノ書馬疥
 病源候論集驗方ニ火疥ヲ入レテ五ツアリ此大成論
 ニ火疥一證ヲチタナリ其證赤クナリ痛ミ又ハ痒ク膿
 アリ樹テ是馬疥ハ皮ノ内ニ水疥含搔ハ水出ルリ乾疥
 痒シ搔ハ皮ニ濕疥常ニ汁氣アリテニメル 今之所謂今時
 熱瘡心煩躁スルナリ冷瘡風寒ノ冷氣瘡二入テ血溢
 ス 惡瘡風濕ニ中ラレテ生ス痛痒ク反花細キ出來モ
 赤ク爛レ腫身熱汗多ナリ

口ツクリカヘリテ木ノ子毒瘡風邪鬱シテ熱ナリ種類
 ノヤウニ肉出テ血ハシル生ス俗ニ云唐瘡ナリ
 不一生於手足乃至遍體或痒或痛或覺瘡ノ字ハ
 起ル去聲ナリ腫或腫或皮肉隱痛隱痛ハ皮肉ノアヒ
 或抓之凸起中ダカニ或瘡癰ツブクト豆粒或膿水浸
 淫浸淫ハ膿汁シメリ治之内則當理心血祛散風熱
 右ニ云如ク諸痛痒瘡ハ心ノワザナルニ因テ心血ノ滯
 ラヌヤウニ生シ補ヒ其上ニ風濕熱毒ヲ發散セヨ
 則敷洗敷ハ付藥洗理無不愈是道理テ愈
 夫瘰癧之病即九漏是也漏ハ穴ニ生ジテ汁ヲ出ス
 瘰癧俗ニ即チルイレキト呼耳ノキワ頸ノ
 結於項腋之間累累大小無定結ハ生ズルナリ累累ハ
 其大小不一其病ノ根ハ藏府ニアル下ニ文ニ肝ハ根
 ヤウニ定ラヌ發作寒熱膿水潰漏其根
 在藏府其病ノ根ハ藏府ニアル下ニ文ニ肝ハ根
 主狼漏其病ノ根ハ藏府ニアル下ニ文ニ肝ハ根
 其病ノ根ハ藏府ニアル下ニ文ニ肝ハ根
 胃主鼠漏食物擇ニスメツタル物ヲ
 寒熱身太腸主蠅蝱漏草木ノ實ヲ食シテ虫ノアルヲモ
 漏トナル其形チカタツ脾主蜂漏飽食辛勞シテ渴キ
 フリノ如クタシニ生ス脾主蜂漏草臥ムサトシタル瀝シ
 水ヲ飲ソノ毒ニ中テ漏トナル頸ノマワリニ二處四處ニ
 生シ腫テ潰ルヤウニテ又瘡ヲ生ス瘡ハ又ワキニ生スル

古方所載名狀大槩不一難以詳述及其生也多
 結於項腋之間累累大小無定結ハ生ズルナリ累累ハ
 其大小不一其病ノ根ハ藏府ニアル下ニ文ニ肝ハ根
 ヤウニ定ラヌ發作寒熱膿水潰漏其根
 在藏府其病ノ根ハ藏府ニアル下ニ文ニ肝ハ根
 主狼漏其病ノ根ハ藏府ニアル下ニ文ニ肝ハ根
 其病ノ根ハ藏府ニアル下ニ文ニ肝ハ根
 胃主鼠漏食物擇ニスメツタル物ヲ
 寒熱身太腸主蠅蝱漏草木ノ實ヲ食シテ虫ノアルヲモ
 漏トナル其形チカタツ脾主蜂漏飽食辛勞シテ渴キ
 フリノ如クタシニ生ス脾主蜂漏草臥ムサトシタル瀝シ
 水ヲ飲ソノ毒ニ中テ漏トナル頸ノマワリニ二處四處ニ
 生シ腫テ潰ルヤウニテ又瘡ヲ生ス瘡ハ又ワキニ生スル

ナ、肺主蚘蟄漏寒ニ因テ漏トナル頸ニ生ジテ熱ツヨク傷
リ、肺主蚘蟄漏寒ノ如シ又ハ疥癬ノゴトクナルモアリ
心主蟄蟄漏悲愁心へ思案ツモリテ生ズ頸ニ生ジテアト
心主蟄蟄漏サキナク索ノ核ノヤウニ皮ノ内ニアナタコ
ナタ移ル膽主浮蛆漏ハ腹ノ下ニアリ指ホドニテアトサ
寒熱アリ腎主癰癰漏ハ濕氣ノアル處ニ生シテ
キ無ク寒熱シテ腎主癰癰漏ハ濕氣ノアル處ニ生シテ
嘔吐ノ心アリ腎主癰癰漏ハ濕氣ノアル處ニ生シテ
生ズ頸ニ生ジテ常小腸主轉脈漏ワレク大キニ驚ヒテ
ニ濃流シ寒熱スル原其所因多因寒暑不調
生ズ頸ニ生スルナリテキ初メ原其所因多因寒暑不調
脈躍リ身振イ寒熱スル或由飲食乖節食物ヨキカ
寒夫暑氣ニ不養生シテ寒或由飲食乖節食物ヨキカ
熱調ラズシテ氣血虚スルナリ或由飲食乖節食物ヨキカ
ソム遂致血氣壅結而成也右ノ不養生巢氏所載決
キ遂致血氣壅結而成也ニテカスノ如シ巢氏所載決
其生死隋ノ巢元方ガ大業六年ニカサ奉ツテ病源
候論五十卷ヲ編リ其内ニ載テアル癰癰ノイ

キル證死スル證カツキト見ワク反其目以視之其中有赤
ルアリ下ノ文ニ見ヘタリ反其目以視之其中有赤
脈從上下貫瞳子見一脈一歲死見一脈半一歲半死見二脈二歲死見二脈半二歲半死見三脈三歲
死見二脈二歲死見二脈半二歲半死見三脈三歲死見二脈二歲死見二脈半二歲半死見三脈三歲
死赤脈不下貫瞳子可治眼ヲ開カセテ見ルニ眼ノ中ニ
ノ中ニ入ル赤脈一筋アレバ一年スギテ死ス一筋半人見死見二脈二歲死見二脈半二歲半死見三脈三歲
見二入レバ一年半ニ死ス二筋ハ二年ニ死ス二筋半人見死見二脈二歲死見二脈半二歲半死見三脈三歲
年半ニ死ス二筋ハ二年ニ死ス二筋半人見死見二脈二歲死見二脈半二歲半死見三脈三歲
多シ母氣滯ク集ルホド赤脈スクナキゾ瞳子ニ赤脈死見二脈二歲死見二脈半二歲半死見三脈三歲
無ハ治セ三因云有是說驗之少有是證陳無擇ガニ
ラハソ三因云有是說驗之少有是證陳無擇ガニ陳無擇ガニ
脈瞳子ヲ貫ヌク多キ少キニ因テ一年ニ死ス理然陳無擇ガニ
二年ニ死スナドノヤウナ病證終ニ見ヌトナリ陳無擇ガニ
カニ云々道理陳無擇ガニ
尤モ聞ヘタナリ陳無擇ガニ

折傷

折ハクジクトヨム打身ナリ傷ハ

折傷者謂其有所傷於身體者也

折傷ハ身ヲ損シ傷ハ身ヲ損ス

為刀斧所刃

所刃トハ切ルナリ刀ヲカ

或墜墮險地

打撲身體

險處ヨリ落テ

皆能使血出不止

金瘡モ打

リテハ止

又恐瘀血停積于藏府結而不散去之不早

恐有入腹攻心之患

ツキアガリテナ

治療之法須外用敷貼之藥散其血

止其痛

付藥ニテ死血ヲチラレ

内則用花藥石散之類

化利瘀血

死血ノ堅リシ化シテトリ

通利サセテ痛ヲ止

ヨ花藥散ノ方ハ花藥石アラクト粉ニシテ一兩硫黃粉ニシテ四兩右二味一ツニ誠合セ土鍋ニ入テ子バ土ニ封ジ内ニ熱スルホドアグリ封ジタルニ乾キテ後平瓦ノ上ニ鐵ヲ置其瓦ノ上ニ八卦五行ノ文字ヲ書



北



土



火



南



後緝籬ニテフセ粉ニシテ磁器ニ入レ用ル時瘻口ニヒ子リカクレバ痛止ル脚ニ瘀血有ニ六鐘使ヲ沸シ酒ヲ少シ入シテ

時ヨリゼンク下カラ炭ヲ起テ火キヘテ取出シ又一夜置テ火氣ヲサメスナリ土鍋能冷テ扱其中ノ藥ヲ取出シ細ニラロシ其

一、久程入レカキタテ、飲ムナリ婦人ノ産後ニ惡血心ニノ
ボラ、童使ニテ用ユル瘀血木トナリテ小便ヨリ出ル
然後款款調理生肌、款款トハ漸々ナリ其後セシクニ或
因折傷而停鬱其氣又當順之、金瘡打身ノ養生ノ
醫スルナラハ其氣或因湯火所傷、熱湯ニテ身ヲ損シ火
ヲ順テスヤウニセヨ、ニテ手足ヲ損ジタルヤケ
ド、并具一二方以備搜討、何レモ一二種ノ藥方ヲ具
ナリ、
卒急救諸方、頸ヲクリ水ニ溺シ凍死是等ハ急ニ救
ナリ方ハ法ナリ、
手ヲテト云フ、
救自縊法凡自縊高懸者徐徐抱任解繩不得截斷
徐徐ハセシクナリソロクト下ヨリ抱カヘテ繩ヲ手ニテホド
ケヌメク繩ヲ切テ解ナ繩ヲ切シバ再ビニミカヘラスソ

上下安被臥之、夜ノ物ヲ下ニ敷上ニ蓋以一人用脚踏
其兩肩手挽其髮常令茲急勿使緩、人脚ニテ縊レ
タルモノ、兩ノ肩ヲフミテ縊タル者ノ髮ノ毛ヲ急ニ引ハ
ナリ茲急ハ茲急ノ如クツヨク引ケトナリヌクユルナリ是レ
死人ノ氣ヲ付シ爲ナリ、一人以手據按胸上數上數摩
動之、又獨ハ軟カニ手ニテ縊タル者ノ胸ヲサスリ、一人摩持
臂脰屈伸之若已強直但漸屈之并按其腹、屈伸ハ
脚臂ヲワキヨリノヘカメ、如此一時頃一時分雖得氣
從口出呼吸眼開仍引按不住、イキツギノカヨニ出デ目
髮ヲ引胸ヲサス、須臾クニテ以少桂湯、藥方ハ見ヌ但
一ツヲヤムルナ

入タルヲ云カ肉桂ハ血脈ヲ通スル物 或清粥 粥ノウハ湯

故ニ縊タル者ノ氣血ヲ順サシタメカ 灌令喉潤漸漸能嚥乃止 灌ハ右ノ湯ヲ飲シムル

按一ヲ更令兩人以管吹其兩耳此法最好無不活

者又二人ノワキヨリ竹ノ管ニテ縊タル者ノ耳 自且至昏

雖冷亦可救 氣ノ中ハ氣モ通ジ安キ故救ハルモノナリ

暮至旦陰氣盛爲難 暮ニ縊テ朝タニテ有ハ夜ノ陰氣

又法緊用兩手掩其口勿令透氣兩時氣急則

活テ氣ヲ通セヌ一兩時ホドシテ縊タル者ノイキ内ニテ

急ニイキニク時ハ生ルナリ縊タル者ヲ俄ニ氣ヲ通シサス

レ一度ニイキ出テアトニイキ飯又或死ス故ニツヨクイ

キヲ開テツロノ氣 經驗方救凍死法 羅天益ガ作タル

救フチダ 四肢直口噤只有微氣者 手危スツニ口ツグミ

イ有者 用大釜炒灰令煖以囊盛熨心上冷即換之

先大釜ニ灰ヲ入シ煖テ煖クナリタル時囊ニ入テ死人

ノ心ニ貼ラシテ熨メヨ冷タラバ又熱キ灰ヲ入カヘテ

目開氣出然後以粥清稍稍進之 目開イキ出ハ粥

ト飲 若不溫其心便將火灸則令氣與火爭必死 又

右ノ如ク心ヲ熨火ニ温メスニテ直ニ火ニアテハ死人ヲ

温ムレハ中ノ冷氣ト外ノ火氣俄ニ爭テ死ヌル 絲真

人救落氷死急解去死衣帶艾灸腹中 經

水ニ溺タルヲ救法ニ早ク死人ノ帶ヲ解テ臍ニ灸 經驗

即チ活ナリ臍中ハ誤ナリ臍中ニ改ムベキナリ

方救溺水法 經驗方ニアル水 凡人溺水者救上岸
者ヲ川岸ニ 即將牛一頭 牛一頭上 却冷水之人
將肚橫覆在牛背上兩邊用入扶策徐徐牽而行
以出腹內之水 於ヨリ扶策ト手定テ取 抱ヘ落サヌヤ
ニシテソロクト牛ヲ引テ 如醒氣付テ 即以蘇合
香圓之類 蘇合香圓ハ後ノ 或老薑擦牙 スケ冷ヲ去リ
水氣ヲ去ル故 若無牛以活人於長板橙上仰臥却令
溺水人如前法將肚相抵活人身上水出即活 牛無
ハ別ニ無病ノ人ヲ長キ板橙トテ凡腰カケノ屬ノ板ノ
上ニアヲケニナリテ扱死人ヲ前牛ニノスル法ノ如ク

横サ三肚ヲ無病人ノ身ニ當
水ヲ出ス即チ溺ルトナリ

空

婦人調經衆疾論 婦人調經衆疾論 婦人調經衆疾論

婦人調經衆疾論 婦人調經衆疾論 婦人調經衆疾論

夫女子十四則月水行 惣テ女ハ陰血ヲ以テ生ズレ
少陽ノセツノ數ヲ以テ七歳ニテ腎氣盛ニナリ齒カワリ
二七十四歳ニシテ月水通ジテ交合スレバ子ヲ生ズルナ
リ陰バカリニテ立又故 男子十六則陽精溢 男ハ陽氣
中ニ少シ陽ヲ含ムナリ 男子十六則陽精溢 男ハ陽氣
スレドモ陽バカリニテハ立又故中ニ少シ陰氣ヲ含テ少陰
ノハノ數ニテ八歳ニテ腎氣實シテ齒カワリニナリ 十六
ニシテ陽精盛ニ溢シテ交合スレバ子ヲ生ズルナリ 此皆合平陰陽之數 男ハ陽
精溢ルモ皆陰陽自 各及其時 女モ男モ陰陽自 然ノ數ニカナフナリ 及テ月水陽精通ズルゾ

故男子之精氣宜盛故先精氣ヲ盛ニルヤリニセヨ
女子之月水宜調女ハ陰ニ狀ル故陰血カカヨウニセヨ
之道貴乎耗其氣以行其血血盛氣衰謂之從從則
百病不生育無損矣
耗之血ノ行ルヤウニセヨ
產難且婦人之病四時所感六淫七情所傷悉與
男子治法一同且ハリモクナリ
惟胎前產後七癥
人聲癥是ナリ
八癥蛇癥蠱癥血癥是ナリ

崩漏崩中漏下ナリ
崩漏ハ形水流出テ斷ヌナリ俗ニ云フ長血ナリ
之證爲異
婦人門ノ藥方ヲ別究其所因多由月水不調變生
諸證根元ハ月水ノ識ヲヌヨリ
如期爲安經候ハ形水ノ通ズル約束ノ時ナリ
期當寒其冷熱虛實而調之先期而
行者血熱故也法當清之
後者血熱故也法當清之
過期而行者血寒故也法當溫之
然又不可不察其有無外邪爲

大成醫解 卷之五
之寒熱而後投藥 扱又月水ノ遲早ハ血分ノ寒熱ト
因テ寒熱スルカラ 且經行之際與產後一般將理失宜
見テ藥ヲ服ヨ 爲病不淺 後ト同シ養生アリケバ病ヲ生スル一多キハ産
ナラヌナリ 一般ハ一様ナリ 若被驚則血氣錯亂經脈斬
リ將理ハ身養生ナリ 然不行ハスキトナリ 胎氣亂ニ轉然 逆於上則從鼻口
中出逆於身則爲血分勞瘵之疾 右ノ驚カサレテ血
口ヨリ血出ルナリ身ノ中ニ逆スルハ血分トテ婦人ノ月水
通ゼスニテ後ニ水腫スルヲ云フ勞瘵ノ證ハ後ニ見ヘタリ
若其時ノ時 勞力太過則生虛熱變爲疼痛之根タ
キ辛勞スルヲ過レバ虛火ノ熱生ジテ 若患怒則氣逆
ソレガ後日ニ變ジテ身ノ痛ノ根トナル

氣逆則血逆逆於腰腿心腹背脇之間遇經行時則
痛而重著過期又安 腹ヲ立ヒバ氣サカ上テ血モ又サカノ
カノボリ止テ月水ノ時痛テ身重クヨダ 若怒極而傷
ルキナリ月水ノ時ヲ過レバ又痛ミ止ナリ 於肝則又有眩暈嘔吐之證
證出 加之經脈滲漏於其間 其血ニ月水ノ時ナラ 遂成
竅穴 玉門ノ外ニ別ニ淋瀝不止 血流シテ止ヌゾ淋瀝
凡此之時 中風則病風感冷則病冷久而不治
崩漏帶下七微八痕可立而待 可立而待トハ約ニ云
生ゼシ 若能治病於未然 未然ハ病ノ未ナリニ云病ガ
ナリ 若能治病於未然 未然ハ病ノ未ナリニ云病ガ

調經為先故首論之人門ノ初ニ先居ルヲ謂フヲ述

各備諸方依次于後婦人門ノ先ニタテニ記ス

（全）孕育婦人ノ予ヲ孕フヲ論スル

生育之道陰陽二氣交感而成胎予ヲ生スル道理ハ

氣交り動テ陰血陽氣和若陰血先至陽精後衝血

開裹精陽內陰外陰抱陽胎而男形成矣若交感ノ

血先至リ男ノ陽精後ニ子宮ニ入リ陰血開テ陽精

若陽精先入陰血後參精開裹血陰內陽外陽抱陰

胎而女形成矣又男ノ陽精先ニ子宮ニ入テ女ノ陰血

又曰婦人月信初止一

日三百五日及男女生命旺相又男女ヲ生ム時アリ

其夫婦ノ生レ時性ニカナウタサカユル日ナリ喻ハ木性

火性ハ陰丁土性ハ戊巳是ナリ陽日陽由トハ卯酉戌陽

時寅ノ時ヨリ未ノ時交合則有子多男右ノ如クニスレバ

若二日四日六日又值男女生命

休囚死絕休囚死絶トハ譬ハ木性ノ人ハ戊巳ノ日ガ木

四日ナリ木性ノ人ハ庚辛ノ日ガ火性ノ人ハ壬子ノ日ガ水

土癸ノ日ガ水性ノ人ハ戊己ノ日ガ火性ノ人ハ庚辛ノ日ガ木

推見ヨ死ト云ハ我ガ木性ナレバ戊巳ノ日ニ勝日ヲ死日

ト云我性ガ其日ノ十二勝ヲ云四トハ其日ノ我性ニ

十二勝ヲ云四トハ其日ノ我性ニ

十二勝ヲ云四トハ其日ノ我性ニ

勝ヲ云木ノ人ハ庚辛ノ日カ凶日ナリ陰日ハ辛癸ノ
殘モ是ニテ察セヨ依絶ノ二字ハ修字ナリ陰日ハ
日陰時ノ時ヨリ交合有子多女是日時ニ父ハ
過此之外皆不成胎交合有子多女是日時ニ父ハ
成男法又女子ヲ胎タルト思フ時其女子但懷娠始
三月名曰始胎血脉不流象形而變是時男女未定
故令於未滿三月間服藥方術轉令生男也胎ニ
胎ト云フイニダ血脉ユキワタラザル故ニ象形變ズル
胎キナリ是時ハ男女ノ形モ定ラヌ間服藥方術ノ
手ダテニテ男ニ轉シカユルナリ其法ノ方ノ及ウヘニ
テ人ニ知セズ其女ノ寢ユカノ下ニ置又テ弦ヲ帶ニサ
ベレ其外イロ
イロアリ

胎前產前

人之夫婦猶天地也男ハ陽ニテ陽精ヲ施シ女ハ陰ニ
天地ノ如シ天地之道陰陽和而萬物生焉夫婦之道
陰陽和而男女生焉天地ハ陰陽和合シテ草木萬
子女子故婦人先須調其經而百病不生百病不生
而成孕育經脈調ハ無病然猶當知氣盛血衰則無
孕血盛氣衰乃有孕須以抑氣生血爲先養子ガ肝
要ナルニ因テ氣ヲ抑ヘテ若有胎脾胎ニ一月ヲ胎脾
血ヲ生スルヲ第一トス胎ニ一月ヲ胎脾
ナリ則服安胎順氣之劑胎ヲ安ラカニスル藥氣
及善將

理ソレニ能身以候分免右ノ如クテ産ノ時ノ様子ヲ見ヨトナリ分免ハサ子バナシ
如胎前産後變生諸證皆由不善調攝所致茲詳具
各方干後臨病之際又當對證求藥産ノ前後ニイロハカ子テ産前ニ不養生ナル故ナリ此婦人門ノ奥ニ藥ヲ記レテ置間其時ニ臨テ病ニタイヤスル藥ヲ用ヨ
若外感四氣内傷七情以成諸疾治法則與男子無異當於各類求之産前ニ四氣七情ノ病ハ男トカワルナキ間ソレノ風寒暑濕内傷等ノ病門ヲ考ヘ
但胎前治病損動胎氣之藥尤當避忌テ藥ヲ用ヨ
附子 天雄 烏頭 側子 牛黃 巴豆 大戟 牛漆 藜蘆 薏苡 芒硝 三稜 桃仁 等ナリ

委クハ婦人良方ニ見ヘタリ考フベシ
凡婦人生産畢且令飲童子小便一瓊一不血ノ一セヨ童子ノ小便ハ十二歳以テノ無病ノサレ男子ノ小便ナリ性寒ニシテ瘀血惡物ヲ下モノゾ不
得便臥且宜閉目而坐睡ハ氣耗ル故横ニ寝サズナ
故ニ目ヲ閉須臾方可扶上床仰臥扶上床トハワキヨリサスルナリ
テ寢所ニ宜立膝膝ガレヲ臍ノキワニヨセ 高倚枕頭ツレユクナリ
枕モトヲ高クシテ厚鋪茵褥茵褥ハ 使無賊風吹著スキニ風ナリソレガ 兼右ノ外 時時令人以軟物從心身ニ中ヌヤクニセヨ

擗至臍下使惡露不滯如此者兩三日
時軟ナリ物ニ
テ產婦ノ心ヨリソロト臍ノ下ニテサスリヲロシテ惡露
ノ滯ラヌヤウニセヨカヤウニスルコトニ二三日ナリ
餘常令產婦聞醋炭氣或燒乾漆煙
燒煙ヲ聞スルハ血氣ノ目ニイナキナリ
舊漆器燒之以防血逆迷運之患
聞セテ血上リ目ニスル用心ニセヨ塗物ハ未
漆等ハ用ユカラス水銀ノ氣アル故ナリ
更且食白粥一味不可令大飽逐日漸增之
白粥ニテ後
リ用テ鹽氣ヲ用ユナトナリ是吾朝トハカワレリ粥
毛飽ホト用ユルナトニ隨テ漸クニ多ク食セヨ
時與童子小便一錢飲之或童子小便以好酒和半

殘溫服
童子ノ小便ニ好酒半錢ヲ加ヘタルハ童便ハ三日
過後方可進醇酒并些鹽味
二百ノ後少シ鹽氣ヲ用
ワレリ鹽ハ血分ニ走
及喫爛猪蹄肉
此猪ノ足ノ肉ヲヨ
テ瀝ス故禁ズルカ
或雌雞
此雞ノ血
不可太過
分モ過サヌ
若纔產便與酒恐產母藏府方虛不禁酒
ヤウニ用ユ
力必引血進入四肢致生諸證
是ヨリ產後ノイメメヲ
ナキニ酒ヲ與ハ產母ハ產スル女子ヨロビシテ藏府モ
虛ニ易キ故酒ノ強キ熱性ニヨタヘス藏氣貧クシバ酒
ハ血ヲ引テ四肢方ニ狂ラグル故イロク
或熱酒入
臍蓋起ルナリ
進ハ酒性方々へ打散ラ云フ
腹致昏悶
目ヲ舞
況不善飲者乎
ミシテヤ本ヨリ下戸
ナドナラハナラ大事

ノ事 纔産食肉太早緣藏府方虛恐成泄瀉或變積
滯運ニテ纔ニ間モナキニ肉ヲ食スルハ藏府虛ニテ
滯ナドノ證ニ 亦不可喜怒憂思 氣ヲ耗スナリ 動力太
早 骨節早 恣食生冷 生冷ハ後ニ現ヘタリ 及不避風寒
不避トハ風寒ノ中 或冷水洗濯 冷水ヲ手足ヲ
ス様ニヨゲサルナリ 雖未覺大損滿月之後致病百端 座六身ニ移ル
覺子トモ數月ツモリテノ後癩ノ生スルイロ 或成產後
イロト度ニ起ルグトナリ百端トハ百品イロナリ 諸疾
諸疾ヲ生ズルモ皆是故ナリ 不可虛羸 血虛ニ四體ツ
カレヌヤウ 失於將補便成大患 生アレケレバ大ゴトノ病
ニ養生セヨ

トナ 終身悔而不及 終身一生ナリ一代悔 其產後倘
有諸證不論巨細并有藥可療 巨細ハ大小ナリ大病
法アル ナリ 小病モ皆藥ヲ療
ナリ

奎 小兒論 イトケナキ子ノ總名

蓋小兒初生受胎氣之厚者疾病自少 胎氣ハ胎内ニテ
氣血ヲ受ルイ少キニ因テ病ナリ胎内ニテ 稟賦怯弱者
ニテ氣血ヲ受ルイ厚ケレバ病ハ少キナリ 又藉藥力以扶植元氣 生レ付弱キ者ハ藥ヲカニイカニ
況養護不謹 右ニ云ル如ク小兒ハモロキ者ナルヲレ 或受
驚觸 音高ナル一ニ驚カレ氣ヲ失ス 或飲食過度 食物ヲ
ラツブス一ニフト遇スル 或飲食過度 過スナリ衝冒

寒暑カニヨラ衝冒チウモウハ寒氣カンキニ向ムカフヒ以致モテ變生ヘンセイ諸證シヨシヨ右ノ不養生フナヤシ

ヲ生ナスル調治テウヂ之法ハフ又須察サツ其觀證カンシヨ審之ミ而後投以藥ノチヤクヲモツ

餌略備數方于後エリハクビスフハツノチ觀證カンシヨ面色ハツロ手ノ筋等テノジナドヲ見ルミナリ

載オモテテ考カウニ備ツクルナリ

〔全〕臍風撮口

危フキ證ナリ

小兒初生コエニハツタマヘ一七日イチニシツ内忽患臍風撮口ウチニタマヘサツフサツ十無一活坐視トナレモモイモナカラ

其斃良可憫也シノタマフミヘシ斃ハ死スルナリスベキ手テタテ無クトリマワ

リ誠ニカナマコトニカナ有一法極驗世罕有知者イツキハツナリ去ナカラ一ツ手テシキ一ナリ

法ナリ世間ニ知チ凡患此證ツラキ臍風撮サツフサツ兒齒齲上エシヤウ斷ノ字キリノジ

グキ有アル小泡子如粟米狀コホウシニホソキミツ其子ノ齒キグキニホソキミツ

テ粟ホソヤ米コメ以溫水蘸熟帛裹手指輕擦破ホソ熟帛ホソハ

キヌナリ熟帛ホソヲ湯ユニヒタシ指サノサキヲ包ツク輕カサハトハ手テ

ツミ輕カサヤカニ痛イタヌヤウニ齒ハグキノテキモノノ破ヤレト

即口開便安不用服藥ツクナリ藥ヤクヲ用ヨウズヨキトナリ

〔全〕口瘡重舌

ア儿ヤウナヲ云フ

小兒夜啼要飲乳若口到乳上即啼而不乳者必身コエニハツタマヘ

額微熱カクヒ小兒ノ夜啼乳ヲホシガ凡故ナリ若乳ノキワニ

額微熱カクヒ口ヲヨセテ飲ヌハ身ト額ニ少し熱氣アルナリ

急即刻取燈照口燈ノ光デ口中若無瘡舌胎腫也

舌レトギナラフ子バ隨證施治

夜啼客忤夜啼ハヨチキ客忤ハ見ナレヌ人ヲ

夫小兒胎熱則心躁而喜夜啼小兒ノ胎内ニテ熱ヲ

能夜啼或腹熱啼時有汗而身仰或口舌瘡腫不能

吃乳故夜啼不止也或ハ腹熱シ啼時身ヲ仰クナリ

又故夜啼客忤者見生人氣忤犯而啼也忤ト云ハ

見ナレヌ人ヲ見テヲコロレ氣ニ思テコレヨリヲビエテ啼ナ

急慢驚風急驚風ト慢驚風ナリ急驚風ハ身熱

證ナリ慢驚風ハヒクヌク少ク少シヅラメヅカヒ

驚風有陰陽二證陰證ハ慢驚風ナリ陽證ハ急驚風ナリ

搐搦上視牙關緊硬者陽證也是陽證ナリ即チ急驚

口メクヲ二云上視ハ口ヲ目ツカヒスルナリ

不瀉日漸困面色白脾虛或冷而發驚不其搐搦微

微目上視手足微動者陰證也因トハ驚風ノ病因マシ

又ハ吐シテ瀉セス目バニクタビシ瀉ノ色白ク肺弱テ不

食シ又ハ冷テ扱散馬風ヲ發スレハツヨク搐搦モ微シ

シテ靜カナリ是陰證ニテ慢驚風ナリ陽證急驚風用涼

藥急驚風ハ肝木ノ風邪盛陰證慢驚風用溫藥慢

藥ナル故涼藥ヲ用テ瀉セヨ

風解顱 解顱ハ小兒ノ頭骨ノビクメキ合ヌ 疳病 小兒ノ
ナリ其證 數證大人無之 右ノ五六種ノ病バカク身ニ
イロアリ 數證大人無之 右ノ五六種ノ病バカク身ニ
冒四氣 外題ニ傷風 傷風 傷寒 斑瘡 發斑ノ一ナリ 蚊ノ
出ル後ノ傷寒 瀉利 痢疾 嘔吐 後ノ嘔吐ノ 等證則一但
門ニ述タリ 藥劑大小輕重之不同耳 右ノ疳大ガヲトナト同シ
府弱キ或藥ノ服 諸方前已類編可ニ而得之 傷寒
大人ヨリ小兒ニスル 等ハ大人ト同キ故別ニ小兒門ニ載ヌナリ 前方ニ
ソレニ類シテ編タル處ヲ披テソレノ藥ヲ求メヨ
(七) 疹痘 拔粹方東垣先生試効方論ニ疹ハカ
熱火故也 ト云ニテガ疹明公カ宣明拔粹方ノ論
ナリ其次ノ文ニ小兒瘡疹之由ト云ヨリ終リ

テカ東垣ノ試効方ノ論ナリソレニ因テ
外題ノ下ニ拔粹方試効方ト記セリ
夫小兒瘡疹始之證 赤キ斑出ル故瘡疹ト云ヘリ 必先
見面燥腮赤目胞赤呵欠煩悶乍涼乍熱咳嗽嚏噴
足稍冷多睡驚並瘡疹之證 右ノ證瘡疹ノ由 或生膿
胞或生小紅斑或生瘡疹此三等不同 間ニ有テ蚤ノ
食タル瘡ノヤウナ熱火肺ニ入テ膿胞トナリ 脾
ニ入レハ瘡疹ヲ生シ心ニ入レハ斑疹トナル 蓋諸證皆
太陽寒水起右腎之下煎熬左腎足太陽膀胱寒水
夾脊逆流上頭下額逆手太陽丙火不得傳導逆於
面是壬癸寒水逆尅丙丁熱火故也 此段ハ瘡疹ノ一

太陽寒水上部ノ太陽火ヲ尅スル故面ニ發スト云フ
命門ノ相火ニ引立ラシ左腎ノ水ヲ煎ニ熬ナリ是足ノ
太陽膀胱ノ經ハ頭ヨリ足ニ至ル經ナレドモ相火ニ引立ラ
シ下カラ上ニ升ル故ニ逆流ト云フ是經背ノ面ニ於テハ
サシテ額ニ至ル手ノ太陽小腸ハ心ト表裏ニシテ内ニテハ
小腸ニ戰ヒ逆ス故ニ手ノ太陽ノ内火足ノ太陽寒水ニハ
尅サレテ傳導スルナラス水火面部ニ戰テ疱瘡出ルナリ
灸ト足ノ太陽膀胱ハ腎ト表裏ニシテ水ヲ司トル故ニ
ト云フ小兒瘡疹之由病由ト由來ト皆始生之時啼聲一
發口中所含惡血隨吸而下還於右腎包絡之胞中
是ヨリ東垣ノ試効方ノ論ナリ按粹方ト試効方ト瘡
瘡ノ見タテヲ後ト爰ニ載タリ凡ソ瘡疹ノ根元ハ其子ノ
生ル時口中ニアル惡血啼時引イキニツレテ吞ミ込ナリ
包絡ハ心包絡ナリ右腎モ相火ノヤドル處ナリ胞ハ命

門ナリ右ノ惡血吞ミ込テ相火其瘡之發下焦相火熾
ノヤドル命門ニ引込ナリ
也下焦ノ命門三等之斑膿胞小紅斑皆出於足太
陽寒水之經足ノ太陽膀胱寒水命門ノ相火ニツレテ
外爲大寒内爲二火交攻化血肉爲膿外ハ大寒ニ傷
相火ノ二ツニ互ニ攻ラレテ寒爲發寒邪可令内瀉二火
血肉ガ變ジテ膿トナルゾ又令濕氣上歸本位濕氣ハ足
寒邪ヲ散シテ内ノ君ヲ令濕氣上歸本位濕氣ハ足
相ノ二火ヲ瀉セヨト
本ノ居處ニ歸ナリ是療治ノ手ダテナリ
愈三服ハ一二服ノ書誤ナリ右ノシカケイ
愈ノ藥一二服用ヒテ瘡瘡ハ愈ゾ已後再無二番
瘡出之患損生命者矣
瘡瘡ハ餘ノ病トカワリ一度愈
テ其已後再ヒ出テ生命ヲ損

スル
無
ブ

醫方大成論諺解卷之五終

貞享二年乙丑五月吉辰

二條通大恩寺町

書肆武村新兵衛板行

