





合類衆方規矩卷之二

▲中風

內經曰風之傷人也或為寒熱或

為瘧中或為寒中或為偏枯

入陽經則在入陰經則顛入皮

膚則痒入筋則攣急入骨節則

疼痛入肉分與衛氣相搏則不

仁與榮氣相搏則半身不遂入

經癱瘓入絡層頑入腑即不識

久入臟即舌強吐沫挾熱則痿

緩挾寒則拘攣挾濕則腫滿

夫中風百病古今諸醫所見不同

古人論中風也河澗論中風

火也東垣論中風氣也丹溪論



中風濕也風火氣濕四者立說
以賢論之總之一虛而已何也
良由素失調護或五味之有傷
或七情之惑甚或嗜慾之無節
或勞役之過極以致臟腑虧損
風邪乘虛卒中者風也陰精枯
竭水衰火盛而昏冒者火也元
陽耗散不任風寒故昏冒者
也氣血衰憊中氣不運而生濕
々生痰濕痰壅盛而昏冒者濕
也以上四者而歸之一虛可謂
明矣賢者考諸明醫論曰所謂
外中風邪者亦未必不由元精
虛弱榮衛失調而後感之也所

謂因火因氣因濕亦未必絕無
外邪侵侮而作焉誠確論也

脈經曰微而數中風使然○寸
口沉大而滑沉則為實滑則為氣
氣實相搏入於臟則死入於腑則
愈此為卒厥不知入唇青身冷為
入臟死身溫和汗自出為入腑而
復自愈○脈陽浮而滑陰濡而弱
或浮而滑或沉而滑或微而虛或
微數寸口或浮而緩或緩而遲皆
為中風之證大法浮遲者吉急疾
者凶又曰脈浮而遲者易治大數而
急者死

八味順氣散

治中風先服此

藥以順其氣次用治風之藥

加苓 童芷 陳葵

參 各二カサ

右煎服○或加星密以攻痰氣○

或痰盛加守 姜片○氣厥者與

中風相似何以別之風中身温氣

中身冷先以此湯

按有四君子湯補脾胃中氣藥

也並去手陽明經風禁通腎胃

間氣陳理肺氣童泄肝氣若風

在手陽明而肝肺腎胃之氣實

者專可用之○卒倒不知人事

痰涎壅盛癱瘓不仁舌強不語

與此湯間求驗○卒中風醒後

七氣拂鬱而手足厥或癱瘓痺

痛者亦間得奇效○或語云一

切鬱病氣弱者妙也又云諸病

共有少眩暈者用之○一方去

冬陳加定泉水瓜○老人加餘

芎斤蒨

烏藥順氣散

治卒中風手足

不遂言語蹇澁四肢骨節疼痛肩

膊麻痛筋脉拘攣及脚氣步履難

辛婦人血風老人冷氣

麻 禁 陳 芎 蚕 芷

枳 桔 各一カサ 永 炮 甘 各半

右入姜棗煎服○寒熱頭痛加葱

白 身軀不能屈伸為末温酒調

下○瘙痒扒之成瘡薄苛煎湯調

下○中風一身俱麻加參伽芥門

○久癱瘓去麻加定芸羌守星蜜

介○口眼喎斜加連羌芸荊瀝姜

汁○遍身痛加芥官乳沒○臂痛

加羌芸官苓蘇○背心痛合行氣

香蘇散加蒼守苓○脚膝浮腫加

膝搖佳○腰痛加膝仲苗○眼眩

加細茶○四肢冷痺加附官○婦

人血風加芸荊○胸膈脹滿加

實我○虛汗去麻加芪○潮熱去

承加琴○二三年不能行合獨活

寄生湯○拘攣加瓜解○濕氣加

蒼伽栝○心腹刺痛加苗○手足

不能起床加續歲○陰積浮腫合

五積散○臂痛因風者或乳婦以

臂枕兒傷於風寒而致臂痛者宜

此湯○白虎歷節走注骨節疼痛

加瓜沒方○四肢冷痛加附官

按卒中風先用八味順氣散六

七貼以順正氣次與此湯以可

順表氣○中風口眼喎斜或肩

膊及背麻痺不仁或脚膝痿弱

或言語蹇澁皆宜此湯○臂痛

冷起手甚艱五積散合九文湯

味効則此湯加羌瓜而安○乳

婦以臂枕兒則其臂麻痺不仁

疼痛若因風者宜此湯若因寒

者宜五積散

防風通聖散

治中風一切風

熱大便閉結小便赤澀頭面生瘡
眼目赤痛或熱極生風舌強口噤
或鼻生紫赤風刺癢疹而為肺風
或為風厲而世呼為大風或腸風
而為痔漏或腸鬱而為諸熱譫妄
驚狂在血皆治之

芩 芍 芥 羌 羌 羌
翹 芎 麻 荆 伽 丹 各
兩 膏 桔 苓 各 一 滑 三 兩

一方去芩加膝參守

右入姜煎○自利去芩虎○自汗

去麻○飲酒中風身熱頭痛如破

加葱白○咳嗽喘急加守桔苑○

耳鳴因酒過加柴枳桔童星荆○

癩疹通治如身疼加蒼朮○痰嗽

加守○一切大風癩狂加嬰牡牡

○兩耳聾者厚味動胃火加酒煨

虎○膽移熱於腦則辛頰鼻淵加

苛連○頭頂偏腫連一目如半盞

其脈洪大此風乘陽明經氣血俱

多風腫去芒虎加姜葱豉煎服取

汗以草莖刺鼻中出血其腫立消

○治風熱瘡疥癩久不愈○瘧頭

瘡用本方為末酒浸焙乾凡三次

食後白湯調服日三服至頭有汗

効○小兒身常發熱風斑及脚指

紅腫去芒虎加力連為末服

按此方雖古法用表裡客熱三

焦實火而其實火用黃連解毒

湯腸胃實熱用大承氣湯風熱

症專用此湯○或語云春每專

用通聖散秋冬專用五積散是

乃時令表裡之方也○狂乱症

解毒湯不効則用此湯此湯若

不効則備急圓可也○打撲者

倍斤虎加紅沒○疥癬楊梅癩

瘡良久者用此湯間有驗○小

兒諸風潮搐急慢驚風大便閉

結邪熱暴甚腸胃乾澀寢汗咬

牙目睛上竄睡語不安傳筋驚

悸肌肉蠕動每一兩加虎骨錢丹

錢調苓末錢○肌肉蠕動者調

羌活末一錢經曰肌肉蠕動命

曰微風○癰疽惡瘡腫毒本方

一兩倍堯斤加連匿菴參密壳

銀牡各半兩名膝黃飲子如瘡

在上加沂○發班熱本方一兩

加連錢○痢後鶴膝風良驗

小續命湯 治卒暴中風不省人

事半身不遂口眼喎斜手足顛掉

語言蹇澀肢麻痺精神昏乱頭

目眩暈痰涎壅盛筋脈拘攣不得

轉側及脚氣緩弱不能動履屈伸

諸風服之皆驗東垣曰中風自汗

者不可重發其汗故此藥亦不可輕用也

共半 麻 離 桂 苓 杏

芍 芩 參 附 車 各半

右入姜棗煎服○精神恍惚加神

速○骨節痛有熱倍芍去附○心

煩驚悸加犀○骨節痛有寒濕倍

加佳附○嘔逆腹脹倍參加守○

燥悶大便澁去附倍芍入瀝○臍

寒下痢去離苓倍附加木○自汗

去麻杏加木○脚膝弱加膝解○

身疼加羌○腰痛加嬰仲○失音

倍杏○中風無汗惡寒加倍麻共

杏○中風有汗惡風倍加枝芍杏

○中風身熱無汗不惡寒加雷膏

去附○中風身熱有汗惡風加葛

官苓○中風無汗身涼倍加附加

家○中風有汗無熱倍加桂附其

○中風肢節攣痛不仁加羌翹○

治剛柔二瘥之通用也○產後中

風脚氣最為要藥然手足搖擻者

當去附

按不可用多汗者大抵身冷或

四肢厥冷而拘急不仁者宜○

一婦二十餘歲產後二十有奇

日腰足冷腹痛甚膝屈不伸脉

沉遲加附得奇妙

大秦朮湯 治中風手足不遂舌

強不能言用之養血則筋自榮

丸 羌 推 芸 芷 伽

膏 苓 蛇 芥 芍 各二

苓 芎 細 茸 各半

右煎服 ○天陰兩加生薑 ○春夏

加雷 ○心下痞滿加實 ○治

血弱陰虛不能養筋燥而手足

不能運動指爪乾燥屬風熱甚者

按此方榮血養筋故脉浮大數

而四肢麻木肌肉痠動則三歲

內當發中風是其為養生專用

也若脉微細者回春養榮湯可

也 ○俄手足痿腰不立舌軟不

能言者不分左右專用之也

加減除濕湯 治右半身不遂手

足癱瘓筋骨疼痛

加 二 分 苓 斤 赤 芍 陳

守 茶 連 濟 葵 枳

羌 各 一 分 參 芎 桔 芸

廿 分 各 八

右入姜煎服 ○身痛加姜黃 ○足

痛加膝離散

按治氣虛與濕痰兼以久手足

癱瘓者也予連年試此方一應

癱瘓不相應矣久字專要也次

方亦然

加減潤燥湯 治左半身不遂手

足癱瘓呵欠嚏噴口眼喎斜頭目

眩暈痰火熾盛筋骨時痛頭痛心
悸

湯 各一斤二分
守 定 各一分
陳 壘 地 芩 酸
各六分
膝 各八分
嬰 芸 桂

右水煎入瀝姜汁服○牛不遂倍
加芩桂○足不遂倍加栢膝

梅治因血虛與瘀血而久手足
癱瘓者也若久左右手足皆癱
瘓者血氣兩虛宜十全大補湯

八 勻氣散 治腰腿疼手足不能屈
伸半身不遂口眼喎斜風氣中風

中氣用風藥而十無一愈即服之
見効

加 不 參 定 各一分
童 茸 各五分
右入姜棗煎服○心脾疼加芩守
陳 蜜 卷 各一分
入姜煎服半日

按中風症風藥不効則此湯合
二陳湯數得奇効又腰腿痛者
亦得尚可有加減消息

九 攝生飲 治一切卒中不論中風
中寒中暑中濕及痰厥氣厥之類
不省人事者初作只用此方

蒼 生 苜 細 甘 一 各

守 各一 星 各二

右入姜煎服 ○痰盛加蝎

按治一切卒中不省人事者宜
之服後人事稍醒氣味盡順痰
味盡消惟當以藿香正氣散加
蜜星以甦痰氣調理最穩或服
加味順氣散亦可也

五論湯 治中風諸病之總司也

參 五 分 木 苓 芍 芎 藁 朮 地
連 蘇 合 八 陳 星 朮 桂 枳 芍 芎 藁 朮 地
右水煎臨服入竹瀝姜汁一二茶
匙清且時溫服 ○左癱加凡嬰紅

○右痰加菝蜜烏 ○或左足癱或

右足癱加膝瓜薏 ○痰迷心竅舌
強不能言加萹菖藁門實 ○口眼
喎斜加芷蚕 ○痰涎熾盛加萹實
○肢體頑麻加烏蚕苟桂 ○筋骨
疼痛加乳沒桂 ○頭目眩暈頭痛
加芷蔓本 ○手足拘攣加皂木

貝母瓜蒌湯 治肥人中風口喎

麻木左右俱作痰用之
貝 星 芥 芸 羌
栝 連 伽 貴 桂
葳 守 花 茸 各 等
右入姜水煎至夜服 ○因痰加附
瀝 針 酒 匙

按此方治中風口眼喎斜者調
理之劑

三十

愈風湯

治一切風症卒中初中

中腑中臟及藏府俱中已上數者
先宜本病藥治之後用此方調理

參 加 一 錢 分 苓 貴 守 各 一

斤 二 錢 分 芍 二 錢 分 洞 芸 卷 各 七

右入姜棗水煎臨臥入瀝姜汁磨

蜜調服

按中風症內邪已除外邪已盡
當服此藥以行導諸經

加味大補湯 治左右手足皆癱

瘳

三十

栝 參 加 苓 斤 芍

芍 芎 泉 附 蜜 各 三

雙 倍 杜 瓜 芸 卷

推 薏 各 五 桂 耳 各 三

右入姜棗煎服

按左右手足皆癱瘳者此血氣

之大虛也宜用此方

類中風

類中風者則常有之中寒中暑

中濕中火中氣食厥勞傷房勞痰

厥血運中惡卒死等症皆類中風

者甚多各有治法不可作風治而

用風藥誤之甚矣

附子理中湯 治中寒厥倒

四十

卷二

附 永 吳 桂 參 斤
貴 朴 伽 母 灸

右入姜棗水煎服○冬月來中寒
氣昏冒口噤肢亦惡寒或口吐涎
沫重則四肢強直則先用此湯若
不急治則舌強囊縮而死矣

十味香薷飲 治夏月率暴炎暑
昏冒痿厥 於見于中暑

木香順氣散 治中氣運倒

蜜 砂 各五分 蘇 莎 童 貴
守 朴 奴 錢 桂 永 車

右姜水煎○氣不轉者加泉蘇
子

按此方由七情過極氣厥昏冒
或牙關緊急者運用之或宜藿
香正氣散

加味二陳湯 治痰運倒

貴 守 苓 斤 洞 利
杏 良 砂 各七分 蜜 桂

右入姜棗煎○氣逆加蘇○元氣
虛弱去洞

按此方因內虛受寒痰氣阻塞
手足厥冷麻痺眩暈欲倒脉沉
細者宜此湯

加味四物湯 治血虛眩暈卒倒
不可艾灸驚哭叫動則乘虛而

死矣

斤 芍 芍 芍 地 井 堪

參 加 貴 苓 芥 茸

右棗 柯烏 節水煎 飽悶加 蘇砂

去棧伽

按此方因平日去血過多歷而

成血運脈微瀉者宜此湯

加味六君子湯 食厥者過於飲

食胃氣自傷不能運化故昏胃宜

此湯

參 分 加 苓 貴 守 各 一

右入 姜 桂 棗 柯 水煎 又 宜 行 氣

香蘇散加蜜童查 方見傷寒

凡中卒倒口噤不能言目不識

入四肢不舉等症多者飲食過

度變為異常必須審問

補中益氣湯 治氣虛

按過於勞役耗損元氣脾胃虛

衰不任風寒故昏胃宜用之

調氣散 治卒中暴厥

多 嬌 檀 蜜 藿 其

右水煎每服二錢入鹽少許沸湯

點服

按因犯不正之氣忽然手足厥

冷肌層栗起頭面青黑精神不

守錯言妄語牙緊口噤昏不知

久頭旋暈倒此中惡卒厥容忤
飛尸鬼擊吊死問喪入廟登塚
多有此病也宜此湯

傷寒

夫傷寒者冬時天氣嚴寒水冰地凍而成殺厲之氣射虛之人觸犯之者中而即病名曰正傷寒不即病者乃寒邪藏於肌層之間伏於榮衛之內至春月發之氣所發者名曰溫病至夏因暑氣作

者名曰熱病
總曰傷寒所發之時既異其氣亦可混也若言四時俱是正傷寒者非也

脈脈陽浮而陰弱謂之傷寒
脈浮而無汗謂之傷寒
脈長身熱鼻乾目疼不得臥病在陽明
脈弦胸脇痛耳聾往來寒熱病在少陽
脈沉細咽乾腹滿自利病在大陰
脈微緩口燥舌乾而渴病在少陰
脈沉瀉煩滿囊縮病在厥陰
脈陰陽俱盛重感於寒而緊瀉變為濕瘧前熱後寒之脈也
於寒脈陽浮而滑陰濡而弱更遇於風變為風濕濡弱也

前脈起陽風 ○脈陽洪數陰實大
木無熱池 ○脈陽洪數陰實大
太過溫熱兩合為溫毒 ○脈陽洪數陰實大
氣變為瘟疫 ○病發熱脈沉細表
得太陽名曰痙病 ○病太陽關節
疼痛而煩脈沉細名曰濕痺 ○病
太陽身熱疼痛脈微弱弦花名曰
中暈 ○若發汗已身灼然熱名曰
風濕 ○若發汗已身灼然熱名曰
不更則其痛時痙痲痲如蠶
死 ○脈沉細而疾身涼四肢冷煩
躁不欲飲水狂悶名曰陽厥傷寒
熱盛脈浮大者生沉小者死 ○
生者死

木豆蘇散 治四時傷寒感冒頭痛
發熱惡寒及內外兩感之證 ○
宜用之探病

蘇 蘇合 陳 轉 半
右入姜葱水煎服 ○頭痛加芩芷
名苦芷香蘇散專治氣虛頭痛 ○
頭如劈痛加膏葱 ○偏正頭風加
細苛膏 ○太陽穴痛加靜膏傷風
自汗加枝傷風無汗加麻葛 ○惡
寒加蒼 ○發熱加柴芩 ○寒慄加
枝 ○虛熱不退加參 ○潮熱加參
芩 ○咳嗽加桔會 ○咳嗽不止加
守杏 ○鼻塞聲重咽膈不和加桔
○胸膈痞塞加枳守 ○氣促不安

加腹聚○嘔吐惡心不止加喬守
○飲食不化加砂童○腰痛不能
屈伸加官嬰○腹肚痛加蜜○脾
寒加良童菓○水瀉即脾泄加藿
衍○瘧疾加菓○瘧痢加枳連去
耳○久瀉加蜜訶○身疼加芍官
○心氣痛加索禁面○感風寒發
熱頭疼合不換金正氣散○感寒
頭痛壯熱惡寒身痛不能轉動合
五積散或合敗毒散○風濕脚氣
加栝瓜○各一踈通氣道名之櫛蘇
散○春夏氣溢腫而痛加五加瓜
栝鈴○濕氣周遊胸膝痛加忍蜜
芍○疝氣偏墜疼痛初發增寒壯

熱甚効加苗蜜稜莪通○內傷飲
食外感風寒夾食夾氣胸膈脹滿
肚腹疼痛頭痛身痛發熱加發膏
麻枳羌名行氣香蘇散因濕又加
蒼外感風寒又入姜葱內傷飲食
又加查曲○小兒傷寒夾食夾驚
四時瘟疫瘧疾加童葛名香葛散
○婦人一切氣作痛或上癩心胸
或攻築脇肋腹中結塊發渴刺痛
月水因之不調或眩暈嘔吐往來
寒熱無間胎前產後並皆治之加
發膏 水炒煎服謂之正氣天香
湯

按此方散氣快氣之劑故耳鳴

頭昏胃或頭痛眩暈或咳嗽痰
 熱往來或瘧寒多熱少或內寒
 外熱或寒熱相半或骨節痠痛
 臍腹作痛或水腫上氣喘嗽面
 目浮腫或浴溫泉中風氣逆上
 而面赤頭痛等皆治之○過酒
 之人其酒毒支胸或嘔或吞酸
 加喬衍○若治酒積加棗姜鹽
 或曲礞喬○脚氣不腫而痛者
 氣痛也加楸瓜○小兒痘疹未
 成加升葛○婦人足冷上氣或
 姪婦四五箇月而腰下浮腫皆
 與本方得奇驗○鼠咬而發熱
 腫痛加連芥丹

一人頭痛咽乾或胸腹脇痛不
 正合升麻葛根湯取驗今來治
 數百人故名之香葛散

參蘇飲 治四時感冒發熱頭痛
 咳嗽停飲中脘痞滿嘔吐痰水寬
 中快膈不致傷脾一切發熱及內
 傷外感諸般咳嗽痰喘或欲成勞
 瘵並治

陳 苓 各 一 匙 守 圖 西
 齊 各 一 匙 枳 分 五 參 蜜 糖 味
 右入姜棗水煎服○初咳嗽加桑
 杏○久嗽加會梅○口乾加門瑞
 ○嘔逆加藿礞○脾泄加蓮扁伽

頭疼加芎細○若感冒惡寒無汗
咳嗽喘促傷風無汗鼻塞聲重咳
嗽加麻杏○肺多有熱加杏苓
桑梅○肺寒咳嗽加會承○心下
痞悶或胸煩熱或停酒不散或膈
雜惡心加連實倍用葛陳○胸滿
痰多加薑○氣促喘嗽加雷貝○
衄血加梅門芩○心盛發熱加柴
苓○咳嗽吐血加升牡牡○勞熱
咳嗽久不愈加雷貝門○妊娠傷
寒去守加菘○陰虛痰嗽或吐血
合四物湯名茯苓補心湯○痘疹
但覺身熱似傷寒疑似未明宜用
之○痘疹久寒甚初見紅斑不能

發起者亦用之

按四時咳嗽風痰胸痛宜用之
不傷脾胃進飲食煩氣殊感冒
發散之方也常去參蜜而用何
者參入乎大陰肺經為火見雜
著心盛者去蜜見必用故新病
去一味加苓柴可退內外熱也
雖然久病衛氣虛則加參宜須
氣也心氣弱則加蜜宜達氣也
○表熱甚加蜜則間有斑出故
他家必去蜜也○傷寒七八日
熱入裏妄語口乾脈數雖與解
毒涼膈等而無驗故此方加苓
連而與則表裏熱退便通而愈

○衄血七日面赤他療無驗予

診脈浮數故加芩蜜側冷而五

貼全安○瘧疾患於途熱多

寒少兼咳故加芩差得奇効

○喘促痰盛喉中如水難加杏

會○勞嗽無汗潮熱五心煩熱

加錄○小兒有痰嗽而驚風初

發可也虛弱加參或感冒發熱

頭痛痰嗽喘促痞悶專用之

男三十餘歲咳痰泄瀉晝夜

四五行口乾胸苦肌熱去守枳

如黃加而取驗

茯苓補心湯 治男婦血虛無汗

潮熱咳嗽無顏色或心虛為邪氣

所傷吐血或心氣虛而黃痺血虛

潮熱五心煩熱無汗欬嗽吐血或

日婦人心胸膈雜或婦女經水不

調吐血咳嗽發熱口乾喘急胸膈

痞悶嘔吐痰水或婦人亡血過多

或氣逆心悶月水不調或女子血

虛有汗潮熱者亦宜用之

按血虛而胸跳或咳嗽怔忡

嗽吐血或虛勞潮熱或勞熱如

瘧或心氣不足面黃肌瘦五心

煩熱或咳嗽唾血或有汗怔忡

或嗜雜或周身血斑此諸症或

產後失血眩暈或婦人惡阻或

小產可也

藿香正氣散 治四時不正之氣
寒疫時氣山嵐瘴氣雨濕蒸氣或
中寒腹痛吐利中暑冒風吐瀉中
溫身重泄瀉或不伏水土脾胃不
和或飲食停滯嘔逆惡心胸膈痞
悶或頭疼疹增寒發熱無汗者

藿錢陳 加 朴 守 圖 各
錢 腹 麩 芷 苓 各 一 錢 半
右入姜棗水煎服○霍亂轉筋加

瓜○腹痛加芍○寒痛加官○冷
甚加承○飲食不化心下痞悶加
薄荷○米穀不化加曲芽○肉食
不化加查○心下痞加洞童○中
暗冒風加藳扁○時氣憎寒發熱

如柴葛○發熱加門竹葉○口渴
小便利合五苓散○心腹絞痛

加木○若頻欲登園不通加枳○
寒濕相搏霍亂轉筋煖湯辟亂合

連蒂散名之二香散○感風寒內
傷飲食霍亂轉筋吐瀉合五苓散

轉筋不止男以手挽其陰女以手
牽其乳此千金妙法○夏時受涼

傷外又飲食生冷傷內頭痛身熱
惡寒或腹痛吐瀉若外感重去加

加蒼蒼若內傷重加宿曲○林日
尸厥飛尸卒厥此即中惡之候因
胃犯不正之氣忽然手足冷肌膚
栗起頭面青黑精神不守或鑄言

妄語牙緊昏不知人頭旋暈倒此
是卒厥客忤鬼擊吊死及入廟登
塚多有此疾以蘇合香丸灌之俟
甦以藿香正氣散加蜜星房驗
按霍亂主方兼內外有譽也殊
治山嵐瘴氣之第一也○霍亂
嘔逆去止加守姜汁最靈吐
瀉腹痛者必用之○夏月泄瀉
或傷食濕瀉俱以兼腹痛者亦
宜○七情過極逆氣運倒此名
中氣亦宜○渾身極急憎寒喘
嗽頭目昏重加玄杏梅得奇
効○出遠方治心腹脹滿此方
專調榮衛利三焦行痞滯消膨

脹○腸胃受濕下血不止加連
梅有奇効○瘧疾初發無汗用
之則必發汗而愈○傷寒感冒
頭痛發熱而無汗亦可也○寢
間風入於口鼻中大陰則咽痛
多此方主之○飲酒而傷風發
熱或吐逆亦宜

人參敗毒散 治瘟疫四時通用
卷推柴 西 枳 芎

右入姜水煎服此藥治傷寒瘟疫
時行風濕風眩四肢痛憎寒壯熱
項強睛疼不問老人小兒皆可服
或嶺南煙瘴或卑濕之地脚氣痿

弱此藥不可缺 衆人病一般者加
 葛為妙 ○傷寒頭疼身痛頂強壯
 熱惡寒口乾心中蘊熱加芩 ○傷
 風鼻塞聲重咳嗽吐痰加守杏 ○
 頭目眩暈屈風熱加守定 ○眼目
 腫痛因風寒所感加芸荆歸尾赤
 芍去參苓 ○酒毒發熱作渴加葛
 連 ○瘧疾不問先寒後熱先熱後
 寒頭疼身痛加蒼葛果枳 ○風熱
 濕毒腰痛加續定苛瓜 ○風熱入
 大腸下血不止加桑奇梅姜兼有
 衄血加閉若因酒毒加連 ○足三
 陽經受熱毒氣流注脚踝上微赤
 腫痛寒熱如瘧自汗惡風或無汗

惡寒加蒼 ○皮膚癢痒加蟬 ○熱
 而紅腫加瓜蒼 ○大便實加虎 ○
 風熱上壅咽喉窒塞或痛或不刺
 生瘡或如肉齒痛妨悶加芩守翹
 倍加桔時行瘟疫下利赤白發熱
 口乾身痛加倉米連姜麥名倉廩
 散 ○噤口痢加倉米蓮 ○痢後手
 足痛加瓜扶 ○臂痛冷起手甚難
 逐合五積散名交加散加瓜膝姜
 棗 ○諸般瘡毒腫痛或癰疽疔腫
 發背乳癰腫瘡等憎寒壯熱甚者
 頭痛拘急似傷寒加荆芸翹忍去
 參名荆防敗毒散 ○身生瘡膿血
 腫腫極痛且痒或風熱積毒發於

面頭手足如胭脂色加葛赤芍升
定蟬奇門地石平血飲○小兒急
驚風初起發熱手足搐搦上竄天
吊角弓反張並一切感冒及瘡疹
欲出發搐加定全蝎蚕附錄○痘
疹疑似三日發熱加芸荊定錄去
參苓

按病人氣實者去參若氣弱難
運藥力者加參○四時不正瘟
疫熱毒鼻塞聲重頭面腫痛加
參奇姜○頭痛甚者加靜○如
心經蘊熱口舌乾燥加參○傷
寒頭痛發熱惡寒半表重半裡
輕者宜用之則宜小柴胡○無

名腫物赤而痛所有發熱世俗
謂之風毒腫若熱甚加參可也
在上宜外麻葛○外科腫物貼
藥故毒氣不出而周身浮腫者
宜用此湯○一鄉患痢世俗謂
之腹疫病加粳蓮○熱痢與河
行則雖痢止而熱不退此湯加
三黃或芩宜解散其藥毒○陽
風下血及近血亦得驗○風眼
目赤多血者用之若甚腫痛加
三黃或芩連亦可○下湯風呂
等風中浮血故赤斑出甚痒加
斤苛或伽芸荊蒼芍地亦宜傳
謂之加味敗毒散此方宜用應

疹○痛風因風濕者百節痛者
脚氣痛處煩熱者俱得奇効○
瘡氣有內難發出與此湯則悉
發出又因加減內消亦可○大
頭癰病頂面腫及咽痛加力連
○小兒急驚風加白附蚕○小
兒啼則口眼喎斜頤少腫與此
湯得數奇○痘疹序病甚發熱
與升麻葛根湯其熱不去故此
湯加柴草有奇効○一人冬月
患痢無熱腹痛與芍藥湯不効
故慮感風濕為痢與此湯得奇
妙○或曰鼠咬加貝○凡欲與
此湯者先試口氣熱或骨節痛

而可也

本方加升芍為地加芸假精名祖
傳敗毒散治班疹○去枯芍參
加芸芥升葛赤芍並力名加減
敗毒散治天行癘疫頭面腫盛
咽喉不利舌乾口燥憎寒壯熱
時氣流傳
愚按謂病人氣實者去參者此
偏見也人參敗毒散去人參是
古人名方之意似相乖矣可考
嘉言父醫門法律
升麻葛根湯 治傷寒頭痛時疫
憎寒壯熱肢體痛發熱惡寒鼻乾
不得眠兼治寒眩不時人多病疫

作煖脫衣及瘡疹已發未發疑似之間宜服

葛 芩 芍 各二

右入姜煎服○頭痛加葱○咳嗽

加桑○上膈熱加芩芻○無汗加

麻○咽痛加桔耳○發黃丹毒加

芫○癩疹者紅點如蚤噬之狀宜

此湯○小兒傷風身熱頭頂強自

汗表不和加芩○瘡疹一見苗不

可服慎之○冬月加蘇八○四肢

厥冷加枝○腰痛當知是痘

加枝○時氣發熱太甚乃毒

氣盛加力○按治癰疹最上方也○八九年

已前六七月間天下人民多患

紅斑摩之則當手不痛不痒頭

痛發熱惡寒合麩腹散二三貼

而皆愈介以來逢此證則立得

奇効矣○當世人多患小瘡甚

痒故合麩腹散而與之則俄沒

然發痰喘心腹強須臾而死矣

遇與不遇勿履履輒

表熱加薑○內熱加黃芩○熱

甚加施連或加翹花○大便硬

加枳壳○頭痛加芩○身痛加

羌○胸膈痞悶加利○咳嗽加

杏○有痰加守○發斑加芫如

老人去芩加柴苓參

不換金正氣散 治四時傷寒瘟疫時氣山嵐瘴氣寒熱往來霍亂吐瀉下痢赤白若出遠方不伏水土者宜常服之

蒼 朴 陳 宇 藿 轉

右入姜棗煎服○頭痛加芎芷○

感寒腹痛加姜官○潮熱加柴芩

○嘔逆加喬砂○口燥心煩加柴

葛○氣塊加稜枳枳實○冷瀉不

正加木訶衍○熱極大便不通加

虎芒○瘧疾加恒枳果○腹脹加

蒞枳多○痢疾加連枳去耳○胸

膈脹滿加實破莪○咳嗽加桔杏

會喘急加麻軾桑○兩足浮腫

加瓜腹佳○身體痛加麻枝赤芍

○濕症聲啞加薑○寒症聲啞加

管○腸胃受濕下血不止加連梅

○小兒感冒風濕頭目昏重時發

壯熱宜此湯○傷濕重著骨節疼

痛酒漸咳嗽加瓜

按平胃散加藿守之方也是乃

辟瘴之劑故遊官四方水土不

伏或旅途中可服未病之先也

○伊勢參宮後瀉痢帶血腹痛

心張加涂冷蜜枳○旅後憎寒

發熱上吐下瀉兩腿痺四肢末

冷無汗口渴去守其加葛喬砂

承○四十餘日下血不止加芍

苓連五貼而愈○新久諸瘧加
柴苓黃芩澤枳果梅

回春加薤破名加減正氣散○
瀉加伽黃烏炒米○腹痛加蜜

苗○飽悶加益腹○發腫氣喘
加軾雪翁猪腰去耳○小木短

赤加翁猪梳米去守其○內寒
手足冷脉沉細加永桂

十神湯時令不正瘟疫妄行或
感冒發熱憎寒頭痛身痛無汗或

欲出疹此藥不問陰陽兩感並治
之

麻葛周芎赤芍
陳芷車

右入姜煎服○發熱頭痛加葱○
中滿氣實加桔○心腹脹滿加實

守○潮熱加芩門○咳嗽喘急加
桑桔守○大便閉加虎芒○嘔吐

加霍守○泄瀉加木苓○瘧疾加
果枳○痢病加枳連○腹痛加芍

○發熱頭痛加細膏○飲食不進
加砂多○嘔逆加喬果○衄血不

正加梅葛○疹毒加官參苓
按此方芎芷香蘇散合升葛湯

加麻故專要在麻黃一味矣○
感冒風寒者發熱惡寒咳嗽頭

痛甚而無汗者宜此湯○傷寒
否熱久不退且汗不出口乾頭

痛是斑可出之證即與此湯開
斑出而熱退也是乃醫術有功
者所為矣予蚤歲頃凡一病人
共證肌熱久不退且無汗口乾
頭痛故與參白虎湯則一二貼
而死天刑難逃者也○東井療
婦人頂筋強急而脹去麻加
蒼得奇妙亦以來有數奇

小柴胡湯 治傷寒四五日往來
寒熱胸滿脇痛心煩嘔吐頭疼耳
聾大便秘澀此在半表半裏也

柴半 參 苓 各一 守 八 耳 五
右入姜棗煎服○小便難潮熱腹
滿加苓 下後陰虛生熱脈微

惡寒去芍加芍 腹痛亦然○嘔

而發熱胸脇滿小便不利去芍加

苓 飲水過多成水結胸去

棗加芍 往來寒熱咳嗽胸

脇痛去參棗加會水 渴甚

去芍加參 身熱不渴去

參加枳 心中飽滿加枳桔○

心下痞滿加連實○夜靜而晝發

熱者熱在氣分加丹連雷錄○晝

夜發熱者熱在氣血之分合四物

湯加連丹○下利身熱按外感者

必惡寒發熱煩渴身首俱病此有

表去參棗加蒼芍陳赤芍姜得微

汗愈○傷寒陽症效逆潮熱加陳

如姜○伏暑發熱汗渴暑入心胞

不語加苓○瘧熱多寒少或單熱

頭痛胸滿咽乾宜此湯去守如參

括○瘧發寒熱作渴病在表裡陰

陽不分者合五苓散名柴苓湯○

無汗加麻○有汗加散○寒多加

官○熱多加苓○口酸而苦者肝

膽有實熱加游童耳○如膽熱而

口苦者諫愚不決也去苓加酸錄

遠○由醉飽房勞而後大怒觸動

榮血致吐血者加二門○灸後發

熱煩悶加龍骨牡蛎○產後惡露

下忽然斷絕寒熱往來晝靜暮劇

語言狂亂如有鬼神此熱入血室

而顛狂加地○產後虛羸寒熱飲

食少腹脹加陳芎芍姜棗○小兒

感寒發熱或作瘧宜此湯○痘疹

出不快身熱甚者加地○傷寒百

合病加雷百合如梗○本方去參

茸加芍鹿○實不入姜棗煎服

名之大柴胡湯治傷寒十餘日不

解大便不通身熱煩燥譫言妄語

此乃攻裡劑故以利為度如身體

疼痛者表證未解不可服之○倍

加芍鹿名數和湯治腹痛大便結

小便澀喜飲冷以手按之痛轉甚

不可近或兩手熱腹脾熱

按大柴胡散和宜實證不宜虛

證小柴胡傷寒和解之劑也○

夏月發熱煩渴小水不利兼傷

寒陰陽不分疑似之間者去守

加門會連○下劑赤白腹痛身

熱加芩芍○如兼惡寒亦得○

熱嗽啜冷水而暫止者加桑杏

煩熱加門○嗜臥減食加木○

效而寒熱往來去參加會永○

寒熱不調作腹痛去芩加芍○

依耳聾而頭昏胃合香蘇散百

發百中○後發熱煩悶加連

丹得奇效○陰囊濕痒加蒺藜

此乃通肝經故也○男婦口苦

兩脇脹或痛加連丹○大飢發

熱大食傷胃已成黃疸其候食

則腹滿眩暈或心中懣鬱不安

加實朴丹○婦人傷寒經水通

來適斷發熱惡寒夜則譫語此

為熱入血室故寒熱如瘧宜此

湯○小壯之人發熱惡寒入夜

護語亦宜

本方加丹王名加味小柴胡湯

又本方加貴餘芎名陶氏小柴

胡湯○又尋常感冒用此等分

名和解湯○加黑豆一撮名火

邪湯而治火邪諸症○傷寒日

久不解者熱必傷血攻表惡寒

發熱而裡味實者加桂○胸中

煩而不嘔去守加參括○腹痛
加童○痰盛或喘加雪烏○熱
盛錯語不眠加丹連栢○少陽
陽明合病口燥目疼加餘葛○
自汗惡熱譫語煩渴去守合白
虎湯○自汗惡風腹痛或寒多
熱少脈弱去守合桂枝湯○血
虛發夜熱合四物湯○去芍
加門○舌乾口燥去守加花或
勤○脈弦虛無力先因房勞
遺感寒或病後血氣未固以致
咳嗽吐痰晝輕夜重發熱不止
合四物湯去芍加門雷栢○脈
弦虛無力或浮散發熱煩燥口

渴不飲水此為虛熱去守本台
生脈散○中暑發熱頭
○頭痛加羌芩○中暑發熱頭
痛加連○溫瘧加恒洗○小便
不利大便泄瀉合四苓散
夾熱而利加炒連芍
大柴胡湯昏亂譫語加連丹○
痞滿加奴利淡○舌胎黃赤口
燥渴飲水加栢○夏月熱病煩
躁脈洪大加雷門羔○發斑加
地丹妙○發黃加茵栢○鼻衄
加犀○大便不通加芒
黃連解毒湯 治大熱不止乾嘔
煩渴錯語神昏不眠或傷寒汗吐

紅後熱不退諸般積熱實火者大効

連二苓 梔丹 各二

右水煎○腹滿嘔吐或欲作利者

加守 梔丹 各二 姜片○三焦實

火內外皆熱煩渴小便赤口生瘡

加翹芍藥 各等○在亂喜笑不休

者此心火盛先行吐法而後加守

瀝竹葉姜汁○臟毒下血者必在

糞後名遠血加翹梔細甘謂之八

寶湯○婦人赤白帶下屬壯盛而

有寒熱者合四物湯加倍連尤効

溫清湯 按清熱之劑也○三十餘歲婦

人崩漏加湯身熱口渴合四物

湯煎湯與枳灰而安○又孕婦

有先證合四物湯加升加而安

一方加柴胡連翹各等分

白虎湯 治傷寒汗吐下後心胸

煩悶渴飲水而脈洪大

膏 雷 耳 糞

右水煎○熱盛煩渴不止及發赤

斑脈虛加參 各一 名化斑湯○一旋

加芩○大便不固熱不退加蒼○

脈尺寸俱長汗大出身如石加

淮○老幼及虛人皆冒謔語或小

便泄起卧無度或煩而不眠加丹

○上焦煩渴而不欲多食謂之高

消加參二或加升相〇瘧疾表裡俱熱時々惡寒有汗而大渴口乾加參

按此方除熱之劑也〇夏因暑熱而遺尿加參〇一男熱不置大便瀉不省人事脈浮大無方背出斑是死証加參蒼朮取效而後小柴胡湯合四君子湯而調理則全愈

本方加參門玄丹姜棗竹葉各陶氏白虎湯治法同上〇虛煩甚加門〇裏熱大渴煩躁夜熱惡寒脈浮并加參

三 桃仁養氣湯 治瘀血小腹急痛

大便不利小便自利或譫語口乾遍身黃或血結胸中手不近腹或寒熱昏迷其人如狂

虎兩一嬰五不桂右入姜煎五更服

三一養氣湯 治消渴胃中乾熱 鹿 芒 朴 實 甘

右煎服

按治傷寒雜病內外所傷一切風熱風痰濕熱燥熱入裡之深大小便閉或難產死胎不下小兒斑疹黑陷等証〇治消渴胃中有熱〇又能治肝經玉壺中痛

調胃養氣湯

治大陽陽明不惡

寒反惡熱邪在中焦作滿大便秘澀語嘔噦

虎 六分 枳 二分 芒 一分

右上一二味水煎入芒再煎一沸服

小養氣湯 治六七日大便不通

潮熱譫語腹脹滿悶而喘○下痢

赤黃內煩喜飲冷水小便不利

者先用三服蕩滌而後調治之

虎 二分 枳 一分 實 各一分

右煎服以利為度

按活人大全曰裡症脈浮緩

下者小養氣湯主之肝裏裡見

症者加柴翹心之裏見症者加

赤苓翁脾之裡見症者加葛丹

肺之裡見症者加翹苓腎之裡

見症者加滑栢

大養氣湯 治胃實譫語五六日

不大便腹滿煩渴舌乾口燥日晡

發熱脈沉實

虎 七分 枳 一分 實 各一分 芒 一分

右先煎實枳去粗內虎再煎去粗

納芒更煎一二沸服以利為度○

瘧疾寒熱轉大者從卯至午發宜

柴胡湯從午至酉發者邪有內宜

大養氣湯從酉至子或至寅發者

邪在血宜桃仁養氣湯下之微利

後更以小柴胡湯撤其邪可也

按活人大全曰裡症脉沉短急
下者大養氣湯主之肝之裡見
症者加柴芩心之裡見症者加
連門脾之裡見症者加芍地肺
之裡見症者加芩蒸腎之裡見
症者加雷相

加味養氣湯 治瘀血內停胸腹
脹痛或大便不通

虎 芒 各二錢
實 朴 斤 紅

右酒水半煎服病急者不用
按養氣之類可用壯盛人不可
用虛弱人若不辨虛實則誤多

○對瘧疾下風而與之則得率

涼膈散 治表未解半入裏下證
味全懶懷不眠三焦實火煩湯口
舌生瘡謔妄便溺閉結發斑黑陷
或治上焦熱甚陽明少陽之氣中

血藥也
翹 丹 虎 奇 芩 各二錢
外 甘 五

右水煎○或入竹葉生蜜炒煎食
後服加姜亦可或作末服○東垣

加桔治諸般鬱熱退六經實火○
肺金邪熱嗽痰加守○咽喉腫痛
涎嗽加桔前○咳而嘔加守姜○
鼻衄嘔血加芍芍○淋閉加滑

苓○風眩加芎藭膏○酒毒加葛
連名清心湯用蜜竹葉同煎○班
疹加葛荆赤芍芎藭○陽毒發
班加有○咳嗽加桑杏桔○結胸
心下滿加枳椇○譫語發狂踰墻
赴井皆陽熱極盛加連栢赤芍○
眼生翳障赤淚流淚加菊賊芎○
本方合四物湯名雙和散能益血
泄熱

按除積熱實火之劑○一婦譫
言發狂晝夜不眠不能坐臥飲
食與則食不與則不食大便秘
脉細緊而數四物湯加連四十
餘貼而愈

八解散 治傷寒感冒頭疼身熱
惡風多汗嘔逆惡心

參 苓 加 陳 藿 朴
守 甘

右入姜棗水煎服

按此方溫劑也傷寒及諸病之
肌熱以寒劑而不退則與此方
而其熱退是乃熱因熱用為秘
中之秘矣○他家去參加桔名
萬安湯是以退諸病之肌熱也
○炎熱食熱等亦可醫王證輕
用之○頭疼發熱體倦或舌強
不能言語是乃有傷寒與中風
之疑則宜用之○風勞多汗或

勞傷過度急愒自汗或飲食無味或嘔逆惡心俱以取驗○感風寒頭痛壯熱無汗則加羌活參○頰頰及咽腫痛津唾難吞加桔菴升○咳嗽加西○脾胃虛而瀉除利

三四

溫膽湯 治心虛膽怯觸事易驚夜夢不祥異像致心驚氣鬱生痰涎或短氣悸之自汗飲食無味或傷寒一切病後虛煩不得眠卧守 陳 苓 實 各 二 茹 各 一 分

右入姜朮煎服○加柴利連參菴各竹茹溫膽湯治傷寒日數過多

其熱不退夢寐不寧心驚恍惚煩燥多痰不眠者

一方 治膽虛痰熱驚悸不眠去苓加姜 煎服

一方 驚悸屬火而兼氣虛治痰火而驚惕不眠

參 伽 神 沂 地 酸 煎 門 守 實 連 茹 丹 各 分 辰 移 五 分 廿 三

右入姜朮煎服○加柴利連參菴各竹茹溫膽湯治傷寒日數過多

三四

加味溫膽湯 治病後虛煩不得眠卧及心膽虛怯觸事易驚短氣悸之

守三不陳五分
守半一分
遠玄參
實各半
方多

右入姜朮煎服

按病後虛煩不眠者選先方得
數奇○一人與主君為口論開
戶一年餘心熱煩滿痰火心攻
腹脹嘔逆夜不能寢他醫皆言
陰虛火動而治不應予謂氣當
生痰而然加味溫膽湯加連而
安○姓婦心驚煩悶不眠溫膽
湯加參朮柴而安

九味羌活湯 不問傷寒傷風寒
頭項脊腰四肢強痛并四時感

胃疫癘晚發等症雜病亦可通治
此方不犯三陽經禁解利神方

羌 芩 精 芎 芷 苓
各二錢 各二錢 各二錢 各二錢 各二錢 各二錢

右入姜朮水煎○此方發春夏秋

三時表症代桂枝麻黃青龍
三時暄熱傷寒則不敢用冬月麻

黃而發表故代以羌精傷風則不
敢用冬月枝而實表故代以芩

芩芷辛發表以代香薷救血以代
芍加芩以須天時也○大陽症加

葛本○陽明症加周葛芷○少陽
症加柴芩守○大陰症加精朴澗

○少陰症加利雷栝○厥陰症加

芎藭○復月加羔雷○有汗去細
○服此湯後不作汗加水○惡風
自汗加枝○復月去枝加芍○汗
後不解加虎○嘔逆加姜汁○有
痰去地加守○肌熱加葛柴○喘
而惡寒身熱加杏地○虛煩加雷
門茹○胸中飽悶加枳利○中風
行經加附○便閉加虎○中風兼
五痺等症各隨十二經內外上下
寒熱濕涼四時六氣加減補瀉用
之○渴加雷羔
赤水玄珠云此方予每用加柴
胡乃總治傷風各經之活套也
今人只知其治四時傷寒如神

不知加柴胡總治各經之妙云
云

四四

六一順氣散 治傷寒傳裡大便
結實口燥咽乾怕熱揭衣謔語狂
妄揚手擲足班黃陽厥潮熱自汗
胸膈滿硬遠膈疼痛症

柴 芩 芍 枳 朴 虎
芒 甘

五五

右水煎臨服入鉄秀水三匙
按代大養氣小養氣調胃養氣
大柴胡三乙養氣大陷胸等湯
之神藥也舉世無人知此奇妙
清火化痰湯 治熱痰在胸膈間
不化咯吐不出寒熱氣急滿悶作

痛者名痰結

連 丹 貝 子 葉 利

枳 貴 守 苓 子 世

雪 耳 蜜 杏

右入姜煎入瀝姜汁

按年力壯盛先用吐痰法後服

此湯此方治痰嗽之劑

芎蘇散 治四時傷寒頭痛發熱

惡寒其外治孕婦傷寒傷風

芎 錢水 葛 利 守 枳

貴 柴 苓 耳 少

右入姜棗水煎

按類香葛湯治四時傷寒時行

疫疠表証

麻黃湯 治大陽症頭疼發熱惡

寒春強身痛無汗脈浮緊而喘又

治太陽八九日不解以此發汗必

衄乃解及不得汗發衄又治太陽

陽明合病喘而胸滿腹不滿邪在

表分不可下者又治陽明脈浮無

汗而喘凡脈但浮無餘症者皆宜

服之

麻 枝 一 六 杏 个

石姜煎 本方加升芎正芸薹本

姜葱豆豉名陶氏麻黃湯治法同

上 若本經寒熱頭痛無汗而喘

去升加葛 本經寒熱身痛去香

加精芍 本經寒熱身痒面赤不

得小汗者去木豆正升加柴芍○本
經寒熱頭痛胸中飽悶加枳椇○
蓋麻黃陽性熱惟冬及春初兼病
人主系有寒者乃用正方夏至後服
必發斑黃狂悶○如夏月得大陽
証惡寒發熱頭痛脈浮洪盛無汗
以子和六神通解散代之

按此方治太陽膀胱經無汗辛
溫發表之劑

六神通解散

精三 羔 滑 苓 各一分
甘五 麻七分

右水煎○春加芸○太陽發熱無
汗惡寒漸變為剛瘕者加赤芍六

分乾葛一錢豆豉二錢入葱白同

煎○傷寒中濕身痛身目俱黃

去枝加翹二支雪赤豆各二支入

生姜大束同煎○傷寒即病少陰

經脈沉微身痛得汗則已本方

中去枝杏耳加細一钱二分附一

錢○傷寒大下後脈沉遲尺脈不

室咽喉不利唾膿血厥逆泄利不

正者雖日難治去杏加升斤各一

支雷苓萎薤各半錢羔伽芍顛苓

永各七分次第取微汗而愈○即

病少隕經無表裡症去枝杏倍耳

加附一钱二三服後得微汗而愈

○風濕相搏脈浮一身盡痛去枝

加薏一 戎得微汗而愈

桂枝湯

治太陽傷風衝寒

自汗頭痛鼻塞項強乾嘔面惡寒

洒々惡風翕々發熱或熱多寒少

面色光而不慘煩躁身痛手足不

冷脈浮緩寸大尺弱者宜如無汗

濁數手足冷不惡寒者忌用夏月

誤服麻桂必發黃發斑狂悶而死

枝芍

各三錢

右水煎○加防芎菴本姜東名陶

氏桂枝湯○如汗多加伽○汗不

止加芪○喘加柴杏○胸中飽悶

加枝

按此方治太陽膀胱經有汗者

溫寶表之劑

桂枝湯

枝芍 芎菴 防芎 羌活 獨活

各等

右水煎○加苓名桂枝黃芩湯○

升陽散火湯○治提空尋衣摸床

譫語沉昏

陳神 柴門 芩 伽 其

右人姜枣水煎○大便燥結詰語

加虎○泄漏加周伽

按又手抹胸尋衣摸床譫語昏

沉不醒人事俗醫不識見病便

呼為風症用風藥誤入死者多

矣殊不知肝熱乘於肺金元氣
虛不能自主持名撮空症小便
利者宜治不利者不可治

二五

柴葛解肌湯

治足陽明胃經受

症目痛鼻乾不得眠眼眩痛脈來

微洪宜解肌屬陽明經病其正陽

明腑病則別有治法

柴 芍 葛 芍 羌 芷

利 羔 甘

右入姜 煎水煎 ○本經無汗

惡寒去 芍加麻

按此方治陽明胃經解肌之劑

三五

益氣養神湯

治傷寒新瘥方起

勞動應事或多言勞神而微復發

熱者曰勞復宜服之

參 芍 門 雷 丹 各

錢 神 西 各 七 貴 五 升 耳 各

分 各 三

右入 煎水煎服

施豆湯 治汗吐下後心膈滿悶

或痛或微汗虛煩不得眠反復顛

倒心中懊憹及燥熱鬱於內而

氣不宣通

紅 梔 子 淡 豆 豉

右水煎 ○少氣虛滿加 嘔噦

加 姜 貴 ○有宿食而煩燥者加 麩

○下後脹滿而煩加 澗 淡 ○下後

身熱而煩加 耳 永 ○差後勞復加

洞

按此方治懊懷之劑

三白湯 治虛煩或泄或渴實調

理內傷外感之奇方也

餘 伽 苓 各一分

右水煎服

加味益氣湯 治體虛弱兼之勞

而染感冒傷寒頭痛發熱者

樞 參 各一分 伽 貴 斤 各一分

柴 斤 分 酒 分 羌 半 錢 芸 錢 半

分五

右入姜水煎服○冬月加細○熱

甚脈滯有力加濟

桂枝大黃湯 治足大陰脾經受

症腹滿而痛咽乾而渴手足溫脈
來沉而有力皆因邪熱從陽經傳
入陰經也

枝 芍 虎 柴 洞 茸

右入姜棗水煎臨服入洗○喘者

加腹

按此方治大陰脾經腹痛之劑



