



類合

衆方規類全

四

之

卷

瘧疾 諸氣 痰 咳嗽 喘急 膈雜 嘔吐 翻胃





合類衆方規矩卷之四

瘧疾



夫瘧者因外感風寒暑濕內傷飲食勞倦或飢飽色慾過度以致脾胃不和痰留中脘然無痰不成瘧

○三陽受病謂之暴瘧發在夏至後處暑前此乃傷之淺者近而暴也在陰經則不分三經總謂之濕毒此乃傷之重者遠而為痰々者老也居西方宜毒藥療之

脈要略曰瘧脈自弦々數多熱弦遲多寒弦而小緊者下之瘧弦遲宜溫○脈經曰瘧脈自弦微則為瘧代散則死

中内書



九味清脾湯

治瘧瘧脈弦數但

熱不寒或熱多寒少口苦咽乾初發先服祛邪氣

柴 芩 苓 姜 枳 朴 童

守 果 甘 其

右入姜煎服
按治瘧第一方也熱多寒少或寒熱往來而頭痛口苦咽乾小便赤或澀脈弦數者此之證也若不可驟用截補之藥與此湯退其熱而後當用截藥○傷寒寒熱往來口苦熱不退者與此湯得奇効實勝於小柴胡湯○一婦人發熱戰慄鼓齒晝夜三

四次熱退而後頭痛與此湯而愈又且有兼惡寒者也○產後

寒熱往來咽渴不食泄下與此湯而安○瘧痢兼作頭痛惡寒

發熱咽渴脈大數雖柴苓證而却與此湯加枳而安○諸瘧不

論新久其驗如神去伽加蒼陳藿澤決梅入姜煎未發前可服

○久瘧加恒○憎寒加枝○體弱加參○無汗加麻○有汗加

官○夾食加莎○渴去守加參

拾發

七味清脾湯

治因食傷脾停痰

飲發為寒熱

朴梅 守 董 良 各 二 分 果

一 分 五

右入姜枣煎未發前併三服

按古人用此湯治脾瘧食瘧今予連年以此方治因瘧而虫攻上心胸寔去甘餘皆治虫之劑也大抵瘧欲發時有差上胸物是當虫先用九味清脾湯退熱而後七味清脾湯加枳可服發日五更必有奇効因虫而久嗽不止時々惡寒發熱脉細緊用葛甦散則爲嘔故與此湯而安○勞嗽乾咳声啞用滋陰降火湯則支胸不食故因虫與此

湯得奇効今按是遇中否雖然切々依有驗而記之

三

人參養胃湯 虛人患瘧者養以正則邪自除也外感風寒內傷生冷憎寒壯熱頭目昏疼不問風寒三証夾食停痰俱能治之

蒼 朴 守 陳 七 分 藿 果
苓 參 各 五 分 梅 一 分
回春有介芍

右入姜棗煎服○寒多加官○熱多加棗○汗多去蒼藿加芪○飽悶去參加童砂○渴去守加門雷○瀉加芍○瀉不止去朴果加行○嘔噦去果朴蒼加預炒米

○痰多去守菓加貝瀝○內熱盛
去守加芩○暑熱盛去守藿加薤
扁

按不換金加參苓菓梅之方也
故寒多熱少或酒漸寒熱而瘧
疾傷寒感冒疑似之間最可也
今察方中有平胃散治胃瘧有
二陳湯治痰瘧殊望瘧愈而後
根生藥則可與此湯也○咳嗽
惡寒發熱用葛麩散九文散而
不驗則此湯去參加會桑得奇
効○婦人赤白帶下洒々而惡
寒翕々而發熱咳嗽無汗或潮
熱與道遙散而及下多血故此

湯加芎歸得率効○產後三十
日計惡寒發熱面青不食自汗
脈數道遙散不驗與此湯而全
愈○諸病後有洒々憎寒或潮
熱者必可用此湯

準繩云脈弱無力或寒多者加
乾姜附子如脈洪有力熱多者
加黃芩黃連柴胡厚朴蒼朮發
散也半果茯苓却痰也人參惟
虛人最宜

散邪湯 治瘧疾初發增寒壯熱
頭疼身痛無汗

芎 芷 卑 芍 芩 假
水 卷 苓 甘 分

右入姜三片水煎露一宿次早溫服○有痰加費○有濕加蒼○夾食加蒞

按此方治瘧無汗當發汗散邪為至

五

人參截瘧飲 治虛人截瘧一切瘧疾并可截之

參 伽 苓 解 藪 朴

柴 芩 留 枝 恒 珍

鰲 各八分 烏 介 廿三分

右入姜片一板水煎露一宿臨發時五更溫服

六

七寶飲 發散病勢少表而用此截之

朴 貴 甘 珍 恒 洗

童 各等分

右姜一片水煎入酒少許露一宿臨發日五更溫服○本方加雷蒼

鰲 錢 梅 各一名常山七寶飲治壯

徒人瘧疾截之○汗多加加去蒼

○熱多加柴芩○寒多加枝○口

渴加門粉○痰多加勤

七

柴苓湯 治瘧發寒熱在半表半裡陰陽不分

柴 芩 參 守 猪 苓

伽 苓 桂 甘 各等分

右入姜片三板水煎○無汗加單○有汗加枝○寒多倍桂○熱多

加芥

按此方治瘧分利陰陽和解表裡之劑

六

柴胡芎歸湯 治夜間陰瘧引出

陽分則散後服人參截瘧飲止之

柴利 斤 芍 芍 參

朴 仙 葛 苓 貴 各 一 紅

廿 各 二

右入姜片棗板梅知水煎○多汗

加斤芍芎芪柏飲之○無汗加柴

木芎升紅發之

九

參歸鱈魚甲飲 治老瘧腹脇有塊

成瘧母

參 五 童 芪 鱈 斤 苓

加 朴 莎 芍 砂 查

洞 各 五 廿 分

右入姜棗梅水煎服○熱多加柴

○寒多加菓

十

老瘧飲 治久瘧結成癥瘕痞

在腹諸藥不愈

蒼 珍 利 童 貴 良 各

分 正 苓 守 廿 奴 桂

永 各 三 水 芍 各 二

右水煎入鹽少許服

十一

加味益氣湯 治平素不足兼

以勞役內傷挾感寒暑以致瘧疾

寒熱交作肢體倦怠乏力氣

芪 柴 苓 各 一 參 加 斤

守 為各八分 貴 分廿五分 周 分二

右入姜水煎服 ○有汗及寒重加
殺五倍殺分 ○執盛倍柴苓 ○渴加

門粉

加減十全大補湯 治入虛弱久

瘡寒熱不多而但微熱者邪氣已
無只宜服此

芪 參 加 苓 斤 芎

芍 芩 柴 苓 貴 耳

右入姜三片 棗二枚 水煎

參歸養榮湯 治瘡疾截住後用

此湯藥調氣血

參 斤 苓 加 貴 砂

朴 預 菴 芍 芎 芎 耳

各等

右入棗二枚 水煎 ○虛熱虛汗加

芪去砂

二木柴葛湯 治諸瘡

加 倉 柴 葛 陳 各七

右水煎服 ○若一日一發及午前

發者邪在陽分加苓苓守各一 ○

熱甚頭痛加芎羔 各一 口渴加羔

雷門 各一 ○若間日或三日發午

後或夜發者邪在陰分加芎斤芍

芎 斤 各一 滋 瀉 各四 提在陽分可

截之 ○若間一日連發二日或日

夜各發者氣血俱病加參芪苓各

以補氣芎辛斤芍以補血○若
 陽瘧多汗用芪參加以飲之無汗
 用柴蒼朮芩葛以發之○若陰瘧
 多汗用斤芍辛栝以飲之無汗用
 柴蒼朮紅升以發之○胃氣弱飲
 食少或服截藥傷脾胃而食少者
 加參芍牙各一○傷食痞悶或有
 食積者加曲牙洞各一連○痰
 盛加姜守星洞各一連○各六○
 若用截之加枳恒青苓各一烏板
 按諸瘧必用之劑也
 ▲諸氣附證
 內經曰百病皆生於氣也若不善
 攝養者五志之火無時不起五味

之備無日不傷是以釀成膠痰固
 積留滯於六腑鬱火邪氣充塞乎
 三焦使氣血失其常候腑臟不能
 傳導是故外邪得以乘虛而湊襲
 鬱証夫人之氣血冲和萬病不生
 一有佛鬱諸病生焉故人之諸病
 多生於鬱蓋鬱者結聚而不發越
 之謂當升不升當降不降當變化
 不得變化所以轉化失常而六鬱
 之病生焉六鬱者氣血濕食痰熱
 也

脉脉經曰脉滑者多血少氣瀦者
 少血多氣六者血氣俱多脉來大
 而堅者血氣俱實小者血氣俱少

細而緩者血氣俱虛代者氣衰細者氣少浮而絕者氣欲絕○弦大而滑中有短氣○尺脈瀦而堅為血實氣虛尺脈細而微血氣俱不足也

○鬱証脈多沉伏氣鬱則必沉而瀦濕鬱則脈必沉而緩熱鬱脈必沉數痰鬱脈必弦滑血鬱脈必芤而結促食鬱脈必滑而緊盛鬱在上則見寸寸鬱在中則見寸關鬱在下則見寸尺左右亦然

分心氣飲 治男子婦人一切氣不和多因憂愁思慮忿怒傷神或臨食憂戚或事不隨意使抑鬱之

氣留滯不散停於胸膈之間不能流暢致心胸痞悶脇助虛脹噎塞不通噎氣吞酸嘔噦惡心頭目昏眩四肢倦怠面色痿黃口舌乾苦飲食減少日漸羸瘦或大腸虛秘或因病之後胸中虛痞不思飲食并皆治之

蘇二童 陳 腹 桑 卷 五
分 苓 守 芍 通 官 各 二

其二不
右入姜枣二灯煎食遠服○加枳椇蒟治氣百病最能降陰陽調順三焦其功難以盡述○一方去芍藥加桔枳木枳椇我霍治憂思鬱

怒諸氣痞滿○水氣面目浮腫加
 猪澤車瓜門葶○氣塊加義○性
 急加柴○多怒加芩○食少加礮
 曲○咳嗽加桔守○胸膈痞悶加
 實瀉○三焦不和加礮○氣閉加
 香○氣滯腰痛加瓜枳○上焦熱
 盛加芩○下焦熱盛加丹○翻胃
 加沉

按此方散氣降氣之劑故專治
 氣鬱之主方也○憂鬱得嗽加
 枳會○因七情面目浮腫腹脹
 肢腫如猪澤瓜○七情氣結干
 中心腹痛不可忍加枳蜜此
 ○氣逆上而腰足下焦冷蒼桔

湯不効故與此湯切得奇効是
 乃氣鬱故也○酒漸寒熱盜汗
 頭痛咳嗽五心煩熱常心不快
 至暮虛熱夜不寢脉弦而數似
 勞證滋陰降火湯不効謂是窄
 人氣鬱故去羌枝半蘇加枳栝
 而安○因氣惱成腫氣脹滿此
 方有數奇○氣不順如痛風一
 身痛此湯切得奇妙

七氣湯 治七情所傷及勞役飲
 食不節滿悶短氣

守五 參 桂 甘草 各一

右入姜煎服○七氣心腹刺痛加
 索乳分名加味七氣湯婦人膈

加芎斤 各一

四七湯

治七情不節致

臟氣不平心腹脹滿又治七情氣

鬱結聚痰涎狀如破絮在咽喉間

咯不出嚥不下及中脘痞滿上氣

喘急

守五 苓四 朴三 蘇二

右入姜煎服○七情所傷鬱結臟

腑氣不和平心腹痞悶如瀉○七

氣鬱結五臟互相刑剋陽陽不和

揮霍變亂吐利交作加芎四陳二

參不入姜煮

加味四七湯 治七情之氣結成

痰氣狀如梅核或如破絮在咽喉

之間咯不出嚥不下或中脘痞滿

氣不舒快或痰涎壅盛上氣喘急

或因痰飲惡心嘔吐此藥最妙切

不盡述但婦人女子患此最

苓 朴 蘇 梗 守 陳

童 實 砂 星 曲 多

換 益 各 五

右入姜煎臨臥服

按主七情鬱結生痰在咽喉間

吐不出吞不下氣不快者善消

痰飲之藥也○婦人上氣喘急

胸膈痞悶嘔吐白沫與此湯而

安○效而痰涎在喉嗑不下得

奇効

三和散

治五臟不調三焦不和

心腹痞悶脇肋脹風氣壅滯肢節煩痛頭面虛浮手足微腫腸胃燥澀年高氣弱背脇痛妨飲食及脚氣攻胸腹滿悶大便不通

芍藥 半 薤白 瓜 腹 泉

各五 陳 枳 木 加 分

一方加砂姜燈 各五

右煎服 ○七情結五臟脾胃不和

大便秘澀或脇背走痛妨飲食並

治 ○水腫喘急者先當降氣加蘇

滑菖

按治因滯氣而秘結者之方也

○能食而大便不通為實秘宜

三黃承氣之類不食而大便不通為虛秘宜此方是氣滯故也

○老人之秘結或腹痛俱以氣

不順故與此湯而順氣則自愈

真救得奇効 ○脚氣不腫而攣

急疼痛宜此方若腫痛宜芹粘

痛湯 脚氣 門 若因風濕者可尋

九文蒼桔湯 ○水腫脹滿上氣

喘急加軼守加大便不通加枳

是依降氣而愈故無氣鬱證則

不可用之 ○治疝氣最上方也

畢凡連小腹痛是也 ○無病人

遊山翫水依然胸腹滿悶卒至

肩頸而筋太強立且口噤暈倒

不知人事故細皂未吹鼻延齡
 丹擦牙通關竅與此湯而全安
 ○頸筋強痛引兩脇而眩暈不
 食身難動得大驗○腰痛難轉
 動而大便秘澀得奇效○大抵
 筋壅急則宜此湯是乃氣滯故
 也○或語曰膈腸內有形如指
 物押之則累累為轉動與此湯
 得奇術

分氣補心湯 治心氣鬱結而四
 肢浮腫上氣喘急
 腹炒 苳 苓 桔 各一 通 芎
 西 童 枳 甘 各七 細 蜜
 各五 分

右入姜東煎服

按主氣鬱腫脹之方也○咳甚
 而頭痛面目四肢浮腫腹脹加
 桑而安

一七

木香流氣飲 治憂思太過諸氣
 痞塞怔忡鬱積脚氣風濕聚結腫
 痛喘滿脹急或肩背肢脇刺痛嘔
 吐不食胸膈膨脹面目虛浮四肢
 腫滿口苦咽乾大便閉小便澀

陳 一兩 朴 童 蘇 苳 苳
 各八分 通 桂 腹 莖 丁香
 皮 枳 菓 門 蜜 各三
 芷 各二 參 加 瓜 守 赤
 苓 各一

右入姜枣煎服 ○ 去菖藿加沉枳
 虎名二十四味流氣飲治腹中氣
 滯痞悶不快胸膈走痛者盡腫加
 多 ○ 頭面腫加葱 ○ 肚腹腫加實
 ○ 臍至脚腫加桑 ○ 腫滿加丹 ○
 厥聾有眩暈本方加菖姜葱
 按治氣管腫滿初起也水腫有
 積聚或水腫脹滿二便不通或
 肩背胸脇為注痛或腹脹不食
 喘急咳嗽而後為水腫二便共
 溢或脚氣有妙術或胸膈痞悶
 怔忡而腹脹或氣逆上而耳聾
 眩暈皆此方主之他家專積聚
 用之 ○ 氣滯腰痛不可轉側服

之立効

木香調氣散

治氣鬱其症腹脇

脹滿刺痛不舒脉沉

- 枳實 枳殼 枳實 枳殼
- 芍藥 蒼朮 蜜砂 官
- 各三 各五 各三

右入姜煎磨木香服

按治男婦因氣鬱而胸痛胸塞

氣下陷不快也若有胸痛者先

可用此湯有教奇効也

蘇子降氣湯

治虛陽上攻上盛

下虛痰涎壅盛

- 蘇子 降香 蘇子 降香
- 蘇子 降香 蘇子 降香
- 蘇子 降香 蘇子 降香

右入姜枣煎服 治虚陽上攻喘促咳嗽 治鼻衄不止

按治虚陽上攻喘促咳嗽足冷者若足不冷者無十分之功 水腫脹滿痰喘氣急欲絕者間與此湯得奇効若雖得奇而心体困乏者不治也

四九

上下分消導氣湯 功勝分心氣 飲常患氣惱之人可用此作九常服甚妙

連守 萹各一 奴各二 雪芎 苓 朴 童 薄 兩 芩 翁 洗 芽 兩 廿 分 右入姜三片水煎服

五九

加味四君子湯 治氣虛証 參 芎 砂 苓 貴 朴 斤 廿 各 等 氣虛甚加棗

六九

右入姜三片水煎服 紫蘇子湯 治憂思過度心腹膨脹喘促煩悶腸鳴二便不利脉虛緊而瀼

子 芩 腹 珍 朴 守 貴 伽 翁 洞 蜜 參 廿 各 五 分

七九

正氣天香湯 治婦人一切諸氣 作痛或上湊心胸或攻築脇肋腹中結塊發渴刺痛月水因之而不

調或眩暈嘔吐往來寒熱無問胎前產後一切氣侯血皆治之

八七

沉香降氣湯 治陰陽壅滯氣升

降胸膈痞悶噫醋吞酸

右水煎服 男子虛勞失血及婦人產月後因氣者四物湯加蜜洗

○陰虛氣滯者去蜜加黑柏或炒

黑丹一味

按此方治胸膈痞塞喘促短氣

或脾胃留飲脇下妨悶

八六

柴胡柳肝湯 治寡居獨陰無陽色慾心萌而多不遂是以惡寒發

熱全類癰者

柴 赤芍 各二 童 牡 一 名 蒼

蒺 丹 錄 其 各 一 曲 分 芎

分 翹 地 各 五

右煎服

按寡婦寒熱往來似瘧或顏色

時赤時青五心煩熱如勞瘵間

與此湯而安此症尼僧並宮女

八三

當歸活血湯 治血鬱証者

斤 芍 芎 嬰 錢 各 一 紅 分 王

莎 葵 奴 童 各 八 桂 永

炒 其 各 三 分

右入姜水煎服○血結硬痛加鹿
按此方治能食便紅或暴吐紫
血痛不移處

一州

香砂平胃散

治食鬱証嘔噎氣作

酸胸飽悶作嘔惡食

蒼朴 貴 莎 各一 硃 奴

查 芽 曲 永 蜜 各五 其

右入姜三片水煎服○食鬱久成

塊去乾姜加大黃

三州

瓜蒌枳殼湯

治痰鬱証動脈喘

胸膈急痰不吐

蔓利 奴 芎 蒼 莎

查 芩 貝 貴 砂 蜜 各

分五

右入姜三片水煎服

三州

二陳湯

治痰鬱火邪在下二便

下利者

本方加升柴芎去痰

四州

六鬱湯

解諸鬱清火化痰順氣

開胸膈

沙 蒼 曲 堯 丹 貴

貝 芎 奴 蘇 苓 各一 其

分五

右入姜三片水煎○有痰加星守有

熱加柴芎又加連倍丹○血鬱加

嬰紅王○濕加羌加倍蒼○氣加

葵蜜洗水永倍莎砂○食積加查

曲芽砂

按此方開諸膏之總司也

解鬱調胃湯 治胃脘血液粘滯

痰火內鬱水穀易下而食物難消

若噎膈之症或氣分之火壅過於

中而時作刺痛者皆由怒憂思慮

勞心所致

佛貴苓 各一錢 麩 丹 各一

分 芍 地 各八錢 曲 芽 各

分 芎 六 嬰 甘 各四

右入姜片水煎○胸膈刺痛加酒

寶○胸噎悶加奴○胸內煩熱加

連○大便不利加虎○有痰加守

難○飲食不羨亦去辛倍加加○

嘔吐加藿去辛芎嬰

▲痰飲 與氣門可互考

丹溪曰有熱痰有濕痰有酒痰有

食積痰有風痰有寒痰有老痰

脈要略云脈雙弦者寒飲也○下後

難○其脈偏弦者飲也○肺飲不

弦但若喘短氣○又云脈浮而細

滑者傷飲○脈弦數有寒飲春夏

難治○脈沉而弦者懸飲內痛○

其人短氣四肢歷節疼痛脈沉者

有留飲○陳無擇云飲脈皆弦微

沉滑○或云左右手關前脈浮弦

大而實者膈上有稠痰也宜吐之

而愈

二陳湯

治一切痰飲化為百病

陳守各五苓其半

右入姜煎服○偏頭痛在右加芎

芷芸前升在左合四物湯加荆芎

細蔓柴冷○頂痛加芎本升柴蔓

細芎○痰在腰膝膝下腫痛加蒼

離通栢蘇膝○痰在胸腹中作痛

或痞滿加加曲芽砂○痰在腸下

作痛或瀉々有聲加紫青芎芍○

痰在經絡中或胸背手足臂膊作

痛者在上加芸薏葳○在下加離

膝通○冬月加烏附行經○風痰

壅盛喘急咳嗽不寧加芸薏星枳

皂○熱痰為病肢脹喘滿加芩連

丹婁滑膏瀝○濕痰身重倦怠加

蒼如星○寒痰加永附漏益○氣

痰加蜜栝砂枳蘇苳○燥痰加薑

杏貝會○陰虛咯血痰嗽加天麥

二門雷栢貝欬苑○氣虛有痰加

參加○血虛有痰加斤天○帶血

者加芩芍○咳嗽白痰者肺之風

寒也風痰加星桔芸實○寒痰加

永官附○食積痰加查曲莎實連

○痰飲者痰在膈膈間痛有聲加

莎砂薑實芹芎蒼童白芥○痰涎

者渾身胸背脇痛加白芥砂密茴

莎實斤冷○濕痰流注者渾身有

腫塊加薑枳蒼冷芸翹斤莎砂

蜜紅瀝姜汁○脾虛生痰加參如
芍實砂桔○酒痰加葛枳砂曲芽
○飲酒嘔噦吐痰加砂梅○痰瀉
者或多或少或瀉或不瀉脈沉滑
加蒼砂預車通朴姜梅灯○若瀉
不止去朴加訶衍○肥人頭痛者
氣虛濕痰加參朮細芎芷羌桔荆
○瘦人頭痛者血虛痰火加牡斤
芩芎細羌桔○腹中水鳴因熱而
痰者痰飲加苓連丹○痛甚加承
炒○腰背重注走串痛者是痰加
蜜苗乳索砂蒼羌泠斤仲○風寒
濕流注經絡而腰痛加麻蒼芎芷
芸朮○濕痰流注腸內作痛加星

蒼芎姜○瘧後飲食少進四肢無
力面色痿黃合四君子湯加連實
姜○閉格上焦痰壅兩手脈盛加
星枳實○大小便不通皆是痰膈
中焦氣滯於下焦加通○痰鬱火
邪在下焦大小便不利加引升芸
柴謂之升發二陳湯○噎氣胃中
有火有痰者加砂多蜜益實連朴
蒹○眩暈嘈雜火動其痰加丹芩
連○胃口有熱時作惡心加連芩
姜數劑○婦人帶下屬濕痰者胃
中痰積流下滲入膀胱加二朮升
柴又云氣虛合四君子湯血虛者
加芍斤

按此方治痰之聖藥也隨証而
照加減以無不治痰飲也按趙
氏云二陳湯謂一身痰都治世
醫執之凡有痰者皆以二陳湯
治之夫二陳湯內有守性燥熱
若風痰寒痰與食痰則相宜若
勞痰吐血鼻血瀉血尿血崩
皆不可用以其能燥血氣乾津
液病不能愈而反加如天道暑
熱之時最當禁用抑且痰藥數
多世醫治痰何必拘々二陳之
守哉

加味二陳湯 治一切癩病 ○發
於痰火則宜用 加味二陳湯

丹 守 苓 星 陳 薑 實 桔
守 各 一 各 一 各 一 各 一 各 一
守 各 一 守 各 一 守 各 一 守 各 一 守 各 一
守 各 一 守 各 一 守 各 一 守 各 一 守 各 一

右入姜煎臨服加瀝姜汁磨木香
調辰砂末同服

加味二陳湯 治痰厥運倒
陳 守 苓 薑 實 桔
杏 各 一 良 砂 各 七 蜜 官
甘 各 三

右入姜煎服 ○氣逆加戟 ○元氣
虛弱去實

枳縮二陳湯 治涎在心膈上攻
走腰背嘔噦大痛
寶 砂 守 陳 蒺 各 一 朴

卷四

茵 索分 八 蜜 漏 永五分

右入姜煎加瀝磨木香服

香砂二陳湯 治傷生冷瓜挑水

果海味魚鯉一應寒物而胸中痞

滿

陳 莎各半 苓 守 礪 曲

廿分

右入姜煎服此方傷食之主藥尤

能消食予連年與此湯取奇效難

勝計者也

按已上四方切得數奇故別立

方銘備倉卒之搜覽者也

導痰湯 治風濕痰一切痰涎壅

盛或胸膈留飲痰塞不通

守 星 實 苓 陳 廿

右入姜煎服 如久嗽肺燥執去

守加會 杏 〇 憎寒壯熱頭目

昏沉迷悶上氣喘急口出涎沫證

類傷寒此因七情內傷以致痰迷

心竅神不守舍狀如鬼祟加連婁

桔 參 如 〇 入姜煎加瀝姜

汁服名之清熱導痰湯 〇 按清熱

導痰湯痰迷心竅不省人事一服

立省真神方也 〇 一方清熱導痰

湯去棗半減參加斤蜜 〇 五

減導痰湯治中風痰涎壅盛不能

言語牙關緊急有熱者也

按卒中風先此湯或八味順氣

散烏藥順氣散選用而後尋治

經絡臟腑左右之方而當療

痰嗽喘急咯吐不成加桑軾而

安

三四

瓜蒌枳實湯

治痰結咯吐不出

胸膈作痛不能轉側或痰結胸膈

滿悶作寒熱氣急並痰迷心竅不

能言○痰喘者喘動便有痰聲○

食積嗽者痰嗽加膠咳胸膈結

痛者痰結早晨嗽者胃中食積上

半日嗽者胃中伏火皆治之

薑 實 桔 苓 貝 陳

丹 各一升 六分 砂 蜜 各五分

甘

右入姜煎加瀝姜汁少服○痰迷

不語去蜜加葛○氣喘加桑軾○

痰結胸膈久不治成膈癰去桔苓

加餅童茵○發熱加柴○痰火發

瘥加門參軾

按治實症咳嗽痰喘之妙方也

○咳嗽胸膈引痛加餅而安若

誤而久不治則成膿血而脇生

滯也○大抵午前咳嗽宜此湯

午後嗽可用滋陰降火湯

清坤湯 治熱痰迷胸絡恍惚驚

三四

卷四

神連各二 酸炒 菖 柏子
藥各一 廿五

右入姜水煎

桔梗湯 治胸膈脹滿短氣痰逆

或吐涎沫及酒痰

利田 貴 洞 各五

右入姜煎

按此方治除痰下氣嘔噦心下

堅痞痰逆惡心飲食不下

豁痰湯 治一切痰疾

柴 射 各二 芩 參 各一 枳 殼 各一

枳 殼 各五 貴 朴 星 苛

右入姜煎水煎服 中風者加桂

胸膈不利者加洞 無熱者去

按此湯與滾痰丸相副蓋以小

柴胡湯為至合前守星枳魁貴

朴之屬出入加減素抱痰疾及

肺氣壅塞者以柴為至餘者並

去柴以前為至

咳嗽與痰門可互考

丹溪曰肺為五臟之華蓋聲音之

所從出入皮毛賴之而潤澤腎水

內滋而生養腠理不靈外為風寒

暑濕之氣所干而疾作

脈閉上脈微為欬 肺脈微急為

欬而唾血 脈弦濇而欬為少血

○脈緊者為肺寒○雙弦者寒○
 脈浮而緊者為虛寒○脈浮而緩
 者傷風脈細者濕○脈數為熱○
 脈沉數為實熱○脈弦為水○偏
 弦為飲○脈沉為留飲○脈洪滑
 多痰○欬脈浮直者生○脈浮濡
 者生○脈緊者死○沉小伏匿者
 死○欬而羸瘦脈堅大者死○欬
 而脫形發熱脈小緊急者死
 參蘇飲 咳之圭方也 傷寒
 清肺湯 治痰火咳嗽面目赤身
 熱咯紅痰
 苓 陳 芥 地 芍 天
 麥 芩 丹 菀 膠 桑

天回 四回

各等 廿一
 右入煎服○喘急加戟去天○
 一切咳嗽上焦痰盛及久嗽不止
 成勞加會杏貝吉瀝姜去芍地菀
 膠○久嗽虛汗多去莞膠梅加會
 加姜○久嗽喉痛声不清去膠加
 桔苛瀝姜○嗽而痰多去芩莞膠
 芍加會貝桔加金沸○咳嗽身熱
 加柴○咳嗽午後至晚發熱去芩
 膠加栢瀝○痰咯不出去會膠加
 薑實瀝咳嗽痰結脇痛去地膠丹
 加白芥薑實砂木苗柴會杏瀝
 按回云此湯治先吐痰而後見
 血者是積熱也滋陰降火湯治

先吐血而後見痰者是陰虛也

○久嗽不止痰喘甚濁脉細緊

而數去芍地膠加桔貝杏○久

嗽不止痰中帶血加杏貝童桔

加減瀉白散 治欬而口燥煩熱

胸膈不利氣喘促

桑兩 錄 雷 陳 桔各五 童

細 苓 其各二

右煎服

按大抵治喘嗽之方也○感冒

發熱退後咳痰久不止不食尿

赤無汗得奇効○久勞咳痰久

不止而後成龜胸龜背聲啞盜

汗足冷大便結脉細數與七十

餘貼而胸背如常喘止○常患

喘之人因氣鬱發尿赤脉浮數

加蘇杏枳苓而安

東垣加減瀉白散 治陰氣在下

陽氣在上欬嘔吐喘急

桑兩 錄 參 會 陳 童各

右入粳米煎服

按治虛症久嗽之方也用滋陰

降火湯而肺氣弥虛則與此湯

有奇効○婦人久嗽不已有咳

血而不食脉無力雖清咳湯之

證在門而肺無火邪故用此湯

而全愈○此症與瓜蒌枳實湯

而全愈○此症與瓜蒌枳實湯

而全愈○此症與瓜蒌枳實湯

而全愈○此症與瓜蒌枳實湯

則却為吐血慎之

一方治咳嗽

杏 苓 各一 貴分會 圖 井

灸各五分

右水煎服○春多上升之氣宜潤

肺抑肝加芎芍守各一 芩雷門各

分○春若傷風致效鼻流清涕宜

辛涼解散加芎芩麩芩門各一○

夏多火熱炎上最重宜清金降火

加桑芩雷蓋門各一○秋多濕熱

傷肺宜清熱瀉濕加蒼桑各一 芩

越芩各三○冬多風寒外寒宜解

表行痰加麻枝守芩永各三○肺

經素有熱者再加芩雷各五○發

熱頭痛鼻塞聲重再加芎本前柴

各一○若有痰加守枳○風痰再

加星姜○濕痰脾困少食加蒼伽

○有痰口燥咽乾加雷蜜貝薑芩

○若夏月熱痰或素熱有痰加芩

連雷蓋○上半日咳者胃中有火

加貝連蓋○五更咳者同上此胃

中有食積也○黃暗咳者火浮於

肺不可正用寒涼藥宜加會訶欬

而下之○午後咳者屬陰虛即勞

嗽也宜補陰降火加芎斤芍辛栢

雷貝薑天瀝對○若咳嗽久肺虛

滋氣補血加參芪膠疑片滿天兜

蟻之類肺熱喘咳去參用砂此兼

血氣也○若勞嗽見血加膠斤芍
雷貝桑天

東垣加減三奇湯 治咳嗽上氣

喘促胸膈不利

田冬利 貴 童 蔞 參

雪 水 各 五 杏 各 三

右入姜煎服

貝母湯 治久嗽

貝 冬 苓 永 貴 各 二 桑

田 桂 各 一 柴 蜜 甘 各 五

杏 十 四

右入姜煎服

按準繩云此方有寒有熱有痰
有散諸嗽通用也

人參清肺湯 治肺胃虛寒咳嗽

并久勞嗽唾血腥臭

參 梅 桑 錄 雷 膠

利 甘 御 杏 各 等

右入棗水煎入蜜一匙澄清溫服

按此方治胸膈咽塞腹脹滿

迫塞短氣喜飲冷咽嗑隱痛

凡勞倦傷脾咳而氣短無力者補

中益氣湯 或六君子湯 磨牙

隨証加減

喘急 附喘 喘

大抵哮喘以聲響名喘以氣息言夫

喘促喉中如水鷄聲者謂之哮喘氣

促而連屬不能以息者謂之喘

四五

脉沉肺張停水氣逆填胸脉必
伏取沉而實滑身温易愈身冷脉
浮大濇難愈又云脉滑而手足温
者生脉沉濇而四肢寒者死
神秘湯 治上氣喘急不得卧

貴 利 水 玄 參 各等分

右入姜水煎服

按此方病人不得眠々則喘者
水氣逆行上乘于肺々得水而
浮使氣不流通其脈沉大宜此
治之 ○一方去利玄加苓姜蜜
桑

五五

定肺湯 治上氣喘嗽

奴 貴 多 玄 守 甘

六五

右入姜水煎服
清肺湯 治火喘

水 雪 杏 各等分
杏 水 門 貝 各八分 泉 辰

右入姜水煎入竹瀝服

按此方治久嗽不止成勞怯若
久嗽聲啞或喉生瘡者

七五

瓜蒌枳實湯 治痰喘
加味四君子湯 治氣短

參 仙 貴 朴 砂
水 雪 斤 泉 蜜 各五分

八五

右入姜枣水煎服

理中湯 治寒喘

砂 水 朴 桂 豉

各一 各五

右水煎服○若脉沉細手足冷加

按此方治四肢逆冷

蘇子降氣湯 治虛陽上攻

氣不升降上盛下虛痰涎壅盛喘

促短氣咳嗽

本方加芎細苓利名大降氣湯

凡吼哮証用二陳湯加蒼苓

嘈雜

夫嘈雜者是痰因火動其証似飢

不飢似痛非痛如有懊憹不自寧之狀者是也

脉脉右寸関脉緊而滑○兩寸弦

滑胸中有留飲○寸脉橫者膈上

有橫積也○右関弦急甚者木乘

土位欲作胃反難治

化痰清火湯 治饋雜有痰因火

動者

星 守 貴 連 苓 丹

雷 羔 蒼 伽 為 各 等 甘

煨

右入姜水煎

二陳湯 治痰火而饋

本方加丹連茹參斤伽酸辰梅

三六 參 麥 瀝 水 煎 服 痰 門

當 歸 補 血 湯 治 心 中 血 少 而 體

兼 治 驚 悸 怔 忡

斤 芍 藥 地 黃 芩 各 三 參

五 分 苓 門 丹 貴 各 八 分 井 分

辰 分 梅 仁 炒 米 粗 棗 核

右 水 煎

四六 香 砂 平 胃 散 治 食 積 而 體

本 方 加 炒 連 丹 芍 辰 芍 去 奴 婆

五六 消 食 清 胃 湯 治 體 雜 悶 亂 惡 心

發 熱 頭 痛

貴 守 苓 曲 查 瀉

芍 藥 奴 丹 連 煎 蒼

婆 井 各 等

右 入 姜 水 煎 服

嘔 吐 附 吞 酸 噯 氣 呃 逆

東 垣 曰 夫 嘔 吐 噦 三 者 屬 於 胃

者 物 司 也 以 其 氣 血 多 少 為 異 耳

嘔 者 陽 明 也 多 血 多 氣 故 有 聲 有

物 氣 血 俱 病 也 吐 者 大 陽 也 多 血

少 氣 故 有 物 無 聲 血 病 也 噦 者 少

陽 也 多 氣 少 血 故 有 聲 無 物 氣 病

也 河 澗 曰 胃 膈 熱 甚 則 為 嘔 火 氣

炎 上 之 象 也 噯 氣 者 噯 而 胸 膈

之 氣 上 升 也 內 經 名 噯 氣 俗 作

噯 氣 呃 逆 發 呃 者 氣 逆 上 衝 而

作 聲 也 一 名 欬 逆

脈嘔吐無他寸緊滑數微數血虛
 單浮胃薄乳則有痰最忌瀆弱
 吞酸脈多弦而滑或沉而遲胸有
 寒飲或數而洪膈有痰熱○呃逆
 脈浮緩乃宜弦急必死結代促微
 清鬱豁痰湯 治酸氣吞酸及胃
 中有熱膈上有痰令人嘔吐清水
 等症

陳守苓連丹蒼
 芎 莎 砂 曲 查 蜜

右入姜煎服

按治吞酸之主方也

保中湯 治嘔吐不止飲食不下

藿 加 貴 田 苓
 連 丹 砂 甘 分

右入姜水煎服

按此方治嘔吐虛熱者宜之

理中湯 治胃寒嘔吐清水冷涎

參 苓 加 貴 永 藿
 砂 喬 田 桂 分

右入姜梅水煎服

加味二陳湯 治痰火嘔吐

貴 守 苓 甘 加 參
 茹 砂 丹 門 分

右入梅加姜片束二板水煎

藿香正氣散 治傷寒

香砂平胃散 治飲食

按右二方共治傷食嘔吐之主方也

三曰 加味六君子湯 治久病胃虛嘔吐

吐

參 伍分 苓 伍分 芍 伍分 預 伍分 斤 伍分

芩 伍分 砂 伍分 五 伍分 田 伍分 貴 伍分

分 其 三 分 梅 一 分 炒 米 粳 一 分

右入姜棗水煎

按此方治久病嘔吐者胃虛不

納穀

三曰 白木湯 治胃中虛損及有痰而

吐者

田 伍分 芩 伍分 洗 半 蜜 其 各 一

苓 伍分

三曰 右入姜水煎

四曰 治吐清水方

蒼 苓 液 各 等 分

右水煎

五曰 清胃二陳湯 治酸水刺心及吞

酸醮雜

曲 伍分 貴 田 伍分 苓 伍分 連 伍分 丹 伍分

不 伍分 菴 伍分 芩 伍分 洞 伍分 八 伍分 芍 伍分

其 分 三

右入姜水煎

六曰 透膈湯 治脾胃不和中脘氣滯

胸膈滿悶噎塞不通噫氣吞酸脇

痛嘔逆痰涎飲水不下

蜜 多 洗 砂 奴 朴

田 童 貴 車 鹿 芒
各等

右入姜枣水煎食後服

加減二陳湯 治痰飲為患嘔吐

頭眩心悸或因食生冷硬物脾胃

不和時吐酸水

香錢田 貴 各二分 苓 一 麦 半

右入姜水煎

二陳湯 治噎氣胃中有火有痰

者

本方加丹砂多蜜益洞連朴蒞

理中湯

治噎氣有胃寒者

本方加蜜茵益朴蒞去參苓

干中

凡不因飲食常噎者虛也宜六君

子湯加泉朴子吳

丁香柿蒂湯 胃口虛寒手足冷

脉沉細是寒呃也

喬 柳蒂 良 桂 田 貴

蜜 泉 茵 藿 朴 砂 各

分 糖 乳 粉

右入姜水煎服 寒極手足冷脉

沉細加附永去良桂

香砂和中湯 治食傷脾胃停痰

胸滿噎嘔吐

藿 砂 各一分 蒼 朮 貴 田

苓 洞 童 各 廿 分
右入姜水煎

翻胃與嘔吐可變勢

夫膈噎翻胃之症皆由七情太過而動五藏之火薰蒸津液而痰益盛脾胃漸衰飲食不得流行為膈為噎為翻胃也

脈脈氣虛緩而無力○血虛脈數而無力○痰寸關脈沉或伏而大○氣滯結者寸關沉而濇○又曰濇而小血不足○大而弱氣不足○脈浮緩者生沉濇者死
寬中湯 治七情四氣傷于脾胃以致陰陽不和胸膈痞滿停痰氣

逆遂成五膈之病一切冷氣並皆治之

莎 朴 各一 及 童 陳 喬

砂 各四 多 廿 分 蜜

右為末姜盪湯煎服○七氣沉滯飲食不下氣滿膨脹宜此湯

按治七情鬱結之方也○好酒

之老僧頭重胸膈痞滿不食間食則欲嘔數方不應加連葛煎

服○少女十一歲從六月初至

七月下四腹痛時止時發今痛

甚泣聲響隣五日絕穀大便結

如咽有芒加枳芍為煎服一貼

而痛減三日而向食氣五日而

大便通得安全 ○女子十七八
歲因氣惱而吐血心腹刺痛堅
如石冷如冰雪經水四五箇月
不通脈沉緊而數衆醫束手故
予加蘇葉煎服得奇効

順和湯 治嘔吐翻胃嘈雜吞酸
痞悶噫氣噎膈心腹刺痛惡心吐
痰水

陳 檳 莎 丹 各一錢
各七連 曲 各六分
實 分 砂 分 廿

右入姜長流水煎入瀝姜汁童便
溫服 ○氣虛加參芪 ○血虛加芎
斤 ○氣惱或氣不舒暢加蘇蜜 ○

胸膈飽悶加葡萄 ○心下嘈雜醋心
加吳倍連 伽 ○嘔吐不止加藿
按順氣和中之劑善治胸痛退

上氣消食積殊以至胸中有濕
熱膏痰而煩悶嘔吐或嘈雜吞
酸者也 ○飲酒之人食油膩物
腹痛吐瀉不止去實加藿永得

奇効 ○夏月胸痛吐血是氣惱
之人故倍連加蜜而安 ○小兒
七八歲因咳而面赤痰如線而

不絕此湯二三貼而愈 ○一婦
人送于夫而面赤胸塞洒泐寒

熱時妄語有乾嘔加柴苓而如
故 ○常飲酒從去秋吃逆至今

春不止且胸痛痰支不食惡寒
 今驚水穀不通而迎予言酒毒
 而此湯三四貼得大驗其後依
 躄倦去實加參而愈○瘧間日
 發不食口苦乾嘔熱多寒少他
 療不効加柴苓珠拱二貼而落
 ○七十餘歲尼飲食俱以卒吐
 甚胸痛脉沉細加喬蜜而得安
 全

四八

當歸艱血湯 治年老之人陰血
 枯槁痰火氣結升而不降飲食不
 下者是乃成膈噎之病也
 斤 芍 芎 苓 各一
 實 陳 菴 藜 軾 各七
 連 蔓

黟燭 八分 沉 八分

右入姜棗水煎竹瀝磨沉香調服
 按老人痰支形瘦皮膚燥痒無
 食味大便二三日不行者血虛
 也此方加減而專可用也若雖
 壯年而有此證胸痛者膈噎之
 先兆也亦加減而得奇効

五八

生津補血湯 治年少之人有患
 膈噎者胃腕血燥不潤故便閉塞
 而食不下
 斤 芍 芎 地 苓 各一
 陳 連 軾 貝 砂 沉 各五

右入姜棗水煎竹瀝磨沉香同服

按年少之膈證胸支痛不食々
 則嘔噦而水飲不入大便結是
 皆生於陰血虛與此湯間有奇
 殊老人亦可○一人胸痛痰嗽
 不食大便結故與滋陰降火湯
 不効是以與此湯則能退痰除
 虛熱得奇効○一老僧不食只
 煮湯茶而熱先與香葛湯順和
 散大半愈然味退故用此湯而
 全安

六八 安胃湯 治胃虛吐食而不細
 參五分 伽 匿 預 斤 貴
 守 婆 各一分 礞 分連 煎 各八
 甘 分三

三八 右姜枣烏梅煎 加水煎

五噎湯 治噎食不下嘔噦不徹
 胸背刺痛淚與涎出

參 伽 匿 貴 各一分 枳 奴
 甘 永 稜 茂 曲 芽 各
 分 訶 心 蜜 洗 各三

八八 右入姜枣水煎

五膈湯 治胃膈痞氣結聚脇脹
 痰逆惡心不欲食

奴 青 星 田 各一分 伽 一錢
 腹 分永 分牙 分喬 蜜 珍 五
 戈 分三

右入姜水煎



