





合類衆方規矩卷之五

▲虚損附虚勞



虚損之病寒熱因虚而感也感寒
 則損陽々虚則陰盛損自上而下
 一損々于肺皮聚而毛落二損々
 于心血脉虚少不能榮于臟腑婦
 人則月水不通三損々于胃飲食
 不為肌膚治宜以辛甘淡過於胃
 則不可治感熱則損陰々虚則陽
 盛損自下而上一損々于腎骨痿
 不能起于床二損々于肝筋緩不
 能自收持三損々于脾飲食不能
 消冠治宜以酸鹹過於脾則不可
 治矣

守心堂藏



二

脈經曰脈來軟者為虛○弱者為虛○微者為虛○弱者為虛○弦為中虛○脈來細而微者血氣俱虛○脈小者血氣俱少○要略曰脈芤者為血虛○脈沉小遲者脫氣○又曰血虛脈大如葱管○又曰脈大而芤者脫血○四君子湯 治脾胃不調不思飲食一切補氣之本藥也
參 苓 朮 甘草
右煎服或入姜棗○有痰加陳守○吐瀉加藿多○嘔吐加霍砂○泄瀉加木衍○脾胃虛弱加官介○咳嗽加桑會杏○心煩不定

加辰酸遠○心熱加愛神蓮○發渴加瓜葛梅○心煩口渴加參芪○胃冷加喬附砂○脾困氣短加木參砂○腹脹不思飲食加多寶砂○胸膈喘急加實守枳○風壅邪熱加荆苛苓○潮熱往來加西芎○盜汗不止加芪麩炒○小便不通加澤通猪○大腑閉塞加枳虎○水瀉不止加木訶衍○遍身痛加赤芍桂○四肢惡寒有執加麻枝○氣痛加苗索斤○氣塊加稜莪苗蒞○腹痛加永赤芍官○小兒疹出味成者加升葛○婦人難產加百草麝芷○暴死有聲

者名痰厥加瀝姜汁○手足痠瘕
或右半身不遂亦然○陽虛不任
風寒體弱脉甚者加附○脾胃元
氣虛弱久泄以食加預蓮多枯扁
○孕婦作淋者加斤芍○五六箇
月加升○八九箇月加通腹○新
產後宜調理脾胃加陳藿砂芪姜
朮○小兒慢脾風加附厥冷亦然
○交精吐乳眼慢養多穢氣乃父
母交合時喫乳所致加藿朮○痘
疹欲出未出而吐利者中焦停寒
或宿食加砂陳○色疸加扁芪○
脾虛而不生血加斤加炒○加陳
各異功散治久嗽不已或腹滿以

食或面腫氣逆等○加陳守一名六
君子湯治氣虛痰因之發飢亦
可○若內熱或飲食難化作酸屬
虛火者加炮姜其功甚速○若肝
木侮脾胃而致虛損者加木芍○
若因脾胃虛寒而致食後飽悶者
加蒺藜破是名香砂六君子湯○
過於飲食胃氣自傷不能運化而
昏冒謂之食厥先用姜鹽湯多探
吐之而後加蒺藜木入姜棗煎服
○去守加預蕙澤連名衛生湯治
脾虛氣弱闡門元氣不足不別水
穀○加藿朴名八解散○加
芪斤芍陳守定結芷入姜棗煎服

名之加減四君子湯治肥人頭眩者屬氣虛濕痰也○加葛藿木陳姜名增損白朮散一切病後服之生津止渴順氣下痰○加瀉扁枯薏蓮為米棗湯下名日參苓白朮散治脾胃虛弱飲食不進或嘔吐瀉利其大病後補助脾胃此藥極妙○加葛藿木名白朮散治積痛和胃生津止渴瀉利將欲成慢驚風者服之訣効若有此加喬○加桔枯細苛名惺々散小兒外感風寒鼻塞咳嗽發熱痘疹變蒸疑似之間皆宜服

按益脾助胃之主藥也○夏月

患消渴時々眩暈晝夜飲水三斗餘加藿木葛舌與數劑常令食南瓜而安○卒倒手足癱瘓言語蹇澁加童止陳禁名之八味順氣散尚照加減求數驗○按婁氏綱目孫氏玄珠王氏準繩等載此湯治真氣虛弱及短氣脈弱去耳換氏如八珍湯亦然今及見三氏之書而得補氣成功之妙

三四

四物湯 治血虛發熱或寒熱往來或消晡發熱頭目不清或煩燥不寐育膈脹或腸痛一切補血之本藥也

右煎服○加伽苓柴牡治肝脾腎
 血虛發熱○午後發熱屬血分加
 參伽牡○如熱從左邊起者肝火
 也○實則加游丹○虛則加參伽
 芪○熱從臍下起者陰火也加參
 伽栢雷會門桂○夜發熱加雷栢
 連丹牡柴○晝夜俱發熱合小柴
 胡湯加連丹○血虛無汗潮熱合
 葛麩加姜枣或女子血虛有汗潮
 熱者亦宜之○瘦人中風屬陰虛
 火熱加膝苓栢○尤半身不遂手
 足癱瘓加桃紅瀝姜汁○多思慮
 以致血虛五更時嘈雜加滋丹連

貝○血虛陰火冲上頭痛加酒溜
 冷蔓漣丹○臍下虛冷腹痛者本
 方六加索練各一名之四物苦練
 湯○因挫閃跌撲致死血瀉本經
 而腰痛加嬰紅方○因房勞而腰
 痛加雷栢會仲○鼻衄加側○溺
 血合五苓散○下血因寒久不愈
 加升永棕灰○血痢加膠朴艾○
 大便秘結加嬰虎○小便秘澀加
 澤通○血氣痛五心熱加婪官○
 五心煩執加苓柴錄百合○口乾
 煩渴加門葛梅○咳嗽加桑杏麻
 ○頭眩加羌細○不思飲食加砂
 多蓮○面色痿黃加陳蒨姜○心

氣不足恍惚加遠酸辰○虛煩不
 睡加膏參淡竹葉○金瘡出血過
 多加參芪○經水將來作痛者血
 實氣滯也或心腹連腰作痛加連
 芫嬰紅索牡茂童○過期不來作
 痛者血虛有寒加桃紅荔枝通
 方耳○先期來者血虛有熱加芩
 蒺連膠相雷耳艾○過期而來紫
 黑成塊者氣鬱血滯加朮紅牡童
 菝索耳○經水去多久不止發腫
 滿者脾經血虛加木苓砂腹木陳
 枳賦猪通菝索膝耳○經水月久
 不行發腫者瘀血滲入脾經加朮
 紅牡永枳木菝膝索去芩○先

期而至血紫有塊腰腹痛手足冷
 痺口乾頭眩加芩荆蒺菝索續仲
 仰耳○錯經妄行於口鼻者火載
 血上氣之亂也加芩丹犀膠苓門
 陳○經水行後作痛者氣血虛合
 四君加永炒○過期而來色淡者
 痰多加陳守苓甘姜○適來適斷
 或往來寒熱先服小柴而後以此
 湯和之○肥白人經水過期者痰
 多用二陳加星蒼滑芩斤蒺○經
 水過多久不止者成血崩加介伽
 膠苓丹仰荆蒺耳○骨蒸勞熱加
 蘇雷柴芩○妊娠胎動不安下血
 不止加艾膠芩○風虛眩暈加芫

卷五
○發熱心煩不得眠加連丹○
虛寒脈微自汗氣短自利加承○
經水過多加芩伽○經水溢少加
葵紅○赤白帶下加苳芷○血臍
虛冷崩中去血過多加膠艾○婦
人血積血瘀加稜茂桂乾漆○胎
漏下血腹痛加膠芩伽砂苳艾火
梗○子腫者面目虛浮加苓澤伽
芩丹門朴耳○產後發熱加柴芩
蘇○虛渴加參梅葛瑞○小兒生
下遍體皆黃加舌黧與○小兒
齒久不生加預沉耳為末擦齒根
調下塩湯○小兒血熱生瘡遍身
腫痒加芸芩○小兒尾骨節痛者

陰虛加酒溜或桂少或西蜜為引
如痛不止加乳波○加柴去芩名
增損四物湯治產後陰虛發熱或
日間明了暮發寒熱○去芩加參
永其入姜亦名增損四物湯治產
後陰陽不和如有惡露未盡停滯
胞絡亦能令人寒熱但小腹急痛
為異產後陽不和加芩林參
去芩加菴芸苳細苳蒼耳膏名加
減四物湯治產後血虛氣弱痰癖
寒厥背冷頭痛○如有汗者氣弱
頭痛加芩桂姜○痰癖頭痛加守
苓姜○熱厥頭痛加苳膏雷○寒
厥頭痛加天雄附姜○加陳芩丹

苓定各等參其各樣入姜棗是亦
名加減四物湯治瘦人頭眩者屬
血虛痰火也○四物加苳發砂入
姜棗名調氣養血湯專治婦人室
女血氣不和胎前產後諸病○氣
痛加吳○痰盛加二陳湯得此功
蓋婦女以血為主殊不知因氣不
調然後血脈不順故生諸病

按補益血虛之主藥也予連年
血虛發熱挫閃跌撲月水調理
鼻衄下血等照加減取奇効且
四物苦練增損四物調氣養血
等湯切得數効猶有加減之法
也

三

八物湯一飲八
治肝脾傷損血
氣虛弱惡寒發熱或煩燥作渴或
寒熱昏憤或胸膈不利大便不實
或飲食少思小腹脹痛或口舌生
瘡或齒齦腫潰或便血吐血盜汗
自汗等

參 伽 苓 芍 芩 芩 各
五 斤 一

右入姜棗煎服○氣弱胸膈痛脈細
緊或弦多從勞役怒氣得之加蜜
童或加官○淨婦由中氣怯弱不
能舉胎々歷其胞々繫了戾而小
便不通謂之轉胞合二陳煎湯探
吐之所以升提其氣上竅通而下

竅自利也○產後子腸不收加升
共以酒炒芪為君○小兒解懸者
用八珍若有熱加連煎服更以常
緊束及以白欬末付之

按四君四物二合之方故非氣
血兩虛者勿用之○心中惕々
然而跳動謂之怔忡加酸連門
煎湯調辰末服得奇効○產婦
大便七日不通加桔桃而得卒
効○一婦滑泄帶血懈怠不食
去平加木而二十餘貽得安全
十全大補湯 治氣血俱虛發熱
惡寒自汗盜汗肢麻倦怠或頭痛
眩暈口乾作渴久病虛損遺精白

濁二便見血小腹作痛小便短少
大便乾澇或咳而不利虛勞諸虛
不足五勞七傷飲食不進

八珍湯加芪桂各一

右煎服○氣血俱虛陰陽並損加
連○發熱加柴○嗽加會○痰加
守○汗加蛻○虛寒甚加附永○
骨蒸倍加柴○氣弱加參○惡寒
加桂○肌熱加錄○虛勞發熱加
柴錄丸○不時而熱或無定處或
從脚心起此無根虛火也加會門
○虛弱之人遍身痛倍桂加守○
久病虛損眼目昏暗見物不明久
服無附外二障之患加多沉附姜

東○產後薄勞四肢煩疼時發寒
 熱不思飲食加續會門姜葱○凡
 痲病有出汗多變症有因去血過
 多元氣虧極或外邪相搏以致牙
 關緊急四肢痲強或隕火內動或
 腰背反張肢體搖擲若有汗而不
 惡寒者曰柔痲若無汗而惡寒者
 曰剛痲由去血過多筋無所養故
 傷寒汗下過多遺膿膿血太泄多
 患之乃敗症也急以此湯治之如
 不應急加附
 按此湯治諸病屬氣血兩虛挾
 寒者也○骨蒸勞熱加錄平分
 是他家之秘也○男婦氣血虛

弱而眩暈加陳守定○食積痢
 或時赤痢或時水瀉或完穀俱
 出加漣曲澤守膠朮芸姜○一
 切痲病欲死者刺項髮際正中
 而出血且其上灸三二壯而興
 尚可用此湯殊傷寒汗下過多
 後或金瘡產後去血過多後或
 諸瘡膿血太泄後間成痲證時
 時以此湯得救矣○產後諸虛
 百損五勞七傷自汗盜汗諸熱
 亦然○手足麻木或疼痛去其
 加陳守芫膝菴附○夢遺精濁
 屬氣血虛損加山茱萸會門○
 產後乳汁自出用此湯而愈未

產而乳自出者亦可

五 滋陰降火湯

治陰虛火動發熱

咳嗽吐痰喘急盜汗口乾此方與

地黃丸相兼服之大補虛勞神効

沂 湯 各一符 芩 天 麥

伽 各 一 匙 分 陳 分 栢 雷 各 五

甘 少

右入姜枣煎臨服加竹瀝童便姜

汁少○骨蒸勞熱加蘇柴○熱不

退加承炆○盜汗不止加芪酸○

痰火咳嗽氣急生痰加桑苑芥瀝

○咳嗽痰帶血者難治加芥牡膠

丹苑犀瀝○乾咳嗽無痰及喉痛

生瘡声啞者難治加芥薑貝會杏

桑苑丹○咳嗽痰多津液生痰加

貝款桑○痰火作熱煩燥不安並

痰火怔忡嘈雜加酸丹連茹辰瀝

○痰火驚惕同上治○血虛腰痛

加膝伸○血虛脚腿枯細痿弱加

芪膠離伸去天○夢遺泄精去天

加預蛎伸膝紙○小便淋濁去芍

加車瞿薊蓄膝丹○陰虛火動小

腹痛去麥加茵木○陰虛火盛

足常熱去麥加丹膝○陰虛火動

而喘急者加軾沉桑瀝○陰虛火

動而眩暈加芩定丹瀝○煩渴引

飲小便如膏名之下消乃腎火也

去芍加瑞伽丹葛連梅○瘦人虛

火患赤白濁去馬加木解丹蓄○
膈下氣上發呃者陰火也加砂面
沉木丹辰柿蒂○虛怯人陰虛火
動小便不通加楮澤通膠○腎經
陰虛火動失血發熱盜汗咳嗽痰
喘心慌口乾是出火証○陰虛發
熱者是陰血自傷屬心腎○酒色
過度陰虛火動勞嗽寒熱盜汗痰
多午後至夜嗽甚或火嗽有聲痰
少面赤身熱脈數○吐
血後見痰是陰虛火動宜此湯
按陰虛火動勞瘵之主方也一
應發熱痰嗽自汗口乾者與之
而動惱入只與元氣虛損之極

可故察脈與眼色而後可與滋
陰降火湯矣脈細數而無力細
弦而數々大而虛是也眼情清
冷如肅然有悲是也大抵陰虛
症譬秋冬令故顏色青醒眼中
清冷惡寒發熱口乾聲濁兼以
咳嗽故間葛甦飲加杏會以有
退其症者若不退當宜此湯○
一人陰虛發熱咳嗽盜汗口乾
心慌加遠酸○發熱盛加柴葛
嗽盛加會款○痰盛加貝冀
盜汗多加酸蛻○胸不快加
陳○泄瀉加蓮陳去栢雷○心
慌退則去遠酸如此加減而半

歲得愈○午後潮熱盜汗大腑
結小水赤照加減經三月而安
○乾咳無痰盜汗聲啞腮熱小
便赤以加減煎湯與六味丸百
目許而安○吐血止而後惡寒
發熱盜汗痰嗽聲渴照加減一
年餘而安予察此證生者十得
二三○產後蓐勞四肢煩熱咳
嗽口乾盜汗與此湯得奇効○
老尼咳嗽發熱痰迷心竅而怔
忡加酸連二三貼而安○小兒
尾骨節痛加桂為引而安○或
語日降火症虫出攻胸咳嗽用
七味清脾湯則虫下咳止○又

云降火湯症熱難去則合黃連
解毒湯而得奇効○又云此症
有積聚者合大七氣湯而可

六

雙和散 治心力俱勞氣血俱傷

或房室之後勞役或勞役之後犯

房大病後虛勞氣乏等症

五

歸脾湯 治脾經失血少寐發熱

盜汗或思慮傷脾不能攝血以致

妄行或健忘怔忡驚悸不寐或心

脾傷痛嗜睡少食或憂思傷脾血

虛發熱或肢體作痛大便不調或

婦人紅候不準晡熱內熱或瘰癧

流注不能消散潰飲

芪參 伽苓 竹龍

眼 酸炒 粟 各一
蜜 其 各五
右入姜棗水煎 ○加柴胡名加味
歸脾湯

按此方兼理心脾神寧意定劑

清離滋坎湯 治陰虛火動咳嗽

發熱盜汗痰喘心慌腎虛脾弱等

症

地 芩 顛 門 斤 芍

預 山 菜 令 王 加 芋

相 雷 各 等 車

右煎服 ○盜汗加酸 蚘 ○嗽盛加

玄 欬 ○痰盛加貝 蔓 ○熱盛加蘇

黑 ○心 慌 加 酸 蕪 ○遺 精 加 龍 骨

蚘 ○胃 中 不 快 加 貴 ○泄 瀉 加 藜

陳 去 雷 栢 ○痰 盛 加 瀝 姜 汁 ○熱

加 童 便 一 盞 入 藥 同 服 ○若 吐 血

咳 血 加 鮮 生 地 黃 搗 汁 一 盞 同 服

此 病 陰 血 太 虛 每 日 五 更 飲 入 乳

汁 一 鐘 甚 妙 與 湯 藥 相 間 服 之 久

奏 效

按此方治勞瘵陰虛火動者

茯苓補心湯 治心氣虛面黃痺

血虛潮熱五心煩熱無汗咳嗽

人參養榮湯 治虛勞羸瘦短氣

倦怠飲食無味

芍 兩 斤 貴 芪 枝 參

加 車 各 一 半 令 各 七

薯 兩半

右入姜枣水煎服○遺精加龍○

咳嗽加膠

按此方治脾肺俱虛者

驚甲地黄湯 治虛勞手足煩熱

怔忡婦人血室乾癩瘦飲食不為

肌膚

驚 卞 柴 門 斛

加 令 丸 枝 參 其

各半

右入姜梅水煎服

保真湯 治勞症虛羸蒸熱

顛 門 玄 雷 栢 為

錄 貴 其 錢 斤 芪 參

伽 地 芩 令 稔 連

各五

右入姜枣水煎服○痰加星守貴

令奴洞薯○喘盛加柔貴肢蘿葶

軾○熱盛加丹連栢壳○風盛加

芸假金沸菊小苳○寒盛加參芍

枝玄○驚悸加令薯栢子酸○淋

濁加草蓂楮芋○便澁加通

和中湯 治虛勞赤白痢疾或腹

痛裏急後重 痰喘熱而痢疾者

斤 上 芍 加 令 中 貴 中 連 紅

右水煎食前溫服○紅痢加翠白

痢加永

▲血症 嘔血 衄血 吐血 便血 溺血 崩漏 疝瘕 痔瘡 下血 夫失血者雖有名色之異大槩俱是熱症但有新舊虛實之不同耳或妄言寒者誤也○肺癰之候口乾喘滿咽乾而渴甚則四肢浮腫咳唾膿血或腥臭濁味胸中隱々而微痛者肺癰也○肺痿之候久嗽不已汗出過度重亡津液便如爛瓜下如豕脂小便數而不渴者自愈欲飲者欲瘥此由肺多唾涎沫而無膿者肺痿也
脈諸症失血皆見孔脈隨其上下以驗所出大凡失血脈宜沉細設見洪大後必難治○腸辟下膿血

脈弦絕則死滑大則生血過身熱者死○肺癰脈寸口脈數而實者肺癰也數而虛者肺痿也若脈微緊而數者未有膿也若緊甚而數者已有膿也又脈短而濇者自瘥浮大者難治○腸癰寸口脈滑而數滑則為實數則為熱滑則為榮數則為衛令數下降榮滑上升榮衛相于血為濁敗
加味犀角地黃湯 治上焦火盛
口舌生瘡發熱或血熱妄行或吐衄或下血及不嗽血自來者
犀角 各二 地 二 赤芍 各一
犀 各二 地 二 赤芍 各一
連 苓 各 一
犀 各二 地 二 赤芍 各一

右煎服○如吐血成塊加鹿角一兩

十○衄血加丹膠○咯血加丹門

相雷方○唾血加丹門相雷方

○下血加即○吐血加天膠

按第一吐血之全方也○衄血

去犀玳加升側荆得奇効○一

婦人月水少來而止翌朝卒吐

血加井丹瑞而安

清肺湯 先吐痰而後見血者積

熱也

令貴斤地芍藥

門苓丹苑琴雪

右入鳥束水煎○喘急加軾去顛

滋陰降火湯 治吐血後見痰乃

是陰虛火動也 見于

黃芪湯 治咳血成勞

芪門苓利芍各一

右水煎○加參各六

清火滋陰湯 治吐血咳血嗽血

唾血嘔血

顛愛地牡丹赤芍

丹連預芋令其

右煎服

清咳湯 治咳嗽痰中帶血者

斤芍嬰貝各一

苓丹各八童利各五

右水煎服 ○潮熱加柴赤苓
清咯湯 治咯血
貴田 苓 雷 貝 牡
利 丹 各七 杏 參 各五 雪
一 桂 分
半 桂 分

右入姜水煎服
清唾湯 治鮮血隨唾而出
雷 貝 利 栢 苜 玆
蕪 門 各等 永 棧 粉

右水煎
補榮湯 治吐血衄血咯血咳血
嚼血用此調理
斤 芍 地 苜 苓 丹
門 貴 各等 參 耳 各減

右入梅 棗 水煎服
加減四物湯 治吐血
地 斤 芍 丹 王 貝
雷 栢 貴 伽 苜 玆
門 各等

右水煎 ○身熱加錄苓 ○嘔吐加
焦 ○衄咳血加茅根黃苓 ○唾咯
血加桂 謝 ○吐血不止加永 照 栢
葉苗根小薊 ○便血不止加槐 卯
百草霜 ○瀉血不止倍丹加苜小
薊 ○諸失血久加周參參入童便
姜韭汁

加減逍遙散 治痰中見血
王 伽 斤 芍 嬰 貝 各

加減逍遙散 治痰中見血
王 伽 斤 芍 嬰 貝 各

王 伽 斤 芍 嬰 貝 各

芩丹 各八分 利分童分耳三分

右水煎服

理中湯 治飲酒傷胃吐血者

本方加 永齊 中規

解鬱湯 治衄血

柴連 芩 芪 錄 地

熟芍 各等分

治鼻衄方 用梔子炒黑為末吹

入鼻中立已

又方 用菘豆粉五錢細茶五錢

為末冷水調服

清肺湯 治大便下血不問糞前

糞後并腸風下血

地 斤 印 芍 連 各六分

芩 丹 栢葉 各七分 芎 槐角 各五分

右煎服 一方去參加苦 腹脹

加貴 氣虛加參 伽蜜 腸風加

假 氣陷加周 心血不足加苓

虛寒加 永 燭

當歸和血散 治腸澀濕毒下血

斤 周 各二分 槐 童 假 伽

芩 各六分

右水煎服 又為末米飲下

敗毒散 治風熱入大腸經下血

不止

本方加 雪蘭 永梅

酒毒下血或食毒下血加連

四又

胃風湯

治風濕乘虛入腸胃或

下瘀血

治

三九

生地黃散

治血屬熱及鬱熱吐

衄血并治

地 芩 茵 陳 芍 藥 連 耳 各 等

右水煎服

三九

清腸湯

治小便出血心移熱於

小腸

斤 地 丹 黧 連 芍 藥 栝

句 枳 殼 翁 蓄 雷 門 等

分 其 煎 服

右入灯心烏梅水煎服○溼中痛

加液奴去芍苓

四九

桔梗湯

治肺癰咳嗽膿血咽乾

多渴大小便不利

利 貝 斤 萹 葶 雪 芸

杏 百 合 芪 奴 薏 苡

各等

右入姜煎服○大便閉加麝○小

便閉加翁○喘急加葶○口燥加

芩○一方加玄錄

五九

參芪補肺湯

治肺癰腎水不足

虛火上炎咳吐膿血發熱作渴小

便不調

參 芪 伽 令 貴 斤

預 山 茱 玄 門 苴 各 五

半 王 一

右水煎

參朮補脾湯

治肺癆脾氣虛弱

咳吐膿涎中滿不食凡肺癆見膿血久不愈必兼服此藥以補脾生肺否則不治

參 各二錢 苳 二錢 芩 二錢 貴

升 各二錢 周 分門分利分玄分其

分五

右入姜水煎

治肺癆方

蕪 斤 利 貝 芷 各一

右水煎

人參平肺散

治心火克肺傳為

肺癆咳嗽喘嘔痰涎壅盛胸膈痞

滿咽喉不利

雪 雷 分 甘 錄 貴 各五錢 玄

糲 芩 童 參 顛

右入姜煎服○熱加芩水田○午

後熱聲嘶加杏利○有膿血將變

癰加死

三仁湯

治腸癰腸中痛煩毒不

安或脹滿不食溺澀婦人產後虛熱多有此病縱是非癰症疑似之間便可服之

薏 二錢 芩 二錢 嬰 王

各一

右水煎服

牡丹散

治腸癰冷症腹滿而痛

時々下膿或血

王參定苓芪薏

嬰芷 芎 桂 其

各五 蜜分

右水煎服

大黃湯

治腸癰小腹堅腫按之

則痛肉色如故或微赤腫小便如

淋汗出增寒其脉遲緊膿味成者

宜急服之

虎 芒 各一 王 萸 嬰 各二

右水煎服

▲積聚

夫積者陰氣也其發有常處其痛不離其部上下有所終始左右有

所窮處聚者陽氣也其始無根本

上下有所留止其痛無常處蓋氣

之所積名曰積氣之所聚名曰聚

故積者五臟所生聚者六腑所成

癥者腹中堅硬按之應手如地癥

者中雖硬忽聚忽散無常未及癥

脉來細而附骨者積也在寸口

積在胸中在關上積在臍傍在尺

部積在氣冲脉在左積在左脉在

右積在右脉兩出積在中央○脉

來小沉而實者脾胃中有積聚不

可食々則吐

指迷七氣湯

治五積六聚狀如

痛攻刺脇助上氣窒塞喘嗽小腹
腹脹大小便不利此方積塊屬寒
者宜用也

稜 莪 藪 陳 藿 桔

桂 益 莎 茸

右入姜煎服○心脾痛加枳實○
加虎栝治諸般痞積面色痿黃肌
躄羸瘦四肢無力皆緣內有蟲積
或好食生米或好食壁泥或好食
茶炭鹹辣等物者只此一服除根
空心服後食頃腹心痛當下○七
情相于陰陽不得升降氣道壅滯
攻衝作疼去稜加守姜連○枳冷
腹痛七氣四肢面色青白加守姜

棗

按治七氣及蟲積聚之方也○

一小女患痔腫痛已潰壞而血

多下俄發心痛欲死加味七氣

湯二貼而安○心痛甚者大七

氣湯加梅沉栝切得奇妙○胸

支因蟲而瘦不食顏色青者指

迷七氣湯加栝而安○常有積

之人患瘧寒熱往來腹皮堅張

無汗數方不應指迷七氣湯加

永麻二貼而安○積塊屬寒者

宜指迷七氣湯若屬熱者宜用

柴平湯時々取卒功

三四 潰堅湯 浴五積六聚諸般瘕瘕

痰癖血塊之總司也

斤 伽 田 貴 洞 莎

砂 查 朴 蜜 各等

右煎服○左腸有塊加芎○右腸

有塊加童○肉食成塊加麵粉麵

食積加曲○血塊加嬰紅桂去田

查○痰塊加海石瓜萋枳實去查

○飽脹加蘿核去加○壯健人加

茂○瘦人加參

按此方治積塊痰與食積

柴平湯 治積塊屬熱者

柴 芩 田 蒼 朴 貴

查 童 奴 曲 削 茂 各

分 耳 核

右入姜枣水煎服○温瘧腹有塊者宜此湯

散聚湯 治九氣積聚心腹疝痛

攻刺腰脇二便不利

守 枳 斤 各 四 貴 杏 官

苓 各 一 車 炮 各 五

朴 菜 各 一 虎 或 一 大 便 秘

右入姜水煎服

枳殼散 治五積三焦痞塞嘔吐

痰逆吞酸

奴 削 貴 益 茂 洗

枝 各 一 良 朴 童 多 蜜

落 各 五

四四

五四

六四

卷五

七

右入姜枣水煎服

青皮湯 進食健脾胃消積化聚

童叢茂 削各五貴 曲各五分

延分

右入姜煎服 痞滿加連 尚加

丹 少食加查并 婦人加莎

紅蜜 氣冷作痛加泉蜜丸 五積

六聚癥瘕癖塊元氣虛弱肌體瘦

怯飲食不進四支沉困者補中益

氣湯 附鼓脹 大七氣湯而用之

水腫附鼓脹

經曰諸濕腫滿皆屬於脾夫脾虛

不能制水々漬妄行故通身面目

手足皆浮而腫名曰水腫

有水氣者微腫先見於目下

經曰諸腹脹大皆屬熱 腹滿臌

脹支膈脹腸下厥上胃過在大陰

陽明乃寒濕鬱遏也

夫脹者由腸胃之氣虛弱不能運

化精微而致水穀聚而不散故成

脹也然飲食失節不能調養則清

氣下降濁氣填滿胸腹濕熱相蒸

遂成脹滿經曰鼓脹是也中空無

物有似於鼓小便短濇不利其病

膠固難以治療

脈丹溪曰水腫脈多沉伏病陽水

兼陽証脈必沉數病陰水兼陰証

脈必沉遲 水病脈洪大可治微

細不治○脈實生虛死○鼓脹脈
弦脾制於肝洪數熱脹遲弱陰寒
瀉為虛脹緊則中實○浮大者生
虛小危急

八回

分消湯 凡水腫者宜徒脾去濕

利水而各實脾飲治中滿成鼓脹

兼治脾虛發腫滿飽悶

蒼 加 苓 陳 朴 實 各

冬 莎 楮 澤 腹 各 八 砂 分 七

蜜 另 分

右入姜燈煎服○氣急加沉○腫

脹加葡萄○脇痛面黑是氣鼓去加

加童○腸滿小腸脹痛身上有血

絲縷是血鼓去加苓加芍芍紅牡

○噎氣作酸飽悶腹脹是食鼓去

參苓加查曲芽葡萄○惡寒手足厥

冷瀉去清水是水脹加官○胸腹

脹滿有塊如鼓者是痞散成鼓去

加苓楮澤加查曲守童近索驚○

發熱去瀉加丹連○泄瀉去枳加

芍○小水不通去木加通滑○飲

食停滯去加查曲○惡寒手足

厥冷脈沉細加官少腰以上腫加

藿○腰以下腫去加膝相○胎

腹腫脹飽悶去加葡萄

按水腫脹滿之全方也以平胃

和脾胃以四苓通小水以實腹

消腫脹以沙砂除食後之飽悶
 以蜜運氣若氣下陷加升柴朝
 急屬氣虛加參暮急屬血虛加
 連介芍芎朝暮急者氣血俱虛
 宜双補之猶因加減有數奇○
 小兒面目周身浮腫此方一二
 貼而如故

九四

補中治濕湯 朝寬暮急血虛暮
 寬朝急氣虛朝暮急氣血俱虛治
 腫脹大法宜補中行濕利小便以
 參朮為君蒼陳苓為臣芩門為使
 以制肝木少加朴以消腹脹氣不
 運加蜜翁氣下陷加升柴提之血
 虛加補血藥痰盛加利痰藥隨證

加減用之無不効者

參 加 二 分 一 分 精 苓 陳
 門 斤 通 各 九 分 淡 升
 各 三 分

右煎服

按纂要正傳等有論無分兩一
 漢叟發開而去其木柴加斤著
 分兩以治脾胃虛感濕為腫脹
 今世醫以是治腫脹而不効矣
 愚能治之蓋有青武虛人病後
 腫脹或虛症脚氣或產後腫脹
 皆能有効近及一女產後患腫
 脹且每曉痰支咽驚醒衆工東
 手愚謂血大下而血氣虛故此

湯三十餘貼而全愈

十五

五皮湯

治風濕客於脾經氣血

凝滯以致面目虛浮四肢腫滿心

腹膨脹上氣促急

腹皮 苓皮 姜皮 五加

地骨 各等

右煎服 ○一放去五加地骨用陳

桑 按治風濕腫滿之方也 ○熱病

後俄面目四肢浮腫短氣喘促

用七味而頓愈

一五

廣木漬堅湯

治中滿腹脹內有

積塊如石形如盤大坐臥不安二

便澁滯上氣喘促通身虛腫

守 分 朴 斤 漏 苓 益

連 各 五 柴 童 陳 曲 澤

升 各 三 菝 升 紅 吳 各 二

右入姜煎服 ○渴加葛

按用有積塊而生腫脹者矣殊

此湯用熱脹而可也若冷脹當

用大七氣湯

二五

加減胃苓湯

治水腫

蒼 半 芩 貴 伽 瓜 赤 苓 各

不 楮 芋 各 一 腹 朴 曲

洗 莎 各 八 查 砂 各 七 井 三

右入姜煎服 治氣為痰飲所隔

加味枳木湯

治氣為痰飲所隔

心下堅脹名曰氣分

三五

洞 伽 水 桂 貴 洗
利 蜜 五 靈 田 苓

右入姜煎服

七情停痰鬱為濕熱小便閉者宜
分心氣飲或木香流氣飲分氣補
心湯等

四五

行濕補氣養血湯 治氣血虛弱
單腹鼓脹浮腫

芎 藭 各一 水 貴 朴 腹
羅 海金 翁 各八 蜜 其 三
分參 加 令 斤 各一

右入姜煎服 氣虛倍參加
苓 血虛倍斤芎為 小水短少

加猪芋滑 服後腫脹俱退惟面
足不消此陽明經氣虛倍用加苓

按此方治腹脹脾胃氣血俱虛
者

五五

和榮順氣湯 治脾弱血虛心腹
脹悶兩足虛腫

斤 芍 加 苓 參 蒼
貴 洞 曲 菠 瓜 膝
搖 羊 薏 翁 各一 芎 分 其

右入姜煎服

六五

寬中養胃湯 治胸膈脹滿飲食
少用

蒼 莎 分 奴 朴 婆 苓

田各五曲 洞各四查 硃

右入姜水煎服

木香順氣湯 治濁氣在上則生

膜脹

加不蒼 斤五分 童 貴 益

苓 芋 永 田 吳 各二分 柴

右水煎服 蜜分 朴分 漏分

分氣紫蘇飲 治男婦脾胃不和

胸膈噎塞腹脇疼痛氣促喘急心

下脹悶飲食不思嘔逆不止

水一分 腹 雪 甘 利 珍

苓 玄 各二分

右入姜水煎入鹽少許

草豆蔻湯 治腹中虛脹

洞 田 漏 益 甘 各五分 苓

斤 各七分 童 貴 各六分 曲 分 蜜 分

芋 分

右水煎服

補氣建中湯 治鼓脹元氣脾胃

虛損

參 苓 土 炒 各五分 加 炒 苓 各 五分 蒼

陳 各 一分 朴 愛 澤 各 五分

右水煎服 朝急暮寬者倍參加

肥白氣虛者亦同 朝寬暮急者

加連 斤 芍 芫 芩 減 參 黑 瘦 人 氣

熱亦同 朝暮急者氣血俱虛宜

雙補之○氣不運加翁木○氣下
脂加升柴

▲黃疸 穀疸 蠱脹 癰疽

夫黃疸為病肌肉必虛腫而色黃
蓋濕熱鬱積脾胃之中久而不散
故其土色形于面與肌膚蓋脾主
肌肉肺主皮毛母能令子虛母病
子亦病矣

丹溪曰不必分五等是濕熱如盆
麤相似

脈五疳實熱脈必洪數其或微澀
証屬虛弱 大抵脈大者死微細

者生
清熱除濕湯 治濕熱鬱蒸於脾

作五疳

連 芩 丹 茵 楮 澤
蒼 童 游

右煎服○穀疸加稜菰陳砂曲○

身熱加柴○小水短赤加栝○大

便實加芎○胸膈飽悶加藟苓○

飲酒人加萹葛○虛弱人加參○

按治黃疸之主方也

茵陳散 治濕熱發黃
茵 丹 赤苓 楮 芋 蒼
洞 連 朴 滑 各等

右入燈草水煎服○身熱加柴○

小水短赤加栝○胸膈飽悶加藟
苓○飲酒加萹齊砂去滑

三六

茵陳大黃湯 治黃疸大便結實
茵 虎 洞 丹 朴 滑 等
分各五

四六

右入燈草水煎服
腎疸湯 治腎疸目黃或渾身黃
小便赤澀

五六

右水煎服
黃芪湯 治黃汗
本 四 門 漏 各 一 赤 芍 茵 各
分 五

六六

按此方治黃汗身體腫熱不
渴汗出淡衣黃色
白朮湯 治酒疸
伽 枝 各 一 洞 葛 本 甘
漏 各 五

七六

按此方治酒疸因下後變為黑
疸目青面黑心下如啖蒜齏狀
秦朮湯 治五疸口淡耳鳴脚弱
寒熱小便白濁此虛疸也

八六

右入姜水煎服
貴 小 草 芩 朮 守
各 五

九六

右入棗水煎服

△疝氣

丹溪曰疝氣者畢九連小腹急痛也。有痛在畢九者有痛在五樞穴邊者皆足厥陰之經也。自素問而下皆以為寒。々々主收引。經絡得寒則收而不行。所以作痛。○大抵此証始於濕熱在經。鬱而久。又得寒氣外束。不得疎散。所以作痛。若只作寒論。恐為未備。

腸中走氣作聲或痛者。是盤腸氣也。○小腹陰囊手按作響。聲痛者。是膀胱氣也。○小腸臍傍一梗升上釣痛者。是小腸氣也。○小腹下注上奔心腹急痛者。腎氣也。

脈弦急積聚在裏。牢急者。生弱急者。死沉遲浮濇。疝瘕寒痛々甚。則伏或細或動。

八六

吳茱萸湯 治厥疝腹中冷痛積氣上逆。陰囊冷。

吳茱萸 五錢
 川烏 小各五錢
 枝 永各二錢

九六

神効湯 治一切疝氣。

蜜 吳 苗 延 益 蒼
 莎 斤 川烏 丹 各一錢
 其 三 砂 七

右入姜燈草水煎服。○脹悶如痛。加乳洞。○有瘀血脹痛。加嬰芎去。

益丹 ○腎氣注上心痛悶欲絕者
加泉洞去益丹

一切疝氣多因熱鬱於中宜此
湯

烏苓通氣湯 治一切疝氣無間

遠近寒熱風濕寒氣

柴 斤 芍 查 貴 各
佛 苓 洗 延 芋 各 五
蜜 其 各 三

右入姜水煎服 ○惡寒脈沉細加

烏附通氣湯 治新久疝氣風寒

暑濕七情皆効

加 苓 芋 猪 其 蜜
各 三 分 各 一 分

右水煎服 ○痛甚加洗延 ○脈沉

細惡寒加吳

五積散 疝氣發於寒月宜此湯

行氣香蘇散 治偏陰去氣疼痛初

起增寒壯熱甚効 飲視 本方加

苗蜜削茂翁

三和散 治疝最上主方也 於

補腎湯 治寒疝入腹小腸氣痛

時泄瀉胸膈痞塞

參 芪 苓 走 炮 加 各 二 瓜

一兩 麩 半 卷 兩 沉 木 芎 其

各二

右入姜枣水煎服○嘔吐加守兩

汗証

夫汗者心之液也心動則湯然而汗出也
有自汗者有盜汗者自汗者不因發散而自然出也
盜汗者睡汗出及覺則不出矣自汗之証味有不
由心腎俱虛而得者故陰虛陽必溼發熱而盜汗
陽虛陰必衆發厥而自汗此陰陽偏勝之所致也
脈浮虛或濡或濇自汗在寸盜汗在尺多汗虛小者
吉緊數者凶

凡內傷及一切虛損之証自汗不

休總用補中益氣湯加走

麻根浮麥以殺其熱發汗之

至微其引參苓等藥○如左寸脈

浮洪而自汗者心火炎也倍參芪

加門會連各五○如在關脈浮弦

而自汗者挾風邪者也加芍枝五

分若不陰虛只用桂枝湯可也○

左尺脈浮洪無力而自汗者水虧

火盛加栢雷各五 芎 壯水之主

以制陽光○右寸關脈浮洪無力

而自汗者只依本方倍參芪○右

尺脈洪數無力而自汗者或盜汗

相火挾心火之勢而尅肺金也

宜當歸六黃湯

當歸六黃湯

治盜汗屬陰虛者

斤 芪 各 地 芎 柏 苓

連 各 七 分

右煎服

按此方治盜汗之聖方也

當歸地黃湯

治盜汗屬氣血兩

虛者

斤 芎 地 湯 加 苓 各

芪 蜜 各 相 雷 陳 各 八

參 五 分 三

右入棗浮麥煎服

按二方治盜汗之聖藥也○氣

虛有自汗宜用醫王陰虛火動

參芪湯 治自汗

參 芪 加 苓 斤 芎 各

牛 其 分 加 芍 酸 蛎 各 一 貴

分 梅 一 分 二 板 小 麥 搗

右水煎服

按自汗者屬陽虛時常出也

茯苓補心湯

治心汗証

苓 參 加 斤 地 酸

芍 門 貴 連 各 一 分 棗

救梅加小麥樹

右水煎服

參芪附子湯

止虛汗

參久芪五

耳分起五分

右水煎服

眩暈

眩暈者言其黑運旋轉其狀目閉眼暗身轉耳聾如立舟車之上起則欲倒益虛極乘寒得之亦不可一途而取軌也○夫健忘者由憂思過度損其心胞以致神舍不清遇事多忘病在心脾也○狂者心胸躁動謂之怔忡此心血不足也

成○驚悸者即動悸也動之為病

惕然而驚悸之為病心下怯々如

人所捕皆心虛胆怯之所致也又

日驚者恐怖之謂悸者怔忡之謂

怔忡健忘驚悸三症各異而病同

脈眩暈左手脈數熱多○脈波而

芤有死血○右手脈實有痰積○

左手人迎脈緩而浮大者屬風脈

虛大必是久病○寸口脈動而弱

動為驚弱為悸○心中驚悸脈必

伏結飲食之悸沉伏動滑

清暈化痰湯 治諸般眩暈

陳守 苓 各一 實 一 泠 苦

各八 芷 卷 各 七 星 芸 細

各六分 其分三

右入姜煎服 ○氣虛加木參七分

血虛倍芍加斤 ○有熱加連六分

按治眩暈之總司也 ○予常療

痰火逆上胸中煩熱頭重足輕

大陽經強脉弦數去弓芷細加

推定連丹而安又心悸怔忡目

暈吐逆亦可

清火安神湯 治驚悸怔忡心神

慌亂

斤二分 地 酸 煨 各 各 各 各

連 各 八 門 芍 丹 速 各

右入姜煎服

按治怔忡之主方也

四君子湯 治氣虛濕痰頭眩

參 加 苓 芪 斤 弓

貴 田 定 利 芷 各 等 各 各

右入姜煎服

按此証肥人頭眩者屬氣虛者

宜此湯

加減四物湯 治血虛痰火頭眩

斤 芍 芎 苈 芍 貴 苓

丹 各 等 各 各 各 各

右入姜煎服

按此証瘦人頭眩屬血虛痰火

者宜此湯

五八

加減二陳湯 忽時眩暈倒者是
風痰也脉浮滑者宜此湯

茯苓 桂枝 芍藥 甘草 人参 附子
加減 茯苓 桂枝 芍藥 甘草 人参 附子
分 茯苓 桂枝 芍藥 甘草 人参 附子

右水煎加瀝姜汁

六八

滋陰健脾湯 此治氣血虛損有
痰作眩暈之仙劑也

加減 茯苓 桂枝 芍藥 甘草 人参 附子
地 各八分 耳分 參 田 神 愛
速 各七

右入姜枣水煎服

此証臨事不寧眩暈雜者此
心脾虛怯也宜此湯

七八

飯脾湯 健忘之主方也方詳于
虛損

八八

四物安神湯 治心中無血養故
作怔忡兼服辰砂安神丸

芍藥 熟地 川芎 當歸 辰砂 安神丸
神丹 酸炒 連 愛 茹
辰 梅 知 棗 煨 米 櫛

右水煎服

九八

二陳湯 治痰因動作怔忡本方
飛門加洞愛茹連丹參加斤辰梅

十

養血安神湯 驚悸屬血虛火動
者宜養心以清火也此湯主之

斤 芍藥 貴 相子 連

各五分 伽 酸 分 七 地 神 各 一

三水煎服

一九

益氣安神湯

治七情六淫相感

而心虛夜多夢寐睡卧不寧恍惚

驚怖痰癆 斤一 一分 地 愛 遠 酸 煨 神

參 芪 膽 竹葉 各 一 連 分 八

二九

右入姜棗水煎服

茯神湯 治神不守舍

神 一 斤 各 一 參 芪 分 二

燈草煎先用硃砂末二分點舌上

後以此湯送下以上健忘眩暈驚悸怔忡四証通用飯脾湯宜之

消渴

經曰二陽結謂消東垣曰二陽者

陽明也手陽明大腸主津液若消

則目黃口乾乃津液不足也足陽

明胃主血若熱則消穀善飢血中

伏火乃血不足也結者津液不足

結而不潤皆燥熱為病也此因數

食甘美而多肥故其氣上溢轉為

消渴

脈消渴肝病心滑而微或緊洪數

陽盛陰虛血虛濡散勞則浮遲短

浮莫治數大難醫

三九

黃連地黃湯 治三消渴

連地 瑞玄 斤 濃

齊 匿 愛 露 各等

右入姜棗竹葉水煎服 ○上焦熱

加丹利 ○中焦渴加苓 ○頭眩渴

不止者加羔 ○下焦渴加屠雷

四九

黃芩湯 治上消渴症

芩 丹 利 斤 地 愛

齊 參 瑞 余 各等 梅 一

右水煎服

五九

按上消肺火飲水多而食少也

麥門冬湯 治心移熱於肺名曰

膈消心膈有熱久則引飲為消渴

參 葛 神 各等

右水煎服

六九

滋陰降火湯 治下消渴小便濁

淋如膏去知母芍藥加白朮天花

葛粉炒連枕梅

小便閉大便閉

閉者小便急滿不通也有氣虛者

血虛有痰有熱有風閉皆宜吐之

以提其氣々々升則水自降蓋氣兼

載其水也譬如滴水之器上竅閉

則下竅不出使吐之是開上竅之

法也 ○大便閉腎至五液津液潤

則大便如常若飢飽失節勞役過

度損傷胃氣反食辛熱厚味之物

而助火邪伏於血中耗散真陰津液虧少故大便結燥

脈小便不通脈浮弦而濇花則便紅數則黃赤便難為癰實見左尺

燥結之脈沉伏勿疑熱結沉數虛結沉遲若是風燥右尺浮肥

七九

潤燥湯 治大便閉結不通

嬰紅升虎麻子仁
廿斤各一 地芩各五

右煎調換末五分食前服○一方去紅升加杏朴苓○發熱加柴○

腹痛加蜜○血虛枯燥倍升芩嬰紅○風燥閉加羌皂莢○氣虛而

開加參郁○氣實而閉加枳蜜○

痰火而閉加薑瀝○老人倍升芩

地加參門郁以用嬰○產婦去嬰倍升芩加參

按治秘結之主方也○效執之後大便不通此湯立應○若此

湯不効則三和散得數奇

八九

導滯通幽湯 治大便噎塞不通氣不得下

周斤 嬰各一 地芩各五

右水煎入楨榔末五分或火麻仁泥調用一方加虎名當飯潤燥湯或

加紅苓一分 按此方治幽門不通上衝吸門

九丸

不開壹塞氣不得上下大便難

大黃飲 治身熱大便不通

虎骨 丹 奴 厥 參

杏 各五 地 兩 廿 半

右入姜水煎

百

猪苓湯 治熱結小便不通

翁 猪 羊 滑 奴 栢

倍 愛 句 米 各等 廿 半

右入扁蓄附燈草煎服

一百

參芪升麻湯 治虛人小便不通

參 斤 地 於 猪 羊

梔 奴 倍 栢 雷 各等 周

火 廿 半

右入燈草水煎服

按虛熱小便不通者是熱結也

二百

二陳湯 治痰氣閉塞小便不通

貴 守 奴 倍 猪

翁 丹 愛 米 栢 各等

廿 半

右入燈草水煎

三百

厚朴湯 治胃虛而秘者不能飲

食 小 便 清 利

伽 夷 貴 夷 朴 半 廿 守 各 二

右入姜水煎服

四百

三和散 治七情之氣結五藏心

腹痞悶大便秘結氣閉

大黃芍藥湯 治大人小兒風與血滯留蓄上焦胸膈高起大便不通

鹿 芍 枳 桔 各一 木 其

炙各五分

右入姜水煎食遠服

淋症

原其為病之由皆膏粱之味濕熱之物或燒酒炙肉之類皆過成痰以致脾土受害之力不能運化精微清濁相混故使肺金無助而水道不清漸成淋閉之候或謂用心太過房勞無節以致心腎不交水火無制清陽不升濁陰不降而成

天地不交之否古方有五淋之別氣砂血膏勞是也

脈少陰脈細而數為氣淋婦人則陰中生瘡○脈盛大而堅者生○塵細而濇者死

五淋散 治肺氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不出或如豆汁或如沙石或冷淋如膏或熱淋尿血皆効

赤芍 丹 各五 赤苓 三 升 其 芩 半

右水煎空心服○一方有地澤通

滑車○膏淋加薤○氣淋加童○

勞淋加參○熱淋加連○肉淋加

翹○石淋加葦○尿淋加車○死
血淋加桃牡索瓊○老人氣虛作
淋加參芪升

按治諸淋之主藥也○久患淋
病項陰莖腫膿出足常冷加地
膝相力牡翹翁去苓而安○淋
病膿出澀痛尿黃脉遲去苓加
地通翹膝力灯

七百

八正散 治心經蘊熱臟腑閉結
小便赤澀陰閉不通及熱淋血淋
如酒後恣慾而得者則小便將出
而痛既出而痒以此藥主之
虎 嬰 遇 滑 蓄 丹
車 甘

右入灯煎空心服○治下焦積熱
二便閉澀多渴咽乾口舌生瘡腫
痛

按二便通利之至藥也○一人
入熱湯則不通漬冷水則能通
身熱渴脉沉實與此湯而安○
產後六日患淋病胸脇痛身熱
咽乾合四物湯而得卒効一男
夜必足心熱小便澀頭中鳴加
赤芍斤弓芷蒞入姜而安

八百

清心蓮子飲 治心中煩燥思慮
憂愁柳膏小便赤澀或有沙漠夜
夢遺精遺瀝澀痛便赤或酒色過
度上盛下虚心火上炎肺金受尅

故口苦咽乾漸成消渴四肢倦怠
 男子五淋婦人赤白五心煩熱此
 藥溫乎清心養神秘精大有奇効
 蓮參各二瓦蜜赤苓各二門
 錄參車各一廿一
 右入灯心根姜麻煎服○上盛下
 虛加酒溜各一○發熱加柴芎各
 半○一方有柴半治熱在氣分
 口乾小便白濁夜間安靜晝則發
 熱又治口舌生瘡或口苦咽乾燥
 作渴小便赤澁或下淋不止或莖
 中作痛○熱治心虛有熱而溺濁
 之至方也○不因老壯氣弱常有
 餘瀝服此湯久皆驗

九百

必効散

治一切淋症

斤地 粉 倍 丹
 愛奴 相雷 蓄翁
 分其 其 等

右入燈草水煎服○血淋加蒲黃
 茅根○膏淋加草薢○氣淋加童
 ○勞淋加參○熱淋加連○肉淋
 加堯○石淋加葶○尿淋加芩○
 死血淋加嬰王延瑰去栢雷○老
 人氣虛作淋加參芪周少許去栢
 雷蓄滑

按五淋者因酒色勞力傷腎虛
 中有熱

四百

益元固真湯

治縱慾強留不泄

淫精滲下而作淋者

參 令 葎 戟 周 益

栢 谷 二 芋 半 耳 半 預 半

右水煎服

龍膽瀉肝湯

治小便澀滯或莖

中痛

遊 芋 各 一 半 芥 翁 地 斤

丹 芥 耳 各 五 分

右水煎服

按此方治肝經濕熱兩脇腫痛

或腹中疼痛

補中益氣湯

治五淋有

効然淋症多是膀胱之氣虛損不能運用水道故滯不通而成諸淋

也此方補元氣故有効焉

溺濁 遺尿 遺精

夫赤白濁者由腎水虛少膀胱火

盛小便去泄所以成濁也○丹溪

曰胃中濁氣下流滲入膀胱赤者

濕熱傷血分白者濕熱傷氣分○

遺精者夢與鬼交而泄曰夢遺或

隨溺而出曰精滑大抵屬心虛腎

虛也○夢遺精滑者世人多作腎

虛治而用補腎澁精之藥不効殊

不知此症多屬脾胃飲酒厚味痰

火濕熱之人多有之

脉 兩尺脉洪數必便濁失精○心

脉短小因心虛所致必遺精便濁

○女人尺瀉而弱者或洪數而促者皆為便濁白帶○遺精便濁當驗於結扎動緊二症之的

滋榮養衛湯 治身體虛瘦夜常遺尿失禁及小便頻數

伽 預 沂 汾 茂 蜜 各 參
八 益 山 菜 酸 七 分 耳 分 分

右水煎溫服

附參耆湯 治氣虛遺尿失禁

參 陳 茂 蜜 苓 沂 芩
伽 谷 一 益 八 分 升 桂 各 五 耳 分 分

右入姜枣煎空心服○年老之人虛寒遺溺者加附

按二方治遺尿之主藥也○二

十餘歲女子行立坐卧不知溺出殊寢數登朽脉細緊參耆湯加附三十餘貼而愈
去益升桂加 芍 酸 煨 蛎 各 一 梅
分 入 枣 浮 麥 煎 服 治 自 汗 之 聖

藥也

水火分清飲 治赤白濁

益 薤 菖 根 朮 朮 楮
芋 伽 貴 奴 甲 各 等 耳

右入半酒半水煎服

按此方赤白濁兼治之劑

滋腎散 治白濁初起或半月者

極効

薤白 芩 麥 酒 鬼 女

各等分

右入竹葉 燈草水煎服

導赤湯 治溺如米泔色不過二服即愈

服即愈

翁滑 耳 相 令 地

奴伽丹

右水煎服

參芪湯 治氣虛遺尿

參 芪 苓 斤 芩 伽

貴 各一 益 八 升 枝 各五 耳 分 分

右入姜 水煎

定心湯 治心氣不足 榮血衰少

夢驚遺精白濁

薄荷 令 神 芪 各三 伽 赤

石脂 芎 朴 各二 變 半 苑

枝 芸 甘 各一

右水煎服

清心湯 治夜夢與人交感而泄

精謂之夢精又久無房事而精自

出者連地 升 參 神 酸 菡 萸 水煎

神芎湯 治遺精經久腎氣下陷

玉門不閉不時漏精

周 芎 參 梅 甘 萸

芪 斤 錄 破 杜 伽

各等分

右入姜 煎 水煎服

十味溫膽湯 治夢遺驚悸

貴^上 粉^上 減^上 參^上 苓^上
藥^上 粉^上 醜^上 耳^上 各^上
右入^上 五^上 味^上 九^上 姜^上 水^上 煎^上 服^上
分^上 各^上 九^上 分^上 各^上 三^上 分^上 各^上 五^上

