



類合

衆方規矩大全

卷之八

小兒科

疳疾

感冒

腹脹

泄瀉

癰疾

喘急

初生通用

麻疹

急慢驚風

癰疾

傷食

腹痛

痢疾

咳嗽

雜病

痘疹水痘








合類衆方規矩卷之八

▲小兒科

小兒諸病但見兩眼無精光黑精  
無運轉目睫無眸芒如魚眼猫眼  
之狀箇々不治或神藏於內但外  
若昏困者無妨其有病篤而眼神  
氣不脫者猶可以活眼者五臟六  
腑神氣之所究神氣已脫脉雖僅  
存亦未能保

一歲至六歲曰嬰孩以男左手女  
右手次指三関脉爲驗病輕重死  
生之訣名曰虎口

第一節名風関無翳則無病有  
翳則病輕





第二節名氣關脈見則病重

第三節名命關脈見則病劇九

死一生惡候也三關通瘦脈候

是極重之証必死

三關通度斜入指押者不治

三關紋色主歌

紫熱紅傷寒 青驚白色痺

黑時因中惡 黃即因脾端

凡診小兒大指按三部一息六七

至平和八九至發熱五至內寒弦

脈風癩沉緩傷食○七八歲日數

九十歲日髻始可以一指探掌後

三部之脈以一息七八至為無病

○十一歲至十四歲日童州以一

息五六至為常脈

急慢驚風

夫急驚之候因聞不常之聲或驢

馬禽獸之吼以致面青口噤或聲

嘶而厥發過則容色如故良久復

作其身熱面赤引飲口鼻中氣熱

大小便黃赤惺々不睡蓋熱甚則

生痰々盛則生風偶因驚而發耳

鎖驚散

治驚風搐搦痰嗽喘熱

星 芸 蟬 苛 甘

右入姜煎服

按急驚之主方也初發時予與

九文加定蚕錄而取驗多

醒脾散

治小兒吐瀉不止作慢



驚風脾困昏沉黙々不食

參 伽 苓 蜜 全 蝎 定

喬 白 附 片

右入姜枣煎服

按慢驚之主方也

三 敗毒散

治急驚風初起發熱手

足搐搦吐瀉天吊涌弓反張并一

切感冒風寒頭痛發熱咳嗽喘急

鼻塞聲重及瘡疹欲出發搐並宜

服之儻觀門

本方加定蝎蚕的錄各等

四 天麻湯

治急驚脾胃虛弱或變

慢驚者

守分定五分甘令伽各二

右入姜片磁器內水煮候乾為末

每服一錢五分姜枣湯調下

五 芎活湯

治急驚風角急反張

參 芩 杏 羔 各一 甲 丹

芎 桂 芎 葛 升 斤 桂

各三

右入姜水煎服

六 人參湯

最能利驚

小柴胡湯加芸枳

七 加味和中湯

治小兒慢驚風

參 伽 各一 苓 貴 蝎 各五

田 定 各七 芎 轉 各二 細 各三

右入姜枣水煎服

八 啓脾湯

百病愈後俱用此藥調



脾為至

藜一兩 伽苓 芩 朮 曲 查 各

參 檉 芋 婆 蜜 介

砂 各三行 三貴 介 介

驚風後加辰滑各二

右為未任意姜湯調服○初生兒

塗乳頭上服之

補脾益真湯 治小兒胎稟怯弱

外實裡虛因嘔吐乳粉糞色青而

成慢驚風氣逆涎潮眼珠直視四

肢抽掣或因變蒸客忤而作或因

特拘驚嚇而作或因快服鎮心寒

涼藥而作

蜜 介 參 慈 訶 喬

貴 朴 行 耳 珍 苓

伽 桂 宇 附 各 七 蠅 一

右入姜煎服○渴者去附喬行加

參倍苓○瀉者倍喬訶○嘔吐者

倍貴喬守○腹痛者加朴良○腹

脹者加朴喬西奴○咳嗽者加西

奴附桂珍衍○痰喘加西奴於去

附喬衍珍○足冷加附喬朴○氣

逆不下加西奴去介附行○惡風

自汗加芪桂

愈氣飲 治小兒風痰壅滿風傷

於氣不能言語

奴 參 定 菴 蚕 各 三 耳



右每服二錢用水一盞姜煎五分不拘時服

按予治慢驚口眼拘攣手足搐搦甚者用此湯得數効見準繩

幼科

錢氏白朮散 慢驚通用

諸疳

內經曰數食肥令人內熱數食且令人中滿蓋其病因肥甘所致故命名曰疳又恣食肥甘與夫瓜果生冷及一切烹飪調和之味朝發暮食漸成積滯膠固以致身熱身瘦面色痿黃或肚大青筋虫痛瀉痢而諸疳之証作矣

消疳飲 治小兒疳疾身熱面黃

肚大青筋瘦弱

參 加 苓 胡連 曲 連  
青 陳 砂 母

右水煎服○傷食加查○有蟲加

按諸疳通治之方也

消疳丸 治五疳皮黃肌瘦髮直

尿自肚大青筋好食泥炭茶米之物或吐或瀉腹內積塊諸虫作痛

蒼 貴 朴 奴 枳 曲  
查 牙 削 茂 砂 令  
連 胡連 蕪夷 史 芦

右為末史君子殼煎湯泡蒸餅為



九如彈子大每服一九清米湯化

四十一

黃芪湯 治小兒疳積勞喘嗽虛汗

有蒸湯而腹瀉少食

芪參 斤 芎 芍 芩 朮 蝦 筍 去

定地 鰲 各一 苓 貴 田

柴 史 各一

右入姜棗水煎

▲癰疾

錢仲陽云癰塊者癰於兩脇痞結者否於中脘此因乳哺失調飲食停滯邪氣相搏而成或乳母六淫七情所致古人多用剋伐痞癰既久飲食減少脾氣必虛久而不愈

五十一

先以固胃氣為至使養正則積自除若欲直攻其結不惟不能善消抑亦損其脾土也  
消癰湯 治小兒癰疾發熱口乾尿赤

參 木 苓 守 柴 芩

楮 澤 胡 連 門 棗 莖 莖

查 母

右入姜棗煎服則立効

如癰病日久元氣虧損此方不効

宜多服醫王養正積自除

按小兒癰積之主方也

六十一

抑肝扶脾湯 治小兒癰疾日久不消元氣虛弱脾胃虛損肌消削



壯大青筋發熱口乾吐腹脹滿

參五分 加令游亦查

分貴童曲各六柴胡連

母各三連一

右入姜枣煎服

大連翹飲 治小兒傷風感冒發

熱痰核頰赤癰瘡眼目赤腫口舌

生瘡咽喉疼痛小便淋瀝胎毒痘

疹餘毒一切熱毒并治

堯句滑朱力 煎各

丹翁介芸各四柴

芥假各一分 蟬五分 耳一分 竹

葉十燈草 煎汁

右水煎服 風痰骨蒸加門 實

執丹熱加鹿胎熱痘疹餘毒加

寄 瘰癧熱毒加虎芒

羚羊角散 治痰喘及多驚熱

羚 犀 神 各一分 愛 半

少 右水煎服

生犀散 治心經虛熱

犀 二 麝 柴 葛 各一分 甘

五 右水煎服

導赤散 治小兒小腸實熱小便

秘赤

右入淡竹葉水煎服

▲感冒

小兒傷寒與大人無異所異者來



食夾驚而已雜病亦然

惺々散 治外感風寒鼻塞痰嗽

發熱

參 加 苓 利 細 耳

苛 蕪根 各等分

右水煎服 〇一方加芍

羌活湯 治風邪所傷頭目昏眩

痰涎壅滯肢節煩疼

羌 西 甲 苓 弓 甘 炙

蔓 苈 奴 細 羔 女

芸 各等分

右水煎服

大羌活湯 羌 活 獨 活 桑 葉 連 翹

蒼 加 甘 芍 細 各 二 雷

右水煎服

脫甲散 治小兒發熱頭疼日久

不愈

甲 柴 斤 雷 遊 各 三 參

芍 各 二 分 半 分 四

右入姜枣水煎服 〇表不解加粳

裏不解加鹿

葛根湯 治大陽々明無汗惡風

發熱惡寒頭痛項背腰強目痛鼻

乾不眠肢麻拘急骨節煩疼胸脇

滿悶不問一切傷寒溫病時行寒

痰等症兼治剛柔二症



葛三升 木半 枝一升 分  
右入姜枣水煎服 ○加苓 錢名書  
根解肌湯

傷食

傷食者宜消導也

消食散

治小兒傷食腹痛或脹

滿或宿食不消 面色黃目無睛 此藥能調和胃氣 乳浦消化

查曲 破芽 伽陳  
青母

右入姜煎服 ○受寒作痛加藿吳

○有熱加苓

按兒傷食之立方也

清中解鬱湯

治肝氣虛弱飲食

停滯鬱熱生痰或身熱赤暈

伽苓 貴丹 查曲  
利耳 各等

右水煎服

大和散

治內傷乳食肚腹脹痛

外感風寒頭疼發熱宜服

水貴 莎卷 蒼芎  
奴查 曲芽 各等

右入姜水煎

銀白散

升雷 預扁 參伽  
各等

右為末每一錢沸湯調服治小兒  
百病加減由人 ○如慢驚搐搦屬



香飯湯下○急驚定後陳米湯下  
 ○驚吐不止丁香湯下○天柱骨  
 倒脚軟濃米湯下○夾驚傷寒薄  
 荷葱白湯下○疝氣肚脹氣急多  
 渴百合湯下○壯熱面赤驚叫金  
 銀薄荷湯下○赤白痢不思飲食  
 及諸病後倦怠不思食姜葱湯下  
 喫食不知飢飽不長肌肉芽姜湯  
 下○暴吐蘇瓜湯下○神形脫語  
 言不正及大人吐瀉藿湯下○若  
 稟受氣怯小兒可每日一服最妙  
 ▲腹脹  
 夫腹脹由脾胃虛氣攻作也亦有  
 實者必悶亂喘滿可下之

十三

消脹散 治小兒腹脹

葡萄水 齊貴奴 各等  
 分

十一

右水煎服○食少者加  
 史君子丸 治藏府虛滑及疝瘦  
 下利腹脇滿不思乳食

史兩 耳 灸 朴 訶 半 燻 各 五  
 分

右為末煉蜜丸芡實大每服五丸  
 米飲化下

▲腹痛

腹痛面黃只是積間有寒熱邪相  
 擊面赤為熱面白寒冷熱不調多  
 嘔逆心腹俱痛面觥白光口中吐



沫虫攻的也

三九 凡小兒腹痛 多是飲所傷宜此湯

加半 貴 童各七廿廿 查 曲

硃 牙 各一廿分 灸五

右為末米飲或自湯下○有寒加

藿吳有熱加

三九 乳頭散 治夜啼不止腹中疼痛

苾 蜜 各等

右為末少許着乳頭上使吮乳就服之

四九 六神散 治腹痛啼哭面青口中

冷氣四支亦冷曲腰而啼或大便

泄瀉青白糞及不吃乳

四九 四君子湯加預為磨

右入姜枣水煎服

凡腹痛通用大七氣湯 麝香砂

干胃散 傷 宜用

人參散 治嘔逆

參 伽 守 永 雪 貴 各

分半 步

右入姜枣水煎服

定吐飲 治吐逆投諸藥不止服

此神効

守 二 錢 桂 三

右姜切作小塊如菘豆大同前半

夏和勻入小罐內慢火順手炒令

香熟帶乾方下桂再炒勻微有香



氣以紙攤開地上去火毒候冷畧  
搗去黑焦末每服二錢水一錢姜  
三煎七分空心少與緩服

泄瀉

泄瀉之症皆脾胃不調或寒或熱  
或過傷乳食或素有蟲積所致

凡泄

參苓白朮散 治脾胃虛弱飲食  
不進多因少力中滿痞噎心中氣  
喘嘔吐泄瀉此藥和中不熱久服  
養氣有神醒脾悅色須正辟邪

參 一各  
芎 一各  
苓 一各  
預 一各  
甘 一各  
半 一各  
右為末每服二錢東湯調下量兒  
歲數加減

凡泄

四神丸 治脾胃虛泄瀉不食  
或不時去後不實或乳母患此致  
兒為患

衍 各二  
玄 各二  
骨子 四  
吳 一

右為末水二碗姜兩紅棗百煮熟  
取棗肉和末麻子大每服二三十

丸空心食前白湯下子母并服

凡泄

錢氏白朮散 治吐瀉或病後津  
液不足口乾作渴和胃生津止瀉  
利將欲成慢驚風者

參 各等  
芎 各等  
苓 各等  
藿 各等  
蜜 各等  
葛 各等

右水煎服頻々泄瀉將慢驚風加  
預扁衍○慢驚已作加小定蝎白



附○吐衄胃寒加喬○胃虛不能食而大渴不止者加瑞○能食而渴者自虎湯加參○中氣虛熱口舌生瘡不喜飲冷者宜此湯  
 益黃散○治脾土虛寒嘔吐泄瀉  
 貴錢童耳訶各五分 水煎  
 ○驚啼瘵癡卧不安加蝎鈎藤白附○赤白痢加芥粟○白痢加承○泄瀉加貴朴○傷風加芩芸羌小○吐瀉肢厥願陷加藿喬○  
 ▲痢疾 ○發渴如葛根瓜  
 痢者利也痢之為疾無積不成治法大要散邪熱行滯氣消積滯解暑毒開胃進食為先也

清熱化滯湯 治痢主方  
 連瀉 枳殼 芍藥 貴苓 奴  
 右入姜水煎服○初起積熱正熾加虎芒○血痢加滑石○白痢加朴奴○赤白併下加芩芥粟紅滑貴承 炒 ○白痢久虛加伽菖令去芥連奴○赤痢久虛下後味愈去芥連加芥芩麥○裏急後重加蜜洗○腹痛加芩延奴○小便赤少加翁猪澤○下如豆汁加伽蒼芸○食積加查洞牙曲○久痢氣血兩虛加參芪斤芎升行○下後二便流利惟後重不去者氣陷



于下以升提之

一方 治痢疾或紅或白或紅白

相兼裏急後重身熱腹痛

連 檳榔 煨 童 各四分

印 各五分 紅 三分 嬰 一分 木 一分

右水煎服 單自無紅者去印嬰

加貴分用芍分 滯澁甚者加瀉

香連丸 二服一二劑仍除之

連 磁 兩 雁 柴 五 兩 煨 檳榔 入

蜜 兩 右為末 醋糊丸如赤豆大每服二

三丸自湯下

凡脫肛色赤或痛用補中益氣

湯 傷 送香連丸 久痢裏急後

重欲去不去手足并冷者用補中

益氣湯加蜜骨脂倍升柴

▲瘧疾

風寒暑濕邪 飢外來飲食起居邪

由內作豈特夏傷于暑秋必痰瘧

哉古人以暑受病者多言之耳

七味清脾湯 治食瘧嘔吐痰沫

及時行瘧瘧不問先寒後熱諸瘧

通用 見于 ○小便赤加猪苓

養胃湯 治停食感寒熱瘧及

中脘虛寒嘔逆惡心等症 見于

截瘧飲 伽 精 貴 童 薰 空



猪 芋 常 母

右入姜枣水煎露一宿服○有汗

而熱多者加參芪西雷○無汗熱

多者加齊水○寒多者加永珍○

痰多加守母○食積加洞查曲芽

○夜發者為限分加介周○二月

三月一發者加參芪伽烏去精○

單寒加永附參去薰空猪芋○腹

痛加淡洗○室女熱入血室合小

柴胡湯用

截瘧妙方 治寒熱相半

柴錢五 貴錢三 車五分

右水煎臨發日五更空心溫服已

發時不可服寒多熱少加貴錢減

柴錢○熱多寒少或全無寒減貴

按初發二三次元氣實者用之

必効

一方 治患瘧已久或元氣虛弱

貝去心 參錢一

右水煎臨發日五更空心服珠全

愈可再服一二劑

咳嗽者肺傷風也

參蘇飲 於購于咳嗽陸

若肺實有邪去參加文雪杏

人參平肺散 治心火尅肺咳嗽

喘嘔痰涎壅盛膈胸痞悶

參 貴 車 錄 各 五 匿 雷



各七  
分  
童  
門  
各  
四  
分  
雪  
一  
分  
右水煎

喘急

喘急者痰氣盛也

人參款冬膏 小兒脾胃虛寒久

嗽不止咽膈滿悶咳嗽痰涎嘔吐

惡心肚腹膨脹腰背倦痛虛勞冷

嗽諸藥無効者宜用之

款冬 各一分 參 各一分 杏 各一分 玄

各八分 水 洗 蜜 各五分 母 利

莞 各二分

為未煉蜜為丸如龍眼大每一丸  
姜湯化服

雜病

夜啼六神散乳頭散

追虫丸 治小兒虫積痛凡腹疼

口中出清水者虫積也

史 二分 洗 一分

右水煎服

當飯連翹湯 治小兒心脾有熱

舌下有形如舌而小者名曰連舌

及唇口兩傍生瘡

介 壳 各三分 鹿 茸 各

右水煎服

瀉黃散 治小兒木舌弄舌

○凡弄舌得病後最難瘳一惡証

也

清胃升麻湯 治小兒齒腫涎流



腮腫馬牙疳

升 芩 守 各七カ  
共

芩 各五分  
不伽分並分

右水煎服

瀉心湯 治小兒口瘡

連 為未蜜水調服

一 治小兒滿口白爛口糜

伽 令 猪 芋 翁 地

桂 車 各等

清胃養脾湯 治小兒愛吃泥土

乃脾胃胃熱所致此藥主之

芩 蓋 貴 伽 令 車 各等

右水煎服

昌蒲丸 治小兒在胎其母卒有

驚怖邪氣心舌本不通長四五歲

猶不能言

參 菖 門 藥 芩 介 各

乳 辰 各一

右為未煉蜜丸如麻子大每服十

丸米飲下

調元散 治小兒稟受元氣不足

顛顛開解肉肌消瘦腸大而腫語

遲行遲手足如筒神色昏慢齒生

預 參 芍 芥 芪 各

神 各一 伽 半 芩 不 其

一 堯 半



右入姜枣水煎服

破故紙散 治遺尿

紙一炒為末每服一錢熱湯下

澄青散 治小兒大便白小便濁

或澄之如米泔

伽連姜澤 查各一童分

沒藥散 治小兒風與熱滯留蓄

上焦胸膈高起大便不通

沒藥 虎 奴 利 各二 蜜 耳

各一 右入姜煎服

○小便不通五苓散主之於

茯苓滲濕湯 治小兒黃疸寒熱

嘔吐而瀉欲飲冷水身體面目俱

黃小水不利不得安卧不思食

令茵 丹 連 苓 離

伽蒼 貴 靛 奴 赫 各

右煎服○小便不通加翁○食傷

不思食加破曲芽

羽澤散 治耳中出膿或疼通或

出水 枯礬少許為末吹入耳中

即愈

一方用抱出雞卵皮炒黃色為末

香油調入耳內即時痛止

四須清涼散 治藏府有熱頰赤

作渴四支驚製大便秘瀉或風熱

結核頭面生瘡目赤咽痛一切有



餘之症

麝香 介 車 虎 各等

右水煎服

甘桔湯 治小兒咽喉腫痛風熱

等毒

利不芸 假 芥 車 苛 各

右水煎服

化痰降火湯 治痰火尾骨節痛

貴 田 苓 芋 栝 雷

各等

右到必用前蜜為引若痛不止加

乳沒

仙方活命飲 治一切瘡毒未成

內消已成即潰此消毒排膿止痛

之聖藥也若膿出而腫痛不止者

元氣虛也當補之

鯨 芷 芸 沒 茸 芍

介 乳 瑞 貝 錢 銀 貴

各三

右酒水各半煎服

練陳湯 治小兒吐蛇虫

練 二 貴 田 苓 各 一 車 五

右入姜煎服

宜風散 治初生兒疳風撮口多

啼不乳口出白沫

蝎 者 去 毒 睡 酒 麝 香 字

右同和勻細末每用半字金銀煎

湯調服



▲初生通用

五香湯 治毒氣入腹托裏若有異證於內加減

喬 蜜 沉 乳 麝 各一

右煎空心服○若嘔去麝加藿

○渴加參兩 ○一方本方去喬加

藿翹各一名小五香湯

加味五香湯 治瘡癰無名腫毒

專小兒用之

泉 蜜 乳 喬 婆 升

葛 翹 各一 通 鹿 各五

右煎服○小兒帛包此湯根出熱湯而服

按大人小兒瘡毒入腹則托裏

之方也壽法印和五香加連童耳而常與小兒即盛脾胃止吐逆清心火治蟲積遺瘡癰瘰疹

▲痘瘡

小兒痘瘡大抵與傷寒相似發熱煩燥臉赤唇紅身痛頭疼乍寒乍熱噴嚏呵欠喘嗽痰涎始發之時有因傷風傷寒而得有時氣傳染而得有因傷食發熱嘔吐而得有因跌撲驚恐畜血而得或為目窳驚搐如風之証或口舌咽喉肚腹疼痛或煩燥狂悶昏睡或自汗或下利或發熱或不發熱証候多端卒未易辨必須以耳冷尻冷驗之



益傷疹屬陽腎藏無証其耳與尻俱屬腎故腎之所部獨冷又不若視其耳後有紅脉赤絲為之真凡痘瘡欲出而未出因發搖者外感風寒之邪而內發心熱也宜惺惺散感暈或升麻葛根湯或參蘇飲敗毒散共三加三見三等三月大抵用五積散見于加減加味敗毒散

○初起發熱即服此藥神效○本方加芸假定錄去參苓宜加紫草蟬水甲蚤葱解熱表汗○泄瀉加猪羊去紫草水煎服出汗為佳

升麻葛根湯 發熱之初未分麻痘傷寒傷食等証以此藥解散

五

無誤事傷寒○寒月加水○四支逆冷加枝○時氣酷烈發熱太甚乃是毒氣加力○加翹名連翹升麻湯

痘初出之時色白者當大補氣血

參 芎 用 葛  
 甘 蜜 喬 介 芍

如大便泄瀉加行訶

消毒飲 痘疹欲出及味出已出熱味解急道服之

力分 假各 耳 芸各五

右水煎加犀尤妙○虛熱加錄○壯熱加苓紫草○痘已出味有減假○出不快及痒加蟬○有汗加

六



芸○減食加參查○便秘加虎○  
氣虛加參伽○血虛加升芎○  
快班散 治痘出不快

紫草 參 芍 各五分 翁二分  
母一分

右水煎服○一方去翁加數治痘  
已出被風復入

如聖湯 治痘瘡已出未出身熱

如火頭疼 瀝赤呵欠鼻瘡

芍 周 葛 各五分 紫草

翁 各三分 查二分

右入姜葱水煎服○心煩加門粉

○煩渴合生脉散○身熱如火加

泮錄

加味四聖散 治痘出不快及變

陷倒屬小便赤澀餘熱不除一切

惡候或痘出被風吹復不見入皮

層內尚熱不散

紫草 翁 蜜 芪 芩 母

參 各等 蟬 殼

右水煎服○便閉加奴○便調加

糯米

神功散 治痘出毒太盛血紅一

片不分地界如蚊蚤種或諸失血

或吐瀉七日以前諸証可服解毒

芪 參 芍 紫草 地 紅

力 各等 西 母 殼

右煎服○熱甚加連苓珠退者再



加鹿○有驚加蟬○頭粒淡黑者  
有寒乘乏加官○面紅不退地泉  
不分者加前○泄瀉者火盛而奔  
越也加升以提之

紫草木香湯 治瘧出不快大便  
泄利

紫草 蜜 參 伽 令 耳  
各等 糯米 三十

右煎服○或隱見者加藿

保元湯 治瘧不起脹

參 芪 朮 一

右水煎服○當起脹而不起加麩

○血弱不起根底淡薄加喬桂斤

芎○一二日初出圓暈成形乾紅

收潤加桂○治血加斤芍○勻氣

加貴○解毒加參力○二三日根

巢錐圓而頂陷者加芎桂○根窠

錐起色不光澤加芍桂糯○五六

日氣盈血弱色昏紅紫加蜜斤芎

○六七日氣交不旺血錐歸附不

能成漿加桂糯米○七八日毒錐

化漿而不滿為氣血有凝不能大

振加桂糯○八九日漿不冲滿血

附線紅加糯○十一二日氣血冲

滿血盡漿足濕潤不斂者內虛也

加伽苓○十三四日毒錐盡解漿

老結痂之際或有雜症相仍宜此  
湯○痘瘡發渴加門玄如不止宜



參苓白朮散 ○痘瘡不起 發膿漿  
 不厚加芎藭 復月加糯米 ○頭額不  
 起脹加芎 ○胸膈不起脹加利 ○  
 腰膝不起脹加膝 ○兩手不起脹  
 加枝 ○出不快加芎官 ○小便赤  
 加腹冷 ○大便澀加加苓行 ○小  
 便短赤加腹通 ○大便實秘加泝  
 ○泄瀉加加木行 ○嘔吐加永喬  
 陳 ○煩渴加麥芍會 ○減食加加  
 參曲 ○傷食加曲并查 ○喘嗽加  
 杏愛會 ○發痒加芎斤芍加苓  
 內托散 治氣血虛損或風邪穢  
 毒中觸使瘡毒內陷伏而不出或  
 出而不勻快此藥活血勻氣調胃

三八

補虛內托瘡毒使之盡出易取易

醫

參 各二錢 芎 各二錢 共 利  
 芍 各一錢 蜜 桂 各三  
 分  
 右水煎服 ○紅紫黑陷屬熱毒者  
 去桂加紫草芍 ○若淡白灰黑陷  
 伏虛寒者加喬救裡加桂救表 ○  
 當貴而不貫膿者倍參芪斤煎熟  
 臨服入人乳汁好酒同參溫服此  
 貫膿之巧法也 ○泄瀉加喬永衍  
 ○又名十奇散

四八

木香散 治灰白黑陷嘔吐白沫  
 為表虛

蜜 西 耳 匿 訶 腹



參各五分 貴圭 守各八分 喬粒五

五八

右入姜水煎 異功散 治寒戰交牙痺塌泄瀉 爲裏虛

斤多 貴伽 匿附

田各一分 淡圭 蜜各八分 參分 五

喬粒七

右入姜水煎服

六八

起死回生散 治痘瘡至七八日

忽然變黑收入腹內偏身抓破 喘死在須臾服此從新別發出立可回生

斤芍 餘地 周紅

右半水半酒煎服○上陷加並下

七八

膏貼之

馮氏天花散 治痘後失音

瑞利 苓訶 陽耳

各等

八八

右爲末用調半匙在碗內外以小

竹七莖黃荆七條縛作一束點火

在碗內煎臨臥服

熱眼丹溪方 治痘瘡傷眼

丹决 赫介 連芸

壳周 利

右水煎服

九八

化毒散 治痘後餘毒生發



介 芎 藁 地 芸 葛  
女 粉 蟬 各等 谷精 粉

右水煎服○赤腫痛加連丹○翳  
眼加賊

麥門冬飲 治痘毒發熱作渴嘔  
痛

愛分文 參 各三 耳 銀  
各五

右水煎服

凡孕婦身發瘡宜馮氏草胎散  
胎動不安宜獨聖安胎二方身熱  
甚宜參蘇飲或瘡稠蜜宜十奇散  
倍餘斤減圭加莎婆如胎已五月  
則田心之屬俱不必禁

一丸

草胎散

蘇 伽 斤 餘 蘇 蘇 蘇

齊 參 利 空 芸 貴

荆 奴 紫 草 麥 糯米

正 母 芍 破 大 熱 加 骨

右細切作一服水一盞半煎至一

盞乾滿蒂七寸野苧根七寸甜瓜

蒂一個用銀器煎以荷葉蓋定至

八分去粗仍用荷葉蓋覆空心溫

服

二丸

獨聖散

用連奴破火炒去殼為

末每半匙熱湯調下胎動則服々々  
後覺胎熱則安矣

三丸

安胎散



腹參貴 伽餘斤  
芎 法便砂 水 苓 耳

各等

右入燈草糯米水煎服

凡妊娠痘瘡者以安胎散為主加  
芩加天寒有表症者間用五積散  
去麻田厚姜桂換伽於於加柴芩  
麥參糯等分○痘出不快者消毒  
飲○痘出後血虛者芎散湯加芎  
氣虛者保元湯加芎○熱盛恐胎  
墮者單胎散胎動者安胎飲或單  
砂仁炒為末酒調服之後覺胎熱  
則安

▲麻疹

小兒時氣咳嗽聲重涕唾稠粘目  
眶焮赤煩熱渴燥此則肺胃蘊積  
熱毒發則易出一出遍於肌皮之  
上如泡子見而漸沒病在表受毒  
之淺此名癩子亦名層瘡俗曰麻

子

凡麻疹初起呵欠發熱惡寒咳嗽  
嚏流涕頭眩宜升麻葛根湯

潮熱甚加芩連錄咳嗽加單杏門

蒸咳甚別用涼膈散

○泄瀉宜四苓散

苓散合犀角地黄湯○吐衄犀角

地黄湯

寒熱似瘧宜小柴胡湯



卷湯 ○ 初起全類傷寒但面赤中  
 指冷為異耳已出煩燥作渴者解  
 毒湯合百虎湯二傷寒 ○ 便閉三  
 四日小養氣湯傷寒 防風通聖散于  
 中謔語潮開者導赤散見 如  
 淋者四苓散見 ○ 謔語如狂者  
 解毒湯調辰砂六一散 ○ 煩渴作  
 泄者白虎湯加蒼蒼又猪苓湯便閉  
 ○ 熱盛乾嘔解毒湯 ○ 傷食嘔吐  
 四君子湯調 ○ 復月因暑作嘔  
 四苓散加參見 用衍密姜桂熱藥  
 二仙湯 治麻疹已出而又沒或  
 出不盡心慌哭啼不止十分危症  
 死在須臾或下痢腹痛

四九

犀角解毒湯 治麻疹已出大便  
 下血或小便下血衄血或二便閉  
 澀瘡疹稠密熱渴赤痛  
 犀角 地五 王 藜 連 苓  
 栢丹 各一  
 右水煎服 ○ 如吐血衄血加炒丹  
 童便  
 ○ 麻疹前後有熱潮不退等証並  
 為血虛血熱可服四物湯見 ○  
 榮渴加愛犀 ○ 嗽加薑 ○ 有痰加  
 倍貴 ○ 麻疹正出之時雖不進飲  
 食但得麻疹淡紅澤潤真正不為

五九

右水煎服  
 各等  
 各等



害加曲砂腫○麻疹已出之時如  
色紅紫乾燥暗晦乃火盛毒熾用  
地加紅濟○麻疹已出既過三月  
不能沒者乃內有虛熱宜本方如  
失血之症加犀泮解之○麻疹退  
後若有牙根腐爛鼻血橫行并為  
失血之症急用本方加茵翁犀之  
類以利小便如痔瘡色白者死○  
孕婦出麻本方倍加加艾安胎  
清熱為主如胎上冲急用芎根艾  
煎湯磨生枳服之更以本方大進

因

十仙湯

治疹後餘毒

柴葛 妙連 芥丹

貴苓 奴地

右入姜水煎服

○麻疹初起已出已沒及一切雜  
症與痘毒大同但始終藥宜清涼  
雖麻喜清涼痘愛溫暖不易常道  
虛則補實則瀉醫家活法故治麻  
亦有血虛而用四物湯氣虛用四  
君子湯天寒傷冷用溫中理中之  
藥一時之權

○麻疹後餘熱內攻循衣摸床  
譫言妄語神昏喪志者死如熱輕  
餘毒未除必先見諸氣色雖預防  
之始終以升麻葛根湯為至或消  
毒飲解毒湯隨症選用仍忌魚腥



蕪蕪之物

▲冰痘

水痘一証與正痘不同易出易靨  
不宜燥濕或濕之亦不為害但不  
能結痂則爛成瘡

四

麥湯散

治小兒水痘

甲

虎

麝

甜

參

滑

錄

灸

右入小麥粒水煎服

延壽遺草卷之八終

貞享二し世歲六月吉日

須原屋茂兵衛



