



增補  
合類

衆方規矩卷五·六







卷之五

卷之六

頭痛 付初表  
腦痛 付六表  
風痛 付木裏  
眼疾 付十五裏  
鼻疾 十八裏  
咽喉 廿一表  
脫肛 廿二裏  
結核癰 廿六表  
破傷風 宜與傷寒考 廿八表  
中毒 廿八裏  
便毒下疳 楊梅瘡 卅八裏  
瘡疥 卅九裏

心腹痛 付三裏  
脚氣 九裏  
耳 十八表  
口舌唇牙 十八表  
痔漏 廿二表  
癰癩 廿四表  
折傷 廿七裏  
癰疽疔瘡 卅一裏  
癩風 卅九裏  
金瘡 卅九裏

婦人科 初表  
雜病 初表  
妊娠 九裏  
產前 十四裏  
產後 十五裏  
小兒科 廿四裏  
驚風 廿四裏  
感冒 廿八裏  
腹痛 卅一表  
癰疾 卅三裏  
雜病 卅四裏  
痘疹 卅七裏

虛勞 六裏  
泄痢 十四裏  
傷寒 十四裏  
產後 十七裏  
癰疾 廿七裏  
腹脹 卅一表  
痢疾 卅二裏  
喘急 卅四裏  
遺月 卅七裏  
麻疹 四三裏

合類增補衆方規矩卷之五

頭痛 附 鬚髮

一 半夏白朮天麻湯 治眩暈眼

黑頭旋惡心煩悶氣短促上喘無

力以言心神顛倒目不敢開如在

風雲中痰厥頭痛身重如山四肢

厥冷不得安臥此乃胃氣虛損停

痰而致也

陳守 荊芥 各五分 伽曲 各五分

芫制 參 芩 精定 澤 各三分

永 二分 油 半 右煎食前服

按治頭痛眩暈四肢厥冷之方

也○腎虛而上熱下冷常頭痛惡

心下痞滿與此湯而安





三 驅風湯 治諸般頭痛

門 各一分 冷 各一分 羌 各一分 桂 各一分

精 斤 芎 芷 各一分 蔓 各一分

本 各五分 細 各三分 右入姜煎服

○一方去本加菊 ○左痛加紫胡

牡 各一分 紅游 各七分 ○右痛加芩

葛 各八分 ○正額上眉棱骨痛甚者食

積痰壅用定分五守查枳 各壹

頭頂痛加流 各壹 本 各五分 ○風入腦髓

而痛加荊瓜 各壹 ○氣血兩虛

有自汗加芩 各壹 參 各壹 地 各壹

按治頭痛之總司也

三 補當歸補血湯 治血虛與風頭痛

斤 芎 芍 地 芩 莎 各壹

芸 蔓 柴 各五分 假 本

右水煎服

按頭痛偏左者屬風與血虛也

宜此湯予用此湯加地榆阿膠

四 加味四物湯 治血虛陰火冲

上頭痛

斤 芎 地 栢 雷 蔓

芩 連 丹 各等 右煎服

五 黃芪益氣湯 治氣虛頭痛

芪 各一分 參 各一分 伽 各一分 貴 各一分 守 各一分

芎 本 各五分 周 栢 小 各三分

右入姜棗煎服△按頭痛偏右者

屬痰與氣虛也宜此湯



六調中益氣湯 治氣血兩虛頭痛

芪參甘 精芎各六分 周柴貴各三分 斤各二分

右水煎服△按頭痛左右俱疼者氣血兩虛也宜此湯

七川芎茶調散 治諸風上攻頭

目昏沈偏正頭痛鼻塞聲重傷風壯熱肢躄酸痛肌肉蠕動膈熱痰盛婦人血風攻疰太陽穴痛但是外感風寒并効

芎假各一兩 藜莎各四兩 卷芷甘各一兩 芸七分

右為末食後茶清湯調下姜葱煎服亦可也○本方加女一兩 小五分 蚕

蠶各一分 各菊花茶調散

按此方治風氣頭痛之劑

八回首散 治頸項強直筋痛或

挫頸轉項不得者即

烏藥順氣散見于中風 加卷搖瓜

九補虛湯 治七情鬱涎隨氣上留

陽經心中怔忡四肢緩弱翁狀齒熱頭目眩冒如欲搖動一切風虛眩暈

參愛 預各一分 苓各八分 麻各七分 西各五分 奴

右入姜五片 秫米撮 水煎服

十安神湯 治頭痛頭旋眼黑

芪一分 卷一分 薰升各一分 地 薑一分 去一分 生甘各二分



右水各三 蔓分 再煎食後用

按證治類方云東垣丹溪治虛熱頭痛大率皆以酒苓酒連酒栝加風劑也

**十一** 補中益氣湯 治飲食勞役及

惱怒眉脫者方見

本方加愛玄佐以六味丸

心痛 即胃脘痛 附腹痛

**十二** 清熱解鬱湯 治心痛即胃脘痛多

因氣鬱日久蘊積成熱作痛也

丹二各 芎各一 枳各一 精各一 連各一

陳五分 永五分 甘三分 右入姜煎服

服後戒飲食大半日或加莎亦

可 △按止心痛之捷法也

**十三** 椒梅湯 治心或腹時痛時止

面白唇紅者是胃口有蟲作痛

梅椒 楨實 蜜莎

砂鈴 朴永 耳

右入姜煎服

按治因蟲而心腹痛之方也

**十四** 姜桂湯 治初起胃脘寒痛

永良 桂各七 婆各七 蒼各七 朴

貴蜜 甘苴 茴奴 砂

莎 右入姜水煎服○痛甚加

乳○手足厥冷脉沉伏加走去良

○泄瀉去奴 △按綿綿痛無增

減脉沈遲者寒痛也宜此湯

**十五** 枳縮二陳湯 治涎在心膈上

行文三 家五 心痛



攻走腰背嘔噦大痛方見于稜門

按此方治心膈大痛厥冷嘔吐者

〔六〕芎朮姜梔二陳湯 治素有痰

火胃腕急痛不可忍者

芎 朮 姜 梔 丹 守 令 各一分

貴 一分 芎 五分 右入姜水煎服

〔七〕一方 心疼肚腹痛小腸積塊

冷氣証屬虛寒者宜服

斤 芎 貴 令 砂

桂 延 各一分 茂 洗 各一分 削 一分

喬 五分 廿 三分 右水煎服

〔八〕四味烏沉湯 治心脾刺痛

芩 芍 沈 各等分

右入姜水煎服

〔九〕開鬱導氣湯 治一切腹痛之總司也

蒼 莎 芎 芷 令 液

丹 曲 各一分 貴 永 各五分 廿 少

右水煎服

〔十〕散火湯 治熱痛

蜜 砂 苒 各五分 連 芍 丹

奴 貴 朴 莎 芎 各一分 廿 三分

右入姜水煎 痛甚不止加延乳

按此方治作痛乍止脈數者

〔十一〕香砂平胃散 治食積痛痛甚不

便實熱去查麴莫姜加大黃下之

莎 砂 蒼 朴 貴 奴

查 曲 各一分 蜜 桂 永 廿 各三分

右入姜水煎服 〇按腹痛瀉瀉



後痛減者食積也宜此湯

二九 溫中湯 治虛痛 以手按之腹軟痛止者是虛痛也

良桂 益砂 蜜 莎

朴 貴 苧 斤 延 甘 各等分

右入姜水煎服

三九 活血湯 治瘀血痛並治血結痛

斤 芎 嬰 葵 丹 延

莎 奴 各一分 紅 桂 蜜 各五分

芎 七分 甘 二分 右入姜水煎服

按痛不移處者死血也宜此湯

四九 七仙湯 治腹痛

莎 茂 童 桂 蜜 苧

延 各等分 右水煎服

五九 枳實大黃湯 治食積痛併積

熱痛太便不通者 方見于飲食

六九 大七氣湯 見于積聚

脇痛 附 癰痛 臂痛

七九 疎肝飲 治左脇下痛肝積屬

血或怒氣所傷或跌撲閃挫所致

或為痛

連 吳炒 二二分 柴 斤 各一分 童

嬰 枳 各一分 芎 芍 各一分 紅 五分

右煎食遠服 △按治脇痛之

主方也若右脇下痛者肝邪入

肺故加姜黃桂陳其生姜

八九 通氣防風湯 治肩背痛不可

回顧者此手太陽經氣鬱而不行

以風藥散之脊痛項強腰似折項

行各五 脇痛



似拔此足太陽經不通行

菴 搗各一カ本 芸 芎

芎 各五分 蔓 各三分 右煎服

○如身重腰沈沈然經中有寒濕

加離ハク分輕者附フ分重者州烏シ分

按治因氣鬱而肩背脊痛之方也

**補**愚按面白脫色氣短者勿服

**九北** **補**推氣散 治肝邪入肺右脇

痛甚脹滿不食

實 奴 各二枝 枝許 芎 各五分 一方

加貴一分 田壹 右入姜水煎服

**北** 柴胡芎歸湯 治肝火盛木氣

實脇下痛左右俱痛者肝火盛而水氣實也

柴 芎 芎 童 奴 各一各半

莎 斤 游 蜜 砂 并 各五分

右入姜水煎服

**北** 平肝流氣飲 治脇痛及小腸

至逆臍併痼氣內外疼者

斤 貴 令 各一各 芍 連 莎

丹 各八分 柴 朴 各七分 芎 守 童 各

貝 其 各四分 右入姜水煎服

**北** 柴梗半夏湯 治發熱咳嗽胸

滿兩脇刺痛者

柴 仁 芩 守 奴 利 各

鬚 各一童 杏 各八分 其 各四分

右水煎服○口燥渴去守○痰在

脇下加茶瀝姜汁

**北** 補陰湯 治腎虛腰痛



斤芍地芩 貴 茵  
紙倍仲 令各一 參分五 栢分七  
雷分七 其分三 右入棗水煎服

○痛甚者加乳砂一分 去芍地貴

**四州** 養血湯 治腰痛腿痛筋痛骨疼

斤地 糺 桂 倍 仲

令 芸各一 土令一分 芎分五

其分三 右水煎入酒少許服

**五州** 調榮活絡湯 治失力腰閃或跌

撲瘀血凝滯及大便不通而腰痛者

斤 嬰 虎 倍各二 芎 朮

紅 地 卷各一 枝分三 右煎服

**六州** 當飯拍痛湯 治濕熱為痛肩

背沉重肢節腰脇疼痛胸膈不利

伽分四 參 周 苦 齊 蒼各五

芸 雷 芩 薤 猪 斤各六

湖 卷各八 其分五 右煎服

按遍身疼痛流注手足足脛腫痛不可忍者宜此湯

**七州** 二陳湯 治濕痰腰痛腰背重

痛者是 痰也 △本方加蜜茵乳延砂

蒼 卷 芩 斤 仲方見于

**八州** 舒筋湯 治血滯腰痛亦治閃挫

延 斤 枝各等 右煎服

**九州** 加味四物湯 治瘀血腰痛

△本方加嬰方見于 虛損

**十州** 二木湯 治痰飲雙臂痛者又

治手臂痛是上焦濕痰橫行經絡



中作痛也

蒼一莖 仰星 貴令

莎各一 冷各一 卷各一 葳各一 苕各一

守二莖 右入姜煎服

一平 滋榮調中湯 治臂痛及腰酸

或有時作痛

令 仰斤各一 貴八分 守八分 芍

冷 酒各一 倍各一 瓜各七 卷各一 雷各六

芍五分 芸五分 枝三分 右入姜煎服

二平 參合湯 治背心下點痛

貴守 令各一 葵各一 奴各一 蚕

苒 芷 屺 利 禾 水

莎 蒼 卷各等 苕各半 右水煎服

三平 豁痰湯 治背肩疼痛

守 丹各一 海桐皮各一 奴各八

赤芍 蒼利 莎令各七

芍 實各五分 苕二分

右入姜水煎服○痛甚加芒各二

四平 五積散 見于中寒

五平 敗毒散 見于傷寒

六平 烏藥順氣散 見于中風

七平 木香順氣散 見于諸氣

八平 三和散 見于氣門

九平 獨活寄生湯 見于中濕

十平 滲濕湯 見于中濕

按右之數方隨証可用之

一辛 活絡湯 治風濕臂痛諸藥不効者

卷搖芍斤 仰苕各等 右煎服



補脚氣

二季 卷活道滯湯 脚氣初起一身

盡痛或肢節腫痛二便阻滯先用

此道引後服當歸拈痛湯

羌 搖 斤 各二 離一

減一 虎 四分 右水煎服

三季 當歸拈痛湯 見脚

四季 左經湯 治風寒暑濕流注腰脚

拘攣二便秘澀喘滿煩悶

守 鬱 卑 萸 愛 朴 令

離 洞 枝 耳 芸 柴 琴

蚕 各等 右水煎服 本方去守

蕪 蔞 朴 洞 柴 琴 蚕 加 伽 細 以 枝 爲

種 名 又 加 細 伽 永

去 卑 萸 朴 離 洞 羌 蚕 各 等

湯 二 方 俱 治 法 同 喘 急 加 杏 雪

五季 防已飲 濕熱脚氣常腫者宜此湯

栢 蒼 伽 離 各 七 地 洗

芎 各 五 犀 耳 節 續 連 各 三

右水煎服 熱加玄 熱甚及天令

暗熱加羔 有痰加瀝對或星

大便秘加嬰 小便秘澀加倍

常腫者專主乎濕熱肥人加痰藥

六季 檳蘇散 治風濕脚氣疎通氣

道 方見于 傷寒

七季 烏藥平氣散 治脚氣上攻頭目

暗眩脚膝疼痛諸氣不利喘滿急促

發 神 耳 參 伽 芎

斤 文 正 八 卷 五 脚 氣



斤 芷 女 軾 各等分

右入姜棗水煎服

八季 治濕熱脚氣方

水 栢 余 鱉 芋 翁

離 洗 蒼 奴 耳 莎

羌 右水煎服○痛加木

香○腫甚加腹○發熱加虎玄

九季 三和散 見于氣門

一季 五積散 見于中寒

右四方隨證宜用之

痛風 附 麻木 痺症 痿癈

三季 羌活湯 治遍身骨節痛者是

皆血氣風濕痰火也

羌 蒼 冷 斤 苓 芍

守 莎 各一分 蜜 另 陳 各七分 茸 各三分

右入姜煎服○風痛加芸○濕痛

加蒼○熱痰痛加冷萹實瀝○血

虛痛加地○上痛加芷葳○下痛

加栢膝○痛甚加乳○發熱加柴

○小水短瀼加通

按治痛風之方也

四季 加味八仙湯 治手足麻木或疼痛

沂 泮 苓 各一分 枵 陳 各八分

芎 守 各七分 參 朮 各六分

羌 芸 各五分 伽 柴 各四分

枝 各二分 右入姜棗煎服

按治麻木之主方也○因濕痰

而手足麻痛者氣虛也宜用此



湯者花軟○一男上体麻妹舌  
痺不知酒味此方得妙術○予  
母七十餘歲咳嗽後舌痺不知  
飲食味此湯三貼而愈

五卒 疎經活血湯

治遍身走痛如

刺左足痛尤甚左屬血多因酒色  
損傷筋脉空虚被風寒濕熱感於  
內熱包於寒則痛傷筋絡是以晝  
輕夜重宜以疎經活血行濕此非  
白虎癰節風也

涂一分 浙一分 地 蒼 膝

陳 嬰 葳 各一分 游八分 苓七分

芎 離 羌 芸 芷各六分 甘四分

右入姜煎服○痰加星守各壹○

上身及臂痛加桂三分○下身並足

痛加瓜通栢屋各一分○氣虛加參

伽板各七分○血虛倍四物湯加紅壹

按治痛風屬血虛者故遍身走

痛日輕夜重○懷妊婦人潮熱

咳嗽吐痰盜汗疴足注痛脉細

數滋陰降火湯不効故此湯去

膝嬰得奇効○傷酒食邪乘經

絡虛為痛風與此湯而安○中

風之人周身或手足痛用上下

六卒 清濕化痰湯

治周身四肢骨節

走注疼痛牽引胸背亦作寒熱喘

咳煩悶或作腫塊痛難轉側或四肢



麻痺不仁或背心一熱如冰冷脈滯  
乃是濕痰流注經絡關節不利故也

星 田 陳 苓 卷 洽

蒼 芷 附 各一 密 五分 茸 三

右煎入瀝姜汁服○頭頂痛加芎

藎○手臂痛加桂○脚痛加膝和

離游瓜○骨痛甚及有腫塊作

痛者名曰痰塊加乳沒硝海石

按治遍身徒痛屬濕痰者故因

痰而咳嗽或脇痛或肩痛或胸

痛皆治○一男有咳痰而背心

一熱如冰冷與此湯得奇効

又治刺後脚弱緩精不能行履在

曰刺風或兩脚腫痛足脛枯腊名  
曰鶴膝風一切麻痺痿軟風濕按  
虛之候服之其効如神

伽 芩 芩 芸 斤 芪 芍

仲 各一 芎 附 各七 羌 參

膝 茸 各半 右入姜棗煎服

按治痿痺之聖藥也此方可治

不足之痿弱不可用有餘之風

痺前方有膏此方有附當者於

心一方也○腰不立身痺痛或

刺後鶴膝風專用之而可也

補 解表升麻湯 治遍身壯熱

柴 周 本 羌 芩 甲



蒼 貴 斤 茸 各等  
右入姜蔥水煎服

九 靈仙除痛飲 治肢節腫痛  
屬火腫屬濕兼受風寒而發動於  
經絡之中濕熱流注於肢節之間  
而無已也

野 薤 各一 芸 假 搖  
薤 蒼 葳 苧 洞 利  
葛 芍 各五 斤 騫 茸 各三

右水煎服○在下焦加酒栝○婦  
人加紅○腫多加洗腹芋沒○脉  
澁數者加嬰紅芍斤瀉  
按此方止痛發散之劑

十 治兩手疼痛麻木方

斤 苳 苳 弓 連 菴  
蒼 芸 野 守 棧 利  
茸 各等 右入姜水煎服

十一 治兩足疼痛麻木方

斤 芍 伽 蒼 守 貴  
苓 栝 倍 葳 嬰 紅  
茸 各等 右入姜瀝

按一方俱治白虎歷節風之劑

十二 通氣防風湯 治見于○經中每

寒濕加瀉輕加走重加川烏 薑  
加升柴 右濕熱加蒼栝

十三 治肢節腫痛方

野 余 各一 假 菴 搖  
苳 蒼 葳 苳 洞 利



葛 芎 各五分 甘 斤 周 各三分

右水煎服○下焦加極○婦人加紅

四字加味四物湯治白虎歷節風本

方虛損加嬰倍貴苓其芷遊○痛在

上者加枝羌威○在下者加嬰離

翁極○氣虛者加參仰龜○有痰

者加星守姜○血虛者倍芎斤紅

五字三痺湯治氣血凝滯手足拘

攣風痺氣痺等

芪 倍各一分按 仰 離 枝

細 參 令 斤 芍 甘

九字地 芎 搖各一分右入姜

棗水煎服△按此方治冷痺之劑

也宜此湯

芪 參 仰 貴 斤 各一 周

柴 蜜各五分 莎 童 芎各八分

枝少許 甘三分 右入姜棗水煎

五字舒經湯 婦人手足麻痺者七

情六鬱滯經絡也宜此湯

水 貴 莎 葵 芎 蒼 羌

星 守 斤各等分 枝 甘各四分

右入姜瀝對水煎服○腰以上痛

用食後腰以下痛食前用

八字獨活寄生湯 見干中濕

九字敗毒散 見干傷寒

十字補中益氣湯 見干內傷

此三方隨証宜加減



眼目

洗肝明目散

治一切風熱中

眼目而赤腫痛

沂芎 藜 地 連 芩

丹 麴 芸 荊 苜

葵 羌 蔓 鞠 楮 草 史

右煎食後服

○痛不可忍加川烏○有翳障去

芎加蒺藜○風熱肝火甚去芎加

游榮○大便實加虎芎楮

按治眼暴赤痛之方也○一男左

眼皆大赤視黑白不分明此湯得

率效○熱痛赤腫小柴胡湯加虎

斤黑豆生不瀉更加芎○暴眼

赤發用升麻葛根湯加蠟與

三貼如未退用敗毒散加虎尚

不退却用五疔膏中湯酒調下

滋腎明目湯

治勞神腎虛血

少眼痛○久病昏暗者腎經真陰

之微也如昏弱不欲視物內障見

黑花瞳子散皆血少勞神腎虛也

斤 芎 芍 地 芎 各一 桔

參 丹 連 芷 蔓 菊

各半 細茶 撮 燈心 團 右煎食

後服○熱甚加游榮○腎虛加栝雷

○風熱壅盛加芸荊○風熱紅腫

加翹芩○酒毒加連○翳膜加賊

按治眼久昏暗之方也



三子補大明散 治一切暴發赤眼

惟日羞明隱澁難開熱淚長流腫痛不可忍者或生翳障攀睛勞肉內障昏蒙不問新久並治

斤芎 藁 地 連 芩  
相 丹 翹 藜 芸 假  
鐵 蔓 加 柴 卷 耳

右入燈心水煎服○眼赤腫痛加虎芒○翳障加賊疾

四子養心明目湯 治兩眼昏花流淚翳膜遮睛

斤 芎 各一 芸 七  
假 雷 節 各五 芩 各四  
右水煎服○酒毒加連

○翳膜加木賊○溺赤加丹

按此方治一切眼疾清涼之劑

五子洗肝散 治風毒上攻暴赤腫痛隱澁眵淚等証

蘭 斤 卷 丹 虎 芸 耳  
芎 各等 右熱水調下又水煎服

六子四物龍胆湯 治目赤暴發雲翳疼痛不可忍者

斤 芎 藁 地 各一 離  
游 各四 芸 六 右水煎服

七子補陽湯 治陰盛陽虛九竅不通青白翳見大眦及膀胱肝腎經

中鬱遏不通於目

柴 一 卷 搖 耳 參 芩



伽 苾各五分 芋 貴 芸

芍各二分 地 參 雷 斤各一分

桂分半 右水煎服

**九** **地黄湯** 治眼久昏澁

芩 斤 參 令 連 苓

芸 羌 苕 甘各等分 右水煎服

**十** **益氣聰明湯** 治飲食勞役脾胃不足內障耳鳴

芩 參各等分 周 葛各三分 芍

栢各一分 蔓一分 右水煎服

**十一** **敗毒散** 風眼通用左詳于傷寒

○凡元氣虛弱人或用風藥過多而損元氣者補中益氣湯見于內傷或

四物湯見于虛損或十全大補湯見于虛損

主之隨証加減而可也

### 耳病

**十二** **通明利氣湯** 治虛火升上痰

氣鬱於耳中或時或鳴痰火熾盛

憂鬱痞滿咽喉不利煩躁不安

貝各三分 陳 鹽 泊 丹 磁各二分 精

伽 候 地 枳 漣 冷各分

芎八分 蜜 其各五分 右入姜煎加

瀝服△按氣閉耳聾之方也

**十三** **滋腎通耳湯** 治腎虛而耳

聾鳴者

斤 芍 雷 芎 地 栢

苓 柴 芷 莎各等分 右水煎服○胸膈不快加童奴



四卒 荊芥連翹湯 治兩耳腫痛

假 堯 芸 斤 芎 芷

柴 媯 芩 丹 芎 利 各等分

其 減半 右水煎服

五卒 蔓荊子散 治上焦熱耳內生

膿或耳鳴而聾

蔓 蔚 翳 檉 門 其 地

醇 枰 雪 節 各等分 右水煎服

六卒 桂星散 治風虛耳聾有頭痛

星 芷 各四枝 斤 小

陽 絲 疾 蜜 其 各一長半

右水煎服○一方去枝加單水桂

鼻

七卒 通竅飲 治鼻不聞香臭

細 芷 芸 菴 斤 芎

守 桔 陳 苓 各一 苟 三

右煎食後服△按此方因肺經有

風熱而治之若向白肺虛用醫

王加門丹而可 補按此方治

感風寒鼻塞聲重流涕

八卒 補清血四物湯 治熱血入肺

成酒釀鼻

斤 芎 芍 地 芩 紅

令 貴 各等分 其 減半

右入姜水煎服○氣虛加芪

九卒 宣明防風湯 治鼻淵腦熱涕下

濁涕不止久而不已必成衄血之疾

芩 參 芎 其 炙 門 各 一 芸 兩 兩



右水煎服○又治鼻淵宜荊芥連翹湯方見于耳門

### 口舌唇

**百**加味清胃散 專治胃火血燥唇裂或為齲唇或牙齦潰爛作痛

膏 地 牡 沂

連 升 芸 荊各等分

右煎頻頻啗嚙齒齦浮腫痛不可忍是胃中有濕熱加丹妙補帶額額半邊痛者加防風白芷羌活細辛○若牙齦脫而血出者加扁柏葉黃芩荊芥梔子○虛損人牙痛者加黃柏知母人參甘州○若滿口浮而痛不能力嚼者加連翹玄

參為藥○小兒牙疳者乳母服加天花玄參白芷○醇酒厚味唇齒作痛或齒齦潰爛連頭向頭項作痛者并加犀角連翹甘草○胃寒齒痛加草薺細辛防風羊脛骨灰去牡丹△按治牙齒痛之主方也

**百**補赴宴散 治三焦實熱口舌

生瘡糜爛痛不可忍

連 栢 芩 丹 細

各等分 永 右水煎服

按此方治口瘡外敷之劑

**百**加減涼膈散 治口舌生瘡痛

裂咽喉腫痛

堯 芩 丹 連 利 荷 斤



地芍 奴 各等 右水煎服

三百 三黃湯 治脾熱口甜

連 芩 丹 蒿 芍 仰

穉 貴 令 各等 其 減 半

右入烏金水煎服○凡肝熱口酸而

苦小柴胡湯方見傷寒加遊童○謀慮不

決膽虛口苦參芩神甘為君柴游為

使或小柴胡湯加唯甘芩芍酸芩錄有熟

用之○肺熱口辛宜瀉白散方見咳嗽

四百 瀉胃湯 治牙痛如神

斤 芎 藁 地 連 王 丹

云 荊 芎 各等 右水煎服

五百 當歸連翹湯 治口呻風則痛

甚或開口則臭氣不可聞或走馬

牙痛三考

斤 芎 翹 地 芸 假

芷 卷 芩 丹 奴 各等

細 減 右水煎服

六百 定痛散 治虫牙痛甚

斤 地 細 永 芷 堯

連 苦 利 梅 椒 各等

右水煎先驗漱後嚥下

咽喉

七百 清涼散 治一切實火咽喉腫痛

桔 丹 翹 芩 芸 枳

連 斤 地 其 各等 芎 半

右入燈心細茶水煎服加山豆根

尤効○咽喉乾燥加參門瑤○咽



○咽喉腫痛加力彭

○痰火盛加扇婁瀝○咽痛生瘡

加力彭○極熱太便實去積加虎

○虛火泛上咽痛生瘡喉不清者

加栢雷△按治喉病之主方也

**八百補**加味四物湯 治虛火上升

喉痛並生喉瘡及痺熱毒最能降

火甚効

斤芎 栢 雷 瑞 各一 芎

芎 各一 芎 各三 右入瀝

水煎服△按屬虛火者宜此湯

**九百通關飲** 治喉痺腫痛不能言

語者但可進藥無不愈者

參 伽 令 各一 芎 假 芎 永 各五

**糖** 甘 炙 加附五分水煎服

**十百** 牛蒡子湯治風熱上壅初發牙關

緊急已發咽喉腫痛或生瘡癰及

愈後復攻胸脇氣促身熱不能言臥

加二 彭 犀 升 甲 芎

有熱加萸貝○肝火加柴吳連○

腎火加斤地雷倍彭○畏下陷加

升○風熱加假蚕○下元虛倍附

痔漏

**七百** 秦尤卷活湯 治痔漏成塊下

垂不任其痒

羌 各七 升 麻

柴 甘 各五 本 分 細 紅 各 右煎



【二草】秦艽防風湯 治痔漏每日大便時發疼痛如無疼痛者非痔漏此藥主之

羌 芩 斤 伽 各一 澤 各六

酒 五 虎 陳 各三 柴 升 各二 嬰 另

紅少 右煎空心服之避風寒

【三草】治痔瘡腫痛

連 芩 柏 翹 蘇 丹

槐 各一 苦 虎 一 右煎空心服

【四草】乾葛湯 專治酒痔

葛 根 守 芩 地 杏

芩 甘 各等 右每三入黑

豆百粒姜五片梅一個煎服

按治痔漏則宜選四方而用必

有數効矣○痔漏痛甚咽乾不食大便結脉弦數與芩芩湯而安○飲酒之人痔突出而痛甚下血與乾葛湯得卒効

【五草】補當歸連翹湯 治痔漏

斤 堯 芩 芩 假 芷

芍 地 丹 伽 參 琴

印 各等 芩 減 右入梅棗水煎服

【六草】秦艽當歸湯 治痔漏大便結燥疼痛

虎 芩 洞 各一 芋 皂 角

斤 伽 各五 紅 少 嬰 右水煎服

○凡陰精損者補中益氣湯 見于

十全大補湯 見于 虛損 主之 漏証 氣血



損者亦治法同之

**補脫肛**

**參芪湯** 治肛門翻出

參 芪 斤 地 伽 芎

令各一周 利 貴各五分 芎三分

右入姜棗水煎服○虛寒加永

**升陽除濕湯**

自下而上者引而竭之

柴 升 芸 猪 芋 蒼

貴 曲 牙 甘各等分 右煎服

○胃寒腸鳴加益守○凡勞倦房

欲過多及產育用力久痢久瀉小

兒叫吸耗氣俱有此症宜參芪芎

斤升水煎服血虛加芎芋虛寒加

永照氣熱用條苓六升兩麵粉丸

服○血熱四物湯加相升方見○

風邪敗毒散可也方見○肺與大

腸為表裡肺熱則肛門閉結肺寒

則肛門脫出必須溫肺葭補胃宜

補中益氣湯方見加訶櫻少許○

按濕熱者升陽除濕湯方見○

有兼痢者四物湯方見加槐花升

**癰**

**九**清心抑膽湯 治癰屬氣血虛

而兼痰火者平肝解鬱清火化痰

除眩暈諸痛之疾

沂 芍 伽 芎 陳 守 實

茹 蓴 連 莎各一 門 芎



參遠各六分 甘四分 右入姜煎服

按氣血虛而痰火上心胸故為眩暈為癲狂此方主之。○百不如心故許問真偽向人而高聲語或忿怒或罵詈與此湯得數奇。○產後血暈心悸多汗熱甚言語錯亂目見不實與此湯而安。

**百** 沉香天麻湯 治因恐懼發癲

病搖擲痰涎有聲目多白睛強項背一時許脈沈微而急方醒後吐見皂衣人即發多服犀牛腦麝鎮墜之藥已四年餘此證尚在又添行步動作神思如痴先灸兩躡各二十七壯次服此藥。

菴五 搖四 定云 守

附各三 沈 益 川烏各一斤

蚕 甘各一斤 右入姜煎服

按救癲癩瘰癧證之劑。○一人足厥冷則有小腹差上心胸部而怔忡或膈塞而心中沈困煩悶如欲絕或食遲則無力生眩暈心如乘舟車久與此湯而安。○男子下血或痢婦人產後脫血多失血後有此證四物湯不效則與此湯而可若蟲出加練真。

**一頁** 清心化痰湯 治精神不守喜笑不常言語錯亂妄見妄言登高罵詈

星 守 陳 苓 連 沂



地 芎 參 酸炒 芎 各壹

其二分 右入姜煎服

按治一切顛疾之主方也

**百** 養血清心湯 治顛病喜笑

不常顛倒錯亂者

參 伽 苓 藜 酸炒 芎 地

各一斤 右水煎服

按此方補虛化痰清火寧心之

劑主顛狂喜笑不常

**百** 加味逍遙散 治婦人顛疾歌

嘯無時踰牆上屋者乃營血迷於

心包所致也此湯主之

斤 芍 伽 令 柴 地

芩 嬰 方 紅 耳

右入煨姜片水煎○有熱者小柴

胡湯加地辰用

**百** 加味二陳湯 治一切癩病

令 星 貴 各一 藁 澗 利

丹 守 苓 各一 其三分 蜜 辰 各五

右水煎入瀝對服

○凡癩疾喜笑不休者是心火之

盛也黃連解毒湯加守瀝對用

**結核** 附 瘰癧 馬刀瘡

**百** 五香連翹湯 治一切惡瘡結

核瘰癧癰疽惡毒

流 兩 翹 扇 升 寄 無用 搖

通 乳 各三 青 木 甘 各一 麩 各

右煎空心服利下惡物為度



百補抑氣內消散

治瘰癧并諸

斤芎 芎 伽 童 貴

田 利 卷 芷 搖 朴各八分

芸 苓 麥 莎 洗各一兩 水一兩

蜜 參 甘 泉各五分 右水煎服

百消解散

治咽喉結核腫塊如

桃腫硬疼痛頸項不廻轉兩腋下

或有塊硬如石

犀 田 貴 洞 利 柴

西 連 堯 赫 芸 搖

白 附 軾 茂 蔓 翁

甘 各等分 右入姜燈心水煎服

百內消散

治梅核痰核馬力瘰

神效

斤 堯 卷 搖 芎 棧

艾 小 灸 右水煎服

本 芎 甘 右水煎服

百益氣養榮湯

治懷抱抑鬱瘰

瘰流注或四支患腫肉色不變或

相哺發熱或潰不斂

參 伽 各一斤 芍 芍

地 貴 莎 倍 柴 利

籛 甘 右水煎服 有痰加

貴 下 棘 痛 加 童 蜜 午 後 有

熟 或 頭 微 眩 加 栝 炒 膿 水 清 倍

參 甚 斤 女 人 有 鬱 氣 胸 膈 不 利

倍 莎 倍 月 經 不 通 加 王 斤



百 十六味流氣飲 方見于瘡瘍

折傷

百 導滯湯 治打撲損傷內有瘀血為痛為腫

芎 藁 各一

芩 檉 各一 牡 各半

近 桃 个十二 紅 分

右水煎服加酒蒸大黃尤効

治被人打死或踢死灸百會穴

立甦△按治跌傷之主方也

百 補 通導散 治跌撲傷損極重

大小便不通乃瘀血不散腫腹脹

脹上攻心腹悶亂至死者先服此

藥却下死血瘀血然後可服補損

藥不可用酒煎愈不通矣亦量入

虛實而用

虎 芒 奴 各一 朴 斤 貴

翁 紅 方 各一 茸 分五

右水煎服○此藥雖婦小兒勿用

百 接骨方 白蒺藜炒為末每服

一匙熱酒調下蓋被汗出即愈

補 破傷風 與傷寒可交考

百 羌活防風湯 治破傷風邪初

傳在表

羌 活 各 斤 余 各一

芩 本 各 斤 右水煎服

○熱加虎○太便秘加虎

百 白木湯 治破傷風太汗不止

筋 攣 手足 攣 攣



芍 各四 伽 葛 各二 升

芩 各一 廿五 右水煎服

百 大芩黃湯 治破傷風在經

芎 各一 芩 虎 卷 各一 各半

右水煎服以利為度

中毒

百 薺芩湯 解諸藥毒治蠱毒

黑豆 芩 各等分

右每七夕水二盞煎八分溫服

百 升麻湯 治桃生毒助下忽腫

起而生癰癰狀須刻間大如桃

此即桃生毒也升麻為末取冷

水調二三夕連服之若洞泄加

薑數莖根鬚其腫即消宜煎平

胃散調補兼進白粥

九 解毒 此毒於肉飯中得之

則易治飲酒中得之難治若胸

作痛則吐之若腹作痛則急瀉

之徐服參芪白朮散無恙

十 巴豆毒 其證口渴臉赤五心煩

熱利不止承連炒等分為末每

三夕凉水調服又寒水石磨末服

十一 斑毒 用澤蘭葉按汁飲之

乾者為末白湯下

十二 野菌毒 用甘草不拘多少以

麻油一盞煎數沸冷服

十三 河豚魚毒 倉卒無藥急以清

油多灌之使毒物盡吐出為愈



或以白礬為末調湯服

按右方雖未試而備倉卒之搜覽者也

**十四** 解毒諸草毒 治誤食毒草并

百物毒救人於必死板藍根四兩貫衆青黛生甘草各一兩為末蒸餅丸梧子大別用青黛為衣如覺精神恍惚惡心即是誤中諸毒急取十五瓦嚼爛新汲水下即解

**十五** 解豆腐毒 過食冷人生瘡愛

氣遺精白濁用生蘿蔔煎湯服或子煎湯亦可

**十六** 解諸菌毒 掘新地取真黃土

以冷水於內攪之令濁澄少頃取

飲之可解亦治楓木菌食之令人

笑不止又方用芫花生為末每一

匙新汲水下以利為度菌之毒者

蓋因蛇虫毒氣薰蒸所致

**十七** 解六畜肉毒 用犀角磨濃汁

一碗服之○食自死六畜毒用黃

栢末一二匙服之不解再服

**十八** 解中諸物毒 白礬細茶等分

為末每三匙新汲水調服得吐即

効未吐再服或萬病解毒丸下之

**十九** 誤吞鐵針 用蚕豆煮熟同韭

菜喫下針與菜從大便而出

**二十** 誤吞銅錢 不能化者用砂仁煎

濃汁飲之其銅自下或用葶藶研



爛服之其銅自化或用堅炭為末  
米飲調服於大便中瀉下如烏梅狀  
〔夏〕誤吞蜈蚣 用生豬血令病人  
喫須臾生清油灌口中惡心其蜈  
蚣衮在血中吐出繼以雄黃為末  
冷水調服

〔夏〕誤吞水蛭 用田中乾泥一小  
塊小死魚二四個將豬脂溶攪勻用  
巴豆十枚研爛入泥內為丸小兒  
三五丸須臾大小水蛭一時皆下  
却以四物湯加其煎服生血補脾  
〔夏〕骨硬入喉 用砂甘等分為末  
以綿裹少許嚥之良久骨髓痰出  
甚者用南硼砂少許水洗汲口中

含化立愈○一方用金鳳花子或  
根嚼爛哈下骨化用溫水漱口免  
傷齒雞骨尤効○魚骨硬食橄欖  
或以核為末順流水調服外用癩  
爪肥之自下○獸骨硬用象牙梳  
磨水嚥下或桑木上虫屑米醋灌  
自下或狗涎灌之以狗善食諸骨  
也○禾芒刺喉或口中取鵝涎  
灌之即下以鵝善消穉芒也  
△馬咬及踏破人用艾灸傷處并  
腫處或用人屎或馬屎燒灰為末  
皆可敷之

〔夏〕犬咬 風犬咬用芸 牽牛木  
黃 各三 斑猫 麝香 分雄黃



為末每三錢遇傷時滾水調服利下惡物從小便而出

**五** 蛇咬 用細辛白芷各五錢雄黃

**二** 為末每二錢入麝香少許溫酒調服

**○** 誤飲蛇交水研雄黃服之

**五** 鼠咬 貓毛燒灰入麝香少許津液調敷

**五** 蜈蚣咬 用雞屎塗之良

**五** 黃蜂螫 用熱油洗之清油擦之亦可或用頭垢敷或以鹽擦亦可

癰疽 附疔瘡

**醫** 十六味流氣飲 治無名惡瘡

癰疽或爛岩

斤芎 芍 芍 芷 桂 參

芪 蜜 麩 朴 枳 椀

蘇 芸 椒 甘 右煎服

**○** 乳岩加童 瘡後餘毒氣流於

陰陽脾經則癰發四肢手腳並膝

臍而腫痛宜此方若氣血虛自利

加附大便實加虎

按此方善消無名腫毒

或手足凸腫其色赤雖經二三年而黃汁不膿世俗謂之氣腫

此湯主之潰壞出膿血謂之血腫

**○** 乳岩 中有如小石物而痛名乳核或

作妳岩而出膿血甚痛加童時

時有大驗

**○** 一人患癰癧寒熱往來與此湯而安



下有結核擲之則白膿出皆與

鼻與此湯三箇月而愈○壽法

印云婦人乳房腫痛太惡寒戰

慄世俗謂之乳風此方有數功

**聖藥** 榮衛返魂湯 治流注癰疽發

背傷折非此不能効至於救壞病

活死肌毋患於味萌之前拔於既

愈之後○此藥大能順氣勻血故

也寔真神仙妙劑

首不犯 斤 通 枳 芷 茵

發 枳 甘 右酒水各半煎

唯流注加獨病在上食後服病在

下食前服○如有潮熱則裡有寒

邪未盡散加升蘇如此而熱不退

加葛○頭痛加芎姜○氣血盛者

減斤○胃寒生痰加守○熱鬱而

成風痰加芎姜○癰疽發背在上

者或老人虛弱者並去翁○如有

瀉者不可用宜瀉止而後用之

按治癰疽之主藥也

**補** 荊防敗毒散 癰疽疔腫初

發寒熱似傷寒表証其毒輕者消

散方見 或宜防風通聖散方見于

**聖** 千金內托散 治癰疽瘡癤未

成者速散已成速潰

芩 參 斤各一 芎 芸 利

芷 朴 桂 甘各一 一方加銀

右為末每服三錢黃酒調下不飲



酒木香湯調下亦可○癰疽腫痛  
倍止不腫痛倍枝○不進飲食加  
砂莎○痛甚加乳沒○水飲乾加  
倍雷○瘡不穿加皂刺○咳加守  
貴杏姜○大便閉加虎奴○小便  
澀加愛茉莉翁燈

托裡散

治癰疽氣血虛不能起

發瀉潰收斂或惡寒發熱肌肉不生

參 各二 貴 斤 半

苓 芍 各一 右水煎服

○燉腫熱毒加連○漫腫氣虛倍  
參伽○表邪加羌芎○表虛加參  
芪○肉熱飲冷便秘去參芪斤伽  
加虎○肉虛飲熱便秘倍參芪斤

伽○寒熱飲冷溺澀肝熱去參芪

加柴丹○不作膿膿不潰氣虛也

加參伽桂○腫赤作痛氣凝滯也

加乳沒○肉赤不斂血虛有熱加

芎王○肉黯不斂陽氣虛也加參

芪桂斂○肉白不斂陽氣虛也膿

多不斂氣血虛也俱倍參芪斤伽

○漫腫不痛肉死不潰脾虛甚也

加參伽姜附○膿多帶赤血虛也

倍參伽斤芎○忿怒瞞熱出血肝

大血虛也加王丹芎○面青腸脹

出血肝虛不能藏也加預菜玄○

食少躄倦出血脾虛不能攝也倍

參芪斤芎○鬱結小寐出血加萸



酸神龍○欲嘔作嘔或外搽內服  
寒涼或痛甚或感外邪穢氣作嘔  
胃虛也加波參伽○少食腹痛腸  
鳴冷瀉脾虛寒也加炮姜蜜○膿  
多作渴氣血虛也加熟地玄門○  
莖痛溺澁精肉敗也加預菜芋○  
勞役溺赤氣下陷也加升柴○日  
哺頭痛眩暈陰血虛也加熟地○  
身熱惡衣欲投水中脉沈微細氣  
脫發躁也加附桂○哺熱多痰脾  
血虛也倍斤芩參伽○善思身痛  
不寐盜汗脾血虛也加神酸○寢  
寐汗出腎氣虛也加玄○飲食汗  
出胃氣虛也加參伽玄○睡覺飽

而盜汗宿食也加參伽守○婦人  
勞怒夜熱或謔語或適經行熱在  
血分也加柴地王

真當歸羌活湯 治腦疽

斤 芩 連 各二 酒 堯 芸

羌 丹 各一 搖 本 各七 分 五

右水浸良久入酒一匙煎熱服日  
一次三日盡六服却將藥清汁調  
下蜜洗末各三錢因膏梁熟蠶者  
宜貧窮寒濕者少用

真補中益氣湯治元氣虛損或因

尅代惡寒發熱肢躄倦怠飲食少  
思或不能起發消散生肌收斂或  
兼飲食勞倦頭痛身熱煩燥作渴



脉洪大弦虛或微細軟弱方見于

**四君子湯** 治脾胃虛弱或因

尅代腫痛不散潰斂不能宜用此

以補脾胃諸症自愈若誤用攻毒

七惡隨至脾胃虛弱飲食少思或

食而難化或欲作嘔或大便不實

若脾胃氣虛瘡口出血吐血便血

尤宜用之蓋氣能攝血故也凡氣

血俱虛之証宜此湯但加斤脾胃

已壯飲食自進陰血自生若用四

物湯沉陰之劑脾胃復傷諸症蜂

起若命門火衰而脾土虛寒必用

八味丸以補土母方見于

**八物湯** 治脾胃傷損惡寒發

熱煩燥作渴或瘡瘍潰後氣血虧

損膿水清稀久不能愈方見

**十全大補湯** 治癰疽潰後補氣

血進飲食實為切要凡膿血出多

陰陽兩虛此藥有迴生起死功方見

**竹葉黃芪湯** 治癰疽氣血虛

胃火盛而作渴

竹葉二 芪門斤芎苓

芍參守 羔 甘 地 各一

右水煎○若大渴發熱或泄瀉淋

閉者邪火內淫一惡也竹葉黃芪

湯氣血俱虛八物湯加芪門玄菜

如不應佐以加減八味丸○若膿

血既泄腫痛尤甚膿色敗臭者胃

新醫正卷五

三六



氣虛而火盛二惡也人參黃芪湯  
如不應<sub>レ</sub>用十全大補湯加門玄○  
若目視不正黑睛緊少白睛青赤  
瞳子上視者肝腎陰虛而目系急  
三惡也六味丸加丹門玄如不應  
用八物湯加丹愛玄○若臨粗短  
氣恍惚嗜臥者脾肺虛火四惡也  
六君子湯加棗姜如不應<sub>レ</sub>用補中  
益氣湯加門玄心火刑尅肺金人  
參平肺散方見干陰火傷肺六味  
丸加玄○若肩背不便四支沉重  
者脾腎虛損五惡也補中益氣湯  
加萊蕪玄如不應<sub>レ</sub>用十全大補湯  
加萊蕪玄○若不能下食服藥而

嘔食不知味者胃氣虛弱六惡也  
六君子湯加蜜砂如不應<sub>レ</sub>急加附  
○若聲嘶色敗唇鼻青赤面目四  
支浮腫者脾肺俱虛七惡也補中  
益氣湯加棗姜如不應<sub>レ</sub>用六君子  
湯加炮姜更不應<sub>レ</sub>急加附或用十  
全大補湯加附炮姜○若腹痛泄  
瀉咳逆昏憤者陽氣虛寒氣內溢  
之惡症也急用托裡溫中湯後用  
六君子湯加附或加姜桂○有汗  
而有惡寒或無汗而惡寒口噤足  
冷腰背反張頸項勁強此氣血虛  
極變瘳之惡症也急用參芪斤蜜  
附救之間有可生者○若有潰後



發熱惡寒作渴或怔忡驚悸寤寐不寧牙關緊急或頭目赤痛自汗盜汗寒戰咬牙手撒身熱脈洪大按之如無或身熱惡衣欲投於水其脈洪大按之微細衣厚仍寒此氣虛極傳變之惡症也○若手足逆冷肚腹疼痛泄痢腸鳴飲食不入吃逆嘔吐此陽氣虛寒氣所乘之惡症也○大抵五善見三則吉七惡見四必危虛中見惡症者難治實症無惡候者易治

五聖湯 治一切癰疽疔腫初

覺憎寒頭痛 虎銀 各二兩

刺二 右入姜一兩酒煎

服○一方去刺加斤約奴

補便毒 附下疳 楊梅瘡

龍膽瀉肝湯 治肝經濕熱或

囊癰便毒下疳懸癰腫痛嫩作小

便澀滯或婦人陰癢痒痛或男子

陰挺腫脹或出膿水 淋症

蘇方散 治便毒

木鱉 斤 芍 芷 苒 芎

射銀 虎 穿 沒 方

右水酒各一盞熱煎

兩解湯 治便毒內蘊熱氣外

挾寒邪精血交錯腫結疼痛

桂 虎 芍 芎 丑

嬰各一 永五分 苒二分 右水煎服



百三 消疔敗毒散 專治下疳瘡

柴一錢 共搖分 堯各六 假各六 連

蒼雷分 栢各七 枏各七 枰各七 翁各七 游

各九 其分 右入燈草其品 水煎服

○存便毒量入虛實加虎一二

百七 補心湯 治婦人陰戶生瘡或痛

或痒如虫行狀膿汁淋漓陰飲已盡

參 苓 西 田 弓各三 卡一兩

斤 芍各 貴各 奴各 水各 利各 永

其各五 右入姜棗水煎服○如濕

熱有虫者去姜水利加苦艾嬰吳通

百五 一方 治外腎腫脹痛甚

苜 蝟 穿 蜜各等 右為末酒調下

百六 消風敗毒散 楊梅瘡初起宜此湯

斤 弓 枏 周 地 葛

苓各一 連 栢 堯 共各八

卷 銀 其各五 退各二 右水煎服

百七 廿四味風流飲 瘡毒發出宜此湯

共 假 堯 芷 斤 芍上部瘡

枏 苓 連 丹 錄 五加倍

翁下部瘡 多加倍 加 鱗 苦 銀 刺

蕙 蟬 蚕 栢 疾 其

土 茯 斤 右剉作五十劑水煎服

○瘡痛加羌活○躄虛加參令去丹

補 癩 風

百八 通天再造散 治癩風

鬱 五 刺 虎 白 五 半炒半生

右為末每服五錢日未出時無灰

斤文三 癩風 瘡疥



酒下東向服之當日必下惡物或臭不可近或虫或膿如虫口黑色乃是多年赤色乃是近年數日後又進一服無虫乃止

瘡疥

夏升麻和氣飲 治瘡疥發於四肢痛痒不常甚至增寒發熱陰下濕痒虛人宜服此

升葛 芷 陳精 桔 廿各一斤 苓 守 枳 承 虎各九分 芍七分 右入姜燈州煎服

△按治癩疥之主方也

頂赤小豆湯 治年少血熱遂生瘡疥變為腫滿或煩或渴

赤豆炒斤 商澤 翹 赤芍

離猪 桑各等分 右入姜煎食

遠服○熱甚加犀○一方有澤漆

按治血熱腫滿之主方也○當世

之小瘡多生手足至遍身太痒

或痛故以熱湯洗之則變為腫

滿喘呼氣急煩悶小水赤澀或太

府結燥加腹陳芍姜若太便

結加枳其得効難勝計○產後

遍身浮腫喘嗽氣急小便澀少去

翹加芍陳芍姜腹七八貼而愈

○或語云痘後有此症加犀而安

頂活血四物湯治諸疥瘡經年不愈

斤 芍 地 各一 嬰九 堯 連

新文正 卷五 瘡疥



芸 甘 各六分 紅 一分 方 八分 右水煎服

**千金消毒散** 治一切惡瘡無

名腫毒發背疔瘡便毒初發脉洪數弦實腫甚欲作膿者

堯 芩 枳 各二斤 銀 各一斤 刺

蛻 虎 瑞 芒 各三錢

右酒水各半煎服

**酒歸湯** 治頭瘡

斤 伽 各一斤 漆 涂 芎 貴 各五錢

蒼耳 淀 各七錢 泔 泔 柏 各四分 芸 三分

右水煎服

**梔子清肝湯** 治三焦及足少陽

經血虛肝火風熱耳內作痒或生瘡出水或頸項胸乳等處作痛或寒

熱腫甚自汗口渴或目唇搖動等証

柴 丹 王 各一錢 令 芎 余

斤 加 各七錢 甘 枳 右水煎服

**洪寶丹** 治一切無名腫毒散

血消腫及湯盪火燒金瘡打撲血出不止並効

瑞 三兩 芷 二兩 枳 二兩 鬱 一兩

右爲末熱毒用茶調冷用酒調塗

患處○衄血不止冷水調塗後頸

項上此藥最絕血路

**隔蒜灸法** 治一切惡瘡毒大

痛或不痛或麻木如痛者灸至不

痛不痛者灸至知痛而止其毒隨

火而散蓋火有暢達之義此從治



之法也大有回生之驗

### 金瘡

**頂** 四物湯 治金瘡出血過多

本方加參芪方見虛損

○凡金瘡治法者扶中氣以補氣血清血熱為本撰補中益氣湯內傷四物湯四君子湯八物湯內傷太補湯四方共見等諸方隨症可為加減

新改正合類增補眾方規矩卷五終

### 合類增補眾方規矩卷之六

#### ○婦人科

#### 雜病

**一** 四物調經湯 治婦女或十五

六歲經脉不行日夜生寒熱手足麻痺飲食少進頭痛惡心嘔吐腹中結塊冲動痛者此誤食生冷傷感而致也

候一分 沂二分 芎二分 芩二分 枳各八分  
澤各五分 陳各五分 莪各五分 菱各五分 伽各五分 芷各五分  
茜各五分 索各五分 青各五分 砂各五分 紅各五分 甘各五分

右入姜葱水煎服○遍身痛加羌活○咳嗽加杏會○肚痛加乾漆

○瘧加果恒○泄瀉去枳加衍

新女正 卷之六 婦人雜病



按此方全合證治三五人也其  
外調經水則與調氣養血湯而  
得數功方見次  
在第三

**補**論云經者常候也謂其一身之  
陰陽愆狀知其安危故每月一至  
大過不及皆為不調陽大過則先  
期而至陰不及則後時而來其有  
乍多乍少斷絕不行崩漏不止所  
皆由陰陽衰盛致蓋先期而至者  
血熱也有因脾經血燥加味逍遙  
散有因脾經鬱火歸脾湯見于有  
因脾經怒火加味小柴胡湯見于  
有因血分有熱加味四物湯有因  
勞役火動補中益氣湯見于後時

而至者血虛也有因脾經血虛人  
參養榮湯見虛有因肝經血少六  
味地黃丸有因氣虛血弱八珍湯  
見于蓋血生於脾土故云脾統血  
凡血病當用甘苦之劑以助陽氣  
而生陰血也

**三元戎加味四物湯 因氣衝經**

脈故月事頻併臍下多痛本方加  
芍○如經欲行臍腹痛本方加  
玄胡苦練栝榔木香○如經水過  
多本方加芩朮○如經水澁少本  
方加葵花紅花○如經水適斷或  
往來寒熱宜先服小柴胡湯以去  
寒熱然後以四物湯和之或以一



方併服名柴胡四物湯

三調氣養血湯 專治婦人室女

血氣不和胎前產後諸病

莎二錢 砂一斤 芍芍

芩各三分 右入姜棗水煎服

○氣痛加吳○痰盛合一陳湯左見痰門

四千金調經湯 治婦女經水不

調或曾經小產或帶下三十六病

腹痛口乾或發熱小腹急痛手足

煩熱太府不調時時泄血經水不

調久不懷孕

斤芍芍各二參 芩 王

桂各一吳一門 守各一 芩五

右入姜水煎服

五 大補經湯 治婦人氣血虛弱血

海寒痛或下白帶如魚腦髓或似米

泔不分信期每月淋瀝不止面色痿

黃四支無力頭目眩暈肌體羸瘦

斤芍 莎各六 芍 芩各五 御

令芩 貴 延各四 參 砂

麥 泉 茵 吳 桂 芩各

右入姜棗水煎服

六 經驗調經湯 治婦人經水或

前或後或多或少

斤芍 莎 芍 吳

腹假 蓉各壹 芍 芩各七

其五 右入姜棗水煎服

七 烏藥湯 治婦人血海疼痛



發一分 莎二分 斤壹 蜜 其各五分

右水煎服

八益胃升陽湯 治婦人經候凝

結黑血或塊

芪壹分 佛二分 其各 斤 貴各一分

柴升 各五分 參 曲各壹分

苓二分 右水煎服○腹痛加芍

桂○如渴或口乾加葛二分

八六合湯 治經水不行腹中結

塊腰腿重痛

四物湯加枝茂方見于虛損

九加減五積散 治婦人過經行

時浴身疼痛手足麻痺或生寒熱  
頭疼目眩此乃觸經感冒

本方去水加羌活倍姜方見中寒

十加減四物湯 經候微少漸至

不通手足煩疼形瘦潮熱脈息微

數去芩芍加澤蘭三倍其半分○

如經候過多去芩加地○如經行

身熱脈數頭昏加薰空○如經行

微少或脹或痛四支疼痛加延沒

芷共為末以淡醋湯調下○如經

行不調心腹疼痛只用芍斤二味

煎服名君臣以斤倍於芍 本

方加減詳于虛損門

十一養真湯 一婦經閉不通癥下一塊

已經三載顏色如故而藥無功服

此數劑經行又投數服而塊消矣



斤芎余芩蘇 丹懷母莎 貴右水煎

二十 溫清湯 治婦人經脈不住或如豆汁五色相雜面色痿黃臍腹刺痛寒熱往來崩漏不止

斤 余 芩 芎 連 空 栢 丹各等 右水煎

按婦人久屬虛熱者用之

三十 桑寄生散 治胎漏及經血妄行淋瀝不止

寄斷 芎 斤 伽 莎 膠 神各五 甘 參各一 人 姜 水 煎 服

四十 涼血地黄湯 治血崩 芩 假 蔓 柏 雷 細

芎各二 連 羌 柴 升各三 地 斤各五 甘 壹 紅 少 右水煎服

△按婦人血崩不止腎水陰虛不能鎮守包絡相火故血走而崩也宜此湯

五十 黃芪當歸人參湯 治婦人經

水暴崩不止先因損身失血自後一次縮二十日而來其後暴崩不止蓋因其人心窄性急多驚而心氣不足及飲食不節得之診得掌中寒脈沈細而緩帶數九竅不利四肢無力上氣喘促口鼻氣不調脾胃虛弱胃脘當心而痛左脇縮急當臍有動氣腹鳴下氣大便難宜先治



其本餘症可去安心定志和脾胃益元氣補血養神以大熱劑去其寒少加地去命門相火不令四支痿弱

斤一連二地三曲四貴五

枝各五漏六芪七參八卑九不十

節各杏五右水煎服

按心窄性急多驚或心氣不足飲食失節血崩不止者宜此湯

六十 加減八物湯 治赤白帶下屬氣血虛者

斤 芍 芎 地 參 伽

苓 預 仲 莎 甘 各等梅

右入姜棗水煎服○肥人加芋○瘦人加栝○飽悶去參加砂○腹

痛加苜延去參○冬加煨朮

七十 加減六合湯 治婦人上有痰

火下有白帶痛

斤 芎 伽 椿 各一表

芎 田 倍 栝 各七 雷 六 甘 各八

右入姜水煎服○痰火盛加苓

八十 桂附湯 治白帶腥臭多悲不

樂大寒証

栝 雷 各五 桂 五 附 三 右水煎服

○少食常飽腹中滿悶加芍○不

思飲食加玄○頭腦面上如虫行

及胃中元氣極虛加芪參炙茸周

九十 加味二陳湯 治帶下濕痰者

本方加蒼伽周柴方見于痰門



〔九〕四仙散 治帶下

蒼朮 芫 弓 附各五分

右為末好酒下

〔一〇〕升陽調經湯 治飲食勞倦暴

崩不止或下水漿怠惰嗜臥四支困倦及夏日帶下脫漏等証

搖五分 蔓七分 斤 芸 茸

附各壹 柴 羌 蒼

芪各一 右水煎服

〔二〕五積散 治赤白帶下屬虛寒者

本方加莎苗吳左見于中寒

虛勞

〔三〕逍遙散 治血虛勞倦五心煩熱

肢體痛頭目昏重心忪煩赤口燥

咽乾發熱盜汗減食嗜臥寒熱如

瘧陰虛勞嗽肌躄羸瘦漸成骨蒸

斤 芍 苓 伽 柴各一

茸半 右入姜煎服

○五心煩熱加門錄○經閉加嬰

紅○腹痛加索○胸熱加連丹○

氣惱膈痞悶加實童莎○手擅掉

加芸荆苛○咳嗽加會苑○吐痰

加守貝蕒○飲食不消加查曲○

發渴加門瑞○心慌心跳加酸遠

芎○久瀉加永炒○遍身痛加芸羌

芎○吐血加膠蚌牡○自汗加芪

酸○左腹血塊加稜莪嬰紅○右

腹氣塊加蜜楨○血虛煩熱月水



不調臍腹脹痛痰嗽潮熱加芎少  
 雷錄或加芩○心煩加門鈴○嗽  
 加梅欵會○產後血虛煩熱加芩  
 ○婦人患癩疾歌唱無時踰垣上  
 握乃榮血迷於心絕所致加嬰遠  
 紅方地○若有熱者合小柴胡湯  
 加地辰○氣血兩虛無汗潮熱加  
 芎○子午潮熱加芩胡連門錄芩  
 通車燈○婦人肝脾血虛發熱潮  
 熱或自汗盜汗或頭痛目澁或怔  
 忡不寧頰赤口乾或月經不調或  
 肚腹作痛或小便重墜水道澀痛  
 或腫痛出膿內熱作渴加煨姜片  
 芎少煎服○加牡丹名如味

按宜虛勞熱嗽有汗者兼以男  
 子五心煩熱體瘦骨蒸婦人癩  
 狂月經不調照加減間治之○  
 十八歲婦初產過一七日後面赤  
 肌體發熱心跳不食頃刻睡俄  
 驚聲戰兩手差上擗掉每夜十  
 四五度許他醫束手於是加錄陳  
 連酸而安其後右手腿痺痛加蒼  
 桔發瓜羌冷而全愈○壯婦怯  
 弱癰發間日數方不應於是詳  
 問則久月信不來有盜汗故加  
 錄丹牡得奇妙○產後寒熱往  
 來若此方不應則與四君子湯  
 間得奇効寔陽生而陰長是也



四九 滋陰至寶湯

治婦人諸虛百

損五勞七傷經脈不調肢體羸瘦  
此藥專調經水滋血脈補虛勞扶  
元氣健脾胃養心肺潤咽喉清頭  
目定心慌安神魄退潮熱除骨蒸  
止喘嗽化痰涎收盜汗住泄瀉開  
鬱氣利胸膈療腹痛解煩渴散寒  
熱祛體疼大有奇効不能盡述

沂 芎 藭 陳 雷

貝 侯 籙 門 苛

滌 耳 各二 右入煨姜片煎服

按虛勞熱嗽有汗者宜此湯若  
無汗者宜茯苓補心湯是乃表  
裏之方也即逍遙散為加味之

方也婦人虛勞寒熱逍遙散不  
効則與此湯有數奇也○男子  
虛勞症欲與滋陰降火湯者先  
用此湯有得安全

五九 養老丹

養老丹 溪之母年踰七十旬素多  
痰飲木府燥結小水短少故制一方

參 伽君 膝 芍 臣 陳 苓 佐

春加芎夏加會苓門冬加歸身倍  
生薑一日或一貼或二貼進此藥  
則小水長如舊是卻病捷法也

按予之父年八旬二便不通以  
醫王煎與六味丸而安 醫見予  
爾以來與此湯至今無病是乃  
延壽妙方也



六補 增味四物湯治婦人血積血瘀

斤 芎 芩 芍 煎

漆 桂 茂 各等分 右水煎服

妊娠

七紫蘇和氣飲 凡胎前一切諸

病宜加減而用

蘇 芎 芩 陳 腹 沂

莎 其 右入姜葱煎服

○一方加參氣虛者亦可○妊娠

胎氣不和上心腹脹痛加蜜○

嘔吐不止是惡阻也加苓伽守砂

藿曲喬○胎漏下血加芩并伽文

砂艾糯米○如胎漏下血心腹脹

痛者先以芎歸 各五分 酒煎入童便

一服立止○胎氣不固常慣小產

預服此以固胎元加芩并文砂寄

伽糯米○因事胎動不安及下血

欲墜者加芩參伽苓文并砂○咳

嗽吐痰加桑杏貝 泄瀉加木苓

○瘧加棋果青良守苓葛○胎痛

加并索艾○娠七八箇月前後面

目浮腫加芩苓澤木苓丹門朴○

口噤不省人事言語錯亂加蚌守

苓門遠菖茹○心痛加索乳○腰

痛不可忍加紙茵仲○白濁白帶

加芩守苓精蛎龍骨○小便淋瀝

不通加翁車滑○大便閉澀加地

連枳○娠至九箇月加枳文伽砂



名達生散○臨產驚恐氣結連日  
不下加枳○孕後覺氣不安或腹  
微痛或腰作痛或飲食不美或胎  
動下血及五六箇月內常服數劑  
甚妙加芩文伽砂參并

按胎前諸病大抵除禁忌藥則  
宜隨諸症施治療也必不拘于  
此可考諸方者也

八世補驗胎散 芎為末每服空心

一棧艾葉煎湯調下覺腹內微動  
則有胎也若服後一日不動非胎  
必是經閉

九世當歸芍藥湯 治妊娠腹痛心  
下急滿

芎八 芎各二 芎各四 斤  
令伽各二 右水煎服

世安胎飲孕成之後覺胎氣不安或  
腹微痛或腰間作痛或飲食不美  
運服或至五六月常服數服甚好

伽各一 餘各一 芎各一 參各一 芎  
文各五 貴各五 苒各三 砂各三 水各三

右入姜水煎○一方有阿膠地榆  
按懷胎嘔吐痰水心中憤悶頭  
重目眩惡聞食氣或胎動不安  
腰腹疼痛或時下血及妊娠一  
切疾病并皆治之

世治胎漏 四物湯加膠伽砂莎  
糯米白水煎服



三冊 同治 文分五 伽一 砂各三 琴右

為末每服二錢艾湯調下水煎亦可

三冊 治妊娠心腹大痛氣欲絕者

芎 斤 令 朴各一 右水煎服

四冊 治妊娠腰脚腫痛

令 伽 永 苈各一 杏三

右水煎服○胎腫謂有胎或手足

或頭面通身浮腫者是也屬濕多

或用山梔子一合砂為末米湯調

下丸服亦可

○治妊娠下血如月信來者若致

胞乾非特損子亦能損母

芎 永炮各 右水煎

五冊 參櫛散 治妊娠三月內惡阻

吐逆不食或心虛煩悶

貴 令各一 門 伽 朴 甘各五

或加參 右水煎服

○凡惡阻嘔吐甚者宜四七湯藿香

正氣散方見于傷寒○無陰則嘔者

左脈必弱頭疼全不入食者八物湯

見于合一陳湯見痰加利奴氣弱

者四君子湯見于加貴門朴竹○

日久水漿不入口吐清水者加喬

六冊 犀角飲 治子煩

犀 籙 芩 門 糝各一

其分五 右入瀝水煎服

七冊 分氣飲 治脾胃虛弱氣血不和

胸膈不利或痰氣喘嗽飲食少思

新文正 卷六



貴守令利腹水  
奴伽丹各一  
其五分

右入姜棗水煎服  
八卅 紫蘇飲 治胎氣不和湊上心  
腹脹滿疼痛謂之子懸

腹芎芍 貴水 斤各六  
參 其各三 右入姜棗水煎服

○腹痛加莎蜜 ○咳嗽加奴桑 ○  
熱加芩 ○嘔加砂 ○瀉加伽苓 ○  
有鬱心腹脹滿甚者加茂及喬  
○不食者古芩木湯倍伽 ○火盛  
極一時心氣閉絕而死亦宜此湯  
○此症兩尺脈絕者有誤服動胎  
○死腹中則憎寒手指唇爪俱

青全以舌為症驗古芎歸湯

九卅 治子腫方

斤芎芍 苓 芩 芋 伽  
芩丹 門 朴 其各等 水煎服

十四 防已散 治妊娠腫滿喘促少

便不利 謂之子氣

離 壹 桑 於 水各二 蜜五分  
右入姜煎服

十五 羚羊角湯 治孕婦中風頭頂

強直筋脈拘急言語蹇澁痰涎不  
利或時發搐不省人事名曰子癲

羚羊 搖 酸 五加各五 蘆  
芸 斤 芎 神 杏各四  
蜜 其各二 右入姜煎服



三平 安榮散 治娠娠小便澀少遂  
成淋瀝謂之子淋

門通滑斤燈 苳各五分  
參芎各一兩 右為細末每服

二錢煎麥門冬湯調下此方恐滑  
石太重而滑胎若胎臨月可用若  
六七箇月已前俱不可輕用宜去  
此一味或加丹蓄石榆之類最穩  
門亦恐損胎不可用

三平 冬葵子散 治子淋小腹疼痛  
胎動不安

葵炒柴雪 於 藟  
斤各等 右入姜棗水煎服

四平 丹溪參朮飲 治娠娠轉胞

四物湯加參仰守貴苳 各等  
右水煎服

補泄痢 一方治娠娠下痢赤白腹中疴痛  
芍一斤 仰令 芋 連

芩各五分 蜜洗 苳各三分 右水煎服

六平 一方治娠娠腹痛下痢膿血不止  
連八分 朴 麥各六分 艾 栢 永各五分

斤六 右為末米飲調下

補瘧疾 一方治孕婦瘧疾寒熱相半  
并產後瘧疾

斤 芎 芍 童 貴 守



令洗珍良水葛  
其 右水煎服

**補傷寒**

加味四物湯專治妊婦傷寒諸  
症方見虛損○頭痛身熱無汗脉浮緊  
加平細○傷寒中風表裡自汗頭  
痛項強身熱惡寒脉浮而弱加芩  
蘇○胸膈滿痛脉弦加柴芩○大  
便硬小便赤氣滿而脉沈數加虎  
嬰○小便不利加苓○小便赤  
如血狀者加琥令○四支拘急身  
涼微汗腹中痛脉沈而遲加走桂  
訖○畜血症加地流○身熱大渴  
蒸蒸如熱脉長而大者加羔雷○

下後過解而不愈溫毒發斑如錦  
紋加升堯○下後咳嗽不止者加  
參玄○下後虛痞腹滿加朴洞○  
不得眠者加丹芩○汗後血漏不  
止者胎氣損者加參甘芩○脉浮  
頭腫自利腹中痛去芩加枝○腹  
中痛自利飲食不下脉沈者去芩  
芩加伽甘芩令芩○頭痛項強身  
熱口乾胸脇痛用地加柴西參芩

**產前**

**九平催生湯**

候產母腹痛腰痛見

胞漿水下方便

嬰 蘇 牡 官 苓 各一

右水煎熱服



十五 催生飲 下胎催生立應

斤芎 腹枳 芷 各等分

右水煎溫服

一季 催生散 治難產並胞衣不下

止炒 百草霜 滑各等分 右為

朱煎芎歸湯下二三久一方加其

二季 芎歸湯 治臨產難生胞衣不

下及子死腹中惡露不止腹中血

刺疼痛一切胎前產後危急口噤

垂死等証 方三寸ラシムルナリ

沂一 芎七 右分四貼每貼

用水一盞煎水將乾投酒一盞半

煎五七沸溫服如口噤開灌之

人行五里許再灌盡四貼便省立

產神驗 補此湯加益母名佛

散 〇虛人加參

三季 脫衣散 治胞衣不下

滑各三 膝各三 通各三 葵各三 近二

加枳三 右煎服〇一方去枳

加三 胎衣不出腹臍堅脹急

痛即殺入服此胞即爛下死胎

四季 立効湯 治胞衣不出

膝八分 葵一分 右水煎

〇東井叟常加滑各等

五季 生神散 治產前後氣沈眩暈

蒲炒大 參中 甘小

右為末白湯下

六季 生氣散 治產後氣逆上

新定



百草霜一味些少白湯下

△按催生立効等湯宜放銘又芎歸生神生氣等湯宜續銘是當流之口授心傳也

**補**凡產前有催生之意先須用五積散方見于中寒去卑倍桂姜○平生

虛弱人或太病後或小產凡虛弱人及臨產則宜八物湯十全大補湯方見于虛損芎歸湯等隨症加減

**七**補氣養血湯 治小產氣虛下血不止

參 芪 斤 芍 酒 芍 廿  
麥 童 莎 砂 各等 右水煎服

**八**保氣湯 治寬氣進食瘦弱易

難或居處失宜頓仆胎動若胎痛胎漏兼服佛手散方見當

莎 密 各四 兩 二 奴 廿 各一  
益 水 各半 兩

右為末每二錢白湯調下

**九**一方 治胎死腹中疼痛不已

鹿角燒灰存性為末每三錢溫黃酒送下

**十**一方 存胞衣不下因產母元氣虛弱者

用芎歸倍桂以溫之即下

**十一**灸治 治橫生逆產

服諸藥不下者灸右足小指末頭三炷炷如小麥大







有塊惡寒發熱有惡血加嬰紅  
桂膝奴蜜延童便姜汁誦去平下  
○惡血去後腹不滿不硬不痛  
但虛熱不退加參王母○產後  
惡露不盡瘀血上冲昏迷不醒  
腹滿硬痛者當去惡血加嬰紅  
桂延膝童便姜汁○產後腹軟  
滿不硬痛者不是瘀血乃是脾  
虛故也加參砂朴去母王○產  
後惡露不盡敗血流入肝胃二  
經或腹脇刺痛或發腫滿加萹  
紅朴延桂童蜜去芎○產後血  
去不止是血虛血熱加參芪地  
丹假參梅去母王發血甚不止

加榆入萊汁○產後去血過多  
大腸乾燥無血大便閉結不通  
加甲地嬰杏苓奴朴紅去芎伽  
苓發永母貴○產後氣大脫血  
虛極昏暈不醒者切不可驚哭  
將動則驚散真氣乘昏暈死再  
用熱米湯布按元氣復甦加參  
芪去王發先將熟醋薰鼻即醒  
○產後泄瀉脾虛發腫加參蒼  
砂朴猪豕腹芎去芎苓發母王  
瀉甚不止加衍訶梅去朴○產  
後食傷脾胃飽悶泄瀉後變痢  
者難治加砂蜜預蒼芎去芎芎  
母王發瀉甚不止加衍訶梅去



新正卷六  
○  
朴蜜○產後惡心嘔噦不止若  
去血過多乃是脾胃虛寒血少  
之故加參田梅去母王莎發○  
產後惡露去少嘔噦惡心胸脹  
或胸膈疼痛是惡血冲胃加桂  
砂朴紅去芩伽苓○產後因怒  
傷肝胸脇刺痛飽脹不進飲食  
發熱加砂蜜朴童延苗去芩伽  
苓母玉○產後血虛發煩燥虛  
驚睡臥不安錯語失神加參  
竹丹門辰去發王母永○產後  
口眼喎斜手足牽引或筋惕肉  
瞤或驚悸戰慄不止或作寒熱  
脉或大無力或虛細皆是氣血

俱虛不能榮養筋脉加參芪辰  
去發永母王若脉來浮緊有力  
恐血虛中風去芪辰加芩假卷  
不可全作風治以風散氣誤矣  
有痰加瀝姜汁許田去芪二三  
服藥除芩假卷依本方加減條  
理○產後心血空虛神無所依  
或因悲思鬱結怒氣憂驚驚則  
神舍空舍空則生痰是神不守  
舍使人驚狂煩亂呼罵欲走悲  
歌妄笑頭搖手戰加參妣酸門  
丹貝洞辰瀝對去芩發永母王  
○產後血少脾虛生痰痰迷心  
竅使人昏迷不能言語加薑貝



洞參萬利瀝對去發莎永母王

○產後心血空虛心無養血口

不能言精神短少加參酸苜蓿

神地利門瀝對去王母發永

莎○產後去血過多血虛發腫

者加砂腹朴猪翁去王母發永

○產後惡血去不止流入脾經

發腫滿者加紅腹朴砂蜜猪翁

去母發伽苓○產後脾虛飽悶

不進飲食加砂多朴蜜益去芎

母王發永○產後血虛煩渴不

止津液枯竭加參門玄瑞葛藟

梅芎去芎永王母發莎○產後

脾虛發痰喘氣急加泉蜜軋朴

芎砂洞貝瀝對去母王永伽

莎○產後因去瘀血過多遍

身骨節痛難轉側是血虛不能

榮養節骨加地芎紅參膝乳桂

少去母王發永○產後因去血

過多血虛發瘕者加參芪地芎

去母王發發熱加柴芎少許有

痰加薑貝實瀝對去芎○產

後形躄壯盛手足癱瘓遍身疼

痛難以動縮者是血虛有風痰

也加貝實桂膝苓羌蒼芎瀝對

少去母王永發伽○產後初起

腹中有塊升舉作痛無寒熱者

俗云兒枕七日痛自已或腹滿



硬痛作寒熱者痛不移處是死  
血痛當去惡血痛自止矣○產  
後初起蒸乳發寒熱者加童奴  
通○如去血過多倍芎斤永去  
婁王母○兩脇肋痛加童桂去  
婁王母○小腹陣痛加延嬰紅  
方甚者加茂稜去婁王母○有  
汗加芪蜜酸炒婁王母

**十六** 補虛產後補虛用參朮芪陳近  
芎其如發熱輕則加芩淡滲之其  
熱自除重則加永又云新產不可  
用芎以其酸寒伐發生之氣十日只  
以芪易芎如腹痛者用芎炒而不妨  
按新產補虛之聖藥也新產後

惡寒發熱眼暗不知人事汗如  
浴脈滑加水而煎與生神散則  
漸隨服而愈

**一** 補人參當歸散 治產後去血

過多血虛則內熱心胸煩滿吸吸  
短氣自汗頭痛悶亂補時轉甚

斤芎芎 參 門 桂各等分  
右入粳米合淡竹葉十水煎服

**二** 當歸黃芪湯 治產後陰戶官

中脫下  
斤芎 芪 參各二升半右水煎服

**三** 理脾湯 治產後停食胸膈飽  
悶身發寒熱不思飲食

蒼 貴 曲 查 牙各一



朴一半一 炙一 永八炒分 砂七分 茸二分

右入姜水煎服○泄瀉加令伽○大便閉加嬰紅○小便閉澀加腹

**四** **方** 治產後痢疾不問赤白

斤 芎 芎 伽 令 貴  
蜜 莎 曲 永炒 茸炙

右水煎服○不思飲食加砂○小便不利加芋○久不止以四君子湯加芪粟殼用

**五** **方** 治產後泄瀉

參 伽 苓 貴 芎 永  
芋 朴 砂 斤 茸

右水煎服○或宜參苓白朮散方見 泄瀉

**六** **方** 治產後嘔吐

貴 守 伽 苓 砂 薺 參  
曲 斤 茸 右入姜水煎服

**七** **方** 治產後頭痛

芪 參 伽 貴 斤 升  
柴 細 蔓 芎 藁 茸

右入姜水煎服

**八** **味** 黑神散 治產後惡露不

盡胞衣不下血氣攻心眩暈等症  
蒲炒 芎 朮 斤 永 心

茸各二 黑豆四 右為細末每  
二錢熱酒童便調服○一方去蒲

加附○一方加斤桂為朮於芎  
○凡乳汁不通者有盛有虛也

**盛宜** 枳二 句 柴 瑞各一



通分七童翁 栲 芷

堯 其 各五 右水煎服

虛宜 翁 瑞 斤 弓 芍

地 王不 各等

用猪蹄傍肉四兩煎湯二鍾入藥同服先將蔥湯頻洗乳房

治乳汁不通

王不 瑞 其 各三 斤 鮫 各五

右為末每服二三匙猪蹄湯或熱湯或熱酒調下其乳即通

婦人欲樹乳方

匙 栲 紅 膝 右水煎臨臥服

瓜 蔓 散 治婦人乳疽乳癰奶勞

蔓 斤 各五 乳 沒 各一 其 各五

右合丁劑好酒三碗於銀石器中慢火熬至碗半分為二次食後服如有乳勞便服此藥杜絕病根如毒氣已成能化膿為黃水毒未成即內消疾甚者再合一服以愈為度

十六味流氣飲 治乳岩 左見

荆防敗毒散 治乳岩通用之 左見

左也 左見

○小兒科

急慢驚風

鎮驚散 治驚風搐搦痰嗽喘熱

星 芸 蟬 苛 其 右入姜煎服

按急驚之主方也初發時予與

九文加定蚕錄而取驗多



三 醒脾散 治小兒吐瀉不止作

慢驚風脾困昏沈默默不食

參 伽 苓 蜜 全蝎 定

喬 白附 甘 右姜棗煎服

按慢驚之主方也

四 補 敗毒散 治急驚風初起發熱

手足搐搦上竄天吊角弓反張并

切感冒風寒頭痛發熱咳嗽喘急鼻

塞聲重及瘡疹欲出發搐並宜服之

本方加定蝎 蚕附錄 各等 左見

五 天麻散 治急驚脾胃虛弱或

變慢驚者

守 定 廿 令 伽 各

右入姜 磁器內水煮候乾為末

每服一錢五分姜棗湯調下

六 芎活湯 治急驚風角急反張

參 芩 杏 羌 各一 卑 廿 炙

桂 芎 葛 升 斤 榔 各三

右入姜水煎服

七 人參湯 最能利驚

小柴胡湯加防風枳殼

九 加味和中湯 治小兒慢驚風

參 伽 各一 苓 貴 蝎 各五

田 定 各七 芎 廿 各三 細 分

右入姜棗水煎服

八 啓脾湯 百病愈後俱用此藥

調脾為主

茵 一 伽 苓 瀉 曲 查 各五



參猪苓 蜜斤芍

砂各三 衍个貴二其 驚風

後加辰滑各二 右為末任意姜

湯調服○初生兒塗乳頭上服之

〔空〕補脾益真湯 治小兒胎稟怯

弱外實裡虛因嘔吐乳爛糞色青

而成慢驚風氣逆涎潮眼珠直視

四肢抽掣或因變蒸客忤而作或

因特拘驚嚇而作或因悞服鎮心

寒涼藥而作

蜜斤參芪 喬訛貴

朴衍 其炙珍 苓伽桂

守附各七 蝎个 右入姜煎服○

渴者去附喬衍加參倍苓○瀉者

倍喬訛○嘔吐者倍貴喬守○腹

痛者加朴良○腹脹者加朴喬四

奴○咳嗽者加西玄去附桂珍衍

○痰喘加西奴於去附喬衍珍○

足冷加附喬朴○氣逆不下加西

奴去斤附衍○惡風自汗加芪桂

〔空〕寬氣飲 治小兒風痰壅滿風

傷於氣不能言語

奴參 定 卷 蚕各三

其減 右每服二錢用水一

盞姜三片煎五分不拘時服

按予治慢驚口眼掣手足搐搦

甚者用此湯得數效見准繩幼科

〔空〕錢氏白朮散 慢驚通用 方見消渴



痔疾

四<sub>中</sub>消痔飲 治小兒痔疾身熱面黃肚大青筋瘦弱

參 伽 苓 胡連 曲 連

青 陳 砂 茸 右水煎服

○傷食加查 ○有蟲加史

按諸痔通治之方也

五<sub>中</sub>補消痔丸 治五痔皮黃肌瘦髮直尿白肚大青筋好食泥炭茶米

之物或吐或瀉腹內積塊諸虫作痛

蒼 貴 朴 奴 棋 曲

查 牙 削 茂 砂 令

連 胡連 蕪夷 史 芦

右為末史君子殼煎湯泡蒸餅為

先如彈子大每服一丸清米湯化下

癖疾

六<sub>中</sub>消癖湯 治小兒癖疾發熱口

乾尿赤

參 朮 苓 守 柴 苓

猪 澤 胡連 門 稜 莪

查 茸 右姜棗煎服則立效

○如癖病日久元氣虧損此方不効宜多服醫王養正積自除

按小兒癖積之主方也

七<sub>中</sub>補抑肝扶脾湯 治小兒癖疾日

久不消元氣虛弱脾胃虛損肌消削肚大青筋發熱口乾吐腹脹滿

參 分 伽 令 游 芥 查 各八



貴童曲各六分柴胡連

其各三分連姜製一分右入姜棗煎服

九分大連翹飲 治小兒傷風感冒

發熱痰核顯赤癰癤眼目赤腫口

舌生瘡咽喉疼痛小便淋瀝胎毒

痘疹餘毒一切熱毒并治

堯何滑芩各八分枳各八分

丹翁斤芸各四分柴芩

假各二分蟬五分苒一分竹葉十分

燈草十分右水煎服○風痰骨蒸

加門○實熱丹熱加虎○胎熱痘

疹餘毒加苛○癰癤熱毒加虎芒

十九 羚羊角散 治夜啼及多驚恐

苓芩犀神各一分愛一分

廿少 右水煎服

一分生犀散 治心經虛熱

犀二分籛一分枳一分葛各一分

廿五 右水煎服

二分導赤散 治小兒小腸實熱小

便秘赤 地一分翁一分苒各一分

右入淡竹葉水煎服

補 感冒 治外感風寒鼻塞痰

嗽發熱 惺惺散

參柳苓利細苒各一分芩

葛根各等分右水煎服一方加芍

四分羌活湯 治風邪所傷頭目昏

眩痰涎壅滯肢節煩疼



菴西 甲 苓 弓 甘 炙

蔓 苈 奴 細 羔 女

芸 各等 右水煎服

**五** 大菴活湯 菴 搖 離 芸

苈 連 蒼 伽 苈 苈

細 各等 雷 地 各一 右水煎服

**六** 脫甲散 治小兒發熱頭疼日

久不愈

甲 柴 斤 雷 遊 各三 參

苈 各一 苈 二分 苈 四分 右入姜棗水

煎服○表不解加單裡不解加虎

傷食

**七** 消食散 治小兒傷食腹痛或

脹滿或宿食不消面色黃目無睛

此藥能調和胃氣乳哺消化

查 曲 砂 粉 伽 陳

青 苈 右入姜煎服

○受寒作痛加藿吳○有熱加苈

按兒傷食之主方也

**八** 清中解鬱湯 治脾氣虛弱

飲食停滯鬱熱生痰或身熱赤暈

伽 苈 貴 丹 查 曲 芽

苈 利 苈 各等 右水煎服

**九** 大和散 治內傷乳食肚腹脹

痛外感風寒頭疼發熱宜服

水 貴 莎 菴 蒼 苈

奴 查 曲 芽 苈 各等

右入姜水煎



百銀白散 升 雷 癩 癩 癩

參 伽 苳 苳 苳 各等分

右為末每下麥沸湯調服治小兒百病加減由人○如慢驚搐搦麝香飯湯下○急驚定後陳米湯下○驚吐不止下香湯下○天柱骨倒脚軟濃米湯下○來驚傷寒薄荷蔥白湯下○疳氣肚脹氣急多渴百合湯下○壯熱面赤驚叫金銀薄荷湯下○赤白痢不思飲食及諸病後倦怠不思食姜棗湯下○喫食不知飢飽不長肌肉芽姜湯下○暴吐蕪瓜湯下○神形脫語言不正及大人吐瀉藿藿湯下○

若稟受氣怯小兒可每日一服最妙

補腹脹

一 治小兒腹脹

葡 水 齊 貴 奴 各等分 苳 少

右水煎服 食少者加伽

二 史君子丸 治藏府虛滑及疝

瘦下利腹脇脹滿不思乳食

史 一 苳 多 朴 誦 半生

各五 貴 五分 右為末煉蜜

九茨實大每服五丸米飲化下

補腹痛

三 凡小兒腹痛多是飲所傷宜此湯

伽 二 貴 童 各七分 查 出

砂 牙 各一分 苳 五分 右為末米飲

新定 卷六 腹脹 腹痛



或白湯下 有寒加薑吳有熱加苓

四乳頭散 治夜啼不止腹中疼痛

茶 蜜 各等 右為末少許

著乳頭上使吮乳就服之

五百六神散 治腹痛啼哭面青口

中冷氣四支亦冷曲腰而啼或大便泄瀉青白糞及不吮乳

四君子湯加預扁 方見虛損

右入姜棗水煎服

凡腹痛通用大七氣湯 見積聚 香

砂平胃散 見內 宜用

六百人參散 治嘔吐

參 伽 守 永 雪 貴 各等 分

其少 右入姜棗水煎服

七百定吐飲 治吐逆投諸藥不止服此神効

守二 兩 薑一 兩 桂三 兩

右姜切作小塊如菉豆大同前牛

夏和勻入小鍋內慢火順手炒令

香熟帶乾方下桂再炒勻微有香

氣以紙攤開地上去火毒候冷略

播去黑焦末每服一匙水一盞姜

三片煎七分空心少與緩服

補泄瀉

八百參苓白朮散 治脾胃虛弱飲

食不進多因少力中滿痞噎心中

氣喘嘔吐泄瀉此藥和中不熱久

服養氣育神醒脾悅色須正辟邪



參 伽 苓 朮 各 二 兩 各 一 兩 右 爲 末 每

服 二 錢 棗 湯 調 下 量 兒 歲 數 加 減  
[九百] 四神丸 治脾胃氣虛泄瀉不  
食或不時去後不實或乳母患此  
致兒爲患

衍 玄 兩 骨 子 四 吳 一 兩

右爲末水二碗姜兩紅棗枚煮熟

取棗肉和末麻子大每服二三十

丸空心食前白湯下子母并服

[十百] 錢氏白朮散 治吐瀉或病後

津液不足口乾作渴和胃生津止

瀉利將欲成慢驚風者

參 伽 苓 藿 蜜 葛 其 各 等 分

右水煎服頻瀉泄瀉將慢驚風加

預扁衍○慢驚已作加小定蝎白

附○吐蚘胃寒加喬○胃虛不能

食而大渴不止者加瑞○能食而

渴者白虎湯加參○中氣虛熱口

舌生瘡不喜飲冷者宜此湯

[七百] 益黃散 治脾土虛寒嘔吐泄

瀉方見于○吐瀉肢厥顛陷加藿

喬○驚啼瘈瘲不安加蝎鈎藤

白附○赤白痢加斤粟○白痢加

承○泄瀉加貴朴○傷寒加苦芸

羌小○發渴加葛批瓜

**補 痢疾**

[五百] 清熱化滯湯

治痢主方

新文正 卷三 痢疾



連吳萊煎 芍 貴 苓

奴 芩 甘 右入姜水煎服

○初起積熱止熾加虎芒○血痢

加芩斤印○白痢加朴奴○赤白

并下加芩斤嬰紅滑貴永炒○白

痢久虛加伽苾令去苓連奴○赤

痢久虛下後未愈去苓連加斤芍

芩琴○裏急後重加蜜洗○腹痛

加芍延奴○小便赤少加翁猪澤

○下如豆汁加伽蒼芸○食積加

查洞牙曲○久痢氣血兩虛加參

芪斤芎升衍○下後二便流利惟

後重不去者氣陷于下以升提之

百香連丸 連十兩用吳萊五兩

液湯中牛 蜜兩 右為末醋糊

丸如赤豆大每服二三丸白湯下

○凡脫肛色赤或痛用補中益氣

湯見于送香連丸○久痢裏急後

重欲去不去手足并冷者用補中

益氣湯加蜜骨脂倍升柴

補 瘧疾

百七味清脾湯治食瘧嘔吐痰沫

及時行瘧瘧小間先寒後熱諸瘧

通用方見○小便赤加猪芋

百養胃湯治停食感寒熱發瘧及

中脘虛寒嘔逆惡心等症方見

百截瘧飲 伽 精 貴 童 薑

空猪芋常甘右入姜



棗水煎露一宿服○有汗而熱多者加參芪西芫○無汗熱多者加齊水○寒多者加永珍○痰多加守母○食積加洞查曲芽○夜發者為陰分加斤周○二日三日一發者加參芪伽烏去精○單寒加永附參去薰空猪芋○腹痛加淡洗○室女熱入血室合小柴胡湯用

**補咳嗽**

**百** 參蘇飲

方見干  
咳嗽門

○若肺實有邪去參加文雪杏

**百** 人參平肺散

治心火剋肺咳

嗽喘嘔痰涎壅盛膈胸痞悶

參貴 片炙 錄各五 監各七

女 童門 各四 雪 一匙 右水煎

**補喘急**

**百** 人參欬冬膏

小兒脾胃虛寒

久嗽不止咽膈滿悶咳嗽痰涎嘔吐惡心肚腹膨脹腰背倦痛虛勞冷嗽諸藥無效者宜用之

欬 雪 各一 參 苑 杏

女 各八 水 洗 各五 蜜 各五

母 糖 匙 各二 右為末煉蜜

為丸如龍眼大每一丸姜湯化服

**補雜病**

**百** 夜啼六神散 乳頭散 共見于小兒腹痛門

**百** 追虫丸 治小兒虫積痛凡腹痛

口中出清水者虫積也



史二分洗一分

右水煎服

**當歸連翹湯**

治小兒心脾有

熱舌下有形如舌而小者名曰重舌及唇口兩傍生瘡

斤 堯 芷各三分 虎 茸各一分 右水煎服

**瀉黃散**

治小兒木舌弄舌方見傷寒

○凡弄舌得病後最難疹一惡証也

**清胃升麻湯**

治小兒齒腫涎

流腮腫馬牙疳

升 芎 芍 守各七分 葛 芸

芩 茸各五分 羔 芩一分 伽一分 芷三分

右水煎服

**瀉心湯**

治小兒口瘡

為末蜜水調服

**一方**

治小兒滿口白爛口糜

伽 令 猪 茸 翁 牠

桂 茸各等分 右水煎服

**清胃養脾湯**

治小兒愛吃泥土乃脾虛胃熱所致此藥主之

芩 羔 貴 伽 令 茸各等分

右水煎服

**昌蒲丸**

治小兒在胎其母卒

有驚怖邪乘心舌本不通長四五歲猶不能言

參 苜 門 蓼 芎 斤各三分

乳 辰各一分 右為末煉蜜丸如

麻子大每服十九丸飲下

**調元散**

治小兒稟受元氣不足顛



鱗開解肉肌消瘦腸大而腫語遲  
行遲手足如筒神色昏慢齒生遲

預<sup>五</sup>參<sup>各一</sup>芍<sup>各一</sup>芋<sup>各一</sup>斤<sup>各一</sup>芪<sup>各二</sup>  
令<sup>各一</sup>神<sup>各一</sup>伽<sup>各一</sup>牛<sup>各一</sup>菖<sup>各一</sup>甘<sup>各一</sup>牛<sup>各一</sup>

右入姜棗水煎服

**破故紙散** 治遺尿

紙<sup>一</sup>炒<sup>為末</sup>每服一匙熱湯下

**澄青散** 治小兒大便白小便

濁或澄之如米泔

伽<sup>各一</sup>連<sup>各一</sup>姜<sup>各一</sup>澤<sup>各一</sup>查<sup>各一</sup>童<sup>各一</sup>分

其<sup>三</sup>分 右水煎服

**沒藥散** 治小兒風與熱滯雷蓄

上焦胸膈高起大便不通

沒<sup>各一</sup>虎<sup>各一</sup>奴<sup>各一</sup>利<sup>各一</sup>蜜<sup>各一</sup>

其<sup>各一</sup> 右入姜煎服

○小便不通 **五苓散** 主之 方見中

**茯苓滲濕湯** 治小兒黃疸寒

熱嘔吐而瀉欲飲冷水身軀面目  
俱黃小水不利不得安臥不思食

令<sup>各一</sup>茵<sup>各一</sup>丹<sup>各一</sup>連<sup>各一</sup>離<sup>各一</sup>伽<sup>各一</sup>蒼<sup>各一</sup>

貴<sup>各一</sup>青<sup>各一</sup>奴<sup>各一</sup>熬<sup>各一</sup>苓<sup>各一</sup>芋<sup>各一</sup>分

**羽澤散** 治耳中出膿或疼痛或出水

枯<sup>各一</sup>礬<sup>各一</sup> 為末吹入耳中即愈

一方用抱出雞卵皮炒黃色為末

香油調入耳內即時痛止

**四順清涼散** 治藏府有熱頰

赤作渴四支驚製太便秘瀉或風

熱結核頭面生瘡目赤咽痛一切



有餘之症

枳斤 其 虎各等分 右水煎服

**百** 其 桔湯 治小兒咽喉腫痛風

熱等毒

利三 芸 儼 苓 其

荷各 右水煎服

**百** 化痰降火湯 治痰火尾骨節痛

貴 田 苓 芋 栢 雷

其各等分 右到必用前蜜為引

若痛不止加乳沒

**百** 仙方活命飲 治一切瘡毒未

成內消已成即潰此消毒挑膿止

痛之聖藥也若膿出而腫痛不止

者元氣虛也當補之

鯨 芷 芸 沒 其 芍 斤

乳 瑞 貝各五 銀 貴各三

皂各 右酒水各半煎服

**百** 練陳湯 治小兒吐蛇虫

練仁 貴 田 苓各 其各

右入姜煎服

**百** 宣風散 治初生兒疳風撮口

多啼不乳口出白沫

蝎二十個頭尾全者去毒用酒炙 麝香一字 右同和

勻細末每用半字金銀煎湯調服

初生通用

**百** 五香湯 治毒氣入腹枕裏若

有異證於內加減

喬 蜜 沈 乳各一兩 麝三



右煎空心服○若嘔去麝加藿  
○渴加參兩○一方本方去為加  
藿翹各一兩名小兒香湯

加味五香湯 治瘡癤無名腫

毒專小兒用之

泉 蜜 乳 喬 婆 升 葛  
翹 各一 通 虎 各五 右煎服

○小兒帛包此藥拂出熱湯而服  
按太人小兒瘡毒入腹則托裏  
之方也壽法印和五香加連童  
其而常與小兒即盛脾胃止吐  
逆清心火治蟲積道瘡癤痘疹

**補痘疹**

凡痘瘡欲出而未出因發搐者外

感風寒之邪而內發心熱也宜醒

惺散見于或升麻葛根湯或參蘇

飲敗毒散三方共見等冬月大抵

用五積散見于加減○加味敗毒

散 初起發熱即服此藥神効本

方加芸假定錄去參苓瀉加紫艸

蟬水甲蚤葱解熱表汗○泄瀉加

猪芋去紫艸水煎服出汗為佳

升麻葛根湯發熱之初未分麻

痘傷寒傷食等証以此藥解散庶

無誤事方見○寒月加水○四支逆

冷加枝○時氣酷烈發熱太甚乃是

毒氣加力○加翹名連堯升麻湯

○痘初出之特色白者當大補氣血



參 伽 苳 芎 周 葛  
其 蜜 喬 斤 芍

○如太便泄瀉加衍訶

**消毒飲** 痘疹欲出及未出已

出熱未解急宜服之

力三分 假一分 甘各五分 芸各五分

右水煎加犀尤妙○虛熱加錄○

壯熱加芩紫艸○痘已出未勻減

復○出不快及痒加蟬○有汗加

雲○減食加參查○便秘加虎

氣虛加參伽○血虛加斤芎

**快斑散** 治痘出不快

紫艸 蟬 參 芍各五分 翁二分

其一分 右水煎○丁左去翁加

絞治痘已出被風復入

**如聖湯** 治痘瘡已出未出身

熱如火頭疼臉赤呵欠鼻瘡

芍 周 葛各五分 其 紫艸

翁各三分 查二分 右入姜蔥水

煎服○心煩加門鈴○煩渴合生

脉散○身熱如火加溱錄

**加味四聖散** 治痘出不快及

變陷倒靨小便赤澁餘熱不除

一切惡候或痘出被風吹復不見入

皮膚內鬱熱不散

紫艸 翁 蜜 苳 芎 其

參各等 蟬減 右水煎服

○便閉加奴○便調加糯米



神功散治痘出毒太盛血紅一  
片不分地界如蚊蚤種或諸失血  
或吐瀉七日以前諸証可服解毒

芪參芍紫艸地紅  
粉各等 西 甘草 右煎服○

熱甚加連苓未退者再加虎○有驚  
加蟬○頭粒淡黑者有寒乘之加官

五五 紫艸木香湯治痘出不快大便  
泄利 紫艸 蜜 參 伽

令 甘 各等 糯米 粒  
右煎服 或隱見者加薑

十五 保元湯 治痘不起脹  
參二 芪三 甘一 右水煎服

○當起脹而不起加鯨○血弱不

起根底淡薄加喬桂斤芎○一二  
日初出圓暈成形乾紅少潤加桂

○治血加斤芎○勻氣加貴○解  
毒加芎力○二三日根窠雖圓而

頂陷者加芎桂○根窠雖起色不  
光澤加芍桂糯○五六月氣盈血

弱色昏紅紫加蜜斤芎○六七日  
氣交不旺血雖歸附不能成漿加

桂糯米○七八日毒雖化漿而不  
滿為氣血有疑不能大振加桂糯

○八九日漿不冲滿血附線紅加  
糯○十一二日氣血冲滿血盡漿

足濕潤不斂者內虛也加伽苓○  
十三四日毒雖盡解漿老結痂之



際或有雜症相仍宜此湯○痘瘡發渴加門玄如不止宜參苓白朮散○痘瘡不起發膿漿不厚加芎喬夏月加糯○頭額不起脹加芎○胸膈不起脹加利○腰膝不起脹加膝○兩手不起脹加枝

十一 內托散治氣血虛損或風邪穢毒中觸發瘡毒內陷伏而不出或出而不勻快此藥活血勻氣調胃補虛內托瘡毒使之盡出易收易靨

芪 參 斤 各二 芎 芸 利 朴 芷 茸 各一 蜜 桂 各三

右水煎服○紅紫黑陷屬熱毒者去桂加紫艸苓○若淡白灰黑陷

伏屬虛寒者加喬救裡加桂枝表○當貫而不貫膿者倍參芪斤煎熟臨服入人乳汁好酒同參溫服此貫膿之巧法也○泄瀉加喬禾衍 又名十奇散

十二 木香散 治灰白黑陷嘔吐白沫為表虛

蜜 西 廿 匿 訶 腹 參 各五 貴 桂 守 各五 喬 五

右入姜水煎 十三 異功散 治寒戰交牙瘵塌泄瀉為裏虛

斤 多 貴 佛 匿 附 田 各八 淡 圭 蜜 各八 參 各五 喬 七



右入姜水煎服

**起死回生散**

治痘瘡至七八

且忽然變黑收入腹內偏身抓破  
吮喘死在須臾服此從新別發出  
立可回生

斤 芍 餘 地 周 紅

右半水半酒煎服○上陷加芷下陷  
加倍遍身黑陷加單○脚下有黑疔

至七八日用針挑去以太乙膏貼之

**馮氏天花散**

治痘後失音

瑞 利 苓 訶 陽 苈 各 等 分

右為末用調半匙在碗內外以小  
竹七莖黃荊七條縛作一束點火  
在碗內煎臨臥服

**熱眼丹**

治痘瘡傷眼

丹 次 赫 斤 連 芸

堯 周 利 右水煎服

**麥門冬飲**

治痘毒發熱作渴

咽 痛 愛 文 玆 參 各 三 分

銀 苈 各 五 分 右水煎服

凡孕婦身發瘡宜馮氏單胎散若  
胎動不安宜獨聖安胎二方身熱  
甚宜參蘇飲或瘡稠密宜十奇散  
倍餘斤減圭加莎髮如胎已五月  
則田心之屬俱不必禁

**單胎散**

赫 伽 斤 餘

榛 薰 齊 參 利 空

芸 貴 荊 奴 琴 紫 艸



糯米 芷 芎 芎 砂 太熱加  
鬱 右細切作一服水一盞半煎  
至一盞乾菴蓀帶七個野苧根七寸甜  
瓜蒂一個用銀器煎以荷葉蓋定至  
八分去粗仍用荷葉蓋覆空心溫服  
十九 獨聖散 用連奴砂火炒去穀  
爲末每半匙熱湯調下胎動則服  
服後覺胎熱則安矣

十 安胎散 腹 參 貴 佛

餘 斤 芎 莎 砂 水

苓 其 各 等 右入燈草糯米

水煎服○凡妊娠痘瘡者以安胎  
散爲主加芎天寒有表証者間  
用五積散去麻田厚姜桂換伽藜

餘加柴芩參參糯等○痘出不快  
者消毒飲○痘出後血虛者芎歸  
湯加芎氣虛者保元湯加芎○熱  
盛恐胎墮者寧胎散胎動者安胎  
飲或單砂仁炒爲末酒調服之後  
覺胎熱則安

補 麻疹

凡麻疹初起呵欠發熱惡寒咳嗽  
嚏流涕頭眩宜升麻葛根湯傷寒  
潮熱甚加芩連錄咳嗽加單杏門  
羔咳甚別用涼膈散傷寒加錄利  
○泄瀉宜四芩散泄瀉○便血四  
芩散合犀角地黄湯○吐衄犀角  
地黄湯見干加丹小便赤加翁○



寒熱似瘧宜小柴胡湯見于傷寒又柴

苓湯○初起全類傷寒但面赤中

指冷為異耳已出煩燥作渴者解

毒湯合白虎湯傷寒○便閉三

四日小承氣湯見傷寒防風通聖散

見于中風譫語瀉閉者導赤散見小兒熱証

如泄者四苓散茱萸○譫語如狂

者解毒湯調辰砂六一散○煩渴

作泄者白虎湯加蒼又猪苓湯見

便閉○熱盛乾嘔解毒湯○傷食

嘔吐四君子湯見于虛損○夏月因暑作

嘔四苓散加參忌用衍蜜姜桂熱藥

或出不盡心慌哭啼不止十分危

症死在須臾或下痢腹痛

芩 芍 各等 右水煎服

犀角解毒湯 治麻疹已出太

便下血或小便下血衄血或一便

閉澀瘡疹稠密熱渴赤痛

犀 地 王 麝 連

芩 柏 丹 右水煎服

○如吐血衄血加炒丹童便

○麻疹前後有熱潮不退等証并

為血虛血熱可服四物湯見于虛損○

發渴加麥犀○嗽加薑○有痰加

倍費○麻疹正出之時雖不進飲

食但得麻疹淡紅澤潤真止不為

害加曲砂用○麻疹已出之時如



色紅紫乾燥暗晦乃火盛毒熾用  
地加紅苓○麻疹已出既過三日  
不能沒者乃內有虛熱宜本方如  
失血之症加犀汁解之○麻疹退  
後若有牙根腐爛鼻血橫行并為  
失血之症急用本方加茵翁犀之  
類以利小便如疳瘡色白者死○  
孕婦出麻本方倍加伽苓艾安胎  
清熱為主如胎上冲急用帶根艾  
煎湯磨生枳服之更以本方大進之  
治疹後餘毒  
十仙湯  
柴葛 葛 連 苓 丹  
貴苓 奴 地  
右入姜水煎服

○麻症初起已出已沒及一切雜  
症與痘毒大同但始終藥宜清涼  
雖麻喜清涼痘愛溫暖不易常道  
虛則補實則瀉醫家活法故治麻  
亦有血虛而用四物湯氣虛用四  
君子湯天寒傷冷用溫中理中之  
藥一時之權也○麻症沒後餘熱  
內攻循衣摸床譫言妄語神昏喪  
志者死如熱輕餘毒未除必先見  
諸氣色雖預防之始終以升麻葛  
根湯為主或消毒飲解毒湯隨症  
選用仍忌魚腥葱蒜之物

新改正合類增補衆方規矩卷六尾大



此衆方規矩之方書不知何人之撰述矣寬文第八夏四月爲客于泉州之日或人持此一帖而示予曰此書雖爲淺學而甚略少也請補益之可乎因分門彙類欲易見歷考數百方而指示方下之加減矣聊求

罪於醫門者也

泉南岸和田城下

盛方後學

三省



元祿十五壬午年

正月吉祥日 改正彫刻

書林 文臺屋次郎兵衛



臨泉堂藏板目錄

廣益衆方規矩	五卷	增補靈寶	八卷
同合類增補	七卷	同廣益	九卷
同片假名附	七卷	普渡慈航	八卷
同無点	五卷	濟陰綱目	十卷
同大全綱目	九卷	本草綱目 <small>和久</small>	早卷
小兒要決	九卷	同指南	六卷
急病妙藥集	全	同原始	五卷
同速效方	全	十四經 <small>片假名附</small>	三卷
奇效醫述	二卷	銅人形圖	四枚
痘疹活幼心法	二卷	運氣論 <small>七部指</small>	一冊
同便覽	未刻	大成論 <small>七部指</small>	一冊
同全書	未刻	雜經本義抄	五卷
針道秘決	二卷	同和語抄	未
醫學正傳論	二卷	痰火點雪	未
要方選評	三卷		

書林

京堀川通錦小路上町

文臺屋治郎兵衛



