



卷之六尾

痘疹	雜病	咳嗽	痢疾	腹痛	傷食	癰疾	驚風	小兒科	產前	瘡疾	妊娠	雜病	婦人科
世	世	世	世	世	世	世	世	世	世	世	世	世	世
麻疹	通用	喘急	瘧疾	泄瀉	腹脹	感冒	疝疾		產後	傷寒	泄痢	虛勞	
世	世	世	世	世	世	世	世		世	世	世	世	





合類增補衆方規矩卷之六

○婦人科

雜病

一四物調經湯 治婦女或十五

六歲經脉不行日夜生寒熱手足
麻痺飲食少進頭痛惡心嘔吐腹
中結塊冲動痛者此誤食生冷傷
感而致也

侯一分 沂二分 芎二分 芎二分 芎二分 枳各八分

泮二分 陳二分 莪二分 稜二分 伽二分 芷二分

苗各五分 索各五分 青各五分 砂各五分 紅各五分 甘各四分

右入姜葱水煎服○遍身痛加羌

活○咳嗽加杏會○肚痛加乾漆

○瘧加果恒○世漏去積加行

新文正 卷之六 婦人科 雜病



按此方全合諸治三五人也其
外調經水則與調氣養血湯而
得數功方見三次

補論云經者常候也謂其一身之
陰陽愆狀知其安危故每月一至
太過不及皆為不調陽太過則先
期而至陰不及則後時而來其有
乍多乍少斷絕不行崩漏不止所
皆由陰陽衰盛致蓋先期而至者
血熱也有因脾經血燥加味逍遙
散有因脾經鬱火歸脾湯見于有
因脾經怒火加味小柴胡湯見于
有因血分有熱加味四物湯有因
勞役火動補中益氣湯見于後時

而至者血虛也有因脾經血虛人
參養榮湯見虛損有因肝經血少六
味地黄丸有因氣虛血弱八珍湯
見于蓋血生於脾土故云脾統血
凡血病當用甘苦之劑以助陽氣
而生陰血也

三元戎加味四物湯 因氣衝經

脈故月事頻併臍下多痛本方加
芍○如經欲行臍腹痛本方加
玄胡苦練栝榔木香○如經水過
多本方加芩儻○如經水澁少本
方加葵花紅花○如經水適斷或
往來寒熱宜先服小柴胡湯以去
寒熱然後以四物湯和之或以二

方併服名柴胡四物湯

三調氣養血湯 專治婦人室女

血氣不和胎前產後諸病

莎_{各二分} 葵_{各二分} 砂_{各二分} 斤_{各二分} 芍_{各二分} 芍

芎_{各二分} 甘_{各二分} 右入姜棗水煎服

○氣痛加吳○痰盛合一陳湯左見痰門

四千金調經湯 治婦女經水不

調或曾經小產或帶下三十六病

腹痛口乾或發熱小腹急痛手足

煩熱太府不調時時泄血經水不

調久不懷孕

斤_{各二分} 芍_{各二分} 芍_{各二分} 參_{各二分} 琴_{各二分} 王

桂_{各二分} 吳_{各二分} 門_{各二分} 守_{各二分} 甘_{各二分} 芍

右入姜水煎服

五 大補經湯

治婦人氣血虛弱血

海寒痛或下白帶如魚腦髓或似米

泔不分信期每月淋瀝不止面色痿

黃四支無力頭目眩暈肌體羸瘦

斤_{各二分} 芍_{各二分} 芍_{各二分} 芎_{各二分} 芎_{各二分} 佛

令_{各二分} 葵_{各二分} 貴_{各二分} 延_{各二分} 參_{各二分} 砂

琴_{各二分} 泉_{各二分} 茵_{各二分} 吳_{各二分} 桂_{各二分} 甘_{各二分} 芍

右入姜棗水煎服

六 經驗調經湯

治婦人經水或

前或後或多或少

斤_{各二分} 芎_{各二分} 莎_{各二分} 芍_{各二分} 芍_{各二分} 吳

腹_{各二分} 假_{各二分} 蓉_{各二分} 芎_{各二分} 芍_{各二分} 芍

七 烏藥湯

治婦人血海疼痛

右入姜棗水煎服

發一各 莎二 斤壹 密各 廿各五

右水煎服

八益胃升陽湯

治婦人經候凝

結黑血或塊

芪壹各 伽二 廿各 斤壹 貴各一

柴升各五 參各壹各 曲貳分

芩二分 右水煎服○腹痛加芍

桂○如渴或口乾加葛三分

八六合湯 治經水不行腹中結

塊腰腿重痛

四物湯加枝茂方見于

九加減五積散 治婦人過經行

時浴身疼痛手足麻痺或生寒熱

頭疼目眩此乃觸經感冒

本方去水加羌活倍姜方見于

十加減四物湯 經候微少漸至

不通手足煩疼形瘦潮熱脉息微

數去芍芩加澤蘭三倍 廿半分 ○

如經候過多去芍加地○如經行

身熱脉數頭昏加薰空○如經行

微少或脹或痛四支疼痛加延沒

芷共為末以淡醋湯調下○如經

行不調心腹疼痛只用芍斤二味

煎服名男臣散以斤倍於芍 本

方加減詳于虛損門

十一養真湯 一婦經閉不通癰下下塊

已經三載顏色如故而藥無功服

此數劑經行又投數服而塊消矣

斤芎 余 芎 芎 蘘 匿
丹 懷 母 莎 貴 右水煎

二十 溫清湯 治婦人經脈不住或
如豆汁五色相雜面色痿黃臍腹
刺痛寒熱往來崩漏不止

斤 余 芎 芎 連 空
栢 丹 各等 右水煎
按婦人久屬虛熱者用之

三十 桑寄生散 治胎漏及經血妄
行淋瀝不止

寄 斷 芎 斤 伽 莎 膠
神 各五 分 各一 分 各一 分 各一 分
入姜水煎服

四十 涼血地黄湯 治血崩
芩 限 蔓 栢 雷 細

芎 各二 連 卷 柴 升 各三 地
斤 各五 分 壹 紅 少 右水煎服

△按婦人血崩不止腎水陰虛
不能鎮守包絡相火故血走而
崩也宜此湯

五十 黃芪當歸人參湯 治婦人經
水暴崩不止先因損身失血自後

一次縮二十日而來其後暴崩不止
蓋因其人心窄性急多驚而心氣
不足及飲食不節得之診得掌中
寒脈沈細而緩帶數九竅不利四肢
無力上氣喘促口鼻氣不調脾胃虛
弱胃脘當心而痛左脇縮急當臍
有動氣腹鳴下氣大便難宜先治

其本餘症可去安心定志和脾胃益元氣補血養神以大熱劑去其寒少加地去命門相火不令四支痿弱

連各五分地三分曲一分貴一分

枝各五分漏六分芪一分參一分卑一分

節各五分杏五分右水煎服

按心窄性急多驚或心氣不足

飲食失節血崩不止者宜此湯

六十一 加減八物湯 治赤白帶下屬

氣血虛者

斤芎芎地參伽

苓預仲莎其各等梅

右入姜棗水煎服○肥人加守○

瘦人加栝○飽悶去參加砂○腹

痛加茵延去參○冬加煨永

七十一 加減六合湯 治婦人上有痰

火下有白帶痛

斤芎伽椿芍貴

芎田倍栝雷其

右入姜水煎服○痰火盛加苓

八十一 桂附湯 治白帶腥臭多悲不

樂太寒証

栝雷桂附右水煎服

○少食常飽腹中滿悶加芍○不

思飲食加玄○頭腦面上如虫行

及胃中元氣極虛加芪參炙其周

九十一 加味二陳湯 治帶下濕痰者

本方加蒼伽周柴方見于痰門

新文正 卷六

六

〔九〕四仙散 治帶下

蒼一 芷 弓 附各五分

右爲末好酒下

〔一〕升陽調經湯 治飲食勞倦暴

崩不止或下水漿怠惰嗜臥四支

困倦及夏月帶下脫漏等証

搖五分 蔓七分 斤 芸 茸

周本各壹 柴 羌 蒼

芪各一 右水煎服

〔二〕五積散 治赤白帶下屬虛寒者

虛勞

〔三〕逍遙散 治血虛勞倦五心煩熱

肢體痛頭目昏重心忪煩赤口燥

咽乾發熱盜汗減食嗜臥寒熱如

瘧陰虛勞嗽肌躄羸瘦漸成骨蒸

斤 芍 苓 仰 柴各一

茸 右入姜煎服

○五心煩熱加門錄 ○經閉加嬰

紅 ○腹痛加索 ○胸熱加連丹 ○

氣惱膈痞悶加實童莎 ○手攢捍

加芸荆苛 ○咳嗽加會苑 ○吐痰

加守貝萸 ○飲食不消加查曲 ○

發渴加門瑞 ○心慌心跳加酸遠

○久瀉加承炒 ○遍身痛加芸羌

芎 ○吐血加膠蚌牡 ○自汗加芪

酸 ○左腹血塊加稜莪嬰紅 ○右

腹氣塊加蜜栝 ○血虛煩熱月水

不調臍腹脹痛痰嗽潮熱加芎少
雷錄或加苓○心煩加門鈴○嗽
加梅欵會○產後血虛煩熱加苓
○婦人患癩疾歌唱無時踰垣上
握乃榮血迷於心絕所致加嬰遠
紅方地○若有熱者合小柴胡湯
加地辰○氣血兩虛無汗潮熱加
芎○子午潮熱加苓胡連門鈴芩
通車燈○婦人肝脾血虛發熱潮
熱或自汗盜汗或頭痛目澁或怔
忡不寧頰赤口乾或月經不調或
肚腹作痛或小便重墜水道澀痛
或腫痛出膿內熱作渴加煨姜片
可少煎服○加牡丹名加味通散

按宜虛勞熱嗽有汗者兼以男
子五心煩熱體瘦骨蒸婦人癩
狂月經不調照加減間治之○
十八歲婦初產過一七日後面赤
肌體發熱心跳不食頃刻睡俄
驚聲戰兩手差上擲掉每夜十
四五度許他醫束手於是加錄陳
漣酸而安其後右手腿痺痛加蒼
桔婺瓜羌冷而全愈○壯婦怯
弱癰發間日數方不應於是詳
問則久月信不來有盜汗故加
錄丹壯得奇妙○產後寒熱往
來若此方不應則與四君子湯
間得奇効寔陽生而陰長是也

四九 滋陰至寶湯

治婦人諸虛百

損五勞七傷經脈不調肢體羸瘦
此藥專調經水滋血脈補虛勞扶
元氣健脾胃養心肺潤咽喉清頭
目定心慌安神魄退潮熱除骨蒸
止喘嗽化痰涎収盜汗住泄瀉開
鬱氣利胸膈療腹痛解煩渴散寒
熱祛體疼大有奇効不能盡述
沂 芍 伽 苓 陳 雷
貝 侯 錄 門 各八 苛
滌 甘 各三 右入煨姜片煎服
按虛勞熱嗽有汗者宜此湯若
無汗者宜茯苓補心湯是乃表
裏之方也即逍遙散為加味之

方也婦人虛勞寒熱逍遙散不
効則與此湯有數奇也○男子
虛勞症欲與滋陰降火湯者先
用此湯有得安全

五九

養老丹溪之母年踰七十旬素多

痰飲太府燥結小水短少故制一方

參 伽君膝 芍 臣 陳 苓 佐

春加芍夏加會萃門冬加歸身倍
生薑一日或一貼或二貼進此藥
則小水長如舊是卻病捷法也

按予之父年八旬一便不通以

醫王煎與六味丸而安

爾以來與此湯至今無病是乃

延壽妙方也

六補 增味四物湯 治婦人血積血瘀

斤 芎 芩 芍 劑

漆 桂 茂 各等分 右水煎服

妊娠

七 紫蘇和氣飲 凡胎前一切諸

病宜加減而用

蘇 芎 芩 陳 腹 沂

莎 甘 右入姜葱煎服

○一方加參氣虛者亦可○妊娠

胎氣不和 嘔上心腹脹痛加蜜○

嘔吐不止是惡阻也加苓伽守砂

藿曲喬○胎漏下血加芩井伽文

砂艾糯米○如胎漏下血心腹脹

痛者先以芎歸 各五分 酒煎入童便

一服立止○胎氣不固常慣小產

預服此以固胎元加芩井文砂寄

伽糯米○因事胎動不安及下血

欲墜者加芩參伽苓文井砂○咳

嗽吐痰加桑杏貝 泄瀉加木苓

○瘧加樛果青良守苓葛○胎痛

加井索文○妊七八箇月前後面

目浮腫加芩苓澤木苓丹門朴○

口噤不省人事言語錯亂加蚌守

苓門遠菖茹○心痛加索乳○腰

痛不可忍加紙茵仲○白濁白帶

加芩守苓精蛎龍骨○小便淋瀝

不通加翁車滑○大便閉澀加地

連枳○妊至九箇月加枳文伽砂

名達生散○臨產驚恐氣結連日不下加枳○孕後覺氣不安或腹微痛或腰作痛或飲食不美或胎動下血及五六箇月內常服數劑甚妙加芩文伽砂參井

按胎前諸病大抵除禁忌藥則宜隨諸症施治療也必不拘于此可考諸方者也

八廿補驗胎散 芎為末每服空心

一錢艾葉煎湯調下覺腹內微動則有胎也若服後一日不動非胎必是經閉

九廿當歸芍藥湯 治妊娠腹痛心下急滿

芎八 芎各二 芎各四 斤
令伽各二 右水煎服

卅安胎飲 孕成之後覺胎氣不安或腹微痛或腰間作痛或飲食不美

芎 斤 餘 芎 各一 參 芎
文 貴各五 芎 砂 水各三

右入姜水煎○一方有阿膠地榆按懷胎嘔吐痰水心中憤悶頭重目眩惡聞食氣或胎動不安腰腹疼痛或時下血及妊娠一切疾病并皆治之

卅治胎漏 四物湯加膠伽砂莎糯米白水煎服

三州 同治 文分 伽一 砂 琴各三 右
為末每服二錢艾湯調下水煎亦可

三州 治姙娠心腹大痛氣欲絕者
芎 斤 令 朴各一 右水煎服

四州 治姙娠腰脚腫痛
令 伽 永 苒各一 杏三
右水煎服 ○胎腫謂有胎或手足

或頭面通身浮腫者是也屬濕多
或用山梔子一合砂為末米湯調
下丸服亦可

○治姙娠下血如月信來者若致
胞乾非特損子亦能損母

芎 永 炮各一 右水煎
參 槲散 治姙娠三月內惡阻

吐逆不食或心虛煩悶
貴 令各一 門 伽 朴 苒各五
或加參 右水煎服

○凡惡阻嘔吐甚者宜四七湯藿香
正氣散 方見于傷寒 無陰則嘔者
左脈必弱頭疼全不入食者八物湯

見于 虛損 金一陳湯 見痰 加利奴 ○氣弱
者四君子湯 見于 虛損 加貴門朴竹 ○

日久水漿不入口吐清水者加喬
六州 犀角飲 治子煩

犀 籙 芩 門 藜各一
苒 分五 右入瀝水煎服

七州 分氣飲 治脾胃虛弱氣血不和
胸膈不利或痰氣喘嗽飲食少思

新文三 卷六

貴守令利腹水
奴伽丹各一分 甘炙五分

右入姜棗水煎服

卅八 紫蘇飲

治胎氣不和湊上心

腹脹滿疼痛謂之子懸

腹芎芍 貴水 斤各六分

參 甘各三分 右入姜棗水煎服

○腹痛加莎蜜 ○咳嗽加奴桑 ○

熱加芩 ○嘔加砂 ○瀉加伽苓 ○

有鬱心腹脹滿甚者加茂及喬諸

○不食者古芩木湯倍伽 ○火盛

極一時心氣悶絕而死亦宜此湯

○此症兩尺脈絕者有誤服動胎

藥子死腹中則憎寒手指唇爪俱

青全以舌為症驗古芎歸湯

卅九 治子腫方

斤芎芍 苓 芩 芋 伽

芩丹 門 朴 甘各等分 水煎服

卅四 防已散

治妊娠腫滿喘促小

便不利謂之子氣

離壹分 桑壹分 枳壹分 水各二分 蜜五分

右入姜煎服

卅一 羚羊角湯

治孕婦中風頭頂

強直筋脈拘急言語蹇澀痰涎不

利或時發搐不省人事名曰子癲

羚羊 搖 酸 五加各五分 薏

芸 斤 芎 神 杏各四分

蜜 甘各二分 右入姜煎服

三平 安榮散

治妊娠小便澀少遂

成林瀝謂之子淋

門通滑斤燈其各五

參芎各一右為細末每服

二錢煎麥門冬湯調下此方恐滑

石太重而滑胎若胎臨月可用若

六七箇月已前俱不可輕用宜去

此一味或加丹蓄石榆之類最穩

門亦恐損胎不可用

三平 冬葵子散

治子淋小腹疼痛

胎動不安

葵炒柴雪各等烱各等

右入姜棗水煎服

三平 丹溪參朮飲

治妊娠轉胞

四物湯加參佛守貴各等

右水煎服

補 泄痢

一方治妊娠下痢赤白腹中疴痛

芍一斤佛令芋連

芩各五蜜洗其各三右水煎服

白痢腹痛甚者去芩連加炒承三

六平 一方治妊娠腹痛下痢膿血不止

連八朴各六艾各五栢各五

斤六右為末米飲調下

補 瘧疾

一方治孕婦瘧疾寒熱相半

并產後瘧疾

斤芎芍童貴守

令洗珍良水葛

甘 右水煎服

補傷寒

〔平〕加味四物湯專治妊娠傷寒諸症方見虛損○頭痛身熱無汗脉浮緊加平細○傷寒中風表裡自汗頭痛項強身熱惡寒脉浮而弱加芪籛○胸膈滿痛脉弦加柴芩○太便硬小便赤氣滿而脉沈數加虎嬰○小便不利加苓○小便赤如血狀者加琥令○四支拘急身凉微汗腹中痛脉沈而遲加走桂少○畜血症加地流○身熱大渴蒸蒸如熱脉長而大者加羔雷○

下後過解而不愈溫毒發斑如錦紋加升堯○下後咳嗽不止者加參玄○下後虛痞腹滿加朴洞○不得眠者加丹芩○汗後血漏不止者胎氣損者加參甘芩○脉浮頭腫自利腹中痛去芩加枝炒○腹中痛自利飲食不下脉沈者去芩芎加伽甘芩令芩○頭痛項強身熱口乾胸脇痛用地加柴西參其

產前

〔平〕**催生湯** 候產母腹痛腰痛見

胞漿水下方服

嬰 麩 牡 官 苓 各一

右水煎熱服

十五 催生飲 下胎催生立應

斤芎 腹枳 芷 各等

右水煎温服

一季 催生散 治難產並胞衣不下

止 炒 百草霜 滑 各等 右爲

朱煎芎歸湯下二三分一方加茸

二季 芎歸湯 治臨產難生胞衣不

下及子死腹中惡露不止腹中血

刺疔痛一切胎前產後危急口噤

垂死等証 方三千方レヅルスナリ

沂雨 芎七 右分四貼每貼

用水一盞煎水將乾投酒一盞半

煎五七沸温服如口噤掄開灌之

八行五里許再灌盡四貼便省立

產神驗 補此湯加益母各佛手

○虛人加參

三季 脫衣散 治胞衣不下

滑 四 膝 通 各三 葵 一 近二

加枳 三 右煎服 ○一方去枳

加瞿 三 胎衣不出腹臍堅脹急

痛即殺入服此胞即爛下死胎

四季 立効湯 治胞衣不出

膝 八 葵 一 右水煎

○東井叟常加滑 各等

五季 生神散 治產前後氣沈眩暈

蒲 炒大 參 中 廿 小

右爲末白湯下

六季 生氣散 治產後氣逆上

百草霜一味些少白湯下

△按催生立効等湯宜放銘又
芎歸生神生氣等湯宜續銘是
當流之口授心傳也

補凡產前有催生之意先須用五
積散方見于中寒去卑倍桂姜○平生

虛弱人或大病後或小產凡虛弱
人及臨產則宜八物湯十全大補
湯方見于虛損芎歸湯等隨症加減

七補氣養血湯 治小產氣虛下
血不止

參 芪蜜斤 芍 酒 芎 甘 炙
麥 童 莎 砂各等分 右水煎服
八保氣湯 治寬氣進食瘦胎湯

產或居處失宜顛仆胎動若胎痛
胎漏兼服佛手散方見當

莎 蜜各四兩 蘇二兩 奴 甘各二兩
益 水各半兩

右為末每二錢白湯調下

九一方 治胎死腹中疼痛不已
鹿角燒灰存性為末每三錢溫
黃酒送下

十一方 有胞衣不下因產母元
氣虛弱者

用芎歸倍桂以溫之即下

十一灸法 治橫生逆產

服諸符藥不下者灸右足小指
尖頭三炷艾炷如小麥大

產後

芎歸調血飲

治產後諸疾宜

加減而用之

沂芎 芩 泔 泔 伽 苓

陳 侯 甘 炒 婪 王 母

永 炒 右入姜棗水煎溫服

初產臨服加童便一鍾好酒半鍾

同服是能行瘀血退熱如神○產

後昏憤不語加荊○口苦咽乾加

門○香氣惱加蜜婪○發熱不止

加永 炒○生腸不止加芪參○咳

嗽加會杏○兩脇痛加童桂○吐

痰加守貝○嘔吐不止加砂守去

下○盜汗自汗加芪酸炒○泄瀉

不止加芪永 炒去辛○瘀血不行

心腹兒枕痛加官蒲會牡去伽○

去血過多頭暈暗加荊參永 炒○

胸膈脹悶加砂實查朴○惡露不

行加鮮牡入童便和酒服○小產

後心腹痛去伽苓加索牡嬰紅童

蘭○驚悸怔忡加遠門酸

按產後諸疾先為加減消息而

可用之若不驗則可考諸方矣

補產後惡露發熱頭痛發痛脉

大無力者是氣血虛也本方加

參芪去弓王母○產後早起勞

動發熱惡寒加參芪○產後惡

露不盡胸腹飽悶疼痛或腹中

有塊惡寒發熱有惡血加嬰紅
 桂膝奴蜜延童便姜汁少去平下
 ○惡血去後腹不滿不硬不痛
 但虛熱不退加參王母○產後
 惡露不盡瘀血上冲昏迷不醒
 腹滿硬痛者當去惡血加嬰紅
 桂延膝童便姜汁○產後腹軟
 滿不硬痛者不是瘀血乃是脾
 虛故也加參砂朴去母王○產
 後惡露不盡敗血流入肝胃二
 經或腹脇刺痛或發腫滿加薤
 紅朴延桂童蜜去平○產後血
 去不止是血虛血熱加參芩地
 丹假參梅去母王參血甚不止

加榆入藥汁○產後去血過多
 太腸乾燥無血大便閉結不通
 加卑地嬰杏芩奴朴紅去芎仰
 苓參承母貴○產後氣大脫血
 虛極昏暈不醒者切不可驚哭
 如動則驚散真氣乘昏暈死可
 用熱米湯布按元氣復甦加參
 芩去王參先將熟醋薰鼻即醒
 ○產後泄瀉脾虛發腫加參蒼
 砂朴猪絲腹芎去芎芩參母王
 瀉甚不止加衍訶梅去朴○產
 後食傷脾胃飽悶泄瀉後變痢
 者難治加砂密預蒼芎去平芎
 母王參瀉甚不止加衍訶梅去

朴蜜○產後惡心嘔噦不止若
 去血過多乃是脾胃虛寒血少
 之故加參田梅去母王莎發○
 產後惡露去少嘔噦惡心胸脹
 或胸膈疼痛是惡血冲胃加桂
 砂朴紅去芩伽苓○產後因怒
 傷肝胸脇刺痛飽脹不進飲食
 發熱加砂蜜朴童延茵去芩伽
 苓母玉○產後血虛發煩燥虛
 驚睡臥不安錯語失神加參酸
 竹丹門辰去發王母永○產後
 口眼喎斜手足牽引或筋惕肉
 瞤或驚悸戰掉不止或作寒熱
 脉或大無力或虛細皆是氣血

俱虛不能榮養筋脉加參芪辰
 去發永母王若脉來浮緊有力
 恐血虛中風去芪辰加芸假卷
 不可全作風治以風散氣誤矣
 有痰加瀝姜汁許田去芪二三
 服藥除芸假卷依本方加減條
 理○產後心血空虚神無所依
 或因悲思鬱結怒氣憂驚驚則
 神舍空舍空則生痰是神不守
 舍使人驚狂煩亂吐罵欲走悲
 歌妄笑頭搖手戰加參炒酸門
 丹貝洞辰瀝對去芩發永母王
 ○產後血少脾虛生痰痰迷心
 竅使人昏迷不能言語加薑貝

洞參菖利瀝對去去參莎永母玉

○產後心血空虛心無養血口

不能言精神短少加參酸苜蓿

神地利門瀝對少去王母參永

莎○產後去血過多血虛發腫

者加砂腹朴猪翁去王母參永

○產後惡血去不止流入脾經

發腫滿者加紅腹朴砂蜜猪翁

去母參伽苓○產後脾虛飽悶

不進飲食加砂多朴蜜益去芎

母玉參永○產後血虛煩渴不

正津液枯竭加參門玄瑞葛藟

梅芎去芎永王母參莎○產後

脾虛發痰喘氣急加泉蜜桂朴

芎砂洞貝瀝對少去母玉永伽

莎○產後因去瘀血過多遍

身骨節痛難轉側是血虛不能

榮養節骨加地芎紅參膝乳桂

少去母玉參永○產後因去血

過多血虛發瘧者加參芪地芎

去母玉參發熱加柴芩少許有

痰加葶貝實瀝對少去芎○產

後形躄壯盛手足癱瘓遍身疼

痛難以動縮者是血虛有風痰

也加貝實桂膝芩羌蒼芎瀝對

少去母玉永參伽○產後初起

腹中有塊升舉作痛無寒熱者

俗云兒枕七日痛自已或腹滿

硬痛作寒熱者痛不移處是死
血痛當去惡血痛自止矣○產
後初起蒸乳發寒熱者加童奴
通○如去血過多倍芎斤永去
婁王母○兩脇肋痛加童桂去
婁王母○小腹陣痛加延嬰紅
方甚者加茂稜去婁王母○有
汗加芩 蜜酸炒婁王母

十六補虛產後補虛用參朮芪陳近
芎耳如發熱輕則加芩淡滲之其
熱自除重則加永又云新產不可
用芎以其酸寒伐發生之氣十日只
以芪易芎如腹痛者用芎炒而不妨
按新產補虛之聖藥也新產後

惡寒發熱眼暗不知人事汗如
浴脉滑加永而煎與生神散則
漸隨服而愈

一卒補人參當歸散 治產後去血

過多血虛則內熱心煩滿吸吸
短氣自汗頭痛悶亂補時轉甚

斤芩芍 參 門 桂 各等分

右入粳米合淡竹葉十水煎服

二卒當歸黃芪湯 治產後陰戶宮

中脫下

斤芍 芪 參 各二升半 右水煎服

三卒理脾湯 治產後停食胸膈飽

悶身發寒熱不思飲食

蒼 貴 曲 查 牙 各一

朴一表 永八炒 砂七分 茸一分

右入姜水煎服。○泄瀉加令御。○大便閉加嬰紅。○小便閉澀加腹

四卒 一方 治產後痢疾不問赤白

斤 芎 芍 伽 令 貴

蜜 莎 曲 永炒 茸炙

右水煎服。○不思飲食加砂。○小便不利加芋。○久不止以四君子湯加芪粟殼用

五卒 一方 治產後泄瀉

參 伽 苓 貴 芍 永 芋 朴 砂 斤 茸

右水煎服。○或宜參苓白朮散方見

六卒 一方 治產後嘔吐

貴 守 伽 苓 砂 藿 參 曲 斤 茸 右入姜水煎服

七卒 一方 治產後頭痛

芪 參 伽 貴 斤 升 柴 細 蔓 芎 藁 茸

右入姜水煎服

八卒 八味黑神散 治產後惡露不

盡胞衣不下血氣攻心眩暈等症

蒲炒芎 藁 斤 永 心

茸各二兩 黑豆四兩 右為細末每

二匙熱酒童便調服。○一方去蒲

加附。○一方加斤桂為藁於芍

○凡乳汁不通者有盛有虛也

盛宜 利二 句 柴 瑞各一

通分七 童 翁 藜 芷

堯 甘 各五 右水煎服

虛宜 翁 瑞 片 弓 芍

地 王不 各等

用猪蹄傍肉四兩煎湯二鍾入藥同服先將葱湯頻洗乳房

治乳汁不通

王不 瑞 甘 各三 斤 鮫 各五

右為末每服二三錢猪蹄湯或熱湯或熱酒調下其乳即通

婦人欲擲乳方

匙 藜 紅 膝 右水煎臨臥服

瓜 薑 散 治婦人乳疽乳癰奶勞

薑 斤 各五 乳 沒 各一 甘 各五

右合一劑好酒三碗於銀石器中慢火熬至碗半分為二次食後服如有乳勞便服此藥杜絕病根如毒氣已成能化膿為黃水毒未成即內消疾甚者再合一服以愈為度

十六味流氣飲 治乳岩 方見

荊防敗毒散 治乳岩通用之 方見

方也 方見

小兒科

急慢驚風

鎮驚散 治驚風搐搦痰嗽喘熱

星 芸 蟬 苛 甘 右入

按急驚之主方也初發時予與九文加定蚕錄而取驗多

三 醒脾散 治小兒吐瀉不止

慢驚風脾困昏沈默默不食

參 伽 苓 蜜 全蝎 定

喬 白附 茸 右姜棗煎服

按慢驚之主方也

四 補敗毒散 治急驚風初起發熱

手足搐搦上窠天吊角弓反張并一切感冒風寒頭痛發熱咳嗽喘急鼻

塞聲重及瘡疹欲出發搐並宜服之

本方加定蝎蚕附錄各等 傷寒

五 天麻散 治急驚脾胃虛弱或

變慢驚者

守分 定 廿 令 伽 各一

石入姜磁器內水煮候乾為末

每服一錢五分姜棗湯調下

六 芎活湯 治急驚風角急及張

參 芩 杏 羌 各一 卑 廿 炙

桂 芎 葛 升 斤 搗 各三

右入姜水煎服

七 人參湯 最能利驚

小柴胡湯加防風枳殼

八 加味和中湯 治小兒慢驚風

參 伽 各一 苓 貴 蝎 各五

定 各七 芎 茸 各三 細 分

右入姜棗水煎服

九 啓脾湯 百病愈後俱用此藥

調脾為主

藥一 伽 苓 薤 曲 查 各五

兩

新編五卷六

二五

參猪芋婆蜜斤芥

砂各三衍个貴及其二一驚風

後加辰滑各二右為末任意姜

湯調服○初生兒塗乳頭上服之

空補脾益真湯 治小兒胎稟怯

弱外實裡虛因嘔吐乳爛糞色青

而成慢驚風氣逆涎潮眼珠直視

四肢抽掣或因變蒸客忤而作或

因特拘驚嚇而作或因悞服鎮心

寒涼藥而作

蜜斤參芪喬訖貴

朴衍甘炙珍苓伽桂

守附各七分蝎个右入姜煎服○

傷者去附喬衍加參倍苓○瀉者

倍喬訖○嘔吐者倍貴喬守○腹

痛者加朴良○腹脹者加朴喬西

奴○咳嗽者加西玄去附桂珍衍

○痰喘加西奴於去附喬衍珍○

足冷加附喬朴○氣逆不下加西

奴去斤附衍○惡風自汗加芪桂

二空寬氣飲 治小兒風痰壅滿風

傷於氣不能言語

奴參定羌蚕各三

甘減 右每服二錢用水一

盞姜三片煎五分不拘時服

按予治慢驚口眼掣手足搐搦

甚者用此湯得數效見准繩幼科

錢氏白朮散 慢驚通用

消

消

消

痺疾

四消痺飲

治小兒痺疾身熱面

黃肚大青筋瘦弱

參 伽 苓 胡連 曲 連

青 陳 砂 甘 右水煎服

○傷食加查○有蟲加史

按諸疳通治之方也

五消

消痺丸

治五疳皮黃肌瘦髮

直尿白肚大青筋好食泥炭茶米

之物或吐或瀉腹內積塊諸虫作痛

蒼 貴 朴 奴 棋 曲

查 牙 削 茂 砂 令

連 胡連 蕪荑 史 芦

右為末史君子殼煎湯泡蒸餅為

丸如彈子大每服一丸清米湯化下

痺疾

六消

治小兒痺疾發熱口

乾尿赤

參 朮 苓 守 柴 苓

猪 澤 胡連 門 稜 莪

查 甘 右姜棗煎服則立効

○如痺病日久元氣虧損此方不

効宜多服醫王養正積自除

按小兒痺積之主方也

七消

抑肝扶脾湯

治小兒痺疾日

久不消元氣虛弱脾胃虛損肌消

削肚大青筋發熱口乾吐腹脹滿

參 五 伽 令 游 芥 查 各 分

所收... 痺疾

貴童曲各六分柴胡連

甘各三分連姜製一分右入姜棗煎服

九斗大連翹飲 治小兒傷風感冒

發熱痰核顯赤癰瘡眼目赤腫口

舌生瘡咽喉疼痛小便淋瀝胎毒

痘疹餘毒一切熱毒并治

堯何滑各八分柴各八分芩

丹翁斤芸各四分柴各四分芩

假各一分二分蟬五分一分竹葉十分

燈草十分右水煎服○風痰骨蒸

加門○實熱丹熱加虎○胎熱痘

疹餘毒加苛○癰癤熱毒加虎芒

十九斗羚羊角散 治夜啼及多驚恐

羚羊各一分犀各一分神各一分愛各一分

其少 右水煎服

一斗生犀散 治心經虛熱

犀二分籛一分枳一分柴一分葛各一分

其五分右水煎服

二斗導赤散 治小兒小腸實熱小

便秘赤地翁各一分其各一分

右入淡竹葉水煎服

補感冒

三斗惺惺散 治外感風寒鼻塞痰

嗽發熱

參各一分伽各一分苓各一分利各一分細各一分其各一分苛各一分

蔓根各一分右水煎服一方加芍

四斗羌活湯 治風邪所傷頭目昏

眩痰涎壅滯肢節煩疼

羌西 卑 苓 弓 甘 炙

蔓 芩 奴 細 羔 女

芸 各等 右水煎服

五 大羌活湯 羌 搖 離 芸

芩 連 蒼 伽 甘 芎

細 各一 雷 地 各一 右水煎服

六 脫甲散 治小兒發熱頭疼日 久不愈

甲 柴 斤 雷 遊 各三 參

芎 各一 苓 二分 甘 四分 右入姜棗水

煎服 ○ 表不解加卑裡不解加虎

傷食

七 消食散 治小兒傷食腹痛或 脹滿或宿食不消面色黃目無睛

此藥能調和胃氣乳哺消化

查 曲 砂 糵 伽 陳

青 甘 右入姜煎服

○ 受寒作痛加藿吳 ○ 有熱加芩

按兒傷食之主方也

八 補 清中解鬱湯 治脾氣虛弱

飲食停滯鬱熱生痰或身熱赤暈

伽 苓 貴 丹 查 曲 芽

芎 利 甘 各等 右水煎服

九 大和散 治內傷乳食肚腹脹

痛外感風寒頭疼發熱宜服

水 貴 莎 羌 蒼 芎

奴 查 曲 芽 甘 各等 右入姜水煎

百銀白散 升 雷 癩 扁

參 伽 苓 甘 各等分

右為末每一匙沸湯調服治小兒百病加減由人○如慢驚瀉痢麝香飯湯下○急驚定後陳米湯下○驚吐不止丁香湯下○天柱骨倒脚軟濃米湯下○來驚傷寒薄荷蔥白湯下○疳氣肚脹氣急多渴百合湯下○壯熱面赤驚叫金銀薄荷湯下○赤白痢不思飲食及諸病後倦怠不思食姜棗湯下○喫食不知飢飽不長肌肉芽姜湯下○暴吐蕪瓜湯下○神形脫語言不正及大人吐瀉藿湯下○

若稟受氣怯小兒可每日服最妙

補腹脹

一消脹散 治小兒腹脹

葡 水 齊 貴 奴 各等分 甘 少

右水煎服 食少者加伽

二史君子丸 治藏府虛澀及疝

瘦下利腹脇脹滿不思乳食

史 一 甘 炙 朴 誦 半生

黛 各五 貴 二分 右為末煉蜜

丸 芡實大每服五丸米飲化下

補腹痛

三凡小兒腹痛多是飲所傷宜此湯

伽 半 貴 童 各七分 查 曲

砂 牙 各一分 甘 五分 右為末米飲

或白湯下 有寒加藿吳有熱加芍

四乳頭散 治夜啼不止腹中疼痛

芫 蜜各等分 右為末少許

著乳頭上使吮乳就服之

五六神散 治腹痛啼哭面青口

中冷氣四支亦冷曲腰而啼或大

便泄瀉青白糞及不吮乳

四君子湯加預扁方見

右入姜棗水煎服

凡腹痛通用大七氣湯見積香

砂平胃散見內宜用

六人參散 治嘔吐

參 仰 守 永 雪 貴各等分

甘少 右入姜棗水煎服

七定吐飲

治吐逆投諸藥不止

服此神効

守二 菱一 桂三

右姜切作小塊如菜豆大同前牛

夏和勻入小鍋內慢火順手炒令

香熟帶乾方下桂再炒勻微有香

氣以紙攤開地上去火毒候冷略

搗去黑焦末每服一匙水一盞姜

三片煎七分空心少與緩服

補泄瀉

八參苓白朮散 治脾胃虛弱飲

食不進多因少力中滿痞噎心中

氣喘嘔吐泄瀉此藥和中不熱久

服養氣育神醒脾悅色須止辟邪

參 伽 苓 薤 其 各 一 兩 二 各 一 兩 扁 姜 各 一 兩 砂 利 各 一 兩 右 為 末 每

服 二 老 棗 湯 調 下 量 兒 歲 數 加 減

九百 四神丸 治脾胃虛泄瀉不

食或不時去後不實或乳母患此

致兒為患

衍 玄 兩 骨 子 四 吳 一 兩

右為末水二碗姜兩紅棗百煮熟

取棗肉和末麻子大每服二三十

丸空心食前白湯下子母并服

十百 錢氏白木散 治吐瀉或病後

津液不足口乾作渴和胃生津止

瀉利將欲成慢驚風者

參 伽 苓 薤 蜜 葛 其 各 等 分

右水煎服頻瀉將慢驚風加

預扁衍○慢驚已作加小定蝎白

附○吐虬胃寒加喬○胃虛不能

食而大瀉不止者加瑞○能食而

渴者白虎湯加參○中氣虛熱口

舌生瘡不喜飲冷者宜此湯

七百 益黃散 治脾土虛寒嘔吐泄

瀉方見于○吐瀉肢厥顛陷加藿

喬○驚啼癩瘕不安加蝎鈎藤

白附○赤白痢加斤粟○白痢加

永○泄瀉加貴朴○傷寒加芎芩

羌小○發瀉加葛批瓜

補 痢疾

五百 清熱化滯湯

治痢主方

新文正 卷六 痢疾

三三

如左治此病去第

連吳萊煎芍 貴 苓

奴 苓 甘 右入姜水煎服

○初起積熱止熾加虎芒○血痢

加苓斤印○白痢加朴奴○赤白

并下加芍斤嬰紅滑貴永炒○白

痢久虛加伽芪令去苓連奴○赤

痢久虛下後未愈去苓連加斤芍

芎琴○裏急後重加蜜洗○腹痛

加芍延奴○小便赤少加翁猪澤

○下如豆汁加伽蒼芸○食積加

查洞牙曲○久痢氣血兩虛加參

芪斤芎升衍○下後二便流利惟

後重不去者氣陷于下以升提之

香連丸 連十兩用吳萊五兩

液湯中日焦黑蜜兩右為末醋糊

丸如赤豆大每服二三丸白湯下

○凡脫肛色赤或痛用補中益氣

湯見于傷送香連丸○久痢裏急後

重欲去不去手足并冷者用補中

益氣湯加蜜骨脂倍升柴

補 瘧疾

五 七味清脾湯治食瘧嘔吐痰沫

及時行瘧瘧不問先寒後熱諸瘧

通用方見○小便赤加猪芋

五 養胃湯治停食感寒熱發瘧及

中脘虛寒嘔逆惡心等症方見

五 截瘧飲 伽 精 貴 童 薑

空 猪 芋 常 甘 右入姜

藥水煎露一宿服○有汗而熱多者加參芪西芫○無汗熱多者加齊水○寒多者加永珍○痰多加守母○食積加洞查曲芽○夜發者為陰分加斤周○二日三日一發者加參芪伽烏去精○單寒加永附參去薰空猪芋○腹痛加淡洗○室女熱入血室合小柴胡湯用

補咳嗽

百 參蘇飲

左見于咳嗽門

○若肺實有邪去參加文雪杏

百 人參平肺散

治心火剋肺咳

嗽喘嘔痰涎壅盛膈胸痞悶

參貴 廿灸 錄各五分 匿 雷各七分

女 童門各四分 雪一匙 右水煎

補喘急

百 人參欬冬膏

小兒脾胃虛寒

久嗽不止咽膈滿悶咳嗽痰涎嘔

吐惡心肚腹膨脹腰背倦痛虛勞

冷嗽諸藥無效者宜用之

欬 雪各一兩 參 苑 杏

女 各八分 水 洗 蜜 各五分

母 糖 糖 各二兩 右為末煉蜜

為丸如龍眼大每一丸姜湯化服

補雜病

百 夜啼六神散

乳頭散 共見于小兒腹痛門

百 追虫丸 治小兒虫積痛凡腹痛

口中出清水者虫積也

史二分洗一分右水煎服

當歸連翹湯 治小兒心脾有

熱舌下有形如舌而小者名曰重舌及唇口兩傍生瘡

斤 堯 芷各三分 虎 茸各二分 右水煎服

瀉黃散 治小兒木舌弄舌方見傷寒

○凡弄舌得病後最難疹一惡証也

清胃升麻湯 治小兒齒腫涎

流腮腫馬牙疳

升 芎 芍 守各七分 葛 芸

苓 甘各五分 羔 芩各七分 芷三分

右水煎服

瀉心湯 治小兒口瘡

為末密水調服

一方 治小兒滿口白爛口糜

伽 令 猪 鬃 翁 蚶

桂 茸各等分 右水煎服

清胃養脾湯 治小兒愛吃泥

土乃脾虛胃熱所致此藥主之

苓 羔 貴 伽 令 茸各等分

右水煎服

昌蒲丸 治小兒在胎其母卒

有驚怖邪乘心舌本不通長四五

歲猶不能言

參 苜 門 萸 芎 斤各三分

乳 辰各一分 右為末煉蜜丸如

麻子大每服十九丸飲下

調元散 治小兒稟受元氣不足顛

倒

顛開解肉肌消瘦腸大而腫語遲
行遲手足如管神色昏慢齒生遲

參芍 斤 芪 各二
令神 各一 伽 各二 菖 各一 茸 各一

右入姜棗水煎服

破故紙散 治遺尿

紙一兩炒為末每服一匙熱湯下

澄青散 治小兒大便白小便

濁或澄之如米泔

伽連姜澤 查各一 童分四

其三分 右水煎服

沒藥散 治小兒風與熱滯雷蓄

上焦胸膈高起大便不通

沒 虎 奴 利 各二 蜜

其各一 右入姜煎服

○小便不通 五苓散主之 方見

茯苓滲濕湯 治小兒黃疸寒

熱嘔吐而瀉欲飲冷水身躄面目

俱黃小便不利不得安臥不思食

令茵丹連離伽蒼

貴青奴 齡 苓 各一 芋 各三

砂澤散 治耳中出膿或疼痛或出水

粘礬 為末吹入耳中即愈

一方用抱出雞卵皮炒黃色為末

香油調入耳內即時痛止

四順清涼散 治藏府有熱頰

赤作渴四支等製太便秘瀯或風

熱結核頭面生瘡目赤咽痛一切

有餘之症

麝斤 廿 虎各等分 右水煎服

百 茸 梅湯 治小兒咽喉腫痛風

熱等毒

利三 芸 假 苓 茸

荷各一 右水煎服

百 化痰降火湯 治痰火尾骨節痛

貴 田 苓 芋 栢 雷

茸各等分 右坐必用前蜜為引

若痛不止加乳沒

百 仙方活命飲 治一切瘡毒未

成內消已成即潰此消毒挑膿止

痛之聖藥也若膿出而腫痛不止

者元氣虛也當補之

鯨 芷 芸 沒 茸 芍 斤

乳 瑞 貝各五 銀各三 貴各

皂各一 右酒水各半煎服

百 練陳湯 治小兒吐蛇虫

練仁 貴 田 苓各一 茸各五

右入姜煎服

百 宣風散 治初生兒臍風撮口

多啼不乳口出白沫

蝟二十個頭尾全 麝香一字 右同和

勻細末每用半字金銀煎湯調服

初生通用

百 五香湯 治毒氣入腹托裏若

有異證於內減

喬 蜜 沈 乳各一 麝三

新法正 卷六 初生通用

三七

右煎空心服○若嘔去麝加藿
○渴加參兩一方本方去喬加
藿翹各一兩名五香湯

加味五香湯 治瘡癤無名腫

毒專小兒用之

泉 蜜 乳 喬 婆 升 葛
翹 各一 通 虎 各五 右煎服

○小兒帛包此藥拂出熱湯而服
按太人小兒瘡毒入腹則托裏
之方也膏法印和五香加連童
其而常與小兒即盛脾胃止吐
逆清心火治蟲積道瘡癤痘疹

補痘疹

凡痘瘡欲出而未出因發搖者外

感風寒之邪而內發心熱也宜

惺散見于或升麻葛根湯或參蘇

飲敗毒散三方共見等冬月大抵

用五積散見于加減○加味敗毒

散 初起發熱即服此藥神效本

方加芸假定錄去參苓宜加紫艸

蟬水單蚤葱解熱表汗○泄瀉加

猪芋去紫艸水煎服出汗為佳

升麻葛根湯發熱之初未分麻

痘傷寒傷食等証以此藥解散庶

無誤事方見○寒月加水○四支逆

冷加枝○時氣酷烈發熱太甚乃是

毒氣加力○翹名連壳升麻湯

○痘初出之時色白者當大補氣血

參 伽 芩 芎 周 葛
其 蜜 五 斤 芍

○如大便泄瀉加衍訶

消毒飲 痘疹欲出及未出已

出熱未解急宜服之

加 假 甘 芸 各五

右水煎加犀兕妙○虛熱加錄○

壯熱加芩紫艸○痘已出未勻減

復○出不快及痒加蟬○有汗加

雲○減食加參查○便秘加虎

氣虛加參伽○血虛加斤芎

快斑散 治痘出不快

紫艸 蟬 參 芍 各五 翁 二

其一分 右水煎○一方去翁加

鯨治痘 已出被風復入

如聖湯 治痘瘡已出未出身

熱如火頭疼臉赤呵欠鼻瘡

芍 周 葛 各五 其 紫艸

翁 各三 查 二 右入姜蔥水

煎服○心煩加門鈴○煩渴合生

脉散○身熱如火加泔錄

加味四聖散 治痘出不快及

變陷倒靨小便赤澁餘熱不除

一切惡候或痘出被風吹復不見入

皮膚內鬱熱不散

紫艸 翁 蜜 芩 芎 其

參 各等 蟬 減 右水煎服

○便閉加奴○便調加糯米

神功散治毒太盛血紅一

片不分地界如蚊蚤種或諸朱血
或吐瀉七日以前諸証可服解毒

芩參芍紫艸地紅
分各等 西芩半 右煎服○

熱甚加連芩未退者再加虎○有驚
加蟬○頭粒淡黑者有寒乘之加官

五薑紫艸木香湯治痘出不快大便
泄利參艸 蜜參仰

令各等 芩各等 糯米北
右煎服 或隱見者加麝

十五保元湯 治痘不起脹
參二 芩三 芩一 右水煎服

○當起脹而不起加鯨○血弱不

起根底淡薄加喬桂斤芎○一二

日初出圓暈成形乾紅少潤加桂

○治血加斤芎○勻氣加貴○解

毒加芎力○二三日根窠雖圓而

頂陷者加芎桂○根窠雖起色不

光澤加芍桂糯○五六日氣盈血

弱色昏紅紫加蜜斤芎○六七日
氣交不旺血雖歸附不能成漿加
桂糯米○七八日毒雖化漿而不
滿為氣血有凝不能大振加桂糯
○八九日漿不冲滿血附線紅加
糯○十一二日氣血冲滿血盡漿
足濕潤不斂者內虛也加伽苓○
十三四日毒雖盡解漿老結痂之

際或有雜症相仍宜此湯○痘瘡發渴加門玄如不止宜參苓白朮

散○痘瘡不起發膿漿不厚加芎喬夏月加糯○頭額不起脹加芎

○胸膈不起脹加利○腰膝不起脹加膝○兩手不起脹加枝

內托散治氣血虛損或風邪穢毒中觸使瘡毒內陷伏而不出或

出而不勻快此藥活血勻氣調胃補虛內托瘡毒使之盡出易收易靨

芪 參 斤各二 芎 芸 利
朴 芷 廿各一 蜜 桂 各三

右水煎服○紅紫黑陷屬熱毒者去桂加紫艸苓○若淡白灰黑陷

伏屬虛寒者加喬救裡加桂救表

○當貫而不貫膿者倍參芪斤煎熟臨服入人乳汁好酒同參溫服

此貫膿之巧法也○泄瀉加喬永衍 又名十奇散

木香散 治灰白黑陷嘔吐白沫為表虛

蜜 西 廿 匿 訶 腹
參 各五 貴 桂 守 各八 喬 五

右入姜水煎 異功散 治寒戰交牙瘁塌泄

瀉為裏虛 斤 多 貴 伽 匿 附

田 各 淡 去 蜜 各八 參 各五 喬 七

右入姜水煎服

夏 起死回生散

治痘瘡至七八

且忽然變黑收入腹內遍身抓破

吮喘死在須更服此從新別發出

立可回生

斤 芎 餘 地 周 紅

右半水半酒煎服○上陷加芷下陷

加倍遍身黑陷加單○脚下有黑疔

至七八日用針挑去以太乙膏貼之

夏 馮氏天花散 治痘後失音

瑞利 苓 訶 陽 甘 各等

右為末用調半匙在碗內外以小

竹七莖黃荆七條縛作一束點火

在碗內煎臨臥服

夏 熱眼丹溪方 治痘瘡傷眼

丹 决 赫 斤 連 芸

堯 周 利 右水煎服

夏 麥門冬飲 治痘毒發熱作渴

咽痛 愛 文 玆 參 各三

銀 甘 各五 右水煎服

凡孕婦身發瘡宜馮氏單胎散若

胎動不安宜獨聖安胎二方身熱

甚宜參蘇飲或瘡稠密宜十奇散

倍餘斤減圭加莎髮如胎已五月

則田心之屬俱不必禁

夏 單胎散

赫 薰 齊 參 利 空

芸 貴 蒞 奴 琴 紫艸

糯米苳苳芎砂○太熱加
鬱右細切作一服水一盞半煎
至一盞乾補帶七個野苳根七寸甜
瓜帶一個用銀器煎以荷葉蓋定至
八分去粗仍用荷葉蓋覆空心溫服
獨聖散 用連奴砂火炒去殼
為末每半匙熱湯調下胎動則服
服後覺胎熱則安矣

安胎散 腹參貴伽

餘斤芎 莎便砂 水
苓 苳各等分 右入燈草糯米

水煎服○凡妊娠痘瘡者以安胎
散為主加苓伽天寒有表証者間
用五積散去麻田厚姜桂換伽苳

餘加柴苓參糯等
者消毒飲○痘出後血虛者苳歸
湯加芎氣虛者保元湯加芎○熱
盛恐胎墮者寧胎散胎動者安胎
飲或單砂仁炒為末酒調服之後
覺胎熱則安

補麻疹

凡麻疹初起呵欠發熱惡寒咳嗽
嚏流涕頭眩宜升麻葛根湯見于傷寒
潮熱甚加苓連錄咳嗽加卑杏門
羔咳甚別用涼膈散見于傷寒加錄利
○泄瀉宜四苓散見于泄瀉○便血四
苓散合犀角地黄湯○吐衄犀角
地黄湯見于血証丹小便赤加翁○

寒熱似瘧宜小柴胡湯見干傷寒又柴

芩湯○初起全類傷寒但面赤中

指冷為異耳已出煩燥作渴者解

毒湯合白虎湯傷寒○便閉三

四日小承氣湯見傷寒防風通聖散

見于中風譫語瀕閉者導赤散見小兒

如消者四苓散芩翁○譫語如狂

者解毒湯調辰砂六一散○煩渴

作泄者白虎湯加蒼又猪苓湯見

便閉○熱盛乾嘔解毒湯○傷食

嘔吐四君子湯見于○夏月因暑作

嘔四苓散加參忌用衍蜜姜桂熱藥

或出不盡心慌哭啼不止十分危

症死在須臾或下痢腹痛

芩 芍 各等 右水煎服

犀角解毒湯 治麻疹已出大

便下血或小便下血衄血或一便

閉澀瘡疹稠密熱渴赤痛

犀 一 地 五 王 粉 連

芩 栢 丹 各一 右水煎服

○如吐血衄血加炒丹童便

○麻疹前後有熱潮不退等証并

為血虛血熱可服四物湯見于○

發渴加麥犀○嗽加薑○有痰加

倍貴○麻疹正出之時雖不進飲

食但得麻疹淡紅澤潤真止不為

害加曲砂用○麻疹已出之時如

色紅紫乾燥眩暈乃火盛毒熾用
 地加紅冷○麻疹已出既過三日
 不能沒者乃內有虛熱宜本方如
 失血之症加犀汁解之○麻疹退
 後若有牙根腐爛鼻血橫行并為
 失血之症急用本方加茵翁犀之
 類以利小便如疳瘡色白者死○
 孕婦出麻本方倍加伽苳艾安胎
 清熱為主如胎上冲急用苧根艾
 煎湯磨生抵服之更以本方大進之

十仙湯

治疹後餘毒

柴葛 妙連 苓丹
 貴苓 奴地
 右入姜水煎服

○麻症初起已出已沒及一切雜
 症與痘毒大同但始終藥宜清涼
 雖麻喜清涼痘愛溫暖不易常道
 虛則補實則瀉醫家活法故治麻
 亦有血虛而用四物湯氣虛用四
 君子湯天寒傷冷用溫中理中之
 藥一時之權也○麻症沒後餘熱
 內攻循衣摸床譫言妄語神昏喪
 志者死如熱輕餘毒未除必先見
 諸氣色雖預防之始終以升麻葛
 根湯為主或消毒飲解毒湯隨症
 選用仍忌魚腥葱蒜之物

新改正合類增補家方規矩卷六
 大尾

此衆方規矩之方書不知何人之撰述矣寬文第八夏四月爲客于泉州之日或人持此一帖而示予曰此書雖爲淺學而甚略少也請補益之可乎因分門彙類欲易見歷考數百方而指示方下之加減矣聊求

罪於醫門者也

泉南岸和田城下

盛方後學

三省



元祿十五壬午年

正月吉祥日 改正彫刻

書林 文臺屋次郎兵衛

