


イヘトモ ズトカナラズシモ カガヘ

不必皆古 ヒヤクシ レダガツテモナルニウルー

昔左国秦得

增補聚方規矩凡例

一舊本不分病部令皆分之

一凡每門先書宜ノ字次以增

○生姜一片

按生姜之分量諸書載之希也今見毒尚恒奇效異述生姜三片爲引約重二錢云云依此說則一片之重六分六厘餘也然異述所用藥劑一服之重大抵八弋以下七弋以上也而用生姜大抵一片唯發表之劑用二片今見本邦所用之藥劑一服之重僅不過二弋則生姜一片重用一分六厘可乎此折衷異述所記之分量爲則以便幼學

○水一盞

按醫學正傳凡例曰凡云用水一盞即今之白茶盞也約計半斤之數云此亦異邦大劑之分量也今見本邦所用之煎法藥

劑少而水甚多若以正傳所載
一盞爲一止則本邦之小齊水一
盞僅不及三十戔用之者宜詳
之

○杏仁十个 去皮尖 九分
○桃仁十个 去皮尖 七分五厘
和之分量
○一朱 二分五厘也
○一歩 一分二分也
○一兩 四分八分也 或四分或五分或四
○一斤 二百三十目也

增補衆方規矩凡例終

▲卷之一 ●中風 初丁表

一 八味順氣散 二丁
二 烏藥順氣散 三丁
三 防風通聖散 四丁 勝黄飲子
四 小續命湯 六丁
五 大秦艽湯 七丁
六 加減除濕湯 七丁
七 加減潤燥湯 八丁
八 匀氣散 八丁
九 補 養榮湯 八丁
十 貝母瓜蔞湯 九丁
十一 三生飲 附子 九丁
十二 愈風湯 九丁
○補 類中風 十丁表
十三 加味大補湯 十丁
十四 附子理中湯 十丁
十五 木香順氣散 十丁
十六 加味二陳湯 十丁
十七 加味四物湯 十一丁
十八 加味羌活湯 十一丁
十九 補中益氣湯 十一丁 見内傷

○傷寒、付傷風　虛煩　十二裏

(十二)香蘇散　十三　香蘇散ノ行氣本香解散ノ散正氣天香湯ノ香散ノ香蘇散ノ香ノ字ヲ去ル

(一九)參蘇飲　十五ウ

(二九)茯苓補心湯　十七ウ

(三九)藿香正氣散　十七ウ　(四九)人參敗毒散　十九ウ

倉廩散　平血散　加減敗毒散　交加散　加味敗毒散　辯防敗毒散　和解散　火邪湯

(五九)升麻葛根湯　廿二ウ　(六九)不換金正氣散　加減正氣散　廿三ウ

(七九)十神湯　廿四ウ　(八九)小柴胡湯　廿五ウ　柴苓湯　加味小柴胡湯

大柴胡湯　歟和湯　酈氏小柴胡湯　和解散

(九九)黃連解毒湯　廿六ウ　八寶湯　溫清湯

(十三)白虎湯　廿九ウ　化斑湯　陶氏白虎湯

(一九)桃仁承氣湯　廿九ウ　(二九)三乙承氣湯　卅ウ

(三九)調胃承氣湯　卅ウ　(四九)小承氣湯　卅ウ

(五九)大承氣湯　卅ウ　(六九)加味承氣湯　卅ヲ

(七九)涼膈散　卅一ウ　清心湯　雙和湯　(八九)八解散　卅三ウ　蒿芩湯

(九九)溫膽湯　卅四ウ　加減溫膽湯　(十四)加味溫膽湯　卅五ウ

(一四)九味羌活湯　卅五ウ　(二四)六一順氣散　卅六ウ

(三四)清火化痰湯　卅六ウ　(四四)菖蒲散　卅八ウ

(五四)麻黃湯　卅九ウ　陶氏麻黃湯　(六四)六神通解散　卅九ウ　桂枝湯　回春桂枝湯

(七四)桂枝湯　卅九ウ　陶氏桂枝黃芩湯　(八四)葛氏桂枝黃芩湯

(九四)葛氏解肌湯　卅九ウ　(十五)梔豉湯　卌九ウ

(一五)三白湯　卌九ウ　(二五)加味葛氣湯　卌九ウ

(三五)桂枝大黃湯　四十ウ

▲卷之二　○中寒

(一)理中湯　初ウ　附子理中湯　(二)五積散　三ウ　四順湯

(三)補　(四)逆湯　陶氏四逆湯　五ウ

四 回陽救危湯 五ウ
○補 火症 六ウ面
五 黃連湯 七ヲ
七 黃芩湯 七ヲ
○中暑 附霍乱 七ウ裏
九 五苓散 八ウ 香苓散 四苓散
十 加味四苓散 十ヲ
二十 清暑益氣湯 十一ヲ
四十 參朮益元湯 十一ウ
六十 理中湯 十二ウ
八十 白朮散 十四ヲ
十二 人參白虎湯 十四ウ
○中濕 十四ウ裏
一九 獨活寄生湯 十五ヲ
九十 薤香正氣散 見傷寒 十四ウ
七十 九君子湯 十四ヲ
五十 六和湯 十三ヲ
三十 補 生脈散 清肺生脉散 十三ウ
十 十味香蘇飲 十ウ
八 芍藥湯 七ウ
六 柴胡湯 七ヲ

二九 補 滲濕湯 十六ウ
四九 除濕 湯 十六ウ
○內傷 十七ヲ
七九 升陽和氣湯 十二ヲ
九九 十氣不虛湯 十二ウ
三九 除濕羌活湯 十六ウ
五九 加味五苓散 十六ウ
六九 補中益氣湯 加味益氣湯
八九 補 參朮調
○飲食 付
一九 平胃散 調胃和中 不換金

四六 八物湯 廿六ウ
▲卷之三 ○瘧疾 初丁表
一 九味清脾湯 初
二 七味清脾湯 二ヲ
三 人參養胃湯 二
四 補散邪湯 四ヲ
五 正氣湯 四ヲ
六 人參截瘧飲 四ウ
七 七寶飲 常山七寶飲四ウ
八 不二飲 五ヲ
九 柴苓湯 五ヲ
十 柴胡芎歸湯 五ウ
十一 參歸鼈甲飲 五ウ
十二 老瘧飲 五ウ
十三 加味益氣湯 六ヲ
十四 加減十全大補湯 六ヲ
十五 參歸養榮湯 六ウ
○諸氣附鬱証 宜與虛損考 六ウ
十六 分心氣飲 七ウ
十七 七氣湯 加味七氣湯 九ヲ
十八 四七湯 九ヲ
十九 加減四七湯 九ウ

十九 和中湯 廿五ヲ
二十 補導滯湯 廿五ウ
二十一 倉廩散 廿六ヲ
二十二 治痢奇方 廿六ヲ
二十三 補中益氣湯 廿六ウ

十二 三和散 十ヲ

二九 木香流氣飲 二十四味流氣飲 十二ウ

三九 木香調氣散 十ヲ

四九 蘇子降氣湯 十二ウ

五九 補 上下分消導氣湯 十三ヲ

六九 加味四君子湯 十三ヲ

七九 紫蘇子湯 十三ヲ

八九 正氣天香湯 見傷寒 十三ウ

九九 沈香降氣湯 十三ウ

十三 柴胡抑肝湯 贅証 十四ヲ

一卅 補 當歸活血湯 十四ウ

二卅 香砂平胃散 十四ウ

三卅 瓜蔞枳殼湯 十四ウ

四卅 二陳湯 痰門 十五ヲ

五卅 六欝湯 十五ヲ

六卅 解欝調胃湯 十五ウ

○痰 宜與氣門交考 十五ウ

七卅 二陳湯 狀發一陳湯 十六ヲ

八卅 加味二陳湯 十八ウ

九卅 同方 十八ウ

十四 枳縮二陳湯 十九ヲ

一四 香砂二陳湯 十九ヲ

二四 導痰湯 清熱導痰湯 加減導痰湯

三四 瓜蔞枳實湯 九ヲ

四四 補 清神湯 九ウ

四四 丹溪加味二陳湯 九ウ

四四 桔梗湯 九ヲ

五四 ○咳嗽 可與痰考 九ヲ

六四 參蘇飲 傷寒門 九ヲ

七四 加減瀉白散 九ウ

八四 清肺湯 九ヲ

九四 東垣加減瀉白散 十ヲ

一五 補 瀉白散 十ウ

二五 橘蘇散 十ウ

三五 東垣加減三奇湯 十ウ

四五 貝母湯 十ヲ

五五 人參清肺湯 十ヲ

補 喘急附吼嗽 宜與痰飲喘嗽互考 十四ウ

五五 神秘湯 十五ヲ

六五 定肺湯 十五ヲ

七五 清肺湯 十五ヲ

八五 瓜蔞枳實湯 十五ウ

九五 加味四君子湯 十五ウ

十六 理中湯 十五ウ

二六 蘇子降氣湯 十五ウ

○補劑雜 廿六ノ

六 二陳湯 廿六ノ

六 香砂平胃散 廿六ノ

○嘔吐附吞酸

六 補保中湯 廿七ウ

六 消食清鬱湯 廿六ノ

六 化痰清火湯 廿六ノ

五 當歸補血湯 廿六ウ

七 噯氣 呃逆 廿七ノ

六 清熟豁痰湯 廿七ウ

七 理中湯 廿七

一 加味二陳湯 廿八ノ

三 香砂平胃散 廿八ノ

五 白朮湯 廿八ウ

七 清鬱二陳湯 廿八ウ

七 加減二陳湯 廿九ノ

一 理中湯

三 香砂和中湯 卅裏

四 寬中湯 廿ノ

四 君子湯 初與功散

八 解散 香砂六君子湯 加減四君子湯 ○增損白朮散 入味順氣散 增損四物湯 調氣養血湯

八 安胃湯 廿二ウ

八 補 安胃湯 廿二ウ

七 透膈湯 廿九ノ

一 陳湯 廿九ノ

三 丁香柿蒂湯 廿九ウ

四 翻胃 與嘔吐可考

七 治吐清水方 廿八ウ

四 加味六君子湯 廿八ノ

八 順和湯 廿二ノ

七 生津補血湯 廿二ノ

八 五噎湯 廿三ノ

▲卷之四 ○虛損附 虛勞 初ノ

一 四君子湯 初與功散

八 解散 香砂六君子湯 加減四君子湯 ○增損白朮散 參朮散 白朮散 四物湯 加減四物湯 入味順氣散 增損四物湯 調氣養血湯

二 四物湯 四物苦練湯 慳慳散

三 八物湯 七

四 十全大補湯 八ノ

五 滋陰降火湯 十ノ

六 補 雙和散 十二ウ

七 皈脾湯 十三ノ 加味皈脾湯

八 清離滋坎湯 十三ウ

九 茯苓補心湯 十四ノ

十 人參養榮湯 十四ノ

一十 鱉甲地黃湯 十四ノ

二十 保真湯 十四ウ

三十 和中湯 十四ノ

●血症 附吐血 鰓血 溺血 腸癖 肺癆 腸癰 下血 …十五ヲ
十四 加味犀角地黃湯 …五十一ウ
十五 補清肺湯 …十八ヲ
六十 滋陰降火湯 …十六ウ
七十 黃芪湯 加味黃芪湯 …十八ウ
八十 清火滋陰湯 …十六ウ
九十 清咳湯 …十六ウ
十二 清咯湯 …十六ウ
一九 清唾湯 …十七ヲ
二九 補榮湯 …十七ヲ
三九 加減四物湯 …十七ヲ
五九 理中湯 …十七ヲ
七九 治鼻衄方 …十八ヲ
九九 清肺湯 …十八ヲ
一冊 敗毒散 …十八ウ
三冊 生地黃湯 …十八ウ
五冊 桔梗湯 …十九ヲ
七冊 參朮補脾湯 …十九ヲ
四九 解鬱湯 …十七ウ
六九 又方 …十八ヲ
八九 當皈和血湯 …十八ヲ
一冊 胃風湯 …十八ウ
三冊 清腸湯 …十八ウ
五冊 參芪補肺湯 …十九ウ
七冊 加減逍遙散 …十七ウ
九冊 人參平肺散 …十九ウ
一四 牡丹散 …十ヲ
三四 指迷七氣湯 …十ヲ
五四 柴平湯 …十二ウ
七四 青皮湯 …十二ウ
八冊 治肺癰方 …十九ウ
十四 三仁湯 …十ヲ
二四 大黃湯 …十ヲ
●積聚 …十ヲ
四四 補潰堅湯 …十三ヲ
六四 枳殼散 …十二ウ
●水腫 附鼓脹 …十三ウ
八四 分消湯 實脾飲 …九四ヲ
十五 五皮湯 …十五ヲ
二五 補加減胃苓湯 …十五ウ
四五 行濕補氣養血湯 …十五ウ
六五 寬中養胃湯 …十七ヲ
八五 分氣紫蘇飲 …十七ウ
一五 廣茂潰堅湯 …十六ヲ
三五 加減枳朮湯 …十六ウ
五五 和榮順氣湯 …十七ヲ
七五 木香順氣湯 …十七ウ
九五 豆蔻湯 …十七ウ
四五 補中治濕湯 …十五ヲ

○黃疸 共ヲ

一六 補 茵陳湯 共ウ

三六 腎疸湯 共ヲ

五六 白朮湯 共九ヲ

○補 痞氣 共九ウ

八六 神効湯 共ヲ

十七 烏附通氣湯 共ウ

二七 行氣香蘇散 共ヲ

○汗症 共ヲ

四七 當皈地黃湯 共ウ

六七 茯苓補心湯 共ヲ

○眩暈附健忘 怔忡

七七 參芪附子湯 共三ヲ

五七 補 參芪湯 共三ヲ

三七 當皈六黃湯 共ヲ

一七 五積散 共二ヲ

九七 清火安神湯 共四ウ

驚悸 與氣門 共三ヲ 同上互考

七七 清暑化痰湯 共ヲ

十六 清熱除濕湯 共ヲ

二六 茵陳大黃湯 共ウ

四六 黃芪湯 共九ヲ

六六 秦九湯 共九ウ

七六 吳萊萸湯 共ヲ

九六 烏苓通氣湯 共ウ

一七 五積散 共二ヲ

十八 補 四君子湯 共四ウ

一八 加減四物湯 共五ヲ

二八 加減二陳湯 共五ヲ

三八 滋陰健脾湯 共五ウ

四八 皈脾湯 共五ウ

五八 四物安神湯 共五ウ

六八 二陳湯 共五ウ

七八 養血安神湯 共五ウ

八八 益氣安神湯 共六

九八 茯神湯 共六ウ

○補 消渴 共六ウ

十九 黃連地黃湯 共ヲ

一九 黃芩湯 共七ヲ

二九 麥門冬湯 共七ヲ

三九 滋陰降火湯 共七ヲ

○小便閉 大便閉

四九 潤燥湯 共八ヲ

五九 補 導滯通幽湯 同上

六九 大黃散 共ヲ

七九 豬苓湯 共八ウ

八九 參皈升麻湯 共ヲ

九九 二陳湯 共九ヲ

一百 三和散 共九ウ

一百 厚朴湯 共九ヲ

○淋症 北九ウ

百二 五淋散 四十ウ
百三 八正散 四十ウ
百四 清心蓮子飲 四十ウ
百五 補 必効散 四十一ウ
百六 益元固真丸 四十二ウ
百七 龍胆瀉肝湯 四十三ウ
○溺濁附遺泉遺精
百八 滋榮養衛湯 四十三ウ
百九 補 水火文清飲 四十三ウ
百十 滋腎散 四十三ウ
百十一 導赤散 四十四ウ
百十二 参芪湯 四十四ウ
百十三 定心湯 四十四ウ
百十四 清心湯 四十四ウ
百十五 神芎湯 同
百十六 十味温胆湯 同
百十七 附髪髪

▲巻之五 ○頭痛附髪髪

一 半夏白朮天麻湯 初ウ
二 驅風觸痛湯 二ウ
三 補 當帰補血湯 二ウ
四 加味二陳湯 二ウ
五 黄芪益氣湯 三ウ
六 調中益氣湯 三ウ
七 川芎茶調散 三ウ
八 回首散 三ウ
十 安神湯 四ウ
○心痛 即胃脘痛 附腹痛 四ウ
菊花茶調散 三ウ
九 補虚湯 三ウ
十一 補中益氣湯 四ウ
二十 清熱解鬱湯 五ウ
四十 姜桂湯 五ウ
五十 枳縮二陳湯 五ウ
三十 椒梅湯 五ウ
六十 芎朮姜桂二陳湯 六ウ
七十 一方 六ウ
八十 四味烏沉湯 六ウ
九十 開鬱導氣湯 六ウ
十二 散火湯 六ウ
一九 香砂平胃散 六ウ
二九 温中湯 七ウ
三九 活血湯 七ウ
四九 七仙湯 七ウ
五九 枳實大黄湯 飲食 七ウ
六九 七氣湯 積聚見 七ウ
○脇痛 附腰痛 七ウ
○臀痛 七ウ

七九 疎肝散 八ヲ
九九 補 推氣散 九ヲ
一卅 平肝流氣飲 九ヲ
三卅 神陰湯 九ウ
五卅 調榮活絡湯 十ヲ
七卅 二陳湯 十ヲ
九卅 加味四物湯 十ウ
一四 滋榮調中湯 十ウ
三四 豁痰湯 十ヲ
五四 敗毒散 見傷寒同
七四 木香順氣散 諸氣同
八四 三和散 見氣門
四九 獨活寄生湯 中濕同
一五 活絡湯 同
十五 滲濕湯 同

八七 通氣防風湯 八ウ
十三 柴胡芎皈湯 九ヲ
二卅 柴梗半夏湯 九ウ
四卅 養血湯 九ウ
六卅 當皈拈痛湯 十ヲ
八卅 舒筋湯 十ウ
十四 二朮湯 十ウ
二四 參合湯 十ヲ
四四 五積散 見中寒
六四 烏藥順氣散 中風同
八四 三和散 見氣門
十五 滲濕湯 同

補 脚氣 十一ウ
三五 羌活導滯湯 十二ヲ
五五 防已飲 十二ウ
七五 烏藥平氣散 十三ヲ
九五 三和散 氣門 十三ヲ
一六 五積散 中寒 十三ヲ
痛風 附 麻木
三六 羌活湯 十四ヲ
五六 疎經活血湯 十五ヲ
七六 大防風湯 十六ヲ
九六 靈仙除痛飲 十六ウ
一七 治兩足麻木方 十七ヲ
三七 治肢節腫痛方 十七ウ

二五 羌活導滯湯 十二ヲ
四五 左經湯 麻黃左經湯 半夏 十二ヲ
六五 檳蘇散 十二ウ
八五 治濕熱腳氣方 十三ヲ
十六 敗毒散 傷寒 十三ウ
二六 四物湯 虛損
痺症 痿 十三ヲ
四六 加味八仙湯 十四ヲ
六六 清濕化痰湯 十五ウ
八六 補 解表升麻湯 十六ウ
十七 治兩手疼痛方 十七ヲ
二七 通氣防風湯 脇痛 十七ウ
四七 加味四物湯 十七ウ

七五 三痺湯 十八ヲ
七六 舒經湯 十八ウ
七七 敗毒散 見傷寒 十八ウ
○眼目 十八ウ
一八 洗肝眼目散 九ヲ
二八 滋腎明目湯 十九ウ
三八 補大明散 二十ヲ
四八 養心明目湯 廿ウ
五八 洗肝散 廿ウ
六八 四物龍胆湯 廿ウ
七八 補陽湯 廿ヲ
八八 地黄湯 廿ヲ
九八 益氣聰明湯 廿ヲ
十九 敗毒散 廿ウ
一九 通明利氣湯 廿ヲ
二九 補滋腎通耳湯 廿ヲ
三九 荊芥連翹湯 廿ウ
四九 桂星散 廿ウ
五九 蔓荊子散 廿ウ
六九 通窓飲 廿ヲ
七九 加味益氣湯 十八ヲ
八七 獨活寄生湯 中濕 十八ウ
十八 補中益氣湯 內傷 十八ウ
○鼻 廿ヲ
○耳 廿ウ

九九 加味滑胃散 廿ウ
一百 加減涼膈散 廿ヲ
三百 瀉胃湯 廿ウ
四百 當歸 廿ウ
五百 定痛散 廿ヲ
○咽喉 廿ヲ
六百 清涼散 廿ヲ
七百 補 加味四物湯 廿ヲ
八百 通關飲 廿ヲ
九百 牛蒡子湯 廿ヲ
○痔漏 廿ウ
十百 秦艽羌活湯 廿ヲ
十一百 秦艽防風湯 廿ウ
十二百 治痔瘡腫痛方 廿ウ
十三百 乾葛湯 廿ウ
十四百 補當歸連翹湯 廿ウ
十五百 秦艽當歸湯 廿ヲ
七九 補 清血四物湯 廿三 八九
○口舌唇 附牙齒
八九 宣明防風湯 廿ウ 廿三ウ 廿四ウ 廿五ウ 廿六ヲ
一百 補 赴宴散 廿五ヲ 廿六ウ
三百 三黄湯 廿五ウ
四百 當歸連翹湯 廿六ヲ

○補脫肛 九ヲ
百 參芪湯 九ウ
百 升陽除濕湯 九ウ
○癲癎 十ヲ
百 清心抑胆湯 十ヲ
百 沉香天麻湯 十ヲ
百 補養血清心湯 十ウ
百 清心化痰湯 十ウ
百 加味逍遙散 十ヲ
百 加味二陳湯 十ヲ
○結核付瘰癧 馬刀瘡 十ウ
百 補抑氣內消散 十ヲ
百 內消散 十ヲ
百 消解散 十ヲ
百 五香連翹湯 十ウ
百 益氣養榮湯 十ウ
百 十六味流氣飲瘡瘍 十ヲ
百 導滯湯 十ヲ
○折傷 十ヲ
百 接骨方 十ウ
百 補通導散 十ウ
○破傷風 與傷寒可一六參考 十ウ
百 大弓黃湯 十ウ
○中毒 十ウ
百 齊苨湯 十ウ
百 砒霜毒 十ヲ
百 瑇瑁毒 十ヲ
百 河豚毒 十ヲ
百 豆腐毒 十ウ
百 六畜肉毒 十ウ
百 誤吞鐵針 十ヲ
百 誤吞蜈蚣 十ウ
百 魚骨硬 十ヲ
百 蛇咬 十ウ
百 羌活防風湯 十ウ
百 白朮湯 十ヲ
百 升麻湯 十ウ
百 巴豆毒 十ヲ
百 菌毒 十ヲ
百 補解諸虫毒 十ウ
百 諸菌毒 十ウ
百 中諸物毒 十ヲ
百 吞銅錢 十ヲ
百 誤吞水蛭 十ウ
百 犬咬 十ヲ
百 鼠咬 十ウ

百 蜈蚣咬 ムカデカム 卅ウ
○癰疽附疔瘡 ヨウソヒツケリサウサウ 卅ウ
百 十六味流氣飲 シチロクミリウキイン 卅ヲ
百 補荊防敗毒散 ホヲケイバウハイドクサン 卅ヲ
百 托裡散 タクリサン 卅ウ
百 補中益氣湯 ホチウエキキタウ 卅三ウ
百 八物湯 ハチモツトウ 卅四ヲ
百 竹葉黃芪湯 チクエフワウギトウ 卅四ウ
○補便毒附下疳 ベンドクフケリゲカン
百 龍胆瀉肝湯 リウタンシヤカンタウ 卅七ヲ
百 兩解散 リヤウカイサン 卅七ウ
百 補心湯 ホシンタウ 卅七ウ
百 消風敗毒散 セウフウハイドクサン 卅八ヲ
百 二十四味風流飲 ニジフシミフウリウイン 卅八ヲ

百 黃蜂螫 ハチサス 卅ウ
百 榮衛返魂湯 エイエイハンゴンタウ 卅ウ
百 千金內托散 センキンナイタクサン 卅ウ
百 當皈羌活湯 タウキキヤウクワツタウ 卅三ヲ
百 四君子湯 シクンシタウ 卅三ウ
百 十全大補湯 ジフセンタイフタウ 卅五ヲ
百 五聖湯 ゴセイタウ 卅六ヲ
百 楊梅瘡 ヤウバイサウ 卅六ウ
百 蘇方散 ソハウサン 卅七ウ
百 消痰敗毒散 セウタンハイドクサン 卅七ウ
百 一方 イツハウ 卅八ヲ

○補瀕風 ヒンプウ 四八ウ
百 通天再造散 ツウテンサイサウサン 四九
百 升麻和氣飲 シヨウマワキイン 四九ウ
百 補活血四物湯 ホクワツケツシモツトウ 五〇ヲ
百 酒皈湯 シユキトウ 五〇ウ
百 栀子清肝湯 シシセイカントウ 五一ヲ
百 隔蒜灸法 カクサンキウホウ 五一ウ
百 四物湯 シモツトウ 五二ウ
○瘡疥 サウカイ 四九ヲ

○補金瘡 キンサウ 五二ウ
百 洪寶丹 コウホウタン 五二ヲ

▲卷之六 ○婦人科 フジンクワ 初ヲ
○雜病 ザツビヤウ 初ヲ
一 四物調經湯 シモツテウケイタウ 二ヲ
二 補元戎加味四物湯 ホゲンジウカミシモツトウ 三ヲ 柴胡四物湯
三 調氣養血湯 テウキヤウケツタウ 三ウ
四 千金調經湯 センキンテウケイタウ 三ウ
五 大補經湯 タイホケイトウ 四ヲ
六 經驗調經湯 ケイケンテウケイタウ 四ウ
七 烏藥湯 ウヤクトウ 四ウ
八 益胃升陽湯 エキヰセウヤウタウ 四ウ

九 六合湯 五ヲ
十一 加減四物湯 君臣散 五ヲ
十二 養真湯 五ウ
十三 溫清湯 五ウ
十四 桑寄生散 六ヲ
十五 涼血地黃湯 六ヲ
十六 黃芪當皈人參湯 六ヲ
十七 加減六合湯 七ヲ
十八 加味二陳湯 七ウ
十九 桂附湯 七ウ
二十 四仙散 七ウ
二十一 升陽調經湯 七ウ
二十二 五積散 八ヲ
○虛勞 八ヲ
二十三 逍遙散 加味逍遙散 八ヲ
二十四 滋陰至寶湯 十ヲ
二十五 增味四物湯 十一ヲ
二十六 養老 十ウ
二十七 姙娠 十一ヲ
○紫蘇和氣飲 達生散 十一ウ
二十八 補驗胎散 十二ウ
二十九 當歸芍藥湯 十二ウ
三十 安胎飲 十三ヲ
三十一 治胎漏 十三ウ
三十二 同治 十三ウ
三十三 治姙娠心腹大痛氣欲絕者方 十三ウ
三十四 治姙娠腰脚腫痛方 十三ウ
三十五 犀角飲 十四ヲ
三十六 紫蘇飲 十四ウ
三十七 防已散 十五ヲ
三十八 安榮湯 十五ウ
三十九 丹溪參禾散 十六ヲ
○補泄衝 十六ヲ
四十 一方 十六ウ
○補瘧疾 十六ウ
四十一 一方 十六ウ
○補傷寒 十七ヲ
四十二 加味四物湯 十七ヲ

一五 催生飲 十八ウ
三五 芎飯湯 佛手散 十九ヲ
五五 立効湯 十九ウ
七五 生氣散 十九ウ
九五 保氣散 廿ヲ
一六 一方 廿ウ

○產後 廿ウ

三六 芎飯調血飲 廿一ヲ
五六 補 人參當飯散 廿五ウ
七六 理脾湯 廿六ヲ
九六 一方 廿六ウ
一七 一方 廿六ウ

十五 催生方 十八ウ
二五 催生散 十八ウ
四五 脫衣散 十九ヲ
六五 生神散 十九ウ
八五 補氣養血湯 廿ヲ
十六 一方 廿ウ
二六 灸法 廿ウ

四六 補虛方 廿五ウ
六六 當飯黃芩湯 廿六ヲ
八六 一方 廿六ヲ
十七 一方 廿六ウ
二七 八味黑神散 廿七ヲ

三七 虛宜 九七ヲ
五七 婦人欲斷乳方 廿七ウ
七七 十六味流氣飲 廿八ウ

○小兒科

○急慢驚風

九七 鎮驚散 廿ヲ
一八 補 敗毒散 廿一ウ
三八 芎活湯 廿四ウ
五八 加味和中湯 廿六ヲ
七八 補脾益真湯 廿八ウ
九八 錢氏白朮散 廿ウ

十八 醒脾散 廿一ウ
二八 天麻散 廿四ヲ
四八 人參湯 廿六ヲ
六八 啓脾散 廿八ヲ
八八 寬氣飲 廿ヲ

四七 治乳汁不通 九七ウ
六七 瓜蔞散 廿七ウ
八七 荊防敗毒散 廿八ヲ

十九 消痰丸 廿三ヲ
一九 補 消痰飲 廿三ウ

痰疾 廿ウ

二九 消癖湯 卅三
四九 大連翹湯 卅三
六九 生犀散 卅三
八九 惺惺散 卅四
一百 大羌活湯 卅四
二百 消食散 卅五
四百 大和散 卅五
六百 消脹散 卅六
九百 乳頭散 卅六
二九 補抑肝扶脾湯 卅三
五九 羚羊角散 卅三
七九 導赤散 卅三
九九 羌活散 卅四
一百 脫甲散 卅四
三百 補清中解鬱湯 卅五
五百 銀白散 卅五
七百 史君子丸 卅六
八百 腹痛方 卅六
十百 六神散 卅六
十二百 定吐飲 卅七
十四百 四神丸 卅七
十六百 益黃散 卅七
十八百 香連丸 卅八
二十百 七味清脾湯 卅八
二十二百 截瘧飲 卅八
二十四百 人參平肺散 卅九
二十六百 人參歸冬膏 卅九
二十八百 夜帝六神散 卅九
三十百 當歸連翹湯 卅九
士百 人參散 卅九
二士百 泄瀉 卅九
三士百 參苓白朮散 卅九
五士百 錢氏白朮散 卅九
七士百 痢疾 卅九
九士百 清熱化滯湯 卅九
三十百 痢疾 卅九
五十百 養胃湯 卅九
七十百 咳嗽 卅九
九十百 參蘇飲 卅九
百 喘急 卅九
二百 雜病 卅九
四百 追蟲丸 卅九

瀉黃散 一
瀉心湯 一
清胃養脾湯 一
調元散 一
澄清飲 一
茯苓滲濕湯 一
四順清冷散 一
化痰降火湯 一
練陳湯 一
初生通用 一
五香湯 一
補瘡疹 一
升麻葛根湯 一
消毒飲 一
加味五香湯 一
仙方活命散 一
宣風散 一
清胃升麻湯 一
一方 一
菖蒲丸 一
破故紙丸 一
沒藥散 一
羽澤散 一
芣桔湯 一
快斑散 一
加味四聖散 一
神功散 一
紫蘇木香湯 一
保元湯 一
木香散 一
起死回生散 一
異功散 一
內托散 一
馮氏天花散 一
麥門冬飲 一
獨聖散 一
補麻疹 一
二仙湯 一
十仙湯 一
如聖散 一
熱眼丹溪方 一
罩胎散 一
安胎散 一
犀角解毒湯 一

增補眾方規矩撮目錄終

增補衆方規矩用藥之一字銘
初學者欲易見今以筆畫之多寡記之

畫
力 牛蒡子

三
子 蘇子 小細辛 女菊花

四
丹 山梔子 水紫蘇 斤當皈 方蘇木
王 牡丹皮 升升麻 木木香 弓川芎
丑 牽牛子 天天門冬 井阿膠 文黄芩
瓜 木瓜 本蒙本

五
玄 五味子 卉卉草 田半夏 卯桂地楡
史 史君子 术白术 半半夏 令茯苓
母 益母艸 奴枳殼
牙 麥牙 句瞿麥
守 半夏 永乾薑
仲 杜仲 尤秦艽

六
朴 厚朴 曲神麹 多白蒐
艾 艾葉 灯燈心 竹竹茹
附 香附子 伽白术 没没藥
牡 牡丹皮 沂當皈 杏杏仁 貝貝母
西 前胡
車 車前子 沈沉香 走附子 忍苡冬
半 熟地黄 杜杜仲 甲麻黄 芋澤瀉
孫 蘇子 糸蓼花 余芍藥
門 麥門冬 芷白芷 芎川芎
定 天麻
佳 五加皮 芸防風 官肉桂 乳乳香
虎 大黄 良良香
花 天花粉 枝桂枝 果柹果
吳 吳茱萸 辰辰砂
芥 車前子 泠黄芩 芎荊芥
芦 蘆薈 芳當皈

八
地 生地黄 芒芒硝 玄玄參
荊 芥荊芥
周 升麻
芦 蘆薈

延延胡索 青青皮 皂皂角 板龜板
近當歸尾 芦芦卉 空枳殼
九
胡延胡索 竹竹茹 琴茯苓 泉沈香
桃桃杷葉 枳枳殼 苘薄荷 芸薰草
星天南星 苓黃芩 苑紫苑 紅紅花
查山查子 蕘連翹 砂砂仁 泊黃泊
梔梔蘗根 茅茅根 柿枯蒂 衍肉蓯
栝栝蔞根 茅茅根 茂薏苡 紅紅花
洗檳榔子 削三稜 珍草菓 芽麥芽
首何首烏 前前胡 恒常山 苦苦參
刺皂角子 芫薤 貞益母 射干
十
粉天花粉 厚厚朴 涂芍藥 退蠟退
芦熟地黃 陳陳皮 姜生姜 桔桔梗

茱吳茱萸 羌羌活 荊荊芥 柴柴胡
附白附子 匿茯苓 桂肉桂 犀犀角
蚕白殭蚕 芍芍藥 栢黃栢 烏烏梅
麥麥門冬 倍牛膝 茹竹茹 梅烏梅
桑桑白皮 益益智 翁木通 桓常山
索延胡索 羔石羔 茵茵陳 芪黃芪
穿穿山甲 龍龍骨 侯香附子
十
涉香附子 斷續斷 參人參 商商陸
雪桑白皮 常常山 麻麻黃 連黃連
側側栢葉 茴茴香 栈棧木 槟槟榔
篠地骨皮 豉豉子 莞白芷 斛石斛
偏白扁豆 細細辛 通木通 宿縮砂
游龍胆艸 假荊芥 猪猪苓 蛎牡蛎

御黍殼 淡厚朴 液滑石 虎太貢
陽葛蒲根 黑玄參 對姜汁 接續斷
馳當歸尾 龜甲板 參阿膠 通通草
羚羊角 越山梔子

三十

菖石菖蒲 童寺皮
會五味子 葛葛根
塊馬鬼鈴 貴陳皮
紙破故紙 薙紫蘇
查山查子 椒胡椒
寄桑寄生 菊菊花
淡黃芩 琥琥珀

二十

腹大腹皮 解革薢
瑞而天花粉 雷知母
椹黃芪 葵遠志
搖獨活 遠遠志
菓卉菓 泠黃芩
喬丁子 訶訶子
蚕蚕砂 波婆羅香
勤貝母 的白芍
的蓮肉 紅紅花
硝硝石 滑滑石
蔥葱白 斐遠志

蚱紫蘇子 稜三稜 齊葛根 粳粳米
椿椿根皮 槐槐花 賊木賊 遊龍腦
愛麥門冬 葶葶藶 狄狄豸 滿茵陳
酌白芍 節菊花 連黃連 柒柴胡
鈴金鈴子又川楝子

四十

蔵藏霊仙 琴烏藥
銀金銀花 膏石膏
酸酸棗仁 赤芍
海帥豆蔻 蔗蔗糖
蓉肉蓯蓉 薑生姜
練川練子

五十

葉瓜蔞仁 餘芍藥
翹連翹 膠阿膠
薑訶子 蓮蓮肉

蜜木香 蒼蒼术
實枳實 圖梔子
葉竹葉 薄荊芥
精蒼术 茉香薷
蛸全蝎 蒲蒲黃

蔓葛藤子 懐荷香

十六 柊赤茯苓 膝牛膝 澤瀉 燈灯心

萹蓄香 路芦艸 麝神麝 黛青黛

薑生姜

十七 鮮白鮮皮 瀝竹瀝 麩姜製地黄

蔕山藥 蔄薄荷

十八 嬰桃仁 離防巳 薤香薷 歸當歸

麝神麝 斷續斷

十九 寶姜黄 蘇紫穌

二十 螵牡蛎 蟬蟬退 靫萵花 糯糯米 蘭沢蘭

二十一 顚天門冬 麝麝香 讐讐金 鱉鱉甲

蘿蘿蔔子 續續斷

二十二 蘚木瓜 蘇白鮮皮

一字銘 終

合類增補衆方規矩卷之一

永原了的增撰
山田昌殷校正

○中風

○内經曰風之傷人也或爲寒熱或爲中或爲寒中或爲偏枯入陽經則狂入陰經則顛入皮膚則痒入筋則攣急入骨節則不仁與榮氣相搏則半身不遂入經癱瘓入絡膚頓入腑即不識人入臟即舌强叱沫挾熱則瘈緩挾寒則拘攣挾濕則腫痺○今諸醫所見不同古人論中風風也河澗論中風火也東垣論中風

氣也丹溪論中風濕也風火氣濕四者立說以賢論之總之一虛而已何也良由素失調護或五味之有傷或七情之感甚或嗜慾之無節以致藏府虧損倘或勞役之過極以致風邪乘虛卒中者風也陰精枯竭水衰火盛而昏冒者火也元陽耗散不任風寒故昏冒者氣也氣血衰憊中氣不運而生痰濕痰壅盛而昏冒者濕也以上四者而歸之一虛可謂明矣賢嘗考諸明醫論曰所謂外中風邪者亦未必不由元精虛弱榮衛失調而後感之也所謂因火因氣因濕亦未必絕無外邪侵侮而作焉誠確論也

脉 脉經曰微而數中風使然○寸口沈大而滑沈則爲實滑則爲氣氣實相搏入於藏則死入於腑則愈此爲卒厥不知人唇青身冷爲入藏死身温和汗自出爲入腑而復自愈○脉陽浮而滑陰濡而弱或浮而滑或沈而滑或微而虛或數寸口或浮而緩或緩而遲皆爲中風之證大法浮遲者吉急疾者凶脉浮而遲者易治大數而急者死

二 八味順氣散 治中風先服此藥以順其氣次用治風之藥

仰 岑 童 並

陳　麥　參各二錢　甘一分

右煎服〇或加星窠以攻痰氣〇或痰盛加守二十介　姜二十片〇氣厥者與中風相似何以別之風中身温氣中身冷先以此湯

按有四君子湯補脾胃中氣藥也芷去手陽明經風麥通腎胃間氣陳理肺氣童泄肝氣若風在手陽明而肝肺腎胃之氣實者專可用之〇卒倒不知人事痰涎壅盛癱瘓不仁舌强不語與此湯間求驗〇卒中風醒後七氣弗鬱而手足厥或癱瘓痺痛者亦間得奇効〇或語云一切鬱病氣弱者妙也又云諸病共有少眩暈者用之補一方去苓陳加

定泉水瓜〇老人加餘苓斤涉

三烏藥順氣散　治卒中風手足不遂言語蹇澁四肢骨節疼痛肩膊麻痺筋脈拘攣及腳氣步履艱辛婦人血風老人冷氣

麻　麥　陳各二錢　甘各半　芎　蚕　枳　桔各一錢　永炮甘各半

右入姜棗煎服〇寒熱頭痛加蔥白〇身體不能屈伸爲末温酒調下〇瘙痒扒之成瘡薄荷煎湯調下〇中風一身俱麻加參伽斤門〇久癱瘓去麻加定芸羌守星蜜

斤○口眼喎斜加連翹芸荊瀝姜
汁一○遍身痛加斤官乳没一○臂痛
加羌芸官苓蘇○背心痛合行氣
香蘇散加蒼守苓一○膝浮腫加
木瓜解○濕氣加
人血風加芸荷荊○胸膈脹滿加
實莪○虛汗去麻加芪○潮熱去
氷加苓○二三年不能行合獨活
膝搖佳○腰痛加
加細茶○四肢冷神加附官○婦
寄生湯○拘攣加
蒼伽梶○心腹刺痛加茴○手足
不能起床加續斷○陰積浮腫合
五積散○臂痛因風者或乳婦以
脊枕兒傷於風寒而致臂痛者宜

此湯○白虎痛節走注骨節疼痛
加瓜没方○四肢冷痛加附官
按辛中風先用八味順氣散六
七貼以順正氣次與此湯以可
順表氣○中風口眼喎斜或肩
膊及背麻痛不仁或喘嗽痰
或言語蹇澁皆宜此湯○臂痛
冷起手甚艱五積散見本合九文
湯見傷寒未效則此湯加羌瓜而
安○乳婦以臂枕兒則其臂麻
痺不仁疼痛若因寒者宜此湯
若因寒者宜五積散

三 防風通聖散治中風一切風熱
大便閉結小便赤澁頭面生瘡眼

目赤痛或熱極生風舌强口噤或
鼻生紫赤風刺癮疹而爲肺風或
爲風厲而世呼爲大風或腸風而
爲痔漏或腸鬱而爲諸熱譫妄驚
狂並皆治之

芫荑 芍藥 斤 翹根 苘麻 荊芥 各一兩 虎杖 芒硝 各半兩 滑石 三兩 青桔梗 芩 各二兩 升麻 各半兩

一方去芫加膝參守一

右入姜煎○白利去芒虎○白汗去麻○飲酒中風身熱頭痛如破加蔥白○咳嗽喘急加守桔苑○耳鳴因酒過加柴枳桔童星荊○癡疹通治如身疼加蒼耳○痰嗽加守○一切大風癩狂加嬰虫牡蠣○兩耳聾者厚味動胃火加酒煨虎○膽移熱於腦則辛頻鼻淵加苘連○頭頂偏腫連一目如半壺其脉洪大此風乘陽明經氣血俱多風腫去芒虎加姜蔥豉煎服取汗以草芒刺鼻中出血其腫立消○治風熱瘡疥癬久不愈○瘍頭瘡用本方爲末酒浸焙乾凡三次食後白湯調服日三服至頭有汗效○小兒身常發紅腫去芒虎加力連爲末服按此方雖古法用表裡客熱三焦實火而其實火用黃連解毒

湯（傷寒）腸胃實熱用大承氣湯（傷寒）風熱症專用此湯○或語云春夏專用通聖散秋冬專用五積散（見中）是乃時令表裡之方也○狂亂症解毒湯不効則用此湯（見中）此湯若不効則備急圓可也○

驗（補）小兒諸風潮搐急慢驚風大便閉結邪熱暴甚其寢汗咬牙目睛上竄譫語不安傳筋驚悸肌肉蠕動每一兩加打撲者倍斤虎加紅沒○疥癬楊梅瘡瘡良久者用此湯間有蠕動者調羌活末一錢經曰肌肉瞤動命曰微風○癰疽惡瘡腫毒本方一兩加連翹五錢○痢後鶴膝風良驗

四 小續命湯 治卒暴中風不省人事半身不遂口眼喎斜手足顫掉語言蹇澁肢體麻痺精神昏亂頭目眩暈痰涎壅盛筋脈拘攣不得轉側及脚氣緩弱不能動履屈伸諸風服之皆驗東垣曰中風自汗者不可重發其汗故此藥亦不可輕用也

芎一分（半）麻 離 桂 芩 杏 芍 參各一分 附 甘各半分

右入姜棗煎服○綺神恍惚加神遠○骨節痛有熱倍芍去附○心煩驚悸加犀○骨節痛有寒濕倍加桂附○嘔逆腹脹倍參加守○燥悶大便澁去附倍芍入瀉○臟寒下痢去離芩倍附加朮○自汗去麻杏加朮○脚膝弱加滕斛○身疼加芎○腰痛加巴戟○失音倍杏○中風無汗惡寒加倍麻芸杏○中風有汗惡風倍加枝芍杏○中風身熱無汗不惡寒加雷實去附○中風身熱有汗惡風加葛官桂○中風無汗身涼倍加附加永○中風有汗無熱倍加桂附茸

○中風肢節疼痛不仁加羌翹剛柔二痓之通用也○産後中風腳氣最爲要藥然手足搐搦者當去附按不可用多汗者大抵身冷或四肢厥冷而拘急不仁者宜○一婦二十餘歲産後三十有奇日暮足冷腹痛甚膝屈不伸脈沈遲加附得奇妙

五 大秦艽湯 治中風手足不遂舌強不能言用之養血則筋自榮

北羌 搖芸 芷 伽 膏 芩 細辛 各半 地骨皮 芍各二 芩 各一

右煎服○天陰雨加生姜○春夏加雷一 ○心下痞滿加實一 ○治

血弱陰虛不能養筋筋燥而手足
不能運動指爪乾燥屬風熱甚者
按此方榮血養筋故脉浮大數
而四肢麻木肌肉瞤動則三歲
內當發中風是其爲養生專用
也若脉微細者回春養榮湯可
也○俄手足痿腰不立舌蹇不
能言者不分左右專用之也

六 加減除濕湯 治右半身不遂手
足癱瘓筋骨疼痛
伽一錢 芩 斤 赤芍
連 澤瀉 枳 羌各
芎 桔芸 甘各八
右入姜煎服
○身痛加姜黃○足痛加膝離蔵

按治氣虛與濕痰兼以久手足癱
瘓者也予連年試此方一應癱瘓
不相應矣久字專要也次方亦然
暈痰火熾盛筋骨時痛頭痛心悸
汗一錢 芎 伽
斤一分 定各一分 陳 塩 蚯 芒
羌 蜈 芸 桂 各六分
右水煎入灘姜汁服○手不遂倍
加芩桂○足不遂倍加桐膝
按治因血虛與瘀血而久手足
癱瘓者也若久左右手足皆癱瘓
者血氣兩虛宜十全大補湯加減
虛類

七 加減潤燥湯 治左半身不遂手足

八 匀氣散 治腰腿疼手足不能屈伸半身不遂口眼喎斜風氣中風中氣用風藥而十無一愈即服之見効

附子 烏頭 天麻 羌活 獨活 白朮 茯苓 川芎 當歸 白芍藥 生地黃 熟地黃 防風 白芷 細辛 藁本 蔓荊子 甘菊花 麻黃 桂枝 乾薑 甘草 各等分

右㕮咀每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎至七分去滓熱服

九 補 養榮湯 治中風血脉四支不舉口不能言及痰迷心竅不省人事舌強不能言語痰涎壅盛口眼喎斜半身不遂

當歸 芍藥 地黃 川芎 桂心 白朮 茯苓 黃耆 甘草 各等分

右水二盞生姜三片棗一枚煎至一盞去滓熱服

十 三生飲 治中風氏昏迷痰涎壅并口眼喎斜半身不遂

星一枚 川烏 附子 各一枚 蜜五分

右水煎服〇去烏名星附湯脉沈無熱者宜服

按此方治一切風痰氣厥不省人事初作者急通治之劑

十一 貝母瓜蔞湯 肥人中風口喎痲木左右俱痰世用之

貝母 蔞星 芥 芸 羌 防 芩 連 伽 貴 桂 蔵 守 花 耳 各等分

右入姜水煎服 △按此方治中風口眼喎斜者調理之

十二 愈風湯 治一切風症 卒中初中中腑中臓及蔵府俱中已上數者先宜本病藥治之後用此方調理

参一銭半 伽同 芩 貴 守 各一銭 斤一銭二分 芎 芍八分 洞 芸 羌各七分 芩二銭 耳三銭

右入姜棗水煎歩臥入滓姜汁磨服 △按中風症内部已除外邪亦須調理

十三 加味大補湯 治左右手足皆癱瘓

棋 参 伽 芩 芎 芍 泉 附 倍 杜 瓜 芸 羌 揺 各三銭 蜜 各三分 姜 棗 各五分 桂 耳 各二分

右入姜棗煎服 按左右手足皆癱瘓者此血氣之太虚也宜用此方

補 類中風

論 類中風者則常有之有中寒中暑中湿中火中気食厥労傷房労痰血運中悪卒死等症皆類中風者甚多各有治法不可作風治而用風薬悞之甚矣

十四 附子理中湯 治中寒厥倒

附子 永吳
斤 貴朴
石人姜棗水煎服
氣昏冒口噤胅攣惡寒或口吐涎
沫重則四肢強直則先用此湯若
不急治則舌強寢縮死矣

五十 木香順氣散 治中氣運傀
蜜 砂各五分 麩 莎
守 朴各一 桂 參
姜三片 水煎〇氣不轉者加泉蘇子
按此方由七情過極氣厥昏月
或牙關緊急者組用之或宜藿
香正氣散

六十 加味二陳湯 治痰運傀
貴 守芩 斤 瀉利
杏 良 砂各七分 蜜 桂 芎各三分
右入姜棗煎〇氣逆加蘇〇元氣
虛弱去洞 △按此方因內虛受
寒痰氣阻塞手足厥冷麻痺昏
暈欲劇脈沈細者宜此湯

七十 加味四物湯 治血虛眩暈不
可灸灸驚哭叫動則乘虛而死矣
斤 芍 芩 蛆
參 伽 貴 芩
右棗二枚烏一箇水煎〇飽悶加
莎砂去梔伽
按此方因平日去血過多虛而
成血運脈微濇者宜此湯

加味六君子湯　食厥者過於飲食
胃氣自傷不能運化故氏胃宜此湯
參七分　伽　苓各一本
莎一錢二分　蔥　砂各五分　茸三分
右入姜三片棗二枚水煎○又宜
行氣香蘇散加減童查方見傷寒
凡中卒倒口噤不能言曰不識
人四肢不舉等症多者飲食過
度變爲最常必須審問明白

十九　補中益氣湯　治氣虛煩

論　○傷寒附傷風虛煩
夫傷寒者冬時天氣嚴寒水氷
地凍而成殺厲之氣體虛之人觸
犯之者中而即病名曰正傷寒不
即病者乃寒邪藏於肌膚之間伏
於榮衛之內至春因温煖之氣所
發者名曰温病至夏因暑熱之氣
作者名曰熱病○總曰傷寒所發
之時既異治之不可混也若言四
時但是正傷寒者非也

脈　脈陽浮而陰弱謂之傷風（那都經）
（健弘那之○陽浮衛中風也陰弱榮虛也○雖傷脈故浮）
脈浮緊而無汗謂之傷寒（寒傷榮脈）
（衛虛○陽脈緊那在上鬱土欲吐也）○脈浮頭項痛
腰脊強病在太陽○脈長身熱鼻
乾目疼不得臥病在陽明○脈弦
胸脇痛耳聾往來寒熱病在少陽
○脈沈細陰乾腹滿自利病在太

陰○脈微緩口燥舌乾而渴病在
少陰○脈沈濇煩滿嘔逆腹滿裏縮病在厥
陰○脈陰陽俱盛重感於寒而緊
濇變爲濕痺前痛熱未除風
太過濕熱兩合爲溫毒洪數實大
相合○脈陽濡弱陰弦緊更遇溫
也
氣變爲瘟疫○病發熱脈沈細表
得太陽名曰溫痺○病
疼痛而煩脈沈細名曰
太陽身熱疼痛脈微弱弦乳名曰
中暍○若發汗已身灼然熱名曰
風濕○出身重多眠睡難小便
不利或默然其下若濕火者微發黃
色顏者則驚癎時瘈不識人
賊○脈沈細而疾身涼四肢冷煩躁
不欲飲水在悶名曰陽厥傷寒熱盛
脈浮大者生沈小者死已汗沈小者
生浮大人者死

十二 香蘇散 治四時傷寒感冒頭痛

發熱惡寒及內外兩感之證春月
宜用之撮病
莎 蘇各二分 陳一分 甘半分
右入姜棗水煎服○頭痛加芎芷
名芎芷香蘇散專治氣虛頭痛○
頭如劈痛加膏薑○偏正頭風加
細茶膏○太陽穴痛加靜膏傷風
自汗加枝傷風無汗加麻葛○惡

寒加蒼〇發熱加柴芩〇寒慄加
枝〇虛熱不退加參〇潮熱加參
芩〇咳嗽加柿會〇咳嗽不止加
守吉〇鼻塞聲重咽
〇胸膈痞塞加枳
加腹桑〇嘔吐惡心不止加喬守
〇飲食不化加砂童〇腰痛不能
屈伸加官嬰〇腹肚痛加蜜〇脾
寒加良童菓〇水瀉即脾泄加藿
衍〇瘧疾加枳菓〇瘧痢加枳連
去茸〇久瀉加蜜訶〇身疼加芍
宜〇心氣痛加索麥芭〇感風寒
發熱頭疼合不換金正氣散〇感
寒頭痛壯熱惡寒身痛不能轉動

合五積散又或合敗毒散〇風濕
脚氣加槟瓜各一分疎通氣道名之
檳蘇散〇春夏氣溢腫而痛加五
加瓜槟鈴〇濕氣凋遊脚膝痛加
忍蜜芍〇疝氣偏墜疼痛初發憎
寒壯熱甚効加茴蜜稜莪通〇內
傷飲食外感風寒夾食夾氣胸膈
脹滿肚腹疼痛頭痛身痛發熱加
麥芎麻枳羌名行氣香蘇散因濕
又加蒼外感風寒又入姜蔥內傷
飲食又加查曲〇小兒傷寒夾食
夾驚四時瘟疫瘧疾加童葛名香
葛散〇婦人一切氣作痛或上攻
心胸或攻築脇肋腹中結塊發潟

刺痛月水因之不調或眩暈嘔吐往
來寒熱無問胎前產後並皆治之加
蔥二莖半水一升煎服謂之正氣天香湯
按此方散氣快氣之劑故耳鳴
頭鬱冒或頭痛眩暈或咳嗽痰
熱往來或瘧寒多熱少或內寒
外熱或寒熱相半或骨節痠痛
臍腹作痛或水腫上氣喘嗽面
目浮腫或浴溫泉中風氣逆上
而面赤頭痛等皆治之○過酒
之人其酒毒支胸或嘔或吞酸
加香附○若治酒積加廉姜鹽
或曲砂香附○腳氣不腫而痛者
氣痛也加栝瓜○小兒痘疹未

成加升葛○婦人足冷上氣或妊
婦四五个月而腰下浮腫皆與本
方得奇驗○鼠咬發熱腫痛加
連芩丹○一人頭痛咽乾或胸
腹脇痛不止合升麻葛根湯取驗
爾來治數百人故名之香葛湯

參蘇飲 治四時感冒發熱頭痛咳
嗽停飲中脘痞滿嘔吐痰水寬中快
膈不致傷脾一切發熱及內傷外感
諸般咳嗽痰喘或欲成勞瘵並治

陳　蘇各一匁半　甦　守　圓
西　薑各一匁　枳九分　甘五分　參
蜜二味滅半若無
右入姜棗水煎服○初咳嗽加桑

杏〇久嗽加㕮梅〇口乾加門瑞
〇嘔逆加藿砂〇脾泄加蓮肉伸
〇頭疼加芎細〇若感冒惡寒無
汗咳嗽喘促傷風無汗鼻塞聲重
咳嗽並加麻杏〇肺多有熱加杏
苓桑梅〇肺寒咳嗽加會氷〇心
下痞悶或胸煩熱或停酒不散或
憎雜惡心加連實倍用葛陳〇胸
滿痰多加萊〇氣促喘嗽加雷貝
〇衄血加梅門茅〇心盛發熱加
柴芩〇咳嗽吐血加升牡蛆〇勞
熱咳嗽久不愈加雷貝門〇姙娠
傷寒去守加沙〇陰虛痰嗽或吐
衄合四物湯名保芩補心湯〇痘

疹但覺身熱似傷寒疑似未明宜
用之〇痘疹冬寒甚初見紅斑不
能發起者亦用之
按四時咳嗽風痰胸痛宜用之
不傷脾胃進飲食順氣殊感冒
發散之方也常去參蜜而用何
者參入手大陰肺經爲火見雜
著心盛者去蜜見必用故新病
去二味加芩柴可退內外熱也
雖然久病衛氣虛則加參宜順
氣也心氣弱則加蜜宜達氣也
〇表熱甚加蜜則間有斑出故
他家必去蜜也〇傷寒七八日
熱入裏妄語口乾脈數雖與解

毒凉膈等而無驗故此方加芩連而與則表裏熱退便通而愈

○衄血七日面赤他療無驗予診脉浮數故加芎蜜側汾而五貼全安○瘧疾患於旅途熱多寒少兼咳嗽故加芩差得奇効

○喘促痰盛喉中如水雞加杏會○勞嗽無汗潮熱五心煩熱加籐○小兒有痰嗽而驚風初發可也虛弱加參或感冒發熱頭痛痰嗽喘促痞悶專用之○一男三十餘歲咳痰泄瀉晝夜四五行口乾胸苦肌熱去守枳加薑伽而取驗

二伏苓補心湯 治男婦血虛無汗潮熱咳嗽無顏色或心虛爲邪氣所傷吐血或心氣虛面黃瘁血虛潮熱五心煩熱無汗欬嗽唾血或婦女經水不調婦人心胸嘈雜或婦吐血咳嗽發熱口乾喘急胸膈痞悶嘔吐痰水或婦人亡血過多或氣逆心悶月水不斷或女子血虛有汗潮熱者亦宜用之

按血虛而胸跳或咳嗽怔忡咳嗽吐血或虛勞潮熱或勞熱如瘧或心氣不足面黃體瘦五心煩熱或咳嗽唾血或有汗怔忡或嘈雜或周身血斑此證多在產後或產後失

血眩暈或婦人惡阻或小產可也

藿香正氣散 治四時不正之氣

寒疫時氣山嵐瘴氣雨濕蒸氣或中寒腹痛吐利中暑冒風吐瀉中濕身重泄瀉或不伏水土脾胃不和或飲食停滯嘔逆惡心胸膈痞悶或頭疼憎寒發熱無汗者

藿三 陳 半 桔 各一錢 甘草 守 圖各二錢

右入姜棗水煎服○霍亂轉筋加官○冷痛加官桂○寒痛加吳茱萸○腹痛加芍○寒疝加木香○若頭欲登圓不通加枳○

甚加冰○飲食不化心下痞悶加莎砂○米穀不化加曲芽○肉食不化加查○心下痞加洞童○中暑煩渴悶亂合連翹散名之

香蘇散 名之

感風寒內傷外又飲食生冷傷內惡寒或腹痛吐瀉若外寒重去伽

加蒼朮若內傷重加宿曲○林曰

時氣憎寒發熱加柴葛○發熱加門冬竹葉○口渴小便不利合五苓散○心腹絞痛加木○若頭欲登圓不通加枳○

寒濕相搏霍亂轉筋煩渴悶亂合連翹散名之

感風寒內傷飲食霍亂轉筋吐瀉合五苓散

轉筋不止男以手挽其陰女以手牽其乳此千金妙法○灸特受涼傷外又飲食生冷傷內頭身熱惡寒或腹痛吐瀉若外寒重去伽加蒼朮若內傷重加宿曲○林曰

尸厥飛尸卒厥此即中惡之候因胃犯不正之氣忽然手足冷肌膚

栗起頭面青黑精神不守或錯言妄語牙緊昏不知人頭旋暈倒此是卒厥客忤鬼擊吊死及入廟登塚多有此疾以蘇合香丸灌之俟甦以藿香正氣散加蜜星殊驗

按霍亂主方兼內外有譬也殊治山嵐瘴氣之第一也○霍亂嘔逆去芷加守姜汁最霍亂吐瀉腹痛者必用之○四時感不正頭運鬱冒惡寒發熱專用之○夏月泄瀉或傷食濕瀉俱以兼腹痛者亦宜○七情過極逆氣連倒此名中氣亦宜○渾身拘急憎寒嗽頭目昏重加玄

杏塩梅得奇効○出達方治心腹脹滿此方專調榮衛利三焦行痞滯消脹○腸胃受濕下血不止加連梅有奇妙○瘧疾初發無汗用之則必發汗而愈○傷寒感冒頭痛發熱而無汗亦可也○寢間風入於口鼻中太陰則咽痛多此方主之○飲酒而傷風發熱或吐逆亦宜○

四九 人參敗毒散 治瘟疫四時通用

羌活 柴胡 各等 甘草 半分 桔梗 參 各等 茯苓 半分 枳殼 半分

右入姜水煎服此藥治傷寒瘟疫時行風濕風眩四肢痛憎寒壯熱

項强睛疼不問老人小兒皆可服
或嶺南煙瘴或卑濕之地脚氣痿弱此藥不可缺衆人病一般者加
葛爲妙○傷寒頭疼身痛項强并
熱惡寒口乾心中蘊熱加芩○傷
風鼻塞聲重咳嗽吐痰加守杏○
頭目眩暈屬風熱加守定○眼目
腫痛因風寒所感加芸荊歸尾赤
芍去參苓○酒毒發熱作渴加葛
連○瘡疾不問先寒後熱先熱後
寒頭疼身痛加蒼葛果棋○風熱
濕毒腰痛加續定芎瓜○風熱入
大腸下血不止加桑芎梅姜兼有
衄血加門若因酒毒加連○足三
陽經受熱毒氣流注脚踝上腫赤
腫痛寒熱如瘧自汗惡風或無汗
惡寒加蒼○皮膚瘙痒加蟬○熱
而紅腫加瓜蒼○大便實加虎○
風熱上壅咽喉窒塞或痛或不利
生瘡或如肉癭痛妨咽加芩守翹
倍加枯時行瘟疫下利赤白發熱
口乾身痛加倉米連○痢後手
散○噤口痢加倉米蓮○腎痛冷起手甚難
足痛加瓜蒌○瘧疾加瓜豚姜
遂合五積散名曰加減五積散
棗○諸般瘡毒腫痛或癰疽疔腫
發背乳癰瘭瘡等憎寒壯熱甚者
頭痛拘急似傷寒加荊芸翹忍去

參名荊防敗毒散○身生瘡癤血
瞤腫極痛且痒或風熱積毒發於
面頭手足如瓜脂色加葛赤芍升
麻定蟬苛門虵名平血飲○小兒急
驚風初起發熱手足搐搦上竄天
吊角弓反張並一切感冒及瘡疹欲
出發搐加定全蝎香附錄○痘疹
疑似二百發熱加芫荊定籙去參苓
按病人氣實者去參若氣弱難
運藥力者加參○四時不正瘟
疫熱毒鼻塞聲重頭面腫痛加
參苛姜○頭痛甚者加薄荷○如
心經蘊熱口舌乾燥加芩○傷
寒頭痛發熱惡寒半表重半裡
輕者宜用之 若半表半裏則宜小柴胡○無
名腫物赤而痛所有發熱世俗
謂之風毒腫若熱甚加芩可也
在上宜升麻葛根在下宜敗毒○
藥故毒氣不出而
宜用此湯○一鄉患痢世俗謂
之腹疫病加粳蓮○熱痢與訶
衍則雖痢止而熱不退此湯加
二黃或芩宜解散其藥毒○腸
風下血及近血亦得驗○風眼
目赤多血者用之若甚腫痛加
二黃或芩連亦可○下湯風呂
等風中浮血故疎瘀遊出甚痒加
斤苛或伽芸荊蒼芍虵亦宜傳

謂之加味敗毒散此方宜用癒疹○痛風因風濕著百節痛者脚氣痛處煩熱者俱得奇効○瘡氣有內攻難發出與此湯則愈發出又因加減內消亦可○大頭瘟病項面腫及咽痛加力連○小兒急驚風加白附蚕○小兒啼則口眼喎斜顫少腫與此湯得數奇○瘟疹序病甚發熱與升麻葛根湯其熱不去故此湯加紫蘇有奇効○一人冬月患痢無熱腹痛與芍藥湯不効故慮感風濕爲痢與此湯得奇妙○或曰鼠咬加貝○凡欲與此湯者先試口氣熱或骨節痛而可也

通本方加斤芍勉伽芸假精名祖傳敗毒散治瘧疹○去桔苓參加芸芥升葛赤芍芷力名加減敗毒散治大行瘟疫頭面腫盛咽喉不利舌乾口燥憎寒壯熱時氣流傳〈愚按謂病人氣實者去參者此偏見也人參敗毒散去人參是古人名方之意似相乖矣可考嘉言父醫門法律

五九 升麻葛根湯治傷寒頭痛時疫憎寒壯熱肢體痛發熱惡寒鼻乾不得眠無治寒暄不時人多病疫作暖脫衣及瘡疹已發未發疑似之間宜服

葛三兩 周岑各二兩

右入姜煎服○頭痛加藭○咳嗽加桑○上膈熱加芩芩○無汗加麻○咽痛加桔芔一○發黃丹毒加彩○癮疹者紅黑如蚤螫之狀宜此湯○小兒傷風身熱頭項強自汗表不和加芩一○瘡疹一見苗不可服愼之○冬月加蘇八分○四肢厥冷加牧半一○腰痛當知是痘加枝一兩半○時氣發熱太甚乃毒氣盛加力半按治癮疹最上方也○八九年已前六七月間天下人民多患小瘡甚紅斑摩之則當手不痛不痒頭痛發熱惡寒合雖腹散二三貼而皆愈爾以來逢此證則立得奇効矣○當世人多患小瘡甚痒故合雖腹散而與之則俄然發痰喘心腹强須臾而死矣遇與不遇勿履覆轍

補 表熱加薰○內熱加黃芩○熱甚加梔連或加翹花○大便硬加枳虎○頭痛加芎○身痛加葛○胸膈痞悶加利○咳嗽加杏○有痰加半○發斑加彩知老人去芩加柴芩參

六九 不換金正氣散 治四時傷寒瘟疫時氣山嵐瘴氣寒熱往來霍亂吐瀉下痢赤白若出遠方不伏水

士者宜常服之
蒼朮 杜仲 陳皮 厚朴 甘草 半夏 茯苓 白朮 生薑 大棗 枳實 神麯 麥芽 山楂 黃連 黃芩 黃柏 當歸 川芎 白芍藥 地黃 阿膠 艾葉 香附子 縮砂 木香 檳榔 烏藥 青皮 陳皮 枳殼 桔梗 紫蘇 前胡 羌活 獨活 防風 荊芥 薄荷 細辛 白芷 蔓荊子 藁本 升麻 葛根 柴胡 半夏 天麻 白朮 茯苓 甘草 黃芪 當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 人參 五味子 麥門冬 遠志 酸棗仁 柏子仁 牛膝 杜仲 續斷 萆薢 防己 木瓜 薏苡仁

十神湯

時令不正瘟疫妄行或
感冒發熱憎寒頭痛身痛無汗或
欲出疹此藥不問陰陽兩感並治之

麻　葛根　芎　赤芍
莎　蘇　陳　芷　甘

右入姜前服○發熱頭痛加蔥○
中滿氣實加枳○心腹脹滿加實
守○咳嗽喘急加
發痞守○大便閉加虎芒○嘔吐
加藿守○泄瀉加术苓○瘧疾加
果朴○痢病加枳連○腹痛加芍
○發熱頭痛加細肴○飲食不進
加砂多○嘔逆加喬果○衄血不
止加梅葛○疹毒加宮參苓
按此方芎芷香蘇散合升葛湯
加麻故專要在麻黃一味矣○
感冒風寒者發熱惡寒咳嗽頭
痛甚而無汗者宜此湯○傷寒
否熱久不退自汗不出口乾頭
痛是斑可出之證即與此湯間
斑出而熱退也是乃醫術有功
者所為矣○予蚤歲頃見一病
人其證肌熱久不退且無汗口

乾頭痛故與參白虎湯則一二貼而死天刑難逭者也○東井療婦人項筋強急而腹脹去麻加蒼得奇妙爾以來有數奇

寒熱胸滿脇痛心煩嘔吐頭疼耳聾太便秘澁此在半表半裏也

八九 小柴胡湯 治傷寒四五日往來

柴二兩半 芩 參各一兩 守八分半五分

右入姜棗煎服○小便難潮熱腹滿加芩一兩○下後陰虛生熱脉微惡寒去芩加芍二兩腹痛亦然○嘔而發熱胸脇滿小便不利去芩加芩一兩半○飲水過多成水結胸去棗加瓜一兩半○往來寒熱咳嗽胸脇痛去參棗加會永 各半兩○渴甚去守加參參半兩葛二兩○身熱不渴去參加枝半○心中飽滿加枳桔○心下痞滿加連實○夜靜而晝發○晝熱者熱在氣分加丹連雷錄○晝夜發熱者熱在氣血之分合四物湯加連丹○下痢身熱挾外感者必惡寒發熱煩渴身首俱病此在表去參棗加蒼芎陳赤芍姜得微汗愈○傷寒陽症欲逆潮熱加陳茹姜○伏暑發熱汗渴暑入心胞不語加芩○瘧熱多寒少或單熱頭痛胸滿咽乾宜此湯去守加參括○瘧發寒熱作渴病在表裡陰

陽不分者合五苓散見中暑　名柴苓湯
○無汗加麻○有汗加枝○寒
多加官○熱多加芩○口酸而苦
者肝膽有實熱加游童茸○如膽
熱而口苦者謀慮不決也去芩加
酸籐遠○由醉飽房勞而後大怒
觸動榮血致吐血者加二門○衄
後發熱煩悶加龍骨牡蠣○產後
惡露下忽然斷絶寒熱往來晝靜
暮劇語言狂亂如有鬼神此熱入
血室而顛狂加勉○產後虛羸寒
熱飲食少腹脹加陳芎芍姜棗○
小兒感寒發熱或作痙宜此湯○
痘疹出不快身熱甚者加勉○傷

寒百合病加雷百合茹粳○本方
去參甘加芍虎名二承實一名入姜棗一
前服名之大柴胡湯治傷寒十餘
日不解大便不通身熱煩燥譫言
妄語此乃攻裡劑故以利爲度如
身體疼痛者表證未解不可服之
○倍加芍虎名數和湯治腹痛大
便結小便澁喜飲冷以手按之痛
轉甚手不可近或兩手熱腹脾熱
按太柴胡數和宜實證不宜虛
證小柴胡傷寒和解之劑也○
夏月發熱煩渴小水不利兼傷
寒陰陽不分疑似之間者去芎
加門會連○下痢赤白腹痛身

熱加芩芍〇如兼惡寒亦得〇
熱嗽嗽冷水而斬止者加桑杏
〇煩熱加門〇嗜臥減食加不
〇欬而寒熱往來去參加會永
〇寒熱不調作腹痛去芩加芍
〇俄耳聾而頭鬱冒合香蕪散
百發百中〇灸後發熱煩悶加
連丹得奇妙〇陰囊濕痒加莢
童此乃通肝經故也〇男婦口
苦兩脇脹或痛加連丹〇大肌
發熱大食傷胃已成黃疸其候
食則腹滿嘔暈或心中怫鬱不
安加實朴丹〇婦人傷寒經水
適來適斷發熱惡寒夜則譫語

此爲熱入血室故寒熱如瘧宜
此湯〇小壯之人發熱惡寒入
夜譫語亦宜補本方加丹王名
加味小柴胡湯又本方加貫餘
苄名陶氏小柴胡湯〇又尋常
感冒用此等分名和解散〇加
黑豆一撮名火邪湯而治火邪
諸症〇傷寒日久不解者熱必
傷血攻裏惡寒發熱而裡未實
者加桂〇胸中煩而不嘔去守
加參括〇腹痛加童〇痰盛或
喘加雪烏〇熱盛錯語不眠加
丹連栢〇少陽陽明合病口燥
目疼加餘葛〇自汗惡熱譫語

煩渴去守合白虎湯○自汗惡
風腹痛或寒多熱少脉弱去芩
合桂枝湯○血虛發夜熱合四
物湯○虛去芎加門○舌乾口
燥去守加花或勤○脉弦虛無
力先因房勞遺感寒或病後
血氣未固以致咳嗽吐痰晝輕
夜重發熱不止合四物湯去芎
加門冬柏○脉弦虛無力或浮
散發熱煩躁口渴不飲氷此爲
虛熱去守芩合生脉散加黃○頭痛加羌芸
嘔逆倍姜加貴○中暑發熱
加桂洗○小便不利大便泄瀉

合四苓散○腹中寒熱而利加炒
連芩○大柴胡湯昏亂譫語加
連丹○痞滿加奴利淡○舌胎
黃赤口燥渴飲水加括○夏月
熱病煩躁脉洪大加雷門羔○
發斑加牡丹紗○發黃加茵栢
○鼻衄加犀○大便不通加芒

九　黃連解毒湯治太熱不止乾嘔煩
渴錯語呻吟不眠或傷寒汗吐下
後熱不退諸般積熱實火者大効
連一芩　栢　丹各一
○腹滿嘔吐或欲作利者加守二枚
朴芩各二芍姜三片○二焦實火內外
皆熱煩渴小便赤口生瘡加翹芩

柴各等分○狂亂喜笑不休者此心
火盛先行吐法而後加守瀝竹葉
姜汁○臟毒下血者必在糞後名
遠血加翹楤細茸謂之八寶湯○
婦人赤白帶下屬壯盛而有寒熱
者合四物湯加倍連尤効名之謂
温清湯△按清熱之劑也○三十
餘歲婦人崩漏如湧身熱口渴
合四物湯煎湯與棕灰而安○
又孕婦有先證合四物湯加升
伽而安補一方加柴翹各等分

十三 白虎湯 治傷寒煩悶渴欲飲水而脉洪大
膏四兩 雷一兩 粳一合

右水煎○熱盛煩渴不止及發赤
斑麻虛加參一名化斑湯○一方
加芎○大便不固熱不退加蒼○脉
尺寸俱長汗大出身如氷石加桂
○老幼及虛人昏冒譫語或小便
澁起卧無度或煩而不眠加丹○
上焦煩渴而不欲多食謂之高消
加參二錢或加升栝○瘧疾表裡俱
熱時時惡寒有汗而大渴口乾加參
按此方除熱之劑也○夏因暑
熱而遺尿加參栝○一男熱不
甚大便瀉不省人事脉浮大無
力背出斑是死證加參蒼取驗
而後小柴胡湯合四君子湯而

調理則全愈 補 本方加參門玄
丹姜棗竹葉名陶氏白虎湯治
法同上○虛煩甚加門○裏熱大
渴煩躁表熱惡寒脈浮並加參
寒熱昏迷其人如狂

虎炒一兩 嬰五各 芒二各 桂一各

右入姜煎五更服

二 三一承氣湯 治消渴胃中有熱
虎芒朴 實 芒 右煎服

補 愚按治傷寒雜病內外所傷
一切風熱風痰濕熱燥熱入裡之
深大小便閉或難產死胎不下小
兒斑疹黑陷等証○治消渴胃中
有熱○又能治肝經玉堂中痛

三 調胃承氣湯 治太陽陽明不惡
寒反惡熱邪在中焦作滿大便秘
譫語嘔噦 虎六各 芒二各

右上二味水煎入芒再煎一沸服
有熱○又能治肝經玉堂中痛

四 小承氣湯 治六七日大便不通
潮熱譫語腹脹滿悶而喘○下痢
赤黃內煩喜欲飲冷水小便不利
者先用三服湯滌而後調治之

虎二各 朴 實各一各

右煎服以利為度 補 按活人大全
曰裡症脉浮緩宜下者小承氣

湯主之肝之裡見症者加柴胡心
之裏見症者加赤芩翁脾之裡
見症者加葛丹肺之裡見症者
加芎翅芩腎之裡見症者

五兆 大承氣湯 治胃實譫語五六日
不大便腹滿煩渴舌乾口燥日晡
發熱脉沈實

虎 七分半 朴 實 各一兩 芒半合
右先煎實朴去粗內虎再煎去粗
納芒更煎一二沸服以利爲度○
瘧疾寒熱轉大者從卯至午發宜
柴胡湯從午至酉發者邪在內宜
大承氣湯從酉至子或至寅發者
邪在血宜桃仁承氣湯下之微利
後更以小柴胡湯撤其邪可也

補 愚按活人大全曰裡症脉沈
宜急下者大承氣湯主之肝之
裡見症者加柴芩心之裡見症
者加連門脾之裡見症者加芍
勉肺之裡見症者加芎羔腎之
裡見症者加雷栢

六兆 加味承氣湯 治瘀血內停胸腹
脹痛或大便不通

虎 芒各二分 實 朴
斤 五分
紅各一分 芒半
右酒水各半煎服病急者不用
按承氣之類可用壯盛人不可
用虛弱人若不辨虛實則誤多

○對瘡寒頭下風而與之則得卒効

七條 涼膈散 治表未解半入裏下證未全懊憹不眠三焦實火煩渴口舌生瘡譫妄便溺閉結發斑黑陷或治上焦熟甚陽明少陽之氣中血藥也

芩 各三匁 芒一匁 甘五分 丹 虎 翹四匁

右水煎○或入竹葉生蜜少煎食後服加姜亦可或作末服○東垣加枯治諸般鬱熱退六經實火○肺金邪熱嗽痰加守○咽喉腫痛延嗽加桔梗○咳而嘔加守姜○鼻衄嘔血加斤芍芒○淋閉加滑芩○風眩加芍芒云膏○酒毒加葛

連名清心湯用蜜炙竹葉同煎○斑疹加葛荊赤芍芎芒云柿○陽毒發斑加斤○咳嗽加桑杏桔○結胸心下滿加枳朴○譫語發狂踰墻赴井皆陽熱極盛加連柏赤芍○眼生翳瘡赤澁流淚加荊賊芒○本方合四物湯名雙和散能益血泄熱按除積熱實火之劑○一婦譫言發狂晝夜不眠不能坐臥飲食與則食不與則不食大便秘脈細緊而數四物湯加連四十餘貼而愈

八條 八解散 治傷寒感冒頭疼身熱惡風多汗嘔逆惡心

參 芩 伽 陳 藿 朴

守耳 右入姜棗水煎服
按此方温劑也傷寒及諸病之肌熟以寒劑而不退則與此方而其熟退是乃熱因熱用爲秘中之秘矣○他家去參加桔名萬安湯是以退諸病之肌熟也○參熟食熟等亦可○醫王證輕用之○頭疼發熱體倦或舌强不能言語是乃有傷寒與中風之疑則宜用之○風勞多汗或勞傷過度怠惰自汗或飲食無味或嘔逆惡心俱以取驗○感風寒頭痛壯熱無汗則加羌去參○頰頸及咽腫痛津唾難

溫膽湯 治心虛膽怯觸事易驚夜夢不祥異像致心驚氣鬱生痰誕或短氣悸之自汗飲食無味或傷寒一切病後虛煩不得眠臥

守陳 芩 實各一錢 茹一錢 半五分

右入姜棗煎服 補 加柴利連參芩沙

名竹茹溫膽湯 治傷寒日數過多其熟不退夢寐不寧心驚恍惚煩燥多痰不眠者

一方 治膽虛痰熱驚悸不眠去芩加桔各四分煎服

一方 治膽虛痰火而兼氣虛痰火以補氣也 治痰

火而驚惕不眠

參 伽 神 沂 泄 酸炒
門 守 實 連 茹 丹各等分
辰 另 芔三分 右入姜一片
棗一枚 梅一个 煎調辰末而服

十四 加味温膽湯 治病後虛煩不得睡
卧及心膽虛怯觸事易驚短氣悸之
守三錢半 陳二錢 茹 實各一錢半
苓 芔各一錢一分 遠 玄 參
芔 酸炒 各一錢 右入姜棗煎服
按病後虛煩不眠者選先方得
數奇〇一人與主君爲口論閉
戸一年餘心熱煩滿痰火心攻
腹脹嘔逆夜不能寢他醫皆言

陰虛火動而治不應予謂氣鬱
生痰而然加味温膽湯加連而
安〇姙婦心驚煩悶不眠温膽
湯加參門柴而安

一甲 九味羌活湯 不問傷寒傷風
寒熱頭項脊腰四肢强痛并四時
感冒疫癘晩發等症雜病亦可通
治此方不犯三陽經禁解利神方
羌 芸 精各二錢半 芍 芷
蚱各二錢 細 芔各五分 右入姜棗水煎
〇此方發春夏秋三時表症代桂枝麻黄青龍各半益三時暄熱傷寒
則不敢用冬月麻黄而發表故代
以羌精傷風則不敢用冬月救而

實表故代以芫伽芍芷辛發表以
代杏蛇救血以代芍加芩以順天
時也○太陽症加羌本○陽明症
加周葛芷○少陽症加柴芩守○
太陰症加精朴洞○少陰症加利
雷柏○厥陰症加芍柴○夏月加
羔雷○有汗去細○服此湯後不
作汗加水○惡風自汗加枝○夏
月去枝加芍○汗後不解加虎○
嘔逆加姜汁○有痰去蛇加守○
肌熱加葛柴○喘而惡寒身熱加
杏蛇○虛煩加雷門茹○胸中鬱
悶加枳利○中風行經加附○便
閉加虎○中風兼五痺等症各隨

十二經內外上下寒熱温涼四時
六氣加減補瀉用之○渴加雷羔
赤水玄珠云此方予每用加柴
胡乃總治傷風各經之活套也
今人只知其治四時傷寒如神
不知加柴胡總治各經之妙上云

甲 六一順氣散 治傷寒傳裡大便
結實口燥咽乾怕熱欲飲冷水
妄揚手擲足斑黃陽厥潮熱自汗
胸膈痞硬遠臍疼痛症

柴芩芍洞朴虎芒芔
右水煎臨服入鐵秀水三匙
按代太承氣小承氣調胃承氣
太柴胡二乙承氣大陷胸等湯

之神藥也舉世無人知此奇妙

三 甲 清火化痰湯 治熱痰在胸膈不化咯吐不出寒熱氣急滿悶作痛者名痰結

連 芩 丹 貝 蔞 利 枳 貴
守 苓 軾 芒 雪 耳 蜜 杏

右入姜煎入瀝姜汁

按半力壯盛先用吐痰法後服此湯此方治痰嗽之劑

四 甲 芎蘇散 治四時傷寒頭痛發熱惡寒其外治孕婦傷寒傷風

芎 二錢 水 葛 各二分
枳 貴 各一分 柴 芩 各二分 耳 少

右入姜棗水煎△按類証活套曰葛湯治四時傷寒時行疫癘表証

五 甲 麻黃湯 治太陽症頭疼發熱惡寒肢體強身痛無汗脈浮緊而喘又治太陽八九日不解以此發汗必鄭重乃解及不得汗發衄又治太陽明合病喘而胸滿腹不滿邪在表分不可下者又治陽明脈浮無汗而喘凡脈但浮無餘症者皆宜服之

麻 二錢 枝 一錢三分 甘 六分 杏 十个

右姜煎 本方加升芎芷芸名陶氏麻黃湯 治法同上○若本經寒熱頭痛無汗而喘去升加葛○本經寒熱身痛去杏加精芎○本經寒熱身痒面赤不

得小汗者去杏芷升加柴芩〇本經寒熱頭痛胸中飽悶加枳利〇蓋麻黃陽性熱惟冬之及春初兼病人素有寒者乃用正方夏至後服如夏月得太陽必發斑黃狂悶〇如不證惡寒發熱頭痛脉浮洪盛無汗以子和六神通解散代之

按此方治太陽膀胱經無汗辛溫發表之劑

甲六 六神通解散 糯三錢 滑石水煎〇春加芸〇太陽發熱無汗惡寒瀝變爲剛痙者加赤芍六分 乾葛一錢 豆豉二錢入 蔥白同煎 芩各一錢半 麻七分半 甘五分

〇傷寒中濕身體痛身自俱黃去桂加翹二錢雪赤豆各二錢入生姜大棗同煎〇傷寒即病少陰經脉沈微身體痛得汗則已本方中去桂杏甘加細一錢二分附子一錢〇傷寒大下後脉沈遲尺脉不至咽喉不利唾膿血厥逆泄利不止者難曰難治去杏加升斤各二錢雷芩萎蕤各半錢羔佩芍顛芩冬永各七分次第取微汗而愈〇即病少陰經無表裡症去枝杏倍甘加附一錢二三服後得微汗而愈〇風濕相搏脉浮一身盡痛去枝加薏一錢得微汗而愈

甲七 桂枝湯 治太陽傷風衛實榮虛

自汗頭痛鼻塞項強乾嘔一面惡寒洒洒惡風翕翕發熱或熱多寒少面色光而不慘煩躁身痛手足不冷脉浮緩寸大尺弱者宜如無汗溏數手足冷不惡寒者忌用夏月誤服麻桂必發黃發斑狂悶而死

桂枝 芍各三錢 甘一錢 右水煎

○加防芎羌本姜棗名陶氏桂枝湯

○如汗多加伽○汗不止加芩

○喘加柴杏○胸中飽悶加枳

按此方治太陽膀胱經有汗辛溫實表之劑

傷寒 桂枝湯 啄春 桂枝 芍 羌 芎 伽 甘各等分

右水煎○加芩名芩甘桂枝黃芩湯

甲八 柴葛解肌湯 治足陽明胃經受症目痛鼻乾不得眠眼瞤痛脉來微洪宜解肌驚陽明經病其正陽明腑病則別有治法

柴 芩 葛 芍 羌 芷 利 羔 甘 右入姜三片棗一枚水煎○本經無汗惡寒去芩加麻按此方治陽明胃經解肌之劑

甲九 益氣養神湯 治傷寒新瘥方定勞動應事或多言榮神而微復發熱者曰勞復宜服之

參 斤 洗 門 雷 丹各一錢 神 西各七分 貴五分 升 甘各二分

右入棗一枚水煎服

十五 梔豉湯 治汗吐下後心腹滿悶或痛或微汗虛煩不得眠反復顛倒心中懊憹及嘔熱鬱於內而氣不宣通○紅梔子○淡豆豉○右水煎○少氣虛滿加茸○嘔噦加生姜貴○有宿食而煩燥者加虎○下後脹滿而煩加洞泄○下後身熱而煩加茸三分復加洞泄○差後勞復加洞泄按此方治懊憹之劑

十六 三白湯 治虛煩或泄或渴實謂理內傷外感之奇方也

餘 伽 斤各一 貴 斤各七分 柴一表 升三分 泊七分 羌一表半 芎一表 茸五分 右水煎服

十七 加味益氣湯 治體虛弱無表之發熱者

棬 參各一錢 伽 斤各一錢 柴一錢半 芎一錢 茸五分 右入姜水煎服○冬月加細○熱而脈滯有力加洛

十八 桂枝大黃湯 治足太陰脾經受症腹滿而痛咽乾而渴手足溫脈來況而有力皆因邪熱從陽經傳入陰經也 枝 芍 洞 大 右入姜棗水煎臨服洗○咯者加腹按此方治太陰脾經腹痛之劑

而染感冒傷寒頭痛發熱者

合類增補衆方規矩卷之一 終

○中寒

論 寒邪傷腎急痛拘攣戰掉強直昏迷厥冷口噤失音此中寒也

脉 脉緊濇陰陽俱盛法當無汗有汗傷命寒在下焦自利陰陽俱竭

一理中湯 治五臟中寒四肢强直兼治胃脘停痰冷氣刺痛及臟毒下寒泄利腹脹太便或黃或白或黑或有清穀

人參 伽炒 甘炙 右入姜棗煎服○若爲寒氣濕氣所干者加附名附子理中湯若中

附毒者甘草乾姜等分或黑豆煎湯解之不可不知也○霍亂吐瀉加童陳名治中湯嘔吐者治中湯加喬守姜○泄瀉加陳苓名補中湯加附○湯泄不止者補中湯加附○不喜飲食米穀不化加砂附陳苓○霍亂吐下心腹痛手足厥冷去附加附名四順湯一名四逆湯○心腦急痛手不可近加實芩○渴欲飲水加瑞○霍亂轉筋加膏○臍上築者腎氣動也去伽加桂○悸多加苓若寒加永○腹痛去伽加附○飲酒過多及炙煿熟食發爲虧加芍○腹滿下利脈沈遲而微加附○痼冷症加附桂苓○胃寒嘔吐清水冷涎脈沈遲加苓附官桂○若寒極手足冷脈微吐不出加附去官○噯氣有胃寒者去參加蜜益陳朴莎○蚘厥者胃寒所生加椒梹○口舌生瘡飲食少思大便不實此中氣虛也手足冷腹痛加附○體虛感雨濕而嘔吐加童陳守姜○去耳加陳守入姜煎服治胃氣虛寒作惡心亦治船暈按此湯治寒之劑也○乾霍亂心腹絞痛不吐瀉足冷脈沈欲絕者先用鹽湯探吐而後加姜朴蒼砂沙蜜枳陳桂腹痛額頭黎

利不渴寒ヲ多而嘔或腹痛下利
霍亂吐瀉手ヲ足厥冷者用附雖
諸證皆退而吐不止則百無一ヲ
生【補】本ヲ方加桂貴苓名陶氏理
中湯治方同上○吐多去伽加
姜○下多還用伽○腹痛裡虛倍
參ノ○寒者倍ニ永○胃虛則氣壅
腹滿去伽加附○嘔吐不レ止減
半加姜汁○吐蚘去茸加烏○
飲逆加喬柿○噦逆加蜜○寒ノ
濕發黃加茵○肺弱泄不レ止溺
不利倍參伽合五苓散○
腎氣動急去伽加桂

黑手足收引脉無氣以息者此
中寒暴死也加附○臟腑停寒
腹痛身怯泄瀉青黑不レ止加陳
婆苓桂梅○若寒極手足冷脉
沈細去桂加附○腹痛滿去參
加砂朴木嘔噦惡心去桂加喬
守○瀉不レ止加蒼蘚○虛汗去
薤桂加芪○飽悶去桂加朴砂
○飲食不節過食生冷腸鳴泄
下加童陳砂○急陰證手足冷
指甲青少腹痛囊縮加附陳守
喬苓多曲沈入姜棗鹽少煎服
如急陰不省人事用鹽塡臍中
火艾灸之以醒爲度○傷寒自

三五積散 治感冒寒邪頭痛身疼項背拘急惡寒嘔吐或腹痛又傷風寒發熱頭疼惡風無問內傷生冷外感風寒及寒濕客于經絡腰脚酸疼及婦人經血不調或難產並治之

蒼朮二錢 厚朴 陳各八分 甘草一錢 枳殼 芎藭 芍藥 芷各六分 川芎 當歸 桔梗 白芷 茯苓各四分 半夏三分 右入姜三片棗一枚水煎服○冒寒用熱湯○挾氣加蔥白○足浮腫加五加腹○遍身疼加烏藥順氣散○巳成風痙加羌活○四肢濕痺合烏藥順氣散○腰痛加杜仲牛膝○手足攣拳加枳殼○婦人調經催產加艾醋○難產加麝香○腹痛綿綿無增減因寒者宜治○腰痛感寒濕脾胃氣閉加嬰○寒濕傷腎經腰痛不可俛仰加永嬰○感風寒濕脊膊痛或遍身麻木者用之遍身壯熱四肢骨節痛因虛寒者加羌搖穿○秋冬脚膝腫滿疼痛因寒濕流注經絡加瓜蔞根○酵飽後色慾不節觸傷小腹成疝氣其疝自小腹痛連腰胯下心頭昏痛額上汗出加索○又虛弱人中寒疝氣作痛亦宜○婦人遇經行時身痛手足麻痺或寒熱頭疼目眩夫人永加羌搖膝姜蔥○咳嗽加杏

玄〇瀉泄去积加衍伽〇赤白帶下屬虛寒加沙苘吳〇新產後以此湯除敗血生新血無寒熱之患去蕈〇熟加芩〇小兒痘疹天時嚴寒不能起發或紅斑初見者除桂枳外十三味慢火炒令黃入二味加生姜水煎熟服則爲貫膿按夏至去蕈此方除寒濕故有痛者必用〇頭疼臂痛腹痛腰痛脚氣痛風等皆有發熱而足冷則與此湯可也〇寒滯脾腎肝三陰而四肢百節痛有奇効〇因滯氣而腹筋張加童〇寒火熱肯憎寒並宜〇婦人兩腿痛甚有汗足稍冷加附三貼安立得效〇冬月腰不立上氣面赤下冷又腰已下冷如氷面上人身冷經水不來者可〇赤白帶下屬虛寒有痛加吳侯〇難產腰腹甚痛時寒天加附得妙又腰腹痛破水下未產經宿亦得〇產後餘血攻心或有冷塊攻心上氣則取驗若無驗則正氣天香湯傷寒有大奇〇死胎腹痛大熱脈數加氷附二貼而立下〇體虛作瘧寒多無汗加蕪

果 補 腹痛或挾氣加吳○體薄有汗去精甲○氣虛去枳利加參伽○産後餘血入遍身肢節腰脚疼痛去甲加參瓜蒌茴

三 補 四逆湯 治卽病太陰自利不渴及三陰症脉微欲絕手足厥冷

永五錢 附生二枚半 甘一兩 右水煎

○或加參○加參伽苓貴守桂玄名 陶氏四逆湯 ○利止脉不出加參○腹痛加芍○嘔吐不止加姜汁○泄不止加升芪○咽痛加利

四 回陽救危湯 治傷寒初起無頭痛無身熱便就怕寒四肢厥冷或過於肘膝或腹痛吐瀉或口吐白沫或流冷涎或戰慄面如刀刺引衣倦卧不渴脉來沈遲無力卽是寒中陰經真寒症不從陽經傳來上

參 伽 苓 貴 守 附 玄 永 桂 甘炙 右水煎

○嘔吐涎沫或小腹痛加吳鹽妙○泄瀉不止加芪升○嘔吐不止加姜汁○若舍卒無藥不便可用蔥鬚法或艾炙臍元氣海二三十壯按此方治虛寒温補之劑

補 火証

論 夫發熱者謂怫怫然發於皮膚之間則成熱也與潮熱寒熱若同

而異潮熱者有時而熱不失其時寒熱者寒已而熱相繼而發至於發熱則無時而發也○丹溪曰太陰陽動而生陰陽靜而合而生水火木金土各一其性惟火有二曰君火人火也曰君火天火也火內陰而外陽主乎動者也故凡動皆屬火以名而言形質相生配於五行故謂之君以位而言生於虛無守位稟命因動而見故謂之相火主生物故恒於動人有此生亦恒於動其所以恒於動者皆相火之爲也脈浮而洪數爲虛火○脈沈而實大爲實火○洪數見於左寸爲心火見於右寸爲肺火見於左關爲肝火右關爲脾火兩尺爲腎經命門之火上腫燥裂或舌尖出血舌硬

連　丹皮　梔子　各一錢　黃芩　各一錢半

(六)柴胡湯　治肝火盛木氣實或脇痛或氣從左邊起者或月紅腫痛

柴胡　芍藥　黃芩　各一錢　甘草　五分　右水煎

(七)黃芩湯　治肺火咳嗽吐血痰血鼻血咽喉腫痛乾燥生瘡或鼻孔

丹皮　梔子　各一錢　甘草　五分　右水煎

俱肝火也

乾燥生瘡或鼻腫痛

八 芍藥湯 治脾火或消穀易飢或胃熱口燥煩渴或脣生瘡

芍藥 丹 連 羌 趙 尚各一錢 芎三分 右水煎

○中暑 附 霍乱

論 丹溪曰夏月陽氣盡出於地人之腹屬地氣陽氣於此時浮於肌表腹中之陰虛矣夏月伏陰在內此陰字有虛之義若作陰冷看誤矣經曰靜而得之爲中暑動而得之爲中熱○霍乱者揮霍變乱也蓋因內有所積外有所傷陽不升陰不降乖隔而成故心腹卒痛嘔吐下利發熱憎寒頭痛眩暈或泄而不吐或吐而不瀉先心痛則先吐先腹痛則先瀉心腹齊痛則吐瀉並作 脈經曰脈虛身熱得之傷暑○脈弦細乳遲

何也 內經曰寒傷氣氣而不傷形則氣消而脈虛所謂弦細乳遲皆虛脈也 仲景以弦爲暑脈虛細弱暑脈虛弱或浮大而散或隱不見 微細也 伏 ○脈虛而微弱或浮大而散或隱伏 ○霍乱脈微而澁○或代而散○或隱而伏○或大而虛○脈右關滑爲霍乱吐瀉○脈結促代皆不可斷以死○脈大者生○脈微弱漸遲者死○脈洪者爲熱○脈弦者爲飲○氣

口脈弦滑編間有宿食留飲宜順
其性以塩湯探吐之
九五苓散治汗後中暍煩燥小便
不利而渴
澤瀉半斤 猪苓 赤苓各一兩 桂半兩
右爲末清米飲調服或入姜棗煎服
○熱甚去桂加芩一○中暑煩渴身
熱頭痛霍乱泄瀉小便赤少心神
恍惚宜此湯或爲末熱湯調下愈
妙加滑一兩甚可○噦咳煩心不得
眠加膠○恍惚加辰○伏暑身熱
大渴未解合人參白虎湯○濕熱
所傷身熱煩渴小便赤少宜此湯
○身腫無汗倍加羌○黄疸發熱
倍加茵○水腫從腰以下俱腫加
蜜茵○虚寒小便不通加斤枳朕
通草燈○小便虚弱不禁者合四
物湯加會山茱○男婦赤濁合妙
香散名香苓散用天麥二門煎湯
而下○湯瀉者瀉水多而腹不痛
腹響雷鳴脈細加預陳蒼行訶砂
草姜梅燈○傷寒三四日仆來寒
熱自利者本方合小柴胡湯方見入
姜棗名柴苓湯一切發熱憎寒者邪
在半表半裡宜此湯○瘧發寒熱
病在表裡陰陽不分亦然○無汗
加麻有汗加枝寒多多加官熱多加
芩○去桂名四苓散○小便不禁

有熱加連柏會山茱〇飲酒伏暑
鬱發爲疸煩渴小便不利加茵
補 本方加萩芽滑丹燈去莖名
陶氏五苓散〇中濕身目黃加
茵〇水結胸加燈笛〇陽症去
桂〇陰症加附子〇温熱病加
芽〇瘧熱發黃加葛
加芎蔥〇咳嗽加五味〇熱吐
加守〇熱瀉合小柴胡湯傷寒
加連〇狂言乱語加辰〇小便
閉加瞿麥滑〇大便難加芩〇
勞復加利〇水氣加葶〇發虛
熱加參茯門〇腹痛加蜜〇氣
堀加茂削〇鼻衄加茅〇尿血
加升〇身痛加精〇煩燥去莖
加參〇心煩不眠加阿膠〇初
病加虎〇心氣不足加參閑〇
嘔急加滑雪〇五心熱如勞加
利柴〇有痰有熱加雪參西〇
霍乱轉筋加藿瓜〇痰氣加茵
練洗桂姜蔥〇女子紅汗加嬰
王〇嘔吐去桂加守姜

十 加味四苓散 火瀉者腹痛一陳瀉
一陳後去如湯後重如滯瀉下赤色
小水短赤煩渴脉數是也用此湯
苓 伽 猪 澤
丹 陳各一分 梅一个 蒼一分
右入燈卅煎服〇飽悶加朴砂去

預〇腹痛去佩加朴砂蜜煎〇嘔
噦惡心加藿梅蓮砂參〇小水短
赤去澤加通車〇口燥煩渴去澤
蒼加連門薑梅葛〇渴多元氣虛
脫昏倦去澤蒼加參芪〇夏月暑
渴加蕭扁〇渴多煩燥去蒼澤加
連參辰梅〇渴多不止去澤丹加
衍參〇發熱脈數加柴芩
按治濕之劑殊視小水不通或
澁而可與此湯也四苓散治小渴
熱渴發熱五苓散治濕渴退下
濕柴苓湯治瘧疾寒熱皆其功
有數多故不舉治例而可知者也
暑身體倦怠

十味香薷飲 治伏暑身體倦怠

神昏頭重吐利 薷一名參 陳
佩苓芪 瓜朴扁芷 各半
右煎服〇暑風去芪加羌一名半〇
脈虛頭痛參玄門 此二味名生脈散
〇心煩加連丹〇胸脹加枳桔〇
夾痰加星守〇嘔吐加藿姜汁少
〇渴加葛瑞〇有搐搦加羌

夏月體倦

按伏暑退散之劑〇夏月體倦
頭目昏重腹痛瀉下甚得數行
〇夏月煩熱頭身痛小水赤去
參芪加連羌而安〇夏月身體
四肢倦怠晝夜汗出如浴陽乾
心煩加連瑞而安

清暑益氣湯 治長夏濕熱蒸人

四肢困倦精神短少頻干動作胸滿
氣促肢節疼痛或氣高而喘身熱而
煩心下痞悶小便赤而數大便溏而
頻或痢或渴不思飲食自汗體重
茂蒼　周各二分　參　伽曲
陳　澤　葛各五分　斤　門　洎
童　甘各三分　玄九粒　右煎服〇
汗多倍芪〇飽悶加砂多〇惡心
加梅蓮粳〇嘔加茹〇煩燥加辰
酸茹〇小水短赤加通丹〇胃脘不
開不思飲食加朴多益砂蓮〇腰
痛加仲苡紙〇腿酸無力加膝仲
〇皮焦加籐〇頭目眩暈加芎〇
虛汗加酸〇夢遺加預〇口

苦乾加幹并梅葛〇嗽清冥者益死
之劑〇一女子十七八歲夏末贏
瘦骨立四肢倦怠食少肌熱聲
嘆嗜卧形如虛怯脉細緊而數
他藥不効加籐連三十餘貼而
瘉全人〇一男年歲患頭痛甚
而晝夜不寢少中頭於枕則氣
上於氣衝而欲絶故常不側臥
倚枕息奉兩手抱頭他治不効
予六月初試脉細數無力加芎
細本酸五六十貼而全愈〇又一
男大陽頭破四形如錠甚腫痛
下血時六月中旬加泠桑杏槐
得奇妙其後再三發每發皆得

十三 補 生脉散 滋生精氣培養眞元

補心潤肺 參 門冬三錢 玄十五粒

○泄瀉加伽水煎○本方加茯斤蚘

名 清肺生脉散 ○生津止渴加茯

柏○身重疼痛者可用此湯

加見傷寒加茶連

十四 參歸益元湯 治注夏病

參五分 玄十粒 柏 雷 貴各七 甘

芍 斤 門各一 石棗一枚

烏一箇炒采 一撮水煎○飽悶加砂

多○惡心加烏葯炒米一○嘔加茹

○煩燥加辰酸茹○渴加伽炒預

砂烏去芍雷柏○小水短赤加茯

丹○胃脘不開不思飲食加朴多

益砂葯去芍柏雷○腰痛加仲紙

尙○腿酸無力加膝仲○皮焦加

鍼○頭目眩暈加芎○虛汗加茯伽

酸○夢遺加蠣辰椿○虛驚煩熱

加辰酸茹○口苦舌乾加丹烏葛

按此方五心煩熱口苦舌乾精

神困倦無力好睡飲食減少胸

膈不利形如虛怯脉數無力是

名注夏宜此湯

十五 六和湯 治暑傷心脾霍亂轉筋

嘔瀉寒熱痰嗽痞噎頭目昏痛胕

體浮腫便澁冒暑背寒伏熱厥冷

瘧痢中酒煩渴畏食又暑毒客上

焦胸膈痞塞上氣喘急渴藥入口
卽吐麝少許
守　砂　杏
赤苓　藿各四分　菜　朴各八分右入
姜棗水煎〇如日間胃暑夜感風露
加芎羌〇婦人胎前產後亦用宜
按此方清暑養元氣除濕熱之劑
痛不吐不瀉脉沈欲絕
十　理中湯　治乾霍亂心腹胞脹絞
藿　精　朴
枳　貴各一錢　甘　永　桂各五分
右入姜水煎〇夏月乾霍亂不吐瀉
胸腹絞痛煩渴自汗不可用姜桂〇
心腹絞痛面青手足冷脉伏欲

絕加附茴去精〇心腹胞悶硬痛結
實者加洗洞查薯蕷去甘枳精〇
胃寒嘔噦發呃加喬茴莎良去桂
甘精〇虛汗加附去薤精外用炒
姜渣△按此方治霍亂屬虛寒者
宜之乾霍亂之主方也
十　九君子湯　治霍亂已愈煩熱多
渴有痰小便不利
貴　守　門
小麥　甘各五分　苓　伽各一錢　參
烏一箇　右入姜水煎
△按此方治霍亂痰喘煩渴
十　白朮散　治霍亂及一切吐瀉煩
渴氣弱胎孕之霍亂
伽　苓　參　薤各一錢

葛二錢 茸 右水煎〇又姙娠
之霍乱用五苓散香茹散亦可也
△按此方治傷寒雜病一切吐瀉
煩渴霍乱虚損氣弱保養衰老
及治酒積嘔噦

十九 藿香正氣散 四時通用 方見傷寒
十二 人參白虎湯 治夏月中暍卽中
熱舌燥生胎刺
參五分 茸三分 伽 貴各七分 羔 雷 戈各一本
扁 八箇 苓 芍 茅朮 丹 門各一錢
右薑肉十箇烏梅一箇水煎
抄此方治身熱頭痛洒然毛聳微
寒口開前齒燥舌燥生胎大煩渴

〇中濕

論 丹溪活套云濕本爲土氣火熱
則能生濕土故夏熱則萬物濕潤
秋涼則萬物乾燥夫熱佛鬱則生
濕也〇凡濕証有內中濕有外中
濕〇居卑濕之地或衝斗風雨或
辛苦汗沾衣皆外感之濕也多憂
煩腫痛疼痛也〇恣飲酒漿多食
瓜菓之類皆內傷之濕也多中滿
痞脹瀉利也 脉 脉浮而緩濕在表
也〇脉沈而緩濕在裏或弦而緩
或緩而浮皆風濕相搏也

九 獨活寄生湯 治腎氣虛弱冷因
濕地腰背拘急筋攣骨痛當風取
涼過度風邪流入脚膝爲偏枯冷

痺緩弱疼痛牽引脚重行步難艱
白虎歷節風痛○中濕而偏枯冷
痺者腎氣虛也

搖寄姑無代續 膝伸 芎細
桂芍 芩參 斤半
芸各等分 半減半 右入姜煎空心服
夫腰背者皆由腎氣虛弱卧冷濕
地當風得之不速治喜流膝髓爲
偏枯冷痺緩弱疼痛或腰痛攣脚
重痺宜急服此○治肝腎虛風濕
內攻兩脛緩縱攣痛痺弱不仁足
膝攣重又治白虎歷節風神効
是腰痛之主方也按因虛而爲
中濕脚氣痛風腰痛此之四症

並治兼以灸瘡痺中風亦取驗

二北 補 滲濕湯 治中濕腹脹滿邪入裡若兼治二切濕症

精 伽 苓各一錢半 貴 芋 猪各一錢
莎 芎 朴各七 半二分 姜一片
燈草一團 右水煎○脾虛發腫
浦氣急喘嗽去伽芎加腹皮枳蜜
蘇子桑蘿○面目浮腫去芎澤朴
涉加薏苡倍蒼燥熟勝濕則豁然
而收○瀉不止加衍灘梅永○嘔
噦去朴莎芎加薏梅炒米甚不止
加煨永○濕症身體重痛手足麻
木酸軟腫痛或枯細痿弱筋脉拘
攣去莎芎朴猪澤加斤勉芍蜜

乳桂膝芩羌芷云

按此方治寒濕所傷身體重著如坐氷中小便赤澁太便溏泄

三九 除濕羌活湯 治風濕相搏一身盡痛

蒼 本 各一錢 羌七分 升云

升 柴 各五分 右水煎服

四九 除濕湯 治寒濕所傷身重腰脚酸痛太便瀉小便或澁或利

蒼 守 各二錢 婆 陳 苓

伽 各一錢 芎 右入姜棗水煎服

五九 加味五苓散 治濕勝身痛小便不

按傷濕發熱惡寒身重自汗骨節疼痛腰脚痺冷皆因坐臥卑濕衣所致宜此湯

濕冒雨露或著濕

利體重發渴者

卽五苓散加羌一倍

○內傷 附補益

論 黃帝曰陰虛生內熱奈何岐伯曰有所勞倦穀氣衰少形氣不盛下脘不通上焦不行胃氣熱熱氣熏胸中故內熱○又曰病生于陰者得之飲食居處陰陽喜怒○內傷病必氣高而喘身熱而煩短氣上逆鼻息不調怠惰嗜卧四肢困倦不收無氣言動掣摸肌膚必大熱疎熱悶乱心煩不寧或表虛惡風是也○勞倦傷誠不足飲食傷當於不足中分有餘不足

脈 東垣曰右寸氣口脈大於人迎一倍過在少陰則二倍太陰三倍右手二部屬三陰少陰在關主腎太陰在寸主肺肌膚大熱故脾脈二十藏之脈皆繫盛也○右寸氣口脈急大而數緊盛者脈之本脈代而澁者元氣不相接續也此飲食失節勞役過甚太虛之脈也○右關脾脈大數微而數五脈皆虛也此不甚勞役之脈也○右關胃脈損弱甚也而隱而不見但內顯脾脈大數微緩時一代脈沈而滑多此宿食消之脈也○補益平脈弦大勞損而虛大而無力陽衰易扶數而無力陰火難除寸弱上損浮大裏枯尺寸俱微五勞之軀血羸左濡氣血無餘勞瘵右推左右微小氣血俱虛

脈數或濇細如潮汗咳血肉脫者殆

六君子湯補中益氣湯治中氣不足飲食勞倦四肢倦怠心煩肌瘦日漸羸弱此藥能升元氣退虛熱補脾胃生氣血

茯苓參　伽　斤各七　陳五分　柴胡各三分　甘　右姜棗煎服

○頭痛加蔓○痛甚加守姜○額腦痛加本細○諸頭痛並用此四味足矣○痰厥頭痛加半夏○疼痛加芎藭○善啖者腹理不密外邪所搏加芷芎○耳鳴目黃頰頷腫頸肩臑肘臂痛面赤脈洪大

加羌芸本芎通其經血加芍連消
其腫加參茂益元氣○嗌痛頷腫
脉洪大面赤加芩芎桔○口苦嗌
乾加葛○夏咳嗽加會門○冬咳
嗽加麻根鶺鴒秋涼亦加○春月天
温加芎數○嗽加桑玄○久病瘀
積漏砂多○春初猶寒加益漏○
心下痞滿加芍連痞腹脹加實砂
朴○寒少加永或桂○心下痞覺
中寒加附連○不食而痞加姜陳
○能食而痞加連實○脉緩有痰
而痞加守連○脉弦四肢滿便難
而痞加連柴芎○腹痛加芍芎○
如惡寒覺冷痛加桂夏腹痛不惡
寒不惡熱加芩芎芍○寒涼時腹
痛加守益漏○脇下痛或脇下滿
急加柴芎○臍下痛加芎如不已
者大寒也加桂○虛勞發熱去周
加守芩芩篠會○陰虛火動加栢
雷○飲酒人元氣虛弱無力飲食減
少面紅加守芍葛曲芽枳○小便
閉加門○大便閉加嬰紅麻仁○
元氣虛弱腰痛加栢雷膝芍○勞
遺加蛎黿○下部無力加膝牡○
脚弱加瓜離○泄瀉加芍澤芩○

汗多去升柴加酸棗仁夜間不睡亦如之○精神短少加參會○用心大過神思不寧或怔忡驚悸加神遠酸菖柏子○太病後元氣未復而胸滿氣短加陳實芍○男婦骨蒸勞熱加芍會○內傷氣虛自汗久不止加附麻根浮麥○十指盡麻並面目遍身皆麻此氣虛也加木涉門羌芸麥○咽喉腫痛口舌生瘡勞而愈盛是屬內傷不足加姜泊雷桔○中氣不足脉虛微氣不相續而發吃加參門會桔以降陰或少加附○氣虛有汗潮熱者或內傷發熱者並宜○婦人因勞耳鳴頭疼身倦此氣不足加門玄○孕八七月胎下墜或動面黃躰倦飲食少此脾氣虛弱倍伽再加蘇梗三十餘劑而安○婦人每交接出血作痛此肝火動脾用此湯而愈○金瘡腫痛出血不止寒熱口乾此氣虛血無所附加玄門○小兒諸痙癖堰久治不愈多服尤効○痘瘡結痂而誤犯風寒惡寒發熱尤宜○酒慾過傷而成淋者用此方補元氣則水道運行故淋不作矣按治內傷不足清氣下陷之方也蚤歲頃與一應之不食頭痛發熱四肢倦怠而時時悶人且

重其證生眩暈爲胸塞而已爾
以來察脉與眼精而知可與醫
王之法矣洪大而數緩大而無
力急大而數時一澁是乃心脾
肺之虛麻也眼色見張弱虛然
無情是其所爲也〇一切病後
元氣未復晴無情脉虛大則宜
使加減湯息而調理矣〇傷寒
愈後因勞力再發其症頭疼身
痛寒熱往來腰腿酸疼沈困無
力加栢差芸若未効則加附運
補藥力也名之曰加味益氣湯〇傷
寒愈後爲沐浴感風再發熱元
氣虛宜加味益氣湯〇傷寒愈
後元氣未復於是犯房勞則必
小便澁肌熱沈困加附得奇効
〇平素不足兼勞役內傷挾風
寒者以致瘧疾寒熱交作肢躰
倦怠加芍守一〇痢疾久不愈
不能起床不食疲弱之甚者加
芍蜜砂卵去柒〇婦人風毒腫
愈後上下流注而腫痛體瘦之
力發熱不食與此湯腫痛在上
加牛在下加差而得愈按其流
注者初爲發散不足之故歟〇
金瘡腫痛其口開則此湯尤宜若
其口閉則宜用茯苓補心湯一傷寒
也癰疽亦然〇內傷氣虛盜汗

不止兼敢咳肌熱加酸門苹桔
○予之父八十歲時冬月大小
便不通莖中及肛門甚痛數方
不効故灸氣海翌朝小腹腫起
二寸許二穴痛益甚於是予喟
然以醫王煎汁與六味丸則頃
刻小水通至夜漏下終四五
日而安○一男面白鼻流清涕
不聞香臭三年予以爲肺氣虛
加門丹而愈○半產氣虛下血
不止昏暈不知人事加芎永○
產後下血不盡與芎歸湯四物
湯之類不止故用此湯以得奇
効諸下血崩漏帶下等亦見氣

升陽神氣湯 治飲食不時飢飽勞役胃氣不足脾氣下陷氣短無力不能久熱早飯後轉增昏悶頻要眠睡急惰四肢不收作五心煩熱若痛止則去加味可用本方也

升二分 升麻 羌活 防風 各五分 蒼朮 柴胡 各七分 蟬半 甘草 各一分 右入姜棗煎服○腹脹及窄狹倍朮○腹硬加砂三分 △按此方治食後頭痛少有寒熱四肢急惰氣不快欲睡眠者是乃脾胃虛弱故也

參朮調中湯 瀉熱補氣止嘔

定喘和脾胃進飲食一
補中益氣湯去升柴加桑五分
玄朮粗錄門各二分芩三分童一分
△按此方治氣虛之
九 正氣補虛湯 治內傷飲食七情
兼外邪所襲寒熱頭
軟腰轉筋自汗肢冷
虛通用婦人產後感
參 麥門冬 朴 芪 芍
神各五分 桂 玄 附 喬 蜜 永 甘
棗水煎服 △按此方治血虛之劑
十三 參苓白朮散 治脾胃虛弱飲食
不進或嘔吐瀉利其
脾胃此藥極妙○參 伽苓預
扁各一 朮 利 薏 蓮 各一兩
右水煎○治噤口痢用石蓮又加石
菖一兩或有加蜜半兩○別方加砂一兩
按此方治脾胃虛之劑

○飲食 附痞滿

論 飲者無形之氣傷之則宜發汗
利小便使上下分消其濕也○食者
有形之物傷之則宜損其穀其次
莫如消導重者宜吐宜下○丹溪曰
痞滿與脹滿不同脹滿內脹而外
亦形痞則內覺痞悶而外無脹急
之形也○夫痞滿者非痞塞之痞
也乃胸腹飽悶而不舒暢也有氣

有血虛有食積有脾泄有痰膈皆是七情內傷六淫外侵或醉飽饑餓失節房勞過度則脾土虛而受傷轉輸之官失職胃雖受穀不能運化故陽自升陰自降而成天地不交之否不通泰也氣口脈緊盛爲傷食食不消化浮滑而疾○痰滿脈滑大痰人鼻弦伏中虛微濇衰弱○右關脈多弦弦而遲者必心下堅此脾胃木乘脾土鬱結於藏府氣不行則痞

一方　平胃散　治脾胃不和飲食不進常服則煖胃消痰

蒼朮各五錢　甘草三錢

右入姜棗煎服或爲末鹽湯點服

亦可也○瀉脾濕加茯苓倘伽名調胃散一方加藿香守○痰疾寒熱加柴守○瘧疾寒熱加柴胡○水氣腫滿加桑○婦人赤白帶加芡○子宮久冷加桂○酒傷加葛○飲冷傷食加良○滑泄加行○小便赤澁加猪澤○風痰四肢沈困加荊○腿膝冷痛加藤○渾身虛羸拘急加薤○脾胃困弱不思飲食加芡參○自痢加吳○赤痢加連○頭風加本○胃寒嘔吐加薑苓倘○氣不舒快中脫痞塞加沙薑○胸中不快心下痰加杏○大便硬加虎芒○遇

夏加芍炒脉洪大亦加芩連〇小
腸氣痛加鈴茴〇遇雨水濕潤時
加芩澤〇欲進食加曲芽吳萸椒
永名曳茱萸湯治傷寒吐涎加本
名和氣飲加本柿名和解散加藿
守名不換金正氣散治傷寒吐痢
瘧疾寒熱者加柴〇飲食不進身
體沈重肢節酸痛皮膚微腫米穀不
化腹脹本方一兩桑炒一入姜名對金
飲子〇積塊屬熱者合小柴胡湯加
童枳曲查稜莪名些柴平湯〇關格吐
逆小便不通者合五苓散方見加藿
按治脾濕之方也〇飲酒太過
小便不利或發黃合五苓散加

自得奇驗補本方加曲麥查名
山楂平胃散〇冷熱氣痛加茴
香〇五勞七傷有熱加芩柴〇
手足酸疼加羌活
香砂平胃散治宿食不消飲食
莎蒼陳各一兩枳藿各八分
砂七分木香各五分右入姜煎服
〇肉食不化加查果〇米粉麪食
不化加曲芽〇生冷瓜菓不化加
永童〇飲酒傷加連葛梅〇吐瀉
不止去枳加芩仰守梅〇吞酸吐
酸去枳木加連炒丹吳〇因心痛
服熟藥過多後吞酸加連炒〇食

鬱而饋雜去積藿加連炒丹芩芍
辰〇右脇下有堀作痛飽悶者食
積也去藿蒼加青查芽永梹〇腹
痛甚而瀉瀉後痛減脉弦是食積
也先用備急圓而下之後用此湯

按治食積之方也〇腹痛而瀉
瀉後痛減去藿加朴查曲官永
得數驗〇一婦人噯氣作酸每夜
寢間不覺浸一尺白帋六七胸腹
飽悶或痛惡食不思二年太抵去
藿加朴查芽曲永尚隨時加減
經二年餘而安殊去臍生一男也

三 養胃湯 治脾胃虛嘔逆惡心腹脇
脹痛腸鳴泄瀉或寒熱如瘧骨節煩痛

藿 朴 守 芩各一 菓附
陳去 參 各七 甘少 伽五本 半

右入姜棗煎服〇心下痞滿而不能
食去棗參附加茯苓〇瘦人
去守加連〇肥人加蒼〇食積去伽
守加曲查芽〇血虛去守加芎芍〇
氣虛去守加參〇痰腦中滿去伽守加
蓼貝桔瀝〇脾泄中滿去守加蒼芍
此方在內傷不足按先方去蒼加
附伽也予常去附代莎而治老
人小兒之瘧疾則十得八九奇妙

四 香砂養胃湯 治脾胃不和不思
飲食口不知味痞悶不舒
伽二分 莎 蒼 朴
陳

芩 各八分 多七分 參 蜜 各五分 芎

右入姜棗煎服○脾胃寒加永官○肉食不化加查菓○米粉麪食不和加曲芽○生冷瓜菓不和加楂永○胸腹飽悶加枳腹薤○傷食胃口痛加木實益○傷食泄瀉加永楂伽○傷食嘔吐加藿香半夏○

按此方平胃散合四君子湯加砂莎多蜜故除濕痰補脾虛進飲食矣予與此方則蓮芋有試胸滿清冷而不食是所以脾胃虛冷而不和殊胃中有寒痰也雖諸病而胸清冷而不食則止本藥用此方進飲食且又與本病藥也若此湯有支胸者可與枳茂之類丸藥矣○久瀉日夜五七行胸冷不食咽渴參苓白朮散不効用此湯得奇妙○老男心腹痛全不食脉平和服藥皆吐數醫束手予謂是脾胃虛冷此湯一貼而吐止五貼而食進得奇名○婦人不食胸悸而冷眩暈足亦冷沉香天麻湯不効故與此湯而愈

五帖 香砂六君子湯 治脾虛不思飲食食後致飽悶

莎 伽 芩 守 陳 多 朴 各 砂 參 木 益 芎 各五分

右入姜棗煎服傳方六君加芎沙藿砂

○胃口有寒嘔吐不止去木益加喬

藿名藿香安胃湯

飽瀉去即宜服細去守多水益加

芍藥煎入姜梅煎服○腹痛去參

須加木茴○瀉加水梅○小水赤

短加通草○嘔噦惡心加藿守○

夏月加連炒○扁○冬月加永去守

按此方治因脾胃虛寒而致損傷

者矣不舉治例切所以得奇効也

去守益加木香則前所謂香砂養胃湯

治中氣虛弱不能運化

爲痞者飲食痰積不能旋化爲痞

者濕熱太甚爲痞者

參朮苓 陳守朴

實連砂 澤 右入姜煎服

按治痞滿之主方也

陶氏平胃散治食積類傷寒

蒼二兩朴 陳 伽各七 甘 永

查 曲各一 珍二 連 洞各四 窒少許

右入姜水煎服○腹痛加檳榔甚

大便實熱去查曲菓姜加虎下之

○如心中兀兀欲吐無奈者用滾

鹽湯調皂莢末五分探吐

葛花解醒湯治飲酒大過嘔吐

痰逆心神煩亂胸膈痞塞手足戰

搖飲食減少小便不利

多 砂 縮各五 苓 陳 猪

參各一錢 神曲炒 澤瀉 生姜各二錢
各半 麥芽 童三錢 蜜五分
右水煎服得微汗則酒病去△按此蓋不得已而用之耳
可特此酶飲成病自損元氣耶

(九九)內消散 治過食寒硬之物食傷太陰或嘔吐痞滿脹痛

陳皮 神麯 查曲 砂仁 莪朮 枳殼
各三錢 山楂 萊菔子 青皮 厚朴
各二錢 甘草一錢
右入姜水煎

△按此方治冷積

(十四)行氣香蘇散 治內傷生冷飲食厚味堅硬之物肚腹脹滿疼痛外感風寒濕氣頭疼身熱憎寒遍身骨節痠木疼痛七情悶怒相沖飲食不下心腹氣痛

香附 紫蘇 陳皮 枳殼 麻黃
各一錢 甘草五分 生姜三片
右水煎服得微汗則
可特此酶飲成病自損元氣耶

(九九)內消散 治過食寒硬之物食傷太陰或嘔吐痞滿脹痛

陳皮 神麯 查曲 砂仁 莪朮 枳殼
各三錢 山楂 萊菔子 青皮 厚朴
各二錢 甘草一錢
右入姜水煎

△按此方治冷積

(十四)行氣香蘇散 治內傷生冷飲食厚味堅硬之物肚腹脹滿疼痛外感風寒濕氣頭疼身熱憎寒遍身骨節痠木疼痛七情悶怒相沖飲食不下心腹氣痛

香附 紫蘇 陳皮 枳殼 麻黃
各一錢 甘草五分 生姜三片
右水煎服得微汗則

寒加蔥三根○內傷飲食加查曲

按此方治內傷外感七情四氣和解表裡之劑

(一甲)藿香正氣散 方見傷寒

右二方飲食之主方也

(二甲)枳實大黃湯 治胸腹有食積大便不通者

枳實 大黃 朴硝 虎掌 半夏 甘草各等分
右水煎以利爲度○腹痛甚加蜜

按此方治飲食停積痞脹作痛者

(三甲)解鬱和中湯 治胸膈痞滿內熱夜不安臥臥則愈悶

貴朮 蒼朮 茯苓 神麯 朴硝 青皮 前胡 連翹
各七分 各八分
右生姜五片水煎服

按此方七情氣鬱不思飲食挾痰火等証宜此湯

○泄瀉

論 泄瀉之症只因脾胃虛弱饑寒飲食過度或爲風寒暑濕所傷皆令泄瀉脈 脈多沈傷於風則呼傷於寒傷於暑則沈微傷於濕則沈緩○洩而腹脹脈弦者死○又曰脈緩時微小者生浮大數者死

平胃苓湯 治脾胃不和暑濕停飲泄瀉腹痛水穀不化陰陽不分不伏水土二切治泄瀉之總司也

蒼朮 陳皮 朴硝 猪苓 澤瀉 茯苓 連翹 縮砂 甘草

右入姜棗煎服○氣虛加參○虛寒加炙○水瀉加滑○食積加曲芽查○痰多加半守○勝濕加芸升○暴痢赤白相雜腹痛裡急後重加木瓜○久瀉加升○腹痛加官○黃胖者飲食無味四肢無力行步倦怠脈濇而濡是也減桂加藿香○脾胃不和而黃腹痛蔔稜莪朮童○連去芩連加桂如小便赤澁加滑

撥此方五苓散與平胃散等分故傷食之泄瀉專可用焉若瀉不止加訶○夏月之泄瀉去桂加芩連予常桂半減用之何者桂大腸之引經也○夏月雖先瀉下而

後滯當用此湯○夏月瀉下身
冷喫乾不欲衣按代熟在內故
令解毒湯而安○夏月患痛風按
因暑濕而身體骨節痛故用此
湯而愈○水腫小便澁少大便
結是乃食滯與濕熱所爲也只
攻其濕熱兼虛客於腸胃
風瀉腸鳴腹痛及腸胃
濕毒下如豆汁或下瘀血○又曰
風瀉者瀉而便帶濇血脉浮弦
參 伽 苓 芍 芍 桂

五 胃風湯 治風冷乘虛客於腸胃
水穀不化泄瀉腸

右入粟煎服○腹痛
按古今傳所謂下膿血則專用
此湯也○腹痛瀉痢如煤血後
重窘迫故伽減半加木瓜得數
奇小柴胡湯○老人曉瀉二三
行腹微痛脉緩加砂○小兒瀉
下如豆汁腹痛
冷○產後當風致泄瀉腹痛宜
此湯○或語云冬月之脫肛下
血加木此妙術也理最可然

六 補理中湯 治寒瀉

右入姜棗燈草煎服○寒極手足

冷。脉沈細加附去良桂〇腹痛加砂
朴審去參〇嘔噦惡心加喬田去三
良桂〇瀉不止加糯蕷〇虛汗加芪
止加衍澁附去良桂〇飽悶加朴砂去參良桂
去藿桂〇飽悶加朴砂去參良桂

(甲)四苓散　治火瀉熱渴煩躁小便赤色一陣後去一陣後重如淋瀉下水穀腸鳴是也

匿伽猪精炒　芍炒丹　貴各一錢　茸五分　烏一个
右入燈艸氷煎服〇飽悶加朴砂
去瀉〇腹痛加朴砂審固去伽〇
嘔噦惡心加藿烏藥砂參〇小水短
赤加翁茱去芋〇口燥煩渴加連
門冬烏梅去茸精〇瀉多元氣虛

脫昏倦加參芪去芋精〇夏月暑瀉
加茅扁〇瀉多煩渴加炒連參辰
烏去精芋〇瀉多不止加參烏衍
去芋丹〇發熱脉數加薫炒芩烏〇

(甲)五苓散　加芍連去桂用亦可也　加見中暑

(甲)六　加味五苓散　治濕瀉濕瀉者不痛腹響鳴脉細是也

芩　猪芋　貴衍精砂訶官　芍各五分
右入姜烏燈水煎服
〇傷熟食加麴〇傷酒暴泄者理
中湯加葛〇傷麪宜人參養胃

(甲)九　香砂平胃散　治食瀉泄而瀉瀉後痛減脉數是也　加見下飲食

本方去洞加伽芩〇又加珍查芽

湯加薤〇傷水飲宜五苓散

十五 加味二陳湯 治痰瀉

或少或多此因痰滯脾中以致氣不周也

貫衆 守冬 苓 伽精 蘋

砂米 翁 朴 各等

右入姜烏燈水煎服〇瀉不止叻

衍詞去朴〇灸滑泄不止百會一穴

天樞二穴中脘一穴氣海一穴

十四 參苓白朮散 治氣虛泄瀉并產

後之泄瀉 參 伽苓 蕷

砂 藿 貫 永 茹 訶

衍 各等分 右入姜燈水煎服

〇嘔噦惡心加守烏〇元氣虛脫昏倦加芪周少許去砂藿〇飽悶加厚去

十三 香砂六君子湯 治脾瀉

飽瀉去即寬脉

也方見于飲食

十二 藿香正氣散 治七情瀉腹常虛

痞欲去不去去

衍詞〇小水短澁加翁苓去永〇瀉甚不止加糯烏熟附少許〇用四君子湯加麥砂茹陳糯米〇久者加周芍

本方加丁子砂仁良姜〇又以木香調氣湯七氣湯調其氣則瀉自止△按此方治暑瀉之劑

十一 升陽除濕湯 治脾胃虛弱不思飲食腸鳴腹痛泄瀉無度小便黃四肢困弱

周 薑黃 芸 曲

猪各五分 精一匁 貫 芽 朴各等分

右入姜棗水煎服○胃寒腸鳴加
益田非腸鳴不得用

五 補中益氣湯 遇飲食勞倦即發而
肢躰酸軟沈困泄瀉者宜此方見于
肉傷門

○痢疾 與泄瀉可通考

論 夫痢乃濕熱食積三者下青黃
赤白黑五色也濕熱傷血分則赤傷
氣分則白氣血俱傷則赤白相兼
黃者食積黑者濕勝也 脈 脈經云
腸澼下膿血脈沈小流連者生洪
大數身熱者死○又曰腸澼筋攣
脈小細安靜者生浮大而緊者死

六 芍藥湯 治下痢赤白初起積滯
不行裡急後重頻上圊而去則少腹痛

芍二錢 芍各一 虎七分 根
蜜 桂 甘各五分

右煎空心服

回春去虎桂加枳○後重窘迫甚
者倍虎加芒二錢○瘧痢氣不宣通
加實一錢○藏毒下血加桶一錢○壯
盛人加虎二錢○虛弱人去虎○按
用此方而行血則便膿自愈和氣
則後重自除補按婁氏綱目曰自
古治裡急後重但用檳榔木香
調氣及大黃下積至丹溪始用
桃仁滑石滑其死血如鼓應桴
實發前人所未發也

七 調和飲 治紅白痢○下痢稍久
者宜調和 芍三錢 斤一錢 芎 連
半

芍三匁 斤一匁半 芎 連 芩
嬰各一匁 升 右煎空心服
○紅痢依本方○白痢加吳一匁○赤
白痢加御苓陳莎各一匁○按治諸痢用
通利藥後未已直服此方調理而愈
(五十八) 參歸芍藥湯 治痢久一二十日
去多不止者
芍一匁半 參 斤 芩 頭 陳各一匁
砂七分 甘 右入燈草烏蓮煎服
○禁口痢不食者胃口極熱加連
參蓮梅粳○腹痛裡急後重者是
熱積氣滯加蜜柊○未除者加升
少二○痢作痛者熱流下加芩炒○
痢後發熱不止或虛坐努力者俱

是血虛倍加斤芍半○積中有紫
血是瘀血加芍紅○按下痢久不
止者用此方宜調養氣血
按二方皆治痢之主藥也初痢
宜芍藥湯日久不止用調和飲
氣血虛弱者參歸芍藥湯○脾
胃虛而膿血不止者胃風湯(方見二十五)芩
虛弱而下如醬鴻脉弦數或白變
紅痢者專可用此湯也
(五十九) 和中湯 痢疾自方不應脾胃痢
餘大朴枳 竜 婆各中

砂糖 永各小半少 右煎服

○此方產前後痢病得數劑後痢不效則宜此湯必有奇妙 餘二方見前

六十又方 和中湯 厚朴 枳實各一錢 芍藥各二錢 甘草五分 右煎服

○此二方東井叟之配劑也

一婦新產十餘日後腹發熱微痛大便不通去周加枳芩四五劑痛大便不通者患前證故前劑貼而愈又一婦患前證故前劑二貼而下滯血更得平安

空補 導滯湯 治血痢疼痛

虫虎芩 仰各一錢 桔梗各一錢 甘草五分 右水煎服○腹痛加奴朴○後重加液△按此方行血和氣

二十 治痢奇方 此方或紅或白或紅白相兼裡急後重身熱腹痛者俱可服禁口亦可用

芍生 連各一錢二分 朴 童各八分 甘草 查各一錢二分 洗紅三分 蜜二分 右煎服

○單白無紅者去印嬰蜜加貴○滯澁甚者加虎○如延至月餘覺脾胃虛滑者用酒炒芩連芍各六分 貴朴蜜各三分 醋炒 印四分 紅二分 斤參伽芣苢各五分○胎婦去紅嬰洗

二十一 倉廩散 治痢疾赤白發熱不退腸胃中有風邪熱毒及時行瘟疫治門閭境皆下痢膿血者服之神效

△即人參敗毒散加連陳倉米
三百粒方見傷寒門
○痢後手足痛加洗爪○噤口痢
加茯苓○赤白潮熱煩渴小柴胡湯
去參名棗加蠔芍見傷寒門○不
○赤黃內煩欲飲冷水小便不利
者宜小承氣湯方見傷寒門○不
問赤白相雜肚痛裡急後重渾身
發熱口乾發渴宜六一順氣湯方
見傷寒門

四十 補中益氣湯 凡痢疾日久者
主之方見內傷門

五十 八物湯 凡休息痢經年月不癒
有過服涼藥以致氣血虛者本方
加貴參茯苓連少許或宜十全大補
湯二十方共見虛損

六十 真人養臟湯 治大人小兒冷熱
不調下痢赤白或如膿血魚腦裹
急後重臍腹疼痛或脫肛下墜酒
毒便血並皆治之
桂 五分 參 斤 蜜 訶
茸 衍 芍炒 伽各一錢
御米殼 二錢
右煎食前服
○臟寒者加附子一錢製

合類增補裒方規矩卷之二終

調中湯（理氣）

蒼（朮）貴（炙）　白芍（朮）精蜜（木香）
淡（乾）洗一　炒（一條）分　甘（炒）熟（二）
赤茯（二）　淡（中）文（炒）王（小）藍梢（灰）

面（二）キビシ　虛勞ノ
出ス紛刺　六味地黃丸ノ未ノ諺有リ

合類增補衆方規矩卷之三

○瘧疾（ギャクレツ）

論（ロン）夫瘧者因外感風寒暑濕內傷（ソレギャクハヨッテホカカンフウカンショシツナイショウ）
飲食勞倦或飢飽色慾過度以致（インショクロウケンアルヒキバクノモッテイタル）
脾胃不和痰留中脘然無痰不成瘧（ヒイフワタンチュウワンシカラズトイエドタンナクバギャクナリ）
○三陽受病謂之暴瘧發在夏至後（サンヨウノヒニコレヲボウギャクトイフナツアルヒキハチカウシテボウセリ）
處暑前此乃傷之淺者近而暴也（ショショノヘニコレヲアダムヒキモノハチカウシテボウセリ）
在陰經則不分二經總謂之濕毒此（アルヒキインケイニハズワレニケイヲフサネテコレヲシッドクトイフコレ）
乃傷之重者遠而爲疾疾者老也（ナスヒキガイヲフカサネテナスガイハガイヲフカサネテハヤリ）
居西方宜毒藥療之（キョスサイハウノヒトヨロシクドクヤクヲモテコレヲリョウスベシ）

脈（ミャク）要略曰瘧脈（ヨウリャクニイフギャクノミャクハ）
自弦弦數多熱弦遲多寒弦而小（ジセンセンサクハオホシネツセンチハオホシカンセンニシテショウ）
緊者下之瘧弦遲宜温○脈經曰（キンナルモノハコレヲクダスベシギャクノセンチハヨロシクアタムベシ○ミャクケイニイフ）
瘧脈自弦微則爲虛代散則死（ギャクノミャクハジセンビナルヒキハスナハチキョトナリダイサンナルヒキハシス）
瘧脈弦數但

（一）九味清脾湯（クミセイヒタウ）治（ナス）瘧（ギャク）

熱不寒或熱多寒少口苦咽乾初
發先服祛邪氣
柴 芩 芩 伽 朴 童
右入姜煎服
守 果 芔 右
按治瘧第一方也熱多寒少或
寒熱往來而頭痛口苦咽乾小
便赤或澁脉弦數者此之證也
若不可嚏用截補之藥與此湯
退其熱而後當用截藥○傷寒
寒熱往來口苦熱不退者與此
湯得奇効實勝於小柴胡湯○
一婦人發熱戰慄鼓齒晝夜三
四次熱退而後頭痛與此湯而
愈又且有兼惡寒者也○產後

寒熱往來咽渴不食泄下與此
湯而安○瘧痢兼作頭痛惡寒
發熱咽渴脉大數雖柴苓證而
却與此湯加桃而安○諸瘧不
論新久其驗如神去伽加蒼陳
藿澤瀉梅入姜煎未發前可服
○久瘧加恒○憎寒加枝○躰弱
加參○無汗加麻○有汗加官○
夾食加朮○渴去守加參括蔞
飲發爲寒熱
朴 梅 守 童 良 各二 果一 芔 五 分
右入姜棗煎未發前併三服
按古人用此湯治脾瘧食瘧今

三 七味清脾湯 治因食傷脾停瘧

予連年以此方治因瘧而虫攻上心胸寔去耳餘皆治虫之劑也大抵瘧欲發時有差上胸物是當虫先用丸味清脾湯退熱而後七味清脾湯加桃可服發日五更必有奇効○因虫而久嗽不止時時惡寒發熱脉細緊用葛甤散則爲極故與此湯而安○勞嗽乾咳聲嗄用滋陰降火湯則支脇不食故因虫與此湯得奇功今按是遇中否雖然切切依有驗而記之

三 人參養胃湯 虛人患瘧者養正則邪自除也外感風寒內傷生冷憎寒壯熱頭目昏疼不問風寒二證夾食停痰俱能治之

蒼朮 守各一兩 陳七分半 藿 梨

苓 參各五 半三 梅一個 姜棗煎服○寒多加官○熱多加柴○汗多去蒼藿加芪伽○飽悶去參加童砂○渴去守加門雷○渴加芍伽○渴不止去朮果加衍○嘔噦去果朴蒼加砂伽預炒米○痰多去守果加貝瀝○內熱盛去守加芩○暑熱盛去守藿加葛扁按不換金加參芩菓梅之方故寒多熱少或洒淅寒熱而瘧疾傷寒感冒疑似之間最可也今

察方中有平胃散治胃瘧有二
陳湯治瘀瘧殊望瘧愈而後養
生藥則可與此湯也○咳嗽惡
寒發熱用葛甦散九文散而不
驗則此湯去參加會桑得奇効
○婦人赤白帶下酒洒而惡寒
翕翕而發熱面青不食自汗脉
與逍遥散而全愈
者必可用此湯
無力或寒多者加乾姜附子如
脉洪有力熱多者加黄芩黄連
柴胡厚朴蒼朮發散半果茯橘
芎藭也人參惟虚人最宜

四 補 散邪湯 治瘧疾初發憎寒壯
熱頭疼身痛無汗

芎 芷 甲 均 芸 假 各一
水 羌各一 茸三分 右入姜三片水一
煎露一宿次早温服○有痰加貝
○有濕加蒼○夾食加莎
按此方治瘧無汗當發汗散邪爲主

五 正氣湯 治瘧疾初爲憎寒壯熱
頭疼口乾有汗

柴 西 芎 芷 守 門
洗 珍 童 苓各一 枝 茸各三分

右入姜二片棗二枚水煎服
按此方治瘧有汗當止汗正氣爲主

六 人參截瘧飲 治虛人截瘧一切

瘧疾并可截之

參 伽 苓 各半斤
苓 甘各八分 枝三分 恒 珍 黛各八分
烏一个 半三分 右入姜一片 棗二枚
水煎露一宿臨發日五更温服

七 七寶飲 發散病勢少衰而用此截之

朴 貴半 甘 珍 恒 洗 童各等分
右姜一片水煎入酒少許露一宿
臨發日五更温服▲本方加雷卷
煎各一錢 梅一个名曰常山七寶飲治
北健人瘧疾截之○汗多加伽士

蒼○熟多加柴苓○寒多加枝○
口渴加門粉○痰多加勒

八 不二飲 治一切新久寒熱瘧疾

劑截住神效

恒 洗各二錢 雷 勒各一錢

右姜一片水煎入酒少許露一宿
臨發日五更服○一方恒雷洗各一錢
酒一盞浸一日臨發早服

九 柴苓湯 治瘧發寒熱在半表半裡陰陽不分

柴 苓 參 守 猪 半各等分
伽 苓 桂 甘各等分
右入姜三片棗一枚水煎○無汗
加甲○有汗加枝○寒多倍桂○

熱多加芩 ▲按此方治瘧分利陰陽和解表裡之劑

十 柴胡芩歸湯 治夜間陰瘧引出陽分則散後服人參截瘧飲止之

柴胡 利 斤芩 芩 歸 各一戔 紅花 各二分 伽藍葛 芩 貴 各一戔 人參 朴 各二分 生薑一片棗二枚梅一个水煎

十一 參歸鱉甲飲 治老瘧腹脇有塊成瘧母

參五分 童 芪 鱉 斤 芩 伽藍朴 莎 芩 砂 查 洞各五分 芎三分 右入姜棗梅水煎服

十二 老瘧飲 治久瘧結成癥瘕羸瘦在腹諸藥不愈

蒼 珍 利 童 貴 各五分 芪 良 各二分 芩 守 芎 奴 桂 各二分 水 右入鹽少許煎服

十三 加味益氣湯 治人平素不足兼以勞役內傷挾感寒暑以致瘧疾寒熱交作肢體倦怠乏力少氣

芪 柴 芩 各一戔 參 伽藍 斤 守 芍 各八分 貴六分 芎五分 周三分 右入姜水煎服○有汗及寒重加枝五分倍芪○熱盛倍柴芩一○渴加門粉

十四 加減十全大補湯 治人虛弱久瘧寒熱不多而但微熱者邪氣已無只宜服此

芪 參 伽藍 芩 斤 芍

芍芍 芎 柴胡 芩 貴耳

右入姜三片棗二枚水煎

五十 參歸養榮湯 治瘧疾截住後用此湯藥調養氣血

參 斤 芩 伽 貴 砂仁 朴 芍 各等分 右入

棗二枚水煎○虛熱虛汗加芪去砂仁與虛損可參考

○諸氣 附鬱証 與虛損可參考

論 內經曰百病皆生於氣也若不善攝養者五志之火無時不起五味之偏無日不傷是以釀成膠痰固積留滯於六腑鬱火邪氣充塞乎三焦使氣血失其常候腑臟不能傳導是故外邪得以乘虛而湊襲鬱証夫人之氣血沖和萬病不生一有怫鬱諸病生焉故人之諸病多生於鬱蓋鬱者結聚而不發越之謂當升不升當降不降當變化不得變化所以轉化失常而六鬱之病生焉

脈 脈經曰脈滑者氣血濕食痰熱也少血多氣大者血氣俱滑者多血少氣濇者緊者血氣俱多脈來大而而緩者血氣俱虛代者氣衰細者氣少浮而絕者氣欲絕○絲大而滑中有短氣○尺脈濇而緊爲血實氣虛尺脈細而微血氣俱不足也鬱証脈多沉伏氣鬱則必沈而濇

濕鬱則脈必沈而緩熱鬱脈必沈數痰鬱脈必弦滑血鬱脈必乳而結促食鬱脈必滑而緊盛鬱在上則見于寸鬱在中則見于尺左右亦然下則見于尺左右亦然

分心氣飲 治男子婦人一切氣

不和多因憂愁思慮忿怒傷神或臨食憂戚或事不隨意使抑鬱之氣留滯不散停於胸膈之間不能流暢致心胸痞悶脇肋虛脹噎塞不通噫氣吞酸嘔噦惡心頭目昏眩四肢倦怠面色萎黃口舌乾苦飲食減少日漸羸瘦或太腸虛秘或因病之後胸中虛痞不思飲食並皆治

蘇二錢 童陳 腹 桑 羌各五分
苓 守 芍 通 官各二 甘二分半

右入姜棗燈煎食遠服○加枳梹涉治氣白病最能升降陰陽調順三焦其功難以盡述○一方去芍羌加桔枳木梹莎莪蘿治憂思鬱怒諸氣痞滿○水氣面目浮腫加豬澤車瓜門萇○氣塊加莪○性急加柴○多怒加芩○食少加砂曲○咳嗽加桔守○胸膈痞悶加實莎○三焦不和加香○氣閉加蔔○氣滯腰痛加瓜枳○上焦熱盛加丹○下焦熱盛加芩○翻胃加沈按此方散氣降氣之劑故專治

氣欝之主方也○憂欝得噉加枳會○因七情面目浮腫腹脹肢腫加猪澤瓜○七情氣結于中心腹疠痛不可忍加枳蜜少○氣逆上而喘足下焦冷蒼朮湯不効故與此湯切得奇効是乃氣欝故也○洒淅寒熱盜汗頭痛咳嗽五心煩熱常心不快至暮虛熱夜不寐脉弦而數似勞證滋陰降火湯不効謂是牢人氣欝故去羌減半蘇加枳梗而安○因氣惱成腫氣脹滿此方有數奇○氣不順如痛風一身痛此湯切得奇妙

十 七氣湯 治七情所傷及勞役飲食不節滿悶短氣

守五分 參 桂 甘各二分 右入姜煎服○七氣心腹刺痛加索一分乳三分名加味七氣湯婦人猶加芎斤各二分

十四 七湯 一名大七氣湯 治七情不節致臟氣不平心腹脹滿又治七情氣欝結聚痰涎狀如破絮在咽喉間咯不出嚥不下及中脘疼滿上氣喘急

守五分 芩四分 朴三分 蘇一分 右入姜煎服○七情所傷欝結臟腑氣不和平心腹疼悶加減○七氣欝結五臟互相刑剋陰陽不和揮霍變乱吐利交作加芍四分陳二分

參一名入姜棗

十九 加味四七湯 治七情之氣結成
痰氣狀如梅核或如被絮在咽喉
之間咯不出嚥不下或中脘痞滿
氣不舒快或痰涎壅盛上氣喘急
或因痰飲惡心嘔吐此藥最妙功
不盡述但婦人女子患此最多

苓朴 蘇 粳 守 陳 童
實 砂 星 曲各一 多 槟 益各五
右入姜煎臨臥服

按七情鬱結生痰在咽喉間
吐不出吞不下氣不快者善消
痰飲之藥也○婦人上氣喘急
胸膈痞悶嘔吐白沫與此湯而安

十二 三和散 治五臟不調三焦不和
心腹痞悶脇肋膜脹風氣壅滯肢
節煩痛頭面虛浮手足微腫腸胃
燥澁年高氣弱清晌
胸氣攻胸腹滿悶大便不通

芍一名 羌 蘇 瓜 腹 泉各五分
半
陳 槟 木 伽各四〇一方加
砂 姜 燈各五分
右煎服

○痰而痰涎在喉嗌不下得奇效
○七情結五臟脾胃不和大便秘
澁或脇背走痛妨飲食並治○水
腫喘急者先當降氣加蘇滑黃
按治因滯氣而秘結者之方也
○能食而大便不通爲實秘宜

二黃承氣之類不食而大便不
通爲實秘宜此方是氣滯故也
○老人之秘結或腹痛俱以氣
不順故與此湯而順氣則自愈
真蚵得奇効○脚氣不腫而攣
急疼痛宜此方若腫痛宜芎粘
痛湯傳曰見于若因風濕者可尋
九文蒼桔湯○水腫脹滿上氣
喘急加軾守如太便不通加枳
是依降氣而愈故無氣鬱證則
不可用之○治痃氣最上方也
○無病人
澤丸連小腹痛是也
遊山翫水俄然胷腹滿悶卒至
肩頸而筋太強立且口噤暈倒
不知人事故細皂末吹鼻延齡
丹揩牙通關竅與此湯而安
○頸筋強痛引兩脇而眩暈不食
身難動得太驗○腰痛難轉動而
大便秘澁得奇妙○大抵筋攣急
則宜此湯是乃氣滯故也○或
語曰腸腸內有形如指物押之
則累累爲轉動與此湯得奇術

分氣補心湯 治心氣鬱結而四
肢浮腫上氣喘急
腹炒 莎 各一 桔 各一 通 苦
西 童 枳 各一 細 蜜 各五分
右入姜棗煎服▲按主氣鬱腫脹
之方也○咳甚而頭痛面目四

脾浮腫腹脹加桑而安

【光二】木香流氣飲 治憂思太過諸氣痞塞怔忪鬱積脚氣風濕聚結腫痛喘滿脹急或肩背腹脇刺痛嘔吐不食胸膈痞脹面目虛浮四肢腫滿口舌咽乾大便閉小便澁

陳一兩六分　朴　童　涉　蘇　甘各八分
通四錢　桂　腹　莪　丁香皮　枳
菓　門　蜜各二分
薑　芷各二錢
伽　瓜　守　赤芩　菖各一錢

右入姜棗煎服○去菖蘆加沉枳殼名二十四味流氣飲 治腹中氣滯痞悶不快胸膈走痛者○蟲腫加多○頭面腫加蔥○肚腹腫加

實○腳至脚腫加桑○腫滿加丑○厥壅有時晕本方加菖姜葱

按治氣鬱腫滿初起也水腫有積聚或水腫脹滿二便不通或肩背胸脅爲注痛或腹脹不食喘急咳嗽而後爲水腫二便共澁或脚氣有妙術或胸膈痞悶怔忡而腹脹或氣逆上而耳聾眩暈皆此方主之也他家專積聚用之○氣滯腰痛不可轉側服之立効

【光三】木香調氣散 治氣鬱其症腹脇脹滿刺痛不舒脉沉

麥　涉　枳　童　朴　陳

芎 蒼朮各等分 甘草三分 右入姜煎磨木香服

▲按治男婦因氣鬱而胸痛胸塞氣下陷不快也若有胸痰者先可用此湯有數奇効也

四九 蘇子降氣湯 治虛陽上攻上盛下虛痰涎壅盛

蘇子 半夏各五分 桂 陳各三分 厚朴 甘草各三分

右入姜棗煎服〇治虛陽上攻喘促咳嗽〇治鼻衄不止

▲按治虛陽上攻喘促咳嗽足冷者若足不冷者無十分之功〇水腫脹滿痰喘氣急欲絕者

五〇 補 上下分消導氣湯 功勝分

心氣飲常患氣惱之人可用此作丸常服甚妙

連 守各二兩 奴利各二兩 蔞各一兩 雪芎 芩朴 芩童 莎各二兩 芋翁 洗芽各一兩 甘草三分

右入姜三片水煎服

五一 加味四君子湯 治氣虛証

參 伽 砂 芩 貴朴 甘各等分 氣虛甚加芪

右入姜三片棗二枚水煎服

五二 紫蘇子湯 治憂思過度心腹脹

腹脹喘促煩悶腸鳴二便不利脈虛緊而滑

子一枝 腹皮 珍朴守貴 伽翁 洞蜜參 各五分 右入姜棗煎服

八 正氣天香湯 治婦人一切諸氣作痛或上湊心胸或攻築脇肋腹中結塊發渴刺痛月水因之而不調或眩暈嘔吐往來寒熱無問胎前產後一切氣候並皆治之 按集緼氣門載之治九氣

九 沈香降氣湯 治陰陽壅滯氣升降胸膈痞悶噫醋吞酸

沈香 降香 各一兩 砂仁 五錢 泉四 二盃 右水煎服

十 柴胡抑肝湯 治寡居獨陰無陽氣或脾胃留飲脇下妨悶色慾心萌而多不遂是以惡寒發熱全類瘧者

柴胡 赤芍 各二 童二 牡蠣 各一 蒼朮 各一 曲 八分 莎 丹 篠 各一 芍藥 七分 麴 蜘 五分 右煎服

按寡婦寒熱往來似瘧或顏色時赤時青五心煩熱如勞瘵間與此湯而安此症尼僧並宮女多

○男子虛勞失血及婦人產月後因氣者四物湯加密洗○陰虛氣滯者去密洗加黑梔或炒黑丹一味

▲按此方治胸膈痞塞喘促短氣或脾胃留飲脇下妨悶

一冊 通

當歸活血湯 治血鬱証 血鬱者能飲便紅或暴吐紫血或瘧不止或痛數處也

當歸 奴 童各一分 桂 末 各八分 紅花 王 莎各一分 芍藥 各一戔 甘草 炙 各五分 牛膝 炒黑 各三分

右入生姜水煎服○血結硬痛加虎杖 ▲按此方治能食便紅或暴吐紫血痛不移處

二冊

香砂平胃散 治食鬱証 食鬱者噯腐腹脹悶作痛惡食不思右瞤脈緊盛也

蒼朮 貴 莎各一 砂仁 奴 查 芽 曲 末 各五分 甘草 炙 三分

右入生姜三片水煎服○食鬱久成鬼毒去乾姜加大黃

三冊

瓜蒂枳殼湯 治痰鬱証 痰鬱者有痰氣急喘嗽不能臥胸膈脹滿脈沈澁也

瓜蒂 二十一枚 枳殼 麩炒 利 奴 芍藥 蒼 莎 查 芩 貝 貴 砂 蜜各五分 甘草 三分

右入生姜三片水煎服

四冊

二陳湯 治痰鬱 火邪在下二便不利者○本方加升柴芍芸 方見下

陳皮 利 奴 芍藥 蒼 莎 查 芩 貝 貴 砂 蜜各五分 甘草 三分

右入生姜三片水煎服

五冊

六鬱湯 解諸鬱 治火化痰順氣開胸膈

莎蒼 曲 堯 丹 貴 蘇 芩各一甘草 五分

右入生姜三片水煎○有痰加星守○有熱加柴芩又加連倍丹○血鬱加嬰紅王○濕加羌伽倍蒼○氣加香蜜洗水永倍莎砂○食積加查曲

芽砂▲按此方開諸鬱之絕司也

【附】解鬱調胃湯 治胃脘血液耗損痰火內鬱水穀易下而食物難消若噎膈之症或氣分之火壅退於中而時作刺痛者皆由怒憂思慮勞心所致

伽貴各一錢 丹各一錢二分 蔚 芽各七分 苓六分 地莎各八分 曲芽各四分 嬰 右入姜二片水煎

○胸膈刺痛加酒寶○胸壹悶加奴○胸內煩熱加連○大便不利加虎○有痰加守碧○飲食不美亦去○痰 與氣門可互考

論 丹溪曰有熱痰有濕痰有酒痰有食積痰有風痰有寒痰有老痰

脈要略云脈雙弦者寒飲也【下後大虛】○其脈偏弦者飲也○肺飲不弦者偏頭痛短氣○又云脈浮而細滑者偏飲○脈沈而弦者懸飲內痛○其人短氣四肢歷節走痛脈沈者有留飲○陳無擇云飲脈皆弦微沈滑○或云左右手關前脈浮弦大而實者膈上有稠痰也宜吐之而愈

【附】二陳湯 治一切痰飲化爲百病

苓三匁 茸一匁半 陳 守各五匁

右入姜煎服○偏頭痛在右加苓

芷芎荊升在左合四物湯加荊芥
細蔓柴泠〇頂痛加芎本升柴蔓
細芎〇痰在腰膝下腫痛加蒼
離通梢解膝〇痰在胸腹中作痛
或痞滿加仰曲芽砂〇痰在脇下
作痛或澁滯有聲加柴青芎均〇
痰在經絡中或胸背手足臂膊作
痛者在上加芎羌歲〇在下加離
膝通〇冬月加烏附行經〇風痰
壅盛喘急咳嗽不寧加芎羌星枳
皇〇熱痰爲病腹脹喘滿加芩連
丹蔞滑膏瀝〇濕痰身重倦怠加
蒼伽星〇寒痰加永附漏益〇氣
痰加蚕蘄砂枳萎莎〇燥痰加蔓
杏貝會〇陰虛咯血痰嗽加天麥
二門雷梢貝母薤
參伽〇血虛有痰加
者加芩芍〇咳嗽白痰者肺之風
寒也風痰加星梢芎云實〇寒痰加
永官附〇食積痰加查曲莎實連
〇痰飲者痰在胸膈間痛有聲加
莎砂蔞實斤芍蒼童白芥〇痰涎
者渾身胸背脇痛加白芥砂蜜茴
莎實斤泠〇濕痰流注者渾身有
腫塊加蔞枳蒼泠卷芸翹斤莎砂
蜜紅瀝姜汁〇脾虛生痰加參伽
芍實砂梢〇酒痰加葛枳砂曲芽
〇飲酒嘔噦吐痰加砂梅〇痰瀉

者或多或少或瀉或不瀉脉沈滑加蒼砂預車通朴姜梅燈〇若渴不止去朴加訶衍〇肥人頭痛者氣虛濕痰加參木細芎並羌活荊〇瘦人頭痛者血虛痰火加芍細羌桔〇腹中水鳴因熱而痰者痰飲加茯苓〇痛甚加泳炒〇腎背重注走串痛者是痰加蜜薤乳索砂蒼羌泠斤仲〇風寒濕流注經絡而腰痛加蔴蒼芎芷芸羌〇濕痰流注脇肉作痛加星蒼芎姜〇瘧後飲食少進四肢無力面色痿黃合四君子湯加連實姜〇關格上焦痰壅兩手脉盛加星枳實〇大小便不通皆是痰扁中焦氣滯於下焦加通〇痰鬱火邪在下焦大小便不利加弓升芸柴謂之升發一陳湯〇噯氣胃中有火有痰者加砂多蜜益實連朴莎〇眩暈嘈雜火動其痰加丹芩連〇胃口有熱時作惡心加連芩姜是得〇婦人帶下屬濕痰者胃中痰積流下滲入膀胱加二术升柴又云氣虛合四君子湯血虛加芎斤按此方治痰之聖藥也蓋證而照加減以無不治痰飲也〔輔按〕趙氏云二陳湯謂一身痰都治世醫熟之凡有痰者皆以二陳

湯治之夫二陳湯內有守性煨熟
若風痰寒痰與食痰則相宜若
勞痰吐血鼻衄血瀉血尿血崩皆
不可用以其能燥血氣乾津液病
不能愈而反加如天道暑熱之
時最當禁用抑且痰藥數多世
醫治痰何必拘拘二陳之守哉

附 加味二陳湯 治一切癜病〇
發於風痰火則宜用
芎 星 陳 蔓 實 桔
芩各一 蜜五分 辰分 爲末
丹 守 茶各一 加味二陳湯
右入姜煎臨服加瀝姜汁磨木香
調辰砂末同服

附 加味二陳湯 治痰厥運倒

陳 守 芩 斤 實 桔
杏各 良 砂各七 蜜 官 芎各三分
右入姜煎服〇氣逆加軾〇元氣
虛弱去實

附 加縮二陳湯 治涎在心膈上
攻走腰背嘔噦大痛
實 砂 守
陳 涉各 朴
茴 索各八分 蜜 漏 永炒各五分 芎三分
右入姜煎加瀝磨木香服

附 香砂二陳湯 治傷生冷瓜桃水
果海味魚鰕一應寒物而胸中痞滿
陳 涉各一 芎各六分
芩一分 守 砂 曲 芎各六分
右入姜煎服此方傷食之主藥尤
能消食予連年與此湯取奇效難

勝訂者也

按已上四方切得數奇故別立方銘備倉卒之搜覽者也

二四 導痰湯 治風濕痰一切痰涎壅盛或胸膈留飲痰塞不通

半夏 陳各一匁半 茯苓 實 枳殼 甘草各半匁

右入姜煎服〇如欠嗽肺熱熱去守加會九粒杏五分〇憎寒壯熱頭目昏沈迷悶上氣喘急口出涎沫證類傷寒此因七情內傷以致痰迷心竅神不守舍狀如鬼祟加連入姜棗煎加瀝婁桔芩參伽各多入姜汁服名之清熱導痰湯〇按清熱導痰湯痰迷心竅不省人事二

服亦省真神方也〇一方清熱導痰湯去棗參加竹瀝各五分名曰加減導痰湯治中風痰涎壅盛不能言語牙關緊急有熱者也

按本中風先此湯或八味順氣散選用而後尋治之方而當療〇

三 風蘆枳實湯 治痰結胸膈作痛不能轉側或痰結胸膈滿悶作寒熱氣急並痰迷心竅不能言〇痰喘者喘動便有痰聲〇食積嘔者痰嘔如膠咳嗽胸膈結痛者痰結早晨嘔者胃中食積上

半日嗽者胃中伏火皆治之

蔓實 梔 苓 貝 陳 苓各一斤 砂 蜜各五兩

右入姜煎加瀝姜汁少服○痰迷不語去蜜加竹瀝○氣喘加桑皮○痰火發痰結脇痛久不治成脇癰去梔苓加瞿麥甘遂○發熱加柴

羌加門參朮

按治實症咳嗽痰喘之妙方也

○咳嗽胸脇引痛加薤而安若誤而久不治則成膿血而脇生癰也○太抵午前咳痰宜此湯午後嗽可用滋陰降火湯

清神湯 治熱痰迷胸絡恍惚驚惕

神遠各二錢 酸炒 菖 栢子 婁各一錢 茸五分 右入姜煎

四五 桔梗湯 治胸膈脹滿短氣痰逆或吐涎沫及酒痰

利 田 貴 洞各五分 右入姜水煎

按此方治除痰下氣嘔噦心下堅痞痰逆惡心飲食不下

四六 丹溪加味二陳湯 補脾消食導痰行氣

查一錢半 莎 田各二錢 蒼 伽 苓各八分 貴 苓 曲各七分 砂 芽各五分 右入姜棗水煎

○咳嗽 與痰門可互出

論 丹溪曰肺爲五臟之華蓋聲音

之所從出入皮毛腠理不密外爲風
水內滋而生養膜理不密外爲風
寒暑濕之氣所干而疾作

脈 關上脈微爲欬○肺脈微急爲
欬而唾血○脈弦濇而欬爲少血
○脈緊者爲肺寒○鼕弦者寒○
脈浮而緊者爲虛寒○脈浮而緩
者傷風脈細者濕○脈數爲熱○
脈沈數爲實熱○脈弦爲飲○脈沈爲留飲○脈洪滑
弦爲飲○脈沈爲留飲○脈洪滑
多痰○欬脈浮直者生○脈浮濡
者生○脈緊者死○沈小伏匿者
死○欬而羸瘦脈堅大者死○欬
而脫形發熱脈小堅急者死

四七 參蘇飲 咳嗽之主立方也方見傷寒
四八 清肺湯 治痰火咳嗽面目赤身熱咯紅痰
苓陳芹勉芍　天麥琴
丹苑膠　桑各等分并減半梅小一
右入棗煎服○喘急加軾去天○
一切咳嗽上焦痰盛及久嗽不止
成勞加會杏貝吉瀝姜去芍勉苑
膠○久嗽虛汗多去苑膠梅加會
伽姜○久嗽喉痛聲不清去膠加
桔苛瀝姜○嗽而痰多去芩苑膠
芍加會貝桔伽金沸○咳嗽身熱
加柴○咳嗽午後至晚發熱去芩
膠加桔瀝○痰咯不出去會膠加

萋實瀝〇咳嗽痰結脇痛去虵膠丹加白芥萋實砂木茴柴會杏瀝按皿云此湯治先吐痰而後見血者是積熱也滋陰降火湯治先吐血而後見痰者是陰虛也

〇久嗽不止痰喘聲濁脉細緊而數去芍虵膠加桔貝杏〇久嗽不止痰中帶血加杏貝童桔

【四九】加減瀉白散治咳而口乾煩熱胸膈不利氣喘促

桑一兩 籐 陳 桔各五 童分 細 芩 芽各五 右煎服

按太抵治喘嗽之方也〇感冒發熱退後咳痰久不止不食尿

赤無汗得奇効〇久勞咳痰久不止而後成龜胸龜背聲嗄盜汗足冷大便結脉細數與七十餘貼而胸背如常喘止〇常患喘之人因氣欝發尿赤脉浮數加蘇杏枳芩而安

【五十】東垣加減瀉白散治陰氣在下陽氣在上咳嗽嘔吐喘急

桑一兩 籐 芩 參 會 陳 童各五 三分 右入粳二十粒煎服

按治虛症久嗽之方也用滋陰降火湯而肺氣彌虛則與此湯有奇効〇婦人久嗽不已有咳血而不食脉無力雖清咳湯之

證在失血門而肺
此湯而全愈○此
實湯則却爲吐血
滿氣促肺經温熱等
惡風脉浮類
貴蜜守雪貝
玄各二匁
水杏甘各五
分
按此方玄珠云治
暑嗽之
齊

一五 神 瀉白散 治咳嗽喘急脇痛胸
雪利蔞周田
杏
錄各一甘五分
右入姜水煎服
按此方治肺火咳嗽要方也

二五 橘薷散 治傷寒咳嗽身熱有汗
右入姜煎服

三五 東垣加減三奇湯 治咳嗽上氣
右入姜煎服

喘促胸膈不利
田七匁 利 貴
雪 水各五分 玄四匁 杏三匁
童 蕗 參

四五 貝母湯 治久嗽
貝 玄 苓 永
田 桂各一匁 柴 蜜
右入姜煎服
按準繩云此方有寒有熱有收
有散諸嗽通用也

五五 人參清肺湯 治肺胃虛寒咳喘
并久勞嗽唾血腥臭
參 梅 桑 錄
利 雷 膠
甘 御 杏各等分

右入棗水煎入滓一匙澄清温服

按此方治胸膈痞滿咽塞腹脇脹滿迫塞短氣喜欲飲冷咽嗌隱痛凡勞倦傷脾咳而氣短無力者補中益氣湯方見內傷或六君子湯方見虛損隨証加減

論 ○痺 喘急 附乳哮 與痰門嗽可互考

太抵哮以聲響名喘以氣息言夫喘促喉中如水鷄聲者謂之哮氣促而連屬不能以息者謂之喘

脉 脉沈肺脹停水氣逆奠胸脉必伏取沈而實滑身温易愈身冷脉浮大濇難愈又云脉滑而手足温者生脉沈濇而四肢寒者死

六五 神秘湯 治上氣喘急不得臥

貴 利 水 各等分
玄 參

右入姜水煎服

按此方病人不得眠眠則喘者水氣逆行上乘于肺得水而浮使氣不流通其脉沈大宜此治之○一方去利水玄參加苓姜棗

七五 定脉湯 治上氣喘嗽

奴 貴 多 玄 宇 茸 水 各等分
雪 杏

右入姜水煎服

八五 清肺湯 治火喘

苓一 越 洞 雪 貴 苓
杏 水 門 貝 各八分 泉 辰 各五分

右入姜水煎入竹瀝服

按此方治久嗽不止成勞怯若久嗽聲啞或咳生瘡者

九五 瓜蔞枳實湯 治痰喘見二十痰門

瓜蔞實一枚 枳實三分 苓 桂各六分 水 雪各六斤 煎八分 去滓 分二服

十六 加味四君子湯 治氣短

參 朮 茯苓各等分 甘草減半 右入姜棗水煎服

十七 理中湯 治寒喘

砂 永 水 朴 桂 貴 甘各一兩 泉 蜜各五分

右水煎服○若脉沈細手足冷加附

按此方治四肢逆冷

二六 蘇子降氣湯 方見二十氣門 治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅盛喘促短氣咳嗽

○本方加苓細苓利名大降氣湯凡吼喘証用二陳湯加蒼苓

○雜

夫嘈雜者是痰因火動其証似飢不飢似痛非痛如有懊憹不自寧之狀者是也脉右寸關脉緊而滑○兩寸弦滑胸中有留飲○寸脉橫者膈上有橫積也○右關弦急甚者木乘土位欲作胃反難治

二六 化痰清火湯 治嘈雜有痰因火動者

星 守 貴 連 苓 丹 雷 羔 蒼 伽 苓各等分 甘草減半

右入姜水煎

四六 二陳湯 治痰火而饋

本方加丹連茹各三斤仰酸辰梅東姜瀝水煎服 方見于痰門

五六 當歸補血湯 治心中血少而饋

兼治驚悸怔忡

斤芍藥 甘草 門冬各八分 丹參 貴各八分 辰三分 梅一个炒米百粒棗二枚 右水煎

六六 香砂平胃散 治食欝而饋 ○本

方加炒連丹芍辰芍去奴婆 方見于食欝門

七六 消食清欝湯 治欝雜悶乱惡心發熱頭痛

貴守芩 曲 查 涉 芍 芽 奴丹 連炒 蒼 婆 各等分 右入姜水煎服

○嘔吐 附呑酸 噯氣 呃逆

東垣曰夫嘔吐噦三者屬於胃胃者陽明也多血多氣故有聲有物氣血俱病也吐者太陽也多血少氣故有物無聲血病也噦者少陽也多氣少血故有聲無物氣病也○河澗曰胃腑熱甚則爲嘔火氣炎上之象也○噯氣者噯而胸膈之氣上升也○内經名噫氣俗作噯氣○呃逆發呃者氣逆上衝而作聲也一名欬逆 脈 嘔吐無他

寸緊滑數微數血虛罹浮胃薄乳
則有痰最忌濇弱○吞酸脉多弦
而滑或沈而遲胸有寒飲或數而
洪膈有痰熱○呃逆脉浮緩乃宜
弦急必死結代促微皆奴

六八 青礞痰湯 治噎氣吞酸乃胃中有熱膈上有痰令人嘔吐清水等症

陳　守　苓
芎　莎　砂
甘　右入姜煎服

六九 保中湯 治嘔吐不止飲食不下按治吞酸之主方也

藿　佩各一匁　貴　田　苓各八分
連　苓　丹各一匁　砂三分　甘二分

右入姜水煎服按此方治嘔吐虛熱者宜之

十七 理中湯 治胃寒嘔吐清水冷涎

參　苓　佩　貴　永　藿　砂
喬　田　桂各等分　右入姜梅水煎服

一七 加味二陳湯 治痰火嘔吐

貴　守　苓
茹　砂　丹　門　各等分
右入梅一个姜三片棗二枚水煎

二七 藿香正氣散 方見傷寒

三七 香砂平胃散 方見傷寒

二二方共治傷食嘔吐之主方也

四七 加味六君子湯 治久病胃虛嘔吐

參　佩　苓　苡　殭　斤各一枝

藿 砂 各五分 茯苓 三分
梅一个 炒米 百粒 右入姜棗水煎
按此方治久病嘔吐者胃虛不
納穀

七五 白术湯 治胃中虛損及有痰而吐者
田五麦 伽藍二麦 洗二麦 蜜 茅各一麦
苓二麦 右入姜水煎

六七 治吐清水方
蒼 苓 液 各等分 右水煎

七七 清膈二陳湯 治酸水刺心及吞
酸饐雜
曲五麦 貴田 苓 連 丹各一麦
莎七分 蒼 芎 洞各八分 芍七分 茅三分
右入姜水煎

八七 逐腑湯 治脾胃不和中脘氣滯
胸膈滿悶噎塞不通噫氣吞酸脇
痛嘔逆痰涎飲水不下
蜜 多 洗 砂 奴 朴
田 童 貴 茅 虎 芒各等分
右入姜棗水煎食後服

九七 加減二陳湯 治痰飲爲患嘔吐
頭眩心悸或因食生冷硬物脾胃
不和時吐酸水
喬 半 田 貴各二 苓一麦 茅七分
右入姜水煎 半 半 半

八七 二陳湯 治噯氣胃中有火有痰者
本方加丹砂多蜜益洞連朴莎
方見于痰門

一八 理中湯 治噯氣有胃寒者○本
方加蜜茴益朴莎去參苓
○凡不因飲食常噯者虛也宜六
君子湯加泉朴子吳

二八 丁香柿蒂湯 胃口虛寒手足冷
脉沈細是寒呃也
丁香 柿蒂 良
薑 砂各一 蜜 泉 茴 藿 朴 砂各等
甘減半 乳爲末 右入姜水煎服○
寒極手足冷脉沈細加附永去良桂

三八 香砂和中湯 治食傷脾胃停痰
胸滿噯噎嘔吐
藿 砂各一 朴 貴 田 苓
右入姜水煎

○翻胃 與嘔吐同一治
論 夫膈噎翻胃之症皆由七情太
過而動五藏之火鬱蒸津液而痰
益盛脾胃漸衰飲食不得流行爲
膈爲噎爲翻胃也
脉 脉氣虛緩而無力○血虛脉數
而無力○痰寸關脉沈或伏而大
○氣滯結者寸關沈而濇○又曰
濇而小血不足○大而弱氣不足
○脉浮緩者生沈濇者死

四八 寬中湯 治七情四氣傷于脾胃
以致陰陽不和胸膈痞滿停痰氣逆
遂成五膈之病一切冷氣並皆治之
莎 朴各一双 童 陳 喬

砂各四 甘草五分 蜜三匁 多二匁

右爲末姜塩湯點服〇七氣沈滯飲食不下氣滿膨脹宜此湯按沿七情鬱結之方也〇好酒之老僧頭重胸膈痞滿不食開食則欲嘔數方不應加連葛煎服〇少女十一歲從六月初至七月下四腹痛時止時發今痛甚泣聲響隣五日絕穀大便結如咽有苦加枳芩芍煎服一貼而痛減三日而向食氣五日而大便通得安全〇女子十七八歲因氣惱而吐血心腹刺痛堅如石冷如氷雪經水四五箇月不通脉沈緊而數衆醫束手故予加蘇黍永煎服得奇効

五 順和湯 治嘔吐翻胃噦雜呑酸痞悶噫氣噎膈心腹刺痛惡心吐痰水陳塩 莎 丹各一 仰分 芩 守各七分 連 曲分 實五分 砂三 甘二分

右入姜長流水煎入澤瀉汁童便温服〇氣虚加参芪〇血虚加芍斤〇氣惱或氣不舒暢加麥蘗〇胸膈飽悶加蔔〇心下嘈雜醋心加吳倍連伽〇嘔吐不止加藿按順氣和中之劑善治胸痛退上氣滞食積殊以主胸中有湿熱欝痰而煩悶嘔吐或嘈雜呑酸者也

○飲酒之人食油膩物腹痛吐瀉不止去實加藿香水得奇効○夏月胸痛吐血是氣惱之人故倍遠加參而安○小兒七八歲因咳而面赤痰如線而不絕此湯二三貼而愈○一婦人送于大而面赤胸塞洒淅寒熱時妄語有乾嘔加柴芩而如故○常飲酒從去秋吃逆至今春不止且胸痛痰支不食惡寒今驚水數不遍而迎予言酒毒而此湯三四貼得太驗其後依躰倦去實加參而愈○瘧間日發不食口苦乾嘔熱多寒少他療不効加柴芩珍桂二貼而落○

七十餘歲尼飲食俱以卒吐甚胸痛脈沈細加喬麥而得安全

當歸養血湯 治年老之人陰血枯槁痰火氣結升而不降飲食不下者是乃成膈噎之病也

斤芍藥一貝母一 薑實各一錢 陳莎草 芎藭各七分 連黑炒八分 沉香五分

右人參棗水煎竹瀝磨沈香調服

按老人痰支形瘦皮膚燥痒無食味大便二三日不行者血虚也此方加減而專可用也若雖壯年而有此證胸痛者膈噎之先兆也亦加減而得奇効

生津補血湯 治年少之人有患膈噎

者胃脘血燥不潤故便閉塞而食不下

斤芍　芎　各一錢　實　陳　連　軾　貝　各七分　砂　沈　各五分

右入姜棗水煎竹瀝磨沈香同服

按年少之腹證胸支痛不食食則嘔噦而水飲不入大便結是皆生於陰血虛與此湯間有奇殊老人亦可○一人胸痛痰嗽不食大便結故與滋陰降火湯不効是以與此湯則能退痰除虛熱得奇効○一老僧不食只美湯茶而熟先與香葛湯順和散大半愈然未退故用此湯而全安胃虛吐食而不納

砂仁五分　伽　罌

