



司南象方規





衆方規矩刪補卷之下

逍遙散

一

①治血虛勞倦五心煩熱肢體
痛頭目昏重心忪煩赤口燥咽
乾發熱盜汗減食嗜臥寒熱如
瘧陰虛勞嗽肌體羸瘦漸成骨
蒸

斤芍苓伽柴 各一
匁

甘半
匁

右入姜煎服○五心煩熱加門

蘇○經閉加嬰紅○腹痛加索

○胸熱加連丹○氣惱膈痞悶

東坡先生用附錄



加實童液 ○手擅掉加甚新苛

○咳嗽加會莖 ○吐痰加守貝

○飲食不消加查曲 ○發渴

加門瑞 ○心慌心跳加酸遠

久瀉加水 ○遍身痛加芸羌

芍 ○吐血加膠蚌牡 ○自汗加

芪酸 ○左腹血塊加稜莪嬰紅

○右腹氣塊加密棋 ○血虛煩

熱月水不調臍腹脹痛痰嗽潮

熱加苛 以雷錄或加苓 ○心煩

加門玲 ○嗽加梅欬會 ○產後

血虛煩熱加苓 ○婦人患癩疾

歌唱無時踰垣上屋乃榮血迷

於心絕所致加嬰遠紅方地

味逍遙散 ○若有熱者合小柴胡湯

加地辰 ○氣血兩虛無汗潮熱

加苛 ○子午潮熱加苓胡連門

錄凡通車灯 名加味 ○婦人肝

脾血虛發熱潮熱或自汗盜汗

或頭痛目澁或怔忡不寧頰赤

口乾或月經不調或肚腹作痛

或小腹重墜水道澁痛或腫痛

出膿肉熱作渴加煨姜 片苛

煎服 ○加牡丹名加味逍遙散

按宜虛勞熱嗽有汗者兼以

男子五心煩熱體瘦骨蒸婦

人癩狂月經不調照加救間

治之○十八歲婦初產過二

七日後面赤肌體發熱心跳

不食頃刻睡俄驚聲戰兩手

差上檀掉每夜十四五度許

他醫束手於是加籛陳德酸

而安其後右手腿痺痛加蒼

桔矮瓜差冷而全愈○壯婦

怯弱瘧發間日數方不應於

是詳問則久月信不來有盜

汗故加籛丹壯得奇妙○產

後寒熱往來若此方不應則

與四君子湯間得奇効寔陽

生而陰長是也

△薛立齋曰此方治肝脾血虛發

熱或潮熱晡熱自汗盜汗或頭痛

目澁怔忡不寧或頰赤口乾或月

經不調肚腹作痛或小使重墜水

道澀痛或腫痛出膿肉熱作渴等

症○友秋子經驗治以血目暗口

苦咽痛或耳鳴重聽或便毒血痢

或下疳不斂或兩膝痠痛足膝無

力或血虛久瘰肥氣發熱婦人氣

鬱多怒發狂等症屬肝脾一經血

虛者隨引用以淡煎服一日用

良方病人亦得道造藥而自適

矣

△趙養葵治五鬱法其言曰：東方先生木者，生肝之氣，即火氣空中之火，附於木中，木鬱則火鬱於木中矣。火鬱則土自鬱，土鬱則金亦鬱，金鬱則水亦鬱，五行相以曰然之理。予以一方治其木鬱而諸鬱皆因而愈。方中柴胡薄荷，一味尤妙。蓋人身之膽，乃甲木以陽之氣，氣尚柔嫩，象剛穿地始出而未伸，此時如被寒風一鬱，則其軟抑遏而不能上伸，不伸則下射脾土，而金水併病矣。唯得溫風一吹，鬱氣即暢達。蓋木喜溫風，風搖則舒暢，柴胡薄荷辛而溫者也。辛能散，故能發散溫鬱，故入以陽。古人立方，其妙如此。其甚者加黃連、吳茱萸，一服之後，繼用六味地黃加柴

胡芍藥服之，以滋腎水。脾水能生木，逍遙散者，風以舒之，地黃飲者，雨以潤之。木在不得其天者乎？此法三宜，水火之鬱既舒，而木不下射脾土，且土亦滋潤，無燥熯之病。金水自相生，予謂一法可通五法者，如此。

學者欲參全言宜看醫貴
古方逍遙散 即本方加陳皮薄荷茯苓易茯苓

△李中梓曰：藏血者肝也。一有拂逆，則將軍之官謀慮不決，而血海為之動搖。經曰：暴怒傷陰，散為血虛。此症婦人尤甚。此方以白朮茯苓固其脾，恐木旺則上衰，經行則痛不治已病，治未病之法。用苦急急食甘以緩之，故用枳朮以苦散之，故用當歸以酸瀉之，以用芍藥、柴胡氣涼散其怒火，出梔、橘其下行丹皮和血通經，所以導血中

之氣而無雍塞之虞由是而察其
平肝補血之法所謂旋而云矣

吳山甫曰大怒逆氣傷肝肝傷則
必血目暗宜此加味道遠散主之

方見

附方

加味道遠散

茯苓易茯苓 加山梔丹皮

當歸飲治勞心生熱真少見血五
心煩熱

去茯苓白朮生薑 加小芎黃

連麥門冬生地黃牡丹皮地骨
皮梔子枯苓

牡丹皮湯治室女經閉咳嗽發熱

去白朮 加牡丹皮生地黃陳
皮香附黃芩

白朮和中湯下利白多用藥下後
未愈者用此和之

去柴胡生薑 加陳皮黃芩黃

連木香

黃芪散治婦人熱勞羸瘦四肢煩

疼心躁口乾不欲飲食
去白朮 加入參黃芩黃芪地

骨皮麥門冬生地黃

鼈甲地黃湯治熱勞煩心怔忡悸
悶婦人血室有乾血身羸瘦

不為肌肉

去芍藥 加麥門冬鼈甲石解

熟地黃秦朮人參肉桂

麥煎散治以男室女骨蒸婦人血

風攻症四肢心胸煩壅

去芍藥 加小麥乾漆鼈甲常

山人黃石膏牛乾地黃

人參散治邪熱客於經絡肌熱瘰

嗽五心煩躁頭目昏痛有盜

汗四肢倦怠婦人虛勞骨蒸尤

宜服之

加入參半夏葛根

補脾瀉肝湯治肝氣有餘面青善

怒脾血不足肢倦體瘦等症

加入參青皮

升陽散火湯治撮空尋衣驚悸

言昏沉詳見陶節庵殺車髓

茯苓易茯苓 加入參麥門黃

苓陳皮

參胡二白湯治霍亂吐瀉止後發

熱頭眩身痛口乾脈數

去升姜 加入參烏梅陳皮麥

門冬山梔子五味子棗肉燈心

人參清肌散治男婦氣虛無汗潮

熱

加入參半夏葛粉大棗煎服

柴胡抑肝湯

二

治寡居獨陰無陽色慾心崩

而多不遂是以惡寒發熱全類

癰者

柴 赤芍 各二 童 壯 一 匁

蒼 蒨 丹 錄 甘 各 一 匁

曲 芎 翹 地 各 五 分

右煎服

按寡婦寒熱往來似癰或瘰

瘰時赤時青五心煩熱如勞

瘵間與此湯而安此症尼僧

並宮女多

△陳良甫曰倉公傳與褚氏論皆云師尼寡婦獨陰無陽慾心萌而不遂是以懶職成病以致乍寒乍熱而類瘧狀久則為勞又有經閉白淫痰通頭風膈氣穴悶面黧瘦瘠皆寡婦之病肝脉弦出寸口而上魚際皆血盛而致云○友松子曰前症兼氣道鬱悶者或膏梁厚味者並用此方若兼痰症當加生夏若無兼症獨肝脉弦出魚際發寒熱者當用許叔微生肌散丸以抑陰若兼虛症者當考薛立齋法

附方

生地黄丸許學士云有一師尼惡風體倦乍寒乍熱面赤心煩大小柴胡湯雜進其病益劇予診視之二部脉無寒邪但肝脉弦長而上魚際服此丸而愈

柴胡 秦艽 各半 生地黄 亦

芍藥 各二 右蜜丸 桐子大 每二

十九丸 烏梅 爲下

○按薛立齋曰前症若肝脉弦出魚際用生肌黃丸血虛佐以四物湯若兼怒動肝火而寒熱佐以加味逍遙散若虧損肝經而寒熱佐以八珍湯若虧損元氣而寒熱佐以補中益氣湯若鬱傷脾氣而寒熱佐以濟生歸脾湯此寡婦寒熱如瘧症候不可不子細下藥按詳及之

溫膽湯

三

①治心虛膽怯觸事易驚夜夢

不祥異像致心驚氣鬱生痰涎

或短氣悸之自汗飲食無味或

傷寒一切病後虛煩多汗眠臥

守 陳 苓 實 各一分 鉅 一分

甘 五分

石入姜棗煎服

一方 治膽虛痰熱驚悸不眠

去苓加姜 四煎服

一方 驚悸屬痰火而兼氣虛者宜清痰火以補虛也 治

痰火而驚惕不眠

參 伽 禪 地 酸 沂

門 守 寶 鏈 鉅 丹

各等分 辰 五分 甘 二分

石入姜 棗 梅 瀝煎調辰

末而服

△華陽軒曰夫思慮千萬心為之勞事情不決膽為之憊以致觸事易驚夜夢不祥不得眠臥等症則歸脾湯苟當若夫痰客中焦而防碍升降則以陰不降以陽不升心為之勞膽為之憊却其痰則以陰降以陽升而心膽調和而已按此論與聖惠方同出一口學者欲治不寐之症留心於此一方則變法有所出矣

△按溫膽湯變法極多畧記一二以助用藥之式 ○一方加炒酸棗仁干姜 ○一方加遠志炒酸棗仁

地黃玄參○**一方**加麥門人參柴胡桔梗治心膽虛怯觸事易驚○

一方加遠志酸棗仁五味子人參地黃去竹筴治疰同上兼治四肢浮腫飲食無味心虛胸悶坐臥不安○**一方**加蓮肉酸棗仁以金銀煎治驚悸以眠多異夢隨即驚覺者○**一方**加入參石膏麥冬酸棗仁龍眼

△友松子曰諸家醫書載溫膽湯治大病後虛煩不得眠或心虛膽怯觸事易驚等症良由氣鬱生涎涎與氣搏變生前疰或原有痰飲之人致前疰者服之効或心虛而煩膽虛而不眠用之無効大法虛人患前疰者宜王六珍加麥門酸棗仁竹葉或遠志茯神辰砂菴選而充之

附方

溫膽湯同名方六道見前

加味溫膽湯治傷寒日數過多其熱不退夢寐不寧心驚恍惚煩燥多痰不眠者

本方加柴胡香附人參黃連

驚悸溫膽湯治痰火而驚陽不眠

去陳皮茯苓加入參白朮茯

神當歸生地黃酸棗仁麥門冬

黃連山梔子辰砂烏梅

高枕無憂散治心膽虛怯晝夜不

睡

去姜棗加麥門冬龍眼肉石

膏人參

千金半身補心湯治心虛寒心中

脹滿悲憂或夢山丘平澤者

去竹筴甘柳加宿薑共心白

朮防風遠志

千金溫膽湯治人病後虛煩不得

眠此膽寒故也宜服此方

半夏竹茹枳實橘皮生薑甘

石麥阻煎服加酸棗仁

十味溫膽湯治心膽虛怯觸事易

驚或夢寐不祥遂致心驚膽怯

氣鬱生涎涎與氣搏變生諸證

或短氣悸乏或復白汗兼治四

肢浮腫飲食無味心虛煩悶坐

臥不安

去竹茹加酸棗仁遠志五味

子熟地黃人參

附

加味溫膽湯

治病後虛煩不得睡臥及心膽

虛怯觸事易驚短氣悸乏

守一二分 陳一分 苒二分 實各一分

苓各一分 甘一分 遠一分 玄一分 參一分

芡一分 酸各一分

右入姜棗煎服

按病後虛煩不眠者選先方

得數奇○一人與王君為口

論閉戶一年餘心熱煩滿痰

火心攻腹脹嘔逆夜不能寢

他醫皆言陰虛火動而治不

應予謂氣鬱生痰而然加味

溫膽湯加連而安○姪婦心

驚煩悶不眠溫膽湯加參門

柴而安

分氣補心湯

四

治心氣鬱結而四肢浮腫上氣喘急

腹炒 苳 苓 桔 各一 通

芎 西 童 枳 甘 各七 分半

細 蜜 各五 分

右入姜棗煎服

按王氣鬱腫脹之方也○咳甚而頭痛面自四肢浮腫

脹加桑而安

人身以為王者氣也蓋陽往則陰來陰往則陽來一升一降無有窮已苟外不傷於六淫內不傷於七情其為氣也何病之有今日心氣鬱結因有所思慮繫心不散使氣停留不行而鬱結不舒日久則金受火邪之上炎則右升而無降致上氣喘急金既失令則不能通調水道致身體四肢浮腫者此方主之○又曰因氣而腫者其脈沉伏或腹脹或喘急其人正氣未虛者此方加陳皮乃潔古之遺意也

附方

上下分消導氣湯常患氣喘之人可服甚效

本方去天腹皮前胡細辛木香

加黃連半夏瓜蒌桑白皮厚朴
澤瀉枳椇麥芽

分消湯 五

凡水腫者宜健脾去濕利水
十味等分
而名實脾飲
治中滿成鼓脹兼

治脾虛發腫滿飽悶

蒼 伽 苓 陳 朴 實

各一 薤 猪 澤 腹 各八
及 分

砂 蜜 二分
分 另

右入姜燈前岐○氣急加沉○

腫脹加苟○脇痛面黑是氣鼓

去柳加董○脇滿小腹脹痛身

上右血絲縷是血鼓去柳苓加

斤芍紅壯○噎氣作酸飽悶腹

脹是食鼓去朮苓加查曲芽葡

○惡寒手足厥冷瀉去清水是

水脹加宮○胸腹脹滿有塊如

鼓者是痞散成鼓去伽苓猪澤

加查曲守童近索蠶○是已下
皆水腫

加 氣急去伽加軾葶桑○發熱

去蕪加丹連○泄瀉去枳加芍

○小便不通去朮加通滑○飲

食停滯去加加查曲○惡寒手

足厥冷脉沉細加官少腰以上

腫加薑○腰以下腫去加加膝

栝○胸腹腫脹飽悶去加加葛

按水腫脹滿之王方也以平

胃和脾胃以四苓通小便以

實腹消腫脹以淡礪除食後

之飽悶以蚤運氣若氣下陷

加升柴朝急屬氣虛加參暮

急屬血虛加連斤芍芍友松

此方治因飲食所傷而腫或

胸滿或變氣或泄下者用之

如鼓應桴或不服水土而腫

者加藿香開亦得前若氣虛

血虛而腫滿於此方中雖加

人參芍歸豈能濟事學者臨

病附量朝暮急者氣血俱虛

斯可宜雙補之猶因加減有數奇

○小兒面目周身浮腫此方

一二貼而如故

△王字泰曰偏身腫不煩渴大便

自調或溇泄小便雖以而不赤澁

此屬陰水宜實脾飲若病後浮腫

此係脾虛宜六君子湯公減若脾

肺虛弱不能通調水道者宜補中

益氣湯補脾肺六味丸補腎丸補

附濟生實脾飲 朴 朮 瓜

姜各一果 枳 附 苓 甘

各半 姜棗

東垣曰傷酒濕麵及厚味之物膏

梁之人或食已便臥使濕熱之氣不得施化致令腹脹滿此脹是熱脹分消丸主之

中滿分消丸 治中滿熱脹鼓脹氣脹水脹此非寒脹也

即分消湯無蒼朮香附剉仁石人參半夏芩連知母薑黃甘艸浸蒸餅為丸服

附方

寶腸散 治泄瀉不止

本方主白朮和實香附猪苓澤瀉大腹皮 加肉果訶子甘艸

消腫調脾順氣湯 治水腫消脹滿順氣和脾除濕利水元氣虛人不宜

去白朮茯苓燈艸 加艸果沉香檳榔桔梗二稜莪朮官桂木茴香木通人參木瓜桑白皮大

黃甘艸牽牛

補中治濕 六

① **朝寬暮急血虛暮寬朝急氣**

虛朝暮急氣血俱虛 按此丹日溪論腫脹屬

氣分血分之大法也 **治腫脹大法宜補中**

行濕利小便以參朮為君蒼陳

苓為臣芩門為使以制肝木以

加朮以消腹脹氣不運加蜜翁

氣下陷加升柴提之血虛加補

血藥痰盛加利痰藥隨證加減

用之無不効者

參 伽各一分 精 苓 陳

門 斤 通各九分 苓 淡

升各三分

右煎服

按纂要正傳等有論無分兩

一溪叟發開而去其木柴加

斤著分兩以治脾胃虛感濕

為腫脹今世醫以是治腫脹

而不効矣愚能治之蓋有旨

哉友松子曰此藥乃盧巖夫丹溪纂要之法一溪叟失

木香柴胡加當歸而著八分兩

以亦後來耳雖然因氣道不

通少陽之氣不升者木香柴

胡固不可無若朝暮急屬氣

血俱虛者當歸四物亦不可

缺其於分兩多寡唯知活法

者不妨 虛人病後腫脹或虛

症脚氣或產後腫脹皆能有

効近夏一女產後患腫脹且

每曉痰支咽驚醒衆工束手

愚謂血天下而血氣虛故此

湯二千餘貼而全愈批曰產後腫脹

多屬瘀血及以血豈此方皆

能有効耶設是虛症亦宜于

細丹溪纂要云產後必大補

氣血非十全大補之類以佐

以蒼朮茯苓等使水自降太剛

皮香附監之有熱當清肺金
麥門黃芩佐之所謂大補者
非指木通厚朴蒼朮茯苓
苓麥門黃芩等藥也

△按此方治病脹脾胃虛者雖有
大小便不利之證乃氣不運血不
潤故也當大補氣血為王慎不可
用下藥太抵以此方增損若下元
虛寒而脹者宜孫氏壯陽湯見赤
水玄
珠若穀脹水脹則又求本而施法
豈此方能盡哉

附方

行濕補氣養血湯治氣血虛弱單
腹鼓脹浮腫

本方去蒼朮麥門冬黃芩升麻
加川芎芍藥蘇梗大腹皮蘿蔔
子海金沙木香甘脚姜棗

補氣健中湯治鼓脹元氣脾胃虛
損宜補中行濕利小便切不可

下屬虛弱者宜服
去當歸木通升麻 加澤瀉

赤小豆湯 七

①治年以血熱遂生瘡疥變為
腫滿或煩或渴

赤豆炒 斤 商澤炒 翹炒

赤芍 離炒 猪各等 桑分

右入姜煎食遠服○熱其加犀
○一方有澤漆

按治血熱腫滿之主方也○

當世之小瘡多生手足至遍體太痒或痛故以熱湯洗之則變為腫滿喘呼氣急煩悶小水赤澁或天府結燥加腹陳苓姜羌若大便結加枳其得効難勝計○產後遍身浮腫喘嗽氣急小便澁以去翹加芎腹陳苓姜七八貼而愈批曰產後遍身浮腫壯盛婦人屬血熱或血鬱者用之可也若屬瘀血用此加減無益於事宜用小調經散若氣血虛者當有別藥○或語云產後有此症加犀而安

△李南豐曰此方治血氣俱熱遂生瘡疥變成腫滿或生煩渴若乾澹洗浴水氣入腹而發腫者敗毒散發汗○按仲景法諸水者腰以下腫當利小便腰以上腫當發汗乃愈後世治水用敗毒散赤小豆湯五皮散分消湯等方乃開鬼門潔淨府同用也然而不辨高低內外輕重表裡虛實補瀉渾用通便之方吾知難成全功矣

△按患生瘡用乾瘡藥不早致偏身腫宜消風敗毒散若大便不通升麻和氣飲若大便如常或自利當導其氣自小便出宜五皮飲和生料五苓散腹若腫只在下宜除濕湯和生料五苓散加木瓜如澤瀉之數已上數條為有餘之證也學之者不可拘泥一隅故詳及之

五皮湯 八

①治風濕客於肌經氣血凝滯以致面目虛浮四肢腫滿心腹膨脹上氣促急

膠皮 苓皮 姜皮 五加

地骨

右煎服○一方去五加地骨用

陳桑

按治風濕腫滿之方也○熱病後俄面目四肢浮腫短氣喘促用七味而頓愈

△東垣曰孫真人療膚革腫以五

皮散乃述類象形之故也

華陀五皮散有陳皮桑白皮無五加地骨○方考治腰以下腫加薑黃木瓜○寶鑑治脚腫加木瓜防已不服水土而腫合胃苓湯○指掌治水氣上氣喘急加蘇子蘆子萊菔子香附子車前子○辯疑加桑皮青皮木通蒼朮白朮猪苓澤瀉治因病後服藥過度而腫者如氣脹加木香不食飲食加砂仁麥芽心下痞滿加檳榔青皮○準繩四肢腫謂之肢腫此方加姜黃木瓜○心法治陽水遍身腫煩渴小便澀大便秘者用之○入門治妊娠子氣用華陀方○更有五皮十皮湯分氣紫蘇飲乃此方變法也

附方

加味五皮湯治小兒四肢腫滿陽

水陰水皆可服又見于前

本方加姜黃木瓜

五子十皮湯治一切蠱脹并氣虛中滿單腹脹此方治脹專攻之劑也

本方加紫蘇子兒絲子大腹子車前子葶藶子瞿麥皮木瓜皮牡丹皮木通皮甘咖啡

加減五皮散治他病愈後或癰癩後身體面目四肢浮腫小便不利脉虛大

去五加皮地骨皮 加陳皮桑白皮

十六味流氣飲 九

①治無名惡瘡癰疽或爛岩

斤 芎 芎 芷 桂 參 芪 蜜 麩 朴 枳 椴 蘇 芸 桔 甘

右煎服○乳岩加童○痘後餘毒氣流於陰陽脾經則癰發四肢手腕並膝膈而腫痛宜此方若氣血虛而自利加附大便實加虎

按此方善消無名腫毒○肩頸或手足凸腫其色赤腫經

一三二年而黃汁不膿世俗謂之氣腫此湯王之橫壞出膿血謂之血
腫○乳房中石如小石物而痛名乳核或作爛岩而出膿血甚痛加童時時有大驗○
一人患癰癰寒熱往來與此湯而安○一人右目下有結核押之則白膿出皆與鼻與此湯二箇月而愈○壽法印云婦人乳房腫痛大寒戰慄世俗謂之乳風此方有數功

△陳實功曰此方治流注及一切鬱怒凝滯氣血作腫疼痛或胸膈痞悶或風寒濕毒搏於經絡結成腫塊者服之

△丹溪曰此方乃表裡氣血藥也復以疎風助陽之藥參入非麻之沉遲緊細洪緩者不宜用諸書往往不分經絡脈症不俱時宜但云消毒化毒又云不退加補氣血藥使人不能無疑也

△徐春甫曰氣血凝滯多因榮衛之氣弱不能運散豈可復用流氣飲以益其虛管見以流氣飲治結腫之症以致取敗者多矣又云流氣飲耗血藥也果氣結胸滿只宜一二服多則血及致敗雖有芍歸亦難倚仗丹溪曰結腫不係膏梁丹毒之變因虛勞氣鬱所致也

公友松子曰近來醫家凡看頸項
胸乳腋臂腫塊結核多不言其初
發腫塊腫而不潰潰而不斂斂而
不收等候亦不言其經絡及病人
虛實便用流氣飲以圖得效豈理
也哉嘗閱張李朱徐薛陳諸公治
癰疽案亦未嘗王此方凡此症多
生于體虛之人勤勞之輩又或惱
怒傷肝鬱結傷脾榮氣不從逆于
肉裡或榮血凝滯而成者多矣豈
一流氣飲而盡其能哉司命者其
可不精思乎金溪龔廷賢亦云癰
癧不繫膏梁丹石之變因虛勞氣
鬱所致宜補形氣調經脈則夫成
者自消已成者自潰若不詳經絡
氣血多少脈証受病之異卒用流
氣飲及牽牛班貓則血氣已損而
實實虛虛之禍如指諸掌當以益

氣養榮湯主之云詳見醫鑑之八

因俗醫治癰疔用流氣飲故細及
之以勸其進益云

附方

加減流氣飲治氣攻肩背脇肋走

注疼痛及痞脹嘔喘氣閉浮腫

腳氣

乃去白芷桂人參厚朴大腹子

加青皮陳皮茯苓半夏紫蘇子

姜棗

方脈流氣飲子治二焦氣壅五臟

不和胸膈痞滿肩背攻痛嘔吐

氣喘痰盛浮腫

去白芷官桂人參厚朴 加青

皮陳皮茯苓半夏枳實大腹皮

姜棗

木香流氣飲 十

①治憂思太過諸氣痞塞怔忡
鬱積脚氣風濕聚結腫痛喘滿
脹急或肩背腹脇刺痛嘔吐不
食胸膈膨脹面目虛浮四肢腫
滿口苦咽乾大便閉小便澀

陳一兩 朴 童 蘇 蒞

甘各八分 通四 桂 腹 菘

丁香皮 枳 菓 門 蜜

瓜各二 薤 芷各二 參 伽

瓜 守 赤苓 菖各一

右入姜棗煎服○去薑熱加沉

枳虎名二十四味流氣飲治腹

中氣滯痞悶不快胸膈走痛者

蠱腫加多○頭面腫加葱○肚

腹腫加實○臍至脚腫加桑○

腫滿加丑○厥聾右眩暈本方

加薑姜葱

按治氣鬱腫滿初起必水腫

右積聚或水腫脹滿一便不

通或肩背胸脇為注痛或腹

脹不食喘急咳嗽而後為水

腫一便共澀或脚氣有如術

或胸膈痞悶怔忡而腹脹或

氣逆上而耳聾眩暈皆此方

王之也他家專積聚用之○

氣滯腰痛不可轉側服之立

効

△陳實功曰此方治流注癭癧及鬱結為腫或血氣凝滯遍身走注作痛等症

△徐春甫曰氣滯者滯於胸膈則脹滿滯於手足則浮腫滯於腰間則墜痛用流氣飲子浮腫加赤苓枳實又治二焦氣壅五臟不和胸膈痞悶肩背攻痛云云

△劉宗厚曰此太陽例熱然類以香燥非寒者氣實者不可用

△友松子曰局方用此治憂思太過諸氣痞塞變成積聚或成水腫脹滿一便不通等症若氣虛血耗脾胃虛弱泄瀉等症雖有積聚決不可餌唯當以良品緩緩圖之累古所謂養正積自除矣此方不過集諸辛香之品流動其滯氣而氣壅斯散解耳

△友松子曰諸家述方書者多修此方大抵不過調諸氣利二焦行痞滯消腫脹而耳如劉氏所評非寒者氣實者不可用也又如丹溪云冷氣滯氣逆氣皆是肺受火邪氣得炎上之化有升無降薰蒸清道甚而轉成劇病局方類用辛香燥熱之劑以火濟火咎將誰執氣無補法世俗之言也以其為痞悶壅塞似難於補不思正氣虛者不能運行邪滯着而不出所以為病苟或氣怯不用補法氣何由行此

千古之確言也。經謂壯者氣行則愈怯者着而成病。故破滯氣消脹滿不補其正氣而行消導獲生者我不敢信也。如三因七氣湯用人參半夏肉桂甘艸治七情鬱結心腹絞痛或為膨脹用人參以壯主氣之臟官桂以制謀慮之官半夏以行其滯氣久鬱不和因老為之調停乃藥性溫和譬如陽春至而閉塞通鬱結者還而為和暢矣。用治氣宜悉諸。

木香調氣散 十一

①治氣鬱其症腹脇脹滿刺痛不舒脉沉。

矮 莎 枳 童 朴 陳

芎 蒼 各一 蜜 另 砂 各五 官

甘 各三 分

石入姜煎磨木香服

按治男婦因氣鬱而胸痛胸塞氣下陷疑衍不快也若有胸痛者先可用此湯有數奇効也

△友松子曰丹溪云因車氣鬱而不舒伸而痛者木香以調達之氣素壯而氣刺痛用烏藥枳殼氣鬱用香附蒼朮撫芎氣在左而痛者屬肝所以有青皮官桂氣在右

而痛者食滯所以有平胃砂仁用一二服痛止則止藥恐傷真氣氣實者可服○氣在胃脘而痛者多是痰宜加半夏茯苓○若痛甚者再加一二種芳藥以行之沉香鬱金茴香之屬

附方

十八味丁沉透膈湯治脾胃不和中寒上氣脇肋脹滿心腹疔痛痰逆惡心或時嘔吐飲食減以十膈五噎痞塞不通噫氣吞酸口苦失味並皆主之

本方去烏藥枳殼川芎蒼朮桂加肉豆蔻麥芽白豆蔻丁香白朮人參藿香沉香神麴半夏川葉

開膈順氣丸治男婦七情憂鬱胸膈痞悶肚腹脹痛痞塊疼痛不思飲食

去川芎木香縮砂桂加莪朮

白豆散治七氣所傷滯於胸膈窒塞咽喉脹痛噫氣吞酸不能飲食

去烏藥枳殼川芎蒼朮加白豆蔻萹澄茄丁香

楊氏二香正氣散治嘔吐清水胸膈壅滯心下堅痞厥氣刺痛去枳殼青皮川芎蒼朮桂加丁香益智仁蓬莪朮乾姜

廣朮潰堅湯

十三

①治中滿腹脹內有積塊如石

形如盤大堅臥不安一便澀滯

上氣喘促通身虛腫

守七分 朴 斤 漏サカ 苓 益マシ

連各五分 柴 童 陳 曲

澤各二分 甘各二分 莪各二分 升 紅

吳各二分

右入姜煎服○渴加葛分四

按用有積塊而生腫脹者矣
殊此湯用熱脹而可也若冷

脹當用太七氣湯

△東垣稱廣茂潰堅湯服此藥忌
酒醋濕麪服一服之後中滿愈
半其有積不消再服半夏厚朴湯

方見一服之後前症又減半却
於潰堅湯加減服之

○批曰用古方則宜委悉立方之
旨何後世述方書多修廣茂潰
堅湯而不及半夏厚朴湯猶獨
脚行步焉能致遠

附方

半夏厚朴湯

本方去益智菘朮 加蘇木木
香乾生姜肉桂蒼朮茯苓三稜
朱苓桃仁昆布

木香順氣湯治濁氣在上則生腫
脹

去黃連神曲甘呷菘朮紅花

加木香茯苓乾生薑蒼朮白朮

中滿分消湯

治中滿寒脹寒疝太
小便不通四肢厥冷食入反出
下虛中滿腹中寒心下痞躁寒

厥奔豚不收並治之

去黃芩陳皮神麴莪朮紅花

加木香茯苓人參川烏乾姜蕪

澄茄黃芪黃柏麻黃

中滿分消丸治中滿熱脹鼓脹氣

脹水脹此非寒脹類

白朮人參炙甘草猪苓去黑姜

黃已上各白茯苓去乾生薑

仁已上各澤瀉橘皮已上各知

母已上各黃芩去腐炒夏用黃連

淨已上各湯洗已上厚朴

姜製已上枳實已上厚朴

一兩已上厚朴

右二十六味為細末蒸餅為丸

白湯食遠服

升陽補氣湯

十三

①治飲食不時飢飽勞役胃氣

不足脾氣下陷氣短無力不能

寒熱早飯後轉增昏悶顛要眠

睡怠惰四肢不快懶倦動作五

心煩熱

朴三分升三羌三搖三芸三藟三

澤一分甘各五分蚘七分柴七分

一奴二分

右入姜棗煎服○腹脹及窄狹

倍朴○腹硬加砂○按腹脹倍

厚朴乃東垣之法也東垣又曰腹脹滿氣

不轉者加厚朴以破滯氣腹中

奔悶此非腹脹滿乃散而不收
可加芍藥收之是知氣結而脹
宜厚朴散之氣散
而脹宜芍藥收之

按此方治食後頭痛必有寒

熱四肢怠惰氣不快欲睡眠

者是乃脾胃虛弱故也批曰脾胃

虛弱而食後頭痛怠惰欲睡
等症當用補中益氣調中益
氣加減可也學者不可以辭
害意宜審其法而施治則東
垣之堂何難陞之在

△友松子曰東垣製此方其理甚
好今于脾胃論中節其畧曰夫脾
胃虛則濕土之氣溜於下而不能
伸發食入則困倦精神不快而欲
睡也唯其胃陽之氣不能伸發
而成熱以致五心煩熱四肢沉困
怠惰短氣無力等症作矣法當于
陰分升騰陽氣次加寒水之藥降
其陰火使脾胃之氣復于中焦本
位則陰陽之氣平矣又曰如病去
勿再服以諸風之藥損人元氣而
益其病故也

附方

人參補陽湯治傷寒餘邪不故上
走空竅其病癰澁赤脹生翳羞
明頭腦骨痛

本方去厚朴升麻 加熟地黃
人參白朮茯苓黃芪當歸

東垣升麻補胃湯治胃氣下陷下
血不止

去厚朴澤瀉 加黃芪牡丹皮
熟地黃葛根當歸肉桂

疎風滋血湯治頸項強急動則微
痛脈弦而澹左為甚作血虛邪

客太陽陽明一經

去厚朴澤瀉 加當歸川芎紅

花牛膝白芷家葛桃仁

升麻防前湯治頸項強急寒熱往

來或嘔吐或脇痛先服小柴胡

湯後用此方

去厚朴澤瀉地黃 加黃芩牛

夏荆芥家葛川芎白芷

獨活散治風毒攻注齒斷腫痛

去厚朴柴胡 加川芎石膏荆

芥天麻乾葛細辛白芷黃芩薄

荷

五香湯 十四

①治毒氣入腹托裏若石異證

於內加減

喬モウ 蜜ミツ 沉チン 乳ニウ 麝ジヤク
各一兩

右煎空心服○若嘔去麝加藿

而○渴加參一兩○一方本方去

喬加藿翹各一兩 名小五香湯

△千金云治熱毒氣卒腫痛結作核或似癰癤而非使人頭痛寒熱氣急者數日不除殺入并以滓傳腫上

△東垣曰總錄聖惠千金外臺治諸瘡腫方中皆載此方大同小異太低專治毒氣入腹煩悶氣不通者其餘熱渴昏昧口燥咽乾大便硬小便澀者未可與服

△和劑謂升降諸氣宜利二焦疎

導壅滯發散邪熱治陰陽之氣滯
不消以致前症者

附方

五香蠲痛丸治冷物所傷脾胃遂

成癰氣胸膈痞塞心腹疼痛

本方去麝香加藿香青皮枳

殼桂心枳砂京三稜陳皮蓬莪

朮吳茱萸

一方有牽牛末

追毒五香丸治發背疔瘡

去麝香加沒藥血竭巴豆

附

五香連翹湯

①治一切惡瘡結核癰癤疔

惡毒

澆翹各二扁升寄無以

搖通乳各三青木

甘各一麝一

右煎空心服利下惡物為度

△外科精要無青木甘脚有沉香

丁香如不用五香名之味連翹湯

△天民曰治癰疽未成膿者服之

可散但當看時令及資稟加減用

之

△丹溪曰吾不知良甫之時有許

多太府祕堅病氣鬱塞耶若是頑

厚可以驟散而大下者亦當開陳

時之先後證之可也庶乎後人不

敢孟浪殺入

△按仁齋曰治癰疽惡瘡須用香

氣透達經絡曾孚曰夫癰疽瘡瘍

皆由氣滯血凝而起服香藥引氣

通血常器之日凡氣血聞香即行
聞臭即逆瘡瘍皆因氣滯而血聚
最忌臭穢不潔觸之毒必引蔓如
斯之言皆以香藥引氣通血而散
其壅滯耳此乃瘡瘍初發之時之
治論也至于內托斂口非參芪歸
朮則不能收功矣豈香竄之劑能
濟乎學者當察病機而處治則司
命之能事矣

附
加味五香湯 秘方

①治瘡癰無名腫毒專小兒用
之

泉 蜜 乳 喬 婆 升
葛 翹 各一 通 虎 各五
分

右煎服○小兒島包此湯拂出
熱湯而服

按大人小兒瘡毒入腹則托
裏之方也壽法印和五香加
連童甘而常與小兒即盛脾
胃止吐逆清心火治蟲積通
瘡癰痘疹

全友松子曰倭朝風俗凡小兒初
生即用五香湯而謂能解胎毒及
小兒發斑丹毒小瘡多用五香湯
者以為未然矣考諸千金方小兒
瘡科標五香連翹湯用青木香熏
陸香雞舌香沉香麝香麻黃黃芩
連翹海藻射干升麻根實竹瀝治

小兒風熱毒腫，腫色白，或有惡核，癰癤附骨，癱疽節解，不舉白丹走，竟身中白癰，瘰癧不已。云前方加味五香湯治無名腫毒，小兒專用之，言本自千金之變法也。然而小兒純陽而虧陰，香竄之劑宜小心斟酌用之，可也。况其臟腑嬌脆，氣血未周，四知之中，欠其間切，唯以望聞神聖之法，用治一誤，輒害百年，用是方者，審思之也。

承氣六方

五

桃仁承氣湯

①治瘀血小腹

急痛大便不利，小便自利，或譫

語口乾，遍身黃，或血結胸中，手

不近腹，或寒熱昏迷，其人如狂。

虎

兩

芒

二

嬰

五

甘

二

桂

一

右入姜煎五更服。

△蘇伊舉曰：吾鄉有善醫者，每治失血蓄妄，血必先以快藥下之，或問蓄血復下，虛何以當，則曰：血既妄行，迷失故道，不去蓄利，則以妄為常，曷以禦之？且去者自去，生者自生，何虛之有？

△友松子曰：用此方以治失血者，為利瘀破血，宜施於蓄妄之初，以絕其道。若亡血虛人，則不宜下。且此方乃仲景先生治傷寒太陽病不解，熱結胸臍，與血相搏，血為熱搏，其人如狂，以腹急結者之神劑。

也然而治失血蓄妄之血尤當緩急相濟宜以青皮枳實柴胡芍藥當歸數品中看勢出入可也此即陶氏桃仁承氣飲子

三一承氣湯

①治消渴胃中

有熱

虎 芒 朴 實 甘

右煎服

△按此方將仲景二承氣合而為一故名二承氣乃河澗之方也原有生姜共六味評見後

△準繩云有中風便牙關緊急漿粥不入者急以二承氣湯灌於鼻中待藥下則口自開矣然後按法治之

調胃承氣湯

①治太陽陽明

不惡寒反惡熱邪在中焦作瀉

大便秘澀語嘔噦

虎 六分 甘 二分 芒 一分

右上一味水煎入芒再煎一沸服

小承氣湯

治六七日大便不

通潮熱譫語腹脹滿悶而喘

下痢赤黃內煩喜飲冷水小

便不利者先用二服蕩滌而後

調治之

虎 二分 朴 實 各一分

虎 二分 朴 實 各一分

右煎服以利為度

大承氣湯 治胃實譫語五六

日不大便腹滿煩渴舌乾口燥

日晡發熱脈沉實

虎 七 匁 朴 實 各 一 芒 半

右先煎實朴去粗內虎再煎去

粗納芒更煎一二沸服以利為

度○瘧疾寒熱轉大者從卯至

午發宜柴胡湯從午至酉發者

邪在內宜大承氣湯從酉至子

或至寅發者邪在血宜桃仁承

氣湯下之微利後更以小柴胡

湯撤其邪可也

加味承氣湯 ①治瘀血內停

胸腹脹痛或大便不通

虎 芒 各 二 實 朴 斤

紅 各 一 甘 五

右酒水 各 煎服病急者不用酒

按承氣之類可用壯盛人不

可用虛弱人若不辨虛實則

誤多 批曰承氣之類不可用

於虛弱人之言恐未盡

善雖虛弱人若患傷寒裏症

痞滿燥實堅俱全者或蓄血

者不用承氣而可束手得幾

乎經曰有故無殞正謂是也

唯其虛弱人醫者宜子細用

氣猶謂勾賊破家俞弁曰凡人胃氣為濕熱所傷必瀉其土實而元氣乃得上下用流此承氣之所由名也

對症窺下風而興之則得卒

効

△徐春甫曰大承氣治二焦俱實痞滿燥堅全故用厚朴枳實苦寒瀉滿苦硝之鹹以除堅大黃之苦以瀉實熱此為胃實不大便發熱狂言譫語二焦俱實而用者也小承氣湯治上焦積熱成痞滿以厚朴枳實去痞大黃瀉實熱不用苦硝則不傷下焦血分之真陰此為上焦實熱而用之也調胃承氣治邪在中焦則有燥實堅二症故用甘艸調胃和中苦硝潤燥大黃瀉實不用枳實則不傷上焦之元氣也桃仁承氣治中焦瘀血積熱經曰中焦如漚血之源也中焦熱甚則血脈凝故有腹痛不可按又右證語則以調胃承氣加桃仁肉桂以破之亦不用枳實以傷上焦此則諸承氣因症立方而不容以不易名也

△友松子曰仲景用諸承氣之法如徐氏之論其可謂子細分明也矣於調胃承氣不用厚朴枳實者以其不作燥滿用之恐傷上焦虛無氤氳之元氣也小承氣湯不用苦硝者以其實而未堅用之恐傷下焦血分之真陰謂不伐其根也至於上中下三焦皆病痞滿燥實堅俱全者急以大承氣湯下之恐邪氣不盡反傷其正也奈何劉完素不世名哲亦不究其理將神景

三方合一安云通治二承氣之症
又治雜病消渴胃熱等症似用仲
景之方甚失仲景之法矣至於杭
之陶節庵編入殺車槌方中而号
六一順氣者即三一承氣加柴胡
黃芩芍藥等物以代大承氣小承
氣調胃承氣大柴胡三一承氣大
陷胃等湯之神藥者則仲景之門
猶不入如何而窺軒岐之奧乎如
江左龔廷賢世多推重其名亦未
夢見仲景之法將六一順氣編入
回春濟世等書以為獨得之妙乃
前輩之大失也由此觀之後輩誤
入不足厚也

△羅謙甫云若大承氣症反用調
胃承氣則邪氣不散小承氣症反
用大承氣下之則過傷正氣而腹
滿不能食故有勿入泄之戒此仲
景所以分而治之亦嘗越聖人之
制度後之學者以此二藥合而為
一且又通治二藥之症及無問傷
寒雜病內外一切所傷一概治之
若依此說與仲景之方甚相違背
又失軒岐緩急之旨紅紫亂朱迷
惑衆聽一唱百和使病者暗受其
弊按羅氏此言甚為明察若使羅
氏後陶華及龔子才而生必有太
段義論矣

附方

六一順氣湯治傷寒傳裡大便結
實口燥咽乾怕熱揭衣讖語狂
妄揚手擲足斑黃陽厥潮熱自
汗胸膈滿硬透臍疼痛等症
柴胡黃芩芍藥枳實厚朴大黃
芒硝甘艸
右剉一劑先將水一鐘煎滾二

沸後入藥煎至一碗臨服入鐵
鑊水二匙調服

和實大黃湯治食積痛併積熱痛
大便不通者

枳實大黃枳榔厚朴甘艸木香
右剉一劑水煎服

加味三一承氣湯治在裡邪實不
便脈實而喘者

大黃芒硝厚朴枳實甘艸木香
枳榔

右剉姜水煎熱服

涼膈散 十四

①治表未解半入裏下證未全

懊懣不眠二焦實火煩渴口舌

生瘡譫妄便溺閉結發斑黑陷

或治上焦熱甚陽明少陽之氣

中血藥也

翹 四 丹 虎 苛 芩 各二
 匁 匁

芒 一 甘 五
 匁 匁

右水煎○或入竹葉生蜜煎

食後服加姜亦可或作末服○

東垣加桔治諸般鬱熱退六經

實火○肺金邪熱嗽痰加守○

咽喉腫痛涎嗽加桔荊○咳而

嘔加守姜○鼻衄嘔血加斤芩

芋○淋閉加滑苓○風眩加芎

芩膏○酒毒加葛連名清心湯

用蜜竹葉同煎○斑疹加葛荊

赤芍芎芩桔○陽毒發斑加斤

○咳嗽加桑杏桔○結胸心下

滿加桔枳○譫語發狂踰牆赴

井皆陽熱極盛加連栢赤芍○

眼生翳障赤澁流淚加菊賊芋

○本方合四物湯名雙和散能

益血泄熱

按除積熱實火之劑○士婦

譫語發狂晝夜不眠不能坐

臥飲食與則食不與則不食

大便秘脉細緊而數四物湯

加連四十餘貼而愈

△友松子曰成無已曰方有緩急

輕重醫當臨時斟酌如大滿大實

堅有燥屎者非駛劑則不能泄是

以有大小承氣之峻也如不至太

堅滿唯邪熱甚攻下者又非承氣

湯之可投必也輕緩之劑乃太柴

胡湯用以逐邪熱也是知大柴胡

湯乃下劑之緩者予謂太柴仲景

治太陽過經十餘日而柴胡症仍

在者先與小柴胡嘔不止心下急

鬱鬱微煩裏熱已甚結於胃中則

與大柴胡湯下之裡熱退而柴胡

症亦罷耳以此橫之或有惡熱口

燥亦罷耳以此橫之或有惡熱口

渴謔語太便祕脈實者雖陽明症而不惡寒者表裡熱俱盛也當以涼膈散治之神驗蓋此方乃調胃承氣之變故也陽明症表裡太熱不退目痛鼻乾脈實大而長者合白虎湯以解表裡之熱若誤下太早將成結胸而痞者加枳殼桔梗若陽毒發狂加當歸雜症熱咳便秘澀者加枳殼桑白皮杏仁去苦稍一方加黃連名錢半散作細末茶調下治一切諸熱紅痢裡急後重臟毒下血酒毒膈熱肚痛赤眼酒齶四肢煩渴及諸熱結核瘡毒風熱等症所以此方能治三焦實火臟腑積熱者也設或誤投虛火之症一服便致撲滅也吁可不審乎哉

全諭西昌曰中風虛大熱風木合君相二火主病多顯膈熱之症古方用涼膈散最多如清心散即加黃連竹葉如轉舌膏即加菖蒲遠志如活命金丹即加青黛藍根蓋風火之熱上炎胸膈正燎原之地所以清心寧神轉舌活命涼膈之功居多不可以宣通腸胃之法輕訾之也

△易老法涼膈散去硝黃加桔梗同為舟楫之劑浮而上之治胸膈中與六經熱以手足少陽之氣俱下膈絡胸中三焦之氣同相火遊於身之表膈與六經乃至高之分此藥浮載亦至高之劑故施於無形之中隨高而走去胸膈中及六經之熱也

附方

轉舌膏治中風噤瘖舌謔不語見前

活命金丹治中風神不清見前

清心湯瀉六經實火治實火煩熱

不止脉實數者

防風通聖散詳中卷之十七

東垣涼膈散治胸膈中熱及六經

之熱詳前

去芒硝 加桔梗

同為舟楫之劑浮而上之

雙和湯治月經不通

本方合四物湯

玄參散治口舌生瘡連齒斷爛痛

去連翹薄荷芒硝 加玄參升

麻獨活麥門冬黃柏前胡犀角

雙和散治上焦熱甚陽明少陽之

氣中血藥也

去川梔子

加味涼膈散治胃有實熱齒痛或

上牙痛尤甚者

加知母升麻石膏黃連

祛風清熱散治暴發眼腫如桃并

赤眼痛澁難開者

去大黃芒硝 加當歸赤芍川

芎生地黃黃連防風荊芥羌活

桔梗枳殼白芷稍

人參瀉肺湯治熱嗽便秘

即涼膈散去朴硝 加桔梗枳

殼桑白皮人參各等分

水煎溫服

拔萃桔梗湯喉痺痛者用之

連翹薄荷黃芩梔子桔梗甘柳

水煎加竹葉

十味香薷飲 [十七]

①治伏暑身體倦怠神昏頭重吐利

藿 參 陳 伽 苓 芪

瓜 朴 扁 甘 各半

右煎服 ○暑風去芪加羌 一匁半

○脉虛弱加參玄門 此二味各生脉散

○心煩加連丹 ○胸脹加枳桔

○夾痰加犀守 ○嘔吐加藿姜

汁 ○渴加葛瑞 ○右搖搗加

羌

按伏暑退散之劑 ○夏日體

倦頭目昏重腹痛瀉下甚得

數奇 ○夏月煩熱頭身痛小

水赤去參芪加連羌而安 ○

夏月身體四肢倦怠晝夜汗

出如浴咽乾心煩加連瑞而

安

△友松子曰香薷扁豆厚朴乃古

之香薷散治夏月傷暑亦云伏暑

謂其人從熱中來便於涼處坐臥

不知被外涼冷氣閉暑熱氣伏在

腠理中不能發泄故云伏暑於斯

時自覺酷暑蒸炎口燥咽乾引飲

吐瀉者用此一二服清而行之若

胃虛體倦神昏頭重則合五苓果

散散以益脾胃加黃芪所以防衛

外之虛加木瓜所以理倉廩之吐利及轉筋之候是十味香薷飲乃古之偶方也

全楊仁齋曰夏月多食冷物及過飲茶水致傷脾胃吐瀉霍亂故治暑多用溫脾消食治濕利小便之藥醫者要識此意

全立齋云夫香薷飲乃散陽氣導真陰之劑也須審有是症而服亦何患哉若人元氣素虛或犯房過度而飲之者適所以招暑也○按和劑香薷飲用香薷扁豆厚朴為主方熱盛則去扁豆加黃連為君治其心火濕盛則去黃連加茯苓甘艸治其脾濕其縮脾飲則以脾為濕所浸滯而重滯於扁豆香薷中加葛根烏梅甘艸除煩止渴以砂仁艸菓快脾而去脾所惡之濕也

附方

原方香薷飲治伏暑引飲口燥咽乾或吐或瀉並治之

厚朴扁豆各半香薷一

右水煎停冷不拘時服熱則作瀉

瀉一方加黃連四兩名黃連香薷飲

五物香薷湯驅暑和中通用

即香薷飲加茯苓甘艸

○一方無扁豆有乾姜

香薷剉散解暑盡止霍亂

即原方香薷飲去扁豆加陳

皮良姜茯苓甘艸食鹽

香薷縮脾飲驅暑和中除煩止渴

即原方香薷飲去厚朴加砂

仁艸菓烏梅乾葛甘艸生姜

批杷葉散治中暑伏熱煩渴引飲

嘔噦惡心頭白昏眩

去人參白朮茯苓黃芪扁豆

加枇杷葉白茅根麥門冬丁香

二香散治四時感冒寒暑嘔惡洩

瀉腹痛瘴氣飲冷當風頭疼身

熱傷食不化及南方風土暑月

傷寒悉以此藥解表發散

去人參白朮茯苓黃芪加紫

蘇香附蒼朮姜葱

清暑和中湯治中暑諸證

去人參黃芪木瓜加黃連猪

苓澤瀉木通滑石車前子枳殼

砂仁木香脚葉小茴香

六和湯治暑傷心脾霍亂轉筋嘔

瀉

半夏砂仁杏仁人參甘柳各二

扁豆木瓜赤茯苓藿香各四分

香茹厚朴各八分姜棗煎溫服

清暑羌血氣湯

十八

①治長夏濕熱蒸人四肢困倦

精神短少懶于動作胸滿氣促

肢節疼痛或氣高而喘身熱而

煩心下膨悶小便赤而數大便

澀而頻或痢或渴不思飲食白

汗體重

芪蜜蒼周各一分參伽

曲陳澤葛各五分斤

門酒童甘各三分玄九粒

右煎服○汗多倍芪○飽悶加

砂多○惡心加梅蓮梗○噦加

象方通經制補卷下

茹○煩燥加辰酸茹○小水短
赤加通丹○胃脘不開不思飲
食加朴多益砂蓮○腰痛加伸
苗紙○腿酸無力加膝伸○皮
焦加錄○頭目眩暈加芎○虛
汗加酸○夢遺加預蠟辰○口
苦舌乾加丹梅葛

按清暑益氣之劑○一女子
十七八歲夏末羸瘦骨立四
肢倦怠食少肌熱叢腹嗜臥
形如虛性脉細緊而數他療
不效加錄連二十餘貼而爲

全人○一男半歲患頭疔痛
甚而晝夜不寢以中頭於枕
則氣上於氣衝而欲絕故常
不側臥倚節息捧兩手抱頭
他治不効予六月初試脉細
數無力加芎細本酸五六十
貼而全愈○又一男大腸頭
破四形如錠甚腫痛下血時
六月中旬加冷桑杏楨得奇
妙其後再三發每發皆得

△按東垣曰氣虛身熱得之傷暑
熱傷氣故也云云此病皆由飲食
勞倦損其脾胃乘天暑而作也藥

中犯澤瀉猪苓茯苓燈心通脚木
通參淡利小便之類皆從時令之
旺氣以瀉脾胃之客邪也此正方
已是從權而立之若於無時病濕
熱之症或小便已數腎肝不受邪
者誤用之必大瀉真陰竭絕腎水
先損其兩目也予謂一等庸醫自
四五月至入九月專用胃苓湯治
暑濕者豈不瞎人眼睛

△徐春甫云仲景云太陽中暈發
惡寒身重疼痛小便已灑灑然毛
聳手足逆冷以有勞身即熱口開
前板齒燥發汗則惡寒甚加溫針
則發熱甚數下之則淋甚仲景此
條無治法東垣以清暑益氣湯主
之所謂發千古之秘也

△楊仁齋曰若既傷暑熱復傷生
冷外熱內寒先治其內溫中消食
次治其外清暑補氣而以理血為
主東垣此方已兼此意蒼朮陳皮
神曲澤瀉青皮是治內補脾也餘
十味是清暑補氣也於前陰陽二
條兼取用之神方也

△東垣曰長夏溼土客邪大旺可
從權加蒼朮白朮澤瀉上下分消
其溼熱之氣也溼氣大勝主食不
消化故食減不知穀味加炒麴以
消之復加五味子麥門冬人參瀉
火益肺氣助秋損也此二伏中長
夏正旺之時藥也

附方

清燥湯六七月間濕令大行子能
令母實而熱旺濕熱相合而刑
傷太陽故寒涼以救之燥金受
濕熱之邪絕寒水生源源絕則
腎虧痿厥之病大作腰下痿軟

癱瘓不能動

本方去葛根青皮 加白茯苓 生地黃猪苓柴胡黃連

黃芪人參湯治暑傷元氣之妙劑 詳見脾胃論

去澤瀉葛根陳皮

張氏近製清暑益血氣湯

人參白朮麥門五味陳皮甘枳 黃柏黃芪歸身薑棗 煎加減隨人

按此治暑傷元氣之一法也詳 見醫學六要

當歸養血湯

方

①治年老之人陰血枯槁咳火 氣結汗而不降飲食不下者是 乃成膈噎之病也

斤芍 芡 苓 各一分

萸 實 陳 苳 芎 軾

各七 連 黑炒 五 分 八分 沉 分

右入姜棗水煎竹瀝磨沉香調 服 按回春此方原有厚 朴七分其十四種

按老人痰支形瘦皮膚燥痒

無食味大便二三日不行者

血虛也此方加減而專可用

也若雖壯年而有此證胸痛

者膈噎之先兆也亦加減而

得奇効

△友松子曰丹溪先生曰膈噎病大率屬血少氣虛有痰有火也蓋陰血枯槁則痰涎凝滯咽喉窒塞食不能下或食下則胃脘當心而痛此皆血少痰凝將成膈噎之明驗也以此方補血豁痰順氣降火則病斯瘳矣然而必用竹瀝一以潤其燥一以清其痰一以降其火用大棗生姜行脾胃津液以和榮氣也○又曰不拘老少血虛之人有此須輕病為醫所誤服香燥太過以致胃血乾枯成前症者世多有之亦必以此方潤之或以後方更奇

附方

開結潤燥湯治翻胃養血健脾胃理氣消火之劑也

本方去貝母瓜蒌蘇子沉香黃連竹瀝加天門麥門白朮半夏藿香砂仁烏藥枳椇木通猪苓黃芩黃栢知母甘艸

養血助胃丸治嘔吐翻胃愈後用

此養元氣健脾胃生血脈調榮衛清鬱氣收功保後大有効當歸熟地黃白茯苓白芍藥川芎扁豆甘艸蓮肉山藥人參白朮

右為末姜汁打神麴糊為丸如梧桐子大每服六七十丸空心白滾水送下

生津補血湯

二十

①治年少之人有患膈噎者胃

腕血燥不潤故便閉塞而食不

下

斤芍 芩 地 苓 各一

實 陳 連 軾 貝 各七

砂 沉 各五

右入姜棗水煎竹瀝磨沉香同

服

按年少之膈證胸支痛不食
食則嘔噦而水飲不入大便
結是皆生於陰血虛與此湯
間有奇殊老人亦可○一人
胸膈咳嗽不食大便結故與

滋陰降火湯不効是以與此

湯則能退痰除虛熱得奇効

○一老僧不食只美湯茶而

熱先與香葛湯順和散大半

愈然未退故用此湯而全安

△友松子曰此方即前當歸養血
湯去川芎瓜蒌厚朴香附加生地
縮砂之劑也前方治痰火氣結升
而不降此方治胃脘血燥不潤之
設藥品尋常不須贅丹溪曰血屬
陰陰主靜內外兩靜則藏府之火
不起而金水二氣滋養陰血自生
腸胃津液傳化合宜何噎之有今
夫血燥火積痰凝則用此方濟之
又曰陳氏曰五膈者思憂喜怒悲
也五噎者憂思氣勞食也嚴氏曰

五膈五噎總是七情之氣鬱於胃
口而成如此之類各有主方非此
一方之能盡矣

徐氏曰翻胃病多是損傷胃氣
不能納谷故食入即吐有思慮頓
食并浩飲傷脾不司運化故朝食
暮吐皆原物之完出故有脾胃二
經分治此又不可不察也夫脾胃
之氣不充則陰陽失其升降所以
濁氣在上則生腹脹而邪氣逆上
則嘔而吐是為反胃故調氣養胃
則陰升陽降傳化合時則無反胃
之患致於朝食暮吐暮食朝吐此
又以健脾胃消導兼治之也反胃之
病治法不外於斯矣

瓜蒌和實湯

三

①治痰結咯吐不出胸膈作痛
不能轉側或痰結胸膈滿悶作
寒熱氣急並痰迷心竅不能言

○痰喘者喘動便有痰聲○食
積嗽者痰嗽如膠咳嗽胸膈結
痛者痰結早晨嗽者胃中食積
上半日嗽者胃中伏火皆治之

萸 實 桔 苓 貝 陳
芩 丹 各一斤 六分 礞 蜜
各五分 甘

右入姜煎加瀝姜汁服○痰

迷不語土蜜加葛○氣喘加桑
軾○痰結脇痛久不治成脇癰
去桔苓加酥童面○發熱加柴
○痰火發瘧加門參軾

按治實症咳嗽痰喘之妙方
也○咳嗽胸脇引痛加酥而
安若誤而久不治則成膿血
而脇生癰也○太抵午前咳
痰宜此湯午後嗽可用滋陰
降火湯

△友松子曰治痰結咯吐不出胸
膈作痛等症非脉之滑數實者宜
斟酌焉世醫多謂咳嗽喘急之第
一方凡痰症除寒痰外雖有諸痰
飲之名大都皆試此方以為通便
之法豈理也哉雖實人患痰結喘
嗽亦可以意增損熟痰酒痰加黃
連青黛去木香食積痰加神麴麥
芽山查痰結胸痛加海石五倍子
胃中伏火加石膏旬母痰在腸胃
間加芒硝下之痰在上加瓜蒂探
而吐之至如風痰濕痰氣痰不可
服此方所以然者痰既降而風濕
氣留而不去變成不可名狀之難
病怪症者多矣○又曰用此方若
欠竹瀝姜汁令人多致咳血又陰
氣在下陽氣在上咳嗽喘急者當
用東垣瀉白散誤投此方亦致吐
血又瘦人痰火喘嗽宜去木香不
然有痰帶血絲之假症矣又虛人
中焦有痰胃氣亦賴所養卒不可

便改改盡則愈虛其中氣以致脉脫者有矣此數件學醫者不可不知

附方

加減瓜蒌枳實湯治痰結腸下痛本方去桔梗片苓加白芥子青皮茴香

治癰二陳湯治癰症因痰者去貝母當歸加半夏南星

開結化痰湯治熱痰在胸膈間不化吐咯不出寒熱氣急滿悶作痛者名曰痰結

去當歸木香加黃連蘇子桑皮朴硝杏仁

東垣加減瀉白散 三

①治陰氣在下陽氣在上欬嘔嘔吐喘急

桑葉各五 錄各五 參各五 會各五 陳各五 童各五

右入粳米粒一煎服

按治虛症久嗽之方也用滋陰降火湯而肺氣彌虛則與此湯有奇効○婦人久嗽不巳有咳血而不食脉無力雖清咳湯之謠在夫而肺無火邪故用此湯而全愈○此症

與瓜蒌根實湯則却為吐血

頓之

△友松子曰原方錢氏瀉白散即骨皮桑皮甘州粳米錢氏治渴而後喘其身熱肺氣盛者王之若脾陰自降不能散津於上肺陽虛甚不能下輸五經致陰陽不成交上熱下冷喘嗽嘔吐者非東垣此法不可為也

△羅謙甫治梁濟民膏梁多飲因勞心過度肺金有傷以致氣出腥臭涕唾稠粘咽嗑不利口苦乾燥以加減瀉白散王之難經云心主五臭入肺為腥臭此其一也因洪飲大熱之氣所傷從心火刑於肺金以桑白皮地骨皮苦微寒降肺中伏火而補氣為君以黃芩知母苦寒治氣腥臭清利肺氣為臣肺欲收急食酸以收之五味子酸溫以收肺氣麥門冬苦寒治涕唾稠粘口苦乾燥為佐桔梗辛溫體輕浮治痰逆利咽膈為使○按此瀉白散又一變法也

附方

東垣瀉白散治心火剋肺傳為肺

痿咳嗽喘嘔痰涎壅盛胸膈痞滿咽嗑不利

桑皮知母甘州地骨皮五味子

茯苓青皮人參陳皮天門冬

如熱加黃芩紫蘇葉半夏

右咬咀生姜煎服

人參五味散治虛勞潮熱咳嗽紅痰盜汗

本方去青皮粳米加黃芪白

朮當歸熟地黃柴胡枳殼桔梗

甘艸 生姜 烏梅 知母 青蒿

人參平肺散 治心火剋肺 金傳為

肺痿咳嗽喘喘 喉痰涎壅盛 胸膈

痞滿 咽嗝不利

去粳米 加天門冬 黃芩 知母

甘艸

三奇湯 治咳嗽上氣喘促 胸膈不

利

去地骨皮 茯苓 粳米 加桔梗

紫蘇 半夏 杏仁 甘艸

參朮調中湯 瀉熱補氣 定喘止咳

去粳米 加白朮 甘艸 麥門冬

人參清肺飲 治肺胃虛寒 咳嗽喘

急 并久勞嗽 唾血腥臭

人參 烏梅 桑白皮 地骨皮 知母

阿膠 桔梗 甘艸 罌粟殼 杏仁 等

棗煎入蜜一匙 澄清溫服

加減瀉白散 匡

①治欬而口乾煩熱 胸膈不利

氣喘促

桑一錄 雷 陳 桔 各五

童 細 芩 甘 各二

右煎服

按大抵治喘嗽之方也 〇感

冒發熱退後 咳痰久不止不

食尿赤無汗 得奇効 〇久勞

咳痰久不止 而後成龜胸龜

背聲 腹盈汗足 冷大便結脉

細數 與七十餘點 而胸背如

細數與七十餘點而胸背如

常喘止○常患喘之人因氣

鬱發尿赤脉浮數加蘇杏仁

苓而安

△劉宗厚曰或曰效之本病不同何用藥往往必本於肺然效者因聲名病也故多主於肺經曰肺象金堅勁扣之有聲邪擊於肺故為效也且肺為臟腑之華蓋主於氣生皮毛朝百脉布化精氣者也或一臟一脉不利或九氣所動或天之六氣所感或水穀寒熱內因所動則肺亦病矣故效症雖曰病本不同是以治例往往相類但病有輕重所兼之殊方亦奇偶溫涼之有異矣又曰按此一方手大陰氣分藥也寶鑑曰華陀云氣盛則為喘減則為枯活人云發喘者氣有餘也凡省文字須要會得本意氣盛而為喘者非肺氣盛也喘為氣有餘者亦非肺氣有餘也氣盛當認作氣衰有餘當認作不足肺氣果盛為有餘當清肅下行而不喘以其火入於肺衰與不足以為喘焉故言盛者非言肺氣盛也言肺中之火甚也言有餘者非言肺氣有餘也言肺中之火有餘也故瀉肺以苦寒之劑非瀉肺也瀉肺中之火實補肺也用者不可不知然已上一方略有加減不同識者審諸

附方

瀉白散治肺臟氣實心胸壅悶咳

嗽煩喘大便不利

本方去知母陳皮青皮細辛黃

藥方類聚卷之...

...

人參清肺湯治肺胃虛寒咳嗽喘急胸膈噎悶脇肋脹滿迫塞短氣喜飲冷咽盛引痛及瘰癧癆勞嗽唾血腥臭乾嘔煩熱聲音不出肌肉消瘦倦怠減食
去陳皮青皮細辛黃芩 加阿膠人參杏仁烏梅栗殼

補肺湯治肺虛氣性火嗽

去地骨皮知母黃芩 加半夏紫苑款冬花阿膠紫蘇杏仁五味呷果砂仁石菖蒲

潤燥湯 因

①治大便閉結不通

嬰紅升虎麻仁

甘斤各一分地芩各五分

右煎調板末五分食前服○

方去紅升加杏朴芩○發熱加

柴○腹痛加蜜○血虛枯燥倍

斤芩嬰紅○風燥閉加羌皂莢

○氣虛而閉加參郁○氣實而

閉加枳蜜○痰火而閉加萹瀝

○老人倍斤芩地加參門郁

用嬰○產婦去嬰倍斤芩加參

按治秘結之主方也○欬熱

之後大便不通此湯立應○

若此湯不効則三和散得數

奇批曰此方治血燥秘結二

和散治氣秘不通二方迥別不可共塗主刪之亦可

△按東垣潤燥湯升麻生地為君，餘品為佐，紅花為使，又潤腸湯生甘脚生地為君，餘品為佐，紅花為使，二方俱用九味，無異，即末又通幽湯治大便難，幽門不通，上衝吸門不開，噎塞不通，燥秘氣不得下，治在幽門以辛潤之，即前方去麻仁大黃，用升麻當歸身桃仁泥為君，生地熟地為佐，甘脚紅花為使，共七味水煎，去渣調，楨榔細末五分食前服之，詳論大便結燥見蘭室秘藏，學者欲沛流窮源，不妨熟讀。

附方

加減神效湯治大便閉結不通春

號潤腸湯

本方去紅花升麻楨榔 加杏

仁枳殼厚朴黃芩

東垣升陽瀉熱湯治膈壅不通逆

氣裏急大便不行

去紅花大黃麻仁 加青皮槐

子黃柏黃芪蒼朮

七聖丸治大腸疼痛不可忍

羌活一兩 郁李仁五錢 大黃八錢 楨

榔桂皮 木香川芎錢五

右除郁李仁別研入外共為細

末煉蜜為丸如梧子大每服

三五十九丸白湯下食前取大便

微利一服而愈切禁不得多利

大便其痛滋甚

五淋散 三十五

①治肺氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不出或如豆汁或如沙石或冷淋如膏或熱淋尿血皆効

赤芍 丹 各五斤

甘 苓 一匁

石水煎空心服○一方有地澤

通滑車按此下加截圓春淋門必効散之法學者宜博考全方而增損不可刻版求劍○膏淋加薺○

氣淋加童○勞淋加參○熱淋

加連○肉淋加翹○石淋加葶

○尿淋加車○死血淋加桃牡

索瓊○老人氣虛作淋加參芪

大升少

按治諸淋之主藥也按治諸淋諸字

當作熟字實字○久患淋病

看則無大過也頂陰莖腫膿出足常冷加地

膝柏力壯翹翁去苓而安○

淋病膿出澁痛尿黃脉遲去

苓加地通翹膝力灯

△友松子曰肺氣不足足字當作調字若肺氣不足之症當用補中益氣麥門五味可也此由肺受火邪不能通調水液故膀胱蓄熱而

家方通旨補卷下

成五淋者用此清之詳其藥品理
自明耳又和劑作腎氣不足於理
頗通

附方

加減五淋散治膀胱有熱水道不
通淋瀝不宜臍腹急痛或尿如
豆汁如沙石淋膏尿血並宜服
之

本方去當歸黃芩 加山茵陳
淡竹葉木通滑石

必効散治一切淋症隨症加減

法見五淋
散條下

去芍藥黃芩 加生地黃滑石
牛膝麥門冬根殼黃柏知母扁
蓄木通燈心

導水散治膀胱有熱小便閉而不
通也

去芍藥黃芩 加瞿麥車前子
滑石澤瀉猪苓木通石蓮子黃
連黃柏知母

五淋一赤散治諸淋或如豆汁沙
石或血尿如膏

去黃芩

龍膽瀉肝湯治肝經濕熱兩拘腫
痛或腹中疼痛或小便澀滯等
證

去赤芍藥赤茯苓 加龍膽草
澤瀉車前子木通生地黃柴胡

一陳五淋散治咳喘小便不通乃
痰氣閉塞故也

加陳皮半夏燈心 一圖
水煎空心服

加味五苓散治虛寒小便不通

猪苓澤瀉白朮赤茯苓肉桂當
歸根殼牛膝木通各等分 甘州稍
減半

右到一劑燈心丁團水煎空心服詳于五

八正散 三

○治心經蘊熱臟腑閉結小便赤澀癢閉不通及熱淋血淋如酒後恣慾而得者則小便將出而痛既出而痒以此藥王之

虎嬰通滑蓄丹
車甘

右入燈煎空心服○治下焦積熱一便閉澀多渴咽乾口舌生瘡腫痛

按一便通利之王藥也○一人入熱湯則不通漬冷水則能通身熱渴脉沉實與此湯而安○產後六日患淋病胸脇痛身熱咽乾合四物湯而得卒效一男夜必足心熱小便澀頭中鳴加赤芍斤芎芷菝入姜而安

△吳山甫曰濕熱下注令人小腹急則小便有可行之勢矣而卒不通者熱秘之也故用寒滑之劑滑其着通其滯矣

△楊仁齋曰此方能治心熱煩燥

目赤咽乾小便淋閉大凡心熱要得小便流利而出

△又曰遍身腫煩渴小便赤澀不便閉身熱脈數者此屬陽水用本方凡因熱而成水腫以此先導之云

△友松子曰此方雖云治心經蘊熱不配清心之藥只類聚苦寒專以通利且有降無升上竅不開徒決其下是名霸道劫法用之者宜知諸

附方

加味通心散治腎與膀胱實熱小腸氣痛小府不通

本方去大黃滑石車前子扁蓄加黃芩連翹枳殼川練子

葵子湯治膀胱實熱腹脹小便不通一名赤茯苓

去大黃扁蓄山梔子一名赤茯苓木猪苓葵子枳實黃芩

又方治血淋諸熱淋疾

去大黃扁蓄車前子 加山茵陳淡竹葉猪苓

猪苓湯治熱結小便不通

去大黃桃仁山梔 加猪苓澤瀉枳殼黃柏牛膝麥門冬瞿麥

清肺飲子治渴而小便閉澀不利邪熱在上焦氣分

燈心一分通脚二分澤瀉瞿麥琥珀五分扁蓄木通七分車前子一分茯苓二錢猪苓三錢

右為釐末每服五錢水一盞半煎至一盞稍熱食遠服或研方入止散五苓散亦宜服之

▲附通關丸一名滋腎丸治不渴而小便閉熱在下焦血分也

黃蘗知母一兩 肉桂五分

右為細末熟水為丸如梧桐子
大每服一百丸空心白湯下頓
兩足令藥易下行故也如小便
利前陰中如刀刺痛當有惡物
下為驗

清心蓮子飲

三

①治心中煩燥思慮憂愁抑鬱
小便赤濁或有沙漠夜夢遺精
遺瀝澀痛便赤或酒色過度上
盛下虚心火上炎肺金受尅故
口苦咽乾漸成消渴四肢倦怠
男子五淋婦人赤白五心煩熱

此藥溫平清心養神秘精大有
奇効

蓮各二 參各二 芪各二 蜜 赤苓各二

門 錄 芩 車各一 甘一

右入灯心五 姜三 煎服○上盛

下虛加酒漚各一 ○發熱加柴

苛各一 ○一方有柴一 治熱

在氣分口乾小便白濁夜間安
靜晝則發熱又治口舌生瘡或
口苦咽乾燥作渴小便赤澀或
下淋不止或莖中作痛○專治

銀方見...

心虛有熱而溺濁之王方也○
不因老壯氣弱常有餘瀝服此
湯久皆驗

△按丹溪曰赤濁屬血由小腸屬
火故也白濁屬氣由大腸屬金故
也或曰思慮過度嗜欲無窮俾心
腎不交精元失守以爲赤白二濁
之患赤濁者爲心虛有熱由思慮
而得之白濁者爲腎虛有寒由嗜
欲而得之葉氏曰虛寒者草薢分
清飲虛熱者清心蓮子飲王之

△吳山甫曰遇勞即發者名曰勞
淋此方主之此以體弱故不任勞
然五臟各有勞勞者動也動而生
陽故令內熱內熱移於膀胱故令
淋澁是以此藥療五藏之勞熱惟
直前子之滑乃以治淋去者云

△李中梓曰心藏主火火者元氣
之賊勢不兩立小腸與心實爲表
裡心火妄動小便必澁云云故以
諸藥共底成功若小便既通則心
清而火自息

△友松子曰古方有柴胡共十味
用之治淋濁屢獲大驗所以然者
濁病在精道故綱目列之腎膀胱
部淋病在溺道故綱目列之肝膽
部今以此方治一部之病節節應
驗前哲謂肝腎之病同一治者豈
欺我哉柴胡黃芩人參甘朮小柴
胡湯也可以清肝膽之火麥門黃
芪骨皮蓮肉可以清心肺之陽赤
苓車前可以導肉丁而注壬癸矣
肝膽之火既清則心火寧肺金肅
如斯則肺存通調水道之令必成

水火既濟之功，然於淋也濁也，豈不平復。

附方

黃芪湯 治腎虛變勞淋結澀不利

本方去麥門地骨皮車前子灯心 加五味子磁石滑石桑白皮枳殼

加味清心飲 治心中客熱煩躁赤

濁肥脂

去黃芪地骨皮黃芩 加益智

仁遠志石菖蒲白朮澤瀉

小温金散 治心腎虛熱小便赤白

淋瀝或不時自汗等證

去地骨皮黃芩車前子 加巴

戟肉益智仁草薢

參芪五味湯 治腎水枯竭不能運

上消渴此症恐生癰疽

去赤苓石蓮黃芩地骨車前

加五味子朱砂 右水煎

石蓮散 治遺精之奇劑

去黃芪黃芩地骨車前 加芩

實遠志蓮鬚

滋榮養衛湯 因

○治身體虛瘦夜常遺尿失禁

及小便頻數

伽 預 沂 芎 芪 各

參 益 山 茱 酸 甘 各

四分

右水煎温服

按圓春方無當歸 益智只用八味此

銀方見巨制補卷之六

因氣虛血弱而遺尿及小便頻者王主之經云足厥陰之脈過陰器所生病者遺溺云云尤當用四物柴胡山茱山藥酸棗等味學者猶宜博考

附

參耆湯

治氣虛遺尿失禁

參 陳 芪 蜜 苓 沂 芩

伽 各一分 益 八分 升 桂 各五分 甘

分三

右入姜棗煎空心服

按此東垣治氣虛遺

尿之方也經云膀胱不約為遺溺又曰膀胱藏津液氣化則能出今因氣虛而不能約使小便不禁常常出而不覺者用之

年老之人虛寒遺溺者加附

按二方治遺尿之主藥也○

二十餘歲女子行立坐臥不

知溺出殊寢數疊朽脉細緊

參耆湯加附二十餘貼而愈

灸關元二十七壯○去益升桂加芍酸

蠣 各一分 梅 一分 入棗浮麥煎

服治自汗之聖藥也 按即圓春參芪

湯也治自汗屬陽虛時常而出者用之既日陽虛自汗則蜜炙升麻留皮官桂亦可以用以佐參芪而達表亦是良法何必日去

附方

和劑十四味建中湯以榮衛失調
氣血不足積勞虛損形體羸瘠
短氣嗜臥欲成勞瘵

本方去山藥益智山茱萸酸棗
仁加麥門冬肉蓯蓉川芎肉
桂附子半夏熟芋茯苓

參朮芎歸湯治瀉痢產育氣虛脫
肛脈濡而弦者

去益智山茱萸酸棗 加川芎
升麻白茯苓

人參丁香散治大人小兒嘔吐不
已粥飲湯藥不下凡嘔吐之病
皆因二焦不調脾胃虛弱冷熱
失和邪正相干清濁不分陰陽
錯亂停痰留飲不能運化胸膈
痞滿嘔逆惡心腹脇脹痛短氣
噎悶欬嘔痰水噎醋吞酸不思
飲食漸至羸瘦

去黃芪益血智山茱萸酸棗仁
加丁香蓬朮肉桂丁皮乾姜茯
苓香附

固精安神丸治心神不安腎虛自
泄精

黃柏知母龍骨牡蠣芡實蓮鬚
白茯苓遠志山茱萸
右為細末煮山藥糊為丸如梧
子大朱砂為衣每五十丸空心
鹽湯下

當歸六黃湯 三

治盜汗屬陰虛者

斤 芪 各一
地 芎 栢

續命湯補神卷下 六五

芩連各七分

右煎服

△吳山甫曰汗孔謂之鬼門故盜汗不止久久令人喪魄也陰虛有盜汗者此方主之但用黃芪一倍餘各等分

△李中梓曰既曰陰虛盜汗則元氣有降而無升肅殺之氣方濇而復用肅殺之劑無乃犯虛虛之戒乎惟火實氣強者用之不然寒涼損胃禍爛深耳

附方

加減六黃湯治妄汗涼血補血各

生地黃煎

本方去熟地黃 加甘卍麻黃

根浮麥

調衛湯治濕熱自汗一身盡痛脉滯者

去黃栢黃連 加麻黃根麥門冬羌活猪苓蘇木紅花生甘卍半夏五味子

附 當歸地黃湯

①治盜汗屬氣血兩虛者

斤 芎 地 芍 伽 苓
芪各一分 栢 雷 陳各八分 參
五分 甘三分

右入棗浮麥煎服

按 芳治盜汗之聖藥也○

氣虛有自汗宜用醫王陰虛

火動自汗盜汗俱宜用六黃
湯殊以滋陰降火湯證熱甚
者得奇驗○斤芩湯即似十
全大補湯滋陰降火湯等故
氣血兩虛盜汗甚以驗

△友松子曰此雲林之方也以十
全大補去芎桂以其辛散故也以
補中益氣去升柴以其升發故也
以滋陰降火去一二閉冬似不可解
然而龔氏製方多類如此不足怪
也於氣血虛有盜汗者服之亦驗
若衛外之陽虛所虛之陽行陰當
瞑目之時則更無氣以固其表故
腠理開津液泄而為汗追語則目
張其行陰之氣復散於表則汗止
矣夫如此則於盜汗桂枝可不用
乎蜜製升柴可不用乎前哲治盜
汗有用黃芪六一湯良有以哉豈
特曰丹溪曰盜汗屬陰虛而已

附方

鎮液丹治自汗盜汗

嫩黃芪防風白朮白芍中桂酸
棗仁大附子

右為細末酒糊為丸如梧子大
每服五十九丸空心酒送下

一方治自汗

用補中益氣湯 加附子芍藥
麻黃根浮小麥 其効如神

一方治盜汗

用十全大補湯 倍芪芍桂
加牡蠣五味麥門浮小麥
一服即驗虛甚者亦不過數服

清暈化痰湯 三

治諸般眩暈

陳守苓 各一 又半 實 一 又 冷

芎 各八 分 芷 各七 分 羌 各七 分 星 芸

細 各六 分 甘 二 分

右入姜煎服 ○氣虛加朮 一 又 參

○血虛倍芎加斤 ○有熱加

連 六 分

按治眩暈之總司也 ○予常

療痰火逆上胸中煩熱頭重

足輕太陽經強脉弦數去芎

芷細加搖定連丹而安又心

悸怔忡目暈吐逆亦可

△按此方雲林之製也醫鑑作魏都憲傳蓋龔氏著書逢逢以籍名色是其人之癖不可易也或曰何以知其然曰丹溪曰眩暈者痰在上火在下火炎上而動其痰也此症屬痰者多無痰不能作眩也雖有因風者亦必有痰又曰火動其痰陳湯加黃芩蒼朮羌活若按氣虛者亦以治痰為王兼補氣降火藥云云此一則即雲林遷就製方之張本也學者觀其藥品則思過半

△批曰治眩暈之總司六字恐刪刪氏之誤也若虛証眩暈服之立殆其可謂總司乎濟世曰右方治風痰眩暈為是

附方

回春一陳湯加減方治忽時眩暈
倒者是風痰脉浮滑也

本方去半夏黃芩白芷細辛
加人參當歸白朮桔梗瓜蒌仁
竹瀝

方考加味一陳湯頭痛常發者名
曰頭風偏於一邊而痛者名曰
偏頭風宜此方王之

去枳實白芷羌活防風 加黃
連薄荷

祛風豁痰湯治肥人日常頭眩眼
昏卒爾暈倒者名曰痰暈

去白芷防風細辛甘柳 加天
麻蒼朮桔梗烏藥竹瀝姜汁

半夏白朮天麻湯 三十一

①治眩暈眼黑頭旋惡心煩悶
氣短促上喘無力以言心神顛
倒目不敢開如在風雲中痰厥
頭痛身重如山四肢厥冷不得
安臥此乃胃氣虛損停痰而致
也

陳守芽 各七
分半 伽曲 各
五

分 芪參 苓 精 定

澤 各二
分半 永 炒二
分 酒 一分
半

右煎食前服

按治頭痛眩暈四肢厥冷之

方也○腎虛而上熱下冷常
頭痛惡心嘔吐心下痞滿與
此湯而安

余友松子曰此方世醫但言治痰厥頭痛眩暈之症而不知東垣老人昔日立方之本旨者良由只看方前治論而不考全篇之誤也東垣治范氏內人脾胃素弱初冬出外而晚歸為寒氣拂鬱悶亂大作火不得伸故也醫疑有熱用藥下之前症不減復添吐逆眩暈眼黑頭旋惡心煩悶云云後來王宇泰治一人臥則稍輕但舉定則頭旋眼黑以天麻半夏茯苓陳皮白附姜蚕參芪甘艸歸苓生姜煎湯服之五六日愈蓋做此方加減之也學醫者其可不知權變之法而概守死法而治活病者吾斯之未能信也予常用此方治脾胃素弱之人或傷飲食而泄瀉或脾濕生痰而泄瀉者無不獲効又用王宇泰之變方以治小兒之慢脾風多効茲特拈出與學醫者共之

附方

天麻黃芪湯治表有風証因連日醉飲其証復來右口角併眼牽引側視及左手脚膝麻木疼痛去陳皮半夏麥芽白朮干姜加芍藥羌活黃連當歸甘艸升麻葛根柴胡

加減天麻湯治面目四肢麻木飲食少用不時眼黑本方去干姜黃柏加防風白芷甘艸川芎姜棗

中和補氣湯治冷眼則麻木開則
不麻四肢無力痿厥醋心目昏
頭眩

去半夏麥芽茯苓天麻干姜
加羌活獨活川歸柴胡木香
豆蔻猪苓甘艸升麻芍藥黃連
麻黃

清陽除眩湯治氣一虛痰火炎上
以作眩暈

人參白朮茯苓陳皮半夏天麻
旋伏花楸榔甘艸生姜煎服
愚按此方出半夏白朮天麻之
例耳婦人宜加川芎當歸如半
夏之數其効異他如氣虛甚倍
人參白朮不應再加附子

驅風觸痛湯 三

①治諸般頭痛

門二 冷 一 芫 搖 芸
分 半 各 各 各

精 斤 芎 芷 蔓
各 各 各 各 各
分 分 分 分 分

本 五 細 甘
分 分 分 分

右入姜煎服 ○ 方去本加菊

○ 左痛加柴地 各一
分 紅游 各七

○ 右痛加芪 一 葛 八
分 分 ○ 正額上

眉稜骨痛甚者食積痰壅用定

五 守查枳 各一
分 分 ○ 當頭頂痛加

流 一 本 五
分 分 ○ 風入腦髓而痛加

荆瓜葶 各一
分 ○ 氣血兩虛有自

汗加芪

一各一
牛 參伽地

按治頭痛之總司也

△按雲林此方治諸般頭痛類聚風藥者總其大體而製之也高巔之上唯風可到故味之薄者陰中之陽自地升天散其壅塞也然亦有二陰三陽之異用藥者知之則有準的矣太陽經頭痛惡風寒脈浮緊川芎羌活為王少陽經頭痛往來寒熱脈弦細柴胡黃芩王之陽明經頭痛自汗發熱不惡寒脈浮緩長實升麻葛根白芷王之太陰經頭痛必有痰厥重或腹痛為痰癖脈沉緩者半夏南星王之少陰經頭痛足寒氣逆為寒厥脈沉細麻黃附子細辛湯王之厥陰經頭痛頭痛或吐痰沫冷厥脈浮緩吳茱萸湯王之若風甚疏散太過而頭痛服辛散藥又甚者則宜用酸澁收而降之乃愈御米殼乳香赤芍之類此外因之活法也

附方

加味吳茱萸湯治厥陰頭項頂痛

或痰涎厥冷浮緩之脈

本方去麥門獨活防風甘艸白

芷生姜 加吳茱萸黃柏麻黃

升麻黃芪柴胡半夏紅花黃連

東垣清上瀉火湯昔有人年少時

氣弱常於氣海二里穴節次灸

之至年老成熟厥頭痛雖冬天

大寒喜寒風寒風吹之頭痛即

愈畧來暖處或見烟火其痛復

作此灸之過也此方治之

去麥門獨活白芷生姜 加荊

芥黃連生地黃升麻黃柏黃芪

...

知母 柴胡 紅花

旋覆花湯 許叔微云 婦人患頭風者 十居其半 每發必掉眩 如在車船 上蓋因血虛 肝右風邪 襲之 爾予嘗處旋覆花湯 修合服之 此他藥甚效

去麥門黃芩 獨活 蒼朮 白芷 加旋覆花 石膏 荆芥 半夏 乾地黃

川芎茶調散 治頭風偏正頭疼及胃寒作痛者

川芎 二兩 白芷 一兩 細辛 七錢 藁本 一兩 羌活 一兩 防風 七錢 荆芥 一兩 薄荷 四兩 香附 炒 七錢 甘草 炙 五錢 右為末 每服二錢 食後茶調下

清熱解鬱湯 三

①治心痛即胃脘痛多因氣鬱日久 蘊積成熟而作痛也

丹 二匁 芎 枳 各一匁 精 連 各七分 陳 永 炒 各五分 甘 三

右入姜煎服 服後戒飲食 大半日或加蒹亦可 方名解鬱則無

按止心痛之捷法也

△按丹溪曰 心痛須分久新 若明知身受寒氣 口傷寒物於初病之時 宜用溫散利之藥 若稍久則成鬱熱 若欲行溫散 寧無助火為病

按丹溪曰 心痛須分久新 若明知身受寒氣 口傷寒物於初病之時 宜用溫散利之藥 若稍久則成鬱熱 若欲行溫散 寧無助火為病

身方知無補之

乎由是古方多以梔子為王或加芎或一陳蒼朮痛甚者加乾姜反佐之云云此雲林製清熱解鬱湯之本乎

附方

清鬱散治胃中有伏火膈上有稠痰胃作痛及惡心嘔吐清水吐酸煩悶

本方去枳殼 加半夏茯苓白朮香附

芎朮姜梔一陳湯治素有痰火胃脘急痛不可忍者食不能內

去枳殼黃連 加半夏茯苓 開鬱導氣湯治肚腹疼痛

去枳殼黃連 加香附白芷茯苓滑石神麩半夏

椒梅湯 四

①治心或腹時痛時止面白唇紅者是胃口有蟲作痛也

梅 椒 楨 實 蜜 苳 砂 鈴 朴 永 甘

右入姜煎服 按此方原有肉桂 此書無者乃脫文

也

按治因蟲而心腹痛之方也

△按蟲痛症因蚘攻髓心痛有林止面上白疰唇紅或上下唇生瘡或食即痛或痛後便能食或口中沫出或與之湯飲藥餌轉入轉吐蓋緣物入則蚘動蚘動則令人惡心而吐此皆虫症也用椒梅湯及

家方見宜則補卷下

攻蟲毒藥不止者宜用仲景甘呷粉蜜湯為臍受肝制而急故虫不安用粉蜜之甘緩以安之

附方

姜桂湯治寒腹痛

本方去烏梅山椒棋榔川棟子加良姜陳皮吳茱萸此方亦有肉桂而不日加者椒梅湯原有肉桂故也

一方治心胃作痛得食則暫止饑則甚者此胃中有蠶也或時常惡心嘔吐清水等症

陳皮半夏白茯苓苦練根皮使君子甘呷右劉生薑煎服

疎肝飲

①治左脇下痛肝積屬血或怒氣所傷或跌撲閃挫所致或為

痛

連柴 斤 童嬰

根芎 芍 紅

右煎食遠服

按治脇痛之王方也

若右脇下痛者肝邪入

肺故加姜黃桂陳甘生薑

加味即濟生推氣散治右脇疼痛脹滿不食姜黃根殼桂心甘呷為末姜棗湯調下二錢食遠服

脇痛在左別無

雜症為肝經受邪宜濟生和
芎散和殼川芎甘艸右煎服
蓋和殼治實症
腸痛酌劑矣

△按陳肝飲治肝積或怒氣或瘀
血實症者用之有效若肝腎一經
氣血虧損腸脹作痛或腸脹頭眩
身痛經水不調者宜用滑氏補肝
散山茱當歸五味山藥黃芪川芎
木瓜各半熟芋白朮各一錢獨活酸
棗各一錢右入棗水煎服治腸痛曰
疎肝曰補肝症有虛實法有補瀉
故併及之按內經曰有所墮惡
血留內若有所大怒氣上而不下
積於腸下則傷肝其人素有此候
而腸痛者直用疎肝飲決効

附方

柴胡芎歸湯治肝火盛而木氣實
腸下痛

本方去黃連桃仁紅花加香

附龍膽艸木香砂仁甘艸生姜

平肝流氣飲治腸痛及小腹至遠

膈併疝氣內外疼者

去桃仁紅花枳殼加茯苓橘

皮梔子香附半夏厚朴甘艸吳

茱萸生姜

柴胡疎肝散治腸痛肝氣有餘者

去黃連當歸桃仁紅花加甘

艸香附子

平肝調脾飲治脾有濕邪肝有熱

邪濕熱相搏兩脇俱痛者

去黃連桃仁紅花加蒼朮扶

苓甘艸

通氣防風湯 三六

①治肩背痛不可回顧者此手
太陽經氣鬱而不行以風藥散
之脊痛項強腰似折項似拔此
足太陽經不通行

羌 搖各一 本 芸 芎

甘 蔓各五

右煎服○如身重腰沉沉然經
中有寒濕加離五輕者附五重
者川烏五

按治因氣鬱而肩背脊痛之
方也

按此東垣魏羌活勝濕湯不知
編書者因何而易其名東垣別有
通氣防風湯故併及之以曉後昆
用藥之有自來以誠述方書者安
稱名目之混亂也

東垣曰肩背痛汗出小便數而少
風熱乘肺肺氣鬱甚也當瀉風熱
則愈通氣防風湯王之二黃芪柴胡
升麻各一人參陳皮防風羌活甘
艸各五薑本青皮各三白芩黃柏
各二右水煎服如面白脫色氣短
者不可服○素虛人或看書對奕
久坐而致脊背痛及發汗後或病
後心膈間痛或牽引乳脇走注肩
背痛俱不可用此宜補中益氣之
類

余俞西昌曰濕上甚而熱汗之則
易下之則難故當變其常法而為

表散羌活勝濕湯得之

△靈樞經曰頂痛不可俛仰取足太陽不可以顧取手太陽也按俛仰屬背與腰故曰足太陽顧則屬肩與項故曰手太陽醫者下藥亦當分別

附方○

提肩散治風熱乘肺肩背強直作痛

本方去獨活蔓荊子 加白芍

黃連黃芩

清上蠲痛湯一切頭痛主方不問

左右偏正新久皆効

去藁本 加當歸白芷細辛菊

花蒼朮片苓麥門冬生姜

羌活湯

①治遍身骨節痛者是皆血氣

風濕痰火也

羌 蒼 泠 斤 苓 芍

守 菴 各一 蜜 陳 各七
分 分

甘 三
分

右入姜煎服○風痛加芸○濕

痛加蒼○熱痰痛加泠蔓實瀝

○血虛痛加地○上痛加正葳

○下痛加栝藤○痛甚加乳○

發熱加柴○小水短瀼加通

按治痛風之方也

△按丹溪曰痛風因痰者一陳湯加蒼朮羌活黃芩因血虛者當歸川芎佐以竹瀝及行氣藥云云製方者就此數句合十一味名羌活湯而治遍身骨節痛者是皆血氣風濕痰火云云雖有上下部之加減豈能盡其術哉嗚呼丹溪之門尚未入安陸百家之堂乎且此症有屬風者屬火者屬瘀血者屬氣血虛者又痛在皮肉筋骨之殊由病有不同之別矣學醫者臨病未責勿拘偏門○又按李士材曰羌活治肢節痛因于風濕者宜之若血氣虛而痛者悞用之反致增劇

附方

清濕化痰湯治周身四肢骨節走注疼痛牽引胸背亦作寒熱喘咳煩悶或作腫塊痛難轉側或四肢麻木痺不仁或背脊心一點如冰冷脈滑乃濕流注經絡關節不利故也

本方去當歸芍藥香附 加南星白芥子白芷

舒筋立安散治四肢百節疼痛

去當歸芍藥香附木香 加防風獨活川芎白芷生苧紅花桃仁南星木瓜威靈仙牛膝防己連翹木通龍膽附子

又方治兩足疼痛麻木

去羌活黃芩香附木香 加白朮黃柏牛膝葳靈仙桃仁紅花

加味八仙湯 ㊟

①治手足麻木或或疼痛

家方親製補本

沂 萍 苓 各一
芎 守 各七
參 朮 各八
膝

各六
分 卷 芸 各五
分 伽 甘 各四

枝 二
分 分

右入姜棗煎服

按治麻木之王方也因濕痰

而手足麻痛者氣虛也宜用

此湯若軟痺者血虛○一男上體麻

殊舌痺不知酒味此方得妙

術○予母七十餘歲咳嗽後

舌痺不知飲食味此湯二貼

而愈

小按丹溪曰麻是氣虛本是濕痰

死血方用四君一陳四物本此說

也更有牛膝防風秦艽羌活柴胡

桂枝等味或引氣藥行陽或就血

藥散麻或扶痰藥除濕或行周身

上下總不過如此矣又此獨活寄

生湯無寄生細辛杜仲有半夏白

朮一床用此方者當參詳之

公友松子曰經云風淫行痺即走

淫痛也寒淫痛痺即痛風也濕淫

者痺即麻木也若人氣血不足患

此三症者當於獨活寄生湯三痺

湯加味入仙湯中不妨參看而增

損所以者何此三方四君四物之

補藥內加蒸朮羌活以勝風濕桂

以勝寒牛膝杜仲以填骨節凡治

三氣襲虛而成痺症者宜准諸此

非特曰一方專治三痺矣

附方

沉香薑甲散治男子婦人五勞七傷氣血虛損腰背拘急手足沉重百節酸疼面色黃黑肢體倦怠行動喘乏胸膈不快欬嗽痰涎夜多異夢盜汗失精嗜臥少力肌肉瘦瘠不思飲食日漸羸弱者

本方去芍藥陳皮川芎防風白朮甘艸 加沉香巴戟大黃黃芪荊芥附子鼈甲肉豆蔻全蝎

人參輕骨散解利四時傷寒頭痛壯熱項背拘急骨節煩疼增寒惡風肢體困倦大便不調小便赤澀嘔逆煩渴或傷風感寒頭痛熱熱鼻塞聲重眩嗽痰涎及山嵐瘴氣時行疫癘潮熱往來去地龍牛膝羌活防風 加貝

母白芷桔梗厚朴麻黃根殼

滋筋養血湯治血氣兩虛雙足痿軟不能行動久臥床褥

去茯苓陳皮半夏秦艸白朮柴胡桂枝 加五味子麥門冬黃栢知母杜仲蒼朮薏苡仁

養榮湯治中風手足痿弱及痰迷心竅舌謇不能言語

去人參牛膝白朮柴胡桂枝 加麥門冬遠志石菖蒲南星根實烏藥黃連竹茹

清熱除濕湯

三九

①治濕熱鬱蒸於脾作五疸

連 苓 丹 茵 猪 澤

原方見巨冊補卷一

蒼童游

右煎服○穀疸加稜莖陳砂曲
○身熱加柴○小水短赤加栝
○大便實加虎○胸膈飽悶加
葡萄苓○飲酒人加萹葛○虛弱
人加參

按治黃疸之主方也

△吳山甫曰丹溪云疸證不必分
五同是濕熱故以此方主之疸黃
病之名也五疸者黃汗黃疸酒疸
穀疸女勞疸也疸分五證始於仲
景此失聖示人以指也不必分五
同是濕熱此後賢示人以畧也雖
然丹溪翁之言不能無弊使後之

學者宗其言至於舉一而廢百宜
乎視仲景之堂如天也學者且讀
金匱及者
於疸症始明白矣

△按治濕疸亦須分新久新病初
起只當消導如此方及茵陳五苓
散之類久病又當變法也脾胃受
傷日久則氣血虛弱必用補劑使
正氣盛則邪氣退庶可收切矣王
海藏謂內傷寒冷勞役形躰飲食
失節中州變寒而病生黃只用理
中大小建中足矣不必用茵陳戴
復庵云諸病後黃者用異攻散加
黃芪扁豆朱血發黃者十全大補
湯之屬是也

附方

茵陳散治濕發黃

本方去黃芩青皮龍膽 加赤
苓枳實厚朴滑石燈艸

限方宜用補參

八世

茵陳五苓散治濕疸

即五苓散加茵陳為君藥

茯苓參濕湯治黃疸寒熱嘔吐而

渴身目俱黃小便不利食少

去猪苓龍膽 加白茯苓陳皮

防已白朮枳實

茯苓茵陳梔子湯治穀疸

去龍膽 加苓白朮枳殼陳皮

防已

清火安神湯 四

①治驚悸怔忡心神慌亂

斤一匁 蛇炒 酸炒 芍 苓

連各 門各 芎 丹 遠各

右入姜煎服

按治怔忡之主方也

△批曰此方主意其人血不足而氣有餘一時被火邪干犯靈臺致心君不寧患驚悸怔忡心神慌亂者暫服數貼固刻龔雲林曰驚悸健忘怔忡失志不寐心風皆是痰涎沃心以致心氣不足若用涼劑太過則心火愈微痰涎愈盛而病益深耳用之者宜思之

附方

四物安神湯治心中無血養故作

怔忡兼服辰砂安神丸

本方去黃芩遠志甘柳川芎

加熟羊人參白朮茯苓神竹節戶

砂烏梅棗

硃砂安神丸治血虛心煩懊懷驚

悸怔忡胸中氣亂

硃砂當歸生地黃黃連甘草

一方加入參白朮麥門酸棗仁

茯神

右為末煉蜜為丸米湯送下

養血清火湯治心驚神亂煩燥不

寧

加辰砂

養血安神湯驚悸屬血虛火動者

宜養心以清火也此湯王之

去黃芩麥門梔子遠志 加陳

皮栢子白朮茯神

安神補心湯治怔忡驚悸

去黃連梔子 加白朮茯神玄參

益氣安神湯治七情六慾相感而

心虛夜多夢寐睡臥不寧恍惚

驚怖

去芍藥黃芩川芎山梔子 加

茯神人參黃芪膽星淡竹葉

加減補心湯治諸虛健忘等症

人參白朮各二錢 白茯苓陳皮

當歸白芍生地黃遠志麥門冬

酸棗仁黃栢知母各五錢 石菖蒲

甘草各三錢 水煎溫服

安神復睡湯治虛人不寐之主方

也

當歸川芎白芍生地黃益智酸

棗仁山藥圓眼肉遠志麥門冬

甘草

右剉燈心水煎溫服

清鬱訟痰湯 附一

①治噎氣吞酸乃胃中有熱膈上有痰令人嘔吐清水等症

陳守苓 連丹 蒼芎 苾砂 曲查 蜜甘

右入姜煎服

按治吞酸之三立方也

△按戴元禮曰吞酸乃濕熱在胃口上飲食入胃被濕熱鬱遏不得傳化故作酸也如穀肉在器遇長夏濕熱則易為酸按中脘有飲則漕有宿食則酸故常噎其宿腐之氣而吞酸者用之立効東垣有吞吐酸水屬金旺之論用鹹熱辛溫之治學者不可不讀

附方

清鬱一陳湯治酸水刺心及吞酸 饋雜

本方去縮砂山查木香 加枳實白芍

星半安中湯治痰積作痛

去黃連川芎神曲山查 加南星滑石枳殼青皮

一朮丸治吞酸心痛

蒼朮白朮陳皮半夏白茯苓白芍神麴黃連甘艸 右為細末蒸餅為丸梧子大每服百丸淡姜湯下

消痞湯 四三

①治中氣虛弱不能運化為痞者飲食痰積不能旋化為痞者濕熱太甚為痞者

參 朮 苓 陳 守 朴
實 連 砂 澤

右入姜煎服

按治痞滿之王方也

△按心下滿而不痛為痞心下滿而痛為胸痺學者臨症宜問其痛與不痛用藥耳治法詳見金匱

附方

木香順氣湯治腹脹滿悶

本方去枳實黃連縮砂 加木

香益智 川豆 蔻青 皮乾 生薑 萊

萸 當歸 升 府 柴 胡

大消痞丸治心下痞滿及年久不愈者

去茯苓 加乾生薑神曲猪苓
黃芩姜黃

化滯調中湯治因食積而脹滿者

去枳實黃連澤瀉 加山查肉

神曲麥芽

五飲湯治五飲最效

去黃連砂仁 加旋覆花猪苓

前胡桂心白芍藥甘艸

統旨香砂寬中湯治氣滯胸痞噎

塞或胃寒作痛者

去入參枳實黃連澤瀉 加木

香香附白豆蔻青皮枳榔甘艸

加味犀角地黄湯

四

①治上焦火盛口舌生瘡發熱或血熱妄行或吐衄或下血及不嗽血自來者

犀

壯

各二

匭

半

赤芍

一

半

玆

連

苓

各一

右煎服○如吐血成塊加虎

骨

嬰一名十一名○衄血加丹膠○咯血加

丹門栢雷斤○唾血加丹門栢

雷斤芩○下血加印○吐血加

天膠

按第一吐血之主方也○衄

血主犀玆加升側荊得奇効

○一婦人月水以來而止翌

朝卒吐血加并丹瑞而安

△李中梓曰此方用四味獨名犀角地黄者所重在一味芍藥丹皮不過佐助矣如因忿怒致吐血者加山梔柴胡

△張三錫曰陽明之脈絡鼻是經火甚迫血妄行從鼻出者曰衄方書言從肺來非也從口湧出者曰吐血初起脈洪大宜犀角地黄湯犀角性辛散能散一切有餘之火乃陽明經藥故曰如無犀角以升麻代之令人不知泥犀角解亦熱一句不分虛實動輒與四物同用若是實火固為得宜若陰虛者寧

免飛揚之禍哉

按陽明經之吐衄血若無犀角以升麻代之若肺腎之心血則不可以升麻代之蓋以升麻引地黃等藥入手足陽明故也他經則升麻無與焉何可代乎
△友松子曰常觀俗醫治血溢諸症不明寒熱虛實多主犀角地黃及四物芩連梔柏之屬使氣血俱傷脾胃兩敗以致不救者往往日擊夫活人犀角地黃王治上膈纏熱血積胸中吐出紫黑塊血脈洪大弦長按之有力精神不倦者多効設或內損吐血非溫補中脘即誤甚矣詳於理中湯條

附方

雲坼子犀角地黃湯治上中二焦火甚吐血衄血

大黃兩 黃芩 黃連各一兩 加生

地犀角

卽仲景治心氣不足吐衄之瀉心湯也

局方犀角地黃湯治衄血及吐紅

本方去黃連黃芩玄參

涼血生地黃湯治吐血咯血

去玄參 加茅根扁栢葉天門

冬知母黃栢

一和湯治暴吐紫血成塊

去犀角牡丹皮玄參 加當歸

川芎黃栢山梔子

清火滋陰湯治吐血咳血嗽血唾

血嘔血

去犀角黃芩玄參 加天門冬

麥門冬山藥梔子仁山茱黃赤

茯苓澤瀉甘艸

秦艽羌活湯 四因

治痔漏成塊下垂不任其痒

羌 一分 芩 二分 苳 七分 升 七分

麻 柴 甘 本 細

紅 各 少

右煎服

附 秦艽防風湯

①治痔漏每日大便時發疼痛

如無疼痛者非痔漏此藥主之

芩 芸 斤 伽 各 一 甘

澤 各 六 分 洎 五 分 陳 各 二 分 柴

升 各 二 分 嬰 各 三 分 紅 各 少

右煎空心服之避風寒

△按此一方東垣之製也更有秦艽蒼朮秦艽當歸等方治痔漏極好見蘭室秘藏

附方

秦艽白朮丸治痔疾并痔漏有膿

血大便燥硬而作疼痛不可忍

秦艽桃仁皂角當歸梢澤瀉根

實白朮地榆

右為細末和桃仁泥研勻煎熟

湯打麩糊為丸如雞頭仁大令

藥光滑焙乾每服五七十九白

湯下空心服少時以美膳壓之

忌生冷硬物冷菜類并濕麵酒

及辣辛熱大料物之類犯之則

藥無驗也

秦艽當歸湯治痔漏大便結燥疼

痛

秦艽當歸湯

秦艽

大黃秦艽枳實澤瀉當歸稍皂
角仁白朮紅花桃仁

右都作一服水二盞煎至一盞
去粗食前熱服已寒風處大小
便

清涼飲子治痔漏涼血

秦艽羌活湯去秦艽蒙本細辛
加知母黃芩防己生地歸身龍
膽黃栢杏仁桃仁

細辛散治寒邪風邪犯腦偏齒亦
痛

去秦艽黃芪甘艸紅花 加桂
枝羊脛骨灰艸豆豉白芷蒼朮
當歸

蝎稍散治太寒犯腦牙疼

去秦艽甘艸細辛紅花 加羊
脛骨灰當歸白芷桂枝艸豉蝎
稍

三方

①治痔瘡腫痛

連 芩 栢 翹 赫 丹
槐 各一 苦 虎 各一
各一 各半

右煎空心服

△批曰此方類聚大苦寒之劑非
人壯氣實者宜斟酌之若久嗜辛
熱炙博新酒蘊積熱毒釀成痔漏
者用之然亦中病則已

乾葛湯

①專治酒痔

葛 枳 守 芩 地 杏
芩 甘 各等
分

每劑二勺入黑豆百粒姜五片梅煎服

按治痔漏則宜選四方而用必有數効矣○痔漏痛甚咽乾不食大便結脉弦數與芩芩湯而安○飲酒之人痔突出而痛甚下血與乾葛湯得卒効

△王璽曰酒痔則每遇飲酒發動瘡腫血流太抵治痔之法以解熱調血順氣先之蓋熱則血傷血傷則經滯經滯則氣不運行氣與血俱滯乘虛而墜入太腸此其所以為痔也
醫方用黃芩甘脚各錢五分餘藥各五分白梅一個黑豆百粒姜五片

△按喻西昌云此方治酒痢專方也予亦屢獲奇効藥味平和不傷腸胃不削藏府凡酒客下利及下血症宜用此方其効著而速雖然腸胃虛弱者宜按法施治不可執泥

附方

逐瘀湯治痔漏疼痛內有瘀血作痛要通利大小腸取下惡物立効兼赤痢血痢如神
川芎白芷枳殼赤芍阿膠茯苓
莪朮生地黃茯苓木通甘脚五靈脂各一錢桃仁大黃各一錢半
生姜三片蜜三匙水煎空心服以利為度

洗肝明目散

四圍

①治一切風熱中眼目而赤腫痛

沂芎 麩 地 連 芩

丹膏 翹 芸 荊 苛

羌 曼 菊 蒺 桔

柳決 甘

右煎食後服○痛不可忍加川

烏○右翳障去芎加蒺賊○風

熱肝火甚去芎加游柴○大便

實加鹿芎桔

按治眼暴赤痛之方也○一

男左眼皆大赤視黑白不分

明此湯得卒効○熱痛赤腫

小柴胡湯加虎斤黑豆生不

瀉更加芒○暴眼赤初發用

升麻葛根湯加蟬與二貼如

未退用敗毒散加虎尚不退

却用五膈寬中湯酒調下

子日五膈寬中湯酒調下用治眼病是發前人未發之旨也學醫者達斯法則通斯理矣如初用升麻葛根再用敗毒因症不退却用五膈寬中猶似未中旨察

△此圓春方也濟世全書言去石膏蒺藜決明桔梗加黃柏大力子些胡燈心十根水煎食遠溫服瓠大

明散眼赤腫痛加大黃芒硝翳障
加木賊蒺藜治一切暴發赤眼怕
日羞明隱澁難開熱淚長流腫痛
不可忍者或生翳障攀睛胬肉內
障昏蒙並治

附方

撥雲散治症同前

去黃連薄荷蔓荊子蒺藜決明
加白芷枳殼大黃
按此方治陽明經風熱有餘眼
赤腫痛者用之若右翳障蒺藜
等藥亦不可去

明目流氣飲專治氣鬱風濕熱壅
赤障等症

本方去當歸芍藥地黃黃連石
膏連翹羌活桔梗加細辛木
賊牛蒡子玄參大黃蒼朮

清上明目丸治一切腫痛風熱眼

疾

去芍藥梔子石膏蔓荊子蒺藜
加大黃黃柏獨活白芷木賊

撥雲退翳丸治一切內外障膜遮
睛昏暗

去芍藥地黃黃芩山梔石膏連
翹防風桔梗加枳實木賊蟬
退蛇退地骨皮蜜蒙花天花粉
川椒

洗刀散治風熱眩爛眼白赤腫內
外障翳羞明怕日倒睫出淚兩
臉赤爛紅筋瘀肉宜用此藥
去地黃黃連加獨活木賊玄
參滑石麻黃白朮大黃芒硝蟬
退細辛

磨翳丸治眼生諸般翳膜太効
去連翹薄荷蒺藜桔梗加木
賊穀精白芷蟬退大黃獨活

龍退青柏子蠶退石决明

滋腎明目湯 圖

○治勞神腎虛血少眼痛○久病昏暗者腎經真陰之微也如昏弱不欲視物內障見黑花瞳子散皆血少勞神腎虛也

斤 芍 芍 地 苧 各一
桔 參 丹 連 芷 曼
菊 甘 各半 細茶 一撮 燈心 一團

右煎食後服○熱甚加游紫○

腎虛加柏雷○風熱壅盛加芸

荆○風熱紅腫加翹苓○酒毒

加連○腎膜加賊

按治眼久昏暗之方也

△友松子曰生生子云治目有專門以其點藥精妙及動針手法慣熟外此不過一理耳予謂然此一理若非專心究竟不易得也張二錫曰日病悉屬火熱世俗之論也須分新久虛實痰鬱氣滯脾胃相火或散或降或開鬱或養榮或滋腎壯水或益氣開痰初無一定方故難執一昧者不察一概施寒涼傷其脾胃辛熱耗其神明氣血愈虛火邪愈熾卒至盲瞽良可大息間有業是科者久病亦知補養多

用地黃滋陰，用陰虛相火盛者，固
有利益，倘中焦氣虛，而有痰因痰
生火，為目患者，服之，寧不泥膈增
病耶？予謂地黃滋血，尚右如是之
害若，本連輩之苦寒，用者亦當斟酌。

附方

平肝散治迎風冷淚

本方去桔梗，人參，山梔子，黃連，
細茶，燈心，加防風，荆芥，柴胡，
羌活，蟬退，膽州，夏枯草。

明目清涼飲治一切熱眼腫痛熱
淚羞明

去人參，山梔子，白芷，菊花，細茶，
燈心，加防風，荆芥，連翹，柴胡，
膽州，蟬退，薄荷。

養心明目湯治兩眼昏花流淚翳
膜遮睛

四物湯加防風，荆芥，羌活，蔓荊，
連翹，知母，黃柏，菊花。

通明利氣湯

①治虛火上炎，痰氣鬱於耳中，
或閉或鳴，痰火熾盛，憂鬱痞滿，
咽喉不利，煩躁不寧。

貝^三陳^鹽酒丹^{各二} 各^一 各^一

精伽候地栝漣

冷^{各一}芎^八蜜^分甘^{各五}

右入姜煎加瀝服

按氣閉耳聾之方也

△友松子曰王節齋曰耳鳴多是痰火上升鬱於耳中而為鳴其甚則壅閉矣遇此証當審平昔飲酒厚味上焦素有痰火只作清痰降火治之入抵多因先有痰火在上又兼惱怒得者最多怒則氣上少陽之火客於耳故也如此症當用此方治之有效今見醫流凡有耳症不察陰陽無故也試感之甚也此藥攻之太過反傷正氣變生他疾者最多此又不可不察也

附方

滋腎通耳湯治男婦耳鳴耳聾久服奏効

當歸川芎白芍生地黃黃柏知母黃芩柴胡白芷香附甘艸各等分右剉水煎服○胸膈不快加青皮枳殼少許

通竅飲

①治鼻不聞香臭

細 芷 芸 卷 斤 芎
守 桔 陳 苓 各一分 苟 三分
右煎食後服

按此方因肺經有風熱而治之若面白肺虛用醫王加門丹而可

△按此方號神愈散治肺熱鼻流濁涕空塞不通

瑞竹堂括曰

細辛白芷與防風 羌活當歸生薑芍
桔槿陳皮茯苓葷 十般等分剉同煎
二錢薄荷姜煎服 氣息調勻鼻貫通

加味清胃散 〔関〕

① 專治胃火血燥唇裂或為齩

唇或牙齦潰爛作痛

膏 蚘 壯 沂 連 升

芸 荊 各等分

右煎頻頻噙嚙齒齦浮腫痛不可忍是胃中有濕熱加丹芩

按治牙齒痛之主方也

△按原方清胃散治陽明熱盛齒痛或服熱藥及引腦痛皆治升麻丹皮 各一錢 當歸生地黃連 各一錢 齒痛甚加石膏一錢細辛二分黃芩一錢細茶二錢大黃蒸一錢腫加防風荊芥 各一錢 汪石山云齒痛

原方為末搗牙甚妙

△按此方治牙痛屬胃火者用之若火有餘當用涼膈散加減

△靈樞經曰齒痛不惡清飲取足陽明惡清飲取手陽明蓋胃經惡熱不惡寒大腸惡寒不惡熱由此言之清胃飲只可以治胃熱之齒痛不可以治大腸惡清之痛矣今世不分上下凡見齒痛多用此方亦關典耳

附方

瀉胃湯治牙痛如神

本方去石膏升麻 加川芎芍藥梔子薄荷甘柳

失血清胃散治氣上奔吐血心膈痛

枳殼青皮桔梗生地黃牡丹皮木通桃仁川芎黃芩黃連甘柳

生乾姜 煎服

清胃瀉火湯 治上焦實熱心胃二
經之火而作口舌生瘡腫痛者
并咽喉牙齒耳面腫皆効
連翹桔梗黃連黃芩梔子玄參
升麻生地黃薄荷甘呷乾葛
右剉煎服

清胃飲 治一切風熱濕痰牙痛床
腫血出動搖

去防風 加黃芩白芍藥青皮
甘呷梔子蒼朮細辛藿香

清火祛風散 治牙痛并牙齦腫緊
難以開口立効

黃連黃芩黃柏梔子連翹金銀
花羌活獨活白茯苓甘呷
右剉水煎頻頻溫服

清涼散 五

①治一切實火咽喉腫痛

桔 一 丹 翹 芩 芸

枳 連 斤 地 甘 各一

苛 半
分

右入燈心細茶水煎服加山豆

根 尤効 咽喉乾燥加參門

瑞 咽喉發熱加柴 咽喉腫

痛加力茲 痰火盛加扇婁瀝

咽喉痛生瘡加力茲 極熱太

便實去桔加虎 虛火泛上咽

痛生瘡喉不清者加栢雷

按治喉病之主方也

△天民曰喉舌之疾皆屬火熱雖有數種之名輕重之異乃火之微甚故也微而輕者可以緩治重而急者唯以砭針出血最為良法
△友松子曰嘗考先達之論以咽喉腫痛俱屬火証然而火有微甚微則正治甚則反治或豁吐痰涎或以齒出血行氣不可遲緩張子和所謂治喉腫之火與救火同不容以待治斯疾者每執小方而藥之且曰吾藥乃王道不動藏府又如於出血若幸遇小疾而獲愈不幸遇大病循死矣豈非誤殺也耶然有一等服涼藥不愈者此酒色過度勞役不睡舌上光滑而無皮或七情損傷中氣虛火泛上無制以致者用理中湯甚者加附子或官桂膏之更以附子末唾津調搽湧泉穴若槩用寒涼損傷生氣為害非輕

附方

清心利膈湯治咽喉腫痛痰涎壅盛

本方去枳殼當歸地黃 加荊芥玄參大黃朴硝牛蒡子

黃連湯治心火舌上生瘡或舌上腫燥裂或舌尖出血或舌硬

去桔梗連翹黃芩防風枳殼加麥門冬芍藥犀角

黃芩湯治肺火咳嗽吐血鼻血咽喉腫痛乾燥生瘡或鼻孔乾燥生瘡或鼻腫痛

去防風枳殼黃連當歸地黃加芍藥桑白皮麥門冬荊芥

清熱解毒湯治吐血衄血

去防風枳殼當歸薄荷 加升

麻乾葛赤芍牡丹皮黃柏

清咽利膈散治咽喉諸火病

去枳殼當歸地黃 加荊芥金

銀花玄參牛旁子大黃朴硝

瀉腸湯治大便秘下血太腸痛不可

忍肝門腫起

去枳梗當歸地黃薄荷 加大

黃黃栢赤芍藥

滋陰降火湯治咽喉作痛午後尤

甚乃虛火上升喉痛并喉生瘡

當歸川芎知母天花粉 各一錢

芍熟地黃 各二分 黃栢一錢 桔

梗甘呷 各三錢

右剉水煎入竹瀝服○加玄參

九妙

榮衛返魂湯

至

①治流注癰疽發背傷折非此

不能効至於救壞病活死肌

患於未萌之前拔原右於既愈

之後此藥大能順氣勻血故也

寔真神仙妙劑

首不犯斤通藜芷

苗矮枳甘

右酒水各半煎唯流注加獨病

在上食後服病在下食前服○

如有潮熱則裡有寒邪未盡散

加升蘇如此而熱不退加葛○

頭痛加芎姜○氣血盛者減斤
○胃寒生痰加守○熱鬱而成
風痰加桔姜○腦疽發背在上
者或老人虛弱者並去翁○如
有瀉者不可用且瀉止而後用
之

按治癰疽之王藥也

△按此方一名通順散一名追風
通氣散一名何首烏散王孤竹醫
林集要列於瘡瘍通治門王金壇
證治準繩列於瘡瘍內消部不唯
治癰疽而已至於痰核腫塊疔氣
脚氣等疾併有治法耳其大概曰
治癰疽發背流注腦疽打破傷折
疔氣血疔脚氣諸氣痞塞塊痛腰
痛一切痰飲為患此藥大能順氣
活血扶植胃本不傷元氣蕩滌邪
穢自然通順不生變疽真仙劑云
○凡癰疽生痰因胃寒者加半夏
因鬱熱生痰者加桔梗○因服寒
涼傷脾飲食以進肌肉不生去木
通加厚朴陳皮○流注加獨活腦
疽發背去木通○打破傷折在上
部去木通加川芎陳皮○經年腰
痛加革薺玄胡○脚氣加板榔木
瓜穿山甲水煎○痰飲為患喘嗽
眩暈頭疼睛痛骨節痺痛或胸背
頭項臑膈腰腿手足結聚痰塊不
紅不破或破而出清水薄血或努
肉突出并加南星半夏○腫毒堅
硬不穿加川芎獨活麻黃蓮瀝葱
煎熱服

附方

何首烏散治打折筋骨初便宜服

此藥順氣疎風活血定痛

本方去木通茴香加防風川

芎陳皮香附子紫蘇羌活獨活

肉桂薄荷生地黃

右煎入酒和服

解毒聖愈湯治下疳便毒楊梅等

瘡初起即消已腫即潰其人元

氣壯者加大黃更驗或楊梅瘡

多年不愈筋骨疼痛咽喉潰爛

不能收口或遍身疙搭不消或

手足皴裂出血或成結毒疔漏

俱加土茯苓二倍多服取効氣虛

加入參黃芪血虛倍當歸芍藥

此法得自方外異人蓋百發百

中之妙劑也

去枳殼加薏苡仁木瓜防風

白蘚皮皂角刺金銀花

升麻和氣飲 圍

①治瘡疥發於四肢痛痒不常

甚至增寒發熱陰下濕痒虛人

宜服此

升 葛 芷 陳 精 桔

甘 各一斤 苓 守 枳

承 虎 各九分 芍 七

右入姜燈檠煎服

按治癰疥之方也

△按和劑無虛人宜服此五字藥
犯相殺入黃非虛人之所宜當刪
之有浸淫浮腫癰風入臟陰下濕
痺耳鳴眼痛數旬予每用於如斯
等症得効良多

△王宇泰曰此手足太陰陽明經
藥也五積散加減法耳世俗多用
之蓋欲燥脾胃勝濕和氣為治瘡
之劑然臨症而不通變恐未合宜
也

附方

三因升麻和氣飲治瘡腫癰疥瘰
癧

本方去半夏 加厚朴

導滯湯 五

①治打撲損傷內有瘀血為痛
為腫

芩 枳 各二
各一

近 桃 紅
半 各一 各二

石水煎服加酒蒸大黃尤効

○治被人打殺或踢死灸百會

穴 立 應

按治跌傷之王方也

△按此方載於濟世全書原無方
名治打撲損傷之王藥云醫鑑載
導滯散即和劑方也用大黃當歸
各等分為末溫酒服治重物壓傷

或從高墜下，或吐血不能禁止，或
瘀血在內，胸腹脹滿，喘促氣短，東
垣用大黃一錢當歸二錢麝香少仍
名導滯散，治打撲損傷，瘀血內壅，
疼痛昏悶，欲死，大凡諸家，右導滯
湯皆從和劑方變化耳。

附方

大成湯治打撲傷損至重，入小便
不通，瘀血不散，肚腹膨脹，上攻
心腹，悶亂至死者，此藥通下，瘀
血方可服補損藥。

大黃當歸芒硝枳殼厚朴桃仁
蘇木紅花木通甘艸
右剉水煎溫服。

生乾地黃散治金瘡傷重，煩悶者，
本方去槐柳牡丹芍紅花，加
白芷續斷羚羊角生地甘艸川
芎桂心。

羌活乳香湯治跌撲傷損，筋折
骨發熱，體痛，挾外邪者。

羌活乳香川芎當歸赤芍藥防
風荆芥丹皮續斷紅花桃仁陳
皮 右生地黃汁煎服。

破血藥治打撲墮馬，從高跌下，皮
肉不破者，若皮破血流者，且作
金瘡，血過多治之。

去槐柳丹皮 加柴胡五靈脂
枳實川芎大黃朴硝蘇木

清心藥治打撲傷損，折骨出血，刀
斧斫磕等傷，及肚皮傷破腸出
者。

丹皮當歸川芎赤芍藥生地黃
黃芩黃連連翹梔子桃仁甘艸
右燈心艸薄荷煎入童使利服。

解毒七方 固

① 薺芫湯 解諸毒治蠱毒

黑豆 芫 甘 各等分

右每七夕水一盞煎八分温服

△李時珍曰薺芫寒而利肺甘而解毒乃良品也肘後方云一藥兼解衆毒者唯薺芫耳

① 升麻湯 治桃生毒肋下忽

腫起而生癰癤狀頃刻間大如椀此即桃生毒也升麻爲末取冷水調二三夕連服之若洞泄加葱數莖根鬚其腫即消且煎平胃散調和兼進

白粥

△按升麻本經稱解百毒殺殃鬼蠱毒入口皆吐出外臺秘要解葛若毒肘後方治射工溪毒直指方治桃生毒野葛毒事見本冊綱目

① 解砒毒 此毒於肉飯中得

之則易治飲酒中得之難治若胸作痛則吐之若腹作痛則急瀉之徐服參苓白朮散無恙

△按砒毒解法雖多唯蒸豆半升細播去渣以新汲水調通口服最効○又一法以地漿水灌之是爲良法

①斑猫毒

用澤蘭葉按汁飲

之乾者為末白湯下

△按大澤蘭連根葉煎水服亦治食瘟死牛馬毒殺入者

①野菌毒

用甘艸不拘多少

以麻油一盞煎數沸冷服

△楊仁齋曰治蠱毒諸藥毒甘艸節以麻油浸之年久愈妙每用嚼嚙或水煎服神妙

①巴豆毒

其證口渴臉赤五

心煩熱利不止永連等

分為末每二匁凉水調服又

寒水石磨水服

△按中巴豆毒而瀉不止者只以甘艸煎濃汁服之瀉立解是為良方

①河豚魚毒

合卒無藥急以

清油多灌之使毒物盡吐出

為愈或以白礬為末調湯服

按右方雖未試而備倉卒之

搜覽者乎

△按此解河豚毒法載備生易簡方不如濃煎橄欖湯服之更愈

△按解毒七方亦為要緊學者欲成其功宜考全篇今於方書中畧摘數方而備倉卒之需云

附方

解毒丸治誤食毒物一切惡毒不救必死

安

便宜方藍飲子解砒毒及巴豆毒
用藍根沙糖二味相和攪水服
之或更入薄荷汁尤妙

解鼠莽毒枯白礬好茶末等分冷
水調下

肘後解一切菌毒掘新地窟以冷
水於內攪之令濁澄以頃取飲
之此方見本艸陶隱居註謂之
地漿

又方用芫花生為末每下及新
水下以利為度菌之毒者蓋因
蛇虫毒氣薰

治中諸藥毒甘艸生黑豆淡竹葉
各等分
右咬咀用水一椀濃煎
連服

秘方中烏頭天雄附子毒
用大豆汁遠志防風棗肉節糖
並能解之

河豚毒食河豚魚中毒一時困殆
倉卒無藥急以澱汁多灌之使
毒物盡吐出為愈

鱔鱉蝦蟆毒中此三物毒令人小
便秘臍下痛者至死者以生豉
一大合新汲水半椀浸濃汁服

諸丹毒紫背浮萍研傳之

又方赤小豆為末鷄子清傳之

又方青澱汁傳之

又方芭蕉根取汁傳之

又方活蚯蚓七條研爛傳之

治食六畜肉中毒方各取六畜乾
屎為末水服佳若自死六畜
肉毒水服黃蘗末方寸匕

又方燒小豆一升為末服三方寸
匕神良

又方水服甯底黃土方寸匕

治食生肉中毒方掘地深三尺取

下土三升以水五升煮土五六

沸取上浮清者飲一升立愈

治食牛肉中毒方狼牙燒灰水服

方寸匕良一作猪牙

又方温湯服猪脂良

又方水煮甘蚶汁飲之

治食牛馬肉中毒方飲人乳汁良

治食馬肝肉諸脯肉毒方取頭垢

如棗核六吞之起死人

又方燒狗屎灰水和絞取汁飲之

立愈

治食百獸肝中毒方頓服猪脂一

斤佳亦治陳肉毒

治食狗肉不消心中堅或腹脹口

乾大渴心急發熱狂言妄語或

洞下苦杏仁一升合皮研以沸

湯三升和絞取汁分三服狗肉

完完皆出即靜良驗

治食猪肉中毒方燒猪屎為末服

方寸匕太尿亦佳

治鬱肉濕脯毒方張文仲云肉閉

在密器中經宿者為濕脯燒狗

屎為末水服方寸匕凡生肉熟

肉皆不用深藏密蓋不泄氣皆

殺人又肉汁在器中密蓋氣不

泄者亦殺人

治脯在黍米中毒方麴一兩鹽兩

撮以水一升煮服之良

人以雞肉作餅臠因食皆吐下治

之方犀角為末服方寸匕得靜

甚良

治食鷺鴨肉成病胸滿面赤不下

食者方服林米泔良

治食魚中毒方煮橘皮停極冷飲

之立驗肘後方云治食魚中毒
面腫煩亂者

治食魚鱠及生肉在胸膈中不化
吐之不出便成癥瘕方厚朴三兩
大黃二兩右一兩以水二升煮取
一升頓服之

治食魚鱠不消方大黃三兩 朴硝
而右二兩以酒一升煮取一升
頓服之仲景方有橘皮一兩肘
後方云治食猪肉遇冷不消必
成癥下之方亦無橘皮

又方春馬鞭草飲汁一升即消生
薑亦良肘後方云亦宜服諸吐
藥

又方鮪魚皮燒灰水服無完皮壞
乃裝取之一名鮫魚皮古今錄
驗云治食鯪魚傷毒

又方魚鱗燒灰水服方寸匕食諸
鮑魚毒亦用之

治食蟹中毒方冬瓜汁服一升冬
瓜亦可食

治食諸菜中毒方甘脚貝齒胡粉
各等分 右二兩為末水服方寸匕
小兒尿乳汁共服一升亦好

治信毒水粉山砒霜一切殺人之
毒方巴豆去殼壯者十四粒弱
者七牛花椒去目五分甘草五
分共為末涼水化服即時嘔吐
如不吐再服嘔吐或其毒盡出
而嘔吐不止用舊壁土滾水泡
服立止

中河豚魚毒方以尿汁多灌之吐
出毒立止○又方多以甘蔗水
或蘆柴根搗水灌之

中螃蟹毒方生藕汁或者煮乾蒜汁
俱効

中鱧魚姜母方可食解即解之
解蜀毒毒方性大熱啖蘿蔔即解之

紫蘇和氣飲 一

①凡胎前一切諸病宜加減而用

蘇 沂 芎 芩 陳 腹
菝 甘

右入姜葱煎服○一方加參氣
虛者亦可○妊娠胎氣不和湊
上心腹脹痛加蜜○嘔吐不止
是惡阻也加苓伽守砂藿曲蕎

○胎漏下血加芩井伽艾

糯米○如胎漏下血心腹脹痛

者先以芎歸各五分酒煎入童便

一服立止○胎氣不固常慣小

產預服此以固胎元加芩井文

砂寄伽糯米○因事胎動不安

及下血欲墜者加芩參伽苓文

井砂○咳嗽吐痰加桑杏貝○

泄瀉加朮苓○瘧加槲果青良

守苓葛○胎痛加井索文○妊

七八箇月前後面目浮腫加芩

苓澤朮苓丹門朴○口噤不省

人事言語錯亂加辟守苓門遠
菖蒲○心痛加索乳○腰痛不
可忍加紙苗仲○白濁白帶加
芩守苓精蠟龍骨○小便淋漓
不通加翁車滑○大便閉澀加
地連枳○姙至九箇月加枳文
伽釀名達生散○臨產驚恐氣
結連日不下加枳○孕後覺氣
不安或腹微痛或腰作痛或飲
食不美或胎動下血及五六箇
月內常服數劑甚妙加芩文伽
釀參井

按胎前諸病大抵除禁忌藥
則宜隨諸症施治療也必不
拘于此可考諸方者也

△按紫蘇和氣飲變法甚多不及
細舉今擇一二方藥味至迎者以
供參考產寶方同銘無香附有入
參龔氏壽世保元治胎前諸疾併
依此方加減用之腹痛加香附木
香咳嗽加枳殼桑白皮熱加黃芩
泄瀉加白朮茯苓感冒加羌活麻
黃傷食加山楂香附氣惱加香附
烏藥又按許叔微本事方紫蘇飲
亦無香附有入參治姙娠胎氣不
和懷胎近上脹滿疼痛謂之子懸
兼治臨產驚恐連日不下一方無
川芎名七寶散

全又丹溪達生散即此方去川芎香附加人參白朮春加川芎氣虛倍參朮氣實增陳皮香附血虛加地黃當歸形實倍紫蘇性急加黃芩熱加黃連痰加滑石半夏食傷加山楂食後易飢加黃楊腦腰痛加木香官桂黃芩冬不用芩二日胎肥加枳殼縮胎若加黃楊腦名縮胎飲蓋此方補中行滯或難產或胞衣不下或死胎等症凡兼氣滯者予每用此方得効不可枚舉豈唯治胎前之病也耶

附方

安胎飲治妊娠胎氣不安腰腹微痛飲食少進

去大腹皮香附 加白朮熟地

黃芩參條芩砂仁

一方婦人肥盛者多不能孕育以

身中有脂膜閉塞子宮以致經事不調瘦弱婦人不能孕育以子宮無血精氣不聚故也肥人無子宜先服調理藥去紫蘇大腹皮 加茯苓白朮半夏

催生丸方

圖

① 催生湯

候產母腹痛腰痛

見胞漿水下方服

嬰 枳 牡 官 苓 各一

右水煎熱服

催生飲

至胎催生立應

斤芎 腹枳 芷各等分

右水煎溫服

催生散

治難產並胞衣不下

芷炒 百脚霜 滑各等分

右為末前芎歸湯下二三及二

方加甘減半

△王肯堂曰大凡生產自有時候未見時候切不可服催生滑胎等藥或勢不得已則服之然而催生藥必候腰痛甚胎陷下漿血破方可服大凡催生之藥滑以流通澁滯苦以驅逐閉塞香以開竅逐血氣滯者行氣胞漿先破疲困者固血○按此法實催生用藥之準則也若不知此而催之則宋人之振苗其非唯無益而又害之矣

芎歸湯

治臨產難生胞衣不

下及子死腹中惡露不止腹中血刺疔痛一切胎前產後危急口噤垂死等證

沂一芎七

右分四貼每貼用水一盞煎水

將乾投酒一盞半煎五七沸溫

服如口噤掣開灌之人行五里

許再灌盡四貼便省立產神驗

△丹溪云催生只用芎歸湯最穩當又且効捷△附加味芎歸湯王交骨不開不能生產即本方加敗

龜板婦人髮灰右水煎服少時即生如胎死亦下

△新產婦人用之調血歸芎分兩在人所處產後氣弱加入參挾惡血加紅花血暈加入參紅花入童便少許此家傳妙訣也

脫衣散 治胞衣不下

滑 四 各二 近
又 膝 通 又 葵 半

二 加 三
又 枳 又

右煎服

一方去枳加瞿 胞衣不出腹

臍堅脹急痛即殺人服此胞

即爛下死胎

立効湯 治胞衣不出

膝 八 葵 一
分 分

右水煎東井叟常加滑 各等分

△友松子曰婦人產育之間胞衣不出最為急症非比傷寒直中陰經雜症喉痺急速之急也蓋婦人 心竅膽怯凡生產竟胞衣稍遲則 心神促急若更遲緩則心亂神恍 以致氣上塞胸血液逆撞心胸脹 痛喘急垂死者不可勝計醫者臨 時不可艸艸於陳自明婦人良方 奪命丹花蕊石散牛膝散失笑散 無憂散益母卽丸皆可擇而用之 予以紫蘇和氣飲治之數効請度 其理

生神散 治產前後氣沉眩暈

蒲 大 參 中 三 甘 小 一
一 分 分 分 分

陳氏婦人補血

右為木白湯下

△按生神散惠德方治產後血暈之奇藥也蒲黃以治瘀血作暈人參以補血脫作暈甘柳以緩神虛作暈是三味所以有生神之名也

生氣散 治產後氣逆上

百柳霜一味此以白湯下

按催生立効等湯宜放銘又

芎歸生神生氣等湯宜續銘

是當流之口授心傳也

△按百柳霜治產後氣逆上是亦不過治血瘀而耳所謂血見黑必止乃從心之理也然當用童便送下尤妙一以潤其燥性一以籍其

速降而使血歸源矣如氣逆上又當理氣

附方

局方榆白皮散滑胎易產治妊娠曾因漏胎去血或臨產驚動太早產時未至穢露先下致使胎胞乾燥臨產艱難

瞿麥冬葵子榆白皮木通牛膝大麻仁

右為粗末煎服

局方催生丹治產婦生理不順產有艱難或逆或橫並宜服之大有神効

母丁香一匁麝香二匁兔腦隨用者乳香五分

右拌勻以兔腦和圓如雞頭穰大陰乾用油紙密封貼每服一圓溫水下即時產下隨男左女

右子中握藥圓出是驗

催生龍蛻散

大蛇蛻蟬蛻滑石葵子末之每服一匁順流水煎湯服

香桂散下死胎

麝香官桂

右牉相勻溫酒調下須臾即下

一方治胞衣不下

川牛膝當歸木通滑石黃葵子

右用水煎連進三四服立下

伏龍肝飲治橫逆不順子死腹中

用伏龍肝

右為細末溫酒調下二錢其

兒頭戴土出甚驗

三退飲治胞衣不下

蛇退蚕退紙蟬退

用瓷瓶盛燒存性細研順流水

調服立下

千金治難產方

槐枝榆白皮大麻仁瞿麥通草

牛膝

右六味段咀煎服

千金治產難累日氣力乏盡不得

生此是宿有病者方

阿膠二兩赤小豆二升

右二味以水九升煮豆令熟去

滓內膠令烱每服五合不覺更

服不過二服即出

千金治胞衣不出方

取小麥合小豆煮令濃飲其汁

立出亦治橫逆生者

補虛 七

①產後補虛用參朮芪陳近芎
甘發熱輕則加苓淡滲之其熱
自除重則加朮又云新產不可
用芎以其酸寒伐發生之氣
之內只以芪易芎如腹痛者用芎
而不妨按芎藥酸寒收斂行
秋金之令未若苓連
之昔寒而丹溪曰新產後勿用
芎藥恐酸寒伐生生之氣蓋藥
之寒者如芎藥猶諄諄告戒其
於苓連昔寒肆用而不忘者人
賞何
如

按新產補虛之聖藥也○新
產後惡寒發熱眼暗不知六

事汗如浴脉滑加朮而煎與
生神散則漸隨服而愈

公友松子曰丹溪云產後以大補
氣血為先雖有雜症以末治之好
生君子知斯法言則於產後保養
何難之有

附方

惠德方生神散治產後血暈氣道
不周手足逆冷愴不知人症屬
瘀血作楚者
炒蒲黃人參各一 焙甘州少許
右為末每服五分白湯送下

芎歸調血飲 五

①治產後諸疾宜加減而用之

沂芎 芍 洋 伽 苓

陳 侯 甘 炒

右入姜棗水煎溫服 初產臨服加童便一

鍾好酒半鍾同服是 能行瘀血退熱如神 ○產後昏

曠不語加荊 ○口苦咽乾加門

○看氣惱加蚤慈 ○發熱不止

加承 炒 ○生腸不止加芪參 ○

咳嗽加會杏 ○兩脇痛加童桂

○吐痰加守貝 ○嘔吐不止加

砂守去芋 ○盜汗自汗加芪酸

炒 ○泄瀉不止加芪承 炒 去芋

○瘀血不行心腹兒枕痛加官

蒲會牡土術 ○去血過多頭暈

暗加荊參承 炒 ○胸膈脹悶加

砂實查杜 ○惡露不行加蔚牡

入童便和酒服 ○小產後心腹

痛去伽苓加索牡嬰紅童蘭 ○

驚悸怔忡加遠門酸

按產後諸疾先為加減消息

而可用之若不驗則可考諸

方矣

△按壽世保元此方加炒黑乾姜

號歸朮保產湯治產後諸病 有論

氣虛加入參去血過多加芎歸干

姜小腹陣痛加延胡桃仁紅花蘇

冰甚者加一二稜莪朮 醋 惡露不行

加益母草牡丹皮桃仁入童便酒同服咳嗽不止加五味子桑白皮
公醫鑑芎歸調血散乃襲西園之方也即
本方無芍藥石烏藥黑姜益母草
丹皮即此方也

附方

一方治產後消渴飲水不止

本方去白朮陳皮香附 加麥

門冬五味子知母

一方治產後胸痞腹脹

去地黃 加半夏砂仁厚朴

一方治產後癰疾

去地黃香附 加柴胡

一方治產後痢疾不間赤白

去地黃姜棗 加木香神麴乾

姜

一方治產後泄瀉

去川芎地黃香附 加入參乾

姜澤瀉厚朴砂仁

一方治產後咳嗽喘發熱

去白朮香附 加半夏枳殼桔

梗前胡蘇梗乾葛人參木香

當歸川芎湯治小產後瘀血心腹

疼痛或發熱惡寒

去白朮茯苓姜棗 加玄胡索

桃仁紅花澤蘭牡丹皮童便好

酒

分挽萬金湯治產後諸症以補氣

血為先若見雜症宜加對治之

藥如風加荆芥寒加姜桂暑加

麥門五味濕加蒼朮瘀血作楚

加延胡紅花氣道不順加香附

烏藥之類百般變法由乎人也

本方去香附 加入參沉香益

母艸

消癰湯 五九

①治小兒癰疾發熱口乾尿赤

參 朮 苓 守 柴 苓
猪 澤 胡 蓮 門 稜
莪 查 甘

右姜棗煎服以立効○如癰病
日久元氣虧損此方不効宜多
服醫王養正積自除

按小兒癰積之主方也

△按此方原無麥門冬醫鑑名淨
附散乃龔氏方治小兒腹中癰塊發
熱憎寒口乾小便赤大便稀澀或
腹脹腫滿或咳嗽喘熱不思飲食

面黃肌瘦四肢困倦等症 此龔氏
賢人之論

附方

參朮肥兒丸治癰塊發熱王道之
劑久服除根

人參 三錢 白朮 三錢 白茯苓 三錢
黃連 五錢 史君子 四錢 神麩 三錢
查麥芽 甘 卍 黃連 各三錢 直蘆薈
二錢 半瓦 盛泥 封置
土坑 谷糠 火 照 透 用
右為末 陳小黃米 粉 糊 為 丸 某
豆 大 每 服 二 三 十 丸 米 湯 下
按右方治癰疾攻掠兼補多服
收功

消食散 空

①治小兒傷食腹痛或脹滿或

宿食不消，面色黃目無睛，此藥能調和胃氣，乳哺消化。

查曲 砂芽 伽陳 青甘

右入姜煎服。○受寒作痛，加藿

吳○有熱加艾

按兒傷食之三方也

△按醫鑑曰：小兒腹痛多是飲食所傷，治宜和脾消食。即本方有香附米七分餘，藥各著分兩，右為細末，每服一錢七量，大小清米飲或白湯任下。

附方

快膈消食丸 寬中快膈消乳食正

顏色

本方去山查白朮青皮 加二

稜菝朮香附

大安丸 治食積酒積

去青皮甘呷 加半夏白茯苓

連翹萊菔子黃連

消乳丸 溫中快膈止嘔吐消乳食

脈沉者傷食不化故也

去山查青皮白朮 加香附子

一方治小兒吐瀉黃疸

去山查砂仁 加二稜蓬朮黃

連茯苓

鎮驚散 空

治驚風搐搦痰嗽喘熱

和方見... 行

星 芸 蟬 苛 甘

右入姜煎服

按急驚之主方也初發時予

與九文加定香錄而取驗多

全按壽世此方有白附子共六味
名南極壽仙散

附方

保生丹治小兒慢驚尚有陽證

本方去薄荷甘艸 加全蝎白

附子白姜蚕琥珀麝香朱砂

化風丹驅風化痰退熱定搐

牛膽南星羌活獨活天麻防風

甘艸荆芥人參川芎

右為末煉蜜為丸薄荷湯化開

服

祛風散治卒暴中風不能言全

眼喎斜驚癱搐掣痰實煩躁補
昏有熱睡臥不穩

去蟬退薄荷 加半夏黃芩

抑肝散治肝經虛熱發搐或發熱

咬牙或驚悸寒熱或木乘

嘔吐痰涎腹脹少食睡臥不安

者

當歸一錢川芎一錢白朮一錢茯苓

柴胡五分鈞藤鈎一錢甘艸五分

水煎子母服

一方治小兒發熱驚啼

防風蠟退白芍木通車前赤茯

苓麥門冬甘艸

用燈艸水煎服

醒脾散 三

①治小兒吐瀉不止作慢驚風
脾困昏沉默默不食

參 伽 苓 蜜 全蝎

定 喬 白附 甘

右姜棗煎服

按慢驚之主方也

△友松子曰慢驚慢脾逆寒之候
急驚搐搦暴烈之症醫工臨病要
察虛實冷熱四候慎毋把定一途
而治庶無枉死者矣夫大抵急驚易
瘳慢驚難痊至於慢脾危篤之疾
雖如手莫易治焉後生未經歷斯
急症者切不可輕試藥餌方一醫

壞人命天譴誰執當舉賢才為之
救濟故曰醫仁術也

△俞嘉言醫門法律癇病論曰如
小兒之體脆神怯不耐外感壯熱
多成癇病後世妄以驚風立名有
四症生八候之鑿說實則指癇病
之卒口噤脚攣急者為驚風之搐
搦指癇病之頭掣手勁者為驚風
之抽掣指癇病之背反張為驚風
之角弓反張辨科倉然宗之兩家
坦然任之不治外淫之邪反投金
石腦麝之藥勾引外邪深入內藏
千中千死從未有二救者可慨也
矣俞氏此論實有超世之見醫者
臨急驚之候留心而悟之未必無
小補也

附方

一方治慢驚風子母俱服

本方去木香丁子白附 加陳皮薄荷半夏細辛

全蝎觀音散治小兒外感風冷內傷脾胃嘔逆吐瀉不進乳食久則漸漸羸弱

去白朮丁子白附 加防風黃芪白芷羌活神麴石蓮肉白扁豆

加減觀音散止吐瀉截虛風 去丁子白附 加黃芪石蓮扁豆羌活防風

調中散治傷食瀉凡此瀉不宜硬補先用食藥或紫霜丸取其積盡然後可補

去全蝎天麻白附 加乾姜藿香葉香附子縮砂仁

直指銀白散助胃驅風嘔吐作慢驚候者通用

去丁子 加蓮肉扁豆藿香陳米

吉州醒脾散治小兒慢驚神昏目慢多困有痰

去丁子甘艸 加姜蚕

徐氏醒脾散治吐瀉脾困不食痰作驚風

去丁子 加石菖蒲石蓮肉

大醒脾散治吐瀉脾困不能食痰作驚風

去白朮天麻丁子 加南星陳皮蓮肉陳倉米

湯氏醒脾散治吐瀉不止痰作驚風脾困不食

去丁子天麻 加陳皮半夏南星陳倉米

天醒脾散治慢脾風內虛昏悶不省

去天麻 加南星陳皮石蓮肉
砂仁陳米

消疳飲 固

①治小兒疳疾身熱面黃肚大
青筋瘦弱

參 伽 苓 胡 連 曲
連 青 陳 砂 甘

右水煎服○傷食加查○有蟲
加史

按諸疳通治之方也

△按錢仲陽曰諸疳皆脾胃之病

內止津液之所作也因太病或吐
瀉後醫又以藥攻擊泄下致脾胃
虛弱以失津液且小兒病疳皆愚
醫之所壞病云云予謂斯言深中
病源每用錢法調治獲效最夥故
書之以為同志之進戒

附方

張氏神效散治小兒諸般疳

本方去白朮胡黃連黃連青皮
砂仁 加大黃芍藥桔梗川芎
厚朴枳殼

養脾丸治小兒氣血未周因食積
致成疳疳

去茯苓胡黃連甘脚 加當歸
川芎木香山查麥芽

香橈丸治小兒食積面黃肌瘦肚
腹膨脹飲食不思心腹疼痛時
常嘔吐泄瀉肢體倦怠

去黃連胡黃連 加麥芽三稜
菝葜木香香附山查厚朴白姜

養老 固

①丹溪之母年踰七十旬素多痰
飲大腑燥結小水短少故制一
方

參 伽君 膠 芍臣

陳 苓佐

春加芍夏加會冬加歸身
倍生姜一日或一貼或二貼進
此藥則小水長如舊是卻病捷

法也

按予之父年八旬一便不通
以醫王煎與六味丸而安謹
于醫爾以來與此湯至今無
病是乃延壽妙方也

△李南豐括曰

老人無非血液衰 火動風痰百病催
亦有脾虛多積滯 溫和丸散可扶培

按養老門中不可無此調理又曰萬
般補養皆為偽唯存操心是要規
予謂後一可誠格言也然而攝養
之藥不可不知上壽之人血氣已
衰精神減耗危若風燭百病易生
當審諸前輩全篇調治之法斯可

①醫方數百千萬愚慮依短才
而有功方漸採摭一百二十以
為衆方規矩蓋診脈察證則先
與此一方而後考諸書施深治
宜救沉痾矣

△友松子曰醫方數百千萬唯摭
一百二十方而號衆方規矩者乃
名不稱實知言者必冷笑也如曰
診脈察證先與此一方後考諸書
施治又似海裡摸月再發一笑

衆方規矩刪補卷下 終

後序

醫道坦平設使面門具
眼安有跌仆之患藥方
幽微若教胸中生茅寧
免殺人之罪耶茲書肆
梓行一冊名曰衆方規
矩正眼觀來大似名不
稱實焉予恐瞎却醫流
心目以故婆心熱血弗
能默止乃與陶泓管城

陳玄數輩商議的確或
刪或補遂圓一件公案
雖非作家翫索也是後
學規模志斯道者信受
奉行則手執筵刃而方
圓有成之日在云延寶
丁巳人日友松子跋

齋齋齋

不匹

刪補衆方規矩跋


是書之行于世也舊
矣予祖君友松子懼
夫末學之不知是非
而妄用之以誤人焉
刪其可刪補其可補
一歸諸正其功不可
勝言既而罹于享保
甲辰之災刻本灰而

不存惜哉頃日書林
村上氏請再梓之可
謂獲予之志於是書
其事而為跋昔

元文二年歲次丁巳季

夏望日

北山壽齋謹書



德 泉 洞 藏 版

刪補衆方規矩

全部四冊

刪正頭書大成論

全部一冊

增補古今方揮

全部壹冊



元文貳歲丁巳正月吉日再彫

攝陽書房

村上清二郎

東都書舖

植村藤二郎

皇都書林

植村藤右衛門

