



日用功方卷之一 增補燈下集

敬迪院

中風一

○大芫 大秦芫湯 中風外無六經之

形証內無便溺之阻隔知血弱不能

養筋故手足不能運動舌強不能言

宜養血而筋自榮此方主之

芫 芫 白芫 膏 獨

苓 苓 風 苓 芷 朮

生地 熟地 各五 細 二分 甘 如過

加生 姜三片 如 心下 痞滿 加 實一錢

此方血ヲハナヤカニシテ筋ヲ養手足

痿腰ヌケ舌痿不能言用是皆血虛

也





一中風養生藥ニヨシ併脈微細ニハ
用石文入故ノ常一息災之人氣
脈浮大數ニシテ元テ中風生セント思時之
養生藥ニ用一段吉也左右不分用
テヨシ

一此方之症ニテ脈微細弱ナクハ回春
中風門ノ養榮湯ナト用テ吉
一緩風ニ吉ソ四肢麻木シ肌肉𦐇動
スルニ二年之内ニ中風スト古人モ云リ
是緩風也此方用吉ソ又差活愈風
湯ニ証也其内脈モ是ニ表証有ハ
勻氣散佳也又ホレト風熱盛ナラハ
防風通聖散黃連解毒湯之症也脈
モ洪大熱甚ハ猶以ノ夏也

一惣別頓死ニ口開尿利スルハ死ス
一中風之如クメ舌強難言内々養
熱モナキハ中氣ト云ソ此方差今去
用吉方ソ中風ニハ必痰アルモノ

一此方ハ足痺レ舌強テ難言内々養
生藥ニ吉方也方考法論ニ有

○大風 大防風湯 去風順氣活血壯

筋又治痢後脚弱緩痛不能行名
曰痢風或兩脚腫痛足脛枯腊名
鶴膝風一切麻痺痿軟風濕水虛
之候服之如神 風熱地 眠
芪 白苟 仲 各一 木 半 羌 參
膝 各半 附 各半 甘 半 姜 各半

古方之内テノ痿症之方也溫補之



也附伸有故也

一腰ヌケ又ハ無力身ヒレ痛脚痛吉
畢竟血虛ノ潤カヌ中風ニシト
思時用テヨシ 氣行ニ補血方ソ
一刺後ニ足弱ク細クナリ膝計腫出フ
トクメ痛ニヨシ

一又痛風濕痰熱經絡ニ傳至腰脚
痛又ハ鶴膝風ニ吉鶴ノ足々々細
ナラ云

一或ハ五十余歳患脚痿不能行甚
痛此方ヲ用事十八貼メ行歩如旧
氣快然タリ

一或ハ太病後兩足痿弱ノ少痛脈無
力此方ニ入姜用事二十余貼ニシテ

安正傳法論有

○羌愈 羌活愈風湯治腎肝虛ノ筋

骨弱語言蹇澁精神昏憤安
心養神調理陰陽使無偏勝治

中風内外無邪服之以行中道

羌 風 苁 苁 蔓 苁 細 枳

熟地 參 麻 苁 苁 歸

知 苁 地骨 梅子 独 芷

仲 苁 柴 半 前 已 各 三

苓 苁 芍 各 四 膏 生地

蒼 各 六 枝 一 分

中風セハ先表ヲメクシ裏ヲ通メ切後
ハ各養生藥ニ吉方ソ

一日之上下眇ビクメクニ吉又脉モ

吉 羔今^ニ生^ニ下^ニ之^ニ藥有故^ニ
想別藥味多^ニ方ハ言語^ニ不及^ニ古人^ノ
不載能^{アル}モ^シ

一 天陰^イ勝^シ騰^ト騰^ト之時又南風之雨^ク時
発スル頭風^ニ用^ニ事^モ有^ニ又眩暈^ニ血
スル頭痛^ニモ用^ニ事^モ有^ニ些中風^ノ心^{アル}ハ
幸^ニ事^モ也

一 又未^ダ中風^ニ不^レ発^ニ足弱^ニ中風^ノ心^{アル}有^ニ云^ニ
吉

一 畢竟^ハ肝腎之真水^ニ虚^ニ筋骨痠^ニ
不^レ叶^ニ吉^也

○烏順^ニ烏藥順氣散^ニ治風氣攻注^ニ四肢^ニ
骨節疼痛^ニ遍^ニ身^ニ頑麻^ニ凡^ニ卒中^ニ
手足癱瘓^ニ言語^ニ蹇澁^ニ者^ニ六^ニ先^ニ宜^ニ

服此藥以疎氣道然後隨証投風

藥

麻^ニ陳^ニ烏^ニ各^ニ二^ニ蚕^ニ各^ニ二^ニ芎^ニ各^ニ二^ニ芷^ニ
甘^ニ桔^ニ枳^ニ各^ニ一^ニ姜^ニ各^ニ半^ニ姜^ニ各^ニ半^ニ姜^ニ各^ニ半^ニ

一 中風^ニ六^ニ先^ニ表氣^ヲ順利^ニ能藥^也此
方必用

一 卒中風^ニ六^ニ先^ニ八^ニ味順氣散^ニ十^ニラ
六七貼或八十貼^ニ毛用氣^ヲシ^ニ後^ニ
此方^ヲ用表^ヲ順^メ吉

一 有^ニ膊背^ニナ^ニ麻痺^ニ不^レ仁^ニヒ^ニリ^ニ痛^ニ
カヒナ脚氣^ニ上^ニ六^ニ此方^コ

一 回春頭痛^ニ門^ニ之^ニ回首^ニ散^ニ之^ニ上^ニ項^ニ三^ニリ
ヒ^ニツ^ニリ^ニ痛^ニ三^ニ頸^ニニ^ニワ^ニ又^ニ三^ニ抽^ニ羌^ニ凡^ニ加^ニ吉

一 中風^ノ口眼^ニ手^ニツ^ニリ^ニ此^ニ彼^ニ動^ニ此^ニ

用切々治多余方未試也

一婦人兒二手枕ヲサセテ風ヲ引中風ノ如ク不仁酸痛ニ多分此方ヨリ又

五積散ノ症モ可有可依時

一中年之男子常ニ過酒之人也患中

風俄ニ口咽舌強リ言語ツカヘブリ

鼻塞リ頭痛脈浮滑也此方用事

二十余貼過半安後八十七貼余

愈也

○聖 防風通聖散 治諸風潮搐手足

痙瘓小兒急慢驚風大便結閉邪

熱暴甚腸胃乾燥寢汗咬牙上竄

睡語筋轉驚悸肌肉蠕動風

藥 級 芍 大 芒 翹 荷

麻各七 膏 梔 桔 苓 木

荆各半 滑 甘 各半 姜片

中風之方也風熱ニアリ不知人事

脈洪數ニ成テ熱ノ有用也夫中

風ニ不限一切驚狂譫妄スル病

屬熱ヲ治脈洪數ニ有テヒツトラ

ル用テヨシ此風熱也玄治此方ヲ

用得効也

一氣虛脈弱ハ八味順氣散ホト物

忘スニモ八味順氣散此方ノ症ト

ニキル也

一此方狂病ニ用在病多ク皆風熱

也常ニ去芒其ヲ減メ用也在ニ

其用解毒湯モ吉先此方ヨ

眼ニカド立ハ在氣上可心得或大
氣湯ナレモ用皆熱實之證ナルニハ
熱實下ス藥ヲ用也三焦之熱ニハ
黃連解毒湯ヲ用也

一疔瘡撲損ナレモ用ニ吸大シ倍テ
最亦癰ノ類ニ大ナク去レトアレ
共其良也

一癰瘡ナレハ先此方用ヨ又回春病
風門ノ通天再造散モ用其中ニモ
通天再造散用テ後ニ此方用佳也
又楊梅瘡之久不愈可用妙也
一格致之瘡瘡許文懿公之丹溪配
劑モ是ノ回春加減有立方本指ハ
方考之文有

一風熱之方也五積散ト表裏之方
也春夏之溫病熱病專用ノ河間
所作立方也仲景桂枝湯冬如用
春策モ專ヲ用ル

一此方益元散ト合ノ双解散ト云也

一明石之人ガクテ煩ヒ卒中風口
噤不知入脉モ弦數洪大而ヨク
ト言時々驚玄冷公此方用テ
治テ各予モ如上文病ヲ治畧
乏物別氣虛々中風脈モ弱キニ
八味順氣散吉又中風之証又餘病ニ
テモホレテ物忘スルニハ此方吉故大
緊風熱心竅ニ壅リ居ルニ也大方
此方ノ証ト八味順氣散トハ証ト

ル故也

一有丁婦人歲三十余久口邊鼻中
引數年生瘡痛于時耳中ヨリ血
出眩暈上気胸塞脉弦大而必動
病甚則脉洪數此方用大半愈
後清心導痰湯用耳中ヨリ出血
止也

一有一人時疫毒耳前後腫痛一医用
小柴胡湯加小母軹治不効
予風熱心得此方一貼二大半
愈三貼三安全也

一男婦實症三日ヲヤ三或ハカス或
ハウヒカリ別ニ余症ナクモ實症
サヘミタス此方五十貼モ百貼モ

アタヘテ愈フ

○除濕 加槭除濕湯 治中風右半身

不遂手足癱瘓及筋骨疼痛

參分 木一分 苓一分 飯一分 川八分

赤芍 陳半 蒼 烏 枳

連 酒炒 苓 酒炒 羌 各一分 芷 九分 桔

防風 各八分 身痛加姜黃脚

痛加膝已歲仙

○加潤 加減潤燥湯 治中風左半身

不遂手足癱瘓及語言費力呵欠

噴嚏面自口眼喎斜寬弛頭目眩

暈痰火熾盛筋骨時痛頭或痛心

悸 飯一分 芍 木 苓 南星

姜 半 汁 天麻 各一分 白芍 酒二

生地酒炒 熟地姜汁炒 陳塩洗 藤酒
酒分 酸各八 桃花 羌風 薄桂
紅花酒洗 相酒三 芍分 四分 瀝姜汁
手小 遂倍 芩薄 圭足 不遂 倍相
膝

○加大 加味大補湯 左右手足皆癱瘓

者此血氣之太虛也 宜此五芪 養灸
參木 苓 飯 芎 白芍 酒炒
熟地各一 大附 沉 木各三 烏
膝酒 仲酒 瓜 風 羌 獨 薏
各五 桂 其 各三 姜 重

右之三方或八左或六右 纏綿不
用方也其內見分テ脉毛尤ラ大
秦九 湯吉

○小續 小續命湯 治暴中風不省人

事漸覺半身不遂口眼喎斜言語
蹇澀肢體麻痺神情昏亂頭目
眩暈痰涎多 東垣曰中風自汗
故三此藥亦不可輕用 者不可重發其汗
仲景曰汗出則止藥

麻 參 文 時 芎 杏 已
圭 風 鉅 各一 付 五分 全八右ノ
已 桂 芩 杏 白芍 芎
鉅 麻 參 各一 四分 風 附 七
姜 重

風症ニテ肩背痛ハ九文 羌活勝温湯
ヲ用テ不効ニ此方吉 惣則肩ニカ
ワス脚氣手ナトノ痛ニ用之 又中風ニ
テ身節痛ニハ尤用ノ

一人患泄瀉色々參白朮散
苓湯金鎖正元丹ナトラ用テモ不
時此方用テ平愈シタリ泄瀉ニ用
ハ事書物ニモ有吏ソ

傷寒ニ

シノ香蘇散

治四時傷寒頭痛發

熱惡寒

水

各二

貴

其

少姜葱

蘇ハ頭痛上気止嘔吐止中積吞酸

氣病ニ良 蘇ハ明胃口進食行

氣表ヲ開ク又クツロケテヨシ

貴ハ嘔吐酒積ヲ治消酒毒去痰

胸塞

一氣藥也發散ノ心ハ多クナレ能表

氣ヲ行シテツロクル故發散之心モ

アルナリ發散スル藥ノ内テハ輕劑也

第一氣ヲ行シ氣ヲ快クスル藥也芒

トシテ氣惡ク蒸々トシテ發熱頭痛

ナトアルニ吉

一耳中ホウクシテ氣惡頭痛眩暈

アルニ必ス用也

一咳嗽痰熱指引ノ時參蘇飲ニ驗

ナキニ結句輕此藥ヲ用テ可也

一此方ニ加丁子蔻酒積ヲ治方也

又惡心吞酸胃膈ツカエタニ吉

一此方ニテ芷ヲ加テテ芷香蘇散ト

名諸頭痛ニ吉中ニモ氣鬱ノ頭痛ニ

專吉其外諸痛ニモ吉

一有馬之湯タリニハ大畧此方吉心
氣又ハ湯之出入ニ風引故ニ吉感水
濕名故ニ痰虫上ヘアカルエ也予驗
ルニ數人無不治今奉一人

一二十余歳男子一七日之間入湯惡
寒發熱頭痛咽乾ス予思ニ湯之
出入ニ風引又湯濕傷腠理名ト心
得テ禁与三四貼平安ス

一此方ニ神葛湯合シテ香葛湯ト云
也頭痛咽乾ニ一段トヨシ又何トモ
胃脇腰痛咽乾キ不止腹痛脇
痛之療治シテモ不驗ニ此方或不
金正氣散ナトニテ行氣表解ノ吉
事切有他医如此事ヲ不知此

意ハ風濕ナト滯腠理四肢ヲ煩氣
而發散スル心也

一脚氣不腫不瘦而痛ハ氣也又腫
有テモ防已ナト加使ソ与病不異
藥也

一此方ニ兵瓜ヲ加兵藪散ト名脚氣
方也

一痛風カ風毒カヤウナニ此方凡藥ヲ
三十粒五十粒程与ヘテ愈タソ下焦
故凡藥スル也

一或婦人三年間病作時ハ上氣回テ
赤心惡シ他医深ク思テ療治ソ不
治予此方二三貼与テ吉

一病人ニ腫氣ナト有風引頭疼而

熱出咽乾腹脹名二齊木ナト加

用吉温之タメニハ加蒼ヨレ腹脹タ

ルニハ香葛湯ニ蒼ヲ加用ソ

一香葛湯ハ諸病ニ湯茶ナトウシテ

多吞發挑脈動數有ニ可也又香

蕪散ニテモ有効

一婦人病ニ此方多用夏有又正氣天

香湯表裏之藥是モ發散上へ劑ニモ

アズ變方也酒ナトシテ胃ツカヘ足

一婦人咳嗽ニハ參換飲ナト用不治ニ

此方可也

一鼠ニ傷ラタル人輕ハ此方重ノ頭痛

ニ熱有ハ九文吉即鼠之齒ニ挑毒

アル故也惣別蜂蛇ナトノ類又

虫獸之比ニ傷ラタルハ皆熱

毒アツテ内ニ入トコロエヘキ也

是モ外感也風邪ナトニ傷ラレタ

ルト同レ事也早ク蓋ラヌハア

惣別此等ノ毒ニアタリタルヤ

金瘡何ニテモ早ク蓋ラヌハ先ツ

愈テ四五日モシテ後熱氣出テ

痛ミ腫物トナリ

一男手ヲ鼠ニ被破二十日ハカリ

過テ熱氣出腹痛ミ甚シウシテ

自汗盜汗ス是水毒裏ニ入ト

心得テ黃連解毒湯ニ二三貼ア

タヘテ腹痛ミ止テ後ニ當敗ハ

黃湯二十貼ハカリアタエテイユル

此用タ心ハ解毒湯ニ丹ヲ去

飯者地ヲ加タルモノ也即チ芪

ニテ表ヲカタメ自汗ヲ止メ竹ニ

温養心栄血盜汗ヲ止心虛ヲ補

フ故也地ハ其血ヲ潤ス者也不

毒内ニ感ス血乾故ニ別ニ使テヨ

一歳ナトニクワレタルヤ又ハ何ナリト

モ害傷セラル事近日ナラハ熱

毒淺トコロヘテ香薷散參薷飲

九文ノ類此ニテ表ヲ解シテヨ

程ヘテ火熱裏ニ入ハ可腫痛

毒深入トコロエテ黃連解毒湯

ナトヨレ一偏ニ不可用也香薷

散ハ輕發散之劑也此方ヨリ

參薷飲ハラモク參薷飲ヨリ霍

香正氣散ハ重ク霍集自正氣散ヨリ

ハ九文次第ニシモキ也

一陰証傷寒ニ四君子湯ニ附子ヲ

加ヘ汗出テ解ハヨシ不解ハ結

句此方ニ塩ヲ加ヘテ用ニハ陰

部ヘ引入センタメナリ香薷湯ニ

同シナリ

一補藥血藥或ハ附子烏頭之熱

藥ヲ用テ長々療治スルニハ間ニ

ハ必ス此方ヲ用テ氣ヲ行ラン

藥氣之積リヲ散ジ毒藥ヲ解

也

一四時不正之氣行ハレ兩脇流

之不食スニモ此方ニ白豆宿ヲ加
可用能食ヲ進ムモノノ胃口ヲ開

進食藥也

一食傷外感寒惱怒相冲ハ即チ此
方ニ加烏芽羌奴麻也

行氣香積散之証也回春飲食門
二有又治傷寒感寒不食夾氣
症

一頭鳴頭眩不能起身熱シテ頭痛
シ口屬キ不食スル香葛湯此方

吉

一魚肉ニ傷タル此方ニ生姜加陳多
入テ吉或山查ナト加テ吉

一此方ハ發散之藥ノ中ノ輕キ方也
惣ノ多年ノ病者ニ重キ藥ヲ用藥ツ
カヘタルノ有用テ良

一傷寒裏証ニ用ケ有シハ表邪未悉
去裏ヲ早ク攻テ裏熱ハサレモ表邪
未出甚シク病重ク見香薷散或ハ參
藿飲用テ表ヲ發テヤレハツカテ愈

事有是人ノ不知也又曰裏熱
モ表ヲ發テサル事有シハ金ノナ
リワクニ蓋フトレハザル心テ表ヲクツ
ロクハ内熱モノニツイテ去リ秘也
一七十余ノ人過酒持寸白此方ニ我
曲良加ヘ用

一醫書大全徐同知加減法私按維

加減繁多草法當流三不信故按
要者婦人經水將行先寒熱加工
婦人產後作虛熱不退煩渴加參
地傷風不解耳內出膿血疼痛
加羌活私加九柴佳也瘧寒多
熱少或內寒外熱骨節疼痛
四肢作痛此方佳也甚有神効也
○十神湯治時令不正瘟疫妄
行或四時感冒風熱頭疼身痛
寒熱汗無汗陰陽兩感並宜服

之
麻 芎 藭 葛 升 芷
陳 莎 姜 葱

此方乃正香薷散升葛根湯上合

麻加へタル方ノ香薷湯ニ似タリ

一感冒咳嗽頭痛汗難出參藜飲

ナト用テモ汗不出頭痛其時用此方

一傷寒サウテ久シ熱氣去カ子テ汗モ

不出口乾頭痛ス後ハ班必出ルモ

其時此方必用決寒藥ヲ用ル事

ナカレ也班出而可然ト思時此方

用吉

一右ノ様症ニ友竹此方ヲ用タハ班一

身出ルノ加様ナトハ切者故ニ而

後正意曰虛ニハ加參化班湯名

此方ヲ用一貼ニシテ死ト也能ク可

心得也

○十藜參藜飲治感風頭痛發熱

嗽聲重沸嚕稠粘大解肌熱寬
中快臍或八旁察潮熱得來並能

治之

陳 苓 各二 藕 葛 詩 半

前 各一 奴 各一 木 六分 耳 姜 三

本方ニ參二分入也常ニ八分入故十藕

飲名ク

一全曰此方ハ四時共ニ用咳嗽風痰ト

胸痛ニ中ヲ寬ク調脾胃進食順

氣之方也感冒発散之方也香藕

ヨリハ重大肚ヨリハ輕

一小兒痘疹疑似之間ニ用テ吉

升葛根湯モ用但兒草卧タハ

惺々散吉私曰雜著次序丹溪小

兒痘瘡治法第三圈之下ニ熱甚ハ

則人參敗毒散モ用ト有此方痘瘡

用時ハ蜜ヲ去ソ表熱甚故也

一此方ハ第一痰ニ吉ニ陳湯ヨリ出タ

一參入心ハ此藥之証ニ衝氣ノ虛タ

者有ソレニ用又ハ氣ヲ廻ス爲也又ハ

氣弱ノ藥カヲハユブ力無ニ入用ソ併

回春小兒咳門ニ肺實有邪ニ去參

ト有

一此藥ヲ用テ班ノ出ル事有何以テ

表熱甚キ木ノ入故力又芦菴家ニハ

木必ス去ルト云ソ

一傷寒七八日発熱シ小柴湯類ニ寒

藥ニテモ不効熱甚ク裏ニ入テ妄語

ナト有テ脉数ハ解毒湯或京瀉散
之証ニ此方佳也心ハ表塞ニ熱有
故ニ此方ニテ表ヲ開テ吉可秘解
毒湯ノ証ニ先此方ヲ用事有テ午
ト解毒湯ノ証ニテ證語ヲ口乾唇烈
脉数脹滿モセハ先必解毒湯用也
若不治ニ此方ニ文廷加吉ノ是
モツト熱氣ヲサミタケハ柴連苓
ヲ加テ吉又大便ノ難ハ大柴胡ノ証
也

一咳嗽漸々勞瘵トナルニ吉方熱裏
熱ニ用回春咳嗽門十難飲ノ下ニ
勞瘵トナレトスラ治ト各々

一痰ニテギ胃苦ク痰涎胃ニツカユル

ヲ開必ス此方ヨキソ又依症茯苓
補心湯モ吉ソ

一小兒咳有テ急驚風之初發ニ先用或
胃工痰氣ソクハタルニ吉可秘虛弱ニハ
參其低入痰氣衝上ニハ參ヲ去ニテ

可也

一感冒シタラシキナリ方咳ニ成ヲ能
治ス

一茯苓補心トハ此方ニ四物湯合シタモ
ソ咳嗽又吐血スル吉專婦人ニ用
方也

一懷妊之傷寒ナト發散シタム此方
用ヘシ餘方ニテハ胎ヲオトス然レトモ
奴ハ其人之虛實ヲ見テ可用マハ也

ハ胎ヲオトス上云説アレモ非也中言
誤也用テ誠ニ不苦也道ニ能毒
不見只依人可然者モ有不然
モ有木ハ上達スル者ノ前ハ子ヲ
ホソラスノ常ニ參不可服心ハ手
大陰肺經ニ入テ火トナルト云事雜
著ニ有殊ニ況ヤ咳嗽喘急ナニ
ハ不火克金也岑ナト加肺清
吉ソ

一 小兒疹ノ後身熱ニ便瀉ニ不食咳
痰ニ去奴ヲ

一 瘧熱多々寒少々咳嗽ヲカヌニ吉ソ
一 啓云傷寒瘧不升時十蕪ヲ用瘧
ナハ汗甚ク出テヨシ大ニ秘也亦痰氣

ニ三練子ナト加テ用亦云此方之証
脉浮大ニ吉也亦諸病多ク医治之
跡ニハ此方ヲ用テ表氣ヲ行ス療治
シノ佳也或云療治之妙此方ニ
有ニ

一 九文ハ脉浮大ニ吉十蕪飲ハ脉沉
而アリ早モナキニ用也藿香正氣散
ハ正氣虛シタル脉ハ九動モ有ニ用七
味清脾湯用ヤ有脉数ニ有ニモ細
散ニ可用咽乾数大ナラハ虫成モ
不用也其様ニハ香砂正氣散ヲ用
ノ惣別香砂正氣散ハ虫之症トモ
風之症トモニ用也

一 尋常頭自不痛似痛不痛此方

用得効事有

一中井曰是方去參常令製置
病ニ依テ用モ不効却テ熱ホカ
シテ氣重クハ快身熱スルニ
參加用
時ハ汗出効有事アリ是理ハ氣
弱ニ依テ衛氣不行邪ノ出ル道ナ
故ニ參木ノカヲ以テ邪ヲ追出ス
心上云リ

一和曰玄治法即膈噎ニ用イラヌコト
有

一十歲小兒感冒熱退後咳甚用六
君子湯雖咳少止汗多出脉五
動如有力用十藷汗出咳モ亦
止

一啓曰小兒感冒熱退後ニ甚ニ六君
子湯ヲ用コト有之故ニ用タハ咳ハ
少止タレモ汗多ク出ニ六君子湯ハ
汗發スル方テモナキ何トシタコトニ汗
多ク出タト云ニ前ノ証今ハ邪氣殘
タニ依テ六君子湯ノ補劑ヲ得テ邪
氣不散參木ヲ以テ皮膚ヲ閉塞
管熱内ニ蒸シテ汗出タル也其時十
藷ヲ用タレハ汗止咳モ亦止十藷ハ
汗ヲ止ル方ニモナキ何トシタコトニ汗
止タト云ニ十藷ハ表氣ヲ順ニ管熱
ヲ散タレハ邪氣殘ル所モナク管熱シ
ナスコトモ無テ自然ニ止ル也六君子テ
汗出コト理自然也十藷ニ汗止

當流手也

一壯年男感冒發熱及七十余日無汗
時々譫言口乾尿黃二大便順脈細
數三格迪院用此方全安

一方考曰感冒宜解表故用藊葛
解勞倦姪娠宜補裏故用參苓
草乃木半枳桔貴所以其利和
表裏之氣氣和則神和神和スル
則無病矣

○六正 不換金正氣散 治四時感冒傷
寒癰疫寒熱霍亂吐瀉及出遠方
不伏水土並皆治之
朴 貴 婆 守 薯 甘
美 速

此方腹痛或ハ心痛之妙方ソ又食
留滯ニ心痛腹痛ニ又行遠方水
土ノサワスニ腹痛心痛赤白下痢
吐逆ナスルニ皆此方吉

一感山嵐瘴氣タル瘧疾ニ吉則チ換
果ヲ加テ用フ也

一感寒濕ニタル腹痛ニ加 永桂用吉

一嘔吐スルニ一宿ヲ加吉

一ナトヤラ氣惡ク潮熱スルニ柴文ヲ加
用テ吉

一持病ニ頭痛有テ兩天ニ逢ハ作ル
ニ云ニ此方ニ芳芷ヲ加用吉

一痢病食積有テ膿血出後重甚

二用ルニナハ連枳ヲ加ヘ甘去吉

一方考二曰山嵐之瘴氣谷氣也
經二谷氣入通於脾故今人不服米
土而壞腹是方也蒼朴貴甘
平胃散也可以平水土之敦阜之
氣而消嵐障乃田之燥所以醒
脾 麥之芬所以開胃方名曰
正氣者謂其正不正之氣尔
C 九文 敗毒散 治傷寒瘟疫風濕風
眩肢痛增寒壯熱項強睛疼或八
多風痰或處卑濕之地脚氣痿
弱此藥不可缺

四時通用太陽經表証藥也參ハ
氣弱ニテ其力メタル事ナラサルニ入用
也玄治曰傷寒之証ニ用發表之

藥ヲ汗不出者有其心ハ氣虛
スル故也參加正氣ヲ補汗出者
ソ九文ナトニ參入モ此心ノ又正
氣強ケル參不入トモ出者九文ニ
參入カ眼ト云也

羌獨 柴 前 只 吉 弓
令分 其少姜

全曰風濕之方也又大肚ヨリ熱ヲサ
一ス事發散重シ

一草卧タラハ參ヲ加ヘ用フ病者ニ依
テ用フ也

一此方傷寒ノ表証脉弦數ナルニ四
時共ニ發散之藥也又頭痛甚ハ
芥ヲ加佳也

一 惣別本方ニ參荷有合シテ十一味
敗毒散ト云今ニ味除テ九味敗
毒散ト云也

一 傷寒頭痛發熱惡寒ニ半表半裏ニ
証小柴胡早ト思時此方也内証
ニ少シ只表証ニツヨキ方也

一 四時不正之氣ニ感シタルニ
瘕病之方也道ニ曰瘕病無余方
ト云レタソ此方ニ加減シテ必ス可用
仲景云瘕病ニ無余方

一 風毒腫第一吉惣四肢ナト痛必示
トシテ此方佳也熱毒甚ニ六文
ヲ加吉シ上焦ノ風毒腫ニ升麻
葛根湯下焦之風毒腫ニ九文吉

ト

一 下血腸風ニ吉此他医不知也人之
療治シタ跡ナス此方多分ハ吉下
血ニ遠血近血ト云事アリ近血ニ吉
回春ニ云腸風下血ニ必在黃芩
是近血也

一 痢病ニ熱不去内ニ訶子肉豆蔻ナ
トテ早ク止テ熱出裡急スル此方
ニ加ニ黃或文計ヲモ加用惣
別此方食アワセヌ毒藥ニ中タルヲ
解散スル故ソ

一 風眼ニ内ニ赤筋多ニ吉甚腫痛
ニ三黃ヲ加吉或ハ文連計モ加
用ルソ

一鼠喰タニ此方ニ貝加テ可用効
方ソ鼠之毒深ク黃連解毒湯

一惣別頭痛發熱不去痢病ニ吉

一腹裏病ニハヤル痢病ニ梗連ナト

ヲ加テヨシ是ヲ倉療散ト名ク回

春痢門ニ有按今加テモ吉

一有丁男時年八歳患赤痢昼夜

十余行裏急後重發熱頭痛咽乾

脈數而有方此方ニテ治ス

一痘疹之序病ニ熱甚ハ升葛根湯

ニテ吉若不去紫草ヲ加テ用ヨ風

濕ニ感シテアル故也

一痘疹疫病熱甚ク葛根湯ニテ去

時ニ水ヲ加用吉風濕感アル故也

一犬頭病トテ面ホウ腫痛ムニ牛子

連ヲ加テ用咽痛ニモ吉亦灸タ

ハ列缺ノ穴佳也

一癰疽或ハ楊梅瘡ナトニテ濕毒熱甚

頭痛ナト有ニ或ハ身節痛ニ此方

主々大ニ加用治リ輕ハ葛根湯モ

吉毒氣ヲ拂ヒ濕毒ヲ散スル方也

荊防九文モ猶可也又濕氣故ニ盜

汗ナトアル結々盜汗ヲ治テハ不叶

一痛風トテ手足此彼走痛ス吉此大

畧風濕アル故也回春ニテ身難動

歩シ可用ト有此風毒之心ニテ云カ

然レモウツリ痛ニヨキ

一加減敗毒散上テ正傳班門二十一
味敗毒ニ當木風荊蒼芍牛
地加名也斑疹ニ吉ノ血斑ニ吉
風呂或ハ湯ナトニ入テ血ノチキタル
キ血中ニ風入斑出タル吉血風上云
テ甚痒モノ按有粒疹無粒
斑
一田舎人養生ニ上リ濱邊ナドへ出時
必斑出タリト云惡風惡寒スル故ニ
濱風ナト上中テ出ト心得タリ其上
濕物湯ナトニ入ハ弥赤キモノ出痒
痛ニ少腫按ニ風濕血中ニ入タル
思此方ニテ治タリ
一脚氣ニモ痛ム外ニ熱有ハ先此方也

別而跟之痛ニ用上有此風毒也
羌獨根多入テ痛風百節痛ニ
吉此方ノ症ハラレテ見ニ痛處熱
スル

一風眼身壯熱頭痛自汗其臍上塊有
上下左右如伏梁食不進諸医止
汗々不止日々ツカレヌ全云此方加
苛文用テ平復ス是秘中之秘也
一小兒急驚風ニ加全蝎白附姜蚕
用佳也心ハ急驚風痰熱有余之
証也治宜鮮表也

一小兒中風ノ口喎ニ啼時能喎也是
風濕ニテ有間敷ト思タモ何ソ
痛ニカ又無カト問ニ必痛有ト云

十八是風濕腫ヲナス也其故口モ
咽下思此方ニテ治メ愈

一男鼠ニ喰事正月ニテ六月之時分
草卧口氣熱盜汗有是熱毒裏ニ
入上思解毒湯ニテ大驗後六黃湯
ニテ全愈

一瘰癧ニモ此方ニ加減ニテ用ソ去參
加矮藪風乳如方ソ

一一切火熱症ニ用口氣熱スルニ良也

一傷風ハ此方十神湯香藪散參藪
飲傷寒ハ正氣散五積散之類

一有汗不解モ使ソ

一或人冬月無熱甚腹痛痢病
患ニ芍藥湯或ハ痢藥ニテ不効風

別而跟之痛ニ用上有此風毒也

羌獨根多人テ痛風百節痛ニ
吉此方ノ症ハテ見ニ痛処熱

スル

一風眼身壯熱頭痛自汗其上現有

上下左右如伏梁食不進諸医止

汗々不止日々ツカレヌ全云此方加

苛文用テ平復ス是秘中之秘也

一小兒急驚風ニ加全蝎白附姜蚕

用佳也心ハ急驚風痰熱有余之

証也治宜鮮表也

一小兒中風口喎ニ啼時能喎也是

風濕ニテ有間敷ト思々モ何ソ

痛ニカ又無カト問ニ必痛有ト云ト

キハ是風濕腫ヲナス也其故口チ
咽下思此方ニテ治メ愈

一男鼠ニ喰事正月ニテ六月之時分
草卧口氣熱盜汗有是熱毒裏ニ
入ト思解毒湯ニテ太驗後六黃湯
ニテ全愈

一瘰癧ニモ此方ニ加減ニ用ソ去參
加矮藷風乳妙方ソ

一一切火熱症ニ用口氣熱スル良也
傷風此方十神湯香藷散參藷
飲傷寒ハ正氣散五積散之類

一有汗不解毛使ソ

一或人冬月無熱甚腹痛痢病
患ニ芍藥湯或ハ痢藥ニテ不効風

濕ニ感爲痢ト思用テ効有右如此
痢証ニ夜寢ヒユス事有枳朴大
直行スト能シラ去ソコレハ手ヲ
尽シテ上之事也加様之事モ自
然アルソ

一腫物ニ抑藥ナトレ或ハ肥癰瘡ナトレ
付藥シテ毒氣不去ヒ人裏不得
出故周身腫事有此方吉

一此方中世之内ニ重寶ナル方也四時
之キライナレ太陽經之表証之藥也
一或人云世間之内障ト云目妙ト云ソ
其時ハ去今也

一此方肺氣瘡癰疾等之初起類
傷寒疑似之間用之

一冬感于寒不即于病至春復爲病
病熱病者用此方妙解ス

一風熱入大腸下血不止如姜苛
雪烏藥用玉機又通消下血六
加連

一二十余歲之婦人風眼身壯熱頭
痛目汗甚之勝上三有塊食不
進請醫止汗上不止日々三瘦元
草全此方二加今治多

一有一人四十余歲之男子六月下旬
眼赤之無余色兩眉間如割脉
浮大弦數予此方二加芷三貼而
平安ス

一惡寒甚頭痛脉數實者此方吉

惡寒甚之而無汗頭痛者或八
身痛痺者十神湯用之汗出也

一二十歲男泄瀉晝夜二十余度腹
痛微熱頭痛脉數ニテ有力
此方三安全ス

一回加減之法私曰雖衆多症之內
有載越其間前所無者記ス

一傷寒頭疼身痛項強壯熱惡寒
口乾心中蘊熱加芩傷寒汗之
後不解亦宜服此回春傷寒龜
塞聲重咳嗽吐痛加半杏四時

瘟疫流行衆人一服者加葛根一
切火熱之証六加輒色今玄

迂風貝母天花酒大黃玄

粉、酒毒發熱、作渴、加丹、
一、癰疾、小間、先寒、後熱、先熱、後
寒、頭痛、身疼、加蒼朮、
葛根、眼目腫痛、因風寒所感者、
也、加已芥、飯尾、赤芍、或八
令參風也、

一、男平素過酒、人、白吐血、數日、
一、升、或八、為酒毒、或為熱、或八
為虛、諸醫醫療、之不効、用人參、敗
毒散、二貼、立止、

一、男持喘、常發、則用、二陳、加杏
雪、愈、今發、前証、用、常、禁、或他、
參、不効、人參、敗毒、三、立愈、
○參養、人參、養胃湯、治外感風寒、

內傷、生冷、憎寒、壯熱、頭目昏疼、
肢體拘急、小間、風寒、二証、及夾食
停痰、皆効、兼治、飲食傷脾、或外
感風寒、濕氣、發為、痲痺、及、中風、痺
氣、痲、尤妙也、入門云、如虛寒、二八

加附桂、
蒼朮、半、杜、各一、陳、七分、霍、果、
參、苓、各半、中、梅、一、筒、姜、

此方、不換金之變方也、不換金正
氣散、二參、果、苓、三味、加、タル、モ、
八解散、三、似、各、方、然、レ、主、此、方、
ハ八解散、ヨリ、少、シ、ハ、瀉、藥、也、奈、何、
ト、レ、ハ、此、方、ハ、菓、精、アル、故、也、
菓、二八果、下味也、

一第一先癰之方也酒々トノ藥表
翁々トシテ發熱シ位ノ輕キ証ニ藥
也寒多ク熱少キニ用也

一外感風寒内傷生於冬ニヨキ方也
内外ヲ兼タル方也

一感寒濕輕感冒之方也症ハ壯寒
頭痛發熱之方也又感寒濕カ感
冒カ癰カ疑似之煩ニ用ヒテ妙方
一此方平胃散 二陳湯有故胃ツ
カハ痰有テ酒々トシテ腹痛ニ咳嗽
スルニ吉方也内外ヲ兼タル方也

一八解散ト此方ト少ノ腎有氣虛シ
痰有二人參養胃湯ヨシ此六君子
ニト參藥加スモ也 朴三内

スカシ波多ニ脾胃ヲサス藥三ノ温
痰ヲ取氣ヲ順ス氣丈ノ順ナレハ邪
氣ハ自ラ散スモノナリ此内外ヲ兼
タル方ソ 八解散ニハ發散ノ藥アリ
ナレ又ハ藥ナキ故食滯濕氣之滯
ヲ去事弱シ

一此方第一癰方也症ハ先酒々トノ寒
寒シ熱氣出頭痛咽乾次伸ス者
ソ止ム時ハ汗サント由熱氣サスルモノ也
此皆癰之症也此方可也但二症
カタルモ有ソ又傷寒ノ証ハ重シ汗ナ
ト由タル方ニハサス但傷風ナレハ
前後自汗スル事モ有又寒濕之カ
チタル人ハ渴スモ有也

一此方ハ癰之内ニ至寒多熱ハ三用
又初内ハ生冷ヲ食ヒ傷脾胃其
上ニ外感風寒癰ト成テ惡寒發
熱頭痛口乾スルハ此方佳也此方
内外ヲ兼テ各方也

一傷寒之症ハ重テ汗ナト出各分テハ
サズ但傷風ナハ前後自汗ハ事
モ有

一滋陰降火湯之症ニ似タル用事有
虚計ニテハ無ト云テ潮熱有盜汗
自汗ハモ此方ニ吉事有結句汗
モ止事有妙方ソ切々得効按此
方止汗ハ滋陰降火湯ナト止汗ハ
少此方之ハ經腠理ニ寒濕アリ

汗出其終止リ寒濕有ハ正氣虚
理也痰有テ胃ツカヘ辛ナトハ
十種飲ヲ用テ吉事間有

一婦人帶下白血長血酒ノ上ニ熱氣
去来咳嗽潮熱茯苓補心湯逍遙
散之証ニ似テ血ナト下何療シテモ
不効此方用テ吉事有平胃散
有故ニ外之寒濕ニモ吉良外兼
タリ又血下ルモ此方ニヒト止ル
事有寒濕故ニ白血長血帶下ナ
ト症有モ也故ニ吉ナセニヒト
陳蒼朴菓皆濕ヲ去ルモノ也
濕去テハ自全ス如此証ニハ回春
之月芍鳥梅ヲ加タル用テ吉

一或婦人產後三十日計惡寒之色
セウくト不食發熱自汗ス先逍
遙散ニテ治不驗ニ此方ニテ治多
結句汗モ止ル事有脉數也私按
此條下モ回春之方下ナラシ也

一或久年癰ニ虚シ熱モ如勞瘵熱
一日間ニヲコリ惡寒發熱ニ脉
微弱ナ上ニ男女ヲ不分逍遙散ニ
テ治タリ或ハメタト怒ルニ脉雖弱
加柴芍方ハ回春之加減ノ方
吉又如右証ノ脉モ強ナス鬼ニ
カナホツ逍遙散又ハ此方ニ如
柴佳也

一婦人血症帶下ニ用ルハ飯前加

名回春之方良帶下長血者寒濕

ニテ大畧ハ生スル故ニ此方吉

一咳嗽ニ九文十藊飲滋陰降火湯

ナトニテ不驗ニ此方ニテ吉事切タ

有症ハ惡寒發熱咳嗽痰切カ

又ル者ニ猶吉方中ニ二陳湯アル

故也

一癰之似セニ吉方ソ日ニセカキトス

ル癰ニ難落只似セカリ各ニ吉

虚証ナト吉感冒癰之証ニ似タル

ニ吉又風俗云寸白ナト似癰者

有如此之証ニ佳也

一婦人前ヨリ先千血下ニ用テ吉事有

委ハ見前傷寒癰愈テアト養

生藥ニ吉也

一婦人寒熱往來飲水咽ニ下即吐
吐ス事噎膈之症ノ如シ吐ス時ハ
血陰門ヨリ出テ食不進交ア劣ス
ハ陰精ニ血出先正氣天香陽ニ
テ吐ヲ止後人參養胃湯ヲ用フ
諸症愈寒熱往來スハ瘧也帶
下ハ濕痰入旁光人參養胃湯尤
妙也

一諸病不食膈間ニ有痰噦シ腹痛
スニ此方吉ソナセニ吉ナレハ方中ニ
平胃散ニ陳湯有故ソ又ハ參蘓
飲モ吉ソ

一嘔噦ニハ加木山炒米去果朴

蒼私ニ思ニ寒嘔ハ砂吉若食停
上焦爲痰水嘔噦セハ朴蒼景
ナト用吉

一予治一兩人四十余歳男過酒之
後感風頭痛惡寒シ不食脉數ニ
而有力藿香正氣散用汗出頭痛
惡寒止熱不退自汗二十日及脉
濡弱ニテ五動此方用テ治タリ

一又一人瘧時年十九歳毎日晡時
ニ寒熱シ汗出大便瀉シ心腹堅ク
脹頭面四肢浮腫ス此方治タ尤
甚シ神効也

○小柴 小柴胡湯 治傷寒四五日往
來寒熱胸滿脇痛心煩喜嘔風濕

身熱邪在少陽經

柴ハチ半ハチ 苓レイ 參シン 各各 半ハチ 分分 其其 五五 姜カキ 重重

此方邪在少陽經用吉方ノ邪在

少陽經半表半裏也邪半表半裏二

有時八寒熱往來又邪在少陽二

則肢痛故ハ少陽經兩脇ハ行ハ故

脇痛又口苦膽汁上溢故二口苦

又脈弦ハ肝膽ノ形五行二有ハ爲

木有垂枝之象故三弦也此方ハ

柴性辛溫也辛者金ノ味也故二用

之以平木溫者春之氣故二就之

以入少陽今者形枯ニシテ味苦シ

枯則能浮フ苦則能降君以柴

則少陽入然上モ邪之人ヲ傷ルコト

常二其虛二乗ス用參甘中氣ヲ助

ク後傳テ不能入裏其ハ又邪初

入裏々氣逆而煩嘔ス故二用姜

製半除嘔逆邪半表半裏ニ

ルトシハ榮衛爭フ故二用姜連

辛甘以榮衛柔ク

一半表半裏心下滿テ不食大便硬

脈細ニシテ沉是裏証也頭汗出微

惡寒手足冷ル是表証也此方吉

惡寒潮熱或ハ瀉シ欬逆スハ此方

吉

一脈浮弦小便難ク噦ハ腹滿テ脇痛

無汗嗜臥此方ニ令フ加ヘ用吉

爲煩而熱無時渴ス者喜テ嘔二

本方佳也

一傷寒痞症心下滿チ不硬ハカク按之痛ツク
ガハ痞チトイフ或ハ只心下ニ水滯チテ
滿ミズ痛ツクズ妨悶ゴモンスル者二症共ニ挂
ヲ加ヘ用

一傷寒發熱嘔噦フクシテ咳カイスル者ニ此
方吉ソ

一傷寒滑カシ脉弦セニシテ嘔カシ滑カスル邪
半表半裏ニアリ此方ニ桔根カクコンヲ加ヘ
佳也

一汗多シテ渴カスル此方ニ半ヲ去桔根
ヲ加ヘ參ヲ倍ス

一婦人經水之時傷寒發熱シ昼ハ明
ムニテ暮ニ譫語セリゴスルハ熱入血室也

此方ニ生地ヲ加ヘ用ニ吉ノヲ試ルニ
三五人治セス云コトナシ

一有一婦傷寒甚シノ時產メ譫言セリゴシ
胸マイキレ脉倫リンキコトナシ小便通セザルニ
此方赤芍セキシャク赤苓セキレイ扈コヲ加テ五貼ニ
テ平安ス

一發熱往來譫言多シテ尿瀝セリリ悸
動スル此方吉

一傷寒十余日汗ヲ發シ吐下シテ後
四五日小柴胡湯症見ハハ先此
方ヲ与ヘヨ嘔止ニズ心下實カクシ火カシ
煩シスルモノハ未タ解セズ大柴胡湯ヲ
与ヘテ正シ之而愈

一少陽頭痛脉弦ナルモノハ此方可与

一此方瘧用症ハ人之身体タタヒ寒甚シカラス熱モ亦甚シカラスハフ見コトヲ惡^ミ心驚^フキ恐ル其時ハ熱サレ汗多ク出ル是少陽ノ瘧也此方ヲ用ヒ切^キ効^キヲウル也

一傳二腹痛門云腹痛ハ此方ヲ去芍ヲ加テ妙也云

一太陽瘧令^レ人腰痛頭重ク寒背ヨリ起^リル先寒シテ後熱シ燔^ク々然喝^ク然トシテ熱止テ汗出テ已^レ難ニ此方ニ桂^ヲ加^テ用吉燔^ク々者熱甚^ニ形也張仲景暑証^ヲ以テ喝^クト此喝熱ハ暑ニ似^ル熱也

一予此方ヲ用治^シ男子之瘧皆四十

余歲瘧患^ル事三年俱ニ寅申巳亥之日ニ起^ル一人ハ丑巳ニ發シテ申ニ退^ク是陰中之陽病也正氣ヲ補^ヒ表ヲ解スヘシ此方ニ木^ヲ齊貴青^ヲ蒼^ヲ進^ル事一日ニ一貼服スル事八貼ニシテ得^テ大汗愈又一^ノ人ハ夜亥ニ發シテ寅ニ退^ク也思^ハ是陰中之陰病也將ニ血ヲ補^ヒ肝ヲ疎^ススヘシ此方ニ四物湯ヲ加^ヘ服ス事三貼又加青^ヲ服ス事十余貼ニシテ是亦得^テ汁平安ス

一熱症之嗽ニ用症ハ冷水ヲ飲タカリ不食^ニ痰上^ヘ衝^キ上^リ膈^ノ火^ノ如^ク熱スルニ此方ニ蒼^ヲ愛^ヲ桑^ヲ白^ヲ德^ヲ加^ヘ參

減ス

一熱症之咳逆ニ此方ニ加^サ方ソ
愚思ニ兩脇痛ニ身轉^フ不能^ス咳
逆^スキハ此方又感冒之咳ニ^テ兩
脇或右ニ^テモ左ニ^テモ痛ハ柴^ハ加^ヘ
吉

一平人風ニ當^テ口酢^シテ苦キ事^ハ斷^サル
モノ肝膽ニ寒熱アル也此方ニ^ニ竜
膽青^ヲ加^テ妙方ソ

一平人言^フ聞^キ少^クシ之事ニ腹立^テ怒^ル
則肝胆之寒熱ト^レ此方ニ^ニ竜且青
扈木^ハ地骨皮加^テ妙也或ハ清心
竜且湯^モ佳也

一疝氣ニ此方用妙也脉弦^ハ數^ハ寒熱

往來小便赤^ク兩^ノ脇引^キ痛者ニハ
此方ノ症ソ又サハ^ナク^テ陰囊腫寒
熱往來スルニ^ニ和散神効湯^ヲ用^フ
テ効^シナキハ清脾湯或ハ此方用^フ
便毒楊梅瘡脉弦^ハ肺時^ニ蒸^ムト^ソ
發熱スルハ此方ニ^ニ龍胆^ハ荒^ハ沢山^ニ
加^テ用佳也

一婦人ノ經行之時多怒^リ月事止^ル
際^ニ筋引^キ衄血出^テ頭痛^ニ痰氣
有^テ搖擗^シ瞳子^上視^シ脉弦^ハ滑^ハ澁^ハ
スハ此肝火熾盛^シテ患^ムト^ソ口也
本方ニ依^テ熟地^ハ扈^ハ釣^ハ藤^ヲ加^ヘ平
安ス

一勞瘵^ナト蒸^ムト^レ熱又癰^ハ後^ハ勞

際ニ似テ勞瘵ニ非ス蒸々々々ニシテ
發熱小便之色種々ニ變ニ脉弦數
上氣陰莖時無起リ氣モウカクト
シテ漏精様々療治シテ上ナラハ
此方ニ烏藥生地 芫花ヲ加フ
妙ニ安全ス事有如此事秘スベシ
一男子莖中痛ニ白津ヲ出小便閉
時ハ爲瘕ニ此方ヲ用フニ芫花加フ
百二貼ニシテ安シ

一婦人年二十余產前ヨリ咳嗽產後
二日惡寒發熱咳甚ニ滋陰至
室湯二貼ヲ用イテ咳嗽止潮熱ニ
夜間發リ甚ク自汗盜汗ス脉數
本方ニ熟地燂ヲ加五貼ニシテ愈尤

神妙也

○升葛根 升麻葛根湯 治瘟疫頭痛

發熱

升 的 其 升 葛根 十五

傷寒陽明之經病ニ用ル方ソ症ハ鼻

乾キ目痛ニ眠ス汗無ク惡寒發熱
スルナリ

一痘瘡發熱傷寒疑似之間ニ用方

ソ或參蘇飲故ハ表ニ寒邪盛也故

ニ表ヲ解スギハ柴衛和シテ痘瘡ナ

レハ痘瘡出ソ

一斑疹出テ或ハ未出煩悶乱ス此

方佳也故ハ升麻葛根表裏熱ヲ

解

芍藥ヲ和シ其ハ衛ヲ和スル

也

一六十計々鼻右之方ニ少シ物出外
科藥ヲ付テ後甚痛ニス腫モ又大
腫此方ニ岑連大ヲ加ヘ三貼ニシテ
平愈ス加藥ハ下ス藥也本方ハ邪
ヲ散藥也邪散シテ内ニ熱毒
ヲ下ス諸病此心得肝要也想別
風毒腫ニ此方効ナソ度々手栖ヲ
シタソ咽痛ニハゴヲ加フ上膈熱ス
ルハ岑ヲ加ヘ可也
發黃丹毒玄ヲ加ヘ寒熱往來今
此ヲ加フ可也
○八解散 治四時傷寒頭疼體熱
惡風多汗惡心嘔逆

參 朮 苓 陳 守 霍 朴
并各等 姜 枣

玄治曰桂枝湯ト此方ト分別有桂
枝湯ハ傷風之証ニ汗サツト出湯
ナト飲ニ其低出ル様ナニ用此方
ハ傷寒之証桂枝湯ヨリ重ク惡寒
無汗出惡風色青々トシ又ハ青
白ナルニ用
一陰証ノ傷寒脉微細体革臥気タ
ラクト目ミハリナク妄語スルニ吉
一或人体健ニシテ脉二十日計ナシ
テアホウニナル予此方用二貼ニシテ
汗出テ平愈ス
一此余之男感寒汗出シテ解ス又

因飲食而腹痛三大便瀉今腹
 痛六止テ眩暈シ左ノ前痛三脉右
 関微弦此方蒼ヲ加フ汗出テ解ス
 一二十余歳之男子仲春ニ感冒シテ
 後作事再ニ今熱發シ汗出鼻フ
 サカリ衄血シ咳痰出テ色嘔咽ヲ
 乾ス腹痛腹少シ脹腰膝痛三小
 便赤ク脉弦数ナルニ此方ニ芍
 芸吉柴門加フ可也
 ○六一順氣湯 治傷寒傳裏大便
 結實口燥キ咽乾キ怕熱揭衣譫語
 狂妄シ揭手擲足斑黃陽厥潮熱
 自汗胃膈滿硬臍三遠テ疼痛
 スル等ノ症

柴 芩 芍 洞 朴 大 芒

分 各等

男左之脇ヨリ痛出膈へ逆上シ
 甚腹痛三手足冷大小便結シ咽
 乾衣ニ効シ有

一大小便結スルト云ハ弥苦ソ
同春ノ傷寒又
 前門ニ見

日用功方卷之二終

月風吹古卷之二條

廣門二見

一大小更終ス云ハ終吉ハ同春ハ

始才二岐ハ春

其期最手最今大小更終ハ同

民式之最出最ハ同

甘ハ春

樂ハ春ハ休ハ大ハ甘