

大醫院校註婦人良方大全卷之十八

產後門

產難既明須知產後疾痛故以次之

產後將護法第一

婦人產畢飲熱童便一盞閉目少坐
 上床倚高立膝仰臥不時喚醒及以
 醋塗鼻或用醋炭及燒漆器更以手
 從心搦至臍下使惡露不滯如此三
 日以防血暈血逆酒雖行血亦不可
 多恐引血入四肢且能昏暈宜頻食
 白粥少許一月之後宜食羊肉猪蹄
 少許仍慎言語七情寒暑梳頭洗足
 以百日為度若氣血素弱者不計日
 月否則患手足腰腿痠痛等症名曰
 產勞最難治療初產時不可問是男



女恐因言語而泄氣或以愛憎而動氣皆能致病不可獨宿恐致虛驚不可刮舌恐傷心氣不可刷齒恐致血逆須血氣平復方可治事犯時微若秋毫成病如山獄可不戒哉

產後調理法第一

產後將息如法臟腑調和庶無諸疾苦須先服黑神散四物湯四順理中丸七寶散若壯熱頭痛此乳脉將行用玉露散頭目不清是血暈用清魂散粥食不美是胃氣虛用四順理中丸○愚按丹溪先生云肉汁發陰經之火易成內傷之病當歸丸當歸建中湯四順理中丸雖滋補悉犯桂附

乾姜僭熱之劑臟腑無寒何處消受若夫兒之初產母腹頓寬便啖鷄子火盪不思鷄子難化火盪發熱展轉為病醫者不識妄指他病率爾用藥寧不誤人予每見產婦之無病者皆不用黑神散與鷄子火盪諸般肉食每白粥調理間以此小石首魚乾淡食之至半月以後少食雞子亦豁

其衣自下牛膠膏交
愚按前症若出而氣虛不能入用補
中益氣湯或草麻子仁一兩研塗母
頭頂心即上若胎衣不下用草麻子
仁塗右脚心胎衣下急洗之緩則胎
衣仍入益母丸亦効若胎衣未下若
欲斷臍帶須先以水物繫墜然後斷
之

附治驗

○婦人胞衣不出胸腹痛手不敢近
用滾酒下失笑散一劑惡露胎衣並
下

○產婦胎衣不出腹作痛手按痛稍
緩此氣虛而不能送出也用無憂散
而下前症常詢諸穩婆云宜服益母
草丸或就以產婦頭髮入口作嘔胎
衣自出其胎衣不出者必死授與前

服一錢童便熱酒下

○牛膝散 治胎衣不出腹中脹痛急服此藥腐化而下緩則不救

牛膝 川芎 朴硝 蒲黃 各三兩

當歸 一兩 桂心 五錢 右每服五錢

錢姜二片生地黃一錢水煎

附方

○補中益氣湯 方見二十四卷第六論

○失笑散 方見十六卷第五論

○無憂散 方見十六卷第三論

○益母草丸 方見十三卷第九論

○又方用竈下土三四錢好醋調和

納臍中續煎生甘草湯半盞或以醋

湯飲之即出○又方用草麻子仁研

爛塗足心下即洗去○又方用紅花

一兩酒煮濃汁服○又方用鹿角鎊

三錢為末者葱白湯調服○又方取

產母鞋底灸熱熨小腹上下二七次

○又方用浸淨水濃煮溫飲二碗立

下○又方用皂角棘燒為末每服一

錢溫酒調

產後血暈方論第五

產後血暈乃血入肝經甚至眼花昏
悶用黑神散主之血過多用清魂
散補之或以醋湯細飲或煎燒秤錘
以醋沃之或嚼醋塗口鼻或燒漆器
薰之使產母鼻吸其氣庶無此患○
愚按前症若惡露上行用失笑散血
下過多芍歸湯若過勞所傷補中益
氣湯氣血虛極用清魂散大凡產後
口眼喎斜等症當大補氣血為主而
兼以治痰若脾胃虛弱用六君子湯
苟於七月之前服安胎飲至八九月
間加大腹皮黃楊頭元氣虛弱八珍
湯臨產用無憂散則無前患

附治驗

○婦八月胎下墜或動面黃體倦飲
食少思此脾氣虛弱用補中益氣湯
倍白朮加蘇梗三十餘劑而安產後
眩暈胸滿咳嗽用四物加茯苓半夏
桔梗而愈

○妊婦因產飲酒惡露甚多患血暈
口出酒氣此血得酒熱而妄行虛而
作暈也以佛手散加煨甘葛一錢一
劑而痊酒性慄悍八月及產後不宜
飲恐致前症產室人眾氣熱喧懷亦
致此症

○奪命丹 治血暈腹痛沒藥血竭
末等分每服二錢熱童便熱酒下

○牡丹皮散 治產後惡露悶絕

牡丹皮 芒硝 大黃蒸各一兩

冬瓜仁三七粒 批皮去 右每五錢水煎服

○清魂散 治產後氣血暴損虛火妄動血隨火上以致心神昏亂口噤

眼花甚至悶絕而甦

澤蘭葉 人參各一錢 荊芥三錢

川芎一錢 右各別為末和勻每服

一二錢熱湯和酒調灌之

○當歸芍藥湯方見十二卷第十二論

○一方五靈脂末半生半炒每服二錢溫酒灌入喉即愈

○一方荊芥為末童便調

○一方神麩末每服二錢熱水調

○一方荊芥切入瓶內注熱醋以瓶口對鼻氣入即醒

○一方用紅葦末五錢酒調服

○一方半夏為末丸豆大入鼻中即省亦療五絕

○一方赤小豆為末東流水和服錢許不瘥再服

○佛手散 治產後去血眩暈欲絕

方見十二卷第七論 ○又方松烟墨二錢燒赤

寧熾為末溫酒調半匕京墨亦可或

燒漆罈取烟薰之

附方

○失笑散方見二十卷第五論 ○補中益氣湯

○六君子湯 ○四物湯三方見二十四卷第六論

○安胎飲方見十二卷第二論

○無憂散方見十六卷第二論

後補論

產後顛狂乃敗血上衝用大聖澤蘭散加砂仁末三分煎酸棗仁湯調下或硃砂二錢研細以乳汁調和入紫項活地龍一條滾二三沸去之入酒再用重湯煮溫分三服○愚按前症乃血虛神不守舍非補養元氣不可仍參後各門互用

附治驗

○產婦患前症或用大澤蘭湯而愈後又怔忡妄言其痰甚多用茯苓散補其心虛頓愈又用八珍散加遠志茯苓養其氣血而瘥

○一產婦亦患此用化痰安神等藥病益甚神思消燼余以為心脾血氣

不足用大劑參朮歸扶神酸棗仁四飭餘而安乃以歸脾湯五十餘劑而愈

附方

○隱居澤蘭湯 方見二十一卷第六論

○茯苓散 方見十九卷第三論 ○八珍散

○歸脾湯 二方見二十四卷第四論

產後狂言譫語方論第七

產後狂言譫語乃心血虛也用硃砂末酒調下龍虎丹參丸琥珀地黃丸亦可如驚悸歌哭顛狂等症當參十九卷卷治之○愚按前症當固胃氣為主而佐以見症之藥為善若一於攻痰則誤矣

附治驗

○產婦形骸甚倦時發譫語用栝子仁散稍愈又用加味歸脾湯而愈又因怒仍狂言脇痛小便下血用加味逍遙散以清肝火養肝血頓瘳又佐以加味歸脾湯而安

○治敗血上衝發熱狂走脉虛大者乾荷葉 生地黃 牡丹皮 等分

右濃煎湯調生蒲黃二錢服之即止

○妙香散 治產後語言錯亂用生地當歸煎湯調服立効方見六卷第八論

附方

○小柴胡湯 方見二十四卷第二論

○栝子仁散 方見十九卷首論

○加味歸脾湯 方見二十四卷第四論

產後不語方論第八

產後不語因心氣虛而不能通於舌則舌強不能言語者宜服七珍散餘當推其所因而治之可也○愚按經云大腸之脉散舌下又云脾之脉是動則病舌本強不能言又云腎之別脉上入于心繫舌本虛則不能言竊謂前症若心腎氣虛用七珍散腎虛風熱地黃飲大腸風熱加味道遙散加防風白芷脾經風熱秦艽升麻湯肝經風熱柴胡清肝散加防風白芷脾氣鬱結加味歸脾湯加升麻肝木太過小柴胡加釣藤釣脾受土侮六

君加升麻白芷釣藤鈎肝脾血虛用
佛手散脾氣虛用四君子氣血俱虛
八珍湯如不應用獨參湯更不應急
加附子補其氣而生其血若竟用血
藥則誤矣

附治驗

○產婦不語用七珍散而愈後復不
語內熱嘔熱肢體倦怠飲食不進用
加味歸脾湯為主佐以七珍散而愈
後因怒不語口噤腰背反張手足發
搐或小便見血面色或青或黃或時
兼赤余曰面青肝之本色也黃者脾
氣虛也赤者心血虛也用八珍湯加
釣藤鈎茯苓遠志漸愈又用加味歸

脾湯而痊

○七珍散

人參 石菖蒲 生地黃 川芎

各一兩 細辛 防風 辰砂 別研各半兩

右為末每服一錢薄荷湯調

○胡氏孤鳳散 治產後閉目不語

用生白礬末每服一錢熱水調下

○治產後不語

人參 石蓮肉 石菖蒲 等分

右每服五錢水煎

附方

○地黃飲 方見三卷 第四論 ○加味逍遙散

○加味歸脾湯 ○八珍湯 三方見二十四卷 第四論

○秦艽升麻湯 方見三卷 第一論

○清肝散 方見二十四卷第三論

○小柴胡湯 方見二十四卷第二論

○六君子湯 ○四君子湯 二方見二十四卷第六論

○佛手散 方見十二卷第七論

○獨參湯 方見三卷第十三論

太醫院校註婦人良方大全卷之十八終

太醫院校註婦人良方大全卷之十九

產後作見鬼神方論第一

產後如見鬼神或言語謔妄皆由血氣虧損陰虛發熱或瘀血停滯以致心神煩躁而然也宜以調經散治之
○愚按前症若敗血停滯用調經散若血虛發熱用八珍加炮薑若心血虛損用栝子仁散大抵此証心脾血少所致但調補胃氣則痰清而神自安矣若果係鬼祟所附即灸鬼哭穴可愈其或不起者多因豁痰降火攻伐之過也 仍參第二卷產後諸語作見鬼神方論

附治驗

○產婦患前症或用調經散愈而復

作仍服前散益甚痰涎上湧朝寒暮熱余朝用八珍散夕用加味歸脾湯各五十餘劑而愈

○調經散 治血虛經閉心神煩躁 渾身疼痛或時見怪

沒藥 琥珀並細研 桂心各一錢 芍藥炒

當歸 細辛半錢 麝香少許

右為末每服半錢薑汁溫酒各少許調服下即愈

○栢子仁散 治產後元氣虛弱瘀血停滯狂言亂語

栢子仁 遠志 人參 桑寄生

琥珀別研 當歸炒 生地黄焙 甘草炒

右用白羊心一箇水三盞煮清汁七

分入藥五錢煎服

附方

○八珍湯 ○加味歸脾湯 二方見二十四卷第四論
○鬼哭穴 見六卷第八論

產後心神驚悸方論第二

產後心神驚悸恐懼或目睛不轉口不能言乃心氣虛而六淫內侵診其脈動而弱者驚悸也動則為驚弱則為悸矣○愚按人之所主者心心之所主者血心血一虛神氣不守此驚悸所由作也當補血氣為主 仍參三卷第十論

附治驗

○產婦患前症二度服琥珀地黄丸局方妙香散隨効再患服之其症益

甚而脉浮大按之如無發熱惡寒此血氣俱虛余用十全大補加味歸脾二湯各百餘劑而愈後遇者恐勞怒復作仍服前藥而安

○琥珀地黄丸 治產後惡露未盡胸腹作痛或小便不利

琥珀別研延胡索糯米同炒赤去米當歸各二兩

蒲黃四兩炒香生地黄研取汁留滓

生薑各二兩研取汁留滓生薑汁用銀石器

右為末煉蜜丸如彈子大每服一九當歸煎湯化下

○治血虛驚悸少寐及產後敗血停留少腹作痛等症

辰砂別研琥珀 沒藥並研細

當歸為末等分 右為末每服一錢

空心日午臨卧用白湯調下

產後驚悸亂語精神不定用好硃砂為細末酒調服錢許

附方

○局方妙香散 方見三卷第十三論

○茯苓補心湯 方見三卷第十論

○十全大補湯 ○加味歸脾湯 二方見二

十四卷第四論

產後中風心驚方論

產後眼張口噤肢體強直腰背及僵言語錯亂如癰者此邪氣所傷而成癰也○愚按仲景先生云有汗為柔瘳用桂枝湯無汗為剛瘳用麻

黃湯然產後得此血氣俱虛之敗症
也不可與傷寒例看丹溪先生云產
後當大補氣血為三可凡全大補
湯以補元氣如不應急加附子更不
應是藥力弗逮仍用參附湯多服余
常治大虛之症參芪數劑附子數枚
方應

附治驗

○產婦患此不省人事言語妄甚惡
風寒喜熱飲形氣倦怠脈虛浮無力
余謂血氣虛寒用十全大補湯二十
餘劑不應又二十餘劑稍緩乃漸加
附子至一錢服數劑諸症減一劑又
二十餘劑十退三四乃去附子二分

數劑諸症頓退而安後又發仍服前
藥加附子三五分而愈

○茯苓散 治產後心虛忪悸言語
錯亂健忘少睡或自汗盜汗

人參 甘草 芍藥 當歸 各八分

遠志 茯苓 桂心 各一分

麥門冬 五分 大棗 二枚 右水煎服

○抱膽丸 治產後遇驚發狂或遇

經行發狂

水銀 二兩 黑鉛 一兩 硃砂 一兩

乳香 一兩 右將黑鉛入銚內

入鎔下水銀結成砂子 硃砂乳末

乘熱用柳木提研勻丸鷄頭子大每

服一丸空心薄荷湯下得睡勿驚覺

來即安妙香散亦善

附方

○妙香散

方見三卷第十論

○十全大補湯

方見二十四卷第四論

○參附湯

方見後第六論

產後中風恍惚方

產後恍惚因元氣俱虛心虛血少或外邪所侵以致心神恍惚怔忡不寧○愚按前症當大補血氣為王而佐以後方為善蓋風乃虛極之假象也固其本源諸病自退若專治風則速其危矣

附治驗

○產婦患前症盜汗自汗發熱暈熱

面色黃白四肢畏冷此氣血俱虛用八珍湯不應更用十全大補加味歸脾二湯始應後因勞怒發厥昏憤左目牽睛兩唇抽動小便自遺余為肝火熾盛用十全大補加釣藤山梔而安再用十全大補湯辰砂遠志丸而愈

○辰砂遠志丸 治產後中風驚狂起卧不安或痰涎上湧

石菖蒲

遠志

去骨芦甘草葉 人參

茯神

去木 辰砂

各三錢 川芎

山藥

鐵粉

麥門冬

去心細 天麻

半隻

湯泡 南星

白附子

右為木姜汁糊丸菉豆大別以硃砂

為衣每服三十九臨卧姜湯下

附方

○八珍湯○十全大補湯

○加味歸脾湯三方見二十四卷第

產後生風論第五

產後生風因去血過多氣無所主以致唇青肉冷汗出目眩神昏急服濟危上丹若投以風藥則悞甚矣○愚按前症若心脾血氣俱虛用十全大補湯如不應加附子釣藤釣若用經血虛用逍遙散加釣藤經云脾之榮在唇心之液為汗若心脾二臟虛極急用參附湯救之

附治驗

○婦人患前症或用諸補劑四服

冷自汗泄瀉腸鳴腹痛余以陽氣虛

寒用六君子薑附各加至五錢不應

以參附各一兩始應良久不服仍腸

鳴腹痛後灸關元穴百餘壯及服十

全大補湯方効

○濟危上丹

乳香研 五靈脂 硫黃 阿膠

玄精石同研極細 卷柏 桑寄生

陳皮等分 右將上四味入石器內

微火炒再研入餘末用生地黄汁丸

桐子大每服二十九合酒或當

歸酒下

○當歸建中湯 治產後腹痛拘急

痛連腰背自汗少食

當歸 桂心各三兩 白芍藥六兩炒

甘草炙二兩 右每斤三錢姜棗

水煎入飴糖一匙服如未應加之

附方

○參附湯見本卷後 ○十全大補湯

○逍遙散二方見二十四卷第四論

○六君子湯方見二十四卷第六論

○獨參湯 治一切失血惡寒發熱

作渴煩躁或口噤腸鳴自汗盜汗或

氣虛脉脫手足逆冷蓋血生干氣故

血脫補氣陽生陰長之理也方見三卷第十三論

產後汗不止者皆由陽氣頓虛腠理

不密而津液妄泄也若遇風則變

縱虛之短氣則身體消瘦唇口乾燥

久則經水斷絕由津液竭故也○愚

按前証屬血氣俱虛急用十全大補

湯如不應參附芪附等湯若汗多

亡陽發瘧尤當用前藥王海藏先生

云頭汗出至頸而還額上偏多蓋額

為六陽之所會也由虛熱薰蒸而出

竊謂前症當以部位分之額左屬肝

額右屬肺鼻屬脾頤屬腎額屬心治

者審之仍參三卷第六論

附治驗

○產婦畧聞音響其汗如水而昏憤

諸藥到口即嘔余以為脾氣虛敗用

參附末為細丸時含三五粒隨液嘔下乃漸加之至錢許却服參附湯而痊

○產婦盜汗不止遂致廢寐神思疲甚口乾引飲余謂血虛有熱用當歸

補血湯以代茶又以當歸六黃湯內黃芩連栢炒更倍加大人參五味子

二劑而愈

○麻黃根湯 治產後虛汗不止身熱發渴驚悸不安

當歸 黃芩 炒 麻黃根 牡礪煨為粉

人參 甘草 炒等

右每服四錢水煎

○一方 治產後自汗盜汗胃氣虛

弱服別藥則嘔吐不能入

當歸 黃芩 各一兩 麻黃根

右每服二錢水煎

○治產後氣脫汗不止小便短少四肢難以屈伸

甘草 附子 炮五錢 桂心

芍藥 炒各一兩 右每服三錢姜

棗水煎服虛甚更加以效為度

○止汗散

牡礪 為末 小麥麩 八兩炒黃

右每服三五錢用猪肉汁調

○人參湯 治產後諸虛不足發熱

盜汗內熱肺熱等症

人參 當歸 等 右為末以猪腰

為末

為末

為末

為末

子一枚切片水二鍾糯米半合葱白
二根煮取汁八分入藥三錢煎服

附方

○當歸六黃湯 治氣血虛熱盜汗
不止不應加人參白朮心血不足加
酸棗仁炒

當歸 熟地黃自製 黃芪炒各
二錢

生地黃 黃柏炒 黃芩炒
黑

黃連炒 黑各 右水煎服

○參附湯 治陽氣虛寒自汗惡寒
或手足逆冷大便自利或膈腹疼痛
吃逆不食或汗多發瘧等症

人參一兩 附子炮五錢 右作一服薑棗
水煎徐徐服去人參加黃芪名氏附

湯

○當歸補血湯 治肌熱躁熱目赤
面紅煩渴引飲晝夜不息脉洪大而
虛重按全無者

當歸三錢 黃芪灸一兩 右水煎服

○十全大補湯 方見二十四卷第六論

○芪附湯 治陽氣虛脫惡寒自汗或
口噤痰湧四肢逆冷或吐瀉狀痛飲
食不入及一切虛寒等症

黃芪一兩 附子炮五錢 右作一劑薑
棗水煎服如不應倍加附子方得全
濟

產後冒悶汗出方論第七

產後忽冒悶汗出者因明虛損陽

氣鬱暴故也急吞鷄子三枚沫醒飲
 童便或時復發宜服竹瀝五合○愚
 按前症屬太虛宜固元氣為主其汗
 不止必變多痰東垣先生云婦人分
 娩及半產漏下昏冒目眩蓋因血暴
 亡而火上熾但補其血則神自昌若
 常持血下當補而外舉其氣陽得血
 而神安則目明矣今立一方以補手
 足厥陰之血兼益陽氣名曰全生活
 血湯

○全生活血湯 治發熱自汗盜汗
 目眩盲四肢無力口乾頭暈行步欹
 側

柴胡 當歸 各二錢 生地黃 炒

熟地黃 各一錢 川芎 蒿本 各二錢

防風 羌活 獨活 葛根

甘草 炒各二錢 細辛 蔓荊子 各五分

升麻 芍藥 炒各三錢 紅葶 分

右每服五錢水煎熱服

產後汗多變症方論第八

產後汗多變症因氣血虧損肉理不
 密風邪所乘其形口噤背強如癰或
 搖頭馬嘶不時舉發氣息如絕宜速
 灌小續命湯若汗出兩手拭不及者
 不治○愚按前症因去血過多元氣
 虧極或外邪相搏以致筋脈急四
 肢痠強或陰火內動或腰背反張肢
 麻抽搐若有汗而不惡寒者曰柔症

若無汗而惡寒者曰剛瘧由血過多筋無所養故傷寒注下過多潰瘍膿血大泄多患之乃敗症也急以十全大補湯治之如不應急加附子多有伏甦者亦有六淫七情所致者治法見第三卷第三論

附治驗

○產婦牙關緊急腰背攣攣四肢抽搐兩目連劄此去血過多元氣虧損明火熾盛用十全大補加炮薑一劑而甦數劑而安余在吳江史方湖第時將入更聞喧攘詢云家人婦產後出直厨忽仆而死余意其勞傷血氣而發症也急用十全大補加附子煎

滾令人正其面開其口灌之久不能下令側其面而出之換以熱藥如此五次方得下咽遂甦

○小續命湯 治剛瘧或脚氣痺弱不能轉舒行步欹側或口眼喎斜牙關緊急急者弓反張

麻黃 桂心 甘草 各半 防風 三

芍藥 炒 白朮 炒 人參 川芎

附子 炮 防已 酒 黃芩 炒 各

右每服五錢水煎入姜汁少許溫服若自汗為柔瘧去麻黃有熱去附子減桂一半盛冬初春去黃芩

十全大補湯 方見二十四卷第四論

產後血暈腰背反張方論第九

產後口噤由血氣虛而風邪乘於手
三陽經也蓋手三陽之筋循結於頷
得風冷則筋急故致口噤腰背牽急
角弓反張者是風邪入於諸陽之經
也○愚按前症因氣血耗損腠理不
密汗出過多而患之者乃虛象也宜
同氣血為主佐以本方丹溪云產後
當大補氣血為先雖有他症以未治
之如惡寒發熱等症乃氣血虛甚之
極也宜大劑參芪歸朮肉桂以培養
之如不應急用炮附子再不應用人
參一兩炮附子一二錢名參附湯借
猶味應乃藥力未能及也宜多用之
○愈風散 治前症用荊芥畧焙為

末每服三錢豆淋酒下童便亦可其
効如神牙緊灌口鼻

○清順散又名交解散 方見第二卷
第五論

○治婦人產後不省人事吐涎痰癡

當歸 荊芥穗 等分

右每服三錢水一盞酒少許煎灌下
咽即甦○愚按前症如有未應者急
用大補氣血為主

○產後中風白癩皮一兩或共獨活
三兩酒水煎服

○張仲文用白朮四兩以酒頓服

○小續命湯 治產後口噤角弓反

張 見前

產後中風方論卷十

產後中風或血氣未復風寒所感以致筋挛拘急口眼喎斜或肢體緩弱入臟則恍惚驚悸郭稽中云產後強力下床或誤入房或憂怒內傷臟腑陳無擇曰當以脉辨而治之若努力下床日內入房憂怒者非中風類乃滯勞火邪之症也○愚按前症果外邪所屬形氣不足病氣有餘當補元氣為主稍佐以治病之藥若強力下床日內入房屬形氣病氣俱不足當純補元氣多有後甦者若誤投風藥乃促其危也仍參照第三卷諸論主之

治產後身背拘急妄言發熱四肢拘

攣不時驚悸

川芎 羌活 羚羊角

酸棗仁 炒芍藥 桑白皮

防風 右水煎分三服

○治產後中風唇青鼻黑用小續命湯連進三服即愈

○產後中風煩渴用紅華子煎徐呷之

○獨活寄生湯 治煎症亦良仍與第三卷中風類通看

產後四肢筋脈論第十一

產後中風筋脈攣急乃血氣具虛或風邪客於皮膚則頑痺羸之若入於筋脈則四肢挛急皆由皮經空虛風

寒乘虛而漸入也。○愚按肝屬水而主筋前症若肝經風熱血燥用加味逍遙散如不應當用六味地黃丸以補腎水經云風客淫氣精乃亡邪傷肝也仍參第三卷諸論主之。

附治驗

○產婦筋牽臂軟肌肉掣動此氣血俱虛而自熱也用十全大補湯而安。
○產婦手麻服愈風丹遍身皆麻神思倦怠余謂氣血虛弱用十全大補加炮薑數劑漸愈去薑又數劑及逍遙散而痊。

○治產後氣血不足風邪所襲肢節牽痛背項強直。

防風兩 赤芍藥炒 桂心各半兩

羚羊角 川芎 羌活 當歸

酸棗仁炒 牛房子炒各三錢

右每服四錢水酒煎。○愚按前方如味應當用八珍湯更不應用十全大補湯。 ○加味逍遙散

○十全大補湯二方見二十四卷第四論

○六味地黃丸一方見二十四卷第一論

產後瘵方論第十一

竊謂瘵者筋脉拘急也瘵者筋脉張縱也經云肝主筋而藏血蓋肝氣為陽為火肝血為陰為水前症因產後陰血去多陽火熾盛筋無所養而然耳故瘵疽膿水過多金瘡出血過甚

則陽隨陰散亦多致此治法當用八
珍散加丹皮釣藤以生陰血則陽火
自退諸症自愈如不應當用四君甘
歸丹皮釣藤以補脾土蓋血生於至
陰至陰者脾土也故小兒吐瀉之後
脾胃虧損亦多患之乃虛象也無風
可逐無痰可消若屬陽氣脫陷者用
補中益氣加姜桂陽氣虛敗者用十
全大補加桂附亦有復生者此等症
候若肢體惡寒脈微細者此為真狀
若脈浮大發熱煩渴此為假象惟當
固本為善若無力抽搐戴眼反折汗
出如珠流者皆不治

附治驗

○產婦因勞兩臂不能屈服蘇合香
丸肢躄痿軟汗出如水余謂前藥辛
香耗散真氣腠理虛而津液妄泄也
先用十全大補湯加五味子補實腠
理收斂真氣汗頓止又佐以四君子
調補元氣漸愈用逍遙散大補湯調
理而痊

○產婦先胸脇乳內脹痛後因怒口
噤吐痰臂不能伸小便自遺左三部
脈弦余謂此肝經血虛而風火所致
不能養筋先用加味逍遙散治之臂
能屈伸又以補肝散六味丸諸症愈
○婦人發瘵遺尿自汗面赤或時面
青飲食如故肝脈弦緊余曰此肝經

血燥風熱名瘰也肝主小便其色青
人心則赤法當滋陰血清肝火遂用
加味道遙散不數劑諸症悉退而安

附方

○海藏愈風湯一名舉鄉古拜散

治一切失血筋脉緊急產後盜汗後
搖擲

荆芥 為細末 右先以炒大豆黃卷

以酒沃之去黃卷取清汁調前末三
五錢和滓飲之輕者一服重者二三
服中病即止其効如神氣虛者忌服
一方用童便調○本事方云此藥委
有奇効神靈之功大抵產室無風為
佳不可衣被帳褥太煖太煖即汗出

汗出則勝理開易於中風便昏
婦人產後遮護太密更生旺火睡久
及醒則昏昏如醉不省人事用此藥
佐以交加散服之即睡睡中必以左
手撥頭覺必醒矣良又果驗

○交加散 治瘰癧或顛振或產後
不省人事口吐痰涎

當歸 荆芥穗 等分 右為細末每
服二錢水一盞酒少許煎至七分灌
下神効

○增損柴胡湯 治產後或經適斷
致手足牽搐咬牙昏冒異症

柴胡 八錢 黃芩 四錢 人參 半隻 各三錢
石膏 四錢 知母 二錢 黃芪 五錢 甘草 二錢

右為粗末每服半兩薑五片棗四枚
水煎溫服

○四君子湯補中益氣湯方見二十四卷第九論

產後脚氣方論第十三

論曰產後脚氣因元氣內虛六淫外
侵所致其狀發熱昏悶攣攣驚悸心
煩嘔吐氣上用小續命湯治之若以
為敗血攻之則誤矣○愚按前症當
補氣血為主佐以小續命湯寄生湯
如不應加大防風湯仍參第一卷九
論主之已上十一症誠似小兒慢驚
風無風可逐無痰可清但專補元氣
庶保其生

附治驗

○產婦患前症或用獨活寄生湯而
痊後復作服之其汗如水更加口噤
吐痰余用十全大補湯倍養血氣漸
愈後飲食日少肌體日瘦吐痰如湧
此命門火衰脾土虛寒用八味丸及
加味歸脾湯諸症漸退肌肉漸生

○獨活寄生湯 治風邪內攻兩脛

腫痛或緩縱攣脾等症方見四卷第七論

○小續命湯方見前

○大防風湯方見二十四卷第九論

○十全大補湯

○加味歸脾湯方見二十四卷第四論

○八味丸方見十五卷第十一論

大醫院校註婦人良方大全卷之十九終

太醫院校註婦人良方大全卷之二十

江右臨川陳自明良甫編

太醫院使立齊薛已校註

建邑書林泗泉余彰德梓

產後門

產後遍身疼痛方論第一

產後遍身疼痛者由氣虛百節開張
血流骨節以致肢體沉重不利筋脈
引急發熱頭痛宜用趁痛散治之陳
無擇云若兼感寒傷食宜用五積散
若誤作傷寒發汗則筋脈抽搐手足
厥冷則變為瘳當大補氣血為主○
愚按前症若以手按而痛甚甚是血
瘀滯也用四物炮薑紅花桃仁澤蘭

補而散之若按而痛稍緩此是血虛也
也用四物炮薑人參白朮補而養之

附治驗

○產婦身腹作痛發熱不食煩躁不寐盜汗脇痛服解散祛血之藥不時昏憤六脈洪大如無用補中益氣加炮薑半隻一劑頓退二三劑寢食甘美但背強而痛用八珍散大補湯調理而安

○產婦遍身頭項作痛惡寒拘急脈浮緊此風寒之症也用五積散一劑汗出而愈但倦怠發熱此邪氣去而真氣虛也用八珍湯調補而痊

○越痛散 治產後骨節疼痛發熱

頭重四肢不舉

牛膝酒炒 甘草炒 薤白各一兩 當歸

桂心 白朮炒 黃芪炒 獨活

生薑各半兩 右每服半兩水煎

○五積散 方見四卷第九論

附方

○四物湯 ○補中益氣湯 二方見二十四卷第六論

○八珍湯 ○十全大補湯 二方見二十四卷第四論

產後腰痛方論第二

腎主腰脚產後腰痛者蓋腎為胎胞所繫此因產勞傷腎氣以致風冷客之若連背脊痛久未已後遇有娠必至損動愚按前症真氣虛邪乘之者用當歸黃芪湯或十全大補為主

伏以寄生湯如不應須十全大補加附子

附治驗

○產婦腰痛腹脹善噫諸藥皆嘔余以為脾虛血弱用白朮一味炒黃每劑一兩米泔煎時飲匙許四劑後漸安服百餘劑而愈

○治產後風邪頭眩腰痛不可轉側四肢沉重行步艱難

獨活 川芎 芍藥炒 桂心

續斷 生薑 桑寄生各六分 當歸

防風各八分 右水煎服

○如神湯即生料五積散加桃仁逐敗血去風濕產後惡露不盡腰重痛

或兩股痛如錐刺宜服桃仁湯花柳 癰用五香連翹湯

○桃仁湯 治產後惡露不盡腹中作痛或流注腿股作痛急用此湯治之如味應多變作癰須用五香連翹湯

桃仁去皮 蘇木 生地黃各半兩

蜜蟲去足 水蛭炒各三錢 右每服五

錢姜水煎空心熱服以惡露下為度

○五香連翹湯

木香 丁香 沉香 乳香

麝香 外麻 獨活 桑寄生

連翹 木通各二兩

右每服五錢水煎入竹瀝少許服

○當歸黃芪湯 治腰痛不可轉側或汗出壯熱氣短

黃芪 炒芍藥 炒各二兩 當歸 三

右每服四錢水煎

附方

○十全大補湯治症同前又治自汗盜汗或內熱咽熱潮熱發熱或口乾作渴喉痛舌刺或胸乳膨脹脇肋作痛或臍腹陰冷二便不調或頭頸時痛眩暈目花或心神不寧恍惚不寐或形容不充肢體作痛或鼻吸氣冷急趨氣促或因飲食勞役起居失宜或更有一切虛熱之症但服此藥補其根本諸症悉退方見二十四卷第四論

○獨活寄生湯方見四卷第七論

產後惡露不絕方論卷三

產後惡露不絕因傷經血或內有冷氣而臟腑不調故也○愚按前症若肝氣熱而不能主血用六味地黃丸若肝氣虛而不能藏血用逍遙散若脾氣虛而不能攝血用六君子湯胃氣下陷而不能統血用補中益氣湯若脾經鬱熱而血不歸源用加味歸脾湯若肝經怒火而血妄行用加味四物湯若氣血俱虛用十全大補湯若肝經風邪而血佛騰用一味防風丸

附治驗

○產婦惡露淋漓體倦面黃食少惡寒晝夜不寐驚悸汗出此脾經虛熱用加味歸脾湯而痊後因怒脅脹作嘔少食用六君加柴胡治之而痊
○一方用蒲黃一兩水煎頓服○一方貫衆醋蘸炙乾為末每服二錢米飲調下

○返魂丹一名益母草四五月採及胎前產後諸症取陰乾用葉及子不瀉犯鐵器為末煉蜜丸彈子大每服一九細嚼米飲下臨產腹痛或胎動不安或漏血當歸湯化下死胎或胎衣不出或牙關緊急或血暈血熱煩悶如見鬼神併童子小便入酒

少許化下惡露腹痛或淋漓或月水不調當歸酒化下

附方

- 六味丸 方見二十四卷第十一論
- 加味逍遙散 ○加味歸脾湯
- 十全大補湯 三方見二十四卷第四論
- 補中益氣湯 ○六君子湯
- 加味四物湯 三方見二十四卷第六論
- 一味防風丸 方見十二卷第八論

產後惡露不下方論第四

產後惡露不下因臟腑勞傷氣血虛損或風冷相搏所致○愚按前症若惡露不下用失笑散若氣滯血凝用花蕊石散若因去血過多而煩熱不

正宜參第七論主治

附治驗方藥

○產婦患前症服峻厲之劑惡露隨下久而昏憤以手護其腹余曰此脾氣復傷作痛故用手護也以人參理中湯加肉桂二劑補之而愈

○失笑散方見後○人參理中湯方見後

○花蕊石散方見十八卷第四論

○返魂丹方見前

產後惡露上攻心痛論第五

產後心痛為陰血虧損隨火上衝心絡名曰心胞絡痛宜大岩蜜湯治之若寒傷心經名曰真心痛朝發夕死夕發朝死無藥可救○愚按前症若

陽氣虛寒用若岩蜜湯溢之瘀血上衝用失笑散散之血既散而痛仍作用八珍湯補之大凡肚腹作痛以手按之却不痛此血虛也須用補養之劑

附治驗

○產婦患前症昏憤口赤為汗不止手足厥逆用六君子加附子一錢以廻其陽二劑頓愈又以十全大補湯養其血氣而安

○產婦患前症手不敢近腹用失笑散一服下瘀血而愈次日復痛亦用前藥而安

○產婦患前症用大黃等藥其血雖下復患頭痛發熱惡寒次日昏憤自

以兩手堅護其腹不得診脈視其面色青白余為脾氣虛寒而痛也用六君子湯加薑桂而痛止又用八珍湯加薑桂調理而安

○大岩蜜湯 治產後陽氣虛寒心腹作痛不食嘔吐四肢厥逆

生地黄 當歸 獨活 吳茱萸 芍藥 乾薑 甘草 桂心

小草 兩各 細辛 兩右每服半兩煎

○失笑散 治產後惡血上攻心腹作痛或牙關緊急一服可愈

○五靈脂 蒲黃 各一錢

右醋水煎一味五靈脂尤妙

○六君子湯 方見二十四卷第六論

○十全大補湯 ○八珍湯 二方見二十四卷第四論

產後惡露腹痛方論第六

產後腹痛或因外感五邪內傷六淫或瘀血壅滯所致當審其因而治之

○愚按前症若瘀血內停用失笑散風寒外感用五積散

附治驗

○婦產後小腹痛甚牙關緊急此瘀血內停灌以失笑散下血而甦又用四物加炮薑白朮陳皮而愈

○婦人經水來比常度過多不止遂服瀉藥止之致腹作痛此乃氣血凝滯也用失笑散一服而愈

○隱居澤蘭湯 治產後惡露腹痛

或胸滿少氣

澤蘭 生地黃 當歸 芍藥

生薑各一錢 甘草炒五分 大棗四箇

右水煎服

○四物湯 方見二十四卷第六論

○五積散 方見第四卷九論

○失笑散 方見前

產後見諸腹痛論第七

產後兒枕者乃母胎中宿血也或因風冷凝滯於小腹而作痛○愚按前症若宿血作痛失笑散行之既散而仍痛四神散調之若惡心作嘔此屬氣虛用六君子健其胃氣若發熱頭痛或腹痛按而不痛此屬血虛用四

物炮薑參朮補其脾氣

附治驗

○產婦患前症或用驅逐之劑昏憤口噤手足發搐此血氣虛極之變症也用八珍湯加炮薑一錢四劑未應又以十全大補湯加炮薑一錢二劑而甦

○一方用山查濃煎汁入砂糖少許再煎熱服

○失笑散 方見前

○四神散 方見第四卷第四論 ○六君子湯

○四物湯 方見二十四卷第六論

○八珍湯 ○十全大補湯 方見二十四卷第四論

產後小腹痛論第八

產後小腹作痛由惡露凝結或外寒相搏若久而不散必成血瘕而月水不調○愚按前症若因氣滯用延胡索散若因外寒用五積散若因怒氣用四物加木香柴胡若因血虛用四君物參朮炮薑若因陽氣虛弱用四君當歸炮薑若因脾虛血弱用六君當歸炮薑治之

附治驗

○產婦患前症或作嘔或昏憤此脾氣虛寒用人參理中湯漸愈又以補中益氣湯加茯苓半其全愈後復作痛而兼喘仍用補中益氣湯培補脾肺而瘳

○延胡索散

治產後惡血凝滯

下作痛或作寒熱

延胡索 桂心各半 當歸一兩

右為末每服一錢食前用熱酒調下失笑散心效

○當歸養血丸

治產後瘀血心腹脹痛或腰脚疼痛

當歸 赤芍藥 牡丹皮

延胡索炒各二兩 桂心一兩 右為末煉蜜

丸桐子大每服三四十九溫酒下

附方

○人參理中湯

治陽氣虛弱小腹

作痛或脾胃虛弱飲食少思或去後無度或嘔吐腹脹或飲食難化胸膈

不利加附子各附

人參 白朮 乾薑炮 甘草炙

右每服五七錢或一兩水煎服

○五積散方見四卷第九論 ○四君子湯

○四物湯 ○補中益氣湯三方見二十四卷第八論

產後加腹痛方論第九

產後臍腹作痛乃冷氣乘虛也用當歸建中湯治之陳無擇云若產當寒月人門臍下脹痛手不可近者用羊肉湯治之○愚按前症若脾胃虛弱寒邪所侵用蟠葱散若肝經濕熱小便不利用龍膽瀉肝湯仍參前論恐有瘀血為患

附治驗

○產婦小腹作痛小便不利內熱肺熱形體倦怠余用加味道遙散以清肝火生肝血用補中益氣湯補脾胃升陽氣而痊

○羊肉湯 治產婦脾虛寒邪所乘以致腹痛或頭眩脇臍急痛

精羊肉兩 當歸兩 川芎各半

生薑兩 右以水十盞煎至四盞分

四次空心服

○蟠葱散 ○龍膽瀉肝湯二方見二十四卷第八論

○加味道遙散

○補中益氣湯二方見二十四卷第四論

產後兩脇脹痛方論第十

產後兩脇脹痛因惡露不盡或肝經

血虛或肝經氣滯當分而治之○愚按前症若肝經血瘀用玄胡索散若肝經氣滯用四君青皮柴胡若肝經血虛用四物參朮柴胡氣血俱虛用八珍柴胡若腎水不足不能生肝用六味丸若肺金勢盛剋制肝木用瀉白散仍參照前各論王之

附治驗

○產婦因怒兩脇脹痛吐血甚多發熱惡寒胸腹脹痛余以為氣血俱虛用八珍加柴胡丹皮炮薑而血頓止又用十全大補湯而寒熱漸退此症苟非用薑桂辛溫助脾胃以行藥勢不惟無以施其功而反助其脹耳

○經効方 治產後肝經氣滯不平

脇肋腹痛或寒熱往來內熱肺熱

當歸 一錢 五分 芍藥 炒 苦梗 炒 檳榔 枳殼 炒 各 八分 桂心 青木香 柴胡 各 六分 右水煎服

○當歸散 治產後陰血虛弱或氣滯

血凝以致發熱腹痛或腹脇脹滿

以當歸乾薑等分每服二錢水煎

○抵聖湯 治血滯腹痛或腹悶滿

嘔吐不食方見後卷八論○四君子湯

○四物湯 二方見二十四卷第六論

○八珍湯 方見二十四卷第四論

○六味丸 方見二十四卷第十一論

○瀉白散 方見五卷第二論 ○玄胡索散 方見前

夫積者陰氣也五臟所生聚者陽氣也六腑所成然積為陰陰性沉伏故痛不離其部聚為陽陽性浮動故痛無常處皆由飲食不節起居失宜產後血氣虛弱風冷所乘搏於臟腑耳○愚按前症乃真氣虧損邪氣乘之况產後得之尤當固元氣為主若求且夕之效而攻其邪則速其危矣當參前六七論及七卷痿痺諸論治之

附治驗方藥

○產婦腹中似有一塊或時作痛而轉動按之不痛面色痿黃痛則皎白脈浮而濇余謂此肝氣虛而血弱也

不信乃行破血行氣痛益甚轉動無常又認以為血滯專用破血祛逐之藥痛攻兩脇肚腹尤甚益信為蟹確服下蟲等藥去血甚多形氣愈虛肢節間各結小核隱於肉裏以為蟹子畏熱而走於外余云肝藏血而養諸筋此因肝血復損筋涸而擊結耳蓋肢節胸項皆屬肝肚部分養其脾土補金水以滋肝血則筋自舒遂用八珍湯逍遙散歸脾湯加減調治而愈○婦月經不調兩脇腫脹小便澀滯腹中一塊作痛或上攻脇腹或下攻小腹發熱暈熱惡寒肌膚消瘦飲食無味殊類瘵症久而不愈余謂肝脾

血氣虧損用八珍湯逍遙散歸脾湯
隨症互服而愈

○逍遙散○八珍湯

○歸脾湯 三方見二十四卷第四論

產後血瘀方論第十二

產後瘀血與氣相搏名曰癥謂其痛
而無定處此因風有風冷而成輕則
否澁重則不通○愚按前症乃寒邪
乘客氣血壅結此因氣病而血病也
當補養胃氣調和月經寬緩靜養為
善難經云任脈之病男子為七疝女
子為瘕聚當參前後各論治之
○治血瘀作痛臍下脹滿或月經不
行發熱體倦

當歸八分 桂心 芍藥炒 血竭

蒲黃炒各六分 延胡索炒四

右為末每服二錢心酒調下

○葛氏方治症同前用桂心為末每
服一錢空心酒調下

產後餘血奔心煩悶方論第十三

產後瘀血奔心蓋因分娩後不飲童
便以致虛火上炎所致宜用後方主
之○愚按前症當與前第五論同治
○金黃散 治惡熱上衝肚腹作痛
或發熱作渴

延胡索 蒲黃各一錢 桂心二分

右為末酒調服

○一方用炒蒲黃每服二錢水煎服

失笑散亦佳

產後虛煩發熱方論第十四

○竊謂前症乃陽隨陰散氣血俱虛若惡寒發熱煩躁作渴急用十全大補湯若熱愈甚急加桂附若作渴面赤宜用當歸補血湯若誤認為火症投以涼劑禍在反掌王太僕先生云如大寒而甚熱之不熱是無火也熱來復去晝見夜伏夜發晝止不時而熱是無火也當治其心如大熱而甚寒之不寒是無水也熱動復止倏忽往來時動時止是命水也當助其腎故心成則生熱腎盛則生寒腎虛則寒動於中心虛則熱收於內又熱不

勝寒是無火也寒不勝熱是無水也治法前症無水者六味丸無火者八味丸氣血俱虛者八珍湯與十全大補湯

附治驗

○大尹俞君之內產後發熱睡熱吐血便血兼盜汗小便頻數胸膈脹痛肚腹痞悶余曰此諸臟虛損也症當固本為善自特和醫用降火之劑更加瀉利腸鳴嘔吐不食腹癢足冷始信余言診其脈或浮洪或沉細或如無其面或青黃或赤白此虛寒假熱之狀時雖伸隻當捨時從症先用六君子加炮薑肉桂數劑胃氣漸復諸

症漸退更佐以十全大補湯半載全愈

○儒者楊敬之內人所患同前但唾痰涎或用溫補化痰之劑不應面色驚黑兩尺浮大按之微細此因命門火虛不能生脾土脾土不能生諸臟而為患也用八味丸補土之母而痊

○人參當歸湯 治產後虛煩短氣煩悶

人參 當歸 麥門冬 桂心

生地黄 各二錢 大棗 四枚 粳米 合

淡竹葉 二錢 右水煎服

○蒲黃散 治症同上 方見前兒枕痛

○四物湯加扶神遠志治產後虛煩十全大補湯充効

○六味丸

○八味丸 方見二十四卷第十一論

○八珍湯

○十全大補湯 方見二十四卷第四論

○六君子湯 方見二十四卷第六論

太醫院校註婦人良方大全卷之二十終

太醫院校註婦人良方大全卷之二十一
產後門

產後口乾味苦論第一

論曰產後口乾痞悶因食米麪乾飯
太早脾胃不能消化熱鬱所致慎不
可下但服見現丸則愈無擇云若內
積憂煩外傷燥熱宜四物湯去地黃
加入參烏梅可愈○愚按前症若宿
食停滯用六君枳實神麪若因肉食
所致更加山查若因魚鱸之類再加
陳皮其物既消而仍痞或反作痛作
嘔此脾胃受傷用六君子湯或噯酸
噯腐加炮薑作瀉更加升麻如不應
佐以四神丸或間用補中益氣湯為

是

附治驗

○婦人食角黍煩渴痞悶腹痛大便欲去不去服消導等藥不應飲食日減飢體日瘦半年矣余謂此食積為患用大酒麴炒為末溫酒調服二錢俄間腹鳴良久仍下糞而愈

○婦人食魚鮮腹痛患痢諸藥不應用陳皮白朮等分為末以陳皮湯送下數服而愈

○見現丸

薑黃炒 三稜醋 芫花 陳皮

良薑 人參 莪酒 等分

右為末用蘿蔔汁糊丸桐子大每服

三十九白湯下

○產後心煩發渴宜青心蓮子飲方見

附方

○六君子湯 ○補中益氣湯方見

卷第 六論 ○四神丸方見八卷第八論

產後血渴方論第二

○竊謂前症若出血過多虛火上炎用童子小便或四物白朮麥門丹皮若胃氣虛而有熱用竹葉歸芪湯若血虛發熱用八珍加麥門五味若血脫發熱煩躁用當歸補血湯若胃氣虛弱用補中益氣湯或七味白朮散

附治驗

○產婦心前症朝寒暮熱肚腹作痛以手按之不痛余以為血氣俱虛用八珍之類治之彼反行逐血更加發熱煩躁余用當歸補血湯熱躁漸止用八珍麥門五味氣血漸復

附方

○七味白朮散 治中氣虛弱津液短少口乾作渴或因吐瀉所致

人參 白朮 炒木香 白茯苓

甘草 炒藿香 乾薑 各一錢

右水煎服

○竹葉歸芪湯 治胃氣虛熱口乾作渴惡冷飲食者

竹葉 一錢 當歸 一錢 黃芪 一錢 白朮 五分

人參 各一錢 麥門冬 七分 甘草 五分 右水煎服

○四物湯 ○補中益氣湯 二方見二十四卷第六論

○八珍湯 方見二十四卷第四論

○當歸補血湯 方見二十四卷第十論

產後乍寒乍熱方論第三

產後乍寒乍熱由血氣虛損陰陽不和若陰勝則乍寒陽勝則乍熱宜用增損四物湯若因敗血不散腹內作痛宜用奪命丹後用增損四物湯隨病加減無擇云敗血流閉諸陰則寒流閉諸陽則熱用大調經散五積散 ○愚按前症若因陽氣不足陰氣上入於陽中而惡寒者用補中益氣湯

若因陰氣不足陽氣下陷於陰中而發熱者用六味地黃丸若氣血不足而惡寒發熱者用八珍湯若病後寒熱倦怠者用補中益氣湯若肌熱大渴目赤面紅者用當歸補血湯

附治驗

○產婦惡寒發熱余以為血氣虛寒用十全大補加炮薑而寒熱愈用補中益氣而肢體安又食後犯怒惡寒發熱抽搐咬牙面色青中隱黃此肝木侮脾土飲食停滯用六君子加木香一劑而安

○產婦惡寒發熱余以為氣血俱虛不信反用小柴胡湯致汗出謔語煩

熱作渴肢體抽搐余用十全大補劑益甚脈洪大重按口無此藥力不能及乃加附子四劑稍緩數劑而安

○增損四物湯

人參 當歸 芍藥 川芎

乾薑 炒各一兩 甘草 四錢

右每服四錢水薑煎

○大調經散 治產後惡露未清寒熱自汗或肚腹作痛

大豆 炒一兩半 扶神 兩 真琥珀 錢一

右為末每服一錢空心濃煎烏豆紫蘇湯調下

附方

○六君子湯 ○補中益氣湯 二方見二十四

卷第 六論 ○當歸補血湯 方見二十四卷第十一論

○八珍湯 ○十全大補湯 二方見二十四卷第四論

○六味地黃丸 方見二十四卷第十論

產後虛弱論第四

郭稽中云產後乍寒乍熱者多是敗血為害或陰陽不和若緊作瘧疾治之誤矣陳無擇曰產後寒熱或一二日或二三日一發或先寒後熱或先熱後寒或寒多熱少或熱多寒少或純寒純熱者皆是瘧疾最難治療可用草菓飲生熟飲四獸飲選用之○愚按前症當與第十四卷第十論參看用藥以補胃氣為主佐以草菓飲之類若胃氣稍充以草菓飲為主佐

以補胃劑大抵產後瘧疾因脾胃虛弱飲食停滯或外邪所感或鬱怒傷脾或暑邪所伏審飲食用六君加桔梗蒼朮藿香如外邪多而飲食少用藿香正氣散如外邪少飲食多人參養胃湯勞役所傷用神中益氣湯氣血虛弱用十全大補加炮薑中氣虛寒用六君加薑桂元氣脫陷急加附子蓋氣虛則寒血虛則熱胃虛則惡寒胃氣下陷則寒熱交作或吐瀉不食腹痛煩渴發熱譫語或手足逆冷寒戰如慄雖見百症但溫補脾胃其病自退若誤用清脾截瘧之類多致不起

附治驗

○產婦患瘧發熱作渴胸膈脹滿遍身作痛三日不食嘔酸噯氣此是飲食所傷脾胃不能消化用六君加神麴山查四劑而不作酸乃去神麴山查又數劑而飲食進其大便不通至三十五日計進飲食七十餘碗腹始悶令用猪膽汁導而通之其糞且不甚燥

○產婦患瘧久不愈百病蜂起其脈或洪大或微細或弦緊或沉伏難以名狀用六君加炮薑二十餘劑脈症稍得又用參朮煎膏佐以歸脾湯百餘劑而瘳

○產婦朝寒暮熱或不時寒熱久不愈用六君子補中益氣湯服百餘劑而尋愈

○產後瘧疾心脾痛見小產

產後瘧疾及論

○愚按瘧勞蓋產後虛弱元氣不復所致故寒熱食少頭目四肢腹痛若脾虛而不能生血者用六君子湯加當歸若脾肺氣虛而咳嗽口乾用補中益氣加麥門五味若因中氣虛而口乾頭暈用補中益氣加蔓荊子若肝經血虛而肢體作痛用四物參朮若因肝腎虛弱而自汗盜汗寒熱往來者用六味丸加五味子若因脾虛

血弱壯腹作痛見經不調用八珍湯
倍加白朮若因脾虛血燥皮膚瘙癢
用加味逍遙散大抵此症多因脾胃
虛弱飲食減少以致諸經疲憊而作
當補脾胃飲食一進精氣生化諸臟
有所倚賴其病自愈矣仍照虛煩發
熱方論主治

○增損柴胡湯 治產後虛弱寒熱
如瘧食少腹脹

柴胡 人參 甘草 半隻
陳皮 川芎 白芍藥 各
等分

右每服五錢水薑棗煎日二服

○白茯苓散 治產後震勞頭目四
肢疼痛寒熱如瘧

白茯苓 當歸 川芎 桂心

白芍藥 黃芪 人參 各半

熟地黃 右先以水三盞入

猪腎一雙薑棗各二事煎一盞去之
入前藥半兩煎一盞服

○猪腰子粥 治產後葶勞發熱用
猪腰子一枚去膜切片用鹽酒拌先
用粳米一合入葱椒黃芩鹽醋和將
腰子鋪碗底以熟粥蓋之如作盒生
狀空心服

○黃芪建中湯 治產後諸虛不足
發熱或惡寒腹痛

黃芪 肉桂 白芍藥 各二

甘草 右每服五錢用薑棗水

煎日二三服虛甚須加附子

附方

○六君子湯補中益氣湯

○四物湯三方見二十四卷第六論

○六味丸方見二十四卷第十一論

○八珍湯加味逍遙散 二方見二十四卷第四論

產後虛弱論

產實云產後虛羸者皆由產後虧損血氣所致須當慎起居節飲食六淫七情調養百日庶保無疾若中年及難產者毋論日期必須調養平復方可治事否則氣血復傷虛羸之症作矣○愚按前症產傷氣血者用八珍湯飲食傷胃者用四君子湯停食傷

脾者用六君子湯勞傷元氣者用補中益氣湯若愛氣覺有藥味者此藥復傷胃也但用四君子湯徐徐少飲以調脾胃若胃氣一健血氣自生諸症自愈矣

○黃雌雞湯 治產後虛羸腹痛

小黃雌雞一隻去頭足翅 當歸

白朮炒 熟地黄自製 桂心 黃芪炒各

右先以水七鍾煮雞至三鍾每用汁

一鍾藥四錢煎日二服

○十全大補湯 治產後氣血未復

形體虛弱發熱惡寒等症方見二十四卷第四論

產後風症論

產後氣血勞傷臟腑虛弱若風冷乘

之血氣愈虛形氣羸損風冷入臟冷
入無子謂之風虛冷勞也○愚按前
症若血氣虛弱用八珍湯血氣虛寒
用十全大補湯胃氣虛弱用補中益
氣湯脾氣虛弱用六君子湯命門火
衰用八味丸肝脾血虛用加味逍遙
散肝脾鬱怒用加味歸脾湯

○產寶方治產後虛羸不生飢肉

黃芪妙當歸妙芍藥妙人參各三錢

桂心妙甘草妙川芎妙生薑各四錢

大棗十二枚右水煎分三服

○又方猪腎一雙煮入葱豉作臠如常食之

產後腹脹嘔吐方論第八

產後腹脹滿悶嘔吐者因敗血散於脾胃不能運化而致宜用抵聖湯治之○愚按前症若敗血散於腸胃宜用前方若飲食停於脾宜用六君子厚朴若飲食傷於胃宜用六君子湯大凡損其脾者當節其飲食為善

附治驗

○產婦患前症或用抵聖湯敗血已下前症益甚小腹重墜似欲去後余謂此脾氣虛而下陷用補中益氣湯加炮薑溫補脾氣重墜如失又用六君子湯而安

○抵聖湯

赤芍藥 半隻 澤蘭葉 人參

陳皮 甘草 炒各一錢

右用生薑焙乾半兩水煎○愚按前方最宜用之

附方

○六君子湯○補中益氣湯二方見二十

不食

經云胃為水穀之海以養臟腑因產後胃氣虛弱飲食所傷必致嘔逆故不食也○愚按前症若因飲食過時用四君子湯飲食過多用六君子湯飲食過時而兼勞役用補中益氣若因飲食停滯用人參養胃湯脾胃氣虛用六君子湯胃氣虛寒加炮薑木香寒水侮土用益黃散肝木侮脾土

用六君升麻柴胡命門火衰不能生土用八味丸嘔吐泄瀉手足俱冷或肚腹作痛乃陽氣虛寒急用附子理中湯多有生者

附治驗

○產婦朝吐痰夜發熱晝夜無寐或用清痰降火肌體日瘦飲食日少前症愈甚余曰早間吐痰脾氣虛也夜間發熱肝血虛也晝夜無寐脾血耗也遂用六君子湯加味道遙散加味歸脾湯以次調補而痊

○開胃散 治產後胃虛嘔吐胸滿不食

訶子肉 兩 人參 兩 甘草 炒半

右每服五錢薑水煎

○治產後胃虛嘔逆

橘紅兩一 半萹 甘草各半兩 藿香兩三

右每服五錢姜水煎

○治產嘔逆不食白朮錢五 薑錢六 水煎

徐徐溫服

○石蓮散兩半 白茯苓兩一 丁香錢五

右為末每服二錢不拘時用薑湯或米飲調下日三服

附方

○錢氏益黃散 治脾土虛寒水反來侮以致嘔不食或肚腹作痛或大便不實手足逆冷等症

陳皮兩一 青皮 呵子肉 甘草錢三

丁香錢三 右為粗末每服四錢水煎服

○人參養胃湯 治外感風寒內傷飲食寒熱頭疼或作嘔疾

半萹 厚朴製 橘紅八分 藿香葉

草菓 茯苓 人參五分 甘草分 炙二

蒼朮錢一 右姜七片烏梅一箇水煎

○四君子湯 ○補中益氣湯二方見二十四卷第六論

○八味丸方見二十四卷第十一論

○附子理中湯方見二十卷第八論

○加味逍遙散 ○加味歸脾湯二方見二十四卷第四論

產後霍亂論第十

產後霍亂因臟腑虛損飲食不消觸冒風冷所致若熱而飲水者五苓散寒而不飲水者理中丸虛冷者加附

子來復丹尤妙○愚按此症當與後
卷第十一論互相主治

附治驗

○產婦停食霍亂用藿香正氣散之類已愈後胸腹膨脹飲食稍過即嘔吐或作泄瀉余謂此脾胃俱應用六君子湯加木香治之漸愈後因飲食失調兼患怒思霍亂胸腹大痛手足逆冷用附子散又用八味丸以補土母而康設泥痛無補法而用辛散或用平補之劑必致不起

○產婦吐瀉噯酸面自浮腫此脾氣虛寒先用六君加炮薑為王佐以越鞠丸而噯酸愈又用補中益氣加茯苓

茯苓其而脾胃康

○白朮散 治脾胃傷吐瀉腹痛煩渴手足逆冷或大便不實

白朮 橘紅 麥門冬去心 人參
乾薑炮各半兩 甘草兩

右每服四錢姜水煎

○附子散 治脾胃虛寒吐瀉腹痛手足逆冷或自汗口噤

附子炮 白朮炒 當歸 吳茱萸
丁香 橘紅 甘草炒各半兩

右為末每服二錢粥飲調若脾胃虛用參苓白朮散

附方

○藿香正氣散 治外感風寒內停

飲食頭疼寒熱或霍亂泄瀉或作瘧疾

藿香 一錢五分 桔梗 炒 大腹皮 紫蘇

茯苓 白芷 半隻麴 陳皮

白朮 炒 厚朴 製各一錢 甘草 炙五分

右薑棗水煎熱服

○五苓散

白朮 炒 猪苓 各二錢 桂 三分 澤瀉 一錢五分

茯苓 一錢 右水煎服

○理中丸 治脾胃虛寒嘔吐泄瀉

飲食少思肚腹膨脹

人參 白朮 炒 乾薑 炮 甘草 炙各一錢

右為末米糊丸彈子大每服一九嚼

細白湯下

○來復丹 治伏暑泄瀉身熱脈弱

其效如神愴卒間須用此藥

硝石 一兩同硫黃火上微炒用柳條攪砂子不可火大

太陰玄精石 研 舶上硫黃 各二兩

五靈脂 去砂 青皮 陳皮 各二兩

右為末醋糊丸小豆大每服三十九

空心米飲下 ○易簡方云硝石性寒

佐以陳皮其性疎快硫黃性寒味澁

若作煖藥以止瀉誤矣蓋由啖食生

冷或冒暑熱之氣中脘閉結權霍變

亂非此藥不能通利三焦分理陰陽

其功甚速 ○六君子湯 方見二十四卷第六論

○八味丸 方見二十四卷第十一論

太醫院校註婦人良方大全卷之二十一

產後

後寒熱方論

產後發熱頭痛身眩雖如傷寒時氣
 雖當用麻黃亦不可輕易如早起勞
 動為寒所傷則漸漸惡寒翕翕發熱
 頭項肩背骨節皆痛至七八日乃差
 若大便堅作嘔不能食用小柴胡湯
 加生薑地黃主之○愚按病机要云
 治胎產之病從厥陰經論之無犯胃
 氣及上中二焦為之三禁不可汗不
 可下不可利小便發汗者同傷寒下
 之早證利大便則脈數而已動於脾
 利小便則內亡津液胃中枯燥製藥

之法能不犯ハ三禁則榮衛自和而寒熱止矣止云

○人參當歸散 治去血過多內熱短氣頭痛悶亂骨節作痛或虛煩咽燥

人參 當歸 生地黃 桂心

麥門冬去心各一兩 白芍藥

右粳米一合竹葉十片水二鍾煎一鍾去之入藥五錢漿二枚煎服虛甚用熟地黃

○小柴胡湯 治傷風四肢煩熱頭疼若頭不疼而作煩一物黃芩湯見方

○二物黃芩湯

黃芩半兩 苦參一兩 生地黃二兩

右每服四錢水煎

○增損柴胡湯 治虛弱寒熱少食腹脹等症方見勞瘵

○竹葉防風湯 治產後傷風發熱面赤氣喘頭痛

淡竹葉半斤 防風 人參 桂枝

苦梗 甘草各半兩 葛根一兩

右每服五錢薑棗水煎汗出項強加附子嘔加半隻

○治惡露不盡晝則明了夜則譫語寒熱如見鬼此執入血室用柴胡地黃湯或四物加柴胡方見卷十五論

產後頭痛方論第二

夫頭者諸陽之會也產後胃氣虛弱飲食少思陽氣微弱不能上升故頭痛若因敗血黑龍丹言之甚詳

○愚按前症若中氣虛用補中益氣湯加蔓荊子若血虛用四物加參朮血氣俱虛用八珍湯若因風寒所傷用補中益氣湯加川芎

附治驗

○產婦患頭痛日用補中益氣湯不效已二年矣稍勞則惡寒內熱為陽氣虛以前湯加附子一錢數劑不發
○婦人產後頭痛面青二年矣日服四物等藥奈謂腎水不能生肝木而血虛用六味丸加五味子兩月而痊

○芎附散 治氣虛頭痛用大附子一枚去皮臍切四片拌醃醋一碗炙

附蕪盡同川芎一兩為末每服二錢清茶調服

○治血虛頭眩當歸川芎每服五錢水煎

○產後頭痛都梁丸亦可治 方見四卷第六論

附方
○補中益氣湯

○四物湯 二方見二十四卷第六論

○八珍湯 方見二十四卷第四論

○六味丸 方見二十四卷第十一論

產後咳嗽方論第三

夫肺主于氣產後肺氣虛故外邪感

而咳嗽所出作也若食鹽醃之類而致者難治若因麵積滯而致者服黑神散五積散可愈愚按前症若陰血虛四物湯加參朮陳皮桔梗肺氣虛四君加芎歸桔梗陰火上炎六味地黃丸加參朮風寒所感補中益氣湯加桔梗紫蘇若瘀血入肺發喘兼口鼻起黑或鼻出血急用一味參蘇飲亦有得生者然而所患悉因胃氣不足蓋胃為五臟之根本胃氣一虛五臟失所百病生焉經云肺屬辛金生于巳土脾土既虛不能生金則滕理不密外邪易感矣治當壯土金生腎水以制火為善

附治驗

○產婦朝吐痰夜發熱無寐泥用清痰降火之藥肌腠日瘦飲食日少余曰早間吐痰脾氣虛也夜間發熱肝血虛也晝夜無寐脾無耗也遂用六君子湯加味道遙散加味歸脾湯以次調補不月而痊

○產婦咳嗽見風則喘急惡寒頭痛自汗口禁痰盛余為脾肺氣虛滕理不密用補中益氣加肉桂數劑而安○產婦咳嗽聲重鼻塞流涕此風寒所感余用參蘇飲一鍾頓愈與補中益氣加桔梗茯苓等集一劑將痊又與六君黃芪以實滕理全愈

○產婦咳嗽痰盛面赤口乾內熱肺熱徹作無時此陰火上炎余用補中益氣湯六味地黃丸而愈

○產婦咳而狀滿不食涕唾面腫氣逆此病在胃而關于肺用異功散而愈

○知母散 治惡露上攻咳嗽不已

知母 貝母 白茯苓 人參各半兩

桃仁 杏仁並生去皮

右每服五錢水煎

○治風寒咳嗽

甘草 桔梗各六分 款冬花四分

麥門冬 生地黃各一錢二分 葱白一握

右水煎服

○旋覆花湯 治咳嗽最良方見下

附方

○異功散 治脾胃虛弱飲食不思或久患咳嗽或狀滿不食而浮氣逆等症

人參 白朮炒 甘草炒 茯苓

陳皮各一錢 右姜棗水煎服

○六君子湯 ○四物湯 ○四君子湯

○補中益氣湯四方見二十四卷第六論

○六味丸方見二十四卷第十一論

○二味參蘇飲方見後

○參蘇飲方見六卷第十一論

後發中氣喘促方論第四

產後喉中氣急喘促因榮血暴竭衛氣無主獨聚于肺名曰孤陽最為難治若因敗血停凝服奪命丹若因榮血暴絕服普濟湯若因風寒所傷服旋覆花湯若因氣鬱結服小調經散若因傷飲食服見現丸○愚按前症若脾肺氣虛弱用六君桔梗若兼外邪更加紫蘇若中氣虛寒用補中益氣加炮薑肉桂若陽氣虛脫更加附子若瘀血入肺急用二味參蘇飲

附治驗

○產婦喘促自汗手足俱冷常以手護臍腹此陽氣虛脫用參附湯四劑而愈

○二味參蘇飲 治產後血入於肺面黑發喘欲死者

人參兩 蘇木二兩 右水煎頓服

○旋覆花湯 治傷風寒暑濕喘嗽太盛坐臥不寧

旋覆花 赤芍藥 前胡 半夏麴 荊芥穗 甘草 茯苓

五味子 杏仁 麻黃 各等分 右每服四錢薑棗水煎 有汗者莫服

○五味子湯 治產後喘促脈伏而厥

五味子 枳殼 人參 杏仁 各二錢 麥門冬 心陳皮 各二錢

右薑三片棗二枚水煎服

○芎藭湯 方見後

附方

○六君子湯 ○補中益氣湯 二方見二十四卷論

卷第 ○參附湯 方見十八卷六論

產後 參附湯 方論

產後口鼻起黑氣及鼻衄者蓋陽明經脈之海起於鼻交額中還出頰口交人中左之右右之左此產後氣虛榮血散亂胃絕肺敗之症也急取緋線一條并產婦頂心髮兩條繫中指節更無藥可療 ○愚按胃脈俠口繞承漿蓋鼻準屬脾土鼻孔屬肺金誠胃虛肺損氣脫血死之症急用二味參蘇飲加附子五錢亦有得生者

產後咳嗽 方論

夫肺主於氣而稟於胃蓋產後脾胃傷損風冷所搏故咳嗽也急灸期門三壯必愈此穴乃胃之大絡 見六卷第十論 ○愚按前症屬胃氣虛寒之惡候如用後方未應急投參附湯亦有復生者 方見十八卷第八論

○丁香散 治心煩咳噫

丁香 白芷 藜蘆 伏龍肝 兩 右為末煎桃仁 吳茱萸湯每服一錢調下

○羌活散 治咳逆

羌活 附子 炮 茴香 炒各半兩 木香 白薑 一錢 右為末每服一錢水

一匙鹽一捻煎服

服 ○一方用桂心五錢姜汁三合水煎

產後血崩方論第七

產後血崩因經脈未復而勞傷或食酸鹹之味若小腹滿痛肝經已傷最為難治急服固經丸主之 ○愚按前症若血滯小腹脹滿用失笑散血少小腹虛痞芎藭湯肝火血妄行加味逍遙散脾鬱不統血加味歸脾湯脾氣不攝血補中益氣湯厚味積熱傷血清胃散加槐花風熱相搏傷血四君子防風枳殼

附治驗

產婦血崩小腹脹痛用破氣行血之劑其崩如湧四肢不收惡寒嘔吐大便頻瀉余用六君炮黑姜四劑稍愈又十全大補二十餘劑而痊

○產婦血崩因怒其血如湧仆地口禁目斜手足抽搐此肝經血耗生風余用六味丸料一劑諸症悉退但食少嗜熱佐以四君柴胡牡丹皮而愈

○固經丸

艾葉 赤石脂 補骨脂炒

木賊各半兩 附子一箇 右為末飯丸

桐子大每服二十九溫酒或米飲

○芎藭湯

芎藭 當歸 芍藥各等分

右每服五錢水煎

附方

○失笑散 方見二十卷第五論

○十全大補湯 ○加味逍遙散

○加味歸脾湯 三方見二十四卷第四論

○補中益氣湯 ○六君子湯

○四君子湯 三方見二十四卷第六論

○清胃散 方見二十四卷首論

○六味丸 方見二十四卷第十一論

產後月水不調方論第八

產後月水不調由血氣虛損風邪所客邪正相搏以致經候失期或多或少而不得其平也○愚按前症若過期而作痛者氣血俱虛也八珍加柴胡丹皮不及期而來血熱也四物山

梔柴胡將來而作痛血實也四物加桃仁紅花過期而來者血虛也四物加參朮紫黑成塊者血熱也四物加炒梔炒連丹皮作痛而色淡者痰多也四物合二陳治當臨症制宜

附治驗

○產婦月經不調內熱燥渴服寒涼之劑其血如崩腹脹寒熱作嘔少食用六君子二十餘劑諸病悉愈以加味逍遙散調理而安

○琥珀散 治經脈不調飲食少思日漸消瘦

- 琥珀 牛膝 生地黃 當歸 各二兩
- 桃仁 赤芍藥 各半兩

右每服五錢水薑煎

附方

○八珍湯 ○加味道遙散 二方見二十四卷第四論

○四物湯 ○六君子湯 二方見二十四卷第六論

○二陳湯 方見二十四卷第五論

產後月水不通方論

產後乳子周歲而經不行是其常也
若半歲而經行此血有餘也若一二
歲不行而無疾不必服藥若肢體倦
息食少內熱是血少也宜健脾胃若
以藥通之則誤矣 ○愚按前症脾胃
虛弱用六君子湯若兼鬱火傷脾用
歸脾湯加丹皮山梔若怒火傷血宜
用四物合小柴胡氣血俱虛用八珍

牡丹皮仍參前論主之

附治驗方藥

○產婦月經年餘不通內熱晡熱服
分氣丸經行不止惡寒作渴食少倦
怠胸滿氣壅朝用加味道遙散夕用
四君子湯月許諸症稍愈佐以八珍
湯兼服兩月而愈

○六君子湯 ○四物湯

○四君子湯 三方見二十四卷第六論

○歸脾湯 ○加味道遙散

○八珍湯 三方見二十四卷第四論

○小柴胡湯 方見二十四卷第二論

產後四肢浮腫方論

產後四肢浮腫者乃敗血乘虛流注

宜用小調經散陳無擇云若風邪所乘於氣分皮膚腫而浮虛乃氣也若皮膚腫如熟李乃水也蓋氣腫者宜發汗水腫者宜利小便○愚按前症若寒水侮土損傷脾肺若氣虛浮腫宜益脾胃若水氣浮腫宜補中氣當參第一卷水分血分主治

附治驗

○產婦飲食少思服消導之劑四肢浮腫余謂中氣不足朝用補中益氣湯夕用六君子湯而愈後因怒腹脹誤服沉香化氣丸吐瀉不止飲食不進小便不利肚腹四肢浮腫用金匱加減腎氣丸而愈

○產婦泄瀉四肢面自浮腫喘促惡寒余謂脾肺虛寒用六君加薑桂而泄瀉愈又補中益氣而脾胃健

○小調經散

沒藥 琥珀 桂心 芍藥

當歸各一錢

右為末每服半錢薑汁溫酒調

○大調經散 最治腫滿喘急煩渴

小便不利方見二十一卷第三論

○漢防已散 治水腫

漢防已 猪苓 枳殼炒

桑白皮各一兩 商陸 甘草各三錢

右每服四錢水煎

○治血虛氣腫水腫

澤蘭葉 防已分等

右為末每服二錢溫酒調下醋湯亦可

○金匱加減腎氣丸 治脾腎虛寒 腰重脚腫濕飲留積小便不利或肚 腹腫脹四肢浮腫氣喘痰甚或已成 水症其効如神

白茯苓兩 附子兩 川牛膝 肉桂

澤瀉 車前子 山茱萸 山藥

牡丹皮各一兩 熟地黄四兩 碎酒

右為末和地黄膏煉蜜丸桐子大每 服七八十九空心米飲下

附方

○補中益氣湯

○六君子湯二方見二十四卷第六

產後腹痛瀉利方論第十一

產後腹痛瀉利因腸胃虛怯寒邪乘 襲或水穀不化洞泄腸鳴兼手足逆 冷用補中湯治之陳無擇云若六淫 七情而致者當隨所感而治之○愚 按前症若胸膈飽脹或惡食吞酸此 飲食停滯用六君枳實山查以消導 若食既消而仍痛更或頭痛熱渴惡 寒欲嘔此中氣被傷用補中益氣半 隻茯苓以健脾胃

附治驗

○產婦腹痛發熱惡食余以為飲食 傷脾彼反服破血之劑加寒熱頭痛

嘔吐涎沫用化痰理氣四肢逆冷泄瀉下墜余用六君加炮薑肉桂木香再用補中益氣湯而愈

○產婦腹痛後重去痢無度形躄倦怠飲食不甘唇腫盜汗竟夜不寐此脾經虛熱之症用當歸六黃湯內黃芩連栢炒黑一劑汗止乃用歸脾八珍兼服而愈

○調中湯

良姜 當歸 桂心 芍藥

附子 炮 川芎 各一兩 甘草 炒五錢

右每服三錢水煎服

附方

○六君子湯 ○補中益氣湯 二方見二十四

卷第六論 ○當歸六黃湯 方見十九卷

○歸脾湯 ○八珍湯 二方見二十四

產後赤白痢方論第十二

產後痢疾因飲食六滯七情傷于脾胃或血滲大腸皆為難治若飲食不進謂之虛痢氣字不順謂之氣痢治法熱則涼之冷則溫之冷熱相搏則溫涼調之滑者澀之虛者補之水穀不分者分利之性情執滯者和順之未有不妥者也 ○愚按前症白屬氣分而赤屬血分也若米食所傷用六君加穀藥若麩食所傷用六君加麥蘗若肉食所傷用六君加山查神麩凡兼嘔吐俱加藿香若兼噤酸或嘔

吐用前藥送越鞠丸若肝木克脾土
用六君加柴胡炮薑若寒水反來侮
土用錢氏益黃散若久瀉或元氣下
陷兼補中益氣湯以升發陽氣若瀉
痢色黃乃脾土真氣宜加木香肉豆
蔻若屬脾土虛寒用六君加木香薑
桂若脾腎虛寒用補中益氣及四神
丸若屬命門火衰而脾土虛寒用八
味丸以補土母若小便瀦滯肢體漸
腫或兼喘咳用金匱順氣丸以補脾
腎利水道若胃氣虛弱而四肢浮腫
須補胃為主若久而不愈是腎氣虧
損也必用四神六味八味三藥以補
足三陰若用分利導水之劑是虛其
虛也

○產婦泄痢腹痛年餘形體骨立內
熱暈熱自汗口舌糜爛日吐痰二碗
許脈洪大重按全無此命門火衰脾
土虛寒而不能攝痰歸源用八味丸
補火以生土用補中益氣湯兼補肺
金而痊

○產婦食雞子腹中作痛面色青黃
服平青二陳更下痢腹脹用流氣飲
子又小腹一塊不時上攻飲食愈少
此脾胃虛寒肝木尅侮所致用補中
益氣加木香吳茱萸漸愈又用八珍大
補兼服調理尋愈

○五味子散 治產後泄瀉或腎泄

在侵晨五更作瀉飲食不進或大便不實不時去後為尤尤効

五味子炒三兩 吳茱萸炒五錢

右為末每服二錢白湯調

○四神丸 治脾胃虛弱大便不實

飲食不思方見八卷九論 二神丸方見八卷

○二神丸 ○六君子湯二方見八卷第八論

○補中益氣湯方見二十四卷第八論

○香連丸方見八卷第八論

○六味丸 ○八味丸二方見二十四卷第十一論

○金匱腎氣丸方見前

○八珍湯方見二十四卷第四論

太醫院校註婦人良方大全卷之二十三終

太醫院校註婦人良方大全卷之二十三

產後門

產後痢疾作渴方論第一

產後下痢作渴者乃內亡津液或胃

氣虛不能生津液但止其渴痢自差

○愚按前症若渴而不喜冷飲屬胃

氣虛不能生津液宜用七味白朮散

夜間發熱口渴屬腎水弱而不能潤

宜用六味丸並佐以益氣湯以滋化

源

附治驗方藥

○產婦瀉痢發熱作渴吐痰肌體油

瘦飲食少思或胸膈痞滿或小腹脹

墜年餘矣余以為脾腎之瀉朝用二

神丸夕用六君子三月餘而痊

○產婦患前症形體倦怠飲食不進與死為鄰此脾胃俱虛也用四神丸十全大補湯而愈

附方

○七味白朮散方見二十一卷第二論

○六味丸方見二十四卷第十二論

○補中益氣湯

○六君子湯二方見二十四卷第六論

○十全大補湯方見二十四卷第四論

○四神丸二神丸二方見八卷第八論

產後大便秘澁方論第一

產後大便秘澁因腸胃虛弱津液不足若小腹悶脹宜服麻仁丸潤之若

用寒藥則促其危矣○愚按前症若

計其日期飲食數多即用藥通之禍

在反掌之間必待腹滿覺脹欲去不

能者乃結在直腸宜用猪膽汁潤若

服苦寒踈通反傷中氣通而不止或

成痞症若去血過多用十全大補血

虛火燥用加味四物氣血俱虛用八

珍湯雖數日不通飲食如常腹中如

故仍用八珍加桃仁杏仁治之若泥

其日期飲食數多而通之則誤矣

附治驗

○產婦大便七日不通飲食如常狀

中如故此狀未滿也用八珍加桃杏

二仁至二十一日腹滿欲去用猪膽

汁潤去而安

○產婦大便不通或用通利之藥中
腕脹痛飲食甚少又用蜜道之大便
不禁吃逆不食余以為脾腎伏傷用
六君加異萊肉果骨脂五味數劑喜
其年壯而愈不然多致不起

○產婦大便秘結小腹脹痛用大黃
等藥致吐瀉不食腹痛胸痞余用六
君子加木香炮薑治之而愈○一婦
人大便秘澀諸藥不應苦不可言令
飲人乳而安

○麻仁丸

大麻仁研如泥 枳殼 人參各四分
大黃二分 右為末入麻仁煉蜜丸

桐子大每服二十九空心溫酒下
通漸加不可過服

○阿膠枳殼丸 治產後大便秘澀
以阿膠枳殼二味等分為末蜜丸桐
子大滑石末為衣溫水下二十九如
或六通再服

附方

○十全大補湯 ○八珍湯二方見二十四卷第四論
○加味四物湯方見二十四卷第六

產後大小便不通方論第三

產後大小便不通因腸胃虛弱津液
燥竭故也○愚按前症若參前後論
及八卷八論主治

附治驗

○產婦大小便不通諸藥不應將危矣令飲牛乳一日稍通三日而痊人乳尤善

○桃花散 治膀胱積滯血澁大小便秘

桃仁 葵子 滑石 檳榔 等分

右為末每服二錢空心葱白湯調下

○通氣散 治產後大小便不通

八卷第七論 陳穎叔通 各四味

產後遺毒方第四

產後遺糞取故燕窠中草燒為末或枯礬牡蠣或白欬芍藥各等分為末俱用酒調服或用固腸丸亦可○愚按前症若脾腎虛弱用還少丹仍以

補中益氣湯為主虛寒加肉豆蔻補

骨脂或四神丸若脾腎虛寒用八味

丸兼四神丸仍佐以前二方

附治驗 小便出尿方藥附

○產婦大便不實飲食少思五更或侵晨遺尿此中氣虛寒脾腎不足用

補中益氣送四神丸而痊

○產婦小便出渣名大小腸交乃氣

血俱虛失行常道先用八君子湯二

劑又用五苓散一劑而痊循常腸交

亦可用

附方

○還少丹 治脾腎虛寒飲食少思

發熱盜汗遺精白濁又治真氣虧損

肌躰瘦弱等症

肉從蓉 遠志去心 茴香 巴戟

乾山藥 枸杞子 熟地黃

石菖蒲 山茱萸去核 牛膝

杜仲去皮 姜製 楮實子 五味子

白茯苓各二兩 右各別為末用棗

肉百枚并煉蜜丸桐子大每服五七

十九丸空心溫酒或鹽湯下日三服

○補中益氣湯○六君子湯二方見

卷第六論○四神丸方見八卷第八論

○八味丸方見二十四卷第十一論

○五苓散方見二十一卷第十論

產後諸淋方論第五

產後諸淋因熱客于脬虛則頻數熱

則澀痛氣虛兼熱血入胞中則血

小便出而為血淋也○愚按前症若

膀胱虛熱用六味丸若陰虛而陽無

以化用滋陰腎氣丸蓋土生金金生

水當滋化源仍參第八卷小便淋瀝

頻數類

附治驗

○產婦小水淋瀝或時自出用分利

降火之劑二年不愈余以為肺腎之

氣虛用補中益氣湯六味地黃丸而

痊

○滑石散 治熱淋

滑石五分 通草 車前子

右為末以漿水調服

○治小腸有熱小便澀痛或為血淋

藿麥 黃芩 冬葵子 各二兩

通草 二兩 大棗 十二枚

右以水七升煎二升半分二服

○治脾氣不利小便不通橘紅為末

每服二錢空心溫酒下

○治肺氣不利小便不通杏仁十四

枚去皮尖炒食之

○治脬轉小便不利滑石一錢半寒

水石一錢水煎服

附方

○六味丸 方見二十四卷第十一論 ○滋陰腎氣丸

○補中益氣湯 二方見二十四卷第六論

產後小便頻數方論第六

產後小便數者乃氣虛不能制故也

○愚按前症若因穩婆不慎以致胞

損而小便淋瀝者用八珍湯以補氣

血若因膀胱氣虛而小便頻數當補

脾肺若膀胱陰虛而小便淋瀝須補

肺腎仍參第八卷小便頻數諸類

附治驗

○產婦小便頻數時忽寒戰乃屬脾

肺虛弱用補中益氣加山茱山藥為

主佐以桑螵蛸散而愈後患發熱晡

熱盜汗自汗月水不調用加味逍遙

散而安

○產婦患前症吐痰發熱晡作渴

此膀胱陰虛用補中益氣湯佐以六

味丸而愈又患痢後小便頻數手足俱冷屬陽氣虛寒用前湯及八味丸而瘳

○桑螵蛸散 治陽氣虛弱小便頻數或為遺尿

桑螵蛸 三十箇炒 鹿茸 酥炒 黃芪 兩 各三

牡蠣 煨 人參 厚朴 赤石脂 各二兩

右為末每服二錢空心粥飲調下

○又方用益智仁為末米飲下

附方

○八珍湯 ○加味道遙散 二方見二十四卷第四論

○補中益氣湯 方見二十四卷第六論

○六味丸 ○八味丸 二方見二十四卷第十論

產後小便不禁方第七

廣濟治產後小便不禁用雞尾燒灰

千金翼用白薇芍藥為末俱用溫酒

下日三服或桑螵蛸半兩龍骨一兩

為末每服二錢粥飲調下 ○愚按前

症若脾肺陽虛用補中益氣湯若肝

腎陰虛用六味地黃丸若肝腎之氣

虛寒用八味地黃丸

附治驗

○產婦小便不禁二年不愈面色或

青赤或黃白此肝脾氣血虛熱用加

味道遙散為主漸愈佐以六味丸而

痊後因怒小便自遺大便不實左目

頻緊面色頻赤仍用前散佐以六君

子湯以清肝火生肝血培脾土而瘳

○補脾飲 治胞破小便淋瀝

生絹黃色者 白牡丹用根 白芨各一錢

右水一，碗前，至絹爛，溫服，服後忌言

語，否則無効

○雞內金散 治氣虛弱，床用雄雞

壁脰，并腸，燒為末，溫酒調服

附方

○補中益氣湯 ○六君子湯 二方見二十四卷

○六味丸 ○八味丸 二方見二十四卷

○加味道遙散 方見二十四卷

產後小便出血方論第八

產後小便出血者，因虛熱血滲於脬

也，以亂髮洗淨，燒為末，米飲調服，或

滑石末一錢，生地黄黃汁調下 ○愚按

前症若膏梁積熱，用加味清胃散，醇

酒濕毒甚，根解醒湯，怒動肝火，加味

小柴胡湯，鬱結傷脾，加味歸脾湯，思

慮傷心，妙香散，大腸風熱，四物，側柏

槐花，大腸血熱，四物，炒連，槐花，腸胃

虛弱，六君，升麻，柴胡，元氣下陷，補中

益氣，茯苓，半，其胃弱，六君，升麻，血虛

四物，升麻，氣血俱虛，八珍，柴胡，升麻

大凡元氣虛弱而發熱者，皆內真寒

而外假熱也，但用六君，或補中益氣

加炮薑，溫補脾氣，諸症悉退，若四肢

畏冷，急加附子

附治驗方藥 大便下血附

○產婦尿血，面黃，脇脹，少食，此肝木

乘脾土也。用加味逍遙補中益氣兼服而愈。後為懷抱不樂，食少，身倦，驚悸，無寐，血仍作用。加味歸脾湯二十餘劑，將愈。感於眾論，服犀角地黄湯，諸症復作。仍服前湯而愈。

○產婦查後下血，食少，身倦，此脾氣虛熱。用補中益氣加吳茱萸炒黃連五分，四劑頓愈。用歸脾湯而痊。

○婦人怒則便血，寒熱口苦，或胸脇脹痛，或小腹痞悶。此肝木乘脾土。用六君柴胡山梔而愈。用補中益氣加味道遙而不復作。

○婦人久下血，在糞前屬脾氣虛寒。用補中益氣加連炒吳茱萸一錢數劑，

稍緩乃加生貝菜五分數劑而愈。

妙吳茱萸法見七卷第五論

○產婦大便後血口乾，飲湯胸脇膨滿，小腹悶墜，內熱，哺熱，食少，身倦，目睛面赤，洒淅惡寒。此脾肺氣虛。先用六君加乾薑木香，漸愈。用補中益氣將愈。用歸脾湯全愈。後勞役兼怒，發熱，血崩，夜間譫語。此熱入血室。用加味小柴胡二劑而熱退。用補中益氣一劑而血止。用道遙散歸脾湯調理而安。

○葛花解醒湯 治酒積上下外消其濕

白芷 菴砂仁 葛花 各五分 木香

青皮錢三 陳皮 白茯苓 猪苓

人參各一錢半 白朮 神麴 澤瀉

生乾薑各二錢

右為末每服五錢白湯調下

○加味清胃散 方見二十四卷首論

○加味小柴胡湯 方見二十四卷第

○加味歸脾湯 ○歸脾湯 ○八珍湯

○逍遙散 ○加味逍遙散 五方見二

十四卷第 論 ○妙香散 方見六卷第八論

○四物湯 ○六君子湯

○補中益氣湯 三方見二十四卷第

產後陰脫玉門不閉論第九

產後陰脫玉門不閉因坐產努力舉動房勞所致或脫肛陰挺逼迫腫痛

小便淋瀝 ○愚按玉門不閉氣血虛

弱也用十全大補湯腫脹痲痛肝經

虛熱也加味逍遙散若因憂怒肝脾

氣血傷也加味歸脾湯若因暴怒肝

火血傷也龍膽瀉肝湯仍參第八卷

末諸論

附治驗

○產婦玉門不閉發熱惡寒用十全

大補加五味子數劑而寒熱退用補

中益氣加五味子數劑而玉門閉

○婦人脾胃素弱兼有肝火產後玉

門腫痛寒熱作渴嘔吐不食外敷大

黃等藥內用驅利之劑腫及於聲諸

症輕起此真氣虛而邪氣盛也先用

六君子以固腸胃次用補中益氣以
外陽氣不敷劑而全愈

○產婦患之失治腫潰不已形體消
瘦飲食少思朝寒暮熱自汗盜汗半
年矣用補中益氣加茯苓半其膠水
漸少飲食漸進用歸脾湯共五十餘
劑而愈

○產婦玉門不閉小便淋瀝腹內一
塊攻走脇下或脹或痛用加味道遙
散加車前子而愈

○產婦陰脫便閉下墜形氣倦甚用
十全大補湯而上因怒仍脫重墜寒
熱小便淋瀝用補中益氣湯加山梔
龍膽草一劑重墜減而小便利仍用

前湯去二味倍用參芪升麻而痊

○產婦陰脫腫痛小便淋瀝此元氣
虛而肝火旺也用補中益氣湯加山
梔車前子四劑而肝症悉退仍用前
藥去二味加茯苓而小便利又用十
全大補湯而腫痛漸消

○婦人元氣充實初產玉門不閉腫
焮作痛小便不利余謂肝經濕熱壅
滯欲以加味道遙散加車前子牛膝
治之不信乃服十全大補湯腫痛益
甚仍用前藥更加澤瀉一劑而愈

○產婦陰脫腫痛脈滑數欲作膿也
余用十全大補湯而膿成又數劑而
膿始潰沮小便頻數患處重墜此元

氣虛而下陷也用補中益氣湯敷劑而瘥

○婦人子宮腫大二百方久損落一片殊類猪肝黃體倦飲食無味肉熱晡熱自汗盜汗十全大補湯并餘劑諸症悉愈仍復生育

○硫黃散 治產後陽氣虛寒

硫黃 烏賊骨各半 五味子五錢

右為末搽患處日三易

○一方蛇床子一分炒熟帛裹熨患處亦陰痛○一方子宮脫出以葶藶子仁十四枚研塗頂心入即洗去

附方

○十全大補湯 ○加味道遙散

○加味歸脾湯 ○歸脾湯四方見二十四卷第四論

○龍膽瀉肝湯方見二十四卷第八論

○補中益氣湯

○六君子湯二方見二十四卷第六論

婦人陰蝕方論第十

婦人少陰脈數而滑者陰中有瘡名曰^レ漏或痛或痒如蟲行狀膿水淋漓亦有陰蝕幾盡者皆由心神煩鬱脾胃虛弱氣血流滯耳內當補心養胃外以藥傳洗乃可○愚按前症乃肝脾鬱結之症木旺生蟲耳宜解鬱清肝備見八卷陰中生瘡類

附治驗

○產婦素有肝火患此內潰痒痛食

少熱渴小水淋瀝用加味道遙散加
味歸脾湯兼服間以蘆薈見外以鶴
風草煎洗而愈

○治疳蟲蝕下部用蒲黃研勻傳入內
○平胃散加貫首末二錢以熟猪肝
拌藥內陰中

附方

○加味歸脾湯○加味道遙散二方見二
十四卷○蘆薈丸方見七卷第七論

產後乳少或正方論第十一

婦人乳汁乃氣血所化若元氣虛弱
則乳汁短少初產乳房嫩脹此乳未
通若怒氣乳出此肝經風熱若累產
無乳此內亡津液蓋乳汁資於衝任

若婦人疾在衝任乳少而色黃者生
子則怯弱而多疾○愚按前症若氣
血虛弱而不能化生宜壯脾胃怒動
肝膽而乳脾汁出宜清肝火夫乳汁
乃氣血所化在上為乳在下為經若
屬產無乳或大便澀滯當滋化源

附治驗

○產婦因乳少服藥通之致乳房腫
脹發熱作渴余謂血氣虛以玉露散
補之而愈

○湧泉散 能下乳忌食薑椒辛辣
飲食

王不留行 藜麥 麥門冬

龍骨各二錢 右用猪蹄汁一碗酒一

杯煎服以木梳於乳上梳下

○治氣血虛鍾乳粉每服二錢煎漏蘆湯調

附方

玉露散 治乳脈不行身體壯熱頭目昏痛大便滯等症

人參 白茯苓 桔梗 炒芍藥 甘草 炙六分 右水煎服

產後乳出論第十二

產後乳汁自出乃胃氣虛宜服補藥止之若乳多滿痛用溫帛熨之未產而乳自出謂之乳泣生子多不育○愚按前症氣血俱虛用十全大補湯肝經血熱用加味道遙散肝經怒火

用四物參朮柴梔肝脾鬱怒用加味歸脾湯

附治驗

○產婦勞役忽乳汁如湧昏昧吐痰此陽氣虛而厥也灌以獨參湯而甦以十全大補湯數劑而安若婦人氣血方盛乳房作脹或無兒飲脹痛增寒發熱用麥芽二三兩炒熟水煎服立消其耗散血氣如此何脾胃虛弱飲食不消方中多用之

○十全大補湯 ○加味道遙散

○加味歸脾湯 三方見二十四卷第

○獨參湯 方見三卷十一論

○四物湯 方見二十四卷第六論

產後吹乳方論第三

產後吹乳因兒飲口氣所吹合乳汁不通壅結腫痛不急治多成癰速服枯蕒散及敷南星更以手揉散之○愚按前症用藥切不可損其氣血治驗見二十四卷

○枯蕒散 乳香二錢枯蕒一箇酒煎服用南星溫湯調塗○一方用陳皮一兩甘草一錢水煎服

產後妬乳方論第十四

妬乳因兒未能飲餘乳蓄結以致腫痛初不流通之必致成癰若乳頭生瘡浸淫名妬乳宜赤龍皮湯天麻湯飛鳥膏飛鳥散傳以黃連胡粉散○

愚按乳盛或無子飲乳以致腫痛炒大麥芽煎服其乳即散若成瘡當從乳癰類治若皮膚津淫成瘡當用本方

○治乳初腫痛內消方用瓜萼一箇粉草一匙生薑一塊半酒二碗煎服少頃去敗乳再服即愈

○赤龍皮湯 槲皮三升水一斗煮五升溫洗之

○麻草湯 以天麻草五升水煎洗之此草葉若麻葉冬生夏花赤如鼠尾花亦洗浸淫濕痒陰蝕等瘡

○飛鳥散 用燒硃砂作水銀上黑煙各羅粉 枯礬一兩傳之諸熱浸淫丈

夫陰蝕庠濕小兒頭瘡症蝕瘡等

○黃連胡粉膏 治症同前

黃連 二兩 胡粉 一錢 水銀 一兩同研

右皮裹熟接和合傳之

○一方乳頭裂破秋茄子裂開者陰乾燒存性水調塗之

太醫院校註婦人良方大全卷之二十三終

太醫院校註婦人良方大全卷之二十四

補遺

吳郡後學薛 已著

書林泗泉余彭德梓

瘡瘍門

婦人兩辰方論

諸骨木使等兩見口齒類要

內經云脾氣開於口又云脾之榮在唇蓋燥則乾熱則裂風則瞶寒則揭若腫起白皮皴裂如蚕繭名曰繭唇有腫重出如繭者有本細末大如繭如瘡者其因或胎產經行而陰血損或七情動火而榮血虧或心火傳授脾經或厚味積熱傷脾大要審本症察兼症補腎水生脾血則燥自潤火

自除風自息腫自消若患者怒畧治者不察內用清熱消毒之藥外用追蝕線結之法反為敗症慎哉

附治驗

○婦人懷抱久鬱或時胃口嘈辣胸膈不利月水不調哺熱食少體倦唇腫已年餘矣此脾經鬱火傷血用歸脾湯加薑汁炒黃連山梔少佐吳茱萸嘈辣頓去飲食稍進乃去黃連加貝母遠志胸膈通利飲食如常又用加味逍遙散歸脾湯間服百餘劑月水調而唇瘡愈

○婦人懷抱久鬱患爾唇雜治洩痰降火虛症悉具盜汗如雨余謂此氣血虛而有熱也用當歸六黃湯內黃芩連栢俱炒黑二劑而盜汗頓止仍用歸脾湯八珍散兼服元氣漸復更以逍遙散歸脾湯間服百餘劑而唇亦瘳

○婦人唇裂內熱二年矣每作服寒涼之劑時由血水益增他症此胃火傷血而藥傷元氣也余用加味清胃散而愈後因怒唇口腫脹寒熱作嘔此屬肝木乘脾土用小柴胡加山梔茯苓桔梗諸症頓愈復以加味逍遙散調補元氣而愈

○婦人因怒唇腫內熱體倦用化痰藥食少作嘔大便不實唇出血水用

理氣消導胸膈痞滿頭目不清唇腫
經閉用清胃行血肢體愈倦發熱煩
躁涎水湧出余曰此七情傷肝脾履
用攻伐反致他症遂用濟生歸脾湯
食進便實涎止用加味逍遙散腫消
熱退體健後因怒寒熱耳痛胸膈脹
悶唇嫩腫甚此怒動肝火而傷血用
四物合小柴胡加山梔頓愈又因怒
胸乳作脹肚腹作痛嘔吐酸涎飲食
不入小水不通此怒動肝木而尅脾
土也用補中益氣加川芎芍藥而愈
又勞役怒氣飲食失節發熱喘渴體
倦不食下血如崩唇腫熾甚此為肝
經有欠不能藏血脾經氣虛不能攝
血用補中益氣加炒黑山梔芍藥丹
皮而愈

○婦人月經不調兩足發熱至年餘
而身亦熱勞則足腿酸疼又年餘唇
腫裂痛又半年唇裂出血形體瘦倦
飲食無味月水不通唇下腫如黑棗
余曰此肝脾血虛火症也彼不信用
通經藥而歿

○一婦人忿怒而唇腫或用消毒之
藥唇脹出血年餘矣余曰此肝木尅
脾土而血傷也須養脾胃滋化源為
主彼執用前藥狀如翻花瘡而歿
○婦人口苦脇脹此肝火之症也用
小柴胡加山梔黃連少愈更以四君

子加芍藥當歸柴胡調補脾胃而瘥
○婦人每怒口苦發熱嘔熱此肝火盛
而血傷也以小柴胡合四物二劑以
清火而生血更以四物加柴胡白朮
茯苓丹皮生血健脾而愈

○婦人每怒則口苦兼辣胸膈脹
乳內或時如刺此肝脾之火也用小
柴胡加山梔青皮芍歸桑皮而安後
又勞怒口復苦經水頓至此屬肉火
動血得熱而妄行用四物加炒芩炒
梔膽草一劑而血止更以加味道遙
散而元氣復

○婦人因怒齒痛寒熱作嘔用清胃
等藥益甚余以為此肝火傷胃寒藥
復傷故也用六君子加芍藥柴胡山
梔而愈

○婦人胃中嘈辣甚則熱痛後患齒
疼此胃中痰火也用二陳加芩連下
越鞠丸而瘳

○婦人發熱齒痛日晡益甚月水不
調此脾經血虛用逍遙散加升麻尋
愈後因怒復痛仍以前藥加川芎而
痊

○婦人因怒牙疼寒熱此肝火侮脾
土用小柴胡加芍歸芩朮山梔而疼
痛止用加味道遙散而寒熱退

○婦人每產後齒齦皆動踰日乃止
此氣血虛而火動也後復懷妊臨月

余付十全大補湯一劑令產後煎服其齒不動如故

婦人善怒舌痛煩熱或胃降火化痰藥前症益甚兩脇作脹又服流氣飲肚腹亦脹經行不止此肝虛不能藏血脾虛不能攝血而前藥復傷也用加味歸脾湯加五味子而愈

○婦人冬患腦疽腫痛熱渴脈洪數實此膀胱濕熱上壅用清熱消毒散潰而愈次年其舌腫大遍身患紫疔如葡萄手足尤多各刺出黑血此脾胃積熱毒也服奪命丹七粒出臭汗瘡熱益甚又便秘二日與大黃芩連各二錢升麻白芷山梔薄荷連翹各

二錢生草一錢水煎三五沸服之大小便出臭血甚多下體疔稍退乃入犀角汁再服舌本及齒縫出臭血諸毒乃消更與犀角地黄湯而愈

○婦人善怒舌本強手臂麻此肝木尅脾土治以六君子加柴胡芍藥而愈

○婦人產後喉痛服清熱等劑益甚此膀胱經血虛也蓋膀胱之內脈上行至喉而還用八珍湯加牡丹皮柴胡酒炒黑黃柏二劑而愈

○婦人喉間作痛旬餘突腫如赤楊梅狀二月後而腫遍身筋骨作痛余以爲此時行楊梅瘡也先以葶藶湯

數劑而平更以四物加草薺黃芪二
十餘劑諸症悉退

附方藥

○清胃散 治醇酒厚味唇齒作痛
或齒齦潰爛或連頭面頰項作痛

黃連炒一錢五分 當歸 生地黃

牡丹皮各一錢二分 升麻二錢

右水煎服實熱便秘加大黃

○加味清胃散 卽前方加犀角連
翹甘草

○涼膈散 治積熱煩渴面赤內熱
頭昏咽痛便溺赤澀狂言譫妄睡臥
不安

大黃 朴硝 甘草各一錢 連翹二錢

梔子 黃芩 薄荷各一錢 右水煎服

○補黃散 治脾胃虛熱口舌生瘡
畏冷飲食

人參 白朮各一錢 白芍藥炒 陳皮

甘草各五分 右薑棗水煎服

○四順清涼飲加山梔牛蒡子 治臟
腑實熱秘結口舌生瘡

當歸 赤芍藥 甘草 大黃各一錢

右水煎服

○人參安胃散 治服峻劑損脾胃
口舌生瘡

人參一錢 黃芪炒二錢 生甘草

炙甘草各五分 白芍藥七分 白茯苓一錢

黃連炒五分 右水煎服

○溫中丸 一名人參 理中丸 治中氣虛熱口
舌生瘡不喜飲冷肢體倦怠飲食少
思

人參 甘草 白朮 炒各等分

右為末薑汁糊丸桐子大每服五十

丸白湯下

○柳華散 治熱毒口瘡

黃柏 炒 蒲黃 青黛 真正者

人中白 煨等分 右為末敷之

○四物湯 治血熱口舌生瘡或牙

齦腫潰或目瞽發熱煩躁不安 本卷見

第六論 ○加味四物湯 即四物湯加丹

○當歸補血湯 治氣血俱虛口舌

生瘡熱渴引飲目赤面紅其脈洪大

而虛重按全無 方見本卷第十一論

○四物二連湯 治血熱口舌生瘡

或夜發寒熱

當歸 熟地黃 白芍藥 炒

川芎 黃連 炒 胡黃連 各錢

右水煎服

○清咽利膈湯 治積熱咽喉腫痛

痰涎壅盛煩躁飲冷大便秘結

金銀花 防風 荆芥 薄荷

桔梗 炒 黃芩 炒 黃連 炒 山梔 炒

連翹 各錢 玄參 大黃 煨 朴硝

牛蒡子 研 甘草 各七分 右水煎服

○龍射聚聖丹 治心脾客熱咽喉

腫痛或成癰不消或舌本腫脹口舌

生瘡或諸物骨鯁

川芎附 生地黃 犀角 羚羊角

琥珀 玄參 連翹各五錢 人參

赤茯苓 馬牙硝 片腦

麝香各三錢 桔梗 升麻 鉛白霜

各五錢 硃砂 牛黃各二錢 南硼砂附

金箔五十片 右各別為末和勻蜜丸

龍眼大金箔為衣薄荷湯化下或嚼嚥之

○拔萃桔梗湯 治熱腫喉痺

桔梗炒 甘草 連翹 山梔炒

薄荷 黃芩各一錢 右竹葉水煎服

○甘桔湯 治咽喉腫痛

甘草六錢 苦梗三錢 右水煎服

○解毒雄黃丸 治纏喉風腫閉或卒倒死牙關緊急

雄黃錢 鬱金錢 巴豆十四粒 去油殼

右為末醋糊丸菴豆大用熟茶送下

七丸吐頑痰立愈

○奪命丹 治喉閉或疔毒或麻木

或嘔吐重者昏憤若疔毒牙關緊急

用三五丸為末水調灌下誠有奪命之功

蟾酥乾者 輕粉各五分 枯白

寒水石煨 銅碌 乳香 沒藥

麝香各一錢 硃砂三錢 蝸牛二十個 別研

右為末用蝸牛或酒糊為丸如菴豆

大每服一二丸溫酒或葱湯下

○換肌消毒散 治時瘡石拘初起

潰爛一名湯

土茯苓錢五 當歸 白芷 皂角刺妙

薏苡仁錢各一 白鮮皮 木瓜不犯鐵器

木通 金銀花錢各一 甘草五分

右水煎服

○七味白朮散一名錢氏 治中氣虛

熱口舌生瘡不喜飲冷或吐瀉口乾

方見二十一卷第二論

○四君子湯 治脾胃虛熱唇口生

瘡食少作嘔大便不實若肝木乘脾

土所致加柴胡芍藥方見本卷第六論

○六君子湯方見本卷第六論

○二陳湯方見本卷第五論

○越鞠丸方見六卷第七論

○補中益氣湯方見本卷第十論

○清熱消毒散方見本卷第五論

○犀角地黄湯方見本卷第二論

○當歸六黃湯方見十九卷第六論

○逍遙散 ○八珍湯 ○歸脾湯

○十全大補湯四方見本卷第四論

○小柴胡湯方見本卷第二論

婦人經脈方論第三

耳瘡屬手少陽三焦或足厥陰肝經

血虛風熱或怒動肝火而致若發熱

嗽痛屬三焦厥陰風熱用柴胡清肝

散若內熱瘰癧或脹痛屬肝火傷血

用梔子清肝散若寒熱作痛或作嘔

肝火傷脾用益脾清肝散若口
乾足熱為肝腎陰虛用益陰腎氣丸
若月經先期為血熱用加味道遙散
過期為血虛用八珍湯食少體倦為
鬱火用加味歸脾湯惡寒發熱肢體
倦怠為氣血俱虛用十全大補湯慎
不可專治其外復傷氣血也

附治驗

○婦人耳內外腫痛胸脇不利寒熱
往來小便不調余以為肝火傷血先
用龍膽瀉肝湯四劑諸症頓退又用
加味道遙散而愈又因怒復作用小
柴胡湯而痊

○婦人經行後因勞怒發寒熱耳作
痛余以經行為血虛用八珍湯加柴
胡怒氣為肝火用加味道遙散勞役
為氣傷用補中益氣湯加山梔而愈
○婦人素鬱怒耳內作痛腫嫩寒熱
面色青黃經行則變赤余用加味歸
脾湯加味道遙散而愈

○婦人懷抱素鬱因怒耳作腫痛經
行不止寒熱發熱面色青赤肝脈弦
數余以為久鬱傷脾暴怒傷肝先用
加味小柴胡湯隨用加味道遙散而
痊

○婦人因怒發熱每經行兩耳出膿
兩太陽作痛胸脇乳房脹痛或寒熱
往來或小便頻數或小腹脹悶皆屬

肝火血虛先用梔子清肝散二劑又
用加味逍遙散數劑諸症悉退乃以
補中益氣加五味而痊

○婦人耳內腫痛出水寒熱口苦
連頸項飲食少思此肝火甚也用小
柴胡湯加山梔牡丹皮稍愈用加味
逍遙散漸愈用八珍湯加柴胡丹皮
山梔調補肝脾而全愈

○婦人耳內外腫痛胸脇不利寒熱
往來小便不調此肝經濕熱也用龍
膽瀉肝湯四劑諸症頓退用加味逍
遙散而全愈又因怒復作用柴胡清
肝散而痊

○婦人耳內不時脹痛內熱口乾勞
則頭暈吐痰下帶此肝脾氣虛也朝

用補中益氣夕用加味逍遙散而痊

○寡婦耳內外作痛不時寒熱脈上
魚除此血盛之症用小柴胡加生地
以抑其血而愈又項間結核如貫珠
寒熱晡熱用加味歸脾湯加味道遙
調補肝脾而愈

○婦人耳內外或作癩或赤腫或寒
熱月經旬白而止潮熱內熱自汗盜
汗余以為肝脾氣血俱虛而有熱用
歸脾湯六味丸而愈

○婦人性急或耳內作痛或耳外赤
腫發熱胸脹目瞤益甚余以為怒氣
傷肝氣血俱虛朝用加味道遙散加

黃柏楮根皮用歸脾湯送地黃丸而愈

○嬌婦耳內外作痛或項側結核內熱暈熱月經不調吐痰少食胸膈不利余以為鬱怒傷肝脾朝用歸脾湯以解脾鬱生脾氣夕用加味道遙散以清肝火生肝血而愈

○女子耳下腫赤寒熱口苦月經不調小便內結一塊此肝火氣滯而血凝也先用小柴胡加山梔川芎丹皮又用柴胡清肝散而痊

附治驗方藥

○小柴胡湯 治肝膽經症寒熱往來暈熱潮熱身熱默默不欲飲食或

怒火口苦耳聾咳嗽發熱脇下作痛甚者轉側不便兩脇痞悶或瀉利咳嗽或吐酸食苦水皆用此藥主之

柴胡 二錢 黃芩 炒一錢 人參 半隻 甘草 炙五分 右薑水煎服

○加味小柴胡湯 治肝膽經風熱耳前後腫痛或結核癰痛或寒熱暈熱或經候不調等症節小柴胡加山梔牡丹皮

○益脾清肝散 治肝經之症寒熱體痛脾胃虛弱

人參 白朮 茯苓 甘草 各一錢 炒五分
川芎 當歸 黃芪 各一錢
柴胡 五分
牡丹皮 十分 右水煎服

○梔子清肝散 治三焦及肝膽經風熱耳內作痒或生瘡出水或脇肋胸乳作痛寒熱往來

柴胡 山梔 牡丹皮 茯苓
川芎 芍藥 當歸 牛蒡子
白朮 甘草 右水煎服

○柴胡清肝散 治肝膽三焦風熱怒火以致項胸作痛或頭目不清或耳前後腫痛或寒熱體疼

柴胡 黃芩 人參 山梔
川芎 連翹 桔梗 甘草
右水煎服

○犀角地黄湯 治上焦有熱口舌生瘡發熱或血妄行或吐衄或下血

犀角 生地黄 白芍藥 黃芩
牡丹皮 黃連 右水煎服若因怒而患加柴胡山梔

○犀角升麻湯 治陽明經風熱牙疼或唇頰腫痛或手足少陽經風熱連耳作痛

犀角 升麻 防風 羌活
白附子 川芎 白芷 黃芩
甘草 右水煎熟入犀末服

○益陰腎氣丸 方見六卷第三論

婦人癩瘰方論第三

婦人癩瘰或因憂思鬱結或因胎產經行則肝膽脾腎受傷以致前症蓋肝傷則血燥血燥則筋攣累累如貫

珠多生耳前後胸脇間若寒熱腫痛
乃肝氣動而為病用柴胡梔子散以
清肝火為王佐以逍遙散以養肝血
若寒熱既止而核不消乃肝經之血
亦病矣宜用加味四物湯以養肝血
為主佐以柴胡梔子散以清肝火若
初生如豈附着於筋白色不變內熱
口乾精神倦怠久不消潰乃肝脾虧
損用逍遙散歸脾湯六味丸以健脾
土培肝木切不宜用散堅追毒之劑
故外臺秘要云肝腎虛熱則生癰矣
病機云癰癰不係膏潔丹石之毒因
虛勞氣鬱所致補形氣調經脈其瘡
當自消散若誤下之先犯病禁經禁
矣若久潰不斂脈浮大邪火盛也
色眇白金尅木也皆不治凡癰癰赤
脈貫瞳子有幾條則幾年死無則可
治

附治驗

○婦人患前症久而不愈或以為木
旺之症不宜於春頰用散腫潰堅湯
腫破益甚余以為肝經虧損用六味
地黃丸補中益氣湯至春而愈此症
若肝經風火自病元氣無虧可用散
堅瀉青之劑若肝自損虧或水不生
木用地黃丸若金來尅木須補脾土
生腎水若行政伐則脾胃傷而反致
木尅土矣

婦人患之少寐年餘而潰膿水淋
瀕月經或五六十日一至悞服通經
丸展轉無寐午前惡寒午後發熱余
謂思慮傷脾用歸脾湯作丸午前以
六君子送下午後以逍遙散送下兩
月餘得寐半載後經行如期年餘而
瘡愈

○婦人潰後發熱煩躁作渴脈大而
虛此血虛也以當歸補血湯六劑而
寒熱退又以聖愈湯數劑而全愈更
以八珍加貝母遠志而瘡斂

○癰婦面黃體倦噯酸噯氣余以為
中氣虛弱欲用補中益氣湯加茯苓
半其不信反降火利氣胸膈痞滿癰

瘡腫痛又散堅利氣噯氣不絕大便
不實四肢時冷余曰今變中氣虛寒
矣用六君子湯加姜桂少用升麻柴
胡漸愈更佐以補中湯尋愈

○婦人患此噯氣用降火清胃食少
吞酸胸膈痞悶用利氣消導吐噯氣
促飲食日少用清熱化痰大便堅澁
內熱身瘦余曰吞酸噯氣脾胃氣虛
也胸痞噯喘脾肺氣虛也太便堅澁
內熱日瘦脾肺血虛也遂以補中益
氣加炒黑吳茱萸三分數劑佐以六
味丸諸症頓退乃用歸脾湯逍遙散
間服而愈

○婦人患前症遍身作痒脈大而虛

此氣血俱虛不能榮於腠理以十全大補湯治之而愈凡潰後午前痒作氣虛午後痒作血虛若作風症治之必效

○婦人項核腫痛察其氣血俱實先以必效散一服去之更以益氣養榮湯二十餘劑補之而消蓋此症初起而血氣虛弱者先用前湯待其氣血稍充乃用必效散以去其毒仍用補藥無不奏效若已成膿者即針而補托之氣血復而核不消者服散堅之劑倘不應而氣血如故仍以必效散養榮湯又不應者時時大肩髑二穴用豆豉餅琥珀膏自愈若氣血壯實不用追蝕亦能自腐用藥以腐肉者使易於收斂耳若血虛而用追蝕不惟無益適以取敗凡不慎飲食七情者不治

附方藥

○當歸川芎散 治手足少陽經血虛癢症或風熱耳內痒痛生瘡出水或頭目不清寒熱少食或經水不調胸膈不利腹脇痞痛小便不調

- 當歸 川芎 柴胡 白朮
- 芍藥 山梔 牡丹皮
- 茯苓 蔓荊子 甘草

右水煎服○若肝氣不平寒熱往來加柴胡地骨皮肝氣實熱加柴胡黃

芩肝脾氣血虛熱加參芪熟地脾虛
飲食少思倍加白朮茯苓脾虛胸膈
不利加人參黃芪脾虛痰滯胸膈不
利加半其肝氣不順胸膈不利加木
香肝虛小腹痞滿或時作痛加熟地
脾血不足小腹作疼加肉桂日晡發
熱加熟地

○加味地黃丸 治肝腎陰虛諸症
或耳內疼痛出水或眼昏痰喘或熱
渴便澀等症

乾山藥 山茱萸肉 牡丹皮

澤瀉 白茯苓 熟地黃自製

生地黃 柴胡 五味子各別為末等分

右將二地黃酒拌杵膏加蜜丸桐子

大每服百丸空心白湯下如不應用
加減八味丸

○人參養榮湯 治潰瘍寒熱四肢
倦怠體瘦少食面黃氣短不能收斂
大瘡愈後多服之庶小變他症也

白芍藥一錢五分 人參 陳皮 黃芪

桂心 當歸 白朮炒 甘草炙各一錢

熟地黃自製 五味子炒 茯苓各七分

遠志去心炒五分 右薑棗水煎服

○瀉青丸 治肝經實火脇乳作痛
或惡寒發熱大便秘結

當歸 龍膽草炒 川芎 山梔炒

大黃炒 羌活 防風各等分

右為末蜜丸桐子大每服三四丸白

湯下若陰血不足肝火血燥用四物
加山梔柴胡或逍遙散加丹皮山梔
若腎水虧損不能生肝木而筋攣結
核或肢節拳搐或似中風涎痰上湧
用六味丸料煎服

○生地黄丸 治師尼寡婦室女乍
寒乍熱或頸間結核肝脈弦長而出
魚際

生地一兩酒 秦艽 黃芩
硬柴胡各五錢 赤芍藥一兩

右為末入地黃膏加煉蜜少許丸桐
子大每服三十九烏梅煎湯下日進
二服

○連翹飲子 治肝膽經氣滯癰癧
結核或乳內結核者

連翹 川芎 瓜蒌仁研 皂角刺炒
橘葉 青皮 甘草節 桃仁各一錢
右水煎服

○散腫潰堅湯 治癰癧堅硬氣血
無虧者宜用

升麻 連翹 當歸尾酒 白芍藥炒
黃栢酒 葛根 連翹 三稜酒 枳椇炒 昆布
廣木各三分 龍膽草酒 知母酒 瓜蒌根各五分 柴胡四分 黃芩四分
甘草炙二分 右水煎服

○必効散 治癰癧未成者消已潰
者歛須元氣無虧者可服若孕婦禁
餌

南鵬砂二錢 輕粉錢 斑猫四十枚

同糯米 麝香五錢 巴豆五粒

白檳榔筒 右為末每服一錢五更

用滾湯調下如小水瀆滯或微痛此

瘰癧欲下也進益元散一服即下此

之斑猫巴豆似為峻厲然用巴豆乃

解斑猫之毒用者勿畏

○益元散

滑石末六錢 甘草末一錢

右每服一錢白湯調

○琥珀膏 治頸項或腋下初結小

核漸如連珠潰而膿水不絕或漏症

者

琥珀兩 丁香 桂心 硃砂

木香 松香 白芷 防風

當歸 木通 木鱉子肉各五錢 麻油

右先用琥珀等六味為末其餘藥入

油煎焦黑濾去粗徐入黃丹再煎

軟硬得中入前末即成膏矣

○針頭散 治一切頑瘡內有瘰癧

或瘰癧不化瘡口不合宜此藥腐之

赤石脂錢五 乳香 白丁香

砒霜生用 黃丹各一錢 輕粉 麝香錢

蜈蚣一條

右為末搽瘰癧肉上其肉自化若瘡口

小用糊和作細條陰乾紙之凡瘡又

合者內有膿管必須用之

○逍遙散 ○歸脾湯二方見本卷第

四論

柴胡清肝散

梔子清肝散

二方見本卷第二論

補中益氣湯

方見本卷第十論

四物湯

加味四物湯

六君子湯

三方見本卷第六論

六味丸

歸脾補血湯

二方見本卷第十一論

聖愈湯

方見本卷第九論

益氣養榮湯

方見本卷第五論

灸肩臑肝尖法

方見本卷末

婦人結核皆因鬱怒損肝脾或因胎產經行失於調養或因暴怒觸動膽火若結於項側耳前後或胸脇肋痛或發寒熱屬膽經風熱怒火宜用

柴胡清肝散加釣藤山梔以養血氣清肝火若結於肉裡其色不變腫熱內熱屬肝火血虛宜用加味道遙散加龍膽草以養肝血清肝火或結於肢節或累累如貫珠其色不變亦肝火血燥而筋攣宜用柴芍參苓散加釣藤以養血氣佐以六味丸以生腎水若時消時作此氣滯而痰結也用歸脾六君二湯以調和脾肺之氣並佐以海藻丸若潰而核不腐或肉不生或膿水清稀肌寒肉冷自汗盜汗

是熱肉熱面色痿黃食少體倦便利調者五臟皆虛也但用補中益氣加味六君子二湯調補脾胃以滋諸

臟則各症自退故經云形傷則痛氣則腫慎不可輕用行氣破血之劑以復傷也

附治驗

○婦人項結後寒熱頭痛脇脹乳痛內熱口苦小便頻數屬肝火血虛用加味四物而愈又用加味道遙散調補肝脾而安

○婦人經事不調肢體結核如榛如豆不計其數隱於肉裡其色不變三年餘矣大按則痛或投以降火消毒乃不按自痛發熱作渴日晡益甚經水過期左關脈數此肝火血燥也用清肝益榮湯六十餘劑諸症已愈惟

項核未消又以當歸龍薈丸數劑及八珍湯加柴胡山梔三十餘劑而痊

○婦人久鬱怒胸脇內股外膝各結核寒熱往來經候不調胸膈不利飲食少思大便不調左關弦洪左寸弦數右關弦緊右寸弦浮余謂左關弦洪肝經熱也左寸弦數木生火也右關弦緊肝剋脾也右寸弦浮木侮金也法當生肝血遂用加味四物湯而諸症退用加味道遙散而經候調用加味歸脾湯而全愈

○婦人因怒肢體結核胸中發痞左關弦洪余曰此為肝火血燥筋攣當清肝火養元氣遂用加味小柴胡湯

加味道遙散漸愈又用八珍湯加牡丹皮柴胡山梔釣藤而愈

○婦人肢體結核胸腹痞悶氣泄稍寬余謂此肝脾鬱滯不信服降火行氣化痰病愈甚而氣愈虛余用加味道遙加味歸脾二藥間服半載而痊

○婦人項間結核不時寒熱左目緊小頭項振掉四肢抽搐此肝火血虛風熱也用加味道遙加釣藤數劑諸症漸愈又用八珍湯調理而痊

○婦人耳內耳後項側結核作痛寒熱口苦月經不調此肝膽經火而傷脾胃也用四君柴胡丹皮及六味地黃而愈

○婦人因怒結核經行不止發熱晝夜安靜而夜譫語此血分有熱也用小柴胡加生地頓安其核尚在經候先期肝脈弦數此肝火血涸而筋攣也用加味道遙加生地月經如期而核消

○婦人項臂結核頭痛寒熱乳內時疼兩脇焮痛余以為肝脾鬱火而血燥先以加味道遙散再用加味歸脾湯而愈

○婦人素鬱怒思前症因熱晡熱久而不愈若面色痿黃則月經過期而少若面色赤則月經先期而多余曰面黃過期脾經虛弱也面赤先期脾

虛火動也朝用補中益氣升舉脾上以益氣血夕用加味逍遙滋養肝血以息陰火復以歸脾湯解鬱結半載元氣復而痊又有患前症因脾虛下陷而發熱乃專治其瘡變瘰癧而殺

○女子耳下結核癩痛寒熱此屬肝經風熱用梔子清肝散一劑諸症悉愈後因怒耳後并額兩角作痛寒熱此兼小陽經症仍以前藥加羌活二劑而瘥

○婦人項患五核時常寒熱肝肺弦長而出寸口此血盛無耦之症也用小柴胡湯加生地烏梅治之而愈

○婦人腹中結塊誤認血驚服驅逐之藥下血甚多致肢節間結核治法見二

十卷第十一論

附方藥

○八珍湯 治脾胃傷損惡寒發熱或煩躁作渴或因脾胃虧損膿水清稀久不能愈等症卽四君四物二湯相合方見本卷第二論

○十全大補湯 治瘡瘍胃氣虛弱腫痛不消或潰而不斂或自汗盜汗食少體倦或寒熱作渴頭痛眩暈或似中風又治氣血俱虛胸腹脇痛或作脹滿或骨節作痛經候不調或寒熱瞞熱五心煩熱或吐血咽乾頭痛眩暈眼目昏澁或痰嗽喘促胸膈虛

痞或嘔吐泄瀉手足冷熱即八珍湯加黃芪肉桂

○加味逍遙散 治肝脾血虛有熱遍身搔痒或口乾咽燥發熱盜汗食少嗜卧小便澀滯等症又治瘰癧流注虛熱等瘡

甘草 炙 當歸 炒 芍藥 酒 茯苓

白朮 炒 柴胡 牡丹皮

山梔 炒 右水煎服

○逍遙散即前方去丹皮山梔

○歸脾湯 治脾經失血少寐發熱盜汗或思慮傷脾不能攝血以致妄行或健忘怔忡驚悸不寐或心脾傷痛嗜卧少食或憂思傷脾血虛發熱

或肢體作痛大便不調或經候不準
肺熱內熱或瘰癧流注不能消散潰
飲

人參 白朮 黃芪 白茯苓

龍眼肉 當歸 遠志 酸棗仁

炒各 木香 甘草 右姜棗水煎

○加味歸脾湯 即前方加柴胡山梔

○柴朮參苓湯 治肝火血熱遍身

癢痒或起赤暈或筋攣結核

白朮 炒 人參 茯苓 柴胡

川芎 山梔 芍藥 甘草 炒 各

熟地 自製 當歸 各八分 右水煎服

○柴芍參苓散 治肝膽經部分結

核瘰癧瘡癩等症或肝血燥熱脾氣

虛弱發熱少食

柴胡 芍藥 人參 茯苓

白朮炒 山梔炒 陳皮 當歸各一錢

牡丹皮 甘草各五分 右姜棗水煎

○清肝益榮湯 治肝膽經風熱血

燥筋攣結核或作癩子

柴胡 山梔各五分 龍膽草酒拌炒 黑五分

當歸 川芎 芍藥各一錢 熟地黃白

白朮炒 木瓜不犯鐵器 茯苓各五分 甘草三分

薏苡仁五分 右水煎服

○清熱涼血飲 治風熱血燥丹毒

等症大便秘結

當歸 川芎 大黃炒 芍藥炒

生地黃各一錢 右水煎服

○神効開結散 消瘰塊甚効

沉香 木香各二兩 橘紅四兩 珍珠四

九粒入砂鑽內以鹽泥封 豬厭肉四

子四十九枚用豚猪者 右為末每

服一錢臨卧酒調徐徐嚥下患小者

三五服大者一劑可愈切忌酸鹹油

膩滯氣之物須用除日於靜室修合

○海藻散堅丸 治肝經癭瘤

海藻 昆布各二兩 小麥四兩醋煮

柴胡兩 龍膽草酒拌炒 焦二兩

右為末煉蜜丸桐子大每服二三十

丸臨卧白湯送下噤化嚥之尤好凡

患瘰癧服調治之藥未應宜佐以前

二藥

○九味柴胡丸 方見本卷第八論

○梔子清肝散

○柴胡清肝散 二方見本卷第二論

○生地黃丸 方見本卷第三論

婦人經水不調論第五

婦人流注或因憂思鬱怒虧損肝脾或因產後勞役復傷氣血以致榮氣不從逆於肉埋腠理不容外邪客之或濕痰流注或跌撲血滯或產後惡露則氣流而注血注而凝或生於四肢關節或流於胸腹腰髀或結塊或漫腫皆屬虛損急用葱熨及益氣養榮湯則未成者自消已成者自潰若腫起作痛起居如常飲食如故屬病

氣有餘形氣未損者尚可治若漫腫微痛起居倦怠飲食少思屬形氣病氣俱不足最為難治不作膿或膿成不潰氣血虛也用八珍湯憎寒畏寒陽氣虛也十全大補湯晡熱內熱陰血虛也四物加參朮作嘔欲嘔胃氣虛也六君加炮薑養少體倦脾氣虛也補中益氣加茯苓半夏四股逆冷小便頻數命門火衰也八味丸小便頻數痰盛作渴腎水虧損也六味丸月經先期不日而止肝脾虛弱也以經過期多日不止肝脾虛熱也八珍湯加柴胡丹皮凡潰而寒凝瘡口不斂者用豆豉餅法散之其潰而有膿

管不斂者用針頭散腐化之若不補氣血不節飲食不慎起居不成七情或用寒涼剋伐者俱不治

附治驗

○婦人左臂患之年許不潰堅硬不痛脈弱少食月經過期日晡發熱勞怒則痛此形氣虛而逆於肉裡也與參芪歸朮川芎芍藥熟地貝母遠志香附桔梗丹皮甘草百餘貼而消

○婦人因暴怒而腰腫一塊或胸膈不利或走氣作痛此榮氣鬱滯與方脈流氣飲數劑而止更以小柴胡對四物加香附貝母月餘而愈

○婦人因怒脇下腫痛胸膈不利脈息沉滯此榮氣鬱遏而為腫用方脈流氣飲數劑少愈以小柴胡對二陳加青皮桔梗貝母數劑頓退更以小柴胡對四物二十餘劑而痊

○婦人因閃肭肩腫遍身作痛用黑丸子二服而痛止又用方脈流氣飲二劑而腫消更以二陳對四物加香附枳殼桔梗而愈

○婦人患此遇勞必痛家手按之痛乃止屬氣血俱虛用十全大補湯六味丸逍遙散而痊

○婦人先肢體作痛後患流注發熱惡寒食少脇脹月經不調痰盛喘嗽五心煩熱健忘驚悸盜汗無常悉屬

肝脾虧損氣血不定用十全大補加
味歸脾兼服諸症悉痊

○婦人素頭暈患流注月經遲少此
屬中氣虛弱用補中益氣湯而愈後
因勞仆地月經如湧此勞傷火動用
前湯加五味子一劑而愈

○婦人患前症用行氣化痰等藥胸
膈不利飲食少思用疎利之藥大使
作泄中滿不食余以爲脾胃後傷用
補中益氣湯加煨姜脾胃健飲食進
又用六君加茸歸百餘劑而愈

○婦人素鬱結肩臂各腫如覆杯余
以爲肝脾虧損用加味道遙散百餘
劑元氣復而腫消後因勞役怒氣經
行不止服涼血之劑其血如崩余以
爲此因脾氣復傷下陷而血從之朝
用補中益氣湯夕用加味歸脾湯而
愈

○婦人懷抱鬱結不時心腹作痛寒
熱倦怠服行氣化痰等劑遍身結核
大小不一二十餘枚諸藥不應余用
加味歸脾湯而愈

○婦人腿患筋攣骨痛諸藥不應脈
遲緊此肝脾氣血虛弱而寒氣之變
也用大防風湯二劑頓退又二劑而
安又一婦患之亦然先用前藥二劑
更服黑丸子而痊此二患若不早治
以致內潰必成敗症矣

○婦人患前症潰後發熱余以為氣血俱虛彼不信乃服敗毒表散之藥果發大熱竟至不救夫潰瘍雖有表症發熱宜以托裏為主而佐以表散之劑况於瘰癧流注乎

附方藥

○仙方活命飲 治一切瘡瘍未成者即散已成者即潰又止痛消毒之良劑也

白芷 貝母 防風 赤芍藥

當歸尾 甘草節 皂角刺

穿山甲 天花粉 乳香 沒藥

各一錢 金銀花 陳皮 各二錢

右用酒一大碗煎五七沸服

○托裡消毒散 治瘡疽元氣虛弱

或行次伐不能潰散服之未成即消

已成即潰腐肉即去新肉即生

人參 黃芪 鹽水 川芎 芍藥 炒

白朮 茯苓 各一錢 金銀花 白芷

各七錢 甘草 五分 右水煎服

○托裡散 治瘡瘍因氣血俱虛不

能起發或腐潰不能收斂及惡寒發

熱者

人參 氣虛多用之 黃芪 炒 白朮 炒

陳皮 當歸 熟地黃 製 茯苓

芍藥 酒炒 各一錢 右水煎服

○益氣養榮湯 治懷抱抑鬱瘰癧

流注或四肢患腫肉色不變或日晡

發熱或潰而不斂

人參 茯苓 陳皮 貝母

香附 當歸酒拌 川芎 黃芪鹽水拌炒

熟地黃酒拌 芍藥炒各錢 甘草炙 桔梗

炒各五分 白朮炒 右薑水煎服

○木香餅 治氣滯結腫閉胸風寒所傷作痛

木香錢五 生地黃兩一 右木香為末

地黃杵膏和勻量患處大小作餅置

患處以熱熨斗熨之腫痛悉退

○二陳湯 治中脘停痰飲食少思

嘔逆等症

陳皮去白 茯苓 半夏各錢一 甘草炙

右水煎服

○方脈流氣飲 治惱怒胸膈脹滿或肢躄作痛或結壅腫血氣無虧見

第三卷第十論等症

○隔蒜灸法 治一切瘡毒大痛或不痛或麻木如痛者灸至不痛不痛者灸至痛其毒隨火而散用大蒜頭

去皮切三分厚安瘡頭上用艾壯於

蒜上灸之三壯換蒜後灸未成者即

消已成者亦殺其大勢不能消者如

瘡大用蒜搗爛攤患處將艾鋪上燒

之蒜敗再換仍服托裏之劑如不痛

或不作膿不起發者不治此氣血虛

極也

○神效葱熨法 治虛怯人肢躄患

腫塊或不痛或作痛或風襲於經絡
肢脊疼痛或四肢筋掣骨痛又治流
注跌撲傷損腫痛用葱頭細切杵爛
炒熱敷患處冷易之再熨腫痛即愈
其効如神此外補陽氣而運散壅滯
之法也

○豆豉餅 治瘡瘍腫硬不潰或潰
不斂并一切頑瘡惡瘡用江西豆豉
爲末唾津和作餅大如錢厚如三文
置患處加艾壯於上灸之乾則易之
若背瘡大者用漱口水和餅覆患處
鋪艾於上灸之如未成者則消已成
者能殺其毒有不効者乃氣血虛也
爲不治

○大防風湯 方見本卷第九論

○八珍湯 方見本卷第三論

○十全大補湯 方見本卷第九論

○六君子湯 四物湯 方見本卷
第六論

○補中益氣湯 方見本卷第十論

○八味丸 六味丸 方見本卷第
十一論

○針頭散 方見本卷第三論

○小柴胡湯 方見本卷第二論

○黑丸子 方見本卷第九論

婦人血風瘡論

婦人血風瘡因肝脾肺經風熱或鬱
火血燥所致其外症或身發疙瘩搔
痒或如丹毒痒痛或搔破膿水淋漓
其內症月經失常小便不調夜熱內

熱自汗盜汗惡寒憎寒肢身倦怠飲食不甘寒熱往來若發熱作痛屬肝經風熱用當歸飲加柴胡山梔若寒熱作痛屬肝脾鬱火用小柴胡如山梔黃連若吃瘧瘵瘵屬肺經風熱用清熱消風散若經候失常內熱晡熱屬肝脾血虛用加味逍遙散若肢體倦怠寒熱往來屬肝脾氣虛用加味四君子加柴胡丹皮若夜熱作渴或兼譫語乃血分有熱用小柴胡加生地黃血虛用四物合小柴胡若無寐盜汗內熱晡熱乃脾經血虛用歸脾湯兼寒熱加山梔若愈後身起白屑擦則肌膚如帛所隔此氣血虛不能

榮於腠理用十全大補湯若用風藥以治其外則陰而復傷及致他症矣

附治驗

○婦人素清苦四肢患之誤服敗毒藥助熱內熱自汗盜汗月經不行口乾咽燥余謂四肢者脾之所主當調養脾血其病自愈遂用歸脾湯數劑而愈

○婦人性躁患之寒熱口苦脇痛耳鳴腹脹溺瀆年餘矣此屬肝火傷脾用四君子加柴胡炒山梔炒龍膽散劑更與逍遙散兼服而瘳愈又與六味丸及逍遙散七十餘劑而愈

○婦人日晡身瘳月餘口乾又月餘

成瘡服祛風治瘡之劑膿水淋漓午
前畏寒午後發熱殊類風症余謂此
肝火傷脾外邪所搏先用補中益氣
加山梔釣藤又以逍遙散加川芎貝
母而愈

○婦人瘡痒發熱日晡益甚皮膚赤
暈月經過期此血虛而有熱也以逍
遙散加熟地熱止痒退更以四物加
柴胡參芪炙甘草茯苓調理遂愈

○婦人懷抱久鬱患前症膿水淋漓
服連翹消毒散食少胸痞服清氣化
痰湯作嘔吐痰服清熱化痰丸煩熱
畏寒四肢厥熱面目赤色脈大而無
力余以為脾胃虧損而虛寒隔陽氣

於外遂用六君子湯加炮薑治之諸
症稍愈飲食頓進又佐以四物湯諸
症漸愈又以四君子每味各一錢四
物湯每味各五分諸症全愈後因勞
嗽熱體倦懶食小腹痞墜小便澀滯
自用四物黃柏知母補熱尤甚更煩
渴眩暈余以為脾氣下陷用補中益
氣湯漸愈乃佐以逍遙散而安後月
經至如崩前症復作此脾氣傷而不
能統血血虛而陰火動也仍用補中
益氣而痊

○女子十二歲善怒遍身作痒用柴
胡川芎山梔芍藥以清肝火以生地
當歸黃芩以涼肝血以白朮茯苓甘

草以健脾土而愈半年後遍身起赤痕或時眩暈此肝火熾甚血得熱而妄行是夜果經至

附方藥

○當歸飲 治血熱癰疹痒痛膿水淋瀝發熱等症

當歸 白芍藥 川芎 生地黄

白茯苓 黃芩 各一錢 防風 荊芥

何首烏 不見 甘草 各五分 右水煎服

○四君子湯 治胃氣虛弱或因刺伐以致腫不消散潰不收斂者宜用此藥調補脾胃諸症自愈若用攻毒七惡隨至若飲食少思或食難化或欲作嘔或大便不實瘡口出血吐

血便血充宜用之凡氣血俱虛之症宜用前湯但加當歸則脾胃健飲食進陰血生若用四物沉陰則脾胃復傷及致他症若命門火衰而脾土虛寒者必用八味丸以補土母

人參 白朮 茯苓 各二錢 甘草 一錢

右薑棗水煎服

○加味四君子湯即前方四君子加川芎當歸

○六君子湯 治症同前即四君子湯加陳皮半錢各一錢若中氣虛寒假熱誤服寒涼刺伐以致四肢發熱口乾舌燥嘔吐此因寒氣隔陽於外須更加姜桂不應急加附子

○四物湯 治血虛或因失血或因
尅伐或因潰後以致喘熱內熱煩躁
不安若脾虛不能生血者宜四君加
當歸并酒炒白朮以補脾土其血自
生若血虛發熱誤服寒涼尅伐之劑
以致發熱作渴目紅面赤脈洪大而
虛此血脫煩躁急用當歸補血湯

當歸 酒拌 一錢 熟地黃 三錢 芍藥 錢 炒 自製

川芎 錢一 右水煎服

○加味四物湯即四物加柴胡牡丹
皮山梔

○神效當歸膏 治一切瘡 勿搔痒

痰痛去腐肉生新肉其効如神如洗
拭換膏必須預備即貼之新肉畏風

故也如用白蠟尤好此藥生肌止痛
補血續筋故與新肉相宜

當歸 生地黄 黃蠟 各一兩

麻油 兩六 右先將當歸地黃入油煎

黑去粗入蠟溶化候冷攪勻即成膏

矣 如用白蠟減半

○滋陰腎氣丸 方見六卷第三論

○小柴胡湯 方見本卷第二論

○歸脾湯 ○逍遙散 二方見本卷第
四論

○六味丸 方見本卷第十一論

○補中益氣湯 方見本卷第十論

婦人赤白遊風方論第七

婦人赤白遊風屬肝經怒火血燥生
風或脾經鬱結血虛生熱或腠理不

容風邪外襲其症或疣瘡癢或膿
水淋漓白屬氣而赤屬血因得風而
遊行也若肝經血燥用柴胡清肝散
肝經怒火用梔子清肝散肝經血熱
用加味四物湯肝火血虛用六味地
黃丸脾經鬱熱用加味歸脾湯肝脾
血虛風熱用加味道遙散若因風邪
鬱熱所致用荊防敗毒散或專用祛
風之劑肝血愈燥則血隨火化反為
敗症矣

附治驗

○婦人素清苦因鬱怒患前補熱
內熱自汗盜汗月經不行口乾咽燥
余謂此鬱氣傷脾乃以歸脾湯數劑
諸症稍退後兼道遙散五十餘劑而
愈

○婦人患此性躁寒熱口苦頭痛耳
鳴腹脹瀉瀉乃肝脾血虛火旺也用
六君加柴胡山梔龍膽數劑更與道
遙散兼服漸愈又與六味九道遙散
七十餘劑諸症悉退

○婦人患前症誤服大麻風藥破而
出承煩渴頭暈誠類風症六脈洪數
心肝脾為甚余曰風自火出此因怒
火脾胃受邪血燥而作非真風症也
與道遙散六味九以清肝火滋脾血
生腎水而愈

○婦人患前症久不愈食少體倦此

肝脾虧損陰虛發熱也先用補中益氣加川芎炒梔元氣漸復更以逍遙散而瘡漸愈

○婦人身如丹毒搔破膿水淋漓熱渴頭暈目瞤益甚用加味逍遙散而愈

○婦人患赤遊風瞞熱痒甚余用清肝養血之劑不信乃服大麻風藥癢痛筋攣又服化痰順氣之劑四肢痿弱又一婦患前症數用風藥煎湯泡洗以致腹脹並歿

○女子赤暈如霞作痒發熱加味小柴胡加生地連翹丹皮而愈大凡女子天癸未至婦人月經不調受驚

身熱多有此症

附方藥

○消風散 治風寒癢疹痒或膿水淋漓頭皮腫痒

荆芥穗 甘草 陳皮 人參

茯苓 白殭蚕 防風 芎藭

藿香 羌活 蟬蛻 厚朴

右水煎服

○大連翹飲 治風熱執毒或赤白遊風表裏皆受患者

連翹 藿麥 荆芥 木通

赤芍藥 蟬蛻 甘草 防風

柴胡 滑石 山梔 黃芩

當歸 右水煎服

○當歸飲 治風熱赤白遊風作痒
或癩破膿水淋漓等症

○四物湯 治赤白遊風血虛發熱
或嘔熱頭目不清或煩躁不寐或胸
脇作痛等症

○六君子湯 治脾氣虧損皮膚癢
痒或癢疹不消 二方見本卷第六論

○加味小柴胡湯 治肝膽經風熱

怒火赤白遊風或寒熱往來嘔熱潮
熱身熱或口苦耳聾等症 方見本卷
第二論

○加味道遙散 治血虛有熱遍身

搔痒赤白遊風發熱嘔熱等症

○逍遙散即前方去丹皮山梔

○歸脾湯 治脾經血虛癩痒發熱

小蘇盜汗等症 二方見本卷第四論

○婦人 方見本卷第十論

婦人癩瘡方論第八

一名癩癧一名
便毒俗名瘡子

婦人癩瘡或肝經濕熱下注或鬱怒

傷損脾肝其外症或兩拗小腹腫痛

或玉門焮腫作痛或寒熱往來增寒

壯熱其內症或小便澀滯或腹內急

痛或小腹痞悶或上攻兩脇或嘔熱

重墜若兩拗小腹腫痛肝經濕熱壅

滯也用龍膽瀉肝湯玉門腫脹肝火

血虛也用加味道遙散及龍膽瀉肝

湯加水香若緊投散血攻毒之劑則

誤甚矣

附治驗

婦人拗中赤腫脹痛此膿內作用
托裏消毒散加柴胡數劑潰而膿清
寒熱乃氣血復虛用托裡散而寒熱
止用十全大補百餘劑而愈

○婦人腹拗腫痛寒熱口苦或時帶
下此肝經濕熱不利也用龍膽瀉肝
湯而腫痛消用加味道遙散而寒熱
退

○婦人腹拗腫痛小水不利時或胸
乳作痛脇腹作脹此肝火氣滯用四
物柴胡青皮玄胡索木香而愈

○婦人拗中作痛小腹痞悶小便不
利內熱體倦飲食少思此肝火內動
脾胃受傷也用加味歸脾湯柴胡清

肝散而安

○婦人拗中腫脹小腹作痛服下血
之劑其痛益甚更吐瀉少食余以為
肝脾復傷用六君子湯加升麻柴胡
而愈

○婦人兩拗腫脹腹內一塊不時上
攻月經不調小便不利余以為肝脾
氣滯而血傷以四君加芍歸柴胡山
梔而愈後因鬱怒前症復作兼胸滿
腹脹盜汗此肝木甚而傷脾土也用
加味歸脾湯下蘆薈丸而痊

○婦人小腹內或作痛或痞悶兩拗
腫痛內熱寒熱胸膈不利飲食不甘
形體日瘦此肝氣滯而脾氣傷也朝

用補中益氣湯夕用蘆薈丸漸愈更
用六味地黃丸全愈

○婦人兩拗腫痛小腹痞脹白帶時
下寒熱往來小水淋瀝余作肝氣滯
而血病用龍膽瀉肝湯漸愈又用加
味道遙散六味地黃丸全愈

○婦人患前症胸脇脹悶或小水不
利或時腹痛此肝火氣病先用龍膽
瀉肝湯以清肝熱又用加味道遙散
以生肝血六味地黃丸以滋腎水而
愈

○婦人患前症余以為肝脾鬱怒不
信別服化痰利氣之劑胸膈愈脹又
服峻利疎導之劑變脾虛發腫而歿

○婦人患前症內熱作渴飲食不甘
肢體倦怠陰中作梗小便赤澀此脾
經鬱經肝經濕熱用加味歸脾湯而
愈後因怒復作小腹脹痛用小柴胡
加山梔芍歸痛止又用加味道遙散
而愈

○婦人兩拗作痛寒熱內熱小便赤
瀉胸膈不利此肝火動而脾氣傷也
用補中益氣湯加茯苓數劑少愈又
與加味歸脾湯諸症悉退再用加味
逍遙散而愈

○婦人小腹痞悶溺瀉內熱體倦懶
食此肝火動而脾血傷也用八珍加
柴胡山梔膽草而安

○婦人陰中如稜兩拗腫痛寒熱不食小便頻數小腹重墜奈以為肝脾鬱怒所致先以補中益氣加茯苓山梔車前子青皮以清肝火升脾氣更以加味歸脾湯調理脾鬱而愈

附方藥

○龍膽瀉肝湯 治肝經濕熱兩拗腫痛或腹中疼痛或小便澀滯等症

龍膽酒拌澤瀉各一錢車前子炒

木通酒拌生地黄酒拌當歸酒拌山梔炒

黃芩炒甘草各五分右水煎服

○九味柴胡湯 治肝經濕熱下注便毒腫痛或小腹脇肋結核凡肝膽經部分一切瘡瘍或風熱結核瘰癧

柴胡 黃芩炒人參 山梔

半夏 龍膽草炒當歸 芍藥炒

甘草各五分右水煎服

○蘆薈丸 治肝氣不和尅侮脾胃而患諸症或三焦肝膽經風熱日生雲翳或疔熱癩癧耳內生瘡寒熱作痛肌體消瘦發熱作渴飲食少思肚腹不調或牙齦蝕落頰頰腐爛下部生瘡等症

蘆薈五錢胡黃連 當歸 芍藥炒

龍膽草酒浸川芎 蕪荑各一兩

木香 甘草各三錢右為末用米

糊丸麻子大每服五十九滾湯下

○加味小柴胡湯

○小柴胡湯 治肝經下部腫脹小便不利或寒熱往來或嘔熱潮熱或胸脇作痛 二方見本卷第三論

○加味逍遙散 治肝脾血虛濕熱流注下部諸症發熱嘔熱寒熱

○加味歸脾湯 治脾肝鬱怒下部諸症寒熱嘔熱少食無寐或經候不調 二方見本卷第四論

○補中益氣湯 治元氣下陷下部重墜或嘔熱寒熱少食體倦或因過服寒涼之藥所致 方見本卷第十論

○加味四物湯 方見本卷第六論

○八珍湯 治氣虛寒熱嘔熱或寒熱往來下部諸症 二方見本卷第三論

婦人鶴膝風方論第九

婦人鶴膝風症因胎產經行失調或鬱怒虧損脾肝而為外邪所傷或先腿脚牽痛或先肢體筋羣既而膝漸大臃漸細如鶴之膝故名之也若腫高赤痛者易治漫腫不赤痛者難治二三月潰而膿稠者易治半載後潰而膿清者難治設用攻伐已損元氣尤為難治也大要當固元氣為玉而佐以大防風湯若食少體倦者六君子湯為主嘔熱內熱者逍遙散為主寒熱往來者八珍湯為主發熱惡寒者十全大補湯為主少寐驚悸者歸脾湯為主月經過期者補中益氣為

至月經先期者加味道遙散為玉凡
潰後當大補脾胃若濃出及痛或寒
熱煩渴等症皆屬氣血虧損一培補
庶保終吉

附治驗

○婦人久鬱怒胸脇不利內熱寒熱
經候不調遍身酸痛余謂胃氣虧損
先用補中益氣湯加半隻茯苓二十
餘劑胃氣漸醒又用大防風湯與歸
脾湯膠膝漸消用加味道遙散大防
風湯而全消又用八珍湯加牡丹皮
調理氣血而安

○婦人患前症腫痛寒熱先用大防
風湯一劑又用加味道遙散四劑月
餘腫痛漸退惑於速効別服祛風敗
毒虛症蜂起仍用大防風為主佐以
十全大補而消又服大補湯兩月餘
而痊

○婦人患前症兩拗中腿股筋牽作
痛內熱寒熱此肝火氣滯之症先用
加味小柴胡湯四劑後以加味道遙
散為主佐以大防風湯而消又患痢
後兩膝腫痛寒熱往來用十全大補
湯為主佐以大防風湯而仍消

○婦人患之雖潰而腫不消朝寒暮
熱飲食不思經水三四月一至此屬
肝脾氣血俱虛也用補中益氣加味
歸脾二湯各三十餘劑腫漸消而寒

熱止又佐以大防風月餘而能步履
再月餘經行如期又服六味丸八珍
湯三月而斂

附方藥

○大防風湯 治陰虛邪襲腿膝腫
痛等症

防風 附子地 牛膝酒 白朮炒

羌活 人參各一錢 川芎一錢 肉桂五分

黃芪炒一錢 芍藥炒 杜仲去皮姜汁

甘草炙各五分 熟地黃自製一錢五分

右水煎服

○黑丸子 治跌撲墜隨筋

骨疼痛或瘀血壅腫或外感風寒肢

體作痛若流注膝風初結服之自消

若潰而膿清與補氣血藥自斂孕婦
勿服

百草霜 白芍藥各一兩 南星

川烏各炮三錢 白欬 赤小豆各一兩六錢

白芨 當歸 骨碎補各八錢

牛膝煨六錢 右為末酒糊丸桐子大

每服三十九丸塩湯溫酒任下

○聖愈湯 治血虛心煩睡臥不寧
或五心煩熱

地黃酒拌蒸半日 生地黃酒拌 黃芪炙

川芎 當歸各一錢 右水煎服

○六味丸 方見本卷第十論

○逍遙散 ○加味逍遙散 ○八珍湯

○十全大補湯 ○歸脾湯 五方見本
卷第四論

○補中益氣湯 方見本卷第十論

○四物湯 方見本卷第六論

婦人下注屬陰及論

婦人兩膝生瘡或因胎產飲食失宜傷損脾胃或因憂思鬱怒虧損肝脾以致濕熱下注外邪所搏外膝屬足三陽可治內膝屬足三陰難治若初起發腫赤痛屬濕熱所乘用人參敗毒散或檳蘇敗毒散若漫腫作痛或不腫不痛屬脾虛濕熱下注補中益氣湯氣血俱虛八珍湯若膿水淋漓體倦少食內熱口乾屬脾氣虛弱補中益氣加茯苓酒炒芍藥若午後頭目不清屬脾虛陰火用前湯加熟地

芍藥若午後發熱倦怠屬氣虛血弱用前湯加川芎熟地若懷抱鬱怒屬脾氣不舒用歸脾湯加川芎山梔若內熱體倦痰涎口瘡屬脾腎虛熱用六味丸若肢體畏寒飲食少思屬脾腎虛寒用八味丸大抵色赤屬濕熱易治色黯屬虛寒難治設誤用攻伐復傷胃氣多變瘵症

附治驗

○婦人兩膝生瘡漸至遍身發熱吐痰口燥咽乾盜汗心煩足熱小便赤潛日晡益甚此腎足三陰虛火也用加味道遙散六味丸而愈

○婦人患前症四畔微赤作痛重墜

膿水淋漓胸膈不利飲食少思內熱
口苦夜間少寐此鬱結傷脾血也用
歸脾湯解鬱結生脾血用補中益氣
加茯苓半其補脾氣除濕熱尋愈
○婦人久不愈色赤微熱日晡微腫
形體虛弱飲食少思勞則喘渴惡寒
發熱此為脾虛下陷用補中益氣湯
而愈

○婦人患已三年色黯腫硬惡寒發
熱飲食少思形體消瘦作渴飲湯飲
食稍多或腹脹或泄瀉或作嘔或作
酸此脾氣虛寒也用補中益氣加乾
姜五分五十餘劑而愈

○婦人患此因步履勞復惡寒發熱
倦怠懶食而瘡出血此元氣虛而不
能攝血歸經也用補中益氣湯而愈

○婦人患之因怒寒熱頭眩或耳鳴
膈脇脹痛或小腹陰道悶墜或小便
頻數下血此屬肝火血熱先用小柴
胡加炒黑山梔芍歸車前一劑諸症
悉退又用加味道遙而愈後因飲食
勞倦前症復作瘡口出血用補中益
氣湯而安

○婦人患將兩月微腫赤痛小便頻
數飲食如常此濕毒甚而氣血虛先
用活命飲二劑去其濕毒又用八珍
湯調補氣血而愈

○婦人患此微腫惡寒發熱此濕熱

胡蘆巴兩 茯苓去皮 龍骨一兩
右為末酒糊丸桐子大每服二十九
空心溫酒或鹽湯下

○平胃鎮心丹 治心血不足時或
心忡驚悸夢如高墜常服安心腎益
榮衛

硃砂細研半兩 人參五錢 龍齒一兩
白茯苓 五味子炒 車前子炒

扶神 麥門冬去心 肉桂各一兩
遠志去心甘草製 天門冬去心 山藥製

右為末蜜丸桐子大每服三十九空
心溫酒下

○威喜丸 治小便白濁

黃蠟兩 白茯苓四兩 一兩一 瓊同 猪苓各

二十沸漉出晒乾不用猪苓 右以茯苓為末

蠟丸彈子大每服一九空心細嚼
津液嚥下小便清利為度忌食米
醋

○小柴胡湯 方見本卷第八論

○加味逍遙散 ○八珍湯

○歸脾湯 三方見本卷第四論

○仙方活命飲 方見本卷第五論

○六味丸 ○八味丸 二方見本卷第
十一論

婦人足跟瘡腫方論第十

婦人足跟足指腫痛足心發熱者皆
因胎產經行失於調攝虧損足三陰
虛熱所致若腫痛或出膿用六味丸

大醫方卷之十四
為主佐以八珍湯胃虛懶食佐以六君子湯寒熱內熱佐以逍遙散補熱益甚頭目不清佐以補中益氣湯痰盛作嘔或口舌生瘡亦用前二藥以滋化源大凡發熱喘熱內熱自汗盜汗等症皆陰假熱也故丹溪謂火起九泉陰虛之極也蓋足跟乃督脈發源之所腎經所過之地若不求其屬而泛用寒涼則誤甚矣然俗謂為鬼噬瘡者蓋獵人被虎咬足跟久而不斂氣血瀝盡其人心必死男子酒色過度者多患此症

附治驗

○婦人素血虛因大勞兩足發熱喘

熱月經過期或用四物芩連飲食少思胸痞吐痰用二陳枳實黃連大便不實吐痰無度足跟作痛余曰足熱喘熱月經過期肝脾血虛也胸痞吐痰飲食少思脾胃氣虛也蓋胃為五臟之根本胃氣一虛諸病悉至先用補中益氣加茯苓半夏脾胃漸健乃佐以六味丸補脾腎不兩月而痊
○婦人經候不調發熱喘熱胸膈不利飲食少思服清熱寬中消導之劑前症益甚更兼肢體酸痛服除濕化痰等藥經候兩二月一至服通經降火之劑足跟足指作痛其熱如炙余以為足三陰虧損用補中益氣六味

地黃兩月諸症漸退又用前湯并八珍湯兩月而康

○婦人足跟患腫兩腿酸軟或赤或白或痛或痒後或如無皮或如皺裂日晡至夜脹痛熾熱此屬足三陰虛損用加減八味丸及逍遙散加熟地川芎百餘劑而愈

○婦人勞則足跟熱痛余作陰血虛用八珍而痊後遍身搔痒服風藥發熱抽搐肝脈洪數此肝家血虛火盛而生風以天竺膽星為丸用四物麥門五味苓連炙草山梔柴胡煎送而愈

○婦人兩足發熱足跟作痛日晡熱甚余謂腎肝血虛用逍遙散六味丸五十餘劑諸症悉愈

附方藥
○當歸補血湯 治脾胃損傷或因服峻劑致血氣俱虛發渴引飲目赤面紅晝夜不眠其脈洪大而虛重按全無若誤服白虎湯必死

黃芪炙一兩 當歸二錢 右水煎服
○六味丸一名六味地黃丸 此壯水制火之劑夫人之生以腎為主人之病多由腎虛而致者此方乃天一生水之劑無不可用若腎虛發熱作渴小便淋秘痰壅失音咳嗽吐血頭目眩暈眼

華耳聾咽喉燥痛口舌瘡裂齒不堅

固腰腿痿軟五臟虧損自汗盜汗便血諸血凡肝經不足之症尤當用之蓋水能生木故也此水泛為痰之聖藥血虛發熱之神劑又治肝腎精血不足虛熱不能起牀即八味丸去附子肉桂

○八味丸 治命門火衰不能生土以致脾胃虛寒而患流注鶴膝等症不能消渴收斂或飲食少思或食而不化或臍腹疼痛夜多漩溺經云益火之源以消陰翳即此方也

熟地黃

自製

山茱萸肉

山藥

茯苓

牡丹皮

澤瀉

各三兩

肉桂

用三分厚者去皮取肉分論方能補腎引虛火歸源

附子

用一兩五錢重者切四分塊童便浸數日入麩炒令無白星為度

右為末蜜丸桐子大每服

七八十九滾湯下

○六君子湯

方見本卷第六論

○補中益氣湯

方見本卷第十論

○八珍湯

○逍遙散 二方見本卷第四論

婦人肺癰因外邪內蘊或七情鬱火

仍於外科要

誤行汗下重亡津液以致肺氣受傷而惡風咳嗽鼻塞項強胸脇脹滿呼吸不利吐痰臭濁膿血腥穢若咳嗽喘急寒邪在表也小青龍湯咳嗽胸脹寒邪內壅也葶藶大棗瀉肺湯脇脹咳嗽腥臭膿已成也桔梗湯咳嗽喘

短氣或小便短少肺氣虛也佐以參
芪補肺湯體倦少食或喘嗽短氣脾
肺虛也佐以參朮補脾湯作渴飲冷
午前嗽甚胃火盛竹葉石膏湯作渴
內熱午後嗽甚陰血虛也六味丸四
物湯口乾飲湯躄倦少食胃氣虛也
補中益氣湯加五味麥門口乾內熱
咳唾痰涎腎水虛也六味丸益氣湯
黃昏熱以嗽甚陰火熾也六味丸四
物湯加五味麥門五更嗽或痰甚脾
肺虛也六君子湯嗽而不得眠及兩
脇痛肝火血虛也六味丸益氣湯大
凡前症因外淫所侵當祛邪而實土
因心火太過當伐木而補金若肺氣
虛弱當補脾土而生肺金若陰火上
炎當補脾肺以滋腎水然而發熱喘
嗽咳唾膿血飲食不入皆脾土不能
生肺金肺金不能生腎水之敗症苟
能純補脾土而生諸臟多有復生者
若用寒涼脾胃復傷則肺經失養腎
水益涸虛火上炎薰蒸於肺吾未見
其能生之者其唾膿血脈浮大面色
赤者俱難治若陰火妄動或勞嗽吐
膿血者尤難治若膿自止脈浮短瀼
及始萌者易治

附治驗

○婦人素血虛發熱咳嗽服痰火之劑後吐膿血面赤脈數其勢甚危此

膿成而氣血虛也余用八珍湯補元氣桔梗湯治肺癰而愈

○婦人感冒風寒或用發表之劑反咳嗽喘急飲食少思胸膈不利大便不通右寸關脈浮數欲用疎通之劑余曰此因脾土虧損不能生肺金若更利之復耗津液必患肺癰矣不信仍利之虛症悉至後果吐膿余朝用益氣湯夕用桔梗湯各數劑吐膿漸止又朝仍用前湯夕用十全大補湯各五十劑喜其善調理獲愈

○婦人咳嗽吐痰胸膈作痛右寸關浮滑項下牽強此脾胃積熱之痰非癰患也以二陳山梔白木桔梗治之

而痊

○婦人素血虛內熱時咳甲辰孟冬兩尺浮洪以脾胃不健請治余曰當防患肺症丙午孟春果咳嗽左右寸脈洪數肺癰也膿已成左寸脈仍洪數乃心火剋肺金甚令可慮余用壯水健脾之劑稍愈彼遽自忽不事調攝果歿於其令

附方藥

○青龍湯 治肺經受風寒咳嗽喘急

半隻湯泡乾姜 細辛 麻黃去節

肉桂 芍藥 甘草炙各一錢 五味炒五分

附子炮五分 右水煎服

○葶藶大棗瀉肺湯 治肺癰胸膈
 脹滿上氣喘急或身面浮腫鼻塞聲
 重用葶藶炒黃研末每服三錢先用
 棗十枚水煎去棗入藥再煎食後服
 ○桔梗湯 治肺癰咳而胸膈隱痛
 兩肢腫滿咽乾口燥煩悶作渴濁唾
 腥臭

桔梗炒 貝母心去 當歸酒拌 山萸仁
 枳殼炒 薏苡仁微炒 桑白皮炒
 甘草節 防已去皮各 黃芪鹽水
 百合蒸各 五味子杵 甜葶藶炒
 地骨皮 知母炒 杏仁各五分
 右薑水煎服

○人參補肺湯 治肺癰腎水不足

虛火上炎咳嗽膿血發熱作渴小便
 不調

人參 黃芪炒 白朮 茯苓
 陳皮 當歸各一錢 山茱萸去核
 山藥各二錢 五味子杵 麥門冬
 甘草炙各七分 熟地黃自製一錢五分
 牡丹皮一錢 右姜水煎服

○參芪補脾湯 治肺症因脾氣虛
 弱咳嗽膿涎中滿不食宜兼服此藥
 以補脾土生肺金

人參 白朮各二錢 黃芪炙二錢
 茯苓 當歸 陳皮各一錢 升麻二分
 五味子四分 炙甘草五分 右姜水煎

○人參平肺散 治心火剋肺金患

肺痿咳嗽喘嘔痰涎壅盛胸膈痞滿
咽嗑不利

人參 青皮 茯苓 天門冬

陳皮各一錢 地骨皮一錢 甘草五分

知母七分 五味子十粒 桑白皮炒一錢

右薑水煎服

○竹葉石膏湯 治胃火盛而作渴者

淡竹葉 石膏煨 桔梗炒 木通

薄荷 甘草各一錢 右姜水煎服

○竹葉黃芪湯 治癰疽氣血虛胃火盛而作渴

淡竹葉二錢 黃芪炒 麥門冬去心 當歸

川芎 甘草炒 黃芩炒 芍藥炒

人參 半隻 石膏煨 生地黄各錢

右水煎服

○二陳湯 方見本卷第五論

○六味丸 方見本卷第十一論

○補中益氣湯 方見本卷第十論

○四物湯 六君子湯二方見本卷第六論

○十全大補湯 八珍湯二方見本卷第四論

婦人腸癰方論第七

婦人腸癰因經行產後瘀血或七情飲食所致其症小便如淋發熱惡風身皮甲錯腹皮腫急按之軟如腫狀或腹脹大轉側有水聲或繞臍生瘡或大便出膿其脈遲緊者膿未成用活命飲以解其毒脈滑數者膿已成

用雲母膏以下其膿若二年間遍身
微腫大腸與臍出膿此息積之症也
多致不救內經云腸癰為病不可驚
驚則腸斷而死其坐卧轉側宜徐緩
時常少飲薄粥靜養調理庶可保生

附治驗

○婦人小腹腫痛小便如淋此毒結
於內用神効瓜蔓散二劑少愈又薏
苡仁湯二劑乃痊

○婦人小腹痛而有塊脈孔而瀉此
瘀血為患以四物加玄胡索紅花桃
仁牛膝木香二劑血下而愈

○婦人小腹脹痛大便秘瀉轉側有
水聲脈洪數以梅仁湯一劑頓下諸

血諸症頓退以薏苡仁湯二劑而痊

○婦人小腹脹痛小便不利脈滑數
此膿已成也服太乙膏五錢膿下甚
多脹痛頓退以瓜蔓散蠟礬丸托裏
藥而安

○婦人因經水多服藥止之致腹作
痛以失笑散二服而瘳又用加味道
遙散數劑而經調

○產婦惡露停滯小腹作痛服瓜仁
湯下瘀血而痊凡瘀血停滯急宜行
之緩則腐化為膿最為難治若流注
關節則患瘡疽多為敗症

附方藥

○瓜仁仁湯 治產後惡露未盡經

行瘀血停滯小腹作痛或成癰患

薏苡仁四兩 桃仁去皮 牡丹皮

瓜蒌仁各一兩 右每服五七錢水煎

○敗醬散 治脈數身無熱腹無積聚按之軟濡此為腸癰久積陰冷所成

薏苡仁一兩 附子炮半兩 敗醬草一兩

五分 右每服四錢水煎以小便利

為度

○牡丹湯 治腸癰腹軟而痛時下膿血

牡丹皮 人參 天麻 白茯苓

黃芪炒 薏苡仁 桃仁去皮 白芷

當歸酒炒 川芎各一錢 官桂 甘草各五分

木香三分 右水煎服

○大黃湯 治腸癰小腹堅腫按之則痛肉色如故或焮赤微腫小便頻數汗出憎寒脈遲緊未成膿者宜服之

大黃炒 朴硝各一錢 牡丹皮

瓜蒌仁炒 桃仁去皮 右水煎服

○梅仁湯 治腸癰壅痛大便秘澀

梅仁九箇 大黃炒 牡丹皮

芒硝各一錢 冬瓜仁研三錢 犀角鎊末

右水煎入犀角末服

○神仙太乙膏 治一切癰疽不問膿之成否並宜貼之更作丸服

玄參 白芷 當歸 肉桂

大黃 赤芍藥 生地黃各一

淨黃丹十二兩 右用麻油一斤入銅

鍋內煎黑濾去粗入黃丹十二兩再

煎滴水中捻軟硬得中即成膏矣如

軟更加丹雲母膏固効卒難修合太

乙膏亦可

○神効黃卷丸 最解毒止痛

白礬未一兩 明慈都黃蠟 半兩 黃色者溶

右和衆手九桐子大每服二十九滾

湯下如服金石發疽更用白礬末一

兩并三五服以溫酒調下若遍身生

瘡如蛇頭服之尤効此藥能解毒氣

內攻也須多服方驗亦治蛇咬熔化

衆熱滴傷處毒即出痛即止仍服兩

許

○失笑散 治產後心腹絞痛或血

迷心竅不知人事及尋常腹內瘀血

積血作痛

五靈脂去砂 蒲黃 炒各

右為末每服一二錢溫酒調

○活命飲 方見本卷第五論

○神効瓜蒌散 方見本卷第十四論

○四物湯 方見本卷第六論

○加味道遙散 方見本卷第四論

乳癰乳巖方論第十四

經云乳頭屬胃厥陰肝經乳房屬足

陽明胃經若乳房怒壅腫痛結核色

赤數日之外嫩痛脹潰稠膿湧出膿

盡而愈此屬膽胃熱毒氣血壅滯名曰乳癰為易治若初起內結小核或如鼈棋子不赤不痛積之歲月漸大嚙巖崩破如熟榴或內潰深洞血水滴瀝此屬肝脾鬱怒氣血虧損名曰乳巖為難療治法熈痛寒熱宜發表散邪腫熈痛甚宜疎肝清胃或不作膿膿成不潰宜用托裏或肌肉不生膿水清稀宜補脾胃或膿出及痛惡寒發熱宜補氣血或腫熈作痛晡熱內熱宜補陰血或飲食少思時作嘔吐宜補胃氣或飲食難化泄瀉腹痛宜補脾氣或勞碌腫痛宜補氣血怒氣痛腫宜養肝血慎不可用剋伐之劑

復傷脾胃也乳巖初患用益氣養榮湯加味逍遙加味歸脾可以內消若用行氣破血之劑則速其亡

附治驗

○婦人內熱脇脹兩乳不時作痛口內不時辛辣若臥而起急則臍下牽痛此帶脈為患也用小柴胡加青皮黃連山梔二劑而差

○婦人因怒兩乳腫兼頭痛寒熱此肝經氣症也用人參敗毒散二劑表症已退用小柴胡加芎歸枳殼桔梗四劑而愈

○婦人久鬱右乳內腫硬此肝經血症也用八珍加遠志貝母柴胡青皮

大醫方卷之十四
及隔蒜灸兼神効此葦散兩月餘而痊

○婦人先熱渴至夜尤甚後兩乳忽腫肝脈洪數乃熱入血分用加味小柴胡湯而愈

○婦人因怒左乳作痛發熱因表散太過腫熱殊甚用益氣養榮數劑熱止膿成因不即針益腫脹熱渴針之膿大泄仍服前湯月餘而愈

○婦人因怒左乳作痛胸膈不利此屬肝脾氣滯以方肺流氣飲加木香青皮四劑而安

○婦人膿清腫硬面黃少食內熱晡熱自汗盜汗月經不行此肝脾氣血

俱虛也用十全大補加遠志貝母及補中益氣各三十餘劑外用葱熨法而消

○婦人膿成脹痛余欲針之不從至數日針出敗膿三四碗許虛症蜂起幾至危殆用大補之劑兩月餘始愈

○婦人素弱多鬱患時疫後脾胃愈虛飲食愈少因怒右乳脇紅腫應內作痛或用炒麩皮熨之內痛益甚服加減四物湯腫勢愈大胸脇背心相引而痛余謂病後脾弱怒復傷肝用八珍加陳皮黃芪紫胡山梔白芷入劑稍愈去白芷加青皮木香桔梗又六劑而安

○婦人左乳內腫如桃不痛不赤發熱漸瘦此肝脾鬱怒也用八珍加香附遠志青皮柴胡百餘劑又兼神效瓜蒞散三十餘劑膿潰而愈

○婦人久鬱左乳內結核如杏三月不消心脈瀆脾脈大按之無力此肝脾氣血虧損以八珍加貝母遠志香附柴胡青皮桔梗五十餘劑而消

○婦人稟實性躁懷抱久鬱左乳內結一核按之微痛此皆氣血鬱滯以連翹飲十餘劑少退更以八珍加青皮香附桔梗貝母二十餘劑而消

皆乳

○婦人右乳內結三核年餘不消朝

寒暮熱飲食不甘此肝脾氣血虧損內服益氣養榮湯外以木香餅熨之年餘血氣復血消

○婦人乳內結核年餘哺熱少食余謂此血氣不足欲用益氣養榮湯彼反服行氣之劑潰出清膿而歿又一婦乳內結核如粟亦服前藥大如覆碗堅硬如石出血水而歿

附方藥

○神效瓜蒞散 治乳癰及一切癰疽初起腫痛即消膿成即潰膿出即愈

瓜蒞 爛研 生粉草 當歸 酒洗各
乳香 沒藥 各一 右用酒煎服良

又再服若用經血虛結核久而不消
佐以四物柴胡升麻白木茯苓甘草
若肝脾氣血弱佐以四君芍歸柴胡
升麻若憂鬱傷脾氣血虧損佐以歸
脾湯

○玉露散 治產後乳脈不行或身
體壯熱頭目昏痛大便澀滯等症

人參 白茯苓 桔梗 川芎
白芷 當歸 芍藥 甘草
右水煎服

○灸肩尖肘尖二穴圖 即肩髃肘膠
此穴治瘰癧之秘法蓋瘰癧屬肝膽
二經故患耳前後項腋之間男子多
因恚怒虧損肝經之血陰火內作或

不慎起居耗損腎水不能生肝血婦
女多因恚怒傷肝火動血燥或鬱結
傷脾火動血耗或患於胸乳間亦屬
於前經此症若因恚怒傷肝氣血壅
遏而不愈者宜灸此穴疎通經絡若
因久於鬱怒元氣虧損而不愈當推
其所屬而調補化源如取其穴當以
指甲指兩肘兩肩四所患處覺酸麻
方是其穴 男子治瘰癧見外科樞要婦
人見校註婦人良方小兒
見保嬰粹要

門人俞應竹


姪勉學

盧徹賢

吳大賓

義烏朱用中

黃補校正



太醫院校註婦人良方大全卷之十四終

元祿六癸酉歲

仲夏吉旦

攝陽書肆

伊丹屋太郎右衛門

藏板

蘇州

甲子星太潤年歲門

蘇州書報

中夏吉且

一云蘇六癸酉歲