



本草辨疑卷第三目錄

四十八種 附七種

一 菊

二 茵陳青蒿

三 益母草

四 青箱子

五 大小薊 續斷 苦荬

六 漏蘆

七 飛廉

八 馬蘭

九 地黃

十 熟地黃

十一 地黃膏

十二 牛膝

十三 麥門冬

十四 淡竹葉

十五 葶藶 折薺

十六 連翹

十七 青黛

十八 穀精草

十九 海金沙

二十 大黃

廿一 大戟

廿二 葶藶

本草辨疑卷第三目錄





- | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|-------|
| 卅七 懷香 時羅 | 卅五 巨勝子 | 卅三 葛蒲 | 卅一 木通 | 卅九 威靈仙 | 卅七 菝葜 | 卅五 何首烏 | 卅三 瓜樓仁 | 卅一 使君子 | 卅九 芫荽 | 卅七 半夏 | 卅五 附子 | 卅三 常山 |
| 卅八 薯蕷 | 卅六 神麩 | 卅四 百草 | 卅二 澤瀉 | 四十 防己 | 卅八 土茯苓 | 卅六 草薢 | 卅四 乾葛 | 卅二 牽牛子 | 三十 五味子 | 卅八 南星 由跋 | 卅六 烏頭 | 卅四 藜蘆 |

本草辨疑卷三

醫草部 製藥舖遠藤元理述

一 菊 本細十五卷之初

菊ニ數種アリ藥舖ニアル者野菊
 アリ能似タリ味苦シ不可用山中
 ヲリ出ル小テ味甘者真ナリ花ニ
 黄白アリ二種共ニ可用時珍氣
 味下曰本經言菊花味苦別錄言
 味甘諸家以味甘者爲菊苦者爲苦
 薏惟取甘者入藥謹按張華博物
 志言菊有兩種苗花如一惟味小
 異苦者不中食范至能譜序言惟
 甘菊一種可食仍入藥餌其餘黄
 白二花皆味苦雖不可餌皆可入
 藥其治頭風則白者尤良據此二



說則是菊類自有甘苦二種食品
須用甘菊入藥則諸菊皆可但不
得用野菊名苦蕒者余故景煥云
真菊延齡野菊泄入

此說因六只野菊之苦蕒一名
者三對ノ是ヲ甘菊ト名所用之
者八只黃白ヲ不擇山野家園ヲ
不分苦蕒ノ外ハ皆可用之 本
經菊花氣味苦平 白菊氣味
苦辛平 野菊氣味苦辛温甘
字ニ目ヲ不可著唯野菊有毒
真菊無毒故野菊ヲ賤シ真菊
ヲ甘菊ト云ヒ野菊ヲ苦蕒ト云也
時珍發明曰黃者入金水陰分白
者入金水陽分紅者行婦人血分
委本綱
發明

茵陳 十五之 青蒿 十五之

藥舖二種ノ差別ナク互ニ混雜
賈之又神麴ヲ合スニモ多ハ不分
別之漫ニ調合スル人多シ
釋名下藏器曰經冬不死更因舊
苗而生故名因陳 弘景曰似蓬
蒿而葉緊細 保昇曰葉似青蒿
而背白時珍曰山茵陳二月生苗其莖如艾
其葉如淡色青蒿而背白葉歧緊細而扁
整九月開細花黃色結實大如艾子

青蒿

時珍曰二月生苗莖粗如指而肥
軟莖葉色並深青其葉微似茵陳
而面背俱青七八月開細黃花頗
香實大如麻子中有細子

茵陳

細如絲 面青北月白

所在

青蒿

有鋸齒 面背共青

各

陳葉小苗類之繁茂之背微白
京賀茂ノ邊ニ多ク青蒿ハ胡蘿蔔
ニ類ノ小葉面背共ニ青ク繁茂ス京
東川原之下ニ多ク

三 益母草

十五之廿四

本綱附方返魂丹下忌鐵器 益
母膏之下以竹刀切勿用鐵力蒙
釜忌鐵器 脩治纂要忌銅鐵又
忌火

藥舖皆利刀ニテ磨切シ貯置ナリ
此物自來テ忌銅鐵陰乾ノ可収
貯也

四 青箱子

十五之三十七

入門曰青箱子黑色似菟實而扁
即野雞冠花子舊以子名草史明
者誤也 蒙筌曰按本經款內載云
子名草次明意謂功專治眼特假
別名以美之非真為次明子也若
以為然則原揭諸簡端何不直書
而但曰青箱子乎正猶沙參一名
知母龍眼一名益智名同而實異
也且別條所載次明子藥粒狀稍
大主治尤優世醫弗明或偏執一
不免得此失彼大辜藥味之能矣
幸而此曰草次明彼曰次明子兩
名雖一上下字差畧此分別不同
讀者不可不識 時珍云其子明

自與次明子同功故有草次明之名大觀本草云子名草次明

草次明ト云ハ青箱ノ子ニ只次明子ハ馬蹄次明ナルト諸說明ナリ然レ入門ニ獨誤レリト云ハ却テ入門誤リ也

眼科精微一方之中ニ青箱子與草次明子ニ味合ソアリ是入門ノ謬說ヲ承タル者歟又青箱ハ草次明去子字馬蹄ハ次明子去草字加草字馬蹄ハ字加子字又是ヲ誤テ草ノ字ヲ加テ馬蹄ヲ草次明子ト書ル歟方書之中不可不考

青箱ハ草次明馬蹄ハ次明子也馬蹄次明子者本綱十六之四十一葉ニ有石次明ハ又別ニ介音有

【五】大薊 小薊 十五之 四十三

藥舖ニ大小薊續斷苦苣ノ差別ナク一草ノ根ヲ貯テ偽賣也此アザミノ類五六種アリテ難分別○小薊 高尺餘多刺心中出花頭如紅藍花而青

頌曰紫色生平澤 葉高一尺大薊 苗根與石相似但肥大尔

續斷 時珍釋名下曰屬折接骨 皆以切名

蘇頌曰三月以後生苗幹四稜似苧麻葉兩兩相對而生四月開花紅白色似益母花根如大薊赤黃○時珍曰續斷之說不一桐君言

是蔓生葉似在李當之范汪並言
是虎薊大薊曰華子言是大薊一
名山牛房蘇恭蘇頌皆言葉似苧
麻根似大薊而名醫別錄復出大
小薊條頗難依據但自漢以來皆
以大薊為續斷相承久矣窮其實
則二薊所云似與桐君相符當以
為正今人所用以州中來色赤而
瘦折之有烟塵起者為良

和大薊根ヲ偽テ續斷トシテ充
賣一本朝ノ誤ニ非ス漢ヨリ承來
者也真ノ續斷ハ無之

蒙望曰三月緣生似苧麻葉苗幹
四稜類大薊根皮色黃赤資之入
藥取根於秋多有鹿良務擇精細
但認狀如雞脚者為上節節斷皮

黃皺者方真去向裏硬筋

大薊ノ類ニ非ス三月ニ苗生メカラ
ムレノ葉ノ如ク兩兩相對ス四月ニ
花サクク紅白色益母ノ花ニ似根ハ
大薊ノ如ク赤黃色時珍云如斯物
未見及

苦苣

保昇曰所在下隰地有
之莖圓無刺若猫薊五

月五日采苗

時珍曰苦苣大如拇指中空莖頭
有臺似薊造化指南曰苦苣大者
名苦藉葉如地黄味苦初生有白
毛入其抽莖有毛開白花甚繁結
細實其無花實者名地膽草汁苦
如膽也處處濕地有之入爐火家
用

本草別類三
是ハアザミノ刺ナキ者、山野多生

〔六〕漏蘆

十五之四十八

和ニ元ヨリ知人ナシ唐ヨリモ不渡
然ラ藥舖ニ遠志ノ中ニ舊根ノ如クテ
遠志ニ非ル擇捨ル者ヲ貯置テ偽
充ツ色薄黄ニ細キ者也不可
時珍曰屋之西北之黒處謂之漏
凡物黒色謂之盧此草秋後即
黒異於衆草故有漏蘆之稱蘆
茶曰俗名筴蒿葉莖似白蒿花黄
生莢長似細麻之莢大如筋許
四五辨七八月後皆黒異于衆草
蒿之類也常用其莖葉及子未見
用根 馬志曰苗高四五尺
餘皆如茶說 保昇曰下濕處最多

蘆頌同蘆茶時珍曰按沈存中華
談曰今方家所用乃飛廉也飛廉
一名漏蘆苗似苦苣根如牛蒡綿
頭者是也今閩中所謂漏蘆莖如
油麻高六七尺秋深枯黒如漆采
時用苗乃真漏蘆

薊ノ類枯々時ハ皆黒シ故ニ誤テ

飛廉ヲ漏蘆トスルカ

恭蘆馬志嘉謨時珍共莖筋如葉
白蒿似花黄色子ヲ結莢アリ
房ヲナス細麻ノ筴ニ似タリ莢四
五辨アリ未秋ニ莖葉盡ク黒ノ衆
草ニ異也

此草未見及藥家ノ物ハ偽也不
可用也

七 飛廉

十五之五十

時珍曰飛廉神禽之名也其形鹿身豹文雀頭蛇尾有角能致風氣此草附莖有皮如箭羽復療風邪故名弘景曰處處有之極似苦菜惟葉多刻缺葉下附莖輕有皮起似箭羽其花紫色

此草和間有之草花屋ニオニ六キト云アサミノ類ニ花葉皆アザミノコトシ刺多ク莖ノ四方羽有薊ニ數種アリ花ニ黄白此紫アリ春夏秋花サクアリ刺有無アリ其中大小薊飛廉ハ所ニ多シテ易見分其餘類草多シト云ヘトモ不明

八 馬蘭

十五之五十七

製劑記ニ豊ニル蘭ノコト、アリ是ニ依テ今藥家ニ燈心草ヲ用テ馬蘭ニ充ツ大ニ誤リ也不可末
蘇頌曰葉似薊而長厚三月開紫碧花五月結實作角子如麻大而赤色有稜根細長通黃色人取以爲劑三月開華五月採實

此說燈心草ニ非ス
時珍曰荒野中就地叢生一本ニ三十莖苗高三四尺葉中抽莖開花結實根可爲馬蘭

今草花屋ニハヒ「云者アリ根ヲ見ル馬蘭ニスキ者ニ非ス朝鮮ヨリ來ルハレンヲ見ル根甚強

少クニミテ不折モノ也故ニ馬刷貴之

馬棟ト云ヘキ者和ニ未見之唐ヨリモ不渡可採用者ナシ燈心草ヲ用ルコトナカシ此謬者製劑記ノ傳ナリ

九地黄 十六之初

山城大和ニ多ク作テ出之藥舖乾地黄ハ冬月掘採テ筵ニ包子サセテ春正月ノ末ニ取出共皆クニタレテ絲ノ引時土ヲ篩掛テ揉冷日ニ乾貯一如此スハ介目重ク尤ガ故ナリ性腐テ藥力甚惡是ノミニアラス或ハ外見ヲ能レ或ハ介兩ヲ増カ爲ニ藥カヲ損亡スル

モノ間コレアリ紫蘂ニ沙ヲ懷カセ茯苓ヲ切テ日ニ乾ス一ヲセヌツ色ヲ變スル類也採藥ノ者可惡也脩治纂要ニ黄色ニナルニテ能洗フトアレトモクサリ地黄ナル故ニ洗フ一百千スレトモ次第ニ黒ハナレトモ黄色ニナルコトナシ

自可貯之十二月新掘者太キヲ擇取テ水ニテ土沙ヲ洗去浮者ヲ捨沉者ヲ取テ陰乾シ風ノ吹通所ニ置ニ二月ノ比能乾テ折之見ハ中黄ニ微白シ洗ハ深黄色ニナル也彼藥舖ノ腐地黄一介ヲ洗テ製スハ半介ニナルナリ手ツカラ乾タル者一介ヲ製スハ其二一介ニアリテ藥

鋪ノ者ハ輕虚ニ手乾ノ者ハ重
實也唐ノ産アリ太ク重實ニ
所見宜トイヘモ元長モノヲ押
チメテ太クナレタル者ナリ皆
作り成ナリ故ニ水ニ浸ストキハ
自ラ延テ長ク細クナリキ
能不知優劣

十 熟地黄

藥舖ニ煤ヲ拌テ偽リナス最下也
今ハ人皆知之テ雖不末遠國ヘハ
於今渡之又酒ニテ煮タルモアリ或
酒ニテ一蒸ニ蒸或蒸至黒為度
モアリ或一日ニ九蒸ニ二日三日ニ
九蒸スル人モアリ皆法ニ背ケリ又
酒ニテ蒸人アリ水ニテ蒸人アリ

皆法ヲ不正ニナリ 蘓頌曰作

熟地黄法取肥地黄三二十斤淨
洗別以揀下瘦短者三二十斤搗
絞取汁投石器中浸漉令液乾上浸
三四過時以浸漉轉蒸訖又暴使汁
盡其地黄當光黑如漆味甘如飴
是不用酒 雷斅曰采生地黄去皮
私言非可也 釜鍋上柳木甑蒸之攤令
氣歇拌酒再蒸又出令乾

酒ニテ蒸ト不言

時珍曰以好酒入縮砂仁末在內
拌勻柳木甑於瓦鍋內蒸令氣透
眼乾再以砂仁酒拌蒸眼如此九
蒸九眼乃止

頌都テ不用酒雷公李氏ハ酒ニ
拌テト許云テ瓦鍋ニ酒ヲ入テ

ヲ不言又軒岐救正論ニ今ノ人
酒ニテ蒸フヲ非ナリトス酒ニ拌
セテ只水ニテ蒸ヘシト云

九蒸九眼ト數ヲ九ニ限テ本草ニ
モ不説之醫生ニ問之モ不明暫
以愚意考之地黄性極陰ノ者ニ
泥テ不走故ニ酒ノ陽氣ヲ假ニ蒸
升之氣亦陽也九亦老陽之數ナリ
如此諸陽ノ氣ヲ持セテ經絡ニ走テ
補シメシカ爲ナリ生ハ寒テ熟スレハ
微温トナル者也然レ九蒸モ九眼モ
皆法アリト云トモ今蒸用ル人ヲ
見シ眼ヲヲ畧ノ蒸フヲ九ニ是酒
氣眼氣共ニ不足ニ陽ヲ不受又眼
コトヲ蒸ノ蒸計ヲ九ニスル時ハ只一
蒸ト同ト也

如法製セト欲ハ酒ニ一夜能拌セ翌日
三時蒸テ取出日乾ノカラリトシタ
ル時又酒ニ拌セ翌日三時蒸ノ眼ニ
乾ス如此九蒸九眼ノ可用也此法
如ク蒸トキハ先蒸ニ一日眼ニ三日ヲ
三十六日ヲ熟成ス其中雨夫ニ日ヲ
増ヘシ是夏日ノコトナリ冬月ニ五六
十日ニ成ル瓦鍋ニ只水ヲ八テ蒸
ヘシ酒ニテ蒸フナカシ

十二地黄膏

今ノ人生地黄ヲ搗絞リテ其汁ヲ
煮堅メテ用之故ニ底皆ユケ付テ
燒地黄トナル也惡シ不可用

地黄煎法本綱云生地黄不拘多
少三搗三壓取汁令盡以瓦器盛

之密盖勿洩氣湯上煮減手絞去
滓再煎如飴

如此湯煎ニスルトキハユゲツカスト
云トモ其成ル一遲キユニ皆直ニ
煮テ藥カヲ損亡スルナリ

十三 牛膝 一六之十

唐アリ和アリ唐ハ太ク長二三尺
許アリテ極モナシ味先甜ノ後ニ
微苦シ和ハ先苦ノ後微甘シ和ハ
燥テ唐ハ潤實ナリ滋補ニ必唐
ヲ可用

震亨曰春夏用葉秋冬用根
惟葉汁効尤速今ノ人不知用
葉皆根ヲ用

十三 麥門冬 一六之十六

和草ニ種アリ大葉小葉ナリ
藥舖ノ者ハ皆小葉ヲ大葉ヲ用
ルコト人不知之根大テ味モ甚甘
藏器曰其苗大者如鹿葱和ノ大葉
小者如韭葉和ノ小葉木小有三四
種功用相似

白實ナルヲ上トシ赤ク皺アリ或
黒輕虚ナルハ下ナリ四國ヨリ
出大葉ノ物所在甚多

十四 淡竹葉 一六之二十一

時珍曰春生苗高數寸細莖綠葉
如竹米落地所生細竹之莖葉其
根一窠數十鬚鬚上結子與麥門

冬二様但堅硬尔八九月抽莖結
小長穗

是ヲ脩治纂要ニ黄精ナリト云

誤リナリ

鴨跖草ヲモ又ハチクノ葉ヲモ淡
竹葉ト云フ一名三種也

下五葶藶 十六之五十一

和ニ齊ノ子ヲ賣

脩治纂要ニ云藥肆ニ賣ハ似セ多

正真ハ少シ苦ニ甜葶藶ノ二種

アリ甜葶藶ハ即ナツナ也苦葶藶ハ似

タトモ別ナリ一説ニオトコナツナ

ト云者ナリ黄ナル花サクト

藥舖ニ似セ不多只ナツナ也

政和本草曰禹錫等謹按蜀本云

苗似薺花春來生高三二尺花黃

角生子黃細五月熟採子暴乾

圖經云初春生苗葉高六七寸似

薺根白色枝莖俱青三月開花

微黃結角子扁小如黍粒微長黃

色立夏後採實 一説葶藶置莖

向上葉端出角粗且短又一種狗

芥草葉近根下作竒生角細長取

時必須分別此二種也 時珍曰

按爾雅云薺葶藶也郭璞註曰實

葉皆似芥一名狗薺然則狗芥即

是葶藶也蓋葶藶有甜苦二種狗

芥味微甘即甜葶藶也或云甜葶
藶是芥薺子攷其功用亦似不
然 今藥舖ノ者此類ニ非タ
ナツナリ

政和本草 薺 陶隱居云薺類甚多此是今人可食者葉作莖羹亦佳 禹錫按藥性論云薺子味甘平 陳士良云實亦呼薺實子時珍曰薺有大小數種小薺葉花莖扁味美其最細小者名沙薺也是薺用大薺科葉皆大而味不及其莖硬有毛者名薺實味不甚佳并以冬至後生苗二三月起莖五六寸闊細白花整々如一結莢如小萍而三角莢內細子如薺子其子名差四月收之薺實薺莖皆是薺類

薺實

證類云陶隱居云是大薺子

錫云似薺菜而細唐本註云介雅云是大薺然驗其味甘而不辛也藏器云本經薺實一名大薺薺蘘氏引爾雅為註按大薺即薺莖非薺實也薺實大而扁薺莖細而圓二物殊也 蘇頌曰爾雅薺莖謂之薺子葉皆似薺一名狗薺薺實即不薺大抵二物皆薺類故人多不能細分別乃介致疑也時珍曰薺與薺實一物也但分大小二種耳小者為薺大者為薺實薺實有毛故其子功用相同而陳士良之本草亦謂薺實一名薺實也薺莖與薺實同類但薺實味甘花白薺莖味苦花黃為異耳

或言薺實即甜薺莖亦通時珍

下或云胡苧藤是折葉子故其功用亦似不然今此通云者及諸也

苧藤葉似苧苗高六七寸花黃子角子扁小如黍粒微長黃也

根白色味至苦苦苧藤也

薺葉花莖花細白子莢三角子如苧藤子

莖無毛味美和誤為苧藤

折葉似苧大花白子似花大扁莖有毛味甘甜不入藥

花黃味至苦物未驗之今用ルモノハ皆花白味ナキ薺

實ナリ俗ニスメノキニチマクトイフモノナリ

薺莖作挑燈杖可辟蚊蠅

十六 連翹十六之六十五

藥舖ノ者ハ唐ナリ今日本所々多シ京洛近邊ニモ花園ニ植之花多實少信州木ノ邊ニ花實トモニ多シト云人アリ和ラ尋通用シタキモノナリ

十七 青黛十六之七十四

唐和ニ種アリ和ハアヒラウト云唐ハ青黛トイフ藥ニ唐ヲ用ヒ畫具ニ和ラ用服藥ニ和ラ可用馬志曰深澱甕上沫紫碧色者用之與青黛同功時珍曰波斯青黛亦是外國藍靛花既不可得則中國靛花亦可用或不得

斯青黛亦是外國藍靛花既不可得則中國靛花亦可用或不得

已用青布浸汁代之貨者復以乾
礮充之然有

石灰入服餌藥中當謹之

今所渡之青黛黑土沙甚多

石灰モアルヒ和ノアヒラウヲ可

用歟唐之色深ク和之色淺ク唯和

ハ畫具ニ許用者ト知テ藥ニ用

ルコトヲ不知

十八 穀精草 十六之九十

蕪頌曰生於穀田中二三月採花

用花自小圓似星私云不生穀田時珍

曰收穀後荒田中生之私云不生

科叢生葉似嫩穀秋細莖高四五寸

莖頭有小白花點々如亂星九月

採花云二三月採花者誤也

日本ニモ所々ニアリ關東道中

吉田與二川間又池鯉鮒與岡崎

ノ間ニアリ荒田ニ不生山ヨリ澗

水滴リ傳フ少シクボニ生ス常ニ

水アル所ニアラス只水氣アル山ノ

スソニ八月ニ花サク時珍カ説ノ如

所ノ者和名スモトリ花ナト云フ

十九 海金沙 十六之九十一

唐アリ和アリ偽アリ

真ハヒ子リテ驗ニサラクトシテ

手指ニツカス偽ハ土ヲ捻ル如クソ

手指ヨゴルナリ

時珍曰莖細如線引于竹上高尺

許其葉細如園荈葉而其薄背而

皆青上多皺文皺處有沙子狀如

蒲黃粉黃赤色不開花細根堅強

和草此說ノ如シ

○毒草類

三十一 大黃 十七之初

二種アリ共ニ唐ナリソギ大黃ト云ハ筋違ニソギテ乾タル者也堅實ニ潤アリテ佳ナリ 一種ツチギ大黃ト云繩ニテツチギ通連珠ノコトクテ乾タル者也輕虚ニシテ潤ナレ最下也不可

和ニテ作ル者アリ莖葉根色本綱ニ合根唐ト一様香氣最良壯人ニ用テ可然藥性強故也外貼膏藥ニ合スニモ可ナラシ虚弱ノ人ニ唐ソギ大黃ヲ可用

今正ニ是ヲ用本草ニ葉ヲ蜀漆ト名クトアリコクサキノ葉ヲチキレハ漆出ルナリ

爰ニ云小クサキト云者一種別ニアルモノニアラスクサキノ木ヲ柴人截テ其跡ニ嫩苗出ルヲ又草刈コレヲ芟取テ嫩苗ヒ

タト出ル者草ノヤウニ見ユレ其本ハ木ナリ殊ニ本綱ニ其葉臭シト云文モナレ俗治ニ有誤ヲ承テ小クサキヲ以テ説ヲ立ル 又或説ニアチサイノコト也

ト云フアチサイ又草類ニアラス弘景曰細實黃者呼爲雞骨常山用之最勝

今唐來ノ物此説ニ合ス

蕪恭曰莖圓有節高者不過三四尺葉似茗而狹長兩兩相當二月生白花青萼五月結實青圓三子為房其草暴燥色青白堪用花ニ青萼アリト云ニ見アヤマリタルカ

其葉臭シト云文モ棟ノ葉ニ似タリト云文モナシ何ニヨリテ如斯古ヨリ誤リ來ルヤ

蒙竈云擇如雞骨入藥方靈

今所渡ノ物此說ノ如ク又弘景カ註ニ能合ノ色黄ニ雞骨ノ如クナル者也唐ヲ可用

井四 物 蕪 蘆 十七之四十一

和ニ古ヨリオモトク根ヲ用ユ本オモトニアラス 保昇曰葉似鬱金

秦九菴荷等根如龍膽莖下多毛

夏生冬凋オモトハ四時トモニ不死 蕪頌曰三月

生苗葉似初出櫻心又似車前莖

似葱白青紫色高五六寸上有黑

皮裹莖似櫻皮有花肉紅色根似

馬腸根長四五寸許黄白色二三

月採根又一種水蕪蘆莖葉大同

只是生在近水溪澗石上根鬚百

餘莖不入藥今用者名葱白蕪蘆

根鬚甚少只是三二十莖生高山

者為佳

冬凋テ春生ストアハオモトハ四

時共ニアリ又黒皮アリテ莖ヲ

包コトモナシオモト大ニ非ナリ

主能ヲ少考之ニ本朝ノオモトラ

用ルニ專ラ蟲腹痛ニ主トス本網ノ

藜蘆盧ハ風痰ヲ吐スルノ功最タリ
然ル名ハ藜蘆蘆ヲ用ル所ハ非藜
蘆一名二種ノ物ノ類也和書ノ
和方ニ入ルハニハオモトヲ用ヘシ若
改之テ真ノ藜蘆ヲ用ハ必人ヲ
吐セシメン唐書ニ出タル方中ニ本細
ノ真藜蘆ヲ可用オモトハ不可用
如斯考トキハオモト不可捨不知之
人ハオモトヲ非ナリトノ一向ニコシ
ヲ捨ツ又コレ誤ナリ

附子

十七之四十四

重サ十々已上アル皺ナククサリ
ナキヲ用ヘシ 時珍曰初種爲烏
頭象鳥之頭也附烏頭而生者爲
附子如子附母也烏頭如芋魁附

子如芋子蓋一物也別有草烏頭白
附子故俗呼此爲黑附子川烏頭
以別之諸家不分烏頭有川草兩
種皆混雜註解今正之
宋人楊夫惠著附子記甚悉今撮
其要讀之可不辨而明矣其說云
十一月播種春月生苗其莖類野
艾而澤其葉類地麻而厚其華紫
辨黃莖長苞而圓七月採者謂之
旱水拳縮而小蓋未長成也九月
采者乃佳其品凡七本同而未異
其初種之小者爲烏頭附烏頭而
旁生者爲附子又左右附而偶生
者爲鬲子即烏附而長者爲天雄
附而尖者爲天錐即天雄附而上
出者爲側子附而散生者爲漏藍

子皆脉絡連貫如子附母而附子以貴故專附名種一而子六七以上則皆小種一而子二三則稍大種一而子特生則特大

延喜式貢藥目錄三所々ニアリ今採一失ノ人不知之惜哉

廿六 烏頭

十七之下之五

釋名烏喙

本經既

草烏頭

土附子 時珍曰此即烏頭之野生于他處者俗爲之草烏頭日華子所謂土附子者是也烏喙者即偶生兩岐者今俗呼爲兩頭尖因形而名其實乃一物也附子天雄之偶生兩岐者亦謂烏喙功亦同天雄非此烏頭也

集解時珍曰處々有之根苗華實並與川烏頭相同但此係野生又無釀造之法其根外黑內白皺而枯燥爲異尔然毒則甚焉後魏書言遼東塞外秋收烏頭爲毒藥射禽獸毒ノ矢ト云者是也故射罔ト云汁ニ煎シタル者也其汁ヲ矢ニスルナリ和ノトリカフト、云中也有所多アリ藥舖ニ烏頭ト云フ書ニハ草烏頭ト云フ

廿七 半夏

十七下之二十

藥舖ニ麴半夏ヲ製スルニ粒半夏ニテ賣レサル小粒ヲ擇出シテ聚テ湯ニ浸搗碎キ團子トナス甚惡シ泡スル一モ姜製スルコトモ略セリ

此物本毒草ナル故ニ湯ニテ泡スル
コト七日ノ姜汁ヲ半夏ノ四分入テ
搗キ合セ團子ニテ子サセ麴ニナリテ
華ノ付ル時取出シ用ユ凡ル麴ニ子セ
ル者多シ主能各別ニナル故ニヤ米
一種ニテ云ハ飯粥酒醋麴皆味モ
主能モ遙ニ異ナリ此物麴ニスルモ
姜制衣シ湯ニ泡スルモ毒草ナル故ニ
其毒ヲ和ケン爲也然ルツ不曉ク之漫ニ
製ス之又藥舖ノ物ヲ求テ病家ノ
虛實ヲイハズ都テコレヲ用ニハ鹿
エトリ自製ラノ可用也自製スルニハ
又半夏ニ擇アリ大粒ニ色白皮
ナキヲ可用其小粒ニ皮アリ或ハ
色黒ク赤ハ不可用又雜リ物アリ
能ク可擇用

廿八 南星

十七之下之十三
由跋 附 十八

和ニ二草アリ大草ハ莖班ニ高ニ
尺許葉大三莖直ニ上ル花一莖上
リテ半夏ノ華ノ如ク子ヲ包ツタル
者也小草ハ莖青高ニ尺許一所
五六莖生ス葉ニツクタニ能ク半夏
ニ似テ大也根葉莖花子皆大草
ニ似テ小也但葉三勝ト莖ノ不班
トヲ異ナリトス皆陰所ニ生ス
時珍曰大者爲虎掌南星小者爲
由跋乃一種也

由跋

時珍曰此即天南星之小者其氣
未足不堪服食故醫方罕用惟重

八九錢至一二兩餘者氣足乃佳

小草ヲ由跋ト云大草ヲ南星

ト云本ハ一物也和ニ大小混レテ

采出ス只大ナル者ヲ可用也

本綱諸註ニ莖班ナルヲ蒟蒻トナス

故ニ南星蒟蒻多ハ誤リ直ニ草ヲ

見ル時ハ蒟蒻與南星半夏與申

跋各異ニ根モ皆別也

廿九 芫花

十七下之四十二

唐和二種アリ和ハホウコ草ノ花

ヲ賣大ニ誤リ也本草ニ佛耳草

ト云別ノ物ナリ唐ヲ可用

圖經曰宿根舊枝莖紫長二尺根

入土深三五寸白色似榆根春生

苗葉小而尖似楊柳枝葉二月開

紫花頗似紫荊而作穗又似藤花

而細其花須未成藥帶細小未生

葉時收之葉生花落即不堪用

時珍曰顧野王玉篇曰柁木或枕

煎汁藏果及卵不壞

和ノ佛耳草ト別也

三十 五味子

十八之四

弘景曰高麗產多肉而酸甜次出

青州冀州味過酸其核並似猪腎又

有建平者少肉核形不相似味苦

亦良時珍曰有南北之分南產

者色紅北產者色黑入滋補藥必

用北產者乃良蘇恭曰皮肉甘酸

核中辛苦都有鹹味此則五味具也

今滋補ニ唐ヲ用ル人アリ今所

渡ノ物産ノ南北分千カタニ是等
ハ日本ニテ南北ノ産味ヲ驗ミテ
可用者也

卅一 使君子 十八之十四

仁ヲ用トイヘトモ今所渡ノ者仁ア
ル甚希也故ニ皆殼ヲ用
原始曰按經味甘即是用肉然肉
少難得今醫家或兼用
皮肉白味甘

卅三 牽牛子 十八之二十四

頭末ト云フ説々アリテ難分別
時珍曰只碾取頭末去皮麩
雷公曰春去黑皮 回春曰研爛
取頭末 衍義微炒擣取其中粉

本綱附方一切積氣黑牽牛頭脩治
纂要一番篩許ヲ用是ヲ頭末上云
又搗碎キ粉トアラキヲ捨テ中ヲ
用

私ニ考ニ時珍カ法ヲ佳トスヘシ唯
肉ノ粉許ヲ用テ皮麩ヲ可キ不
入カ爲ナリ

脩治ニ粉ト麩トヲ去テ其中ヲ取
ト云ハ衍義其中粉ヲ取ト云ニ因リ
テカ衍義ノ其中粉ト云中ノ字ハ
初中後ノ中ニアラス外中ノ中也
附方ノ頭爲末ト云ハ牽牛ヲニツニ
切テ尾ヲ去テ頭ヲ用ルヤウニ聞ユレ
トモ只ハシメノ末ノコトナルヘシ一番篩
ト云能了簡也二番ト篩ハ皮麩
粉ニナル故ナリ

奇効醫述牽牛大黃丸ニ黑牽牛
四兩半炒半生共磨取頭末一兩
二錢

四兩之内頭末一兩二錢取テ殘
二兩八錢ヲ捨ルトキハ一番篩ノ
説ニ能合ス然レ一介百六十目製
シテ四十八錢取用テ餘ハ可捨也
刻テ煎劑ニ用ルヲ不見皆未

卅三 瓜樓仁 十八之三十四

藥舖ニ三種アリ玉章ノ瓜樓ヌ
瓜樓棟ノ核ノ瓜樓ト云時珍曰根
直下年久者長數尺其實圓長青
時如瓜黃時如熟柿内有扁子大
如絲瓜子殼色褐仁色綠多脂作
青氣炒搗爛水熬取油可點燈

合スト云

玉瓜

宗奭曰玉瓜其殼徑寸長二寸許
上微圓下尖長七月八月熟紅赤
色殼中子如螳螂頭者是今玉章
ニ似タリ

又メト云ハ扁テ文ナシ柿ノ核ト
イフハメクリニ縁アリテ柿ノ
核ニ似タリ此ニ種瓜樓雌雄
ナルヘシ玉章ハ瓜樓ニアラス王
瓜ナリ不可用

卅四 乾葛 十八之四十二

藥舖ニ種乾葛ト云物アリ其本
ヲ尋六葛莖ナリ此誤リハ或書ニ

乾葛ト書タル所アリ故ニ字ノ如ク
書テ藥肆ニ求ル人アリ藥家亦
不知シテ葛ノ莖ヲ貯置テ充之
世ニ亦不知改メ藥舖任テ用之
生葛根ニ對シ乾葛根ト云フヲ
根ヲ畧ノ書タル者也莖ハ本草
葛蔓ト云フ

原始云葛根世亦呼乾葛ト

卅五 何首烏 十八之五十三

唐和ニ種アリ和ハ蔓モ葉モ零
餘子モ皆山藥似タリ根圓ク扁
ニシテ袋ニ物ヲ入テ口ヲ括タルカ
如シモノ多者也不可用誤リ也
唐ハ瓜ニ似テ長ク筋五ツアリ連
珠ノ如クイクラモツキテ生是真也

唐ヲ可用 蘇頌云春生苗蔓延
於木墻壁間莖紫色葉々相對如
薯蕷而不光澤夏秋開黃白花如
葛勒花結子有稜似蕎麥而雜小
纒如粟大秋冬取根大者如拳各
有大稜辨似小甜瓜有赤白二種
赤者雄白者雌

今所渡ノ者此説不差唐ヲ可
用和ハ葉ノ説纒ニ似テ餘ハ皆不
合大誤リ也不可今和草人皆
雖貴之改ル人ナレ可歎哉

卅六 草薺 十八之下一

和ニトコロノ根ヲ採テ充ツ草蔓
ニシテ莖モ葉モ皆山藥似タリ
和ノ何首烏山藥トコロニ草共ニ

能似テ難見分但何首烏ハ葉大
ニ山藥ハ中トコロ只葉小ナルヲ異
蕪恭曰此有二種莖有刺者根
白實無刺者根虛軟軟者爲勝和草ニ似テ
似リ蔓生葉似蒼蒼和草ニ似テ
説不蕪頌曰作蔓生苗葉俱青
葉作三支似山薯又似綠豆葉
花有黃紅白數種亦有無花結白子
者根黃白色多節三指許大此説
不今成德軍所產者根亦如山薯
體硬其苗引蔓葉似蒼麥子三稜
時珍曰蔓生葉似菘菜而大如盆
其根長硬大者如商陸而堅今人
皆以土茯苓爲蕪誤矣
諸説皆和ノ物似根ノ形モ異
也真ナル者ノ唐ヲ不見明者ノ

辨ヲ俛

卅七 菘菜

十八之下之三

和山歸來ト云者也葉圓ク莖刺
アリ圓子アリ和名サルガキイハラ
ト云者也 時珍曰山野中
甚多其莖似蔓而堅強植生有
刺其葉團大狀如馬蹄光澤似栲
葉秋開黃花結紅子其根甚硬有
硬鬚如刺野人采其根葉入漆家用

卅八 土茯苓

十八之下之四

和ナレ唐ニ上中下品々アリ白柔
ニシテ大輕虛ナルヲ上トス色赤ク
重ト下也又赤クノ堅ク實シタル甚
重キアリ最下也又赤ク輕クウカ

ウカトシテ判カタキ者アリ又最
下也阿媽菴ヨリ來ル白柔ニ輕
虛ナル最上ナリ一種タカサコ山歸
來ト云者ヲ渡ス甚索白ナル者也
真偽未知 時珍曰蔓生如尊
莖有細點其葉不對狀頗類大竹
葉而質厚滑如瑞香葉而長五六
寸其根狀如菘蕒而圓其大若雞
鴨子連綴而生遠者離尺許近或
數寸其肉軟可生啖有赤白二種
入藥白者良

色赤ニ重ト輕トアリ重ク堅キハ
疑ク菘蕒ヲ混メ渡スナラン別
種物ニ見ユ

製忌鉄忌茶也今藥舖削去皮皆
利カラ以ス誤リ也 脩治纂要曰

頌曰不拘時月采根利刀切行曝
乾用見本草細目是草不忌鐵之證也

此註難心得草辭不忌鐵之文ヲ
引テ土茯苓ノ證又トス可笑

土茯苓附方瘰癧潰爛下鐵聖發
物ヲ忌回春茯苓湯忌之トアル

ウヘハ忌之證明白ナリ脩治纂要
誤トスヘシ

證類家苓菘蕒草辭ヲ載テ
土茯苓ヲ不載其文又土茯苓多

言テ菘蕒並草辭ノ言ニ非ケ多シ
續醫說草辭下曰凡有二種無刺

虛軟為勝有刺自實次之一名仙
遺糧一名土茯苓一名冷飯團實

ト云者今タカ
サトクモノカ
此說モ皆山歸來ノ云分也古ハ

土茯苓一名一種不出時珍至
一三物具ニコレヲ註セリ

時珍曰昔人不知用之近時必治
正德間因楊梅瘡盛行率用輕粉
藥取効毒留筋骨潰爛終身至人
用此遂為要藥諸醫無從考證往
往指為葶藶及菝葜然其根苗迥
然不同宜參考之但其功用亦頗相
近蓋亦葶藶菝葜之類也

卅九威靈仙 十八下之十六

唐和之二種アリ和名フナハラト
云多識編ニ威靈仙俗ニ云布那波
羅一誤レリ
フナハラハ葉柳ニ似テ根細辛似
タル者ナリ

徐長卿 十三之五十六

蘇恭曰川澤有之葉似柳兩葉相
當有光澤根如細辛微粗長黃色
而有臊氣今俗以代鬼督郵非也
日本誤代保昇曰似小桑兩葉相
對三月苗青七八月著子似蘿摩
子而小九月苗黃十月凋
今ノフナハラ皆此說

時珍曰威靈仙根每年旁引年深
轉茂一根叢鬚數百條長者二尺
許初時黃黑色乾則深黑倍稱鉄
脚威靈仙以此別有數種根鬚一
樣但色或黃或白皆不可用

唐ヨリ渡者此說如色黑長數
百條ヲ一窠ト真也和色黑カ

偽ナリ唐ヲ可用

四十防已ハタイ 十八之二十三

和アリ唐アリ唐ハ香氣甚

脩治纂要ニ莖ヲ木防已ト云根ヲ

漢防已ト云 蘇頌曰漢中出者

破之文作車輻解黃實而香莖梗

甚嫩苗葉小類牽牛折其莖一頭

吹之氣從中貫如木通然也是漢防已也今所獲

者與此他所者青白虛軟又有腥

氣皮皺上有丁足子名木防已不

任用

此說ハ根莖ヲ以テ木漢ヲ不分

只其所産依テ名ク

陶隱居曰大而青白色虛軟者好

黯黑木強者不佳唐本草註曰本

出漢中者作車輻解黃實而香甚

青白虛軟者名木防已都不任用

陶氏謂之佳者蓋未見漢中然此

與頌蒙筌云漢防已是根破之紋

作車輻解黃實馨香今所獲者木防

已此說同是苗皮皺上有丁足字青白虛

軟宗此辨認庶不差訛並刮淨麁

皮枕音木漢者主水氣名載君行枕音木

者理風邪職僉使列此木漢說

頌云木防已雖今不入藥而古方

亦通用之 張仲景治傷寒有增

減木防已湯及防已地黄五物防

已黃芪六物等湯 深師療膈間

支滿用木防已湯孫思邈療遺溺

小溲澁亦用三物木防已湯

藏書曰如陶所註木漢防已即是

根苗爲名漢主水氣木主風氣
雷公曰凡使勿用木條色黃腥皮
皺上有丁足子不堪用惟要心有
花文黃色者

蘇頌 唐本草 雷公

仲景 孫思邈 陳藏器 蒙筌

漢木
雙用

私考漢木根苗ヲ以各主能
ヲ以ニツナカラ用ク説可然其
餘ノ説ハコレ誤ナラシカ請正

水氣漢防已ヲ可用

今所渡ノ者車輻解アリテ香氣
甚ヨシ是漢防已真ナルヘシ風氣ハ
本防已可用 和ニ采モノヲ可
用カ

冊二木通 十八下之十五

和アリ唐アリ折テ聞之ヲ香
氣甚佳ナリ和ハ不然土地ノ肥
瘦ニ依ル徐氏明德ハ唐三驗アリ
和ハ主能薄シトイヘリ

冊三澤瀉 十九之初

和アリ和ニ二種アリ越後ヨリ出
ハ輕虚ナリ唐ト形ハ異ナシトモ輕
虚一同也近年丹波ヨリ多ク作り
テ出之色白堅實テ所見ヨシ
蘇頌曰春生苗多在淺水中似牛
舌獨莖而長秋開白花作叢似葍精
草秋後采根暴乾
和ノ産越後ノ輕虚ト丹波ノ堅實ト

何カ佳ナリトセシ愚考ルニ主能ヲ以テコレヲ云ハ、是能水滲ノ藥也丹波ノ者堅實テ濕ヲ引ヘキ形ニアルスモ茯苓濕ヲ滲ス堅實ヲ下トシ輕虚ヲ上トスルトキハ此堅實モ不可ナルヘシ越後ノ輕虚能唐ニ似タリ濕ヲ滲スヘキ形也根ノ形越後丹波唐三物各別ナリ其中越後ハ唐ニ近シ丹波ハ遙ニ異也然トモ丹波ハ皮ヲ去リ易ク色潔白ヲ所見ヨキ故ニ主能形狀ノ考ガヘナク專ラ丹波ヲ貴シテ越後ヲ賤ニス今ハ越後ヲ不用ユヘニ藥舖ニ小貯之惜哉用レ人審之

卅三 首蒲 十九之八

藥舖ニ首蒲根石首蒲根ノ二種アリ本草ニ首蒲白首ノ二種有方書ニ首蒲根トアハ都テ石首ノコトナリ是一寸九節ノ者也然ラ方書ノマ、ニ首蒲根ト書シテ藥家ニ求ルトキハ皆白首ヲ賣ナリ誤也石ノ字ヲ付テ可

卅四 百草 二十一之十一

世ニ百草ノ註文ト云者アリ是ヲ見ル或ハ下藥草ノ異名和名本名ヲ出ノ一種ヲ二三種ニ舉タル者アリ難信用

藏器曰五月五日采一百種草陰乾燒灰和石灰爲團煨又燒灰

和井花水作團煨白以醃醋也為餅

本草云定リタル者ナリノ只何ノ草ニテモ百種ト云也又百草霜ト云ハ別也

卅五巨勝子 二十二之初

唐アリリ色不黒カラ時珍曰以荒蔚子偽爲巨勝以黃麻子及木藜子偽爲胡麻誤而又誤矣荒蔚子長一分許有三稜黃麻子黒如細非子味苦太藜子狀如壁蝨及酸東棗仁味辛甘無脂油不可不辨今所渡ノ者色不黒味モ胡麻ニアラス荒蔚子ニ近キモノナリ不可用ニ只和ノ黒胡麻ノ重サノ脂多キ者ヲ可用

一種色赤ノ大ニ重キ者アリ入門ニ赤キヲ巨勝ト云者是ナルヘシ巨勝ノ字ニ協ヘリ和ノ黒キ者油アリトイヘトモ甚薄ノ輕シ明者正之

卅六神麩 二十五之十九

俗治纂要ニ三法ヲ擧皆難信用コキノコ小麥粉百斤 野藜 蒼耳 青蒿各中各中トハ何ニ對シ水足仁一各云哉心得カタシ 赤小豆中小麥百斤中へ杏仁一各入テハ如何 此法會テ無筭也不足論 又小麥粉五百二十三各本方百斤十六貫目 積ト見ニ青蒿蒼耳小豆杏仁各一合ツ、合テ少シルメニコ子タルガヨシ或ハ云一合トハ唐ノ升ノ了也

是又唐ノ升
ツモリモナシ

此法ハ秤モ升モ不考也
本方ノ三十分一ヲ書名許

ナリ

又白麴百六十日本細二百斤上
アリ唐目ニハ十六貫目也今
用ハ其百分一ナリ餘藥ヲ準之
赤小豆三々七分 是ハ三升ト有
唐ノ藥升ノ積リ一介ト云八百二
十四々水ノ入升ナリ然ハ三升ハ
三百七十二々ナリ其百分一ナル
故ニ三々七分八也 杏仁泥三
々七分是モ右ニ同 此積不勘ヨリ
出タル所ナリ豆
杏ノ升量ト水ノ升量トハ甚ク輕重アル
者ナリ水ハ諸方一水ナレトモ土地ニ依テ
不同ナリ又小豆ハ重ク杏仁ハ輕ク而モ其
共ニ細末スルトキハ却テ小豆ハ輕ク杏仁ハ重ク
今日本ノ一升ニ水五百目入ナリ此升ニ
テ水一升ヲ秤ニカクハ三百七八十目アリ

如此ノ違目ヲ何積リモナク水百二十四
ガ一升ナリトテ其量ニ任テ水ヨリ輕キ
杏豆ヲ三々七分用テ大ニ誤リナリ但シ百
二十四々入升ヲ作リテ其升ニテ杏豆ヲ量
ハ相違ナキナリ 三自然汗各三升トア
レトモ右ノ末ヲコヌルニツレホト

不入ナリ 大ナル誤ナリ右皆百分一
ツモリナラハ此自然汁モ
百分一ノ三々七分ツレ入ヨト
イフヘキヲ其ミ、三升トイフ

右三法トモニ大誤也不可用

水ヲ計テ百二十四々入升トハ
全九集ニ周升ノ積リアリ開
元錢百二十四文ノ重則周ノ一
升トアリ是周ノ升ニアラス
大明鐵斛ノ五合升ナリ全九
集ノ積リ何レノ書ニ出ルソ不知
周ノ升ハ黃帝初テ十二律ノ中
ノ黃鐘ノ管ヲ以テ度量衡ヲ
過木及ナキヤウニ均ク定メ給

テ升ハ嘉量ヲ銅ニテ作り給
厥黄帝ノ所定ノ一升ヲ周ニ
漢ニ用之嘉量ハ黄帝ノ八斗
周ノ六斗四升漢ノ十斗入テ
大小アレトモ一升ト云ハ三共ニ
カラス右ノ一升百六十目ト至
今秤ト相違アルナリ右ハ黃
鐘ノ管ニ黍ヲ滿テ一龠ヲ半
兩トシ唐ヨリ以來ハ開元錢一文
ヲ一匁トシ秤ヲ作り十錢ノ
徑リ一尺ト定ム今大明日本
秤共ニ開元錢ノ積リナリ此秤
ニテ古ノ黍積リノ十匁ヲカケ
テ見レ六匁アリ然レ古ノ一升
百六十目ハ今極ノ秤ニ九十六匁ニ
當ルナリ此度量衡ヲ不考ハ神

麴脩合モナラサルナリ度量衡
ノ勘合古來未詳故ニ脩合一次
セズ予考之度量權衡ト号
一ノ書ヲ著述ス考之トキハ
神麴脩合ノ積リモ自ラ明ケシ
水雲録云五月五日六月六日或
三伏日用白麴百斤青蒿自然汁
三升赤小豆末杏仁泥各三升蒼
耳自然汁野蓼自然汁各三升用
汁和麴豆杏仁作餅麻葉或楮葉
包罨如造將黃法待黃衣晒收之
度量衡ノ法ヲ不知トモ自ラ能
積アリ

- 野蓼 青蒿 蒼耳 杏仁
- 赤小豆 各粉

右五種ヲ同器ニ一盃ツ、計テ一

所トレ其中へ麩ノ粉ヲ入次第
ニ能比ノ團字ニシルクモカタクモ
ナキ程ニスルナリ此積リ最良

外ニ百介ノ秤ノ考へ三分ノ升
積リアトモコニ不記

神麩ニ神ノ字ヲ付ルハ白麩配虎

青蒿青龍赤小豆朱雀杏仁玄武

蒼耳勾陳野蓼騰蛇此六神ニ配ソ

諸神集會日五月五日脩合ス故ニ神

名アリ

今藥舖ニ脩合スル者日ヲ不擇

不備六神白虎一神ヲ水ニテ

コ子テ麩ニモ子サセス神菊ト心得

テ菊ノ紋ヲ押テ漫ニ賣大キニ

誤レリ神ノ名モナク麩ノ名ナレ

又世自ラ脩合スル人アリ見之ヲ

青蒿ヲ多ハ茵陳ヲ用蒼耳ニ稀

發ヲ用野蓼ニ太蓼ヲ用皆誤也

青蒿ハ茵陳ノ下ニ委レ蒼耳ハ葉

シラケテ大テ人ノ衣類ニ付大サ

豆程ニ刺ノアル子ノ生ス俗ニオ

ナモミト云草ナリ野蓼ハ野ニ生ス

ル甚辛キ蓼ナリ家園ニ生スルハ

辛ニウスレ

冊七 穰香 二十六之六トニ

時珍曰苗香宿根深冬生苗作叢

肥莖絲葉五六月開花如蛇床花

而色黃結子大如麥粒輕而有細

稜俗呼爲大苗香今惟以寧夏出

者第一其他處小者謂之小苗香

自番舶來者實大如栢實裂成八

辦二辦一核大如豆黃褐色有仁
味更甜俗呼三船苗香又曰八角苗
香時羅小苗香

時珍曰其子簇生狀如蛇床子而
短微黑氣辛臭不及苗香

時珍八苗香二大苗香小苗アリ
外二八角苗ト時羅ノ小苗トアリ
ト云フ

蘇頌曰入藥多用番舶者八角苗
或云不及近處者有方三月生葉

似老胡荽極疎細作叢至五月莖
粗高三四尺七月生花頭如金異本

蓋黃色也結實如麥而小青色北人
呼為土茴香九月采實註皆八角

時羅 土茴香
頌曰三月四月生苗花實大類蛇

床而簇生辛香六七月采實今人
多用和五味不聞入藥用是小苗

時羅二頌ハ懷香ヲ八角苗時羅
アラスノ小苗ト見テ註ラナス

宗奭曰茴香云似老胡荽者誤矣
胡荽葉如蛇床雖有葉之名但散

如絲髮是八角苗ヲ註シ
蒙筌云大茴香即懷味辛氣平鄉

落多生秋月方採殼有八角子赤
藏中嚼甚香甜頌說又小茴香家

園栽種類蛇床子色褐輕虛時珍
苗者別種時羅顆粒似蔓椒開口

俗呼時羅椒內有黑子但皮薄色
褐不紅耳氣味比茴香更辛子苗

別種二蒙筌二大苗小苗懷香時羅
見エノ四圖ヲ載ス然レトモ都ヲ圖ト註ト

ノ四圖ヲ載ス然レトモ都ヲ圖ト註ト

ノ四圖ヲ載ス然レトモ都ヲ圖ト註ト

ノ四圖ヲ載ス然レトモ都ヲ圖ト註ト

ハ大藥異ナル故ニ難用之

今藥舖云八角ノ番苗ヲ太苗トシ

葉絲ノ如ク子蛇床ノ如クナル者

ヲ小苗トス是ニ唐ト和トマノ唐

ハ和ヨリ微シ大ニ味ハ異ナルナリ

時珍其他所小者謂之小苗ト云ハ唐ノ小苗ヲ大苗トシ和ノ苗香ヲ小苗ト云ニカ

頌カ七月ニ花ヲ生ト云蒙筌ニ秋月

方ニ採葢有八角ト云ハ今和ニ云ハ

角ノ者大苗香トスルト同意也是

ニヨレハ藜香ハ八角大苗ニ蛇床子

ニ似タル者ハ小苗香又蔣蘿ハ別

物ナリ

圖經蒙筌日本ノ説同一ヲ時

珍獨及之明者訂之

今藥舖云只苗香ト云時ハ小苗也

大苗ト云時ハ八角ノ物ヲ用

愚考モ此説ニヨルナリ

冊八 首者 頰 二十七之三十三

時珍曰入藥野生者爲勝若供饌

則家種者爲良

藥舖ニ二種アリ自然ニ生ト作

山藥也山城大和ニ多ク作ル自然

生ニモ又然リ自然生ハ肉黒ク見

分惡キ故ニ人賤之作山藥ハ

色白ク所見ヨキ故ニ人貴之非

ナリ

所見惡クトモ米ノ粉カケタル自

然生ヲ折テ中ノ白ヲ可用其餘

ハ不可用

