



圖畫

和語本草綱目二心



廣益本草大成卷之二

浴下

法橋

岡本為竹一抱子

撰

甘草

綱本 始原



甘草性平。色黃。味甘。其味。夫脾胃。中宮。二位。土。土。入。土。性。平。正。之。編。奇。之。惡。且。土。八。甘。之。欲。之。苦。味。之。惡。其。色。黃。ナリ。故。二。其。草。ノ。其。本。黃色。ハ。土。德。ニ。合。ノ。能。脾胃。ヲ。補。者。也。李。士。材。云。其。草。其。平。之。品。也。之。德。故。獨。入。脾胃。又。云。採。橋。作。其。土。之。正。味。故。其。草。為。中。宮。補。劑。是。以。內。傷。不。足。ヲ。補。益。ス。ル。劑。中。其。草。ヲ。兼。用。ス。ト。云。コト。ナリ。或。

穢養陰血。治瘡腫。腹脹。煩滿。止痛。益精。壯筋骨。補益。內傷。△原。始。曰。

根。因。味。其。甜。遂。名。其。草。ト。此。草。ノ。味。專。甘。レ。故。二。其。草。ト。補。又。補。脾胃。

甘草。性。平。色。黃。ニ。味。甘。レ。夫。脾胃。ハ。中。宮。ニ。位。ソ。土。ト。入。土。性。ハ。平。正。之。

編。奇。ヲ。惡。ム。且。土。ハ。甘。ヲ。欲。ノ。苦。味。之。惡。其。色。黃。ナリ。故。二。其。草。ノ。其。本。

黃色。ハ。土。德。ニ。合。ノ。能。脾胃。ヲ。補。者。也。李。士。材。云。其。草。其。平。之。品。也。

之。德。故。獨。入。脾胃。又。云。採。橋。作。其。土。之。正。味。故。其。草。為。中。宮。補。劑。

是。以。內。傷。不。足。ヲ。補。益。ス。ル。劑。中。其。草。ヲ。兼。用。ス。ト。云。コト。ナリ。或。

問。寇宗奭曰。生則微涼。味不佳。炙則溫。本草漚曰。生寒。炙溫。東垣曰。生用則氣平。補脾胃不足。而大瀉心火。炙之則氣溫。補三焦元氣。而散表寒。除邪熱。此諸說。二從則生。甘草性涼寒。炙甘草性溫。乃如。然。否。曰。此說。アリ。雖實不然。夫苦。辛。酸。收。藏。ハ。飲。其。ハ。緩。此。五。味。ノ。性。ナリ。火。熱。ヤ。陽。ニ。其。氣。急。烈。甘。草。ノ。其。以。火。氣。ノ。急。烈。ヲ。緩。則。熱。火。自。解。瀉。ス。此。本。連。知。栢。ノ。火。熱。ヲ。瀉。ス。ル。ト。異。ナリ。彼。ハ。苦。寒。ノ。以。テ。直。ニ。火。熱。ヲ。清。瀉。ス。甘。草。ハ。惟。其。味。ヲ。以。テ。火。急。ヲ。緩。瀉。ス。宗。奭。等。其。熱。火。ヲ。瀉。ス。ル。功。ヲ。視。テ。或。涼。或。寒。ト。云。ト。雖。生。甘。草。ノ。本。性。涼。寒。ノ。者。ニ。非。ス。平。ナ。ル。ニ。若。其。涼。寒。テ。ハ。何。ノ。東。垣。生。用。則。氣。平。補。脾。胃。不。足。ト。云。シ。ヤ。涼。寒。ノ。者。ハ。脾。胃。ノ。所。惡。ニ。シ。補。益。ヲ。致。コ。ト。ナ。シ。炙。甘。草。ハ。微。溫。ヲ。能。中。焦。ノ。元。氣。ヲ。補。益。シ。元。氣。不。足。ノ。虛。熱。ヲ。除。ニ。勝。タリ。本草漚曰。性。緩。諸。火。理。虛。熱。東。垣。曰。甘。

溫能除太熱。是ナリ。元氣不足ノ大熱ハ參耆其草合用ノ其功。尤盛ナリ。宗奭等謂炙則溫タリト雖全溫ニ非ス。微温ナルノ三。惟實熱實火ノ急烈ヲ除ニ於ハ生甘草ヲ用ユ。虛熱虛火ノ急烈ヲ除ニ於ハ炙甘草ヲ用ベシ。九方劑ノ中ニ惟甘草ト稱スル者ハ皆炙甘草也。生甘草ヲ用則必生字ヲ加置。生炙ノ字ヲ不加者ハ皆炙甘草ト知ベシ。蓋脾胃ハ中州ノ土トス。土ハ緩ヲ欲シ其ヲコノム。甘草素ヨリ其ト雖炙者ハ其味尤佳。宗奭謂生則味不佳ト。故炙甘草ノ其味ノ厚佳ヲ以能中焦ノ緩土ヲ補。炙テ微温ナルヲ以テ胃氣ヲ助ニ宜シ。彼火熱ノ實ニ屬者ハ生甘草ニ宜トスル所以ハ。炙テ微温ナルトキハ其温ヲ以瀉火ニ害アルコトヲ恐テナリ。緩テ甘草ノ味其ハ緩故正氣ヲ緩和スルノ功アリ。凡物急則不瀉。則充滿ス。甘草ハ正氣ヲ緩ヲ以テ參耆ト合テハ能氣ヲ補。地。

本草綱目 卷之二十一 補益 甘草

黃當歸ト合シハ能精血ヲ補 治寒熱邪氣 寒ハ陰邪タリ 陰ハ
收斂急迫ノ氣ナリ 熱ハ陽邪タリ 陽ノ常性ハ緩散ナリト雖
ニ熱火ノ盛ナルニ至テハ反テ急烈ナル者ナリ 然則寒熱ノ邪
俱ニ急者ナリ 故ニ甘草ノ其緩ヲ以テ寒熱ニ邪ノ急ヲ緩解テ
治ス 此ヲ誤テ寒熱ノ邪ヲ發散スト覺ヘカラス 惟邪氣ノ急ヲ緩
ノニ東垣謂散表寒トハ外寒邪在表者ヲ發散スルニハ非ス 彼ニ焦
ノ元氣不足ノ表寒者 灸甘草ノ其温ヲ以テニ焦ノ元氣ヲ補カ故
ニ表陽不足ノ陰邪ノ急者ハ此ガ緩解スル所ヲ以テ散表寒ト云直
ニ發散スルニ非ス 然レ發散ノ劑中ニ多ク用之コトアリ 蓋東垣曰
甘草性能緩急而又協和諸藥使之不爭ト甘草ノ性能急ヲ緩テ
和スルガ故ニ生甘草木寒熱上下ノ諸藥ヲ合劑メコト方ヲ製スルニ
於ハ甘草ノ公用ノ方中ノ藥氣ヲ和調セシム 是以甘草ノ一名ヲ

國老ト呼ビ長者ハ若輩ノ喧嘩口論ノ間ヲモ此ガ能ナクメアソカ
ウテ和合セシムルノ義ヲ以ナリ 甄權曰調和衆藥有功故有國老
之號ト故ニ發表ノ劑中ニ用之者アテガチニ此ガ發散ノ功ナレト
雖其劑中衆藥和調ノ爲ニ用ユ且中官不緩則發表ノ劑ト雖其功ヲ
致コト不能故ニ甘草ヲ以テ中焦ヲ緩クシログルトキハ 胃表開易
ノ發表ノ藥力ヲ盛ニス 麻黃湯ニ甘草アル者是ナリ 夫甘草ハ能緩
急熱藥ニ得之其熱性ヲ緩ス 寒藥ニ用之其寒性ヲ緩ス 仲景附
子理中湯ニ甘草ヲ用者ハ其速ニ上過コトヲ恐テナリ 胃氣
湯ニ甘草アルハ其速ニ下過コトヲ恐テナリ 此皆用之其熱性ノ
急速ヲ緩ス 麻黃湯ニ甘草アル者モ亦杏仁ト合メ裏ヲ緩クシロケ
テ發表ヲ助ケ兼テ麻黃桂枝ノ發表速ニ過則汗多ク亡陽ア
コトヲ恐テナリ 然レ傷寒ノ病急症ニ其治モ亦急ニス 彼麻黃

湯氣湯ヲ用ニ於ハ急ニ汗レ急ニ下ヲ欲ス故ニ下ヲ欲ス仲景大柴胡湯ヲ製スル
用コト勿レ多則藥力ヲ減ノ効ヲ致ニ遲レ仲景大柴胡湯ヲ製スル
甘草ヲ不用所以ノ者ハ其表邪未除裏証亦急ナルヲ治スレバ也
甘草ノ緩性ヲ用ハ大柴胡湯ノ裏証急ナルヲ治スルニ於テ藥功遲
緩ナラシコトヲ察メナリ然則急証急方ニ甘草ヲ用ハ減少ノ宜トス
タトヒ急証急方ニ非トイヘ凡甘草ヲ用コトハ多過コト勿レ藥力ヲ
減レ不食腸滿ヲ致易レ甘草ノ甘厚ナルヲ以テナリ薛己云甘草宜
少不宜多則泥膈而不思飲食抑恐緩藥力而少効ト然凡此ヲ
必トスルコト勿レ症ニ從ヒ方ニ從テ或減或不減ノ用ヨ大抵四君子
六君子湯ノ如キ中焦補氣ノ劑中ニ甘草ヲ用ハ大ニ減少スルコト
勿レ參朮陳皮等ノ補藥得甘草其功ヲ盛ニスルヲ以テナリ若用之
不食腸滿ヲ致ハ減セヨ不然古人ノ分量ニ從用テ宜トス今ノ時師

ハ甘草ヲ以テ方劑ノ外ノ如クシテ一藥ニ用之微少ニ其方ノ緩急症
ノ虛實ヲ察スルコトナレ大槩補中ノ甘草ハ詳審ニ用ユベレ矣
偏ニ減少スルコト勿レ一偏ニ減少スルトノ覺者ハ方意ノ不明ト病用
ノ不詳トニ因テ也饒ヒ肺熱ノ喉痛ヲ治スルニ炒甘草二兩桔梗一
兩阿膠半斤ヲ用ユ仲景肺痿多涎傷肺冷者炙甘草四兩炮乾姜
二兩ヲ用ユ此皆甘草ヲ主トシ其兩ヲ重ス今ノ世醫ノ如クハ此
等ノ甘草ヲモ亦減少スヘケンマ薛己所謂義ハ醫家ノ準繩ヲ發
メ疾ニ過多ナラシコトヲ恐レ必トスル通例ニハ非ス長肌肉肌肉ハ
脾胃ノ所主脾胃ハ甘草ヲ欲ス故ニ甘草ヲ用テ脾胃ヲ補中焦ヲ
緩和セシムルトキハ中氣緩ニ煩出テ能肌肉ヲ生長メ肥盛ナルコ
トヲ致ス然凡亦甘草ニ不宜者アリ中氣雖未虛積癖中焦ニ
テ食飲ノ氣此ガ爲ニ支ラレ胃氣此ガ爲ニ不煩ノ其肌肉ニ充コト

少カ故ニ瘦者アリ。如此ニ甘草ヲ用コト過多則其味ナラ中焦ノ積滯ヲ塞テ反テ害アリ。惟其積ヲ消シ中焦ヲ開テ胃氣食氣ヲノ運行セシムル時ハ中氣能肌肉ニ熾滿ノ肥盛ヲ致ス。若中焦不足シ中氣急道ニ胃氣其肌肉ヲ緩滿スルコト不能ノ瀰漫スル者ハ甘草ノ主治スル所ナリ。止渴甘草ハ滋陰ノ劑ニ非下イハ能生津止渴功アリ。蓋味ノ甘ヲ以テナリ。試之砂糖飴餈ノ類一切其味ノ物ヲ嚼食則口中必津唾ヲ生ス。然則甘草ノ其味ナル津ヲ生スルコト明ナリ。然凡甘草直ニ津液ヲ生スルニハ非ス。此能津ヲ持テ劑タリ。凡其ハ緩下イハ能緩中ニ亦持テ義アリ。人一切ノ其物ヲ食則腸ニ泥腹ニ滯者ハ此其味ハ緩中ニ持テ義アハ也。故甘草能氣ヲ持テ氣水合ニ相並行者ナリ。是以甘草ヲ用テ氣ヲ持則氣ニ從テ津液モ亦會持テ止渴。彼中焦補益ノ劑中ニ甘草ヲ用

者モ亦其持津ノ功ヲ兼取何如トナレバ。脾胃ハ土トス。土乾則不能生物。惟緩ニシテ濡アリ且泥濕ナキ處ノ土ハ能物ヲ生化ノ盛ナリ。故ニ人身脾胃土ノ氣ヲ養者モ甘草ノ其緩ニ津ヲ持テ不乾ニ宜トス。多ハ白朮陳皮人參甘草ヲ合並テ中焦ヲ補益ス。乃四君子湯ノ品ナリ。白朮マ中氣ヲ持テ中焦所惡ノ濕泥ヲ去。陳皮マ中焦ヲ順和ノ緩土ノ氣ヲ得セシム。譬錒鐵ヲ以テ土ヲ疎テ稼カ如シ人參ヤ日光ヲ移テ土温ニ物ヲ生スルカ如シ。然凡白朮乾濕。陳皮疎之。人參温養之。則土乾潤ノ不能生物。故ニ甘草ノ其ヲ以テ持津不乾。且其其緩陳皮ノ順和ヲ助。亦其其味ノ持氣マ。白朮人參ノ中氣ヲ持テ助テ能脾胃不足ノ補益トナルコトヲ致ス。潤肺甘草ハ中焦ヲ補益ノ且持氣持津ノ劑タリ。肺金ハ脾胃土ノ子ニシテ氣ヲ至津液ハ氣ニ從テ至。故ニ甘草ヲ以テ肺金ノ母タル脾胃土ヲ補フテ其

氣液ヲ持シムルトキハ。金肺モ亦自氣液ニ富テ潤ラ致コトアリ。然
凡麥門冬五味子ノ肺ヲ潤ラ異ナリ。彼ハ直ニ手太陰肺經ノ藥ニ
麥門冬ハ直ニ肺部ノ津液ヲ生化シ。五味子ハ酸收ニ直ニ津液ヲ
金肺ニ聚者ナリ。甘草ハ脾胃土ノ氣液ヲ持テ餘ニ肺金ヲ潤者也
去咽痛凡一切ノ痛マ。皆氣血ノ急迫ニ生ス。譬ハ人身以繩縛テ急
ナレバ痛ニ同シ。故ニ甘草ノ其緩其急迫ヲ除テ諸痛ヲ治ス。且咽喉
ハ胃與肺ニ連。甘草ハ脾胃ノ劑タリ。肺ハ脾胃ノ子ニシテ母其氣
ヲ通ス。故ニ甘草能咽喉ノ痛ヲ治ス。古人咽喉ノ痛ヲ治スルニ甘
草。桔梗合用ノ神効アリ。各テ甘草桔湯ト云。蓋甘草ハ緩急諸痛ヲ治
スルノ良藥ト雖其味厚メ鈍。故ニ速ニ高上テ咽喉ニ達スルコト遲シ。
桔梗ハ諸藥ヲ載テ能高ニ至ラシムル者。古人譬舟楫其能浮上
テ沉シメガトヲ以ナリ。且桔梗モ亦辛ニ利咽喉ノ功ヲ存ス。故ニ甘

草其緩ニシテ治咽痛者ヲ以テ。桔梗ノ舟楫ニ乗浮テ能咽喉ノ高
ニ至ラシム。彼証ニ辨スル黃耆得防風其功大ナルノ義ト同シ。或問
吾子カ言ノ如ナルトキハ甘草一味ヲ以テハ咽痛ヲ治スルノ功ナシヤ
否ヤ。曰不然甘草一味ニ能治咽痛其味ノ其厚ナルヲ以テ速
ニ咽喉ノ高ニ上達スルコト不能メ。其効ヲ致ニ遲シ。故ニ桔梗ニ合メ
速効ヲ致ノシ。夫咽喉ハ食飲呼吸ノ道路一身ノ要部タリ。若病ア
ラハ速ニ治スベシ。慢コト勿レ。若咽痛甚メ速ニ治セシコトヲ欲セバ。甘草
合桔梗用之。若痛輕者ハ或單ニ甘草ノ用モ可ナリトス。必桔梗ヲ
兼サレバ咽痛ヲ治スルコト不能ト云ニハ非ス。解百毒百毒ハ諸毒也。
甘草能諸ノ毒氣ヲ解ス。解字和ニ登久ト訓ス。此モ亦甘草ノ其ヲ以
テ毒氣ノ急烈ヲ緩解テ治スルナリ。又甘草ノ其ヲ以テハ能諸藥ヲ調
和スルヲ以テ。毒氣ノ雜駁ヲ調和ノ諸毒ヲ治スルノ功ヲ致者也。

黒大豆ノ煎汁。雖解百藥毒。甘草ヲ加入セザレバ解毒ノ驗アルコトナシ。故ニ思邈曰。甘草解百毒。如湯沃雪。甘草解毒ノ功勝タルヲ可見。甄權モ謂。甘草治七十二種乳石毒。解一千二百般草不毒。故ニ常ニ甘草ヲ懷中ノ不可絶。若食物等ノ毒ニ中コトヲ覺ハ。炙甘草一寸ヲ以テ嚼テ其汁ヲ嚥ハ。即毒物ヲ吐出ス。不吐則厚毒ニ非ズ。吐ノ後炙甘草三兩。生姜四兩。水六升。煎二升。服ス。或大豆甘草等分。煎ノ甘草湯ト名ク。解諸毒奇妙ナリ。烏頭巴豆ノ毒ヲ解スルニ甘草尤妙ナリ。衛生ノ士ハ必甘草數寸ヲ帶テ中毒ノ急ヲ救コトヲ欲セヨ。葛洪云。常帶甘草數寸。隨身備急。若經含甘草而食物不吐者。非毒物也。コノ毒物ハ與毒等ノ厚毒ヲ指也。輕毒ハ不吐ノ自愈トス。療小兒胎毒驚癇。此モ亦甘草解百毒ノ所致ナリ。驚癇ハ驚風ノ名ナリ。小兒初テ生ハ。炙甘草一寸許。判碎水煎

ノ此ヲ綿ニ浸テ小兒ノ口中ニ滴飲シムルコト。蜆殼一スクヒ程用則胸中ノ惡汁シノ吐出ノ胎毒ヲ去。驚風ヲ除。痘瘡少ノ且智慧アリ。此玉璣選方ニ見タリ。或甘草黃連等分ニ煎メ。綿帛ニ浸吮シムルモ可ナリ。胎毒胎熱ヲ去ノ治也。本草匯曰。小兒初生加黃連煎湯拭口有益。夫胎毒ノ症或熱アリ。或寒アリト雖。胎寒ハ稀ニ胎熱ノ毒尤多シ。故ニ甘草黃連湯多ハ小兒初生ノ良法タリ。又小兒驚癇症多ハ胎毒脾胃ニ屬ス。甘草ノ解毒補中ノ者ニ宜シ。除火熱實火ハ生甘草ニ宜シ。虛熱ハ炙甘草ニ宜シ。此義右ニ辨スルヲ詳也。甘草直ニ火熱ヲ清涼スルニハ非ス。只虛實兩火ノ急烈ヲ緩テ除去者ナリ。故丹溪曰。甘草味甘大緩諸火ト。緩字ヲ以テ予ガ辨ヲ可知。東垣モ謂。甘草性能緩急ト。生甘草ハ只其甘緩ヲ實熱ノ急烈ヲ緩シコトヲ欲ス。炙甘草ハ其緩溫和ニテ虛熱ノ急烈ヲ緩

ニトヲ欲スルナリ。謂温能除大熱ノ義タリ。或問東垣曰生用則大
瀉心火下。甘草ハ手少陰ノ藥タル欤。曰不然東垣ノ醫法ヲ察ニ
心ハ南方離火ノ本部タルヲ以テ。實火ヲ心位ニ歸メ云。生甘草ハ大
ニ實火ヲ除フ以テ瀉心火下ス。甘草ハ手少陰ノ藥ニハ非ズ。虛火
ハ胃氣ノ不足ニ生ジ。衝脈ノ火下並テ中州ニ起トス。故ニ炙甘草ノ
甘温能元氣不足ノ虛熱ヲ除カ故ニ東垣謂灸之則氣温補ニ焦
元氣而散表寒除邪熱下。此邪熱ハ正氣不足ノ虛熱ヲ指ナリ。散表
寒ノ説ハ右ニ見タリ。通經脈 玉好古曰甘草入足太陰厥陰經下。時
珍曰通入手足十二經下。李士曰甘草獨入脾胃李時珍以爲通入十
二經者非也。實ニ李士ノ説ヲ是ナリトス。甘草ノ其味黄色ナル
ハ專中焦坤土ノ氣色ヲ全ノ脾胃ノ本藥タルコト明ナリ好古謂
入足太陰説述之入足厥陰トハ甚非ナリ。時珍謂入十二經トハ

甘草ハ脾胃ノ劑タリ。脾胃ハ土トス。土ハ中宮ニ在テ其氣ヲ四方
四行ニ寄應ズ。ヲ以テ通入十二經ト云乎。○通經脈トハ十二經
脈ニ通入スルニハ非ズ。夫經脈ハ榮衛所行ノ道路タリ。榮衛ノ生ス
ルヤ中焦脾胃ノ氣ニ從。甘草能中焦ノ氣液ヲ養コト。右ノ辨ノ如
ナルトキハ。營衛自調和ノ經脈通行スルコトヲ得ベシ。且營衛ノ中焦
ニ生スルハ其源ナリ。營衛ノ經脈ニ通行スルハ其流ナリ。源急迫ナ
レバ其流通行セス。故ニ甘草ヲ以テ中焦營衛ノ本源ヲ緩和ナ
ラシムルハ。經脈營衛ノ流自通行スルニ至ル。通九竅 九竅ハ中焦ノ
水穀氣液ノ出入往來ノ道路ナリ。九竅ノ不通ハ中焦ノ緩和セザ
ルガ故ナリ。故ニ甘草ヲ以テ脾胃ノ氣ヲ緩和セシムル時ハ。九竅自
通行ス。然レ茯苓猪澤ノ過竅通水トハ不同彼ハ直ニ淡味ヲ以テ
通利滲泄ス。甘草ハ直ニ竅ヲ通スルコト不能中焦緩和ノ餘ニ通九

竅ノ功ヲ致ス。此モ亦源ヲ以テ和ノ其流ヲ通スルノ義ニ取者也。
養陰血 甘草ノ其ハ津液ヲ持テ然リ。直ニ陰血ヲ生化スル
ニ非ス。然レ當歸。芍藥。地黄等ノ滋陰生血ノ劑ニ合入メハ自生
血ノ功ヲ發ス。凡シ甘草ハ中央土德ノ氣味ヲ備コトノ全キ物ナリ。
且シ甘草ノ外赤中黃ナルハ離火坤土ノ色ヲ兼タリ。其氣薄其味
濃ナルハ陰陽浮沉ノ氣ヲ全ス。故ニ甘草ハ可下可上可內可外有
和有緩有瀉有補中道ヲ盡ス。諸藥ノ中ニ於テ王道土德ノ化ヲ得
者、甘草ニ勝ハナレ。然レ好古ハ謂甘草升而浮陽也。李杲ハ謂陰
中陽也。ハ俱ニ不是。甘草ハ居中ノ君子。陰陽浮沉升降補瀉寒熱
氣血ノ道ヲ備故ニ諸藥ニ合並ノ爭乖コトナキ者ナリ。是以陰劑
ニ合ハ能陰血ヲ補。陽劑ニ合ハ能陽氣ヲ補。并藥ニ並ハ浮降藥ニ
並ハ沉。下隅ニ執滯スル者ニ非ス。故ニ諸ノ方劑ニ甘草ヲ合セサルハ

惟其緩和ノ能ヲ取テ方中ノ臣佐トスレ。君藥ニ取者少シ。此藥ハ
諸劑ノカイレトスルニ便者ナリ。蓋シ疾ナキヲ以テ。仲景小柴胡
湯ニ柴胡黃芩ノ寒。人參半夏ノ温アリテ。寒温不和故ニ甘草ヲ用
テ此ヲ調和スル類ナリ。甘草若シ陰陽浮沉升降補瀉寒熱氣血ノ間ニ
於テ惟一道ヲ得テ偏奇タラズ。何ゾ調和ノ功ヲ致コトアルヤ。丹溪
甘草ヲ稱ノ厚德ノ君子トシ。時珍稱ノ王道ノ化ヲ得タリトス。實ニ
ルカナ**治瘡腫** 諸瘡ノ生ズルヤ。氣血ノ凝滯急迫ニ因者ナリ。故ニ甘
草ノ其緩和ヲ以テ其氣血ノ急迫ヲノ緩和ナラシムレハ愈易シ。大抵
瘡腫未潰破者ハ實熱ニ屬ス。生甘草ニ宜シ。其已ニ潰破ノ後ハ屬虛
灸甘草ヲ用ヘシ。蓋シ炙甘草ヲ以テ中焦ヲ温養シ。肌肉ヲ長ゼレ
シコトヲ欲スルナリ。**腹脹** 腹脹中滿ノ症。虛實ノ二辨アリ。生甘草
宜與不宜ヲ存セシ。夫胃ハ水穀ヲ納脾ハ水穀ヲ消化ス。脾胃且盛

ナルトキハ能水穀ヲ消化傳送ノ上下升降レ。管衛流行ノ脹滿等ノ
患ナレ。若脾胃一度虚則水穀留滯シ。升降不順ヲ中焦否塞シ。遂
ニ脹滿ノ患ヲ致ス。故甘草ヲ以テ脾胃ヲ補則中宮消化升降ノ
脹滿ヲ除。此蓋因塞用ノ義ニ近。若此虚症ヲ以テ妄ニ疎通順利ノ
劑ヲ用ハ脾胃彌虚脹滿彌厚コトヲ致ス。然正王好古曰甘草ハ中
滿中滿者勿服甘草緩而壅氣非中滿所宜也。此甘草ノ其ハ中滿
症ハ不宜用者トス。蓋脾胃土太過中焦結實ノ脹滿ヲ云。若此中
焦實滿症ヲ治スルニ於テ甘草ノ其緩ヲ用則其味中宮ニ塞リ滿
テ其滿脹ヲノ加甚カラレム。故中滿者勿服甘草ト云。按三好古ハ
謂甘草非中滿所宜ト。別録ニハ謂甘草下氣除滿ト。甄權モ謂其
寬除腹脹滿ト。此三説不同者虚實ノ不同ニ從テナリ。好古ガ説ハ中
焦脾胃ノ實滿ヲ云。別録ト甄權トガ説ハ中焦脾胃ノ虚滿ヲ

云也。世人此辨ニ昧ノ一弊ニ中滿症ニハ絶テ甘草ヲ不宜用トス。誤
レルカナ。内經曰以耳瀉之。以耳緩之ト。彼中焦不足ノ脹滿ハ甘草ノ
其ヲ以テ虚中ノ實邪ヲ瀉シ。虚ノ脹スル急ヲ緩テ其滿脹ヲ治
ス。何ゾ一例ニ甘草不宜トセンヤ。李士材曰。脾得補則善干健運也。
若脾土太過者慎服則轉加脹滿故曰脾病人毋多食甘。其能滿中
此爲土實者言也。世俗不辨虚實每見脹滿便禁甘草何不思之甚
耶。且世俗謂乳母ニ甘草ヲ用則乳汁ヲ閉澁セシムト。是以乳母ハ
絶ニ甘草ヲ禁者モ亦慎ナリ。蓋此モ亦虚實ノ兩辨ヲ存ス。夫乳汁
ノ閉澁スルヤ氣血胸腹ニ鬱結シ。痰飲迫膈致者ハ實ナリ。若此ニ甘
草ヲ用則其味泥膈腹氣痰ナラ胸中ニ塞リ。乳閉加甚如此者ハ
痰氣ヲ順シ胸膈ヲ開通ノ宜トス。若其脾胃虚ノ升降不順ガ故ニ
上中二焦ノ氣急迫ニ乳閉ヲ致者ハ反テ甘草ノ其ヲ以テ中焦ヲ

補則升降能順。胸腹ノ氣急心自緩テ乳汁ヲノ通利セム。然則一菓
 二甘草ヲ以テ乳母ニ禁言。豈有ハ豈禁ニアラスマ。凡諸藥ノ禁忌善惡ハ
 類云ヘカラス。病ニ臨時ニ從テ當用者ヲ不用不當用者ヲ用。故ニ醫
 ハ只權ニ在テ變ニ應スルニ非ズ。治療ノ神ヲ致コト不能トス。煩滿胸
 膈ノ煩滿者モ亦虛實ニ從テ甘草ノ宜不宜アリ。若上中焦ノ氣實
 鬱結ニ屬者用之則其味胸膈ニ填テ鬱塞不開煩滿ナリ。盛ナリ。若中
 焦虛ノ上焦不行。元氣不足ノ虛火旺ノ胸中煩滿ヲ致者ハ。炙甘草
 ヲ以テ中焦元氣ヲ補テ宜トス。凡胸中ノ煩スルマ皆胸氣ノ急ナルニ
 因。故ニ實煩ノ者モ亦或生甘草ヲ用テ暫其氣急ヲ緩テ可ナ
 ルコトアリト雖實症者多ハ用之不宜其味其膈ニ泥易ヲ以テ也。虛
 煩者ハ必用之補緩テ効ヲ致ス。若煩ノ滿スト雖上中焦ノ虛ヨリ
 致者ハ甘草ニ宜シ。其滿ヲ恐コト勿レ。止痛諸痛マ皆急迫ニ生ス。故

甘草ヲ以テ其急迫ヲ緩則諸痛乃止。東垣謂心火乘脾胃腹中急痛
 腹皮急縮者宜倍用甘草。其性能緩急トハ是ナリ。大抵實痛者ハ
 生甘草ヲ用ユ。虛痛症ハ炙甘草ニ宜トス。益精古人謂補腎不如
 補脾ト。甘草ハ直ニ下焦腎精ヲ補者ニ非ズ。雖甘草能脾胃ヲ補
 肺ヲ潤フ以テ益精ノ功アリトス。蓋脾胃盛則水穀能消化ノ中焦
 水穀ノ精液注テ五藏ノ精ヲ養。且肺金ハ腎水ノ母タリ。故ニ甘草ノ
 脾胃ヲ補肺ヲ潤者ハ。自益精ノ功ナクシバアラス。然ニ李士謂甘草
 下焦藥中勿用トハ何ゾヤ。此言ニ辨スル如ク。甘草ノ其ハ緩ト雖緩
 中ニ自持ノ義ヲ存ス。故ニ下焦ノ藥中ニ用之則藥氣ヲ中焦ニ持テ
 下ニ達スルコトノ遲滯ヤシトヲ恐テナリ。愚案李士說深意アリト
 雖下焦藥中勿用之ト云テ。必トスル者ハ恐ハ不是古人下焦ノ藥中ニ
 於テ甘草ヲ用コト多シ。惟下焦藥中ニ用之宜サ甚多ヲ勿ト

云ハ可ナラシノミ壯筋骨筋ハ所ノ至骨ハ腎ノ至下雖總テ皮肉血
脈筋骨周琳ハ皆中焦脾胃ノ所養タリ脾胃虛則筋骨柔弱ナリ
中焦盛則筋骨自健ナルコトヲ致ス故ニ甘草ノ甘緩ヲ以テ中焦ヲ
補則筋骨自壯堅ナリ然レ虎骨松節等ノ筋骨ヲ壯ニスルトハ不
同彼ハ同類求テ直ニ筋骨ノ氣カヲノ壯實ナラシム甘草ノ壯筋骨
中焦補益ノ餘ニ致者ナリ補益内傷飲食不節肢躄勞倦ハ内傷
ノ症皆中焦ノ不足ニ屬ス甘草ハ中央土ノ氣味ヲ全ク脾胃ヲ補
功ニ長ゼリ且脾胃土ハ常ニ緩和ヲ欲メ急迫ヲ惡甘草ノ甘ヤ脾
胃ヲノ緩和ノ土徳ヲ得セシメテ急迫ヲ除故ニ諸内傷補益ノ劑
中ニ必用之補脾胃○或問大抵甘ハ上行ノ發ス然レ別錄云甘草
下氣トハ何ゾ曰甘草ハ居中ノ道ヲ盡メ升降浮沉ノ功アリト雖
本草能中焦ヲ緩和ス中焦緩和ナルトキハ上焦通ノ其氣下行ス

別錄ニ所謂モ其理ナキニハ非ズ然レ此中焦虛急ニ上氣ノ不下者
ヲ甘草ユレヲ下サレム彼逆氣胸中ニ上實ノ不下者ノ如キ矣○
下ト欲セハ反テ甘味膈ニ閉テ上氣ナラ不可下ナリ
總槩 甘草ノ主治數品アリト雖此ヲ
者ナリ緩ハ緩急ノ義建中湯ニ甘草アルハ脾ノ急ヲ緩テ中焦ヲ
補ガ爲ナリ鳳髓丹ニ甘草アルハ腎ノ急ヲ緩テ下元ヲ生センガ爲
ナリ其外寒藥ニ合ノハ其寒ヲ緩シ熱藥ニ合ノハ其熱ヲ緩シ上藥
ニ合ノハ其上ヲ緩シ下藥ニ合ノハ其下ヲ緩スルノ類緩ヨリ所致奉
テ數ヘカラス和ハ和合調和ノ義ナリ寒熱草石相雜ニ於テ甘草ヲ
用則能此ヲ和調シ或相畏相反ノ劑ヲモ能和合ノ事シメス故ニ古
方多ハ甘草ヲ入用テ劑中ノ稱高ク和合セシム惟甘草ノ主治スル
所ハ緩和ノ兩道ヨリ致者ナリ其所入中焦脾胃ノ部ニアリ他ハ

本草綱目卷之六

皆此が枝葉ニ属ス。蓋甘草ノ緩和スルヤ。中焦ニ入ヤ。只其味ヨリ致之。生甘草ノ瀉シ。炙甘草ノ補モ。亦味ノ其ニ因テ致之者ナリ。

使藥

木苦參。乾蒸ラ使ラス。人參白朮ト合ノ善。脾胃ヲ補。陳皮ト合ノ中官ヲ順和ス。桔梗ト合ノ善。咽喉痛肺痿ヲ治ス。

ス。黑豆ト合煎

毒

甘草ハ緩急故ニ一切急症ニ臨テ汗下利伐ヲ急ニセント欲セバ勿用之。○中焦ノ實

ニ属スル脹滿者勿用之。其其味中焦ヲ塞テ加滿悶ス。○嘔吐不

食痞滿者妄ニ勿用之。動スレハ其味中胸泥膈害ヲ致ス。○酒

病ハ濕熱中焦ニ閉。胸膈滿ノ多ハ嘔吐惡心等ヲ致ス。

畏惡

只辛散ヲ欲ノ其味ヲ不喜。故ニ酒病ハ甘草ヲ用テ勿

甘草惡遠志反。大戟。芫花。其遂海藻。○忌猪肉。○東垣結核ヲ治スル消腫潰堅湯ニ甘草海藻ヲ用テ。丹溪治勞瘵蓮心飲ニ甘草芫

花ヲ用テ此皆相友ノ物ヲ合劑メ効アル者ハ何ゾヤ。蓋病深ノ甚

者ハ其相友ノ相爭ノ勢ニ乘メ病根ヲ拔去ント欲ス。以毒攻毒ノ

義ナリ。如此ノ法ハ達神明醫ニ非ハ敢テ所不致也。故弘景曰。古

方亦有相惡相友並乃未爲害。非妙達精微者不能知此理ト。○予常

ニ時師ノ古方ヲ施者ヲ視ニ甘草ノ大戟芫花其遂海藻ト反スル

トヲ知凡多ハ惡遠志ノ義ニ味ノ古方ノ甘草アル劑中ニ於テ。其ニ遠

志ヲ合用メ施者不少。

附方

治懸癭。前後陰ノ間ニ生メ初松子ノ如ク。漸大ニ赤腫桃李ノ如

ク。成膿即破テ難愈懸癭ト名ク。大甘草五錢。酒ニ煎メ服ス。出癭

疔方。諸毒ヲ治スル其豆湯。甘草。黑豆等分。合煎メ用テ諸藥毒。

切魚鳥等ノ食毒ヲ治ス。出千金方。○飲食ノ後。中毒。腦亂。何ノ毒

タルコトヲ不覺メ急ナル者。甘草薺芫ノ煎湯ヲ用テ死スレ凡入口便

活出金匱至函方。傷寒咽痛ヲ治ス甘草湯。蜜炙甘草二兩。水一升。煮一升半。服之。出傷寒論。○痰熱在肺。喉痛者。炒甘草二兩。桔梗一兩。合劑之。每一貼五錢。水一鍾半。阿膠半片ヲ入煎服ス。出小兒直訣。小兒初生便閉ノ不通者。甘草枳殼煨ノ各一錢。水半盞。煎服セシム。出全幼心鑑。小兒初生臍帶ノ落口ヨリ風寒ヲ受テ卒ニ口噤テ撮ミタルガ如ク。臍風撮口トス。小兒ノ口中上脛ニ必小泡子アリテ身冷。帝テ不飲乳。温湯ニ帛ヲ浸メ指ニ卷テ輕入ニ口中ノ小泡子ヲ搯ツグレ。次ニ生甘草二錢半。水一盞。煎六分。温服スレバ痰涎ヲ吐ス。次ニ乳汁ヲ口中ニ含スレバ愈。出金匱至函。小兒尿不覺タル者。大甘草ノ蘆頭煎湯ニシテ每夜服ス。出得效方。小兒羸瘦者。炙甘草三兩。末トシ蜜ヲ以テ之。綠豆ノ大ニ丸レ温水ニテ服ス。出金匱至函。小兒尿ニ血ヲ下ス。甘草一兩二錢。水六合。煎二合。日ニ服ス。出至寶方。舌

腫塞急ニ不_レ治殺入_レ甘草ヲ濃煎シ熱テ漱テ頻ニ吐出_レ聖濟總錄。陰莖生瘡者。蜜炙甘草ノ末頻ニ塗テ愈尤妙也。出千金方。陰囊後陰濕癢者。甘草ノ煎湯ニテ日ニ洗コト三五度。出古今錄驗。凍瘡發裂者。甘草煎湯ニテ洗。次ニ黃連黃柏黃芩ノ末ニ少許輕粉ヲ加。胡麻油ニ調テ塗。談登翁方。湯火瘡。甘草蜜ニテ煎塗。李樓奇方。

愚案

甘草八種中。焦補土ノ聖劑。諸急ヲ緩和スルノ良藥タリ。今ノ世醫甘草ヲ以テ方劑ノ飾ノ如ク。此ガ主功ノ秀タルヲ不知。深氣性ノ所行ヲ不_レ究。漫爾トシテ少用之耳。ニシテ分量加減ノ論ニ及者ナシ。恨カク。假令四君子六君子湯ノ如キ。其四六ノ品味皆君中ノ道ヲ窮故ニ稱ノ君子トス。其中甘草尤君子ノ徳ヲ全ス。然則四六君子ノ類ハ專方中ノ眼。甘草ニ在_レニ。然_レ正時師惟參朮ニ意ヲ留メ。症ヲ察シ時ヲ考テ。此ガ分量ヲ加減スルコトアリト雖。甘草ニ於_レハ意ヲ

留テ加減ヲ考者アルコトナク。一例ニ於テ許ヲヒメ四六ノ藥數ニ合ス
 ル。此實ニ不思ノ甚ナリ。凡古人ノ方ヲ製スル何ノ藥カ意義ノ
 輕物アラシ。一方ノ諸藥盡深意存スルコトアリテ。病ニ從ヒ時ニ從
 テ一々其氣味性功ヲ察メ。盡分兩ヲ加減スヘシ。豈甘草ヲ以テ一
 藥ニ減少メ用ガ理ナラシヤ。大抵中焦補益ノ劑ハ甘草甚減少ス
 ルコト勿レ。甘草補土ノ功盛ナレバナリ。急症ニ臨テ急ニ汗シ急ニ下シ
 急ニ攻伐スルニ於テハ甘草少テ減少
 セヨ。甘草藥カラ緩ノ功盛ナレバ也

修治
 甘草ハ太シ皮薄ク色
 黃ニ堅實ナルヲ粉草
 ト名ク甘草ノ極上ナリ。藥ニ入テ功力強シ。細メ堅實ナルハ中品。輕
 虛ニ或性或朽色赤或黒色ニ皮厚。或皮麁脫物ハ下品ナリ
 皆功用甚惡シ不入藥。凡甘草ヲ使ニハ大粉草ヲ擇テ麁皮ヲ去
 蘆頭ト尾サキトヲ切捨テ剉灸用ユ。或生ヲ用ユ方ニ依ヒ。甘草ノ

蘆頭尾サキハ人ヲノ吐逆セシム。必去用ヘシ。雷斅曰。凡使須去頭
 尾尖處。其頭尾吐人ト。今ノ醫家人參ノ蘆頭致吐コトヲ知テ去
 之。凡甘草ノ頭尾致吐ノ義ヲ忘テ多ハ恐去コトナレ。○和ノ藥店ニ
 堅韌ト呼物。甘草ノ極上也。其次ヲ中韌ト名ク。其次ヲ切込ト名ク。
 堅韌中韌切込ニ亦各上中下品アリ。良香様ト呼ハ。良香ニ以テ
 細小ナリ。最下品ナリ。良香様ノ太細ヲ蒙甘草トス。極下品ナリ
 俱ニ不足用。○今駿州富士山ニ此草アリト。或甲斐州ノ諸山ニ皆
 此草アリト。延喜式ニハ常陸陸奥出羽三箇國ヨリ甘草ヲ獻スルコ
 目アリ。今モ有マ無ヤ未知之也

甘草稍 甘草ノ稍ノ細處ヲ云也。○甘草稍生ニテ用レハ胸中ノ
 積熱ヲ除。陰莖中ノ痛ヲ去也。元素曰。加酒煮玄胡索苦棟子尤妙
 ○龔庭賢曰。稍去尿管澀痛子除胸熱。尿管ハ陰莖也。子トハ甘草

ノ岐出タル小枝ナリ

甘草頭 生ニ用レハ脾胃ニ經ノ瘀血ヲ行ク消腫瘡毒ヲ導癰

瘡ヲ主治ス或吐藥ニハテ能ク人ヲメ吐セシム稍尾モ亦宜入吐藥

白朮



其温〇補中益氣除濕治風寒濕痺止汗除熱消食去痰逐水腫利腰膈間血温中進食療脹滿利水安胎止霍亂吐下治反胃躄重心下急滿臍腹痛長肌

肉補内傷△此草根枝葉ノ形朮字ニ似テ其色白シ故ニ白朮ト号
上古ニハ蒼白朮ノ別ナレ宋ヨリ以來始テ白朮蒼朮不別テ用來レリ
古方ニ所使ノ朮ハ二朮ヲ通用セリ或聞古方ノ朮ハ皆白朮ナリト
時珍云古方ニ朮通用ト頌云古方所用朮者皆白朮也ト蓋古人
ハ只朮トノミ云テ二朮ヲ通用ス陶隱居以來始蒼白ヲ別用ユ彼

陳皮青皮ノ例也補中益氣除濕好古曰白朮入手太陰少陰足太
陰陽明少陰厥陰六經ト愚案ニ朮ハ中焦脾胃ノ聖藥足太陰足
陽明ノ劑タリ李士曰白朮得中宮冲和之氣故補脾胃之藥更無
出其右者ト白朮ハ全其温ニ非ス微其微苦ノ微温ナリ能中焦ヲ
補ヒ元氣ヲ益濕ヲ除蓋補中益氣ハ氣味ノ其温ヲ以テナリ其ハ土
ノ味温ハ寒熱ノ中氣ニシ中焦ノ所欲ナリ除濕ノ功アル者ハ氣
味ノ苦温ナルカ故ナリ内經ニ謂以耳緩之以苦燥之ノ義タリ
然凡補中益氣除濕ノ功中ニ於テ脾胃ヲ補ノ力勝リ其益氣除
濕ノ功ハ合用ノ劑ヲ以テ其力ヲ盛ニス人參黃耆ト合ノ能元氣
ヲ益茯苓ト合ノ能凡脾胃ハ中州ノ土タリ土ノ化ハ濕タリト
雖潤濕ハ土ノ本化萬物ヲ生養ス泥濕ハ土所惡ノ濕ニ土中ニ泥
濕在則物ヲ生化スルコト不能故ニ人ノ脾胃土モ亦少津液潤則能

官衛五藏ヲ生化ス此中焦所欲ノ濕也。若脾胃土或不足シ。或太過ノ陰濕中焦ニ盛ナレハ胃氣コレガ爲ニ阻ラレテ官衛五藏ヲ生化スルコト不能。此中焦所忌ノ濕也。白朮其濕ヲ除故ニ中焦補益ノ功ヲ致シ。補土ノ劑中必コレヲ不用ト云コトナレ。然凡白朮動スレハ中氣ヲ寒易シ。故ニ少ク陳皮ヲ加用ノ能中焦ヲ補和ス。何如トナレハ凡補者ハ必閉塞ノ意アリ。蓋閉則不散。塞則不泄。不泄不泄則能充滿スルニ至ル。是以閉塞ノ意アルニ非ハ何ニ從カ補益ノ功アラシヤ。故ニ白朮ハ能脾胃ヲ補益スルノ物タレハ中焦ニ閉塞レ易コト明ナリ。陳皮ハ苦辛ニ中焦順和ノ劑タリ。白朮補土ノ中ニ陳皮ノ苦辛ヲ兼テ順和則補ヘ凡閉堅メス滿レ凡不滯。補益順和ノ兩道ヲ兼テ補中ノ功盛ナリ。故ニ古方多ハ白朮陳皮ヲ並用者是ナリ。然凡陳皮ハ白朮ノ五分一ヲ用ユ。陳皮ノ苦辛順和ヲ用コト過則反テ白朮

補中ノ力ヲ薄ス。若中焦ノ虛甚者ハ陳皮ノ順和反テ白朮ノ補ニ害アリ。故ニ中虛甚ハ單ニ白朮ニシテ用ユ。白朮ハ中焦ヲ補テ微閉ノ義アリ。陳皮ハ中焦ヲ順和ノ微疎ノ義アリ。其閉與疎ノ意ヲ得則白朮陳皮合用ノ理ニ達スルコトアラシト云。或問元素謂非白朮不能去濕ト。然則白朮除濕ノ功勝タル者也。五字謂補中ノ力勝テ益氣除濕ハ合用ノ劑ニシテ其力ヲ盛ニスルハ恐ハ元素所謂ノ説ト反スルニ非ヤ。曰小反。白朮實ニ除濕ノ力勝ト雖然ノ濕ニ天人ノ二辨アリ。曰天造濕。曰人爲濕也。天造濕ハ雨露水川等ヨリ所受ノ者ナリ。人爲濕ハ多ハ飲食ヨリ受之。故ニ天造濕ハ皮肉ヨリ始ル。人爲濕ハ中焦ヨリ始ル。元素謂非白朮不能去濕トハ中焦脾胃ニ生スル人爲ノ濕ヲ主トシテ予所謂人爲之除濕之功盛也トハ一切ノ濕ニ通用スルノ功ヲ云ノニ。且濕ニ寒濕濕熱アリ。白朮能中焦ノ寒

濕ヲ除ノ要藥タリ。或中焦不足ノ濕熱ヲ除ト雖其功寒濕ヲ除
ニ次者ナリ。夫白木ノ主功本根ヲ厚則味甘ヤ中焦ヲ補ヒ中氣ヲ
持苦ヤ中焦ノ濕ヲ除ク補土除濕ノ兩功勝項ナキガ如トイハレ
補土ノ力盛ニテ除濕ノ力次之者ナリ。今ノ時師ハ譜ラク白木ノ主功
ハ惟除濕其脾胃ヲ補ノ功モ亦除濕ヨリ致トスル者ハ真説非ス
治風寒濕痺痺ハ後世ニ謂白虎歷節痛風也。其症風寒濕ノ三邪
交合ノ宮衛ヲ閉澁スルニ因テナリ。其中風勝者ヲ風痺トシ寒勝
者ヲ寒痺トシ濕勝者ヲ濕痺トス。脾胃盛則宮衛ノ運行モ亦盛ニ
メタトヒ風寒濕ノ三邪襲コトアリト云レ閉澁留滯セシメテ諸痛
ヲ致ニ不及若脾胃虛則宮衛ノ運行モ亦不順ニメ彼ニ邪乘虛閉
澁留滯セシメテ遂ニ諸痛ノ症ヲ致ス。故ニ白木ヲ以テ脾胃ヲ補益シ
寒濕ヲ除則諸痺自安レ白木能除濕則尤凡濕痺ヲ療スル功盛

ナリトス。止汗一切ノ汗ヲ止ニハ非ス。彼中焦虛熱ノ且濕氣脾胃
ノ間ニ在者。濕熱肌肉ニ薰ノ自汗スルコトアリ。白木ヲ以テ中焦ヲ補
ヒ濕ヲ除則虛ニ生スルノ濕熱自去テ汗出ノ患ナレ。黃耆ノ止汗ハ直ニ
閉表也。白木ノ止汗ハ中焦不足ノ濕熱ヲ去ハナリ。除熱中焦脾胃不
足ノ虛熱ヲ除ク。諸熱ヲ除ノ劑ニハ非ス。前ノ參耆ノ除熱ト同レ。寒
垣謂陰火乘脾胃ノ熱ナリ。脾胃不足スルニ元氣不足ス。元氣不足
則虛熱從テ生ス。此熱ヤ涼寒ノ劑ヲ以テ直ニ清解スレハ寒劑其元
氣ヲ擊テ虛熱ナク燻ナリ。惟白木參耆ノ藥ヲ以テ脾胃ヲ補ヒ
元氣ヲ益則熱火自退コトヲ得ナラ前ノ人參ノ條ニ詳ナリ。消食消
食ノ義兩辨アリ。直ニ消食物アリ。直ニ雖不消食脾胃ヲ補ヨリ消
食者アリ。神麴麥等ノ宿食ヲ消化スルハ直ニ其宿滯ノ食ヲ消者
也。白木ノ消食ハ不然中焦不足ノ食飲ヲ消化スルコト不能故ニ食滯

ヲ致者アリ。如^キ此ハアチニ食飲ヲ太過セルニアラサレ。常ノ飲食中
焦ニ宿滯^レ。或ハ微^ニ食飲ノ常道ヲ過^ハ。即^チ宿食ト成テ病ヲ致ス。此ニ
神麴麥芽等ノ直^ニ宿食消化ノ劑ヲ用^ル。則^チ反^テチ中焦ヲ損傷ス。故
白朮ヲ以テ^テ其脾胃ヲ補^フ。テ中氣^ヲ健^ルナルトキハ食飲自^ラ消退スル者
ナリ。然^レ則^チ白朮ハ直^ニ消食ノ劑ニハ非^ズ。惟^テ脾胃ノ虛ヲ補^フ。自^ラ食滯ヲ
消化セシム。消食ハ補中ノ餘力ナリ。故^ニ飲食過飽ノ宿食中宮ニ盛^ニ
中氣未^ダ傷者ハ白朮ヲ勿^ク用^フ。反^テ食滯ヲ^テ滿悶^ヲ加^フ。麴麥ノ類ヲ
以テ直^ニ消化スヘシ。若^シ或^ハ中焦不足ノ宿食ト雖^モ食滯盛^ニ。之^ヲ痞滿スル
者ハ白朮ニ少^ク枳實ヲ合用^シ。白朮ヲ以テ脾胃ヲ補^フ。枳實ヲ以テ宿
食痞滿ヲ消^ス。宜^トス。元素カ枳朮丸是^{ナリ}。乃^チ名^ケテ虛中ノ實症トス。
白朮ハ暖^ク中燥^ク濕^クノ劑タリ。暖^ク則^チ食消^シ。燥^ク則^チ飲消^ス。雖^モ直^ニ消食ノ
劑ニハ非^ズ。蓋^シ白朮ハ補中ノ力盛^ニ。且^チ閉塞ノ意アルトキハ動^ス。ハ食

飲ノ邪ヲ補任^シ。易^シ。惟^テ補中ノ餘^ニ消食ノ功アリ。ト覺^ル。則^チ過^{コト}アル
コトナシ。去^ク痰^ヲ。痰^ハ津液本^ト根也。行^テ順^{ナレ}。津液也。若^シ此^ノ滯留^ス
ルトキハ痰飲ト成^ル。其^ノ行^ト滯^ト俱^ニ中焦脾胃ノ致^ス所ナリ。中氣健^ニ
轉^ル。則^チ升降氣道能^ク順行^シ。津液流通ス。何^ノ痰^ト云^フコトカアラ^ズ。若^シ脾胃
不足^ノ中焦不^レ運^トキハ。升降氣道順行^セズ。津液留滯^レ。遂^ニ痰飲
ト成^ルコトヲ致^ス。且^チ痰^ハ津液ノ留滯タルトキハ。即^チ濕化^ニ屬^ス者ナリ。故^ニ
白朮ヲ以テ脾胃ヲ補^フ。テ中焦ヲ健^ル。轉^レシメ。又能^ク濕氣ヲ除^ク。則^チ痰
自^ラ退去ス。然^レ凡^ソ濕痰燥痰涼痰熱痰ノ不同アリテ。白朮ハ諸痰ノ通
劑トハ決^シ難^シ。惟^テ濕痰涼痰中焦不足ノ虛痰ヲ主治^ス者ナリ。陳皮
ト合^シテ除痰ノ功ヲ盛^ニシ。半夏ト合^シテ能^ク濕痰ヲ燥^ス。スニ至^ル。逐^ス水腫
水濕ヲ逐^ス去^リ。テ水腫ヲ治^ス。蓋^シ水腫ノ本^ハ腎ニ屬^ス。脾胃ハ土ニシテ水ヲ
尅^ス勝^ス者也。脾胃土健固ナレバ水氣溢^{コト}ナク。脾胃氣盛ナレバ皮與肉

和語本草卷之三

親者テ水ヲ分肉ニ注シ允コトナレ。若脾胃不足則水濕ノ邪侮溢
テ中宮ニ乘レ。分肉ニ注テ水腫ノ病ヲ致ス。彼地中流行ノ水ヤ。堤土
鞏則水溢テ堤外ニ注ガ如シ。脾胃土ハ防水ノ堤ナリ。此ガ虚ナル從
テ邪水溢テ水腫ト成。白木ヲ以テ脾胃土不足ヲ補益シ。中焦ノ
客濕ヲ除則水氣自主氣ノ堅固ナルニ逐レ防ガレ。腫病消退ス。逐
トハ王君水ノ意ニ似タリ。直ニ利水ノ劑ト覺ヘカラス。治水腫モ亦
補中除濕ノ餘力也。然凡水腫症ニ虛實ノ兩辨アリ。中焦脾胃土
將結太過ニ因テ水液ヲ防止テ水腫ヲ致者アリ。彼堤坊妻ニ防
止テ水流反テ溢ガ如シ。如此者悞テ白木補土ノ藥ヲ施則水ナ
ラ溢滿コトヲ致ス。惟平胃利水猪苓澤瀉等ノ劑ヲ用テ中焦ノ太
過ヲ平治シ直ニ其水ヲ通利ノ愈コトヲ致ス。若或中焦不足ノ水腫
ト雖邪水ノ溢滿盛ニシテ白木ノ補土除濕ノ力ニ不及者ハ少導水ノ劑

ヲ兼モ亦權道ナリ。世ニ仲景五苓散ニ白木ヲ用テ利水ヲ見テ謂
白木ハ直ニ通水ノ藥トハ謬説ナリ。凡土能水ヲ尅スト雖亦土ニ
非ハ水行コト不能。故ニ水土ト躰ノ説アリ。是以仲景五苓散ニ白
木ヲ用テ蓋脾胃ヲ補ヒ濕ヲ除テ土堅固則水能流通スルノ義ニ
從直ニ利水ノ劑トソ用ルニ非ズ。利水ノ劑ノ佐ナリ **利腰臍間血** 夫
心ハ生血肝ハ納血脾ハ一身ノ血ヲ總統者也。腰臍ノ間ハ血液所行所
腋ノ分野也。故ニ白木ヲ以テ脾胃ヲ補養ノ中氣健則血液ヨク流
行ノ瘀血ノ滯留スルコトナレ。是以白木ハ腰臍間ノ瘀血ヲ利スル功ヲ
發ス。此モ亦補中ノ餘力也。本草滙曰。脾胃統一身之血而腰臍乃其
分野也。藉其養正之方而瘀血不敢稽留ト。養正ハ中焦ノ正氣ヲ養
ノ義ナリ。 **温中** 温ハ温養ノ義ナリ。桂附等ノ如ニ直ニ温熱セシムルノ
劑ニ非ズ。右ニ辨スルガ如ク。白木性温トスルノ説アリト雖詳ニ此ガ性

和語本草 卷之三 白木

功ヲ察スニハ全温者ニハ非ズ。微温ナリ者ナリ。夫温藥ハ直ニ寒涼ヲ
ノ温ナラシム。微温者ハ直ニ温ナラシムト云フニハ不至。然レ久々ニ用
テ積テハ自温ナラシムルニ至ルベシ。故ニ速ニ中焦ヲ温ムコトヲ欲ス
ルニ於テハ白朮ノ所不能也。脾胃不足ノ微寒者ハ白朮ヲ用テ中焦ヲ
補益スルコト久則其微温ヲ積テ漸ニ温中ノ力ヲ發ス。若シ焦
虛ノ寒大者急ニ温補センコトヲ欲セバ。姜桂ノ類ヲ合用シ可ナリ
トス。且世ニ謂白朮ハ燥劑タリト。此モ亦謬ナリ。蓋白朮ノ性温ニシ
テ除濕ノ功アルヲ以テナリ。然レ白朮微温ニシテ全温ナラス。除濕ノ功アリト
雖アチカチ強テ燥劑トスルノ燥ニ不至。故ニ本草家ノ諸説ニ謂白
朮除濕ト別録云益津液ト。元素曰生津止渴ト。白朮ハ本燥劑ナ
ラサルヲ以テ除濕ト云テ燥トイワス。若シ其燥タラバ何シ生津止渴
ノ功アルンヤ。世ニ白朮ヲ以テ燥劑トスル者ハ本草准ヨリ始メ之。准ノ

書善ト多ト雖亦或不詳ノ義ヲ著ス。孟子謂盡信書則不如無
書ノ意知ヘシ。或問吾子謂白朮惟除濕ヲ燥ニ非スト。別録元素ノ
謂生津止渴ヲ以テ證トスルトキハ。白朮ヲ以テ潤劑トスルカ。曰白
朮ハ不燥不潤。惟除濕ノ劑トスベシ。然レ除中ニ自微燥ノ意ヲ存ス
ト雖強テ燥劑トスル程ノ燥ニ非ズ。故ニ半夏ト合シ能濕痰ヲ燥ニ
至ル。或四君子湯ニ於テハ人参ノ温茯苓ノ淡ニ合シハ燥濕ノ力アリ。
故ニ甘草ノ新津ヲ加テ燥ヲ防此皆合用ノ劑ニ從テ燥濕トナル
コトアリト雖單ニ白朮ノミヲ以テ燥劑トスル程ノ燥アルコトナシ。又生
津止渴ト云ト雖白朮直ニ津液ヲ生スル潤劑ニモ非ズ。中焦ハ津液
氣血ノ家ナリ。白朮ヲ以テ脾胃ノ氣ヲ補則氣液ヨク周流シ津液
テ滯止且濕ハ此停滯ノ氣ナリ。中焦ニ濕アル時ハ氣液其濕滯ニ
留ラレテ亦周流スルコト不能遂ニ渴ヲ致ニ至ル。白朮中焦ノ濕ヲ

除則氣液運行ノ渴ヲ潤ス故生津止渴ノ功ヲ云李士云元素謂其
生津止渴者濕去而氣得周流而津液生矣下此說實三可也酒云
白木性本燥本草言其生津者蓋脾惡濕濕勝則氣不得施化津何
由生故膀胱津液之府氣化則出今用木以燥之則氣得周流津液
亦隨氣化而出矣下此說モ亦是ナリト雖多燥字ヲ以辨者恐ハ
理ニ於テ小合ト入白木潤劑ナラザレバ中氣ヲ補益スルヲ以テ故ニ
氣津流化ノ力ヲ致スニ茯苓ハ淡滲利水ノ劑ニ燥藥ニ近ト雖本
草家ニ多ハ謂茯苓能生津液下亦コノ意ナリ**進食脾胃虛ノ不**
食者中焦虛ノ濕氣胃ニ滯ノ不食者皆白木ヲ以テ補中除濕則
安レ或中焦實ノ不食ハ反テ白木害ヲ致ス然レ白木ハ微閉ノ義
アルヲ以テ進食ヲ欲者或陳皮ヲ加用ノ可ナリ此白木ノ補益下陳皮
ノ順和ト相兼テ能進食ノ功ヲ致ス**療脹滿** 脹滿ノ症實虛ノ別辨

アリ實滿者ハ絶ニ白木ヲ用コト勿レ惟中焦虛ノ升降不順濕痰其
間ニ在テ脹滿ヲ致者ハ白木ノ善主治スル所ナリト常ニ脹滿者ヲ
視ニ實脹ハ枳ノ虛脹症尤多シ其實脹者ト雖中氣ノ疲ヲ不兼ハナ
シ苟中氣全健ニシ何ノ脹滿ト云コトカアラン故ニ張家白木ヲ恐ル者
希ナリトス**利水** 前ニ辨スル如ク白木ハ直ニ小便通利ノ劑ニ非ト
雖水土ハ一類氣水ハ合一ニ土堅固ナレバ水能流氣健テハ水能通
ス故ニ白木ヲ以テ補中除濕益氣則脾胃土堅固ニ氣行健ニ小
水能通利スルナリ此モ亦脾胃ヲ補ヒ除濕ノ餘力ナリ直ニ通水ノ
劑ト覺ヘカラス右ノ逐水ノ條ト參考スヘシ**安胎** 李士本草通
玄曰安胎者除胃中熱也下愚察ニ此說不是白木除胃中熱者ハ
一切ノ胃熱ヲ除ニ非ス胃中ノ虛熱ヲ除也然則此通例ノ義ニテ
ラス余竊ニ考ニ見ノ母腹ニ在マ母ノ中焦水穀ノ氣液其胞衣臍帶

和語本 卷之二十一 三十一

二注ニ此ヲ育母ノ管衛外ニ行テ胎ヲ養フ。管衛モ中焦水穀ノ精
脾ノ氣也。故ニ母ノ中焦不足則水穀ノ氣液管衛ノ行皆不得。其胎ノ育養不得常遂ニ胎動ノ不安也。壁土不堅則木根不治ノ
動搖スルニ似タリ。故ニ白朮ヲ以テ中焦ヲ補則水穀ノ精氣管衛
ノ行盛ニ能養胎。胎養治則何ノ動ト云コトアズ。或中焦不足
生濕濕下焦ニ流テ胎動ヲ致者モ白朮ノ補中除濕ニ宜キ者也
止霍亂吐下 霍亂ハ病名吐下ハ病症ナリ。上吐シ下瀉シ吐瀉同時
ニ病ヲ名テ霍亂ト云。夫脾胃土ハ中州ニ位ノ上下升降ノ間ニ居
者也。故ニ中州病則下氣不升ノ瀉シ上氣不降ノ吐ス。是以霍亂吐
瀉ス。白朮ヲ以テ脾胃土ヲ補テ中氣健テレハ升降能通ノ濁陰ハ
下降シ清陽ハ上升ス。濁氣降則吐止清氣升則瀉止。故ニ吐瀉者ハ
白朮ヲ鉄ヘカラス。若或食飲中焦ニ塞ニ吐瀉者ハ消食ノ劑ト相

兼テ用之。治反胃反胃ハ食不消ノ即吐ス。此專脾胃ノ虛寒ニ因
ノ。故ニ白朮補中暖胃ノ劑ニ宜シ。**躰重** 脾胃不足ニ生ス。蓋脾胃ハ
手足肌肉ヲ王者也。故ニ脾胃虛則手足倦怠シ肉氣不行。且脾濕
肌肉ニ注テ形躰重コトヲ致ス。白朮ノ補脾胃除濕ニ宜キコト明シ
心下急滿 中氣不健ノ濕容中焦ハ濁痰填膈心下急迫痞滿ス。白
朮ヲ以テ中氣ヲ健ニシ。濕ヲ除則濁痰自去テ急滿去然。凡或中焦
ノ實滯。或氣分ノ鬱實ニ因テ心下急滿者ハ白朮ノ主治スル所ニ
非ズ。**臍腹痛** 臍腹ハ中焦ノ分野ナリ。若中焦ノ不足ニ因テ痛者
ハ宜用白朮。胃ノ實滯ニシテ痛者ハ不宜用之。**長肌肉** 肉ハ脾ノ主
ル所也。故ニ脾胃虛則其氣ヲ肉ニ滿シムルコト不能ノ羸瘦ス。然則
白朮補中ノ劑ヲ以テ豈肌肉ヲ長セザラシヤ。**補內傷** 飲食勞倦ハ
內傷ノ病。皆脾胃ノ不足ニ因。故ニ白朮ハ參茸草補中ノ劑ハ一切

和語本草 卷之三

内傷脾胃虚ノ聖藥トス。人參ハ胃元氣ヲ補自來ハ
脾胃土ヲ補甘草ハ脾胃ヲ令得中和德者ナリ

總藥

白木

ハ惟脾胃土ヲ補ヒ除濕ノ良藥也。此カ主治ノ能多ト雖皆補中除
濕ノ餘カヨリ致ス。元素白木ノ主功ヲ九ニ辨ノ謂温中一也。去中
濕二也。除胃熱三也。強脾胃進食四也。和胃生津五也。止肌熱六也。
治四肢困倦嗜臥目不能開不思食七也。止渴八也。安胎九也。然
此此惟補中除濕ノ一根ヨリノ如此ニ主治ノ品ヲ多ス。好古説ニ白
木ハ上ニメハ皮毛中ニメハ心胃下ニメハ腰膈ヲ療スト雖此カ所入ノ本
官ハ中焦脾胃ニ在也。脾胃ハ中州其氣ヲ四方ニ注者ナリ。故ニ白
木能中焦ヲ補則其力上下内外ニ不及ト云所アルコトナシ。本草滙
曰。白木安脾胃之
神品ト。尤是ナリ

使藥

防風地榆ヲ使トス。少陳皮ヲ加テ善脾
胃ヲ補和ス。枳實ト合テ補脾胃消痞

滿黃芩ト合ノ屬熱安胎動甘草ト合ノ補脾

胃除濕亦不燥乾姜ト合ノ中焦ノ寒濕ヲ去

毒

白木ハ中焦ヲ補
其補所以ハ中

氣ヲ留閉トナリ。故ニ脾胃實滿ノ者。胃中實熱ニテ不食者勿用之
○腎虚ノ逆氣攻於下ニ動氣アル者勿用之。蓋白木閉氣カ故
ナリ。○劉涓子癰疽論曰。潰癰忌白木以其燥而閉氣又生膿作
痛也。愚案ニ白木實ニ閉氣則生膿作痛ノ義。或是アラス。然癰
疽甚ソ脾胃既ニ虚衰シ營衛不足スルニ至テハ參朮ニ非ハ此ヲ補
助スルコト不能。彼ハ八珍湯大補湯益氣湯ハ癰疽補虚ノ主劑ニ非ヤ。
其方皆白木ヲ以テ君臣トス。若其劉氏カ論ノ如ナラバ癰疽虚ヲ
補ニ於テハ八珍大補益氣湯等ヲ用ル。白木ヲ除去テ可ナリトスル
次ハ八珍大補益氣湯等ノ白木ヲ去ハ何ニ由テ其補益ノ功ヲ又シ
ヤ。不思ノ其也。或潰癰用白木宜サト云ハ可ナラン。思之ト云者ハ恐

和語本草
卷之三

ハ不可ナリトス。且劉氏謂燥腎ノ義モ亦是ナルニ非ズ。詳ニ後ノ愚案ニ見タリ。

畏惡

桃李。松葉。雀肉。青魚ヲ忌。

附方

枳朮丸 白朮一兩土炒ニス。枳實一兩麩炒ニス。右味トシテ
薄荷ノ煎湯ヲ以テ燒タル飯ニシテ丸スルコト。梧子ノ大毎
服五十丸。白湯ニテ服ス。消痞強胃。久服スレハ善食ノ不滯也。若中
氣尚滯セハ陳皮一兩ヲ加。胃火アラスハ加黃連一兩。濕痰盛ニハ加半
夏一兩。胃寒セハ加乾姜五錢。木香三錢。宿食アラスハ加神麩麥芽
各五錢。紫古製。白朮膏 脾胃虛ノ久瀉。久痢ヲ治ス。白朮一兩切。剉
鍋内ニ入テ水ニ浸過コト二時。不緩不強火ヲ以テ煎半。分渣亦如此
ニ煎ス。煎スルコト總テ三度。其汁ヲ合シ。熬膏入器。一夜ノ明日清
水ヲ傾去。收置。每服二三匕。蜜湯ニテ下ス。出千金良方。參朮膏補脾
胃虛。益元氣。白朮一斤。人參四兩。剉テ流水十五碗ニ浸コト一夜ノ

煎藥ノ不緩不強火ニシテ濃煎シ。汁ヲ取テ熬膏。煉蜜ヲ加入ノ收置
以白湯點服ス。出集簡方。温白丸 小兒脾虛ノ久瀉シ。米穀不化。飢
食不進ヲ治ス。白朮半夏各二錢半。丁香五分。烏末。生薑ヲ合タル
麩糊ヲ以テ黍米ノ大ニ丸シ。米飲ニテ用。出全幼心鑑。寬中丸 脾氣
不和。冷氣中焦ニ壅テ脹滿スルヲ治ス。白朮二兩。陳皮四兩。烏末。酒
ヲ合タル糊ニシテ梧子大ニ丸シ。食前ニ木香湯ヲ以テ服ス。出指迷方。
或濕或暑ニ因テ泄瀉者 白朮。車前子等分炒末シ。白湯ニテ二三錢
ヲ服ス。出簡便方。面ニ黥點多ノ雀卵色ノ者 醋ニ白朮ヲ漬テ日人
拭之。神效アリ。牙齒日ニ長。漸難食者。髓溢病ト名ク。白朮一味煎シ
漱服ス。出備急良方。吃力伽散 婦人血虛。小兒脾虛ノ蒸熱羸瘦。不
能飲食者ヲ治ス。白朮。白茯苓。白芍藥。各一兩
甘草半兩。為散。生薑大棗煎服ス。出外臺秘要。

愚案

吳門直宜曰。凡積皆

屬陰世人但知木能健脾不知此蓋指脾為正邪所干故曰補也。寧知脾虛無濕者用之反致燥竭脾家津液是損脾陰也。何補之有。木低陰虛燥渴少血骨蒸痰嗽喘喘唇燥咽塞便閉帶下肝腎攻築腰滿動氣者。切須忌之。馬宗素曰。白木雖除濕燥劑。トスル程ノ燥ニ非ス。何燥腎燥血ノ恐アラシマ。夫濕ハ停滯壅遏ノ氣脾胃ハ精血津液ノ家也。若脾胃虛ノ濕滯アル時ハ精血津液何ニ由テカ生化流通スルコトアラシ。白木ノ補中除濕ハ反テ精血津液ヲノ生化流通セシムルノ佐トスヘシ。古人謂補腎不知補脾ノ意ト同シ。且脾虛ス凡無濕者ニ用ハ損脾陰トセバ白木ハ一切ノ脾胃虛ヲ補聖藥トシ難シ。諸藥ノ中ニ於テ補元氣者ハ人參ニ勝ハナシ。補脾胃者ハ白木ニ越ハナシ。若脾虛ノ無濕者白木ヲ恐忌ハ何ノ物ヲ以テカ其脾虛ヲ補フトセン。由テ考ニ脾虛ノ無濕者モ脾虛ノ燥者モ俱ニ白木ニ非ハ其中虚ヲ

補不足。若脾虛ノ無濕者ハ甘草當歸等ト合ノ白木ヲ用ユ。脾虛ノ燥者ハ生血潤液ノ劑ト合ノ白木ヲ用ユ。何ノ忌之ノ義アラシマ。ハ珍湯ニ白木地黃ヲ用。益氣湯ニ白木當歸ヲ用モ亦此意ナリ。或問好古曰無汗則發有汗則止與黃耆同効ト然ヤ否ヤ。曰黃耆ハ表氣ヲ補ヒ白木ハ裏氣ヲ補其發汗止汗ノ功モ亦補中ノ餘力也。脾土虛ノ肺金ヲ不生皮肉疎之有汗者或脾土虛ノ肺金ヲ不生陰火乘之皮肉焦熱ノ無汗者皆白木ノ所主ナリ。然凡汗ヲメ或止或發スルハ單ニ白木ノミヲ用テ効サレ。黃耆芍藥等ニ合メ善止汗サ辛散ノ劑ヲ加入メ善發汗ヲノミ。蓋白木ハ中宮中氣ノ品ニ偏奇ナラス。故ニ血藥ニ合メ補血ノ佐トナリ。氣藥ニ合メ補氣ノ力ヲ加好古曰在氣主氣在血主血ト然凡補氣ノ助ニ厚メ補血ノ佐ニ薄シ。惟白木ハ氣血二閉氣除濕ノ良藥トシ他ハ皆此方餘力ナルコトヲ知ハ効ヲ致スト盛ニ

本草綱目卷之二十一 補中 白木

ノ過ルコト
ナカルベシ

修治

白木蒼木本一類ナリ。其苗葉根ノ形多氣
味微不同コトアリテ。各治功ヲ異ニス。蒼木
ハ色蒼黒シ肉ハ白。形老莖ノ如シ。堅骨アリ。白木ハ色白ノ指ノ太
ノ如ク。形太鼓ノ槌ノ如シ。柔ナリ。大ナルハ拳ノ如ク。小ナルハ
藥店ニ誤テ白木ヲ蒼木トシ。蒼木ヲ白木トシ。或老根ヲ以テ蒼木トシ。
嫩ヲ以テ白木トシ。或蒼木ノ中ニ白木ヲ雜エ。白木ノ中ニ蒼木ヲ雜テ
不正或謂和ノ木ハ皆蒼木ニシテ白木ハ本朝ニテハ皆誤也。白木
與蒼木俱ニ吾朝ノ處ハ山中ニ多有之。二木俱ニ苗ノ高二三尺。或
一三尺。其葉抱莖生シ。稍ノ葉ハ棠梨葉ノ如ク。根ニ近キ葉ハ三五
又アリテ皆鋸齒小刺アリ。白木ハ葉稍蒼木ヨリ大ニ毛アリ。他
ハ皆蒼木ニ同シ。雖其根ノ形色右ニ辨スルカ如ク。大小堅柔蒼白
ノ異アリテ蒼木白木ヲ別。彼老嫩ヲ以テ蒼白ヲ分者ハ非ナリ

○米泔水ニ浸コト二夜ノ土氣ヲ洗去。藥店ノ者多ハ粗皮ヲ削出ス。
如此ハ其儘剉日ニ乾ノ炒用。若粗皮ヲ留者ハ粗皮ヲ削去テ剉日ニ
乾ノ炒用。脾胃ヲ補。トシ盛ニセント欲セハ東壁土ニ雜炒。蓋土氣
ヲ借テ脾胃ヲ助ントス。東壁土ハ東方ニ向ノ壁也。此常ニ朝日ノ陽光
ヲ受ガ故也。○東壁土ニ合ノ炒。則土末相雜テ難釋。故予家傳ノ法
アリ。東壁土ヲ以テ丸水ヲ滴テ粘レ。龍眼ノ大ニ丸テ。數十丸。白木ニ
合ノ俱ニ炒用。則土氣然能。白木ニ移テ。且土末紛雜スルコトナレ。或脾胃
胃ヲ潤補スル劑中ニ用。之則蜜水ニ浸ノ炒用。或乳汁ニ拌テ炒使。
或中焦不足ノ懸痰ヲ去ノ劑。或中焦ヲ補ヒ胃氣ヲ行ス劑中ニハ
生薑汁ニ浸炒用。方ニ從ベシ。和唐和木ハ性味緩和ナリ。唐木ハ
氣性強シ。故ニ緩治ハ和木。急治ハ唐木ニ宜シトス。川白木。近於川
白木ト名。一種ヲ渡ス。本綱謂削木片木是也。藥力薄シ。然凡亦和

和唐和木
川白木

木ヨリハ其氣味勝タルニ似タリ

木 蒼



苦微辛温。○除濕健胃散風發汗治風
寒濕痺。主頭痛消痰水逐皮間風水結
腫除心下急滿腹脹腹痛止霍亂吐下
暖胃消穀進食治嘔泄冷痢濁帶腸風

大風痲瘋諸瘡諸毒除寒熱惡氣弭山嵐瘴氣災沴△此木赤黑蒼
色故二蒼木ト名ク。白木ノ條ニ辨スル如ク。古ハ蒼白ノ別ナレ陶隱居木
高兩ト云ヨリ始テ二木ヲ別白者ヲ貴赤黑者ヲ蒼木トシ至能ヲ異
ヲ異之也。除濕白木蒼木俱ニ去濕ノ良藥タリト雖。白木ハ其氣味
辛烈ト云ケルカ故ニ除濕ノ功柔ク燥ト云程ニハ不至也。蒼木ハ其氣味
辛烈ニ強シ故ニ燥濕ノ要藥タリ。宗奭謂蒼木氣味辛烈白木不烈
ト。李士曰蒼木其而辛烈性温而燥ト。夫蒼白ノ二木ハ本ト類ト雖

其氣味不同コトアリ。白木ハ其微温也。故補中ノ功盛也。蒼木ハ苦辛
ニ其氣烈其性全温也。故燥濕開胃口且達表發汗ノ強効アリ
テ補中ノ功ハ懸ニ白木ニ劣リ。是以補中ノ劑ハ白木ヲ主トシ燥
濕開胃中焦ノ大過ヲ平クルニ於ハ蒼木ヲ主トス。通玄曰六低卑監
之土宜與白木以培之。敦阜之土宜與蒼木以平之。卑監土不及
ノ名則脾胃ノ不足ヲ指也。敦阜ハ土大過ノ名則脾胃濕土ノ亢實ヲ
指也。白木ハ中氣ヲ補テ不泄。蒼木ハ苦辛温苦ハ推テ疎シ辛ハ發
テ散スルガ故ニ中焦ノ大過結實ヲ平發ノ功ヲ得タリ。古方平胃散ニ
蒼木ヲ以テ脾胃濕土ノ大過ヲ平ノ要藥トスルモ亦此義也。健胃
時珍曰蒼木入足太陰陽明手太陰陽明太陽之經ト。愚案蒼木
亦白木ト同ク足太陰陽明脾胃兩經ノ藥タリ。丹溪曰蒼木爲足陽
明經藥。李士曰蒼木入脾胃二經ト。蒼木ハ白木ト同類タリト雖

其氣味柔緩ニ善脾胃ヲ補者也。蒼朮ハ氣味苦辛ニ烈シ。故ニ脾胃ノ濕ヲ燥シ。中焦ノ結實ヲ開散シ。脾胃ヲ健ニスルノ功アリ。健ニスルハ補益ト云程ノ義ニ非ス。惟中焦ノ濕ヲ燥シ。中焦ノ結實ヲ開散シ。脾胃土ヲ平ナラシムル時ハ脾胃自健ナルヲ云ナリ。震亨曰。蒼朮氣味辛烈強胃強脾發穀之氣ト是ナリ。胃ヲ開散セシムル時ハ穀食ノ氣ヨク中焦ニ發ス。木ハ直ニ中焦ヲ補ヒ。蒼朮ハ胃土ノ太過ヲ平テ健ニス。平與補不同。藥用スヘカラス。散風蒼朮ノ苦マ中焦ヲクワケ。辛マ發表出汗。故ニ風邪ヲ散スルノ功アリ。凡表ハ裏ヲ以テ根トス。中焦塞則表モ亦開コト不能。是以蒼朮ノ苦マ中焦ヲクワケル。辛味ノ開散スルヲ合シ。發汗散風。羌活ト合シ。能風濕ヲ散シ。葱白麻黃ト合シ。大ニ風寒ヲ散ス。皆蒼朮ノ辛烈ナルヲ以テ也。白朮ハ補中除濕テ散發ノ勢ナシ。蒼朮ハ辛烈ニ散發ス。故ニ補中

功ハ白朮ニ劣レリトス。發汗蒼朮ノ辛烈ナル。中焦ヨリ出テ皮ニ達シ。腠理ニ散テ發汗。故ニ發表ノ劑中ニ多用之。或問東垣曰。蒼朮能出汗。與白朮止汗特異。用者不可以此代彼。蓋有止發之殊。然ニ王好古白朮ヲ釋シ云。無汗則發。有汗則止。與黃耆同効ト。然則不問其故何ゾマ。曰。諸補者ハ閉塞ノ義アリ。閉則不泄。塞則滿。補益ノ功ヲ致ス。故ニ白朮ハ能中焦ヲ補益スルヲ以テ止汗ノ功アリ。然則亦或中焦虛シ。肉氣怯シ。出汗ニ不足者ハ白朮ヲ以テ中焦ヲ補テ裏氣ヲ滿シムル時ハ出汗ノ力ヲ致ス。彼黃耆ハ止汗ノ本藥タリト雖。或表氣怯虛ノ發散ニハ黃耆ヲ以テ反テ出汗ノ義ニ同。此皆補テ止汗ヲ本トシ。其餘ニ或ハ汗ヲ發スト雖。直ニ此が發表スルニハ非ナリ。故ニ此が要能トスル所ノ者ハ白朮黃耆俱ニ止汗ノ劑トス。蒼朮ハ辛烈直ニ發汗ノ功アリトキハ實ニ白朮與蒼朮止發ノ功異者也。不可混

治風寒濕痺 蒼朮燥濕發汗風寒濕ヲ散ノ能諸痺ヲ治スルノ要藥
トス 主頭痛 震_レ曰。蒼朮_ハ濕_ヲ上中下皆有_レ可用_ト然_レ凡_レ蒼朮_ハ辛
烈ナリ。中焦ノ本藥ニソ上行ノ氣壯也故ニ上部ノ風寒濕ヲ散シ。痰
鬱氣鬱ヲ解テ治_ル頭痛。李杲曰。蒼朮_ハ別有_レ雄壯_ノ上行之氣_ト是ナリ
消痰水 蒼朮_ハ善_ク燥_ク濕_ヲ故_ニ痰飲_ノ水_ノ留滯_ヲ消_ス功_{アリ} 逐皮間風水結腫
風腫與水腫不同 風腫ハ上躰ノ腫盛ニ_テ按_之窩_ヲ成_テ不起_ル此風
寒皮間ニ結滯シ。水其間ニ流_テ腫者ナリ。論疾診尺篇云。按_手足上
宵而不起者風水膚脹也。水腫ハ下躰ノ腫盛ニ_テ按_之隨_手腫起
直ニ皮裏ニ水ヲ裹_カ如_者此偏ニ水濕ノ邪。皮肉ノ間ニ結滯_ノ腫也
水脹篇曰。以_手按其腹隨_手而起如_裹水_ノ之狀_此其_候也。蒼朮_ハ
水濕ヲ燥_シ風濕ヲ散_シ。辛烈ニ_テ皮表ニ達_ス故ニ皮肉ノ間ノ風結水
結_ノ邪ヲ逐_テ諸腫氣ヲ治スルノ要藥トス 除心下急滿 白朮ノ除

心下急滿者ハ中焦不足スルガ故ニ濁陰不能降_ノ然_レ治_ス蒼朮
所治_ル心下急滿ハ中焦鬱結_ノ胃氣開通セザルガ故ニ然_レ除_ク
腰脹腹痛 蒼朮_ハ中焦ニ入_テ燥_ク濕_ヲ解_ク鬱_ヲ散_ク寒_ヲ開_ク滯_ヲ故ニ腰脹腹痛ヲ
治_ス。然_レ凡_レ中焦ノ虛脹虛痛_ノ者ニハ不宜用。若_シ或_シ用_之白朮ヲ主_ト
ノ_カ蒼朮ヲ佐_トス。多_ク用_{コト}勿_レ。本草匯云。腹脹痛必有_レ濕也。實邪
者用_之則邪散而濕除_即寬_ク。若_シ虛悶痛者用_之則耗_ク其_レ氣_血燥_ク其_レ精
液_虛火益_ク動_而愈_悶。不如_レ調_キ其_レ止_氣則悶_自是_而散_矣 止霍亂吐下
中焦不足スルガ故ニ升降不通_ノ霍亂吐瀉者ハ白朮ニ宜シ。中焦_ノ
結滯ニ因_テ升降不通_ノ霍亂吐下者ハ蒼朮ニ宜シ。尤_ニ中濕ノ瀉痢
ヲ治スルニ蒼朮ノ功盛也 暖胃消穀進食 蒼朮_ハ辛_ノ胃口ヲ開_キ温
ニ_テ胃ヲ暖_ム故ニ穀_ノ食_ノ積滯ヲ消_ス進_食然_レ凡_レ神麴麥芽等ノ直ニ消
穀_ト不同_レ彼_ハ直ニ消_ス穀_ノ食_ノ積滯ヲ消_ス。蒼朮_ハ惟_テ暖_ム胃_開消_ス穀_ヲ

神藥本草 卷之三 四十一

ヲ嘔消スルノ三 **治嘔泄冷痢** 嘔吐泄瀉ヲム消スルモ亦暖胃中焦ノ爵ヲ
煩シ寒濕ヲ散スルカ故ナリ是以屬冷痢病ニハ蒼朮ノ功尤大ナリトス
濁滯 小便赤白濁婦人ノ帶下諸因アリテ不同腎虛ヨリ致アリ脾
胃虛ヨリ生者アリ如此ハ蒼朮ノ主治スル所ナラス夫水ハ土ニ從テ行
且濕ハ濁テ重下故ニ中焦脾胃土ノ濕太過ノ下流スレハ小便因之濁
下焦因之濁液ヲ生シ遂ニ帶下小便濁ノ病ヲ致入此中焦濕土ノ本
過ニ屬シ蒼朮ノ主治スル所ナリ中虛下虛ノ者ハ妄ニ勿用之 **腸風** 本
便道ニ血ヲ下者腸風ト号腸胃ノ風濕ニ因テ下血者蒼朮ニ宜シ
若脾虛ノ不認血腎虛ノ血液ヲ不治カ故ニ下血者ハ不宜之 **大風** 本
風ハ癩病也風寒ノ邪經絡ニ壅リ皮肉ヲ腐シテ致者ナリ蒼朮
ノ風寒濕ヲ散シ其辛烈發汗ノ勢ヲ以テ大風ヲ療入 **瘰癧** 蒼朮ノ
辛温ヲ以テ氣血ノ爵ヲ解ニ功アリ故ニ瘰癧癧瘰ノ滯ヲ除ク **諸瘰**

諸瘰 瘰癧ハ足陽明胃ニ屬ルエト素問瘰癧論ニ詳ナリ且濕ハ物ヲ柔弱
ナシムルノ氣タリ故ニ諸瘰癧多ハ脾胃ノ濕ニ屬シ又筋骨經絡ノ濕
ニ屬ス是以蒼朮ノ脾胃ニ行去濕ヲ以テ之瘰癧症ヲ治スルノ功ア
リ丹溪曰徑入諸經疎洩陽明之濕通行欽齋大明曰治筋骨軟弱
諸爵 蒼朮ノ若ハ疎辛ハ開散入故ニ痰火濕食氣血ノ六爵ヲ解ニ宜シ
凡脾胃ハ中宮ニ位シ痰食氣血ノ家タリ故ニ中氣煩開則何ノ六爵ト
云コトアラン蒼朮ノ若辛能中焦ヲ煩開シ諸爵ヲ解ノ功ヲ出ス蒼朮
與香附俱ニ解爵ノ劑タリト雖其功不同蒼朮ハ中焦ノ諸爵ヲ開散
ノ升降ヲ通ス香附ハ氣爵ヲ煩散スルニ快ノ氣ヲ下ト最速者也
除寒熱 蒼朮辛烈ニシテ發汗故ニ寒熱ノ表邪ヲ除ニ宜シ然ニ表邪盛
者ハ蒼朮獨ノ力ニ不及宜ク發表ノ劑ト合用ユヘシ **惡氣** 一切不正ノ
惡氣ヲ除ニ勝リ詳ニ下文ニ見タリ **弭山嵐瘴氣** 災疹阻ハ止也

疹ハ陰陽ノ亂氣ヲ云。災疹ハ天地災患ノ疹氣也。瘡ハ山谷ノ間濕熱
 薰蒸不正ノ氣ヲ云。此山嵐ノ瘴氣也。蒼朮ハ一切不正ノ惡氣山嵐
 瘴疫天地災疹ノ氣ヲ去除ス。疫癘行ノ時。或歲且ニ於テ蒼朮ヲ燒
 則惡疫ノ邪氣其家ニ入コトナシ。張仲景下切惡氣ヲ辟ニ。赤木ヲ以
 猪蹄甲ト同燒烟ニ去之。赤木ハ蒼朮也。時珍曰病疫及歲且。人家
 往ハ燒蒼朮ヲ以辟邪氣。下晉朝ノ中都宣義坊。天神宮ニ於テ除夜ニ
 木ヲ求。民家燒之。烟薰シ。歲中ノ災疫ヲ除ト云モ亦此義ニ從乎。凡
 山谷濕熱薰蒸ノ地ニ往來シ。或山廟。或傳尸。疫癘ノ家。或得暑久雨
 ノ時。或人久不在。旧屋等ニ至者ハ皆必蒼朮ヲ燒烟ニシ其不正ノ
 氣ヲ辟ベシ。男ハ鼻竅ヲ薰。女子ハ陰戸ヲ薰ヨ。蓋疫氣ノ類ハ男ハ鼻
 竅ヨリ犯シ。女ハ下陰ヨリ入ハナリ。或不胃散能。山嵐不正ノ惡氣ヲ去
 モ亦蒼朮アルヲ以ナリ。蒼朮逐邪辟嵐瘴ノ功ニ長セルコト知ヘシ

總纂

蒼朮ハ脾胃ノ藥也。中焦ノ太過ヲ平ケ。且能濕ヲ燥ス。白
 朮モ亦除濕ノ劑タリト雖。彼ハ中焦除濕ノ藥トス。蒼朮ハ

辛烈ニシ皮膚ニ達シ表ヲ發テ汗ヲ出ス。故ニ蒼朮ハ中焦ノ濕ヲ燥シ善
 皮膚ノ濕ヲ散ス。陶節菴丸味羌活湯ニ蒼朮ヲ用ハ足太陽ノ濕熱
 ヲ燥シガ爲ナリ。仲景白虎湯ニ蒼朮ヲ用者ハ濕熱ノ表邪ヲ開發
 セシガ爲ナリ。蒼朮ハ脾胃土ノ太過ヲ平ケ。表濕ヲ散シ。醇ヲ解。邪惡
 ヲ辟ノ
使藥 葱白。麻黃ノ類ニ合シ善。分肉皮膚ニ至テ表ヲ散ス。
 要劑也 黃柏。牛膝ノ類ト合シ善。下焦ノ濕熱ヲ治ス。
毒 蒼朮ハ中焦ノ太過ヲ平者也。故ニ中焦ノ虛甚者ハ斟酌スベシ。○
 中焦燥結者。自汗盜汗多者。精血津液ノ燥耗者。陰分ノ虛火躁
 動者皆蒼朮ヲ用ニ宜カラス。蓋辛
畏惡 右ノ白
附方 食生
 烈ニ善燥シ善散スルガ故ナリ

和語本草 卷之二 四十一

食ノ暴。腸胃ニ滯ニ生蟲。善生米ヲ食テ。飲食ヲ不思。形悴色黃ヲ
治ス。蒼朮米泔ミヅ浸ヒコト一夜。剉焙キ爲末。蒸餅コシニ梧子キノ大ヲニ丸シ。每
服五十丸。食前ニ米飲ニテ用ユ。出揚氏經驗方。麴木丸。夏月ノ暴瀉
飲食傷ニ属者ヲ治ス。蒼朮米泔ニ浸ヒコト一夜。焙。神麴炒キ等分爲末。
糊シニテ丸シ。梧子ノ大ヲ。每服二三十九丸。米飲ニテ下ス。出局方。椒木丸
發泄久痢ヲ治ス。蒼朮二兩。川椒カ一兩爲末。醋糊シニ梧子キノ大ヲニ丸シ。
每服二十九丸。食前ニ温水ニテ下ス。惡痢久者ニ八角桂ヲ加。出保命集
眼目昏花ク。蒼朮半升。米泔ニ浸ヒコト七日。去皮切焙。木賊各二兩爲末。
每服一錢。茶酒ニテ下ス。出聖惠方。因風牙根腫痛。蒼朮鹽水ニ浸ヒ
燒キテ性ヲ存シ。研末シ。牙ニ搯ヒテ風熱ヲ去。出普濟方。臍蟲腹中鐵石ノ
如ク。臍中ヨリ水流。其水變蟲。身ヲ透キ。痒キ。掃キ。凡不盡。蒼朮ノ濃煎湯
ニテ洗浴シ。蒼朮ノ粉ニ麝香少許ヲ入。水ニ調服ス。出益奇疾方。

愚案

本草家ニ謂。蒼朮ハ皮表ノ濕ヲ去。白朮ハ中焦ノ濕ヲ去ト。
愚案ニ蒼朮白朮俱ニ中焦除濕ノ要劑タリ。白朮ハ補
中ノ功盛。ニシテ去濕ノ功ハ蒼朮ニ劣レリ。蒼朮ハ烈ク燥濕。且辛烈ヲ
以テ中焦ヨリ皮膚ニ達ノ汗ヲ發シ。善表濕ヲ散ス。豈蒼朮ハ表
濕ヲノミ除テ中焦ノ濕ヲ不除者ナランヤ。白朮蒼朮俱ニ能中焦ノ
濕ヲ除ト雖。白朮ハ中焦ノ濕ヲ除。凡表濕ヲ散スルコト不能。蒼朮ハ中
焦ノ濕ヲモ燥シ。表濕ヲモ開散ス。元素曰。蒼朮與白朮主治同。但比白
朮氣重而沈。若除上濕發汗功最大。若補中焦除脾胃濕力。少不如
白朮。腹中窄狹者。須用之。氣重而躄沈トハ白朮ヲ指除上濕發汗
トハ蒼朮ヲ指。腹中窄狹者。須用之トハ。蒼朮ノ功ヲ云。窄狹ハ俗ニ云。腹
スボル也。愚案スルニ。蒼朮ハ味苦辛。ニシテ其氣温烈。苦ハ疎。辛ハ開。テ
散ス。腹中窄狹ハ中焦ノ結。鬱收縮ニ属ス。故ニ蒼朮ノ苦辛温ヲ以テ開

疎寬發^分セシメテ宜^レス。此中焦ノ結實ニ屬スル者ヲ以テ云。若中氣
不足^分ノ不充^分ガ故ニ腹中窄狹ヲ致者アリ。如此ハ蒼朮ニ不宜其
辛温氣烈ヲ以テ反テ中氣ヲ充^分ケラシム。惟白朮ノ沉重ニテ中氣
ヲ補持^分シムレバ胃氣充^分中窄狹自快^分シ。一藥ニ腹中窄狹者ハ蒼朮
ニ宜^レトシ覺^分ヘカラス。且蒼朮白朮主治同ト雖。白朮ハ中氣ヲ不開^分ノ
補^分ヒ。蒼朮ハ中氣ヲ開^分テ表^分ニ散^分。

修治

糯米泔ニ浸^分コト二日。每
則二朮ノ所治^分豈同^分キ者ナラシヤ
ノ粗皮ヲ去^分剉^分干^分乾^分焙^分用^分ユ。或土炒^分ヲ油氣ヲ去^分モ良^分。土炒^分ノ法ハ
酢ノ白朮ノ條ニ見^分タリ。或^分脂麻^分ニ拌^分テ炒^分。或^分脂麻^分ト同^分蒸^分コト三次
ノ用^分コトアリ。脂麻^分ト同^分スルハ蒼朮ノ燥氣ヲ制^分センガ爲^分ナリ。或^分藥店
ニテ水ニ浸^分シ粗皮ヲ去^分出^分者ハ其儘用^分ベシ。或^分鹽水^分ニ浸^分シ炒^分テ用^分レバ下
焦ノ濕熱ヲ去^分也。○按^分本草^分淮^分ニハ糯米泔浸^分三日ト。通玄^分ニハ米

泔水ニ浸^分二日ト。和^分ノ修治^分纂要^分ニハ米泔水ニ浸^分コト春秋^分ハ二日。夏
ハ二日。冬^分ハ四日ト。愚^分カ家法^分ハ四時皆浸^分コト二日ヲ宜^分トス。泔^分ニ必^分
糯米泔ヲ以^分ス。時珍^分曰^分以^分糯米泔浸^分去^分其油^分トノ和藥^分ノ評議^分ハ
酢ノ白朮ノ條ニ見^分タリ

廣益本草大成卷之三

洛下 法橋 岡本為竹一抱子 撰

桔梗



辛微温。治胸脇痛、喉痛、鼻塞、胸膈滯氣、心腹滿脹痛、肺熱氣促、喘嗽、血結、嘔吐、肺部風熱、痰涎、驚癇、腎氣、口舌瘡、赤

目腫痛、肺癰、肺痿、排膿、下痢、消穀、利頭、身下一切氣、△桔ハ結也。此草ノ根。結實ニシテ梗直。故ニ桔梗ト名ク。按ニ其氣味辛微温ト雖。甄權曰。苦辛ト。時珍曰。當以苦辛ヲ爲是ト。故ニ本草ニ材ト謂。桔梗苦辛。氣輕味平。入肺經ト。好古モ曰。入手太陰肺經氣分ト。然則桔梗ハ味苦辛平ニシテ肺經氣分ノ主藥トスベシ。治胸脇痛。桔梗ハ輕浮シテ善升。諸藥ノ舟楫トス。譬ハ鐵石ノ重ト雖。舟楫ヲ得テハ水上ニ浮テ沉コト不能ガ如ク。大黃等ノ降沈ト雖。桔梗ヲ以テ引則下。沉コト不能也。

故ニ桔梗ハ能胸中ニ高ノ分ニ至リ。肺氣ヲ通利ノ胸痛ヲ治ス。凡胸
痛ハ屬肺。脇痛ハ屬肝。今茲ニ謂胸脇痛トハ胸ヲ主トシ云。胸痛甚
ノ其ガ脇ニ及テ痛ヲ云。此膈中肺分ノ塞滯ニ屬ス。故ニ桔梗ノ主治
スル所ナリ。咽痛 桔梗善高ニ升テ咽喉痛ヲ治ス。若咽痛甚キ者
甘草ト合用ノ宜。故ニ仲景少陰症ニ三日咽痛ヲ治スルニ桔梗甘草
ヲ用ユ。後人名テ其桔湯トス。實ニ咽痛ノ要藥此ニ勝者アルコトナシ。
前ノ甘草條ト參考ス。鼻塞 鼻ハ肺ノ主トス。故ニ鼻病ハ屬肺。
鼻塞者ハ即肺氣塞テ上部ノ不開也。桔梗ハ上肺ニ入テ肺氣ヲ開
下者ナレバ也。胸膈滯氣 桔梗ハ輕ノ能浮升。味苦ノ辛シ。苦ハ味辛
ハ開故ニ能胸膈滯氣ヲ利スル功アリ。朱肱活人書治胸中痞滿
不痛用桔梗枳殼取其通肺利膈下氣也。心腹滿脹痛 此モ亦心滿
痛ヲ主トシ云。心滿痛引テ腹脹痛ニ及者ナリ。夫桔梗ハ善升テ至

高ニ入ト雖反テ善氣ヲ下スノ功アリ。李士材曰按桔梗之用微其上
入于肺。肺屬主氣之機。故能便諸氣下行。世俗泥爲上升之劑。不能
下行。失其用矣。桔梗ハ升テ肺氣ヲ利ス。肺氣上ニ利則濁氣下降
スル。譬天雨ヲ降ト欲スル時ハ先必地中ノ水蒸氣ニ始ル。此地氣
ノ升コト盛ナルニ從テ地水引テ上ニ達スルガ故ナリ。升ルコト如此則
天必雨ヲ降コトモ亦盛ナリ。升則必降ノ理昭然アリ。是以桔梗ノ升
テ肺氣ヲ利者ハ善至高ノ氣ヲ降コト有コトヲ知ヘシ。濁氣下降
則心滿心痞。及心痛痞。桔梗善升テ降ス。一升一降ノ上下通則腹
脹腹痛痊。本草ニ治腸鳴別錄ニ利五藏腸胃。大明止霍亂。元素利
竅ト云者。皆升通ノ降ノ用ニ取ノミ。肺熱 滙曰。桔梗爲肺部引經
之要藥ト。其味苦辛ニノ疎散ス。故ニ肺部ノ鬱熱ヲ去。凡上焦鬱熱
者用之升散ス。一氣促喘嗽 呼吸氣促テ或喘或嗽者ハ皆上焦

肺分ノ氣結ニ屬ス故ニ桔梗ヲ用テ肺氣ノ結鬱ヲ開散ノ宜シ血結
血ハ從氣流行ス。氣ハ肺ニ屬者ナリ。桔梗ハ肺氣ヲ利スルノ要劑也
一用之肺氣利則血從テ流行ス。何ノ血結血積アラシマ。此皆皆皆皆
肺氣ヲ升通スルニ因ノミ。直ニ血藥ニハ非ス。嘔吐此モ亦桔梗ノ胸膈
ヲ利シ氣ヲ下ニ因ノ也。肺分風熱桔梗ハ發散ノ劑ニ非ト雖能肺ニ
上テ肺氣ヲ通利スルガ故。風熱ノ結鬱ヲ開通ス。蓋桔梗ノ苦ハ疎利
シ辛ハ開通スレバ也。痰涎痰涎ハ皆氣化ニ從氣滯則痰ヲ生ジ。氣
利則痰退。氣ハ屬肺。順下ヲ善。故ニ桔梗ヲ用テ肺氣ヲ利シ。胸氣下
降則氣道順行ノ痰涎自退。コトヲ致ス。凡肺中ノ痰鬱ニ宜。驚悸氣
小兒驚風。大人癩癩。恐悸等ハ皆肺心ノ病ニ屬ス。故ニ補氣補血去
痰等ノ劑ヲ用ニ桔梗ト合ノ諸藥ヲ善。上焦心肺ノ分。膈上へ行シ
ス。此舟楫ノ功ヲ以ナリ。○恐悸ハ恐悸スヘキコトモアラサルニ。妄動ニ

恐テ降スルヲ云。多ハ心肺ノ氣甚聚動ニ因也。口舌瘡赤目腫痛此モ
亦至高ニ行ノ功ヲ以ナリ。故ニ口舌ノ瘡止ラス。眼目ノ赤腫痛ニカ
ギラス。一切眼目口舌ノ病。高ニ在者ハ皆用之。效ヲ致ス。本草曰。凡頭
目口舌諸症一切主之。桔梗ハ諸藥ヲ載テ至高ニ至シメ。舟楫ト
ナルヲ以ナリ。且桔梗ハ升テ爵ヲ開キ亦ヨク降ス。口舌瘡赤目腫痛
多ハ氣ノ上鬱ニ屬ス。故ニ桔梗ヲ用テ其效アルコト知ヘシ。肺癰肺痿
排膿肺癰ハ中肺藏ニ癰ヲ生ノ膿血ヲ唾ニ出シ。口中臭。胸中疼痛
ス。肺痿ハ久嗽テ不巳。胸中痛乾咳出。大便爛タル。凡ノ如ク。或承ノ
脂ノ如ク。或渴或小便渴。其症肺癰ニ似タリト雖。肺痿ハ膿血ヲ不
略肺癰ハ膿血ヲ略也。桔梗ハ肺中ニ入テ利氣開爵ノ要藥アレハナリ。
排膿トハ肺癰ノ膿血ヲ排ヒ逐コトアルヲ云也。下痢肺與大腸
衰衰タリ。肺氣利則大腸モ亦從テ利ス。且痢疾ヤ氣ノ隔下ノ開

提セサルが故ニ裏急後重ヲ致ス。桔梗能肺氣ヲ利シ。膈下ノ氣ヲ
升開ス。是以下痢ヲ治スルノ功ヲ致ス。丹溪曰痢疾腹痛乃肺經之
氣腎在大腸也。宜桔梗開之。上。滙云用之痢藥以其能開提氣血也。
消穀此桔梗ノ要能ハ非ナリ。桔梗ハ高ク升ノ劑タリ。人ノ胃腸ノ氣
ヤ升テ下陷セサル時ハ中焦消穀ノ道盛ナリ。故ニ桔梗ノ升ニ高ニ行
ノ氣ヲ以テ胃腸ヲ升開セシムル時ハ自消穀ノ理アルヲ以テナリ。然則
此等ハ皆桔梗ノ高ニ行ノ餘ニ出テ主功ニハ非ズ。枝葉タリ。必シモ
食積消冠ノ劑ト覺ベカラス。如此ノ義。諸藥ノ中ニ多ク存セリ。雖其根
要スルノ能ヲ辨メ。他ノ千變方集ノ主治ハ皆此ガ枝葉タルトナリ。
標病ハ其枝葉餘カヲ以テ治之。本病ハ其本能ヲ以テ主テス。滙云
別錄言消穀者亦藉其升載陽氣而不下陷。則脾中陽氣長浮而穀
食自消矣。利頭目下一切氣。桔梗ハ升テ至高ニ行。味苦辛。多疎開。

故ニ頭目ノ氣ヲ清利者也。且清陽升則濁氣下降ス。故ニ桔梗
ノ善升ヲ以テ善下トヲ致ス。是以桔梗ハ一切氣ヲ下ノ效ニ長
セリトス。世俗多ハ桔梗ノ升トヲ知下トヲ不知。故ニ其功用ヲ
失コトナカサ。
總論 桔梗ハ升テ肺分ニ入ノ本藥タリ。其味苦辛
嘆スベキカナ。故ニ頭目鼻口咽喉胸膈ノ諸病ヲ主治ノ
鳩尾以上ノ藥也。味ノ苦ハ疎テ且推辛ハ開テ利ス。故ニ鳩尾以上
ノ爵ヲ開結ヲ利シ。塞ヲ疎シ。滯ヲ推ル。凡諸藥ヲノ上行セシムコト
ヲ欲セバ必用之。引テ藥カヲ上ニ置ベシ。或桔梗耳草合用ノ諸藥
ヲ上ニ持テ下ノ功ヲ盛ニス。桔梗ノ升ト如此ト雖亦其升ニ從
テ一切氣ヲ下ノ功モ亦盛ナリ。物升
則必降ハ理ノ自然ル所ニアラスヤ。
使藥 徐之才曰。桔梗葉
皮爲之使下。然凡
時珍曰。徐之才所云。節皮不知何物也。枳殼ト合メ善胸氣ヲ利シ。

本草綱目卷之...

甘草ト合ノ善咽痛ヲ療シ。荆芥。防風。連翹ト合ノ咽口舌ノ諸病ヲ通治ス。 **毒** 病氣日ニ上逆ノ苦者勿用之。一切下部ヲ

療スルノ藥中 **畏惡** 白及。龍膽草ヲ恐。猪肉。二用之。コト勿。 **附方** 甘草湯 咽ノ痛

ヲ治ス。甘草。桔梗各等分。煎服ス。 **加聖湯** 右ノ并。桔湯。荆芥。防風。連翹ヲ加。咽口舌ノ諸病ヲ治ス。若音ヲ失者。加訶。聲不出者。ハ

加半夏。上氣ニハ加陳皮。痰嗽ニハ加知母貝母。欬ノ渴者。ハ加五味子。酒毒ニハ加葛根。氣虛セバ加人參。嘔吐セバ加半夏。生姜。胸滿ニ

ハ加枳實。目赤ニハ加山梔。大黃。面腫ニハ加茯苓。膚痛ニハ加黃耆。發斑ニハ加防風。荆芥。疫毒ニハ加梔。子。大黃。難眠者。加山梔。出醫

壘元戎。胸滿テ不痛者ヲ治ス。桔梗。枳殼等分。煎服ス。出活人書。 **桔梗半夏湯** 傷寒。腹脹者ヲ治ス。桔梗。半夏。陳皮各二錢。生薑五

片。水二鍾煎。下。鍾出。活人書。 **桔梗湯** 肺癰。胸滿。振寒。脈數。咽乾。不

渴。濁唾腥臭ヲ出シ。久米粥ノ如ク。膿ヲ吐。ニ宜。桔梗一兩。甘草二兩。水三分煮。一分。温服ス。朝暮。膿血ヲ吐盡テ。痊。出金匱玉函。 **齒齲**

腫痛。桔梗。薤白。仁等分。爲末。服ス。出永類方。 **牙根腫痛** 桔梗爲末。 **肉ニ丸シ。綿ニ裹咬之。** 荆芥。煎湯ニテ漱。出經驗方。 **打身瘀血在內時**

發動者。桔梗爲末。米飲ニテ服ス。出肘後要方。 **小兒ヲヒエテ死イリ** 不能言者。桔梗ヲ燒爲末。三錢。米湯

ニテ服。麝香サ。許ヲ吞シム。出備急方。 **愚案** 桔梗ハ諸藥ノ舟楫

多ハ劑中ノ佐使トス。蓋諸藥ノガイシキトナル者ナリ。或問。元素曰。桔梗色白。故爲肺分引經。ト然ヤ否ヤ。曰。其色ノ白。ニテ以テ何ノ肺

コトヲ致シカ。恐ハ元素ノ説未盡ノ旨アルニ似タリ。或問元素曰與甘草
 同行爲舟楫之劑トハ何如。曰然リ凡味ノ其者ハ必胸間ニ持滿
 通下スルコト不能。故ニ諸藥ヲ上ニ持シメント欲セバ甘草桔梗ヲ
 合用スヘシ。蓋桔梗ハ浮テ能ク升ル。然レ凡氣輕味苦辛ニ上ニ久持
 コト不能者也。甘草ハ味太甘ノ能持ト雖氣味重厚ニ升達ス
 ルコト不能也。故ニ桔梗ヲ以テ上ニ引キ甘草ヲ以テ上ニ持テ諸藥
 ヲ上部ニ置コトヲ得タリ。彼青者得防風其功ヲ大ニシ陳皮得白
 朮能中焦ヲ補ヒ桔梗得甘草諸藥ヲ上部ニ置コトヲ知者ハ常人
 ノ所及ノ理ニ非ズ實ニ
 生知ノ致ス所タリ

修治

白ノ不腐者味之腥澁カラサル者
 ヲ擇用ユ嚼テ太麗澁者ハ木梗也
 不可用。蘆頭ヲ去。浮皮及尖ト。黑腐アル處トヲ削去テ。米泔ニ浸テ
 一夜ノ到干乾微焙用ユ。或百合ヲ搗爛テ米泔ニ合シ。此ニ桔梗ヲ

浸コト下日ノ到焙テ用コトアリ。○桔梗蘆頭ハ胸中ノ風熱痰實
 ヲ吐スルノ劑タリ。故ニ常ニ桔梗ヲ用ハ必其蘆ヲ去テ用ヘシ。不然人
 ヲノ必吐セシムルコトヲ致ス

當歸



耳小温。○補血和血養新血破惡血止
 痛治氣生肉療瘡排膿潤腸胃筋骨皮
 膚治癰疽崩中瀝血癢癢中風虛勞下

痢症病補諸不足虛冷絶子定氣血昏亂通脉治帶脉衝脉之病△
 氣血昏亂者服之即定。此能氣血ヲ各所當本部ニ歸セシムルコト
 有力故ナリ。是以名テ當歸トス。承曰姪婦産後惡血上衝倉卒取效
 氣血昏亂者服之即定。能使氣血各有所歸。恐當歸之名必因此出
 也ト士材曰氣血昏亂服之而定。能領諸血各歸其所當之經故名
 當歸ト補血和血當歸ハ補血ノ聖藥タリ。故ニ心脾肝ノ三經ニ入

蓋心ハ生血脾ハ裹血肝ハ藏血也。夫地黄ハ陰中ノ陰ニ腎陰ヲ
補當歸ハ味辛ノ温陽中ノ陰タリ。故ニ心血ヲ補。心血ハ陽中ノ陰
タルヲ以テナリ。味辛ニ補血其温ヲ和血凡地黄芍藥等ノ純陰
ノ劑ハ陽氣ヲ損傷シ易者也。當歸ハ補血ノ劑タリト雖純陰ノ者
ニ非ス陽中陰タルヲ以テ陽氣ヲ損傷スルコトナレ。故ニ東垣補中
益氣湯ニ用之補氣ノ助トスルコトヲ致ス。養新血破惡血當歸ハ
血ヲ補血ヲ温和ス。故ニ新血ヲ養蓋血ハ得寒凝得温行當歸ノ其
温ヲ以ハ和血養血コト明也。其惡血ヲ破モ亦生血和血ノ餘カヨリ致ス
者也。譬流水ノ中ニ濁惡汚水ノ滯ニ於テ洪水溢流テ盛ナル時ハ汚
水ヲ推破テ流行ガ如シ。以當歸生血養血和血則血分能流行ノ瘀
惡血ヲ推流ニ因テ破惡血ノ功アリ。然則紅花延胡桃仁ノ直破血
トハ不同者也。或問當歸頭破血尾止血トハ雷教説也。頭止血尾破

血中身和血トハ張元素説也。頭止血上行身養血中守稍破血下流
全身活血不旁トハ東垣説也。議論如此ト不一何ヲカ是非トセン。
曰東垣元素止血以頭者ハ蘆頭ノ脉紋ワカマリテ根上ノ止處タ
ルニ因ナリ。破血以尾者ハ末梢ノ細ノ銳ナルニ因ナリ。教ハ止血以尾
者ハ根下ノ止處タルニ因ナリ。破血以頭者ハ其脉ノ硬實ナルニ因ナリ。
各其理存スルコトアリト雖元素ノ説ヲ以優リトスベシ。凡欲止血上
行センコトヲ欲セバ頭ヲ用ヨ。欲破血下行センコトヲ欲セバ尾ヲ用ヨ。諸治
通用セント欲セバ全身ヲ使ベキノ三止痛心腹ノ諸痛或頭痛或齒痛或
腰痛或足痛及諸瘡ノ痛ヲ止蓋物枯則急ニ潤則緩急則痛緩則
不痛故ニ當歸ヲ用テ養血和血則潤テ其急ヲ緩シ且瘀血ノ塞ヲ
行ノ諸疼痛ヲ治者也。元素曰血壅而不流則痛當破之其温能和
血ト治氣大明曰治一切氣ト好古曰當破血中氣藥也。當破

八補血ノ劑タリト雖。其性温ヲ陽中ノ陰タルヲ以テ獨補血ノニテラス
亦兼テ氣ヲ行テ一切氣症ニ用ユ。然レ獨當皎ノニテ用テ氣ヲ治セント
欲セハカサノ不足行氣補氣ノ劑ト合用則治氣ノ功ヲ發ス且氣行
則血行。血行則氣行。氣血ハ互ニ並行者也。故當皎ノ養血和血ニ從テ
氣モ亦養レ和セラレシ此ニ其性ノ温ヲ兼テ氣能行コトヲ致スレ。古
人治氣ノ劑中ニ用之者皆此義ナリ。生肉當皎ハ補血和血カ故ニ肌
肉ヲ生ズルノ功アリ。金瘡破傷ニ用テ能正肉ヲ生ゼシム。療瘡當皎ハ和
血亦氣ヲ治スルカ故ニ癰疽諸瘡ニ用テ血氣ヲ和セシム。排膿補血和
血治氣且温ナルカ故ニ瘡家用之能膿シメテ惡膿水ヲ排出潤腸胃
補血則腸胃自潤故ニ大便結燥者尤宜之。筋骨皮膚此皆補血
ヲ以テ筋骨皮膚ヲ潤ス。當皎ハ惟補血ヲ以テ主本トス其治功多
ト雖皆補血ノ餘力ナリ。故ニ當皎ハ女人ノ主藥トス藥性論ニ當皎

補女子諸不足ト云モ亦補血和血カ故也。古方産後ニ惡血上衝テ
氣血昏亂者用之取效實ニ産後ノ要藥也。或問心生血脾裹血肝藏
血當皎ハ何藏ノ血ヲ補ヤ。曰當皎ハ心脾ノ補血ニ宜レ肝血ヲ充レム
ル者ハ芍藥ヲ以宜トス。然レ肝ハ直ニ生血ノ藏ニ非ス心脾ニ生スル
所ノ血ヲ肝ニ納藏者也。故ニ當皎ハ肝ノ本藥ナラズト雖當皎ヲ以テ
心脾ノ血ヲ生則其血自肝ニ充レレ故ニ肝血ヲ補モ亦芍藥等ト合
メ當皎ヲ用ユ。然則當皎ハ諸血虛ヲ補ノ主劑タリ。是以元素曰治
諸病夜甚下。病夜重者ハ精血ノ不足ニ屬スレハナリ。精與血同ク陰
類タリ故ニ地黄當皎多ハ合用ノ精血互ニ相補コトヲ致ス。或問當
皎ハ補血ノ要藥トス何如ノ胸中效逆上氣ヲ治スルマ。仲景傷寒ノ
血症及熱入血室者皆當皎ヲ不用マ。曰血虛則氣ノ附所ナク陽
獨逆ノ上ル故ニ當皎ヲ用テ陰血ヲ補則氣自降皎テ效逆上氣症仲

景傷寒血症熱入血分症ニ不用之者ハ此ガ甘潤中脘ニ填痰涎ヲ
動シ且其温ヲ以テ邪熱ヲ助コトヲ恐推生地犀角柴胡等ヲ用テ血
熱ヲ治スルノミ。太低當飯ハ血分虚寒者ニ用テ其功盛ナリ。血熱者ハ
非所好然凡血熱症忌之ト云ハ非ズ。凉血ノ劑ニ合ノ或用之凡當
飯ハ佐使ノ劑ニ因テ一切ノ血症ニ通用ノ忌コトナシ。生地黃犀角牡
丹皮ノ類ト合ノハ血熱ヲ清シ。馬鞭。紅化。桃仁等ト合ノハ瘀血ヲ破リ。
人參。黃耆等ト合ノハ氣血ヲ補ヒ。香附子等ニ合ノハ氣血ノ鬱ヲ順
行シ。肉桂等ニ合ノハ虚寒ヲ温補シ。木黃等ニ合ノハ血積ヲ碎キ。上藥
ニ合ノハ上行シ。下藥ニ合ノハ下行ス。實ニ佐使因用ノ劑ニ從テ周身
血分ノ諸症ヲ通治者也。治癥瘕。癥瘕ハ血分凝滯ノ病タリ凡血虛則
滯テ不行寒則凝テ不流遂ニ癥瘕等ノ血結ヲ致ス。當飯補血和血
温血且行惡血ヲ以テ癥瘕ヲ治スルコトヲ致ス。崩中瀝血瀝血ハ俗ニ

云長血白血ノ類。經水久不止ヲ云。崩中ハ月水不時ノ大ニ下ルヲ云
當飯ハ和血補血ガ故ニ崩中瀝血ニ用之。血分ヲ調ル也。痿痺痿ハ
總テ身ノ癢ヲ云。癢ハ足癢ヲ云。當飯ヲ用テ補血和血則筋骨潤經
脉通ノ癢覺自安。中風中風ノ症外風ヨリ致者アリ。内風ヨリ致者アリ。
外風ハ或氣虛ニ或血虚ノ風邪其虚ニ乘ノ致者ナリ。内風ハ天ノ風
邪ヨリ致者ニ非ズ。内蔵府ノ間ヨリ自風化ヲ生ノ致ス。多ハ燥與火ニヨ
ツテ風化自生ノ然リ。凡風ハ物ヲノ燥シムルノ氣也。故外風内風ノ症
皆血虚ヲ不兼ト云コトナシ。是以中風ヲ治スルニ多ハ當飯ヲ用テ潤養
スルヲ主トス。虚勞當飯能補血故ニ虚勞ヲ治スルノ功アリ。前ニモ
辨ズル如ク。精血同類ニ血ヲ補者ハ兼テ精ヲ補ヒ。精ヲ補者ハ兼テ
血ヲ補フ。故ニ虚勞勞瘵。地黃等ノ劑ニ合ノ用之。精血互ニ相補也。
好古曰當飯治足下熱痛。足下ノ熱スルヤ陰精ノ虚タリ。當飯

ヲ以テ補血則精從テ自益コト有_レニ **下痢** 古人謂利氣則後重除
補血則便膿愈_レ。當飯ノ其温マ。獨血分補和耳ニ非ズ。兼テ少氣ヲ
和スルノ義アリ。故ニ元素曰使氣血各有所_レ。是以下痢症用之血
氣ヲ和調則後重便膿俱ニ安_レトヲ致ス **瘧疾** 瘧ハ痺病也。身ノ強
直反張スルヲ云。其症無汗者アリ。有汗者アリ。無汗者ハ血虚ニ屬ス。
風邪乘_レ虚血分ニ容リ。經筋燥急ニシテ瘧ヲ致ス。當飯ヲ用テ補血則
經筋自潤緩テ身躰自柔也。但汗不出瘧病ハ當飯ヲ以テ主トスベシ
補諸不足 虚冷當飯ハ補血ノ劑タリ。故ニ諸血分ノ不足血分ノ虚冷
ヲ補_レ。雖血氣當衛ハ合_レノ者。陰陽ハ互根ノ氣。故ニ補氣者ハ兼血
補血者ハ兼氣則氣分ノ不足氣分ノ虚冷ニモ亦當飯ヲ兼用ニ宜シ。
然_レト雖地黃ノ類ハ純陰ノ劑。陽化ヲ代テ補氣ニ善アリ。當飯ハ雖
補血陽中ノ陰タル者也。故ニ補氣ノ劑中ニ兼用テ補氣ノ助トスレ

凡陽化ヲ伐ノ恐ナシ。是以當飯ハ諸血氣不足諸血氣虚冷ニ通用ス。
蓋當飯ノ其温ヲ以テ虚冷ヲ補温スルニ宜シ。然_レモ當飯ハ小温ニシテ大温
全温ノ者ニハ非ズ。故ニ虚冷ノ大者ハ桂附等ト合用スベシ **絶子** 婦
人子ナキ者用之。血分ヲ補_レ。和_レ。温則自_レ妊孕ヲ致ス **定氣血昏乱**
當飯ハ血氣ヲ本部ニ飯セシムル者ナリ。故ニ血氣ノ昏亂テ常道ヲ
變者用之。定之。是以當飯ハ産後ノ要藥トス **通脉** 脉ハ血ノ府也。當
飯補血和血劑タリ。故ニ通脉者多_クハ用之。 **治帶脉衝脉之病** 帶脉ハ
膽肝ノ二經ニ屬シ。衝脉ハ十二經ノ血海トス。皆屬血者也。故當飯能_レ以
補血帶衝二脉ノ病ヲ主。帶脉ノ病ハ少腹痛腰_ニナキニテ患。衝脉
ノ病ハ氣逆上_レノ胸急痛ヲ患也。當飯ノ主治スル所ア_リ。多有_レ。雖者
補血和血ノ餘力
總釋
心ハ生血ノ藏タリ。當飯ハ心血ヲ補_レ。主藥ト
ス。且性小温ニシテ血ヲ和シ血ヲ温兼テ少氣

ヲ助諸血ヲ補ニ於
ハ此ヲ缺コト勿レ

使藥

芍藥ニ合シ肝血ヲ補川芎ニ合シ血中ノ
氣ヲ行熟地黃ト合シ精血ヲ補フ

毒

當飯ハ性小温血熱ノ者ハ少涼藥ヲ合スルニ非バ勿用之○不食
膈滿者及胃氣甚虛者多用コト勿レ其其味ノ泥コトヲ恐テ也

畏惡

○土材曰脾胃瀉者忌之ト蓋當飯ハ心脾ヲ潤シル者
也故脾胃瀉症其潤液過テ瀉下ナラ盛ナラシコトヲ恐テ也

惡蘭茹麩類畏苦白蒲海
藻牡蒙生薑制雄黃毒

附方

當飯補血湯 血虛ノ發熱渴目赤
面紅脉洪大ニテ虛ニ按之全無力

ヲ治ス當飯身酒洗二錢黃耆蜜炙一兩水二鍾煎一鍾空心温服
出蘭室秘藏一切虛血半產ノ血多下或產後去血多或崩血過多
或金瘡出血多或拔牙血多出一切出血過多ノ後心煩眩暈テ夢
中ニナル者當飯二兩川芎一兩每一貼五錢水七分酒三分煎七分

熱服出婦人良方

衄不止

當飯焙味シ每服一錢米飲ニテ下出聖

濟方小便出血

當飯四兩剉酒三分煮二分

類服出肘後方

頭痛甚

者當飯二兩酒下升煮六合飲出外臺秘要

心下刺力如二痛當

飯爲末酒ヲ以テ一匕ヲ服出必效方

大便不通

當飯白芷等分爲

末每服二錢米飲ニテ下出聖濟總錄

佛手散

孕婦胎動腹痛者

用之若死胎則下不死則痛止當飯二兩川芎一兩粗末シ每服三

錢水一盞煎ツメテ乾トスル時ニ酒一盞ヲ入再煎ノ一沸シ温服ス出

備急方小兒臍濕テ不乾

或腫或出水者

當飯末ヲ傅或麝香少許

ヲ加或胡粉ヲ等分ニス若愈後尿ニ因テ復作者再傅出聖惠方

產足先出ヲ倒産ト云倒産ノ子死ノ不出

愚案

當飯苦温説アリ或辛太温或

者ハ當飯末酒ニテ一匕ヲ服ス出子母秘錄

其辛温或小温ノ諸説アリ愚案ニ苦ハ燥ニ辛ハ散ス當飯味苦辛

大温ノ物タラバ何カ故ニ補血ノ能アラシヤ。洞君謂味其李當之謂小温下。此說實ニ宜シ。當故ハ甘小温陽中陰ニシテ可升可降者ナリ。補血又助氣。作使ノ藥ニ從テ上下周

修治

身ニ行テ血ヲ補ノ要藥タリ。若草當故トテ不宜蘆頭ヲ去水ニテエヲ洗淨ノ干乾到微焙用ユ。愚案ニ水ニ浸洗コト久則燻テ惡レ干乾コト強則藥勢乾テ潤ヲ失且焙コト強則此毛亦藥性燥テ皆血液ヲ潤ノ功ヲ失干コトハ俗ニ云シシ佳焙コトハ微ハシマダ宜トス。當故ハ補血ノ要藥タリ。乾燥セシムル時ハ補血ノ能ヲ失コトヲ恐テ也。行表通經ニハ酒浸焙血虛頭痛等ヲ治スル上行ニハ酒ニテ蒸或酒ニテ煮有痰者ニハ姜汁ニ浸焙用ユ。吾朝ノ大和山城ヨリ多蔣シ裁出ス者其色白シ且乘時沸湯ニテ煮日ニ晒テ其形ヲ羨ニス。藥性歳ノ不宜山中ニ自生者ヲ冬月ニ採テ水洗乾

テ用則其潤ニシ宜シ。瓦罐ニ納置テ蛙サカル様ニスベシ。真當故種ハ越中ノ山中ニ多存セリ。然凡人不之採コトナレ。倍力ナ



辛温。治諸頭痛面上遊風目淚出多涕唾養新血破宿血治吐血衄血瀉瀉諸瘡長肉排膿行氣開鬱燥濕止瀉

痲治寒痺筋牽心腹堅痛脇痛主婦人無子經閉胞衣不下腰脚軟痛半身不遂去諸寒冷氣治一切風一切氣壯筋骨調衆脈△芎ハ空ト同レ入ノ頭等諸病高也。芎窮ハ上行ノ頭腦ノ諸疾ヲ治ス。故ニ名テ芎窮ト云也。芎ノ蜀中ヨリ出者ヲ川芎ト号。今芎窮字畫多ヲ以テ皆通ノ川芎ト呼。治諸頭痛面上遊風淚出多涕唾川芎ハ辛温浮ノ升陽也。能頭面ニ上行シ其辛ヲ以テハ散通シ。温ヲ以テハ開利入。故ニ諸頭痛ニ缺コトナレ。然凡頭痛亦諸經ノ別アリテ不同川

芎八尾少陽膽經。足厥陰肝經之本藥也。故二肝膽兩經ノ頭痛。及血虛ノ頭痛ニハ獨用之效ヲ致ス。若太陽頭痛ニハ羌活。陽明頭痛ニハ白芷。太陰頭痛ニハ蒼朮。少陰頭痛ニハ細辛。及痰厥頭痛ニモ亦細辛。血虛頭痛ハ多ハ左ニ在。當散。氣虛頭痛ハ多ハ右ニ在。參耆。頭頂痛。藁朮。諸頭痛甚者ハ蔓荊子ト合用スベシ。佐使ノ劑ニ從テ一切ノ頭痛ニ用ユ。若厥陰頭痛甚ノ獨川芎ヲ不能者ハ吳茱萸。少陽頭痛甚ノ獨川芎ヲ不能者ハ柴胡ト合用スベシ。此東垣家ノ法也。然凡川芎ハ辛温ニ散シ易シ。故ニ氣虛頭痛ハ參耆ト合用ス。一鍾氣虛甚者ハ斟酌スベシ。或用凡多クト勿レ。面上遊風トハ赤遊風ニハ非ズ。赤遊風ハ火毒遍身ニ遊行ノ一身赤腫痛。丹毒ノ種類也。此ニ謂遊風ハ頭面ノ風毒遊行ニ因テ。或痛或腫。或瘡ヲ生スルノ類。一切頭面ノ風症ヲ云。川芎ノ辛温上テ能風邪ノ結滯ヲ散セバナリ。

目淚出多涕唾者モ

風邪ヨリ致ス。宜シ。或元氣虛ノ津液ヲ不持力故ニ淚涕多者ハ勿用之。養新血破宿血。川芎ハ直ニ補血ノ劑ニ非ズ。時珍曰芎藭血中氣藥也。川芎ハ血中ノ氣ヲ行者也。凡新生ノ血ハ其氣怯ノ行難シ。行サレハ血活カタシ。故ニ用之。血中ノ氣ヲ行則血能流滿。是以養新血ト云。四物湯ニ川芎アルモ亦此義ナリ。地黄當散ノ所生ノ血ヲ芍藥ニテ收テ不泄。川芎導之流行セシムレハ。不滯ノ周轉ニ充テ潤コトヲ致ス。破宿血モ亦此義也。川芎直ニ瘀宿ノ血ヲ破者ニ非ズ。蓋血ハ從氣行行則何ノ瘀血ト云コト有ヤ。故ニ川芎ヲ用テ血中ノ氣ヲ行則血行行則瘀血流テ留滯スルコトナレ。治吐血衄血滿血。川芎ノ辛温何ガ故ニ諸ノ血症ヲ止ヤ。蓋血能經絡ノ常度ヲ行則何外ニ溢溢コトヲセシヤ。皆其或滯或塞テ常度ヲ失カ故ニ溢テ外ニ泄出。是以血中氣ヲ行者ヲ用テ血ヲ導則不滯不塞ノ常度ニ行。血能常

度ニ行則自外ニ溢止コトナク止川芎升テ浮故ニ吐血衄血等ノ上
部ノ血症ニ於テ尤宜シ弘景云止齒根出血モ亦此義也療諸瘡長
肉排膿血滯塞則瘡トナリ痛ヲナシ膿ヲ去ス川芎血中氣ヲ行テ血
ヲ導者也故ニ發背疽瘰癧贅痔瘻疥瘡金瘡一切ノ瘡毒腫痛
ヲ療ノ肌肉ヲ生長シ膿ヲ排出ス蓋血行則肌内能生長ス且惡
寒ニ川芎ノ辛ヲ散ス故ニ獨血中ノ氣ヲ行スノミナラス一切瘡腫ノ
毒ヲ散發スルコトヲ兼ベキ者欤行氣開鬱川芎ノ辛温行氣尤血
中氣ヲ行ニ宜シ且辛ハ散シ温ハ開ク故ニ氣鬱血鬱ヲ開ニ宜シ然レ
香附ノ鬱ヲ治スルト不同香附ハ氣ヲ下テ鬱ヲ順ス川芎ハ鬱ヲ
開テ散スルコト譬ハ風ノ物ヲ吹散ニ似タリ故ニ久用則元氣ヲ散ス
ルノ害アリ或川芎開鬱下ノ説アリト雖此モ亦升テ開カ故ニ降
有ニ取彼枳殼ハ升カ故ニ下氣ノ義ニ類ス燥濕川芎ノ辛温升ルカ

故也尤上部ノ風濕ニ宜シ或問川芎燥濕然何好古謂補肝血
潤肝燥ト又古方四物湯ニ用之血液ヲ補ニ至マ曰川芎ノ辛温能
濕ヲ燥ス然レ亦能血中ノ氣ヲ行ス肝ハ直ニ生血ノ蔵ニ非ハ心
脾所生ノ血ヲ肝ニ納蔵ス者也故ニ川芎ヲ用テ血中氣ヲ行シ
血ヲ肝ニ導シムル時ハ肝血自滿潤ニ至ル是以補肝血潤肝燥ノ
功アリ然レ獨川芎ノミヲ用テ然コト不能當敗地黄等ノ補血
ノ劑ト合用スル時ハ尤血燥ヲ補潤スルニ至ル且生熟地黄等ノ補
陰ノ劑ハ藥性濕重難行滯泥シ易シ故ニ川芎ノ辛温開鬱ヲ兼
テ此ヲ滯泥セシメサルノ義アリ古人四物湯ノ地黄芍藥ノ重藥中
ニ用之行者實ニ妙ナリ止瀉痢濕瀉ノ症用之或血痢ノ症已ニ通
下スト雖腹痛後重未止者ハ陰血虧テ氣鬱スルカ故ナリ川芎
ヲ用テ氣行血調テ方ニ止此皆主方ノ藥中ニ加之爲佐也獨用

テ瀉痢ヲ治スルニハ非ズ **治寒痺筋牽痺ハ風寒濕ノ三邪交合ノ**
致之其寒邪勝者ヲ寒痺トス。痺ハ後世ニ謂痛風也。寒痺ノ痛ハ處
ヲ定テ不動筋牽テ伸コト不能川芎ノ辛温ニル。寒濕邪ヲ散シ
血氣ヲ通行セシメテ治之 **心腹堅痛脇痛**或寒濕或瘀血或鬱氣ニ
因テ心腹堅痛ヲ治ス。脇ハ厥陰肝ノ部ナリ。川芎ハ厥陰肝經ノ藥。
故ニ脇痛ヲ主ル **主婦人無子**川芎ヲ導血流行セシム。血流行ノ不滯則
婦人自孕ニ至。此モ亦獨川芎ノミヲ用テ然ニ非ズ。當飯地黃等ヲ津
補ノ劑ニ合用ノ然者也 **經閉**川芎ハ血中氣ヲ行テ血ヲ導行者ナリ。
故ニ婦人經水不通ノ主藥タリ。靈苑方ニ婦人經水不通ニ三月孕力
不_レ孕カラ驗ニ川芎生ニテ末トシ。空心ニ艾葉ノ煎湯ニテ一匕ヲ服ス。
孕則腹内微動不動者ハ孕ニ非ズ **胞衣不下**胞衣ノ不下ヤ。惡血衣
中ニ膨血滯氣塞テ不通ノミ。川芎ノ瘀血ヲ破。血氣ノ滯塞ヲ開通

流行セシムルヲ以テ下之ノ功アリ **腰脚軟痛**川芎ハ肝膽ノ二經ニ
入。此二經腰脚ヲ行。故ニ或濕ニ因。或瘀血ニ因テ。腰脚或軟或痛ヲ治
然。川芎辛温ニノ浮升ヲ以テ上部ノ功盛ニ下部ノ功ハ強カズ。腰
脚軟痛ノ治モ此カ要能トスルニ不足 **半身不遂者**氣虛アリ血虛ア
リ。氣虛者ハ參耆宜シ。血虛者ハ補血ノ劑中ニ川芎ヲ合用シ。血ヲ導
テ左右ニ周流通セシム **去諸寒冷氣**辛温ナルガ故ナリ。尤上部及經
絡筋骨ノ間ニ塞寒。冷ヲ散通ス **治一切氣一切風**川芎辛温滯氣ヲ通
爵氣ヲ開テ諸氣ヲ治スト雖。辛ハ散スルガ故ニ氣虛症ニハ斟酌スベシ。且
此カ辛温ヲ以テ一切ノ風邪ヲ散發ス。尤上焦頭面ノ風症ヲ主治ス。及風
痰ニ用テ殊効アリ。或問川芎一切風ヲ治則諸風症ニ獨用之能發散ス
ルヤ。曰川芎獨用テ發散ノ劑トスルニハ不足。諸風癱瘓發散ノ劑ニ合入ノ
ハ自發散ノ功ヲ致ス。彼香氣香蘇散等ニ入テハ。香蘇羌活ノ風藥ニ

合ノ自發散ノ勢ヲ致ス。獨用テ然ニ非ズ。若其川芎發散ノ劑タルハ
何四物湯ニ用之。虛損ヲ補ノ效ヲ取シマ。壯筋骨通脈。此皆血中ノ
氣ヲ行テ血ヲ流行セシムルガ故ナリ。本草匯云。川芎性走竅而無
凝滯能助血流行。血中氣藥也。
總樑 川芎八升。テ頭面ノ留滯
ヲ散シ。諸頭痛ヲ治スル

ト。血流則筋骨潤。脈道通利ス。
至藥也。且風濕ヲ散シ。血中氣ヲ行テ血ヲ流行セシメ。補血ノ劑ニ合
入ノ血分ヲ助導テ肝血ヲ
潤シ。開鬱利氣要藥ナリ。

使藥

白芷ヲ使トノ能頭痛ヲ治ス。
當版地黃芍藥ニ合多能血ヲ
補シ。桃仁紅花ニ合ノ瘀血ヲ破。細辛ニ合ノ金瘡ヲ療シ痛ヲ止。牡
蠣ニ合ノ頭風吐逆ヲ治シ。紫蘇羌活ニ合ノ風ヲ散シ。麥芽神翅ニ
合メ濕ヲ治シ瀉ヲ
毒 川芎辛温ニ走散ス。故多用久用則真氣
ヲ散亡メ天死ス。故ニ元氣虛弱者ハ斟酌

スベシ。○血虛ノ症ト雖久用コト勿レ。久則氣ヲ散ス。氣散則陰彌虛
○陰虛ニ熱氣骨中ヨリ蒸ガ如ニ熱者ヲ骨蒸ト云。骨蒸有汗者勿
用之。辛温骨中ニ走竅シ。表氣ヲノ開發セシメシコトヲ恐ル。○上盛
下虛。虛火上衝ノ嘔吐者勿用之。○痘疹起發セサル者川芎ヲ使コ
ト有厄多用コト勿シ。多則上升ス。○一切熱アル者ハ詳ニ用之。藥

性辛温
ナレハ也
畏惡 黃連ヲ畏レ。
雌黃毒ヲ伏。
附方 跌僕或重ヲ擧テ損傷。或
子死腹中者。川芎爲末。酒
ニ煮テ合出。廣濟方。崩血下血。日夜不止。川芎一兩。生地黄汁ニ合。酒一
大盞。煎五分。徐
服之。出聖惠方。

愚案

川芎久用多用則真氣ヲ散ノ暴死スルノ
義アレハ。惟川芎一味ヲ服用者如此。諸藥ニ
合入ノ他藥ノ佐使ヲ得テ用則強テ恐ヘカラス。本草匯云。若具五味

君臣位使配合得宜寧致此哉。然下雖久服當服之。タトヒ他藥ニ合入テ真氣散亡ノ義アルベシ。妄ニ恐モ不可。妄ニ不恐モ亦不可也。惟藥效ニ中ラハ速ニ止テ之過用スルコト勿レ。時珍說ニテハ飯肺川芎辛久用則肺偏ニ勝テ肝木偏ニ絶ノ天死ストハ理ノ悞也。夫辛味ハ入肺辛味少用則肺ヲ養過則肺ヲ傷ル。五味皆然リ。此内經ノ旨。余ガ愚意ニハ非ス。然則川芎ノ辛久服則反テ肺ヲ傷ヘシ。且辛ハ散入肺ハ氣ノ截辛ヲ用ニテ久則肺氣散ノ傷ヘシ。何ゾ肺金偏ニ勝。肝木此ガ尅勝ヲ受テ偏絶スルノ理アラシマ。時珍說ハ惟五行相尅下五味其本截ニ飯スルノ義トニ泥テ云ナリ。

修治 八月ニ採テ土氣ヲ洗。蘆頭ヲ去。到干乾テ用ニ形大ニ雀ノ頭腦ノ如ク。重實ニテ裏色白。油氣ナク嚼之辛甘ナル尤良。形小者ハカサシ。惟爵ヲ開ノ功アルニ。○和川芎ニ三品アリ。丹後山城大和豊後肥後ヨリ出。丹後ニ生者雀腦ノ如クニ。上品。然

尺希也。山城大和ニ生者ハ丹後ノ品程ニハ非レ。豊後肥後ニ生者ヨリハ優レリ。豊後肥後者ハ輕虛嫩小ニテ最下品不足用。或人曰此草牛ノ病ニ良。故ニ和名牛草ト号。丹後ハ牛ノ多處タレハ此草自生セリト。近代和川芎ヲ貴テ漢芎ヲ不用。此蓋由來アリ。中古漢芎高直ニノ一兩ノ價十六錢目セリ。此時人多和芎ヲ採テ漢芎ヲ不用コレヨリノ遂ニ和芎ヲ貴テ然モ精粗ヲ不擇考ニ和芎ハ丹後者良ト雖不多他處者ハ多クレ尺不可則惟漢芎ノ形雀腦ノ如ク。重實辛甘者ヲ擇用テ可也。○和朝ニ撰スル修治纂要ニ川芎忌火トス。然尺本草家ノ諸書ニ遂ニ忌火ノ説ナシ。何ニ從テ然云ヤ未詳也。愚案ニ川芎ハ香氣稍烈纂要ニ忌火者ハ此ガ失香氣ヲ恐ナラズ。欬

白 綱本



辛温 ○治頭面諸疾療風邪表汗通九竅徹宿血養新血止血症療諸瘡止痛

排膿長肌治女人赤白漏下血閉陰腫解砒毒咬傷刀箭△徐錯云
 初生根幹為正上。此草初ヨリ根正ノ色白ヲ以白芷ト名ク治頭面
 諸疾。白芷ハ手陽明大腸經ノ本藥也。大腸ハ肺ノ府。肺大腸ハ俱ニ
 金トス。金ハ白色辛味。故ニ白芷ハ手陽明ニ入。又手太陰肺經ニ入
 及足陽明胃經ニモ引者也。且氣輕ノ升陽也。其辛温能開散ス。故ニ
 頭面ノ留滯ヲ散通ノ下切頭痛齒痛眉稜骨痛頭眩目運目癢目
 淚流目赤努肉出ヲ治ス。以上ノ諸症風熱濕熱ニ属者及手陽明頭
 痛ニ充宜シ或面疔ヲ去。顏色ヲ潤ス。或細辛ト合ノ鼻病ヲ治ス。充
 鼻淵症ニ宜シ。鼻淵ハ濁涕多流出テ不止也。○以上白芷所治ノ
 功ヲ察ニ川芎ノ能ト相同ニ似タリト雖川芎ハ上行ノ滯鬱ヲ開散
 ス。白芷ハ上行ノ留滯ヲ開通ス。芎ハ散スルコト強ク。芷ハ通スルコト強シ。
 故ニ多ハ川芎白芷合用ノ頭目ノ留滯ヲ散通ス。療風邪表汗。白芷

ハ大腸胃肺三經ノ藥也。肺大腸ハ表裏ノ皮膚ヲ主リ。胃ハ肌肉ヲ
 主ル。且白芷ハ辛温芳香ノ物ニ留滯ヲ開通開散ス。故ニ風邪ヲ逐
 テ表汗ノ功アリ。腸風血風風痺等皆用之。風滯ヲ開通ス。通九竅兩
 耳。兩眼。兩鼻孔。口。前陰後陰。此ヲ九竅トス。白芷能九竅ノ滯塞ヲ開
 通ス。然凡愚業スルニ白芷ハ輕ノ浮能頭面ニ上行ス。故ニ耳目鼻口ノ
 留滯ヲ通スルニ充宜シ。下竅ノ功ハサカラン。欬破宿血養新血。白芷
 ハ紅花桃仁ノ如クニハ非。凡亦能瘀血ヲ破者也。是以女人ノ月經不
 通ニ用ユ。養新血トハ瘀血ヲ破ニ因テ云。直ニ補養スルニハ非ス。凡古
 血ノ瘀滯アル時ハ新血自流行スルコト難シ。故ニ破宿血則自新血モ亦從
 テ行コトヲ得バ也。直ニ此ガ血ヲ補養スト心得テ。血虛ノ劑中ニ用テ
 勿レ止血症。小使血。大便血。婦人不時大血ヲ漏シ。或長血白血ヲ止ム。
 案ニ白芷ハ諸血症ヲ止ト雖其血分或風濕ヲ挾ホハ瘀血ヲ兼テ然ル者

尤宜_レ血虛ノ血ヲ不收故ニ去血者ハ斟酌スヘシ瘰癧諸瘡止痛排膿長肌
 白芷ハ破瘀血留滯ヲ開通スルガ故ニ諸瘡ヲ療スハ尤發背疽癰疽疔
 疥癬女人乳腫及陰戶腫ニ用ユ然レ血虛症ニハ斟酌スヘシ但風熱濕熱ノ
 留滯瘀血ノ畜積實症ノ者ニ用之止痛排膿長肌或腰痛者ニ白芷ヲ
 用テ止痛亦風熱瘀血ニ屬者ニ宜シ或心腹刺カ如クニ痛者白芷ヲ用
 テ止痛者ハ瘀血ノ上衝ノ然ニ宜シ此症婦人ニ尤多トス治女人赤白漏
 下血閉陰腫辨皆右ニ詳也漏下ハ不時ニ大ニ月經漏下ヲ云或血崩
 疔号長血白血漏下月經閉テ久不通或陰戶ノ腫痛ハ皆コレ風熱
 濕熱血分ニ留滯シ或瘀血ノ滯ニ因テ然リ故ニ白芷ヲ用テ留滯ヲ
 開通シ瘀血ヲ破テ治之若又全血虛ニ因テ赤白漏下血閉者ハ白
 芷ノ宜所ニ非ス解砒毒蛇傷刀箭白芷ハ留滯ノ氣ヲ開通ス故ニ
 砒霜石ノ毒丁切惡虫ニ傷ラレ或金瘡箭等ノ滯ヲ去痛ヲ止神隱書

云種白芷能辟蛇ト白芷ノ芳香ナル諸蛇ノ畏所也實ニ蛇傷ヲ治
 スヘキコト明ナリ夷堅志曰徑山寺ノ僧蛇ニ傷ラレ百藥不效白芷末
 ニ膽礬麝香サ許ヲ加テ
 疹ハ惡水出テ愈タリト
 開通ス故ニ頭面鼻目ノ諸症ヲ治シ皮膚骨分肉ノ間ノ諸邪ヲ逐テ瘡
 腫痛癢ヲ治シ尤風熱濕熱ヲ去瘀血ヲ破丁切ノ齒痛ヲ治スル要藥
 也蓋白芷ハ手足陽明經ノ藥也上下
 ノ齒根ハ手足ノ陽明經ニ屬スル也
 麻ト合ノ手足陽明經ニ通行シ亦手太陰經ニ入辛夷細辛ト合
 ノ鼻病ヲ治シ川芎ト
 合ノ諸頭痛ヲ治ス
毒 白芷辛温故ニ陰虛火熾上衝者ニハ勿
 用○白芷風熱濕熱ヲ散スト雖血熱
 者ニハ勿用○白芷諸瘡ヲ療スト雖癰疽疔
 疥癬疔已ニ潰ノ後ハ漸減去スヘシ

總標

使藥

○白芷ハ辛温ニノ開散ス。氣虛者ニハ斟酌スヘシ。○白芷ハ足陽明經ノ本藥也。足陽明經ハ頭額及面鼻ニ行コト專リ。故陽明頭痛面鼻ノ諸病ヲ治ス。然其氣味辛温タレハ右關脉實數ニノ胃熱アル者ハ

妄勿用之

畏惡

旋覆花
ノ惡ム

附方

頭面諸風 白芷切剉萊菔汁浸シ日乾爲末。每服二錢。白湯ニ下ス。

或鼻ニ吹入。出直指方。偏正頭風 天下第一方也。白芷炒二兩五錢。

川芎炒。甘草炒。川烏頭半。半熟。各一兩。每服五錢。細茶薄煎湯

ニ下。出試奇方。風熱痰ニノ眉稜骨痛 白芷黃芩酒浸炒等分爲末。

每服二錢。茶清ニ下。出丹溪纂要。風熱ニノ牙痛 白芷一錢。朱砂五

分爲末。蜜ヲ以芡實大ニ丸シ。頻ニ擦牙。出醫林集要。口齒氣臭 白芷

川芎等分爲末。蜜ニテ芡實大ニ丸シ。日ニ嚙之。出濟生方。脚氣腫痛

白芷。白芥子等分爲末。生姜汁ニ和ノ塗。出醫方摘要。烏金散 婦人

產前産後虛損月經不調崩漏及橫産逆産ヲ治ス。白芷百草霜等

分爲末。沸湯ニ童便ヲ入。醋ト同調テ二錢ヲ服ス。出普濟方。鼻血不

止所。出血ニ白芷末ヲ調。鼻山根ニ塗ハ止。出簡便方。一切腫毒熱痛醋

ニ白芷末ヲ調塗。出衛生易簡方。刀箭傷金瘡 白芷嚼爛テ塗。出集

簡方。諸骨咽ニ刺者 白芷半長等分爲末。水ニテ一錢ヲ服則出。出普

濟方。毒蛇傷 白芷ト川芎ト氣味性功大槩相同ノサ異也。

蟹筋ニ見タリ 愚案 川芎ハ上テ結時ヲ開散シ。白芷ハ上テ凝滯

ヲ開通ス。川芎ハ辛温ヲ其氣烈故ニ真氣ヲ散スルノ恐アリ。白芷ハ

辛温ト雖川芎ノ烈ニ不同。川芎ハ血中ノ氣藥タリ。故ニ補血ノ劑中

ニ用之。白芷ハ推宿血ヲ破ノミ。故ニ補血ノ助ニ用コトヲ致シ難シ。且白芷

ハ足陽明經ニ引テ分肉ニ行キ。手太陰經ニ引テ皮

膚ニ行。故ニ皮肉ノ間ニ滯留邪氣ヲ除ニ宜トス

修治

二八月ニ採
土氣ヲ洗

麩皮ヲ刮去日ニ乾シ生微焙用ユ。或、黃精ト等分ニ合シ同蒸晒乾テ
 微焙用ユ。○今人採テ寸許ニ切シ石灰ニ拌晒テ其色ヲ白シ并蛙ト
 ヲ碎トス。此皆藥性ヲ損ノ不宜若如此ヲ用ハ石灰ヲ洗去テ微焙
 用ユ。○愚案ニ本朝ニ所撰ノ修治纂要ニ白芷忌火トス。此ニ從テ和
 朝庸醫皆謂白芷忌火ト。實ニ誤ナリ。本草家ノ諸書ニ白芷微焙ノ
 義アリト雖遂ニ忌火ノ言ナシ。今ノ和俗川芎白芷俱ニ忌火者ハ纂
 要ニ誤之ニ因テ也。案ニ白芷ハ芳香アリ。故ニ古人稱ノ香白芷ト云。
 修治纂要ニ忌火者ハ其芳香ヲ失ユトヲ恐テ云云。

芍藥



白芍藥酸微寒。○入肝脾血分補肝血
 不足涼血熱治腹痛瀉痢胎前產後諸
 疾諸失血中滿腰痛煩熱寒熱脇痛飲
 瘡口瘰癧血閉固膜和血瀉肝安脾收胃氣△芍藥ハ焯約ノ義ニ取焯

約ハ羨好貞。此草ノ花容美好ナルヲ以芍藥ト名ク芍藥ニ赤白ノ
 兩種アリ。花赤者ハ根赤花白者ハ根亦白色也。其赤白ニ從テ性
 功不同然凡本草ニ此ヲ記コト下條ナリ。今神農本草經及別錄并好
 古甄權元素大明時珍等ガ所述ノ芍藥主治ノ功中ヲ考テ白赤
 芍藥ノ兩條ヲ立ユト左ノ如シ。入肝脾血分肝ハ血ヲ藏脾ハ血
 ヲ統芍藥ハ肝脾ノ血分ヲ收テ不泄者也。故ニ四物湯用之血虛ヲ
 補補肝血不足肝ハ東方ノ木藏木味酸芍藥味亦酸ノ肝ニ行酸
 味收欽ノ不泄者也。故ニ肝血不足ヲ補充シム。蓋芍藥ハ雖補血此ガ直
 ニ補血者ニ非ス味酸ヲ以テ津血ヲ收聚テ不泄也。不泄則自充滿
 ス。彼梅酸ヲ食テ必口津ヲ致シ同シ。此梅ガ津ヲ生ハ元ニハ非ト雖其
 酸味ヲ以テ津ヲ收聚ガ故ナリ。是以補血者ハ當飯地黄ノ直ニ生血
 者ヲ主トシ此ガ助ニ芍藥ヲ用ユ芍藥ハ壁言堤坊ノ如シ流ノ源盛ナリ

ト雖堤坊ノ防聚者ナキ時ハ水自分散ノ滿大ナニコト不能當故地
黃ヲ以テ血液ヲ補「雖芍藥ノ堤坊ナキ時ハ其血分散ノ肝ニ入
滿コト不能也成無已云芍藥之酸飲津液而益營血トハ是ナリ
涼血熱芍藥行血分其性寒タリ故ニ血熱ヲ涼是以虛寒者ハ勿用
或虛寒者不得已ソ用之酒炒ニ其酸寒ヲ減テ用ユ治腹痛丹溪曰
九腹痛多是血脉凝滯亦必酒炒用然止能治血虛腹痛餘並不治
爲其酸寒收斂無溫散之功也ト此說尤是ナリ芍藥ハ厥陰肝經ノ
血ヲ收者故血虛レ肝經急迫ニ腹腹痛者用之收血滿血則肝急自
潤潤則自緩テ其痛止ル然凡血得寒滯得溫行芍藥ノ寒性血脉ヲ
凝滯セシメシコトヲ恐テ酒炒ニスルニ或問長澤道壽家ノ藥性傳ニ
芍藥調腹中ト然則芍藥ハ獨血虛ノ腹痛ニミ不止一切ノ腹痛ヲ
治スヘシ疑丹溪ノ義不是乎曰調トハ過不及ナク和平ヲ致ノ義ナリ

腹中ハ脾胃肝腎大小腸ノ雖所居專此ヲ總主者ハ脾胃ナリ脾
胃ハ甘温ヲ欲メ寒涼ヲ惡何芍藥ノ酸寒者ヲ以テ腹中ヲ調ノ義
アラシマ且諸腹痛ハ中焦脾胃ニ屬ス甘温ヲ以テ中氣ヲ開噴スルニ
宜シ酸寒收斂ハ雖非所好血虛ノ腹痛スルガ如ハ芍藥ヲ用ヒテ調
之然凡其酸寒ヲ惡テ此ヲ酒炒ニ製ス實ニ丹溪ノ說ヲ得タリトス
ベシ瀉痢芍藥治泄瀉痢疾者深義存セリ世人多ハ芍藥ヲ以テ脾
胃ヲ和シ陽氣ヲ扶テ瀉痢ヲ治スト云ハ甚誤也芍藥ノ酸寒何ゾ私
中扶陽ノ義アラシマ夫泄瀉ノ病タル腸胃ノ氣疎豁ニシテ水穀ヲ絞
コトサメ糟粕中ニ水津ヲ並雜テ瀉下ヲ致ス故ニ芍藥ノ酸味收斂
ヲ以テ腸胃ノ氣ヲ收束セシムル時ハ水穀ヲ絞分テ糟粕自堅ノ
津瀉瘞瘻酒ヲ絞ニ似タリ芍藥ノ酸味收斂ハ絞木ノ如シ未絞ノ醴
酒ハ水穀相分サル泄瀉ノ如シ此ヲ絞木ニカケテ絞則清酒ハ分泄

和語本草 卷之三 三

糲ハ堅分カ如ク。芍藥ノ酸味收斂ノ絞木ヲ以テ腸胃ノ氣ヲ收束
スル時ハ水津ト糟粕ト能相分テ。糟粕堅則大便泄下自愈。一ヲ致
其熱瀉ノ症ハ芍藥ノ酸寒尤宜シ。中焦虛寒ノ瀉ハ非所好。或用之
酒炒ニ製ス。温劑ト合同スヘシ。又此ガ痢疾ヲ治スルニ至モ深意存ス
ルコトアリ。蓋痢病ノ由ハ腸胃中ニ積滯物アリテ。此ガ通泄セザルガ故ニ
數劑ニ走行。是以治法ノ始。檳榔大黃等ノ下藥ヲ以テ其積滯ヲ通
則病自愈。此内經ニ謂。通因通用也。芍藥ハ酸味收斂ノ物タリ。痢病
ノ疎通ヲ欲スルニ於ハ似不可然ニ用之。治痢者ハ何ゾヤ。此其疎通ヲ
速ニセシコトヲ欲スナリ。何如トナレバ。譬言流水ノ如キ。堤ヲ決メ流ノ末
ヲ留テ防則水倍ノ勢盛ニ速ナリ。檳榔大黃等ノ通下ノ劑中ニ芍
藥ノ酸味ヲ合同則其酸味收束ニ從テ。檳榔大黃ノ疎通ヲハツミ
シメテ速ニ下則積滯泄去テ痢疾痊。芍藥湯ノ方意此義ナリ。然則

此ガ治痢ノ功ハ通利ノ劑ト合同ノ致者也。何此酸味收斂者ヲ獨
用テ治痢ノ義アラシヤ。如此ノ類。諸藥ノ功ニ多存セリ。陳皮補中焦
得甘藥然リ。甘草治咽痛得桔梗然リ。芍藥本草ニ所謂功能一通ヲ
ノミ知テ。其至能ノ由ヲ不辨。藥石ノ功ヲ盡コト不能ト云。或問東垣以
白芍藥補脾氣升陽。章宜滙曰。治中氣下陷而成瀉痢。然則此ガ
泄瀉痢病ヲ治者ハ補中氣ニ限リ。吾子何酸味收斂ヲ以テ瀉痢ノ
功ヲ立。和中扶陽ノ義ナレト云乎。曰東垣以芍藥中焦ノ陽氣ヲ升
トハ深義存セリ。蓋芍藥ノ酸寒者何獨用テ升陽ノ義アラシヤ。東垣
用之升陽トハ。參芪朮等ノ甘温補氣ノ藥中ニ芍藥ヲ合同則其
酸味收斂ヲ以テ温陽ノ藥氣ヲ收束テ泄シサル時ハ。陽氣能力
ヲ得テ元氣滿薰蒸ノ升上ス。譬言甕底ノ穴大則陽氣ノ蒸升反少也。
其穴ヲ小ニシテ湯氣ヲ釜中ニ收束則陽氣能釜中ニ元氣滿ノ薰蒸然ノ勢ト

盛ニ能升上スルコトヲ致ス。湯氣ハ參朮等ノ補藥ニ同。龜底ノ穴ヲ
小ニテ塞リニ不泄者ハ芍藥ナリ。不泄則滿滿則能升故ニ東垣以爲升
陽必補氣耳温ノ劑ニ合ノ然ラ云也。其酸寒何獨用テ升陽ノ義ア
ランマ。章宜滙ニ所謂モ亦右ニ辨ズル東垣ノ義ニ從者ナリ。丹溪先生
芍藥ヲ産後ニ不可用ト云ハ其酸寒ハ生發ノ氣ヲ伐ヲ以ナリ。此獨用
テ升陽扶陽ノ義ナキコト知ヘシ。治胎前産後諸疾婦人妊孕ノ道ハ
專血分ノ養當ニ因ナリ。芍藥ハ肝血ヲ補助スルノ劑ナリ。故ニ用之産
前後ノ諸疾ヲ治スト云。然レ産後ハ尤血虛スト雖亦生發ノ陽氣未復
故ニ芍藥ノ酸寒ヲ用則生發ノ陽氣ヲ害ス。是以丹溪先生曰芍藥ヲ
産後ニ用ハ酒炒ニシ其酸寒ヲ減テ用ト。諸失血芍藥ノ酸味ヲ以テ
血分ヲ收束ノ不泄故ニ大便血ヲ收及諸出血ノ後用之肝血ノ不足ヲ
補滿シム。中滿肝木ノ和乘脾腹中滿者用之肝ノ丸邪ヲ平則脾土

免冠中滿自消。世人多ハ此ガ治中滿ヲ見テ。芍藥直ニ補中然トス
ルハ誤也。味酸ハ收斂ノ肝木生發ノ氣ニ反故ニ酸ハ肝邪ヲ平ニ可
ナリ。肝不丸則脾胃土自安ノ痞滿痊。此酸寒何脾胃ヲ補コトアラ
シヤ。腰痛章宜說ニ脾氣虛ノ濕氣流腎腰痛ス。芍藥ヲ以補脾中
氣運行ノ痛愈トハ誤ナリ。愚案ニ肝與膽表裏ス。膽經ハ專腰脇ヲ
流芍藥ヲ以テ肝血ヲ補則膽經モ亦潤緩ノ腰痛愈。或肝ハ三筋
腰ハ筋ノ大倉ナリ。故ニ芍藥ヲ以テ肝血ヲ補則經筋潤緩ノ腰
痛愈ベレ。或曰酸ハ雖走筋酸味ハ收斂者タリ。收斂則縮急スベレ。然
ニ五字謂經筋ヲ潤緩スト。緩字疑ハ誤乎。曰酸味ハ收斂ノ血液
ヲ不泄則滿。血滿則潤潤則柔緩也。彼枯燥木ハ堅急潤生木ハ柔
緩ナルニ同シ。故肝血滿則筋潤潤則筋緩シ。是以酸味ハ收束ノ縮
急ヤシムト雖芍藥ノ酸味ヲ以テ血ヲ滿則筋潤テ自柔緩ニシ

縮急セス東垣肝血ノ虛急ヲ緩ルニ四物湯ヲ用テ神藥ヲ主トス
ル者是ナリ **煩熱** 陰不足ノ胸中煩熱者及肝火旺逆ノ煩熱ハ
者ヲ治ス **寒熱** 寒熱往來ハ其本熱ニ在芍藥ハ酸寒ノ劑故ニ血熱
ヲ清シ肝火ヲ瀉ノ寒熱往來ヲ療ス肝癰症柴胡ト合メ可ナリ
脇痛 脇ハ肝部故ニ脇痛者芍藥ヲ用テ肝血ヲ補ヒ肝邪ヲ瀉ノ治之
夫芍藥ハ肝ノ虛實俱ニ療ス蓋芍藥ノ酸味收斂ハ肝血ノ不足ヲ充
シメ又其酸寒收斂ハ肝木生發ノ亢烈ヲ逆ヲ制メ肝實ヲ瀉ス此虛
實ノ要劑ナリ **欬瘡口** 芍藥補血又血熱ヲ清ス且其收斂ヲ以テ
諸瘡ノ破口ヲ斂瘡ス **療血閉** 芍藥補血又瘀血ヲ逐故ニ女人ノ月經
閉テ不通ヲ治ス **固脛** 芍藥ノ酸收ヲ以テ脛理ヲ收閉テ固クス察ニ
本經ニ謂芍藥益氣ト芍藥ノ酸寒ヲ以テ何益氣ノ義アラシヤ此
蓋其脛理ヲ固スルヲ以ナリ脛理固收則氣不泄故ニ益氣ト云直

ニ氣ヲ補益スル者ニハ非ズ **和血** 血熱ヲ清シ血虛ヲ補瘀血ヲ逐ニ功
血分ヲ調和ス **瀉肝安脾收胃氣** 肝ハ將軍官生發勇猛ノ氣ナリ
芍藥ノ收斂者其氣ニ逆テ肝有餘ヲ瀉シ又肝火ヲ瀉ス安脾者脾
ハ土ニ屬シ且統血芍藥ヲ以テ肝木ヲ制則脾土ノ尅ヲ免又芍藥ヲ以
テ脾所統ノ血ヲ補則脾自安全ナリ收胃氣モ亦制木木尅ヲ除中
氣ノ散耗ヲ收テ不泄ガ故ナリ此皆酸味收斂ノ氣ヨリ致所也直ニ
脾胃ヲ補ニハ非ズ夫中焦ハ甘温ヲ欲メ若酸寒者ハ非所好芍藥
ノ酸寒何如ゾ直ニ中焦ヲ補メ惟肝木亢テ中焦土位ニ乘スガ故
ニ脾胃虛者ハ補中其温ノ劑中ニ芍藥ヲ合同メ木邪ノ有餘ヲ瀉ス
トキハ土尅ヲテ中氣安全ナルベシ然レ過用スルコト勿レ酸收ハ陽氣
ヲ伐易ク寒ハ胃氣
總要 白芍藥ハ收斂ノ血ヲ不泄故ニ肝血
ヲ損易シ詳ニ用之ヲ滿シム又肝木有餘ノ邪ヲ瀉ス

其性寒ナルが故ニ血熱ヲ清シ肝
火ヲ除キ并逆ノ氣ヲ折者也

使藥

須丸ノ使ハス須丸ハ代類
石ノ一名ナリ禹錫曰別本

須丸作雷丸木邪ヲ制シテ中焦ヲ補ニハ白朮ト合ス肝邪ヲ瀉スル
ニ川芎ト合ハ補血ニハ當故地黄ト合ス腹痛ヲ治スルニ甘草ト合
ス黃連ト合フ屬熱瀉痢ヲ治ス防風ト合フ瘧疹ヲ發ス夏月腹痛
肺熱アル者ハ黃芩ト合ス惡熱ノ腹痛ハ黃柏ト合ス惡寒ノ腹痛ハ
肉桂ト合用ス痢病後重

毒

芍藥ハ收斂寒性ノ者ナリ故ニ生發
陽氣ヲ伐易シ是以陽虛虛寒者勿

用之○或血虛者ト雖血分寒症ハ勿用或用ハ酒炒ニシ又ハ肉桂ト
合同スレ○産後妄ニ用之生發陽氣ヲ伐若用ハ酒炒ニス○胃氣
下陷者單ニ勿用之酸寒收斂タレハナリ○食
傷腹痛中寒腹痛尤忌之酸寒收斂ヲ以ナリ

畏惡

鐵器ヲ忌
石斛 芫消

ヲ惡消石 鼈甲 小薊

ヲ畏レ 藜蘆ニ反ス

附方

衄血咯血 白芍藥一兩犀角末二錢
半新水ニテ一錢ヲ服則血止出古今

録驗 魚骨咽ニ立者 白芍藥

愚案

芍藥ノ補血瀉子制逆清熱
有ハ其酸寒收斂ヨリ致者

也芍藥ノ主能千變万種ト雖其本ハ惟酸收ノ氣味ヨリ生者ナリ
好古日手足太陰行經藥ト案ニ芍藥ノ白色ニノ收斂スルヲ以テ
手太陰肺經ノ藥ト脾ハ統血載芍藥補血ヲ以テ足太陰脾經ノ藥
トスル乎疑此說未是芍藥ハ足厥陰肝經ノ血ヲ補者トスベシ若
脾肺兩經ノ藥ト脾脾不足症ニ妄ニ用之其酸寒上中焦ノ元
氣ヲ傷テ致害コト不サト云○或問芍藥ハ微寒ニシテ大寒ナラズ
黃連黃芩山梔黃柏等ノ寒甚ニ異ナリ吾子何恐之忌コト多乎
曰春夏ハ温暖ニシテ万物ヲ生發ス秋ハ微寒タリ其氣收斂ニシ

万物ヲ殺伐ス。芍藥ハ微寒ニシテ今連施栢ノ甚寒ニ異ナリ。雖其氣味收斂ニシテ秋殺ノ令ニ似タリ。故ニ妄ニ用之則生致氣ヲ伐サルベケシマ。李士曰雖微寒如芍藥猶且諄人告戒。冠氏云。芍藥以選中寒。此皆收寒ヲ恐テ然リ。元素謂白芍藥入脾經補中焦ノ説ニ惑テ直ニ補氣補中ノ劑トセバ。人ヲ損トサカフ。レ

修治

芍藥ハ二月二根ヲ採用ユ。人家ニ植者肥大ナリト雖氣味薄山野ニ自生者佳。其花單瓣者尤宜。採得テ米泔水ヲ以テ土氣ヲ洗干乾。銅刀ヲ以テ割用ユ。血熱肝火ヲ涼ニ生ヲ用ユ。腹痛瀉痢産後ニ用ハ酒炒ニス。補血ノ劑ニ用ハ醋ニ浸炒用ユ。或肉桂ト合ノ酒ニ浸俱ニ拌炒。桂ヲ去テ芍藥ヲ用レハ其寒收性ヲ減ノ虛寒者ニモ或用ユ。或謂血虛者ニハ煨ノ用ト。案唐ヨリ來芍藥ハ和ノ産ト形異ニテ堅重シ。和産ハ信州ヨリ出者良。魯國ノ芍藥ハ多ハ乾時ハ白ト雖水

ニ畏セハ赤色ニ變ス。信州ノ者ニモ二品アリ。一ハ真ノ芍藥也。一ハ本草ニ謂草芍藥。和ニ謂山錫杖。又土錫結ト云者ナリ。其形單瓣ノ白芍藥ニ似タリ。故ニ多クコレヲ掘採テ四方ニ貨宜擇テ用ヘシ。

赤芍藥

酸微寒。○行滯血。下結氣。利小便。消腫去肝熱。血熱。破

堅積。治赤目腸風下血。○赤芍藥ノ氣味行經ハ右ノ白芍藥ト同然。凡赤芍藥ハ白芍ヨリモ收斂ノ氣性薄シ。蓋白芍ハ西方收斂ノ金氣ヲ稟。赤芍ハ南方ノ火氣ヲ兼者也。故ニ能滯凝ノ氣血ヲ破テ癥瘕積聚ノ堅ニ用ユ。又血熱ヲ涼シ氣血ノ滯ヲ破カ故ニ腫毒ヲ消眼目ノ赤痛ヲ除キ。血熱滯血ノ下血ヲ治ス。又能小便ヲ利ス。然凡此カ直ニ小便通利ノ劑ニハ非ス。夫芍藥ハ津液ヲ收停テ滿シタル者也。津液滿則水道通入。然ト雖。白芍ハ收斂ノ盛ナル者也。赤芍ハ收斂薄ノ南方陽火ノ行道ヲ得カ故ニ津液ヲ停ノ間ニ亦テ自行シ義ヲ存

ノ小便通入。東垣曰。古人以酸澆為收。本經何以言利小便。曰芍藥能益陰。滋濕而停津液。故小便自行。非因通利也。愚案。赤芍藥利小便。獨用。其功不大。宜通利。劑下合用。スヘシ。

總案

李杲曰。白者。色在西方。故補。赤者。色在南方。故瀉。血虛。二

八白芍。瘀血結氣。赤芍。血脉ヲ通スルニハ赤芍。血脉ヲ滿レムルニハ白芍ヲ用ユ。太槩ニ芍ノハ同ノ。白芍ハ收斂ノ血ヲ不泄。赤芍モ亦收斂血。收中ニ於テ推通ノ義ヲ存ス。故ニ瘀血結氣ヲ破リ利小便ノ能アリ。

使藥

白芍藥 同シ

毒

血虛產後。及癰腫已潰後。ハ不可用。他ハ皆右ノ白芍ト同シ。

畏惡

右

白芍藥 附方 痲病ニ赤芍藥一兩。枳椇一箇。麩裏煨為末。每一錢。水一盞。煎七分。空心服。出博濟方。血不止。赤芍藥為末。水服。二錢。出車林廣記。如神散。婦人不時血大下。及帶下。

治ス。赤芍藥。香附子。等分。為末。每一貼。三錢。鹽一捻。水一盞。煎七分。温服。入舌腫強。テ口中ニ滿者。ハ急症ナリ。赤芍藥。甘草。煎水。熱シテ

口漱出。聖 愚案 芍藥治腹痛。血虛ノ腹痛ハ宜。白芍。瘀血ノ腹痛ハ赤芍ヲ用ユ。芍藥治經閉。血虛者ハ白芍。瘀血者ハ赤芍ニ宜。餘皆倣之。可知也。

雜工。白中ニ赤芍ヲ混入。宜擇テ赤白ヲ分明ニシテ可用。其功不同也。 修治 赤芍藥ノ採用。右ノ白芍藥ト同シ。今ノ藥店ニ多ハ赤芍。中ニ白芍ヲ



辛若温。治一切氣。冷氣。痰結。腹痛。心痛。嘔吐。反胃。霍亂。虫積。濕痢。腫毒。除邪。氣消。食安。胎治。此木香ノ本名ハ蜜

香。其芳。香蜜ニ似タルヲ以テナリ。然。凡沉香ノ中ニ蜜香アリテ。其名同。カ故ニ弘景コレヲ青木香ト呼。然。凡後人馬兜鈴根ヲ青木香トメ。

亦其名同カ故ニ此ヲ南木香ト呼。又後人薔薇ヲ以テ木香トス
實ニ木香ノ名多ク紛亂ス。方書ニ惟木香ト稱者ハ南木香ナリ
治一切氣時珍曰木香乃三焦氣分之藥能升諸氣。木香ノ辛
ハ散レ苦ハ疎シ温ハ行開キ。芳香ハ順通ノ上中下周身ノ氣ヲ升降
縱橫ニ調ヘ補藥ト合入ハ補助トナリ。瀉劑ニ合入ハ瀉トナル。機曰與
補藥爲佐則補與泄藥爲君則泄ト。木香ノ主能千方アリト雖此
カ調氣ノ一種ヨリ致ス。然凡補氣ニ劣。瀉氣ニハ勝リ。尤上焦肺中ノ滯氣
ヲ除ニ宜シ。然凡香附子ノ功ト異ナリ。彼ハ胸中ノ鬱氣ヲ順下入。本
香ハ胸中ノ滯氣ヲ散行シ中下焦ノ結氣ヲ疎破ス。蓋上焦ノ散行
ハ味辛ヲ以ナリ。中下焦ノ疎破ハ味苦ヲ以ナリ。且此ニ芳香ト其温
性トヲ合ノニ焦ノ氣道ヲ升降調治ス。脾胃ハ中官升降ノ間ニ位ノ
芽香ヲ喜故ニ此カ升降ノ氣ヲ調テ其芳香ナルヲ以テ脾胃ノ氣ヲ

和ス。好古謂健脾胃トハ是ナリ。直ニ脾胃ヲ補益スルニハ非ス。惟中氣不
運者尤宜シ。或小使淋瀝者木香多用ル所以モ亦調氣カ故ナリ。氣水
合一且水ハ高源ニ出。木香ハ上焦氣ヲ散行シ。三焦氣ヲ調則水道自
流通ス。或肝氣逆ノ上ニ塞テ怒易者。或中氣滯テ不食腹脹者。或氣
凝結ノ上ニ達セサル者。肺氣塞滯テ胸中煩悶者。皆用之。其氣ヲ調テ。或
痞塊痞癖癥瘕ノ劑中ニ用之者。亦其氣ヲ散行スルニ因ナリ。然レ凡
上焦ノ氣滯ヲ治スルニ獨用之。其功盛ナリ。中下二焦ノ氣ノ結滯ヲ
治スルニ於ハ宜。使ノ藥ヲ合同スベシ。元素ハ檳榔ヲ使ト。中下ノ
氣滯ヲ療スルニ宜トス。冷氣木香辛温也。故一切冷氣結滯ニ用。痰結
痰ハ氣ニ從。故ニ痰劑ニ合入ノ痰劑ヲ通入。腹痛心痛木香ハ升降ノ
氣ヲ通シ。中焦ノ滯氣ヲ運シ。且其辛温温散ノ義アルニ因テ。諸腹痛
ヲ療ス。或中焦不足ノ腹痛ト雖。補中ノ劑ニ合テ用之。必痛者尤

和語林

宜シ。熱痛者ハ過用スルコト勿レ。其辛温ナルガ故ナリ。心痛ヲ治者
モ亦木香能胸中ノ滯氣ヲ散行スレハ也。凡痛ハ氣ノ凝滯壅塞ニ
屬ス。故一切ノ心痛ヲ療ス。然レ陰虛ノ火邪衝上ノ熱痛ニハ樹膠スヘ
シ。或用ハ黃柏知母等ヲ主トシカ木香ヲ佐トスヘシ。夫木香ハ調氣
ノ劑ト雖氣虛ヨリ滯塞者ハ此ヲ君主トスルコト勿レ。人參補氣ノ劑
ヲ君主トシカ木香ヲ佐使トスヘシ。木香ノ辛苦温ハ散疎開行ノ上
焦肺氣ヲ泄シ易シ。章宜曰。雖能調氣多用能瀉肺氣不宜久服。十
ハ是ナリ。嘔吐反胃霍亂 木香ノ辛苦温ヲ以テ上中焦ノ滯氣ヲ散疎
温開スルヲ以テ。嘔吐反胃霍亂ヲ治ス。反胃ハ食入胃或半時或一時
ノ必反吐ス吐物不消出甚者ハ朝食ヲ暮ニ吐。晚食ヲ朝ニ吐。中焦ノ
虛冷氣滯ニ屬ス。木香内桂附子等ヲ合用ス。霍亂ハ中焦塞テ升降
不通ガ故ニ吐瀉同時ニ發ス。濕霍亂ト号。欲吐不吐。欲瀉不瀉。胸腹

悶乱者。乾霍亂ト名。俱ニ木香ヲ用テ升降ヲ通レ。上中焦ノ滯氣ヲ
利ノ痊。虫積 木香ノ辛苦ヲ以テ也。冷虫濕虫ノ滯積ニ亦宜シ。熱虫
症ニハ多用コト勿レ。瀉痢 木香ノ升降ヲ通レ。中焦ノ滯氣ヲ通スル
ガ故ニ。泄瀉痢病ヲ治ス。且痢疾ノ裏急ヤ。中焦ノ滯氣ニ屬ス。後重
ヤ下焦大腸ノ氣滯ニ因。木香ハ中焦滯氣ヲ通レ。又下焦ノ氣滯
ヲ疎。故ニ裏急後重者亦宜シ。腫毒 此モ亦滯氣ヲ通スルガ故也。
氣滯通則留血モ亦從テ行。氣血流通則何ノ腫毒カ不痊者アリシ。
故木香ハ血藥ニ非ト非。人ノ血氣滯凝ノ諸痛ニ用之。蓋通氣則血
行ノ義也。除邪氣 木香能邪惡ノ瘴氣ヲ除テ瘧疾瘧癘。瘧夢ヲ
去。此蓋其芳香ヲ以テリ。霧露瘴氣。瘴臭陰囊濕ヲ治スル。皆此義
也。三洞珠囊曰。燒木香能上徹九天也。實ニ芳香ノ氣藥也。消食
滯氣ヲ通スルガ故ナリ。神效麥芽山查等ノ直ニ食ヲ消スルガ如ニハ

非不調氣ノ餘功ナリ**安胎**木香ハ補血ニ非ト雖調氣則血モ調テ胎ヲ安スルノ功アリ**治疝**諸疝ハ氣滯ニ屬ス故ニ疝氣ノ名アリ木香能調氣治疝且其辛温ヲ以テ濕熱ノ壅滯ヲ開通ノ治疝ニ佳

總案

木香ハ氣分ノ留滯壅塞結滯ヲ治諸氣ヲ升降シニ焦氣分ノ壅滯充肺中ノ氣滯ヲ泄シ中氣ヲ順スル者也陳皮肉豆蔻生薑ヲ佐使ト胸腹ノ間ノ滯氣冷氣ヲ治スルニ尤佳中下太腸ノ氣滯ヲ破ニハ檳榔ヲ佐トス胃

使藥

氣ノ滯ヲ温和シ及腹中冷痛ヲ治スルニハ乾姜肉桂ニ合ス黃連ニ合ノ屬熱燥**毒**木香ハ雖調氣辛温ニ散シ易シ故ニ氣虛者ハ疾痢ヲ治スニ用コト勿レ又過用久服セレムルコト勿レ肺氣ヲ瀉シ易カ故ナリ○肺氣虛ノ有熱者○血分乾燥者○元氣虛者○陰虛内熱ノ火邪衝上者皆用コト勿レ○脈數ニ内熱伏火アル者對

酌スベシ○滙曰有熱心痛陰火衝上者則火邪皆當禁服用不得也用黃柏知母少佐木香

下陰火ハ命門ノ火ヲ云**畏惡**忌火蓋芳香ヲ失コトヲ恐ル**附方**木香

好醋ニ浸腋下ニ炙陰囊下濕臭或作瘡木香好醋ニ浸爲末傅以上出外臺秘要**牙齒痛**木香末ニ麝香少許ヲ入牙ニ揩盪湯ニテ漱

出聖濟錄諸瘡惡瘡膿瘡潰後外風寒ニ傷ラレ惡臭汁出テ不取ニ木香黃連檳榔等共爲末油ニ調頻ニ塗出和劑局方**黑髮**每正月

朔日本香湯スレバ老ニ**愚案**木香性本經ニ温ト元素好至レ疝瘕變黑シ出修養書古ハ熱ト東垣ハ微温トス

愚案ニ温ニハ薄ク微温ニハ厚シ温與微温ノ間ナル者ナリ故内熱伏火アル者ニ雖忌之亦獨用之冷寒ヲ温ト云程ノ義ナレ是以熱痢十餘黃連ニ合ノ用之冷寒ノ心腹痛ニハ桂附ト合ノ温散ノ功ヲ致ス且諸

子ニ不生ノ惟根ヨリ生スルヲ以テ牡トス丹ハ其色ニ赤ヲ名ク
消瘀血涼血熱行結氣此牡丹皮ノ主能ナリ他ハ皆此ヨリ致ス所
ノ餘功タリ牡丹ノ赤色ナル血分ニ走テ其苦ハ疎辛ハ開テ瘀血ヲ破
消シ其性ノ寒ヲ以テ血熱ヲ涼シ又苦辛ノ疎開ヲ以テ氣分ノ結
滯ヲモ行ニ至ル紅花牛膝等ト合ノ能瘀血ヲ破リ枳實枳殼等ト合
ノ能結氣ヲ破氣脹太低脹滿ハ中焦ノ虛ニ屬ス牡丹ハ血氣ノ瘀
結ヲ破者故ニ虛脹者ハ不宜用或氣ノ結滯或血ノ瘀留ニ因テ腹脹
者用之破之詳ニ實脹ヲ察ノ用ヨ治頭腰痛諸腫血熱瘀血ノ頭
痛ニ用ユ又瘀血ニ屬スル腹痛ヲ療ス太繁諸痛ハ瘀血血熱結氣ヨ
リ致ス故ニ牡丹皮ハ諸痛ニ用テ效アリ女子經閉血虛ノ經閉ニハ四
物湯ノ類ヲ以テ補血則通ス牡丹皮ハ瘀血ヨリ所致ノ經閉實症ニ
用ユ或血虛ノ經閉ト雖補血ノ劑中ニ於テ少加之導血コトアリ

過用スルコト勿レ血滯經水ノ外ニ血滯世テ長血ノ如ナル者ハ多ハ瘀血
ニ因テ血道順行セザルガ故ナリ或又血熱ニ因テ血分妄行ノ致者ア
リ俱ニ牡丹皮ヲ用テ瘀血ヲ行レ血熱ヲ涼ス產後諸疾產後ハ
補血コトヲ主トス雖然凡多ハ瘀血ヨリ諸疾ヲ致ス牡丹ハ產後ノ
瘀血ニ屬スル諸疾ヲ治ス或産中ニ惡露下盡サスノ腹痛等ヲ致
者不宜之通關節血ノ流行スル地中ノ水行ノ如シ水ハ脾濕ノ處
ニ定故ニ骨節曲屈ノ分ニハ血液淀滯易シ是以關節ノ諸病多ハ
瘀血ニ屬ス牡丹皮能通之療撲損跌撲ノ損傷ハ皆瘀血滯氣ニ
屬スレバ也續筋骨此直ニ金瘡等ノ筋骨斷絶ヲ續ニハ非ズ跌撲
等ノ瘀血ニ屬スル筋骨損傷者牡丹皮ヲ用テ瘀血結氣ヲ通シテ
續筋骨ノ助トス除風痺風痺ハ痛風也風濕濕熱經絡ニ塞
テ痛ヲナス故ニ其症必ス瘀血ヲ兼牡丹皮其瘀血ヲ通シ且其血

熱ヲ涼テ風痺ヲ除ニ宜ニ下胞常道ヲ以テ云キハ胞衣ハ胎ニ從テ俱ニ出ヘシ若其胞衣留テ不下則惡血胞中ニ滯テ愈不得下故ニ牡丹皮ヲ用テ瘀血ヲ通シ且氣ヲ行則胞衣自下ル排膿涼血熱消瘀血故ニ瘡腫ヲ排ノ功アリ治瘡腫排膿ノ理ト同シ癥瘕癩疾癩癧ハ瘀血ニ屬スレバ也癩疾ハ惡血血熱ニ屬スレバ也無汗骨蒸陰虛勞熱ニ因テ骨蒸中如蒸熱者骨蒸ト云骨蒸無汗者手足厥陰足少陰ニ屬ス牡丹皮ハ此兩經ニ入テ無汗骨蒸ヲ治ス有汗骨蒸ハ足少陰手少陽ニ屬ス地骨皮主之古方婦人無汗骨蒸ヲ治スルニ四物湯ヲ以テ牡丹皮ヲ加者此義也衄血吐血涼血熱消瘀血故也犀角地黄湯ニ以用之考見ヨ煩熱血熱ニ因テ煩熱者用之通用ノ義ニハ非

總條 牡丹皮ハ消瘀血涼血熱兼テ結氣ヲ行ノ要劑其ナリ主治ノ功多端ナリト雖皆此ニ義ヨリ致者ナリ

使藥

至地黄ト合ノ能血熱ヲ涼シ桃仁紅花等ト合ノ能瘀血ヲ破リ枳實枳殼等ト合ノ能結氣ヲ行ハ

毒

婦人血虛ノ血崩者○血虛ノ月經長下者

畏惡

忌鐵又忌蒜胡荽畏貝母

○氣血虛寒者○胃氣怯弱者俱ニ勿用之

附方

金瘡內漏內漏ハ俗謂血落胸者也牡丹皮爲末水三ノ三指撮ヲ服スレ

ハ立處ニ惡血ヲ尿ヨリ下ス出千金方婦人惡血攻上テ面赤多

怒者牡丹皮半兩乾藤燒テ烟ヲ盡ノ半兩水二鐘煎一鐘服ス此

症產後ニ尤多

愚案

時ニシガ説ヲ案ニ古方ニ牡丹皮ヲ以テ相火ヲ治ス故ニ仲景腎氣丸ニ用之然

後人專蓄積ヲ以テ相火ヲ治コトヲ知氏牡丹皮ノ相火ヲ治ノ功更

ニ黃柏ヨリ勝コトヲ不知ト元素曰丹者赤色火也故瀉腎丸中

火下陰胞中之火ハ命門ノ相火ヲ指テ云實ニ牡丹ノ赤色ナク火
也其花ノ茂成ノ實スルハ陰ニシテ其性寒ニ屬則命門陰胞中ノ伏
火ヲ瀉センコト明ナリ後人何如捨之獨黃柏ヲ主テスルヤ此皆本草
ニ昧ノ過ヨリ致ス或問元素曰牡丹皮治神志不足下然ヤ否ヤ曰
牡丹皮ハ其性寒々何ソ神志不足ヲ補ノ義アラシ此蓋牡丹ハ血
熱及陰胞ノ火ヲ涼者ナリ心ハ血ヲ主リ陰胞ノ火ハ腎ニ屬ス神ハ心
ニ舍志ハ腎ニ藏牡丹ヲ用テ血熱ヲ涼則神定陰胞ノ火ヲ涼則志收
故ニ治神志不足下云此ガ直ニ補ニハ非ズ牡丹皮ハ只消瘀血涼血熱
陰火ノ要劑タリ補藥ニハ非ズ時珍曰赤花者利白花者補人亦罕
悟宜分別之實ニ世人芍藥ノ赤白ヲ別コトアレバ牡丹ノ赤白ヲ
分者ナシ然ル白花者補トハ不是何ソ其白色ノミヲ以テ補ノ功ヲ
異ニセン愚案ニ赤花者ハ破血瀉火ノ功強ク白花者ハ破血瀉火ノ

功緩カクベキノミ彼芍藥ニ

修治

二八月ニ採根土氣ヲ洗銅刀
ヲ以テ劈破心ヲ去剉日干

赤白ヲ別ノ義ニ似タリ
乾ス肉厚者尤佳或生或炙或酒ニテ洗微焙用ユ方ニ從ヘシ雷欒説
ニハ剉テ酒ニ拌蒸ユト三時ノ干乾用ト○牡丹ハ山野ニ自生ノ單瓣
者良通用紅花或白花ヲ用ユトアリ干瓣者及異色者藥ニ勿用家
園ニ植者ハ培養種ハニノ藥性ノ眞ヲ失テ不佳山城大和ニ多植出ト
雖皆此真壤ノ他力ニ生ノ其眞性弱シ只山中自然生ノ者ノ擇用
ヘシ希人或牡丹枝梗皮或五加皮ヲ剉テ雜出ス宜撰擇

