



圖

和語本草綱目

五十四



廣益本草大成卷之四

洛下

法橋

岡本為竹一抱子

撰

薄荷



原始

本綱

關節止痢治骨蒸利咽喉治口齒諸病去舌胎語澁止血治肩背

痛△本名ハ菝葜音跋薄荷ハ俗稱也原始本草曰菝葜薄荷乃花葉

總名菝葜聲近故俗呼薄荷辛苦温唐本草辛温思總曰苦辛元素

曰辛凉今味ニ辛ノ少苦其性ヲ察スルニ温凉者欤何如ナレバ

其發汗散風寒者ハ辛温ニ非ヤ其驚熱骨蒸ヲ治シ頭目ヲ清者ハ

苦凉ニ非ヤ某ニ此カ淺表ノ氣味ハ辛温ニ其深裏ノ氣味ハ苦辛

凉也彼穀性属金平糠性熱麥肉性温麥皮性凉ナル類ノ如真西

山謂物人具太極ノ義タリ。物類相感志曰。凡收薄荷須隔夜以糞水澆之。兩後乃悉刈收。則性涼不爾不涼也。糞水ハ寒者也。澆之其表ノ温性ヲ滅テ。深裏ノ凉性ヲ助ノ義ニヨル乎。清頭目除風熱薄荷ハ浮而升。能高巔皮膚ニ達シテ頭目ノ邪ヲ清シ。皮膚ノ風熱風寒ヲ發散ス。此清字深意存セリ。清トハ譬言穢器ヲ掃洗拭清テ明潔ニスルガ如ク。其辛温ヲ以テハ頭目ノ皮表ニ滲邪ヲ開散シ。其辛苦涼ヲ以テハ頭目ノ肉骨ニ滲。鬱邪ヲ除テ。悉頭目ノ表裏ノ痰留氣ヲ清除スルノ義アルヲ云也。薄荷清頭目功。大槩茶茗ニ似テ。薄荷ハ茶茗ヨリモ頭目清利ノ功強者ナリ。故ニ頭痛眼病ニ多用之。發汗去暴寒。其辛温ヲ以テ發汗。暴寒ニ犯者ヲ療ス。或問薄荷ノ發汗輕重何如。曰薄荷ハ辛温辛苦涼也。其辛温ヲ以テ輕皮毛ノ汗ヲ發ス。發汗ノ後其辛苦涼ヲ以テ分肉ヲ清涼ス。他ノ偏

ニ發汗ノ劑ト不同コトアリ。故賊風暴寒ヲ云發毒汗ノ功アリ。暴寒トハ暴ニ冒サレタル輕ヲ云ニ非ズ。暴虐ノ烈キ寒ニ傷ラレタルヲ云。賊風暴寒ハ其邪毒烈メ分肉ニ浸透ス。一偏ノ發汗耳ニテ其邪毒ヲ去コト不能。薄荷ノ辛温先發汗。苦涼後ニ清解スルヲ以テ邪毒ノ浸透者ヲ悉ニ竭サレム。故ニ發毒汗ト云。治腹脹宿食霍亂此ニ治ハ薄荷ノ要能ニハ非ス。標能ナリ。只其辛温ヲ以テ中焦ノ鬱ヲ開散シ。辛苦涼ヲ以テ中焦ノ結滯實熱ノ氣ヲ清メ。腹脹宿食霍亂ヲ治スルノ佐トシ。其症屬實屬熱者餘藥ト合用メ治之。獨用テ治之ニ不足。小兒驚風風痰驚風症ハ風痰痰熱ニ屬ス。薄荷ノ辛温苦涼ヲ以テ風痰ヲ開痰熱ヲ涼ス。故ニ痰飲症或用之。瘰癧薄荷去風痰瘰癧モ風痰ニ屬スレバ也。瘡疥癰疹諸瘡ハ屬熱毒疥疹ハ皮表ノ風熱ニ屬ス。薄荷ノ辛苦涼ハ熱毒ヲ清シ。辛温ハ皮表ノ風熱ヲ解散

スレハ也。[漆瘡] 思邈曰薄荷煎湯洗漆瘡。蓋涼熱解表故ナリ。[火毒] 此モ亦清熱解毒故也。灸火ノ毒氣入内生瘡者尤宜。[蜂螫蛇傷] 此皆清熱解表發毒汗故也。[猫咬] 陸農師曰薄荷猫之酒也。宗奭曰猫食薄荷則醉。物相感爾。故薄荷汁ヲ猫咬ニ塗則立處ニ痊。其毒ヲ制スルノ義ニ取ノ三。[通關節] 薄荷ハ骨中ニ達ノ滯滯ヲ清ス。故ニ通關節。詳義下文ノ骨蒸條ニ註ス。[止痢] 一切ノ痢ニハ非ス。風熱ニ屬者用之。血痢症多ハ風熱ニ屬ス薄荷尤主之。[治骨蒸] 薄荷ハ氣味薄浮テ升陽也。故能高巔皮膚ノ病ヲ去。何ノ深骨中ニ達ノ蒸熱ヲ治スルマ。蓋薄荷ヲ嚼味ニ始口中辛ノ温ナリ。漸ノ次一辛若透。清涼タルコトヲ覺ユ。故ニ始口中ノ辛温ナル氣ヲ以テハ高巔及皮膚ニ至ル。漸ノ辛若透舌ノ氣ヲ以テハ骨中關節ノ深ニ達シ。其清涼ノ氣ヲ以テハ蒸熱ノ滯ヲ清ス。此等ノ義藥性ノ微妙。精神

ノ奧旨庸學ノ非所及。[利咽喉] 治口齒諸病。薄荷ハ浮テ升上ニ壅風熱ヲ清ス。故利咽喉。治口齒。章宜曰風熱上壅斯爲要藥。去舌胎語澁。舌上ニ小白泡子數粒ヲ生スル。名ニ舌胎ト云。風熱ノ上壅ニ屬スル舌胎語澁ハ薄荷主之。[止衄血] 此モ亦上熱ヲ清ガ故也。治肩背痛。風熱肺分ニ滯ノ肩背痛者用之。蓋肩背痛ハ屬肺也。好古曰搜肺盛有餘。肩背痛。肺盛ハ肺氣ノ實ヲ云。有餘ハ風熱ノ邪ヲ指薄荷ハ辛温芳香解散ノ劑タリ。故ニ肺氣損耗シ易ク以テ肺盛ニ非スレバ勿用之。[總緊] 薄荷ハ頭面及發散シ清熱去痰。鳩尾以上發散清涼ノ要藥タリ。[使藥] 蕪ト同ク糞トノ食ニ相宜シ。[毒] 薄荷ハ辛ノ氣ヲ損耗シ易シ。故ニ肺氣虛弱者。○虛寒ノ熱症ナキ者。○自汗盜汗者。○病愈テ後肺氣不全者皆勿用之。○薄荷ヲ用ハ詳ニ邪氣

有無ヲ察ノ病愈ハ速ニ止テ多服久服スルコト勿レ。虛氣虛汗
 七陽ノ患ヲ致ス。通玄曰。芳香尖利。多服久服。令人虛汗不止。○薄荷
 ハ骨蒸勞熱ヲ治ス。雖陰虛發熱者。妄ニ用ルコト勿レ。○薄荷ハ
 風寒ヲ發散ス。雖獨寒耳。ニ無熱。有ハ斟酌ス。○瘦弱人久
 服スレバ消渴
 病ヲ發動ス
 忌火。寒ニ本綱ニ忌火。義ヲ雖不見。吾朝
 醫火ヲ忌來レリ。此實ニ其方。未日ヲ失。コト

畏惡

ヲ恐テ云。
 右可ナリ
 附方
 舌胎語澁。薄荷葉ヲ按絞テ取汁。白蜜生薑
 汁ニ和シ。擦出。醫學集成。血痢不止。薄荷葉ノ

煎湯常服ス。出。普濟方。水入耳中。薄荷葉汁。耳中ニ滴入テ效アリ。
 出外臺秘要。蜂螫薄荷ヲ按塗同上。衄血不止。薄荷汁ヲ鼻中ニ
 入。或乾薄荷葉ヲ水ニ煮綿ニ裹テ鼻孔ヲ塞。出本事方。
 灸火毒入內。敗生瘡。汁出者。薄荷煎汁ヲ頻ニ塗。出醫說。

愚案

薄荷ノ功能ハ高巔及皮膚ニ在リ。雖心上焦頭目鼻口ノ
 功盛ナリトス。且發散清涼ノ雖有兩功。清涼ノ能盛者也。
 新ヲ佳トス。陳者ハ芳香ヲ失テ不可。採テ陰干ニシ。手ニテ按碎シ。細
 末ヲ振去。不然則葉中ニ所包ノ土砂アリテ惡シ。又不可洗。其香ヲ
 失也。忌火說右可也。用ニ枝梗並ヲ去ヘシ。雷斅曰。莖性燥。和俗或
 山薄荷ヲ以テ薄荷トス。甚謬也。山薄荷ハ本草ニ謂。臭蘇也。

修治

藿香



微辛微温。○開胃口。進飲食。止霍亂心
 腹痛。治吐逆。要藥。瘴風水毒腫。快氣温
 中。△豆葉ヲ藿ト云。此草葉似豆葉。且

芬香アリ。故ニ藿香ト名ク。開胃口。味微辛。性微温。タルヲ以テ開胃口
 進飲食。開胃口。故也。然凡胃熱ニ因テ不食者。不可用。中焦寒。及中
 焦不順。ノ胃口甚ガ故ニ不食者。用之。止霍亂。吐瀉同時ニ發スル濕

霍亂吐瀉。セントノ吐瀉セザル乾霍亂。俱ニ用之。藿香ノ辛温芬香ヲ以テ。胃口ヲ開中氣ヲ順則升降交通ノ愈。心腹痛。腹痛及胸痛者ヲ治ス。獨心痛者ニハ其功アラス。胃口ヲ開中焦ヲ順スルカ故ニ腹痛ヲ治ス。然レ中焦熱滯者ニハ斟酌スベシ。治吐逆。此ハ藿香ノ要能也。開胃口。喉中焦也。療風水毒腫。此通用ニハ非ス。風毒腫。或水毒腫。其風水ノ邪毒中焦ニ塞者。諸藥ト合ノ用之。快氣。其辛温芬香ナルヲ以テナリ。順氣烏藥散ニ用者是也。温中。辛微温ナルガ故也。然レ疝獨此ノニヲ用テ。肉桂乾姜等ノ如クニ急速ニ温中スルコト不能。漸用積テ漸ニ温ヘシ。藿香ハ開胃口中。其微温ナルヲ以也。總緊。焦順和ノ要劑也。使藥。陳皮。木瓜。茯苓。蘇葉。生姜ヲ得テ中寒吐逆不止者ヲ治ス。毒。胃中伏熱アル者。陰火盛

總緊

藿香ハ開胃口中。焦順和ノ要劑也。

使藥

陳皮。木瓜。茯苓。

毒

胃中伏熱アル者。陰火盛

吐者ハ皆勿用。○藿香ハ嘔吐ヲ治スル要藥タリト雖。胃熱アル者。及胃弱ノ嘔吐ニハ勿用。或問。元素謂藿香助胃氣ト。吾子何ソ胃弱吐症ニ勿用ト云ヤ。曰。李杲謂芳香之氣助脾胃ト。脾胃ハ土ニ屬ソ芳香ノ氣ヲ喜。藿香亦芳香タリ。故ニ其喜所ヲ以テ助胃氣トスルノミ。此カ直ニ補助スルニハ非ス。然レ藿香ハ辛温開鬱者。補益ノ劑ニ非則。中焦虛弱者ニハ不宜。則其芬芳ヲ失ゴト。附方。霍亂吐瀉。甚者起死回生ノ功アリ。藿香白陳皮等分。水ニ煮煎。一盞温服ス。出百一選方。去口臭。愚案。今世俗。藿香正氣散等劑ト覺者ハ甚謬ナリ。藿香ハ中焦順和ノ藥ニシテ發表ニハ非ス。

附方

霍亂吐瀉。甚者起死回生ノ功アリ。藿香白陳皮等分。水ニ煮煎。一盞温服ス。

愚案

今世俗。藿香正氣散等劑ト覺者ハ甚謬ナリ。

然斥彼正氣散ノ此蘇陳皮等ノ辛溫發表ノ劑ニ
合ノハ自發表ノ如ニ至ル獨用テ發表ノ義アルナシ
ノ芳香ヲ擇者ナシ本草ニ其氣芬香ナルコトヲ云則芳香高者ヲ
擇用ヨ塵ノ雜者ヲ採去米泔水ニ浸テ葉ノ柔タル時能土砂ヲ洗
淨シ水ヲ代コト數度ノ土砂ツキ水清ニ至テ陰乾ニシ則用ユ藥店
ニ埋藿香ト云者アリ真ノ藿香ニ非ズ青葉ト名者真種也○和
ニ謂藿香草ハ多ハ真物ニ非ズ誤用則人ヲノ吐セシム本草ノ諸説
ニ所合ノ真藿香者香ノ若吾朝ニナキニ非ズ詳ニヲ擇採ヘシ○時
珍説ヲ案スルニ古人ハ惟其葉ノミヲ用ユ後人葉ト枝梗トヲ併
用ル者ハ葉ニ偽多カ故ト通玄曰今市中售者殊久芳香定非
真種安望其有切耶ト今渡者多クハ芳香少シ疑ラクハ真物ニ
非ル歟

然斥彼正氣散ノ此蘇陳皮等ノ辛溫發表ノ劑ニ
合ノハ自發表ノ如ニ至ル獨用テ發表ノ義アルナシ
ノ芳香ヲ擇者ナシ本草ニ其氣芬香ナルコトヲ云則芳香高者ヲ
擇用ヨ塵ノ雜者ヲ採去米泔水ニ浸テ葉ノ柔タル時能土砂ヲ洗
淨シ水ヲ代コト數度ノ土砂ツキ水清ニ至テ陰乾ニシ則用ユ藥店
ニ埋藿香ト云者アリ真ノ藿香ニ非ズ青葉ト名者真種也○和
ニ謂藿香草ハ多ハ真物ニ非ズ誤用則人ヲノ吐セシム本草ノ諸説
ニ所合ノ真藿香者香ノ若吾朝ニナキニ非ズ詳ニヲ擇採ヘシ○時
珍説ヲ案スルニ古人ハ惟其葉ノミヲ用ユ後人葉ト枝梗トヲ併
用ル者ハ葉ニ偽多カ故ト通玄曰今市中售者殊久芳香定非
真種安望其有切耶ト今渡者多クハ芳香少シ疑ラクハ真物ニ
非ル歟

香 需



辛微温○治霍亂轉筋腹痛吐下利小便
便散水腫温胃調中下氣除煩熱瘧
逆冷氣鼻衄脚氣寒熱△香需本名ハ

香需其氣香ク其柔ナルヲ以テ号按スルニ今人多需ヲ讀テ需ノ
音トス然正時珍綱目ニ謂需音柔トス儒ノ音ニハ非ス
轉筋腹痛吐下 香需辛温且其葉形輕故ニ發表散邪且中焦ヲ
温開ク是以外風寒ニ犯サレ内冷寒ノ食飲ニ傷テ霍亂轉筋腹
痛吐下者用之夏月納涼ノ感寒暑ヲ冷飲食ニ避テ受寒者多ハ
霍亂轉筋腹痛吐瀉ス治之香需尤要劑タリ凡夏月ノ傷暑者ニ
症アリ東垣家ニ謂中暑中熱也炎暑ノ熱ヲ避ト欲ノ扇テ冷風
ヲ受或冷水ニ洗浴或冷水冷物ヲ飲食レ此等ノ陰冷ノ邪ニ因
テ陽氣止ラレテ外ニ發達スルコト不能故ニ頭痛發熱惡寒煩躁

口渴或吐或瀉或霍亂者ハ香薷ヲ用テ陰邪ヲ發散則愈香薷散ノ類宴人若又直ニ火者ノ氣ニ中ラレテ太熱大渴汗大ニ泄煩燥喘息或瀉或吐者此皆倦内傷元氣損虛ノ症ナリ東垣ノ清暑益氣湯或人參白虎湯等ニテ元氣ヲ補火邪ヲ制ノ症若此症ニ香薷ノ辛温散發ノ劑ヲ用則虛人實人ノ害アルコト甚シ利小便散水腫香薷ハ金水ノ兩氣ニ屬シ微上微下ノ功アリ故ニ利小便甚捷ニ是以水腫風水ヲ治スルニ尤佳風水トハ水ニ風氣ヲ兼テ腫ヲ云香薷ノ利水解表ヲ以テ宜治之温胃調中其温ヲ以テ温胃其香ヲ以テ胃ヲ喜辛ヲ以テ開胃故ニ調中ト云然此カ辛温散ノ氣烈ニ調補ノ劑ニハ非ズ中焦冷寒ノ實邪伏者用之胃氣不足者ハ勿用下氣除煩熱辛温ヲ以テ上中焦ヲ開散シ且小便ヲ利スルヲ以テ下氣然此通用ニハ非ズ若陰邪閉表陽氣上焦ニ鬱ノ氣不下胸

中煩熱者用之療嘔逆冷氣冷寒氣中焦ニ伏ノ嘔逆者用之此症尤夏月ニ在鼻衄香薷細末ノ水ニテ服則鼻衄ヲ止此下氣除煩ニ從ナリ脚氣寒熱脚氣ハ風寒濕熱ノ鬱塞ニ屬入香薷ヲ以テ此ヲ解散ス治寒熱往來モ解表ノ義ニ因也香薷ハ辛温發表ノ主劑且利小便風水ヲ治スルノ要藥也凡夏月納涼ノ陰邪收表者用之解スルニ宜シ時珍曰香薷ハ夏月解表之藥如冬月之用麻黃ト世人多ハ謂夏月暑時ノ諸症ニハ一切香薷ニ宜シトハ甚謬ナリ夏月伏陰ノ邪アリテ陽氣發越セサルノ症ニ用之他ハ盡此カ主

使藥 夏月妄ニ服則霍亂轉筋ヲ治ス

毒 元氣ヲ散ス表

畏惡 至ル者ハ一匙白山桃ヲ食コト勿シ

虛白ノ胃火ア

總條

附方

薤末丸 風水水腫利小便効アリト如神香薤一斤水一斗ニテ煎爛シ去滓再熬膏トシ白朮末七兩ヲ加合シ梧桐子大ニ丸シ毎服米飲ニテ十九日五度夜一度服ス出外聖秘要


口臭者香薤水煎 ノ會之出千金方

愚案 世醫以香薤夏月諸暑病ヲ通治スト覺ニ故ニ虛實寒熱外感内傷ノ分ナク夏月ハ必香薤飲ヲ用ユ或無病人モ亦服之暑病ヲ避トス不思ヤ夏月ハ汗泄テ真氣ヲ脱レ暑熱傷元氣病多ハ虛氣ニ屬ス何如ソ此辛温開散ノ者ヲ以テ夏月ノ諸症ニ通用シ且無病人ヲノ飲服セシムルニ至ヤ此反テ助邪伐正ノ害ヲ取ノニ案ニ汪穎曰香薤夏月煮飲代茶可無熱病ト此說一度出テ後人ノ惑ノ致ス不可不改戒時珍曰今人不知暑傷元氣不拘有病無病既用代茶謂能辟暑真癡前說夢也ト香薤ハ雖治吐逆熱ノ服スルコト勿レ反

テ吐ヲ增惟冷テ服用スヘシ熱因寒用ノ義也

修治 去莖葉與穗用忌火藥店ニ長刀香薤ト云者尤佳夏採葉冬取穗陰干ニス○和俗イヌエト云者ソ香薤トスル誤也○本綱ヲ案ズルニ平地ニ生者ハ葉大也香薤ト号屋石ニ生者ヲ石香薤ト名葉細也俱ニ通用スヘシ和名ハカサヤ

石香薤 本綱 原始



辛香温○調中温胃止霍亂吐瀉心腹脹滿腹痛腸鳴功比香薤更勝制硫黃毒○本草蒙筌ニ香薤ハ陳年者其効捷トス○以止ノ說ヲ考ニ石香薤ハ小葉ニシテ其功勝レリトス蒙筌大葉者種優ト此說何是ナル未考然リト雖石香薤ノ辛香ナル者ヲ以テ佳トセン欵

テ吐ヲ增惟冷テ服用スヘシ熱因寒用ノ義也

修治 去莖葉與穗用忌火藥店ニ長刀香薤ト云者尤佳夏採葉冬取穗陰干ニス○和俗イヌエト云者ソ香薤トスル誤也○本綱ヲ案ズルニ平地ニ生者ハ葉大也香薤ト号屋石ニ生者ヲ石香薤ト名葉細也俱ニ通用スヘシ和名ハカサヤ

紫蘇



本綱 辛温〇發表 解肌散風寒 開胃下氣 和血 安胎 定喘 消痰 治冷氣 心腹滿脹 止脚氣 霍亂 轉筋 解魚毒 蘇ハ種也

舒暢自蘇性氣血ヲ舒暢ス且葉色紫也故ニ紫蘇ト名ク 發表解肌散風寒 紫蘇ハ辛温ニノ發表肌邪ヲ解カ故ニ風寒ヲ散ス抑紫蘇ノ發散マ麻黄ノ發散ニ異也麻黄ハ直ニ發表一偏ニ汗ヲ發スルノ三紫蘇ハ不然蓋此葉赤黑ニ紫色陰陽氣血ノ色ヲ備フ故ニ氣血ノ間ニ行其輕浮テ入肺辛温中焦ヲ温胃ヲ開是以紫蘇ノ發散ハ直ニ表發汗ニハ非ズ温中開胃行氣順血衰ヨリ漸表ニ達ノ發汗章宜曰爲裏之表藥也發散ノ緩和者也故ニ氣藥ニ合メハ行氣不至表發汗辛温發表ノ劑ニ合メハ能至表發汗發散ノ劑中ニ於テ和者也 開胃 辛温香氣ヲ以テ開胃中焦氣ヲ順ス時

珍曰寬中ト是也 下氣 案ニ本草ニ紫蘇辛温ト云ト雖今味ニ辛ノ苦コトヲ覺ユ故ニ辛温浮テ胸中ノ氣ヲ開行レ其氣ヲ疎テ下降セシム 蘇頌謂下氣トハ開胃下氣ニ取也 和血 色紫ニノ血分入ト雖紫蘇ハ本血藥ニ非ズ手太陰氣分ノ藥ナリ氣行則血行此辛苦香温ヲ以テ氣ヲ行則血從テ自和スベシ 安胎 氣ヲ行テ血ヲ和スルガ故也 定喘 喘散風寒下氣故也 外邪ニ非ル所ノ喘咳ニハ斟酌スベシ 消痰 辛苦香温ヲ以テ痰鬱ヲ通フ能胸痰ヲ消ス然レ外邪ヲ兼ル實痰ノ者ニ非ハ勿用 治冷氣 辛温故也 心腹滿脹下氣則心滿ニ宜開胃温中則腹滿ニ宜レ此モ亦上中二焦ノ氣分滯實ノ者ニ用ユ 虛人ハ勿用 止脚氣 紫蘇風寒ヲ散レ又除濕且氣血ヲ行ガ故ナリ 霍亂轉筋 外邪ヨリ所致ノ者主之散邪開胃テ宜レ 解魚毒 一切魚肉ノ毒ヲ解ス尤解魚毒ヲ解スルニ宜レ 藿香

正氣散諸食傷ヲ治
スルノ功モ亦此ニ在リ
總纂
紫蘇ハ發汗ノ緩劑也
頃中焦舒胸氣長藥也
使藥

陳皮破仁ト合ノ行氣安胎
藿香烏藥ト同ノ温中止痛
香附麻黃ト合ノ發汗解邪
邪川芎當歸ト同ノ和血散血
木瓜厚朴ト同ノ散濕解暑
治霍亂脚氣若梗積滯ト同ノ利胸
寬腸杏仁萊菔子ト合ノ痰ノ消喘息ヲ定ム
毒
氣虛表虛陰虛者勿用之

○自汗盜汗症及脾胃虛寒ノ大使泄利者皆禁用
畏忌
鱈魚ト同食スレハ毒瘡ヲ生ス
附方

金瘡出血不止紫蘇葉桑葉同搗ツ貼出永類鈐法撲傷紫蘇搗ツ傳ハ自愈出試驗方一切損傷血出不止所出血ニ陳紫蘇葉カヲ浸ヒ接爛テ傳ハ不膿ノ愈無癩出永類鈐方大咬傷紫蘇葉嚼カ傳出千金方食蟹中毒紫蘇葉ノ煮汁ヲ飲出金匱要畧

愚案

紫蘇ハ胸中肺氣ノ結滯ヲ行下ニ宜ト雖辛温香散ノ劑タレハ鹿爵ノ者ニハ不宜用若或用ハ梗ニ宜レ梗ハ下リ氣葉ヨリヒ和緩ナレバ也雷教曰薄荷莖燥紫蘇莖和ト今人芳香辛味ヲ喜テ朝暮ニ食之者アリ不思ヤ其香辛ク又則人ノ真氣ヲ泄コトヲ妄ニ食過服スルト勿レ

修治

新者佳陳

者ハ香氣失藥性弱シ其儘到用ユ○本草ニ忌火ノ説ナレト雖和人ハ以爲忌火其香ヲ失コトヲ恐テ也○株ニ肥地者背面俱ニ紫色ナルヲ佳トス瘠地者面青背ノニ紫色或面背皆白者勿用六月土用ニ面背俱ニ紫色者ヲ擇採葉ノ葉系ヲ去水ニ洗清シ陰乾ニ入シ山城ヨリ多ク出ル之然凡此分量ヲ重シニトラ欲スノ葉破ノ間ニ細砂ヲ包藏ス擇テ勿用○藥店者動ハ陳年者ノ偽出又色損香微ナリ惟ニ色ニ芳香ツヨキ新葉ヲ擇ニ用之

紫蘇子 辛温。下氣治上氣喘嗽。順氣利膈。寬腸消痰。治風寒濕痺。脚氣止霍亂嘔吐。五膈利大小便。除寒温中。破癥結。解魚蟹毒。蘇子之功。入蘇葉之功。不異。俱風寒之發散。氣ヲ下シ温中。然此蘇葉ハ發散ヲ盛ニ下氣ニ弱。蘇子ハ發散ニ少。下氣温中。トヲ專ニス。上氣喘息咳嗽。順氣利膈。寬腸消痰。利大小便ノ功ハ皆下氣ヨリ致者也。霍亂嘔吐五膈ヲ治スルハ。其下氣ト温中トヲ以テ致者也。風寒濕痺脚氣癥結ヲ治スルハ。散邪解表ト辛温開發ノ功トヲ以テナリ。惟此ガ主能トスル者ハ下氣ニ在リ。故ニ喘息咳嗽上氣ノ要藥トス。然レ氣ノ逆ノ上者。二肉アリ。下焦腎陰虛。中官不和。氣上リ。氣上レバ寒其下。生ノ逆スル者。喘息咳嗽胸滿面赤痰盛。手足逆冷等ヲ致ス。此蘇子ノ所主。陳皮肉桂ト合用。宜治之。彼蘇子降氣湯ハ是ナリ。若ク又腎陰虛ノ陽ヲ損コト

無ノ上氣喘咳者アリ。惟其陰ヲ補則氣自下。或元氣虛ノ陽氣ノ本根弱カ故ニ浮上テ然者アリ。惟其陽ヲ補則氣自下。治ル此兩種ハ俱ニ蘇子ノ宜所ニ非ス。蘇子ハ辛温散氣ノ劑タリ。虛人ハ妄ニ不可用。然レ陰陽ノ虛ニ因テ上氣喘咳者ハ蘇子ニ雖不宜。其逆氣甚者ハ不得也。用之此急則治標ノ義ナリ。若如此ニ用之ハ必補劑ト合シテ施シ。效アラハ速ニ止ヨ。過服單服スルコト勿レ。惟日方書誰不云蘇子下氣。獨劉氏以爲未然者。爲其能劫氣之標。不能劑氣之本。蓋肺王氣。腎納氣之藏。今腎虛不能攝氣。歸原以致呼吸急促。此先天元氣受虧也。其法當從安腎始。是知蘇子但能降後天喘急逆氣之標病也。

使藥 陳皮ト同ノ 下氣ニ宜レ 毒 元氣虛弱者 大 便閉者 禁之 畏惡 下氣上實ヲ

蔡葉ト同然凡葉ハ宜忌火子ハ火
之忌ヲ無古方炒用コトアレハナリ

附子

夢中泄精蘇子牙
熬杵研末酒ニテ

一七日ニ兩服入出外室秘要食解毒中蘇子煮汁ヲ飲出金匱

要畧風寒濕脚氣一切冷氣蘇子良姜陳皮等分蜜三ノ梧子大ニ

丸レ空心酒ニテ十
愚案ニ皆謂蘇子辛温下今味ニ辛

丸ヲ服入出藥性論
ノ微苦レ尙モ苦味ヲ兼ニ非ハ何ゾ

下氣ノ功ヲ致シヤ辛ハ開苦ハ疎レ温
其焦少レ炒用工

ハ順スルヲ以テ下氣ノ功如此トアリ
婦人良方ニ隔紙

炒香用之

修治



辛微苦微甘平○解諸鬱治一切氣利
三焦治憂愁不樂治諸痛諸血婦人胎
產帶下消痰飲積聚婦人開鬱聖藥△

香附子

本綱 原始

本名ハ莎草此草根ニ如子者アリテ此ガ相附連續ノ以テ附子
ト名ク此ヲ諸香ニ合ノ宜レ故ニ香附子ト号ス香氣アルニハ非ズ

解諸鬱治一切氣利ニ焦香附子ハ辛ノ開放レ苦ノ疎レ降レ其ノ

緩和ス上胸膈留鬱滯ノ氣ヲ解テ下行ヒム此香附子ノ要

能ナリ故ニ諸氣鬱ヲ散シ一切ノ氣滯ヲ開ニ焦氣ヲ通利セシム

諸藥ノ中ニ於テ氣鬱ヲ解ニ宜者ハ香附子ニ勝ハナレ故ニ蘇頌謂治

心腹中空熱別錄謂除胸中熱トハ背氣鬱ノ熱ヲ治スルニ良蓋香

附ハ清熱ノ劑ニ非スト雖解鬱則熱自除コトヲ致也東垣謂治霍

亂吐瀉腹痛亦三焦ノ氣ヲ利スルニ取蓋香附ハ脾胃ノ劑ニ非スト

雖三焦ノ氣ヲ利則升降自通ノ吐瀉腹痛ヲ除ニ至也時珍謂消

飲食ハ氣行則中宮自消化スルニ從此ガ直ニ宿食ヲ消ス非ズ時

又謂治痞滿肘腫脹脚氣ハ此亦利氣ニ因テ也氣行則滿脹

除氣行則水退腫消氣行則風寒濕鬱之氣愈易且癰疽瘡瘍ヲ治スルモ亦利氣ニ從ノ三諸瘡癰ハ氣血ノ留滯ニ因ハ也治憂愁不樂此症ニ因アリ元陽氣怯ノ然者アリ香附子ニ宜惟其陽ヲ補則憂愁不起若其元氣雖夫虛氣鬱滯不伸故ニ憂愁ノ情起テ喜樂ノ氣ヲ不能發者アリ此香附子ノ發鬱テ所治ナリ若虛鬱ノ然者ハ香附子ノ雖非所主補氣助陽ノ劑ト合フ或於用テ補中ニ其鬱ヲ解ノ三治諸痛諸痛ハ氣ノ留滯ニ屬ス故ニ用之留滯之鬱氣ヲ解則痛愈諸血夫陰ハ從陽運リ血ハ從氣行ル血行則水之源泄スルコトナシ故ニ香附子ハ直ニ血藥ニ非ト雖此ガ能氣ヲ行ニ從テ血能常道ニ流行テ吐血下血尿血婦人不時崩血月水不調ノ諸症ヲ療スルニ至ル婦人胎產帶下產前產後ノ諸症ハ血氣ヲ調和スルニ在香附子ヲ以テ發鬱テ行氣則血モ亦和利ノ血氣

能並行故ニ胎前產後ノ諸症赤白帶下ヲ治ス凡婦人ノ赤帶白帶其因多端ナリト雖多ハ氣分ノ留滯ニ始ル故ニ諸帶ヲ治スル者用之至劑トス消痰飲氣鬱則津鬱ノ痰ト成氣行則津行テ痰飲去故ニ香附子ノ鬱ヲ散シ氣ヲ行ヲ以テ痰飲ヲ消スルニ至積聚香附子能氣ヲ行ガ故ニ積聚ヲ治スルノ功アリ五積六聚ハ氣血ノ留滯ニ屬スレハ也婦人開鬱聖藥好古曰此婦人之仙藥也ト香附子能氣鬱ヲ解ガ故ナリ氣鬱ノ病ヤ獨婦人ノ三有ニ非ズ男婦俱ニ此患アリト雖男子ハ陽熱發動ヲ主トス且男ハ一切外ヲ勤テ其氣散シ易ク又其情意熱滯ノ念ナシ故ニ男ノ氣病ハ多ハ氣虛ニ屬ノ氣分鬱實者少シ或ハ有ハ虛鬱症タリ婦人ハ百年ノ苦樂ヲ他人ニ任テ且華月ノ遊行少ク其寒モ亦陰トシ收靜ヲ主トシ執著ノ思念日ニ積是以婦人ノ諸病多ハ氣分ノ留滯鬱悶ニ生

彼經水不調ノ如モ氣鬱ニリ始テ血滯ヲ致ス。香附子ハ散鬱氣ヲ行滯氣ノ要藥タルヲ以テ呼ビ婦人ノ聖藥トス。元素謂陽中之陰血中之氣藥也。好古亦謂如此。婦人ノ本以血爲主則香附子血中ノ氣鬱ヲ散スルノ劑豈婦人ノ聖藥ニ非ト云者アラシヤ

總藥

香附ノ主能ヲ總藥則氣分ノ鬱ヲ散行スルニ止ノ三。或問香附ハ血中之氣藥トス川芎モ亦血中ノ氣藥タリ。兩種ノ別何ヲ以テカセン。曰川芎ハ辛温ノ劑。香附ハ辛微苦平ナル者也。芎ハ血中ノ氣ヲ導ニ止ノ三。香附ハ血中ノ氣ニ行亦諸ノ氣分ニ行テ諸ノ氣鬱留滯ヲ散行セシム。此其別也。又問香附ハ利ニ焦ト。木香モ亦謂利ニ焦ト。此辨何如。曰木香ハ氣ノ升降ヲ通メ利ニ焦ト。香附ハ胸中留鬱ノ氣ヲ散行セシムルガ故ニ三焦ノ氣ヲ利ス。實ニ木香ハ三焦升降ノ劑。香附ハ上中ニ焦ノ鬱ヲ散メ。三焦ヲ利スルノ劑

タリ。豈兩種ノ功同者ト云シヤ。又問本草ニ謂香附益氣治心松々氣ト。或謂生血トハ何ソヤ。曰此本草家ノ臆言ナリ。能此道ニ通則神アリ。若此義ヲ誤則害ヲ致ス。請盡ニ辨之。慎聽曰凡物滯則不滿ハ自然ノ理ナリ。且物其常則不損。失常則傾スルモ亦自然ノ道也。故ニ氣道鬱滯ノ其常ヲ失則不滿不健ノ不足ノ義アリ。香附子其滯鬱ヲ行テ氣ノ常度ヲ得セシムル時ハ行中ニ自益氣ノ理ヲ存セリ。汝見ヨ流水ハ勢強レ實也。止水ハ勢弱レ虚ナリ。人身ノ氣血マ不行則漸ニ不足ヲ致ス。香附ノ行氣者ヲ以益氣生血トスルノ理此ヲ以曉ベシ。好古曰香附是能益氣而止血也。又能逐去瘀血是推陳也。正如巴豆治大便不通而又止泄瀉同意。丹溪亦謂方家言香附子於老人有益。意有存焉。蓋於行中有補理。天之所以爲天者健而有常也。健運不息所以生人無窮。即此理爾。凡瀉中有補補

中有瀉。通中有止。止中有通。本草ヲ閱者、其補瀉通止ノ標本
 ノ考テ、此ヲ病因ノ虛實通止ノ標本ニ合シテ用ユ。其文ニ三拘テ、
 其主能ヲ過コト勿レ。客アリノ間、曰川芎香附子俱ニ血中ノ氣藥ニ
 ノ俱ニ利氣ノ劑タリ。川芎。久服單服スレバ元氣ヲノ大亡セシムル
 患アリト。何が故ニ香附子獨リ是ニ至ラサルヤ。曰川芎ハ辛温ニシテ且香
 氣烈者ナリ。辛香温ノ氣烈ヲ以テ元氣ヲ散亡スルニ至ル。香附子ハ
 辛ノ微。若滯氣ヲ散シ雖其性平。且烈香ノ氣ナキヲ以テ元氣ヲ亡
 失スルニ不至。然レ香附子能散滯行氣ノカアルヲ以テ。多服單服ヲ恐
 好古曰多服亦能走氣ト。耗
 氣ノ義ナキニ非コト知ヘシ
使藥
 人參。白朮。甘草ヲ得テ補氣
 當飯地黃ヲ得テ補血。木香
 ヲ得テ滯氣ヲ行シ。升降ヲ通シ。中焦ヲ和ス。沉香ヲ得テ胃氣ヲ
 散ス。川芎。蒼朮ヲ得テ能諸節ヲ解。山梔。黃連ヲ得テ鬱熱ヲ降シ。

伏神ヲ得テ心腎ノ二氣ヲ交通セシメ。茴香。破故紙ヲ得テ氣ヲ下
 元ニ散セシメ。厚朴。半夏ヲ得テ去痰消脹。中焦ヲ通ス。紫蘇。葛根。白陳
 皮ヲ得テ邪氣ヲ解散シ。三稜。莪朮ヲ得テ積塊瘀血ヲ消シ。艾葉
 ヲ得テ子宮ヲ暖メ
毒
 氣虛ノ爵ナキ者○血虛ノ瘀爵ナキ者俱
 ニ勿用之○香附子散爵行氣則多服單
 服スルコト勿レ。氣ヲノ耗散セシム○世俗ニ謂香附子宜、女人不宜、男
 子トハ誤也。爵氣氣滯ニ属
畏惡
 鐵器
附方
 女人諸病ヲ
 治ス。四制香
 附丸。香附子一斤ヲ四分テ制ス。一分ハ酒ニ浸ス。一分ハ醋ニ浸ス。下
 分ハ鹽水ニ浸ス。一分ハ童便ニ浸ス。以上各春ハ二日。秋ハ五日。夏ハ
 一日。冬ハ七日。干乾シ搗爛微焙爲末。醋ニ煮麩糊ニテ梧子ノ大二
 丸。酒ニテ七十九ヲ服ス。氣虛ニハ四君子。血虛ニハ四物ヲ合メ丸。

瑞竹堂方

蜈蚣咬

香附子嚼カテ塗ヌハ即愈チ出袖珍方

小使血淋

陰莖甚痛者香附子陳皮赤茯苓等分水煎服出十便良方氣鬱

頭痛及睛痛香附子炒四兩川芎二兩為末

愚案

本草香附散時氣

每服二錢茶湯ニテ下入常ニ服レテ根ヲ除ク

寒痰下因此世人謂香附子ハ外邪ヲ發散ス上此說甚誤ナリ香附子獨用テ何ゾ發散ノ義アラシ時珍曰得紫蘇葱白解散邪氣上夫

邪ハ因氣氣滯則邪塞氣行則邪往易レ故ニ紫蘇葱白等ノ發散ノ劑中ニ合入ノ氣ノ行則外邪往易ク且發表ノ藥氣能行テ解

表ノ功ヲ盛ニス香蘇散等ノ義此意也俗見之直ニ發散ノ劑ト覺者ハ甚

誤ナリ

修治

火ニテ毛ヲ燒去銅刀ニテ皮ヲ去石臼ニ入搗碎火ニテ毛ヲ燒去銅刀ニテ皮ヲ去石臼ニ入搗碎炒黑也ニ炒用コ炒黑也ニ炒用コ生ハ行胸膈達皮膚熱走肝腎至腰足炒黑止血童便浸炒入血分補虛血益水浸炒或蜜水浸

炒潤血燥酒浸炒行經絡發散醋浸炒消積聚姜汁浸炒化痰飲

今藥店ニ兩種アリ。栲州大坂ヨリ出者色惡内朽テ不是京西陳

安居院ヨリ出者佳安居院香附子ト号然凡製之鐵ノ杵ヲ以

碎テ忌鐵ノ說ニ差リ惟安居院ノ搗碎サル圓香附子凡粒凡

云者ヲ求テ自己鐵製之

細辛



辛温○治頭痛腦動去風寒濕利九竅下氣破痰温中去水出汗行血治咳嗽開胸中滯結通百節△根細ノ味辛レ

故ニ呼テ細辛トス治頭痛腦動細辛ハ足少陰厥陰ノ藥屬陽升

者也故ニ頭面ノ風寒濕ヲ散通ス充厥陰少陰ノ頭痛外邪ニ屬者

ヲ治ス腦動トハ頭腦ノ中痛テ腦中振動ノ苦ヲ云此少陰ノ頭

痛也蓋邪氣腦内ニ留滯スレバ也按ニ細辛ノ味甚辛ヲ以テ深ク腦

竅中竅際ニ通ノ滯塞ヲ散入。且其根葉ノ細ヤ。加骨空ノ小隙ニ達シ。其性ノ温ト辛味ト合ノ散發ノ功アリ。是以風寒ノ邪氣腦内ニ滯者用之。治スルニ宜シ。去風寒濕。其辛温ヲ以テ發散スレバ也。然凡惟皮膚ノ淺ニ客ノ邪ハ不及用之。其邪深。肉骨ノ間ニ透テ留滯スル者用之。細辛治痛風トハ此義ナリ。利九竅。其味辛。其莖細。其性温ナルヲ以テ。上下ノ九竅孔際ニ達ノ滯塞ヲ開散通利ス。故ニ明目治風眼痛。淚出。療鼻塞。不聞香臭。治口舌瘡。及喉痺齒痛。利水道。通大便。秘結。此皆利九竅ノ功ヨリ出。愚案ニ細辛ハ陽ニノ升則上下九竅ヲ利スト雖。上部眼目鼻口ノ竅ヲ利スルノ功尤勝トスヘシ。宗奭説ニ治頭面風痛不可缺之ト云。モ亦此意ナリ。又中風口瘡。不閉者。細辛ノ末ヲ鼻中ニ吹ノ術モ。亦上竅ヲ利スルノ功盛ナルニ取也。下氣破痰温中。細辛ハ陽ニノ升者也。何此下氣蓋細辛ハ陽ニ

ノ升。故ニ胸中滯結ヲ開胸膈ノ滯結開則氣自從テ下。彼桔梗ハ諸藥ヲ載ル舟楫ノ劑ニメ。此ガ能氣ヲ下ノ義ト同。細辛升テ上ヲ開ニ因テ下氣ノ功アルト知ヘシ。痰ハ因氣。細辛下氣且其辛温能留滯ヲ開通ス。故破痰尤風痰寒痰ノ留著ヲ破ニ宜シ。温中トハ中焦ヲ温ニハ非ズ。内寒ヲ温散スルノ義也。仲景少陰症ヲ治スルニ麻黃附子細辛湯アリ。内寒温散ノ意明ナリ。去水。此標能ヲ微也。猪澤木通ノ如キ水道通利スルニハ非ズ。細辛開胸氣下氣利竅ノ餘力也。元素曰散水氣ト。水濕風水等ノ沉著留滯者用之。散通入出汗辛温ナルガ故ナリ。出汗頭面ノ風氣ヲ去ニ心佳。行血氣滯ヲ行ノ餘力也。婦人月水閉。又血滯。或癰痛ノ氣血留滯ニ屬者用之。治咳嗽上テ胸肺中ノ風寒留滯ヲ散ノ治咳嗽。外邪ノ留著ニ非バ勿用。開胸中滯結。辛温陽ニノ升ガ故也。通乳汁乳按治癰癩者ハ皆此ヨリ

致ノ餘功ナリ。癩症ハ風痰胸中ニ積ニ因バ也。通百節。辛温深ク骨節ニ達ノ關節ノ留滯ヲ散通ス。故ニ四肢拘攣ヲ治ノ功アリ

總案

頭面ニ深留著結滯ノ邪ヲ散ス。細辛ノ一能也。次ニ關節膈結滯。次ニ關節ノ留滯ヲ通ス。此細辛ノ要能也。

使藥

曾青。棗根ヲ使トス。當歸。芍藥。川芎。白芷。牡丹。藁本。草ヲ得テ療婦人。決明。鯉魚膽。青羊肝ヲ得テ療目痛。

獨活ヲ使トシ能風寒ヲ散ス

毒

氣虛内熱者。○上盛下虛。相火衝升者。○氣虛自汗盜汗者。○血虛熱狂頭痛。○陰虛咳嗽。○脾胃虛泄瀉者。皆勿用。○細辛。空服ニ用ハ弱。食ニ通シ止セラ

レム。○細辛。多服單服スルコト勿レ。風藥ノ中ト雖五分ニ不過多。則反テ氣壅テ悶絶セシム。不可不知。

畏惡

黃耆。狼毒。山茱萸ヲ惡。生菜。狸肉ヲ忌。消石。滑石ヲ畏。藜蘆ニ反ス。○本

草ニ忌火義ナシ。修治纂要ニ忌火トス。何ヲ以テカ此ヲ云未考。其

旨疑ハ其温陽燥烈ヲ助シテ恐テ云云。

附方

兼金散。口舌ノ瘡ヲ治ス。細辛。黃連。等分。爲末。參之。甚効アリ。或黃

栢ト合ス。出。三因方。匿齒腫痛。細辛。煎湯熱ノ含。冷則吐。出。聖惠方。口鼻。細辛ヲ含。弘景。說。中風口禁。細辛末吹鼻。出。得効方。鼻

息肉。細辛末時々吹鼻。出。聖惠方。諸耳聾。細辛末。黃蠟ヲ溶テ丸スルコト。耳屎。大綿ニ一丸ヲ

裹耳中ヲ塞成。忍出。經驗方。其性温ト雖熱ニ近シ。能升能徹。深能破。勢烈ノ緩和者ニ非

愚案

舌ニ徹スルコト。椒ヨリモ甚シ。按ニ細辛ハ甚辛習人トノ

痛ノ實邪ニ非バ。妄ニ用コト勿レ。左常服單服ヲ恐ユ。或急症ノ如ハ

此例ニ

修治

土氣ヲ洗。蘆頭子ヲ切去。干乾シ用ユ。或土由ノ水ニ浸コト一宿ノ暴乾用ユ。○雙葉者ヲ擇去ベシ。

誤用ハ人ヲ害ス。○和ニ謂細辛ハ多ハ杜衡也。此ガ葉莖氣味細辛ニ似タリ。時珍曰杜衡之亂細辛則根而功用皆彷彿乃彌近而大亂也。不可不審。今人家ノ園ニ植テ名葵植之雷庭ノ災テト云者此細辛也。浴ノ東北賀茂ノ葵祭ニ用者真ノ細辛ナリ。凡細辛ニ似者本草ニ多存ス。審ニ用之。

防風



辛其微温。○治上焦風邪散頭目中滯氣。瀉肺實去經絡中留濕。治頭痛目眩。煩滿。金瘡。療風眼冷淚。脇痛。卒急。周身。

痛。△此草根自然ニ防風ノ良能アリ。故ニ呼テ防風トス。治上焦風邪。防風其名ニ合ノ風ヲ治ス。凡治風諸藥ハ皆解表發汗ノ劑タリ。防風獨解表發汗ノ義ナレト雖。其藥性自然ニ風氣ヲ去。故ニ他ノ發表散風ノ力強者アリト雖。防風ノ名ヲ得コトナク。此草ノ三此

名アルコトヲ得タリ。是以防風ノ治風ハ必シモ解表發汗ノ散スルニハ非ス。故ニ風邪盛者ハ獨用之不足。發表解散ノ劑ト合用ス。塵人ノ風症輕ク發センコトヲ欲者宜之。蓋防風ノ風ヲ治者ハ邪氣雖不盛。風内ニ鬱滯者用之内ヨリ逐テ外ニ出ス。譬蜘蛛ノ滿ヲ卷テ取ガ如シ。故ニ周身ノ風痛ニ用之。且防風ハ氣味俱ニ薄。浮テ升。是以身半以上ノ風症ニ其功盛ナリ。或防風稍ヲ用レハ身半以下ノ治風ノ說アリト雖。腰以上ノ功ニハ懸ニ劣リトス。散頭目中滯氣。防風氣味薄。浮テ升陽也。且辛ハ散シ。其ハ緩テ頭目中ノ滯氣ヲ治ス。滯氣トハ正氣ノ滯鬱ニハ非ス。風寒ノ邪滯ヲ云。故ニ頭風痛。風眼赤痛。冷淚ヲ療ス。瀉肺實。肺中ノ正氣鬱實ニハ非ス。風邪肺分ニ實者ヲ云。其症肩背痛息。急。鼻雍。胸中煩入。防風ノ所治也。去經絡中留濕。風濕經絡ノ中ニ留

滯ノ項強脊痛或身表痛痺者ヲ治ス **治頭痛目眩** 東垣頭痛ヲ
治スルニ常ニ風藥ヲ用ユ蓋風ハ東方ノ木化升發ノ氣タリ故ニ山
巔常ニ風氣ヲ存ス是以風邪ノ感人先頭高ニ受或直ニ頭高ニ
不受上雖風邪升陽ノ氣ハ升テ頭ニ乘ス故ニ頭自ノ病ナカ九ハ
風邪ニ屬ス且風ハ動搖ノ氣タリ是以風頭高ニ爵則頭旋目眩ス
防風能上焦頭自中ニ爵スル風氣ヲ逐則頭痛ノ頭旋目眩スル者
ヲ療ス **煩滿** 風邪肺中ニ爵ノ胸煩滿者ヲ治ス **金瘡** 防風直ニ
金瘡ヲ治スルニハ非ズ彼養血補氣生肉收口瘡藥ノ中ニ此ヲ合
用則藥氣ヲノ能外ニ達セシム内托ノ藥中ニ黃芪防風合用者是
也或瘡瘍ノ破口ヨリ風ヲ感ノ病者破傷風ト名ク防風主之李杲
曰人身勞倦者風也諸瘡見此證亦須用之 **療風眼冷淚** 防風
ハ上焦頭自ノ風ヲ治スルニ宜カ故ナリ東垣曰爲能散結去上部

風病ト然凡風眼症頸項強惡寒發熱眼中赤痛其風症甚者ハ獨
防風ノ力ニ不足紫蘇羌活薄荷等ノ辛溫發表ノ風藥ト合入スヘシ
脇痛 脇ハ肝部也左右ヲ分則左脇ハ肝右脇ハ肺トス元素曰瀉肺
實好苦曰搜肝氣ト此皆肝肺ノ去風ヲ云故ニ脇痛肝肺ノ風邪
ニ屬者ハ皆用之 **牽急** 手足屈伸者ヲ牽急トス病經筋ノ
風ニ屬ス防風主之 **周身痛** 因風身痛者皆用之逐之蓋防風ハ
佐使引導ノ藥ニ從テ周身ニ行一定ノ位ナシ故ニ周身痛屬風者ハ
何ノ所ニモ皆用之杲曰防風治一身盡痛乃卒伍卑賤之職隨所引
而至ト屬風身痛者多ハ羌活ト **防風** ハ上焦頭自中ノ
合用ノ足太陽ノ邪氣ヲ逐ヘシ **總纂** 風ヲ除又經絡中ノ留
濕ヲ去此カ其風ヲ逐マ強テ表ヲ發ニモ非ズ又必汗ヲ出ニモ非ズ
自風爵ヲ去ヘシ風爵トハ風氣ノ内ニ爵滿スルヲ云防風コレヲ内

本草綱目 卷之四 風部 防風

ヨリ逐テ出
ニ宜者ナリ

使藥

葱白ヲ得テ發汗行周身澤瀉藁本ヲ得
テ上下表裏ノ風ヲ療ス。當岐芍藥陽起石
尚餘根ヲ得テ婦人子藏風ヲ療ス。黃芪ヲ得テ表氣ヲ堅シ。瘡ヲ
抱尋常治風者羌活ト合用スベシ。麻黃紫蘇ニ合メ發汗黃芪白芍
ニ合メ
氣虛自汗盜汗者妄勿用。○肺虛者妄用則上焦元氣
ヲ瀉ス。○血虛者過用スルコト勿レ。蓋風劑ハ燥シ易
收汗

毒

車蘼ヲ畏藜蘆白欬乾姜羌花ヲ惡。附子毒ヲ殺ス。
○防風ハ又頭又尾ヲ除去ヘシ。別錄曰又頭者令人

畏惡

發在。又尾者
發人痢疾
小兒願久不令防風白芨柏子仁等分爲末
乳汁ニテ調塗。一日一換。出養生主論解毒方

附方

烏頭附子。天雄。羌花野菌毒ヲ解ス。防風煎湯ヲ飲シム。熱藥ノ毒ニ
中テ已ニ死レバ心間暖者防風一味冷水ニ漬テ口中ニ灌積善堂方

愚案

古人治自汗防風末ヲ用ユ。治盜汗防風川芎人參末ヲ
用ユ。由テ案ニ防風雖治風解表發汗ノ者ニハ非ス。風ノ
内ニ鬱者逐テ其出スヘキハ出メ後ニ其表ヲ收密スルノ義ヲ
存セリ。故ニ李杲說ニ黃芪得防風其功愈大ト云。彼廢家内抱
者黃芪防風合用則發汗ノ劑ニハ非ス。苟モ後ニ此ガ表ヲ收ノ義
アルニ非バ。此等ノ主治ヲ致コト不能。故ニ虛人ノ風ヲ逐及風症ニ
汗アル者用之。蓋風ハ汗スルニ非バ治スルコト不能。然モ症ニ汗ア
ルニ於テハ重テ發表ノ劑ヲ致シ難シ。恐ハ汗多亡陽アラシメトヲ。只
防風ノ汗ヲ發スルニ不至ノ風ヲ逐後ニ收表ノ義アル者ヲ用ヒテ治
之。古人自汗盜汗ニ用者モ。全陰陽ノ獨虛ノ致者ヲ云ニ非ス。微邪
ヲ兼テ然者ノミ。或問東垣曰風藥中潤劑也ト。然マ否ヤ。曰夫驅
風ノ劑ハ皆辛溫發散津汗ヲ泄シ氣性烈ノ燥劑トス。防風ハ辛

ト雖不猛且兼ルニ其味ヲ以ス。其性温ト雖亦微ニ芳芬ノ氣ナシ。故ニ此ガ逐風者ハ天然ノ性ヨリ出テ解表發汗ノ烈ニ不至。是以風藥ト雖強テ燥劑トスルニ不足。故ニ潤藥ト入。此直ニ燥ヲ潤ニハ非ス。又問東垣謂若補脾胃非此引用不能トハ何ゾヤ。曰東垣ノ脾胃辨惑等ノ書ヲ閱スレバ。間補中ノ治ニ防風羌活ヲ用ユ。深理存スルコトアリ。夫四時ノ生物在春。和緩春風ノ氣ニ從。人身中ノ中焦ヲ補。モ參朮等ノ其温ヲ以ス。然レ其虛ノ不行者。偏ニ補ハ加不行。偏ニ行ハ加虛ス。風藥ヲ合ノ補益スレバ。此ガ補藥ヲノ引導セシムニ從テ補。凡不瀉行。凡亦不虛ノ補與行並行テ。且補劑ノ力ヲ得タリ。彼春風アリテ暖温ヲ行則物能生化スルノ義ニ同シ。○黃耆得防風其功大ノ義ハ前ノ黃耆ノ條ニ詳也。惟防風能黃耆ヲ引テ表ニ行。行凡此ガ解表發汗ノ義ナク。後ニ收表アルニ取ノミ。必不贅

修治

水ニテ土氣ヲ洗淨シ。蘆頭ヲ去。判用ユ。頭尾ノ又者ハ毒アリ不可用。○察ニ本草ニ焙ノ説ナシ。和ニ撰スル修治纂要ニ定テ焙トス。此何ニ據マ。修治纂要ニ所述ノ製法。其ニ已カ臆見ヲ以テ不正コト間存セリ。見者詳審ニ用之。近代消防風濱防風。薩摩防風ノ數種アリ。俱ニ真物ニ非ス。又一種筆防風アリ。輕虛ニノ不宜。消防風濱防風ハ防葵ノ類ナリ。薩摩ハ證類ニ謂石防風ノ類也。頭風張痛ヲ治スルノ功アルニ。惟古來所用ノ防風良時珍曰。凡使以黃色。而潤者爲佳。白者多。少條不堪。

獨活



草得風不搖。入無風自獨搖。テ活人ノ如シ。故ニ獨活ト名ク。古ハ

苦辛其微温。○治諸風痛。中風不語。失音。手足不隨。口眼喎斜。目赤。筋骨痠急。牙腫。竟豚疝氣。破傷風。頭目眩暈。△此

獨活羌活通用ノ別コトナシ。後人別テ兩用ニ入。詳義ハ修治ノ條ニ見タリ。治諸風痛獨活ト羌活ト本一類二種ナリ。只其氣ノ雄細剛劣ノ不同ノミ。羌活ハ其氣雄ナリ。故ニ足太陽ヲ治ス。獨活ハ其氣細ナリ。故ニ足少陰ヲ治ス。此好古ガ説ナリ。李士材曰羌活氣雄可理遊風獨活氣細可理伏風ト。由テ考ニ獨活羌活俱ニ風濕ヲ治スルノ劑ニシテ。羌活ハ其氣雄剛タルヲ以テ。周身ニ遊浮スル風濕ノ邪ヲ逐ヘシ。獨活ハ其氣細ニテ筋骨關節ニ伏滯スル風濕ヲ逐ニ宜シ。故ニ頭風痛痛風齒痛腰脊痛等ノ風濕毒滯。骨節筋間ニ伏ノ痛者盡用之。中風不語失音手足不隨口眼喎斜真中風ノ伏風ニ屬者用之。目赤風毒ノ伏滯ニ因テ眼目赤痛者用之。風ヲ逐ヘシ筋骨牽急。牽急ハ屈テ不伸ヲ云ナリ。風濕ノ毒滯伏留ノ牽急疼痛者用之。牙腫足少陰ハ腎經タリ。牙齒ハ少陰腎ニ屬ス。獨活ハ足少陰腎經ノ藥タリ。故ニ風毒ノ伏滯ニ因テ牙根腫齒痛者皆用之。賁豚腎積ノ名ナリ。腎經ノ伏風ニ因テ此積アル者用之。通用ニハ非ス。疝氣疝氣症多ハ風寒風濕邪經筋ノ間ニ伏滯ス。故ニ用之。破傷風金瘡瘡口ヨリノ風ヲ受テ角子シ瘡口疼痛甚者用之。其伏風ヲ逐ニ宜シ。頭目眩暈風氣頭目ノ内ニ伏ノ頭眩目暈者用之。其伏風ヲ逐ニ宜シ。凡風ハ動搖ノ氣故ニ此ガ分肉ニ動則皮肉蠕動シ筋骨ニ動則四肢振掉シ頭目ニ動則眩暈ス。皆伏風ノ動也。俱ニ獨活ノ主治スル所ナリ。

忽既

獨活ハ得風モ不程則此草ノ性自風氣ニ勝ユトヲ得タリ。故ニ能風ヲ逐且

若ハ燥濕辛温ハ發寒是以風濕風寒俱ニ治ス。然モ其氣細ニテ經絡筋骨分肉ノ間隙ニ伏滯スル風濕風寒ノ毒ヲ逐者也。故ニ風毒ニ屬スル諸節ノ痛ヲ療スルノ要藥ナリ。

使藥

實 蠶

ヲ使トス。細辛ト同用テカ
陰頭痛頭運目眩ヲ治ス

獨活善諸藥ト合

ノ畏惡スル者ナシ

附方

出肘後方。痛風獨活羌活松節等分

案ニ恭曰。療風宜用獨活兼水宜用羌活

煮酒空心飲
孟出外臺秘要

愚案

ト。又諸家ノ本草ニ曰。羌活ハ足太陽經獨

活ハ足少陰經ノ藥トス。此皆其氣ノ剛劣ヲ以テ云。獨活羌活俱ニ
風濕ヲ逐ト雖獨活ハ得風不搖其能勝風性ヲ以テ雖逐風其氣
細ニ雄剛ナラス。故ニ伏風ヲ除凡驅邪ノ氣ハ羌活ヨリモ劣リ
是以惟療風ニハ獨活トス。羌活ハ其氣性雄剛ニ能逐風勝濕
風濕ノ兩邪ヲ除ノ力盛ナリトス。故ニ獨活療風ト云ニ對ノ兼水
羌活ヲ用ノ說アリ。獨活羌活俱ニ風濕ヲ逐ノ劑ナリ。獨活ハ風

毒

氣血虛者○自汗盜汗者○血燥者俱勿用

畏惡

風ニテ牙腫痛獨活煮酒熱シテ漱口

ノミ。羌活ハ水ノミト云ニハ非ズ。水トハ水道通利ニ非ズ。水濕留滯
ヲ云也。又獨活ハ足太陽。羌活ハ足少陰ト云ト雖獨活羌活俱ニ
足太陽少陰經ニ行。蓋足太陽少陰表裏ニシテ太陽ハ表。少陰ハ裏也。
獨活ノ氣ハ細ニ裏ニ行。羌活ノ氣ハ雄ニ
ノ表ニ行。故ニ太陽ト少陰トヲ別ト云ノミ

修治


土氣ヲ洗淨シ
皮ト黒腐トヲ削

去。判テ焙用。○俗說ニ獨活羌活ハ一物ノ内ニ兩種ニ別チ。獨活ハ
莖夕子ノ蟠テ黃色ナル處ヲ云。羌活ハ根ノ末細長別出テ紫色ナル
處ヲ云トハ甚誤ナリ。或云獨活ハ羌活ノ旧根ト。或羌活中ノ大者ヲ
擇テ獨活トス。皆甚謬也。頌曰。或擇羌活之大者爲獨活。殊未爲當
ト。獨活羌活ハ一類ニ種所出ノ地ニ異アリ。紫色ニ節密ナル者ヲ
羌活トス。黃色ニ節疎者ヲ獨活トス。獨活ハ中國ニ生シ。羌
活ハ西卷ニ生ズト。此種頌時珍ガ說ナリ。節ナキ者ハ土當飯也。白肉

黒皮茯苓香ニノ白芷氣ニ似者ハ水白芷也。擇テ勿用之。今所渡ノ活ニ節ナキ者紫色ナラザル者ヲ雜工詳ニ用ヘキノ三

活 卷

始原



南卷活無節 西卷活多節

辛苦温 ○治遊風 頸項難伸 肩背痛 脚氣腰膝腫痛 痛風癩風 頭痛目

皴。真中風失音不語手足不遂肝脹非時傷寒表症代麻黃瘰癧反張除風濕相兼者層痺不仁散瘡毒△活ノ西卷ヨリ出者ヲ活

ト号獨活卷活一類二種也 治遊風 卷活ハ其氣雄ニノ辛温能層表ニ達ノ風濕ヲ驅散入遊風ハ浮遊ノ風邪ヲ云 頸項難伸肩背強

痛此皆足太陽經ノ風症也。卷活ハ太陽ノ風ヲ逐ハナリ 脚氣腰膝腫痛風濕ニ因テ然者用之 痛風癩風 此二症邪氣在表卷活在裏獨

活ヲ用ユ多ハ二藥兼用ニ宜シ 頭痛目眩 太陽ノ風症ニシ然者卷活與川芎合用ノ宜トス 真中風 六活ノ風ニ中テ致者真中風ト云裏ニ

爵則獨活表ニ爵則卷活ニ宜シ。彼氣虛陰虛火旺ニ屬スル類中風者ハ勿用實ハ虛人ノ過アリ 失音不語手足不遂 風邪太陽ニ寒ニ然者

用之風濕相兼テ致者ハ尚以宜之 肝脹 眼ハ肝ノ竅タリ。肝ハ木蔽風化ヲ主故ニ肝風ニ因テ肝葉脹則眼睛忽垂出テ鼻ニ至リ痛甚コ

トヲ致ス。名テ肝脹ト云。卷活ノ煎湯多用テ其風ヲ逐則自愈 非時傷寒表症代麻黃 冬月即病正傷寒ノ表症ハ麻黃ヲ用テ其風寒

ヲ逐ニ宜シ。此時令凜寒氣盛ナレバナリ。若春夏温熱ノ時寒ニ傷レテ表症盛者麻黃ヲ用ハ其發散ニ過コトヲ恐故ニ卷活太陽經ノ

風寒ヲ逐ニ雄ナル者ヲ以テ。麻黃ニ代テ用之。此史國信説也。九味卷活湯ノ方意是ナリ。然ニ世俗誤テ時ノ寒温病ノ輕重ヲ不察妄

ニ麻黃アルノ方ヲ用則恐テ必卷活ニ代テ施者アリ突ヘトス。凡其病アリテ其藥ヲ用則麻黃ト雖不可恐。參茸ト雖不可恐トス

ルニ非ス。藥ニ本ヨリ補瀉剛柔ノ定躰ナレ。從病其補瀉剛柔ヲ致
ノ。人參瀉火。大黃止瀉利。香附子補氣ノ類。此ヲ定躰アリトセン
カ。補ノ瀉トナリ。瀉ノ補トナル。此醫中ノ神法ナリ。療角弓反張俗
謂。リノ病。此太陽經ノ風症ニ屬スレバ也。瘡家ニ此症多シ。除風濕
相兼者。獨活モ亦風濕俱ニ逐ト雖。風ニ挾濕者ハ羌活ノ功更ニ勝
レリ。元素曰。風能勝濕。故羌活能治水濕。胛痒不仁。風濕ニ因テ皮
層痛痒シ。風濕ニ因テ氣血塞テ皮膚不仁者用之。散瘡毒。羌活ハ
能表ノ毒ヲ驅カ故ナリ。獨活羌活ノ主能。太繁同ノ俱ニ
毒深者ハ獨活ヲ用ユ。逐風除濕ノ良劑タリ。惟風裏深
ク關節ニ在者ハ獨活ニ宜シ。風表ニ在者ハ羌活ニ宜シ。且羌活ハ風濕
ヲ逐ノ功。獨活ニ勝者ナリ。羌活獨活ハ周身百節ノ風痛
ヲ治スル要藥ナリ。其二活ノ用ハ邪氣ノ淺深ヲ以テ辨之。

總藥

使藥

川芎ト同用テ太
陽ノ頭痛ヲ治ス
毒 氣血ノ虛ニ屬者ハ身痛アリト雖勿用。若ハ燥耗スルガ故ナリ。○自汗盜汗者亦

勿用
附方 產後子腸出者。羌活ニ兩煎酒服。出必効方。太陽頭
痛甚者。羌活防風紅豆等分爲末。鼻ニ吹。出。玉機微

義。肝脹。出。益奇
疾方。詳義見前
愚案 諸家ノ本草ニ謂。羌活ハ關節ノ風痛ヲ
治トス。好古曰。後人因羌活氣雄。獨活

氣細。故雄者治足太陽風濕相搏。頭痛肢節痛。一身盡痛者。細者治
足少陰。伏風頭痛。兩足濕痺不能動止者ト。元素亦謂。羌活透關節
節ト。此皆逐風ノ剛勢ニ從テ云ノ。羌活ハ逐風ノ氣剛ヲ以テ關節
ヲ治ト云。愚案ニ獨活羌活俱ニ逐風勝濕。透關節者ナリ。然レ凡
羌活ノ氣ハ雄。獨活ノ氣ハ細ナリ。雄者ハ表ニ達シ易ク。細者ハ骨隙
ニ透リ易シ。此理ノ必然タリ。李士材曰。羌活色紫氣雄。可理遊風。

獨活色黃氣細可理伏風下。遊風ハ浮遊ノ風。伏風ハ伏藏ノ風。夕
 リ。此豈卷活ハ表ニ行易ク。獨活ハ裏ニ行易キノ義ニアラスマ。
 後人誤テ卷活ハ骨節風痛ヲ治シ。獨活ハ頸項難伸ヲ治ス。此
 背轉倒ノ説ナリ。頸項難伸ハ太陽症卷活ノ所主也。暹曰卷活
 氣雄。雄者入太陽。獨活氣細。細者入少陰也。此説亦自獨活ノ
 骨節ニ行コトヲ知ニ足リ。蓋
 太陽ハ表。少陰ハ裏。ハ也。
 削去到テ焙用ス。詳義前條ニ見タリ

修治

紫也ニソ竹節ノ如キ者佳
 土氣ヲ洗皮ト黒癭ト

廣益本草大成卷之四終

廣益本草大成卷之五

浴下 法橋 岡本為竹一抱子 撰



苦寒。○清熱。治諸瘡。諸痛。諸血症。目疾。
 消渴。泄痢。瘡。小兒疳蟲。及胎毒。除濕
 熱。△此草根連テ黃色ナリ。故ニ黃連ト

各ク清熱。黃連ハ手少陰心經ニ入テ火熱ヲ瀉スル主藥也。愚案ニ
 黃連ノ苦寒ナル。上焦心火ヲ瀉スルノ劑ニシ又中焦脾胃ノ熱ヲ涼
 ニ至ル。蓋心與脾胃子母其氣ヲ通ス。且黃連ノ黃色ナルヲ以ハ脾胃
 土ニ不可不行此藥心脾ノ熱ヲ涼ニ宜シ。故ニ腹痛消渴瀉痢ヲ
 治者ハ脾胃ノ熱ヨリ致ラ云。治諸瘡。至真要大論ニ諸瘡ノ心
 火ニ屬スルコトヲ云。黃連能心火ヲ涼カ故ニ諸瘡腫ノ初メ實熱
 ニ屬者用之其既潰爛ノ虛者ハ妄ニ勿用。尤上焦ノ腫瘡口瘡

口瘡本位

ヲ治スルニ宜シ。蓋ク瘡等ハ心火ニ屬スルヲ以テナリ。或婦人陰中
腫痛ヲ治スルノ義アリ。雖此モ亦直ニ下熱ノ致ニ非ス。心部ノ
爵火小腸ニ及テ然ガ故ナリ。諸痛至真要大論病機。諸痛ノ
心火ニ屬スルコトヲ云。故ニ或心腹痛。或諸瘡腫痛。皆心脾ノ實熱
一屬者用之。諸血症心生血肝藏血脾總血。血得熱妄行ス。故ニ
心脾肝ノ火熱ニ因テ血液妄行ノ。或上竅。或下竅ニ血ヲ出者用
之。清熱則血自止。此モ亦實熱ニ因者ヲ治ス。或問黃連心脾ノ熱
ヲ涼者ハ辨哉ニ明ナリ。何此ガ肝熱ヲ涼ニ至ヤ。曰肝ハ木トス。心
火ノ母タリ。亦母子其氣ヲ通ス。蓋心ハ南方離火ノ本藏タリ。凡
虛火ノ生スルヤ其部各不同。虛空ニ生スルガ故ナリ。實火ノ諸症モ
亦其部各雖不同。心火ヲ主トセスト云コトナシ。是以實火ノ諸症
ハ使ノ劑ニ合同ノ皆黃連ヲ通用ス。獨心火ノ熱症ニハ不可

正目疾眼目赤腫痛淚出暴發者ハ火熱ニ屬ス。黃連ニ宜シ。凡本
草家ニ黃連ヲ以テ目疾ヲ治スル聖藥トス。蓋眼病多ハ實熱タ
ルガ故ナリ。然凡亦虛熱虛寒症アリテ苓連等ノ苦寒ニ不宜者
アリ。一藥ニシテ不可治。消渴三焦ノ火熱ニ屬スレバナリ。泄痢泄瀉
痢疾ノ初腸胃ノ實熱濕熱ニ屬者用之。痢病多ハ濕熱ノ實滯ニ屬
ス。且血痢ト不食禁口痢トハ加腸胃ノ熱滯ニ因コト多シ故ニ劉涓
間曰。治痢以黃連為君ト。然凡虛ヲ主トノ瀉痢スル者アリ。一藥ニ
通用スヘカラス。痞滿心脾ノ爵實熱結ニ因テ心下痞滿ノ惡心嘔
吐者用之。小兒疳蟲成無己曰。得甘則動得苦則安ト。黃連ノ苦
ノ濕熱ヲ除ガ故ニ疳蟲ヲ療ス。胎毒胎中ノ熱毒ヲ云。因此丹瘡
癩疹等ヲ發者用之。除濕熱黃連ハ獨ハ火熱ヲ瀉スルニナラス。若ハ
勝濕寒ハ制熱除濕熱瀉痢腹痛ノ治方ニ用之者タマハコノ義ナリ

總纂

黃連ハ心脾ノ實熱ヲ涼。心火ヲ瀉スルノ要劑タリ。且能中焦濕熱ノ實滯ヲ除ク。大抵一切實熱者ハ佐使ノ

藥ニ從テ皆

使藥

黃芩。龍骨。理石ヲ使トス。龍膽草ト合テ肝膽實火ヲ涼シ。甘草ト合テ胎毒ヲ除當故

此ヲ合用ス

赤芍ト合テ熱眼ヲ療ス。枳實ト合テ痞滿不食ヲ治ス。廣木香ト合テ腹痛下痢ヲ治ス。吳茱萸ヲ佐トシテ吞酸吐水ヲ治ス。蘆薈。白蕪荑。

白槿花。白芙蓉花ト合テ

毒

心元不足者。脾胃怯弱者。腎元虛冷者。元氣不足ノ虛熱アル者。

小兒一切ノ疳熱ヲ治ス

皆勿用。凡陽氣虛冷者ハ切ニ用コトヲ禁ズ

畏惡

菊花。玄參。白鮮皮。芫花。白殭蠶。惡。疑。冬。花。牛膝。畏。烏頭。二。勝。巴

豆ノ毒

附方

痔瘡如雞冠。黃連末加赤小豆末傳出斗門方。痢或痔ニテ脫肛者。黃連末ヲ冷水ニ調塗出經

驗良方

治目中百疾。乳汁ニ黃連ヲ浸テ此ヲ内外皆ニ點ス。目赤

卒ニ疼痛者尤佳。出外臺秘要。口舌瘡。黃連煎酒冷呷出肘後方。

小兒鼻下赤爛者先

米泔ニ洗次ニ黃連末ヲ塗出子母秘錄。小兒

初生

黃連煎汁。匕ヲ灌則終身胎毒ノ患ヲ免出湯液本草。巴豆

毒ニテ瀉不止者黃連乾姜等分

愚案

黃連ハ實火ヲ瀉スル要藥トス。其苦寒ナル

為末水ニテ服シ匕出肘後方

ヲ以テ也。夫四時ノ令ヤ。春夏暖陽ヲ得テハ万物生榮シ。秋冬冷

寒ヲ得テハ万物殺傷ス。人身ノ腹内モ亦常ニ春暖生發ノ氣ニ存

則何ノ病カアラシ。故ニ苦寒冷沉ノ劑ハ喜所ニ非ト雖實熱ノ瀉

者アルニ於ハ不得已用之。是以若其黃連等ノ苦寒ヲ用ハ明ニ實

熱タルコトヲ決シテ施之藥ノ效アラバ速ニ止テ過用久服スルコト勿レ。且

反佐因用ヲ主トセヨ。古人寒劑ヲ用ニ熱藥ヲ加。熱劑ヲ用ニ寒藥ヲ


加此ノ反佐ト入。又熱劑ヲ服スルニ寒ノ飲シム。寒劑ヲ服スルニ熱ノ
 吸シム。此ヲ因用トス。如此則偏寒偏熱ノ害ナク。病邪與藥氣相非
 爭コトナシ。今庸醫知之者アルコト希ナリ。或間反佐因用ヲ知凡
 苦寒反テ熱火ヲ生スルノ義ニ昧シ。夫黃連等ノ苦寒ヲ以テ實熱
 ヲ瀉者ハ水泄火ノ義世人所知ナリ。若其元氣不足ニ因テ陰火
 生者ハ此龍雷ノ相火タリ。若寒ヲ以テ欲消則炎熱ナラ盛。病惟補
 陽ノ温藥ヲ以テスレバ陰火自退。此義ヲ不知者妄ニ黃連等ノ寒劑
 ヲ投メ日ニ攻月ニ擊則元氣加虚レ陰火彌生ノ熱入。此寒藥反テ
 生火ノ義ニ非ヤ。宗奭曰慎勿輕用ト。時珍曰中病則即當止。豈可久
 服使庸殺之令常行而伐其生發中和氣乎ト。李士材曰惟不得已
 而後敢用ト。慎恐テ過
 用スヘカラサルコト明也

修治

二月根ヲ採洗淨シ。蘆頭ヲ
 去。慢火ニテ炒毛ノ焦ニ至テ太布

ニ包。揉磨テ毛ヲ去。ナラ。鑽ニテ毛ノ殘者ヲ篩去。再色ノ昏。橙炒
 用ユ。○心火ヲ瀉スルニハ生。肝膽ノ實火ヲ瀉スルニハ豬膽汁ニ浸炒
 肝膽ノ虛火ヲ瀉スルニハ醋ニ浸炒。總テ上焦ノ火ヲ瀉スルニハ酒ニ浸
 炒。中焦ノ火ヲ瀉スルニハ姜汁ニ浸炒。下焦ノ火ヲ瀉スルニハ鹽水ニ
 浸炒。氣分ノ濕熱伏火ヲ瀉スルニハ茱萸湯ニ浸炒。血分塊中ノ伏
 火ヲ瀉スルニハ乾漆水ニ浸炒。食積ノ火ヲ瀉スルニハ黃土ヲ雜炒。眼
 目ノ劑中ニハ生ヲ用ユ。或人乳ニ浸蒸。○和黃連ハ加賀州ヨリ出者
 上品ナリ。他ハ皆細長多毛。内。空ニ黃色薄シ。不堪用。

胡黃連



伏熱。一切濕熱。療骨蒸勞熱。消渴。目疾。
 傷寒。勞復。黃疸。痔瘡。温瘧。泄痢。小兒驚

癩。不下。食。疳積。婦人胎蒸。去。菓子積。△此草。胡地ニ生。ノ功用黃連ニ

似タリ。故ニ名テ胡黃連トス。瀉心火及肝膽實火。黃連ノ功用ト
太繁同ニ似テ異アリ。胡黃連ハ大苦大寒ニ瀉心ノ性。黃連ヨリ
甚且黃連ハ瀉心火除。脾熱。胡黃連ハ心肝膽ノ火熱ヲ瀉ス。黃連
ハ氣分ノ熱火ヲ涼ニ宜シ。胡黃連ハ陰分ノ熱火ヲ涼ニ宜シ。胡
黃連ハ大苦大寒。實火ノ者ニ非バ勿用。治陰分伏熱一切濕熱。陰分
ニ伏スル實熱。及一切濕熱ノ實積ヲ治ス。此皆其實ニ非バ用テ勿レ
療骨蒸勞熱。陰分ノ伏熱ヲ去ガ故ニ骨蒸熱。及五心煩熱等ノ勞
熱ヲ除ク。然レ精液甚ダ虚竭シ。中焦氣血虚弱者ハ。骨蒸勞熱スト
雖勿用之。消渴。實火ニ屬者ヲ治ス。目疾。眼ハ肝膽ノ所主。故ニ用
之。肝膽ノ熱火ヲ瀉メ目疾ヲ療ス。此モ亦實熱ノ眼病ニ非バ勿用。
傷寒勞復。傷寒愈テ後不養生ニ從テ餘熱復裏ニ鬱結ノ病再
發者ヲ治ス。此モ亦胡黃連ハ能陰分ノ伏火ヲ去ガ故ナリ。然レ庫

實ヲ詳ニ施之。輕用コト勿レ。黃疸。胡黃連ハ能濕熱ヲ除カ故也。
濕熱ノ實鬱ニ屬ノ胃氣不虛者ニ用エ。痔瘡。濕熱ヲ瀉スルガ故也。
濕癰。寒少熱多。或單ニ熱ノ寒セサルノ癰ヲ治ス。凡癰疾ハ伏熱ニ
生ス。故ニ雖用之。妄ニ施コト勿レ。實熱ノ結伏ニ非バ勿用。泄痢。泄瀉
痢疾。症濕熱ノ鬱實ニ屬者ヲ治ス。小兒驚癇。不下食。疳積。苦ハ蟲
ヲ殺シ。寒ハ熱ヲ清ス。故ニ驚風ノ熱症。及疳積ヲ治ス。驚癇者。不
下食ハ胃口ノ熱實ニ因バナリ。苦ハ疎テ推者也。故ニ疳病積熱ア
ルヲ療ス。婦人胎蒸。婦人懷胎ノ中ニ勞熱ノ如クニ骨中ヨリ蒸熱
スルヲ云。胡黃連能陰分ノ伏熱ヲ治スルガ故ナリ。去菓子積。菓子實
ノ宿積ヲ去也。苦ハ能消推スルガ故ナリ。然レ久用テ胃氣ヲ傷ル
コトカレ。大苦大寒ハ
總條
陰分ニ伏スル實火ヲ瀉シ。濕熱ノ結
滯ヲ除。小兒ノ疳症。驚風ノ積熱ヲ

去善蟲ヲ逐故

毒

氣血虛弱者○胃氣不健者○一切冷寒ニ
屬者皆勿用○味苦ハ胃氣ヲ損易ク性太

寒者ハ陽氣ヲ伐易シ

畏惡

菊花玄參白鮮皮ヲ惡猪肉ヲ忌
誤テ合用則漏精巴豆ノ毒ヲ解

故ニ過用スルコト勿レ

スルニ

附方

小兒赤目胡黃連末ヲ茶ニテ調
手足心ニ塗ハ即愈出濟急仙方

愚案

胡黃連
ハ黃連

ニ似テ其苦寒甚者也實熱

修治

劉テ生ヲ用ユ○今人當藥
草ヲ以胡黃連トス甚非也

ニシ胃氣健者ニ非バ勿用之
其形質本草ノ説ニ不谷惟甚苦ノミ勿用唇ヨリ來者ヲ用ベシ

黃芩



苦寒○治肺熱下氣去煩療泄痢熱瘡
赤目喉腥失血熱渴淋閉黃疸骨蒸寒
熱往來女子血閉安胎小兒腹痛火奴

肺疼癆結壅氣痰熱風熱濕熱皮膚痒痛痞滿上逆喘息△芩ハ説

文作葢此草根黃色ニシ加金故ニ黃芩ト名ク治肺熱黃芩クニ能

千變万態ト雖此カ本根トスル所ノ者ハ平太陰ニ入テ肺熱ヲ涼ニ

在ノミ下氣肺ハ膈トニ在テ諸上氣ハ此カ總主所タリ故ニ熱氣肺

中ニ逆トシテ下者ハ用之黃芩ノ寒ヲ以テ清熱苦ヲ以テ氣ヲ下シ

其逆氣ヲ除去煩肺熱ニ因テ胸中煩悶スルニ宜シ療泄痢泄瀉痢

病症或風熱或濕熱一切屬熱ノ泄痢ニ皆用之蓋泄痢ハ下焦ノ

病タリ黃芩ハ上焦肺分ノ藥トス何ゾ此カ泄痢ヲ治スルヤ夫肺

與大腸表裏タリ源清則流從テ自清シ故ニ黃芩ヲ以テ肺熱ヲ

清則大腸從テ清シ泄痢ヲ治スルノ義明ナラスヤ熱瘡丁瘡乳

癰發背疽等ノ熱ニ屬スル諸瘡ニ用ユ赤目肺熱上衝ニ因テ目

中腫赤痛者ヲ治ス喉腥腥ハ金肺ニ屬ス故ニ喉腥赤鼻ノ腥ハ肺

熱ニ屬ス。黃芩ノ所主ナリ。失血ハ得寒止リ得熱妄行ス。且血ハ從氣肺ハ主氣故ニ肺熱則氣熱シ。血熱シ。氣血亂テ或吐血或六小便血ヲ致ス。黃芩其熱ヲ清則血自止。熱渴肺熱ニ因テ渴者用之。凡熱渴症。虛實ノ兩辨ヲ存ス。渴ノ冷飲ヲ惡。頻ニ熱飲ヲ欲ノ然多不飲者ハ虛熱ノ渴也。切ニ黃芩等ノ苦寒。降沉ノ劑ヲ不宜用。甘温補陽ノ劑ヲ用ヨ。渴ノ涼飲ヲ欲シ然善多飲者ハ實熱ノ渴也。芩連等ノ寒劑ニシテ熱ヲ清ス。左寸ノ脈實大者ハ黃連。右寸ノ脈實大者ハ黃芩ヲ主トセヨ。淋閉肺熱ニ因テ小便淋瀝閉癢者用之。蓋肺ハ金トシテ氣ヲ主ル。金ハ水ノ母。氣水ハ合ニタリ。故ニ肺熱則氣上ニ逆シ。水津順下スルコト不能ノ小便下ニ淋閉ス。黃芩清肺熱。逆氣則水自通利ス。本經黃芩逐水。甄權治五淋トハ皆是也。直ニ小便ヲ通利スルニハ非ズ。清肺熱下逆氣ヨリシテ此説アリ

黃疸 熱ヲ主トスル者用之。骨蒸此症兩辨アリ。陰火ノ伏熱ニ

因テ氣分ノ伏熱ニ因トナリ。黃芩所主ノ骨蒸ハ氣分ニ伏スル結實ノ熱ニ因テ然者ヲ治ス。寒熱往來 惡寒發熱ノ往來者ハ熱邪表裏陰陽ノ際氣分ニ附ノ急ナルガ故ナリ。黃芩ノ寒其氣熱ヲ清シ。味苦ヲ以テ爵急ヲ疎利ス。小柴胡湯ニ黃芩アル者是也。凡熱微則氣緩故ニ汗出。熱甚則氣急故ニ汗ナシ。是以苦寒者ニ非ハ不能清熱何如トナレハ。惟其寒性ヲ以テ雖欲清熱熱甚ニ至テハ彼氣ノ急ヲ疎利セズンバ熱自清コト不能故ニ寒勝熱苦味急其功盛ナリ。諸寒熱往來ハ半表半裏少陽ノ病トスト雖愚案ズルニ此症以蔵云則肺ニ屬ノ氣分ノ急ナルニ始者乎。譬ハ平人ト雖犯寒氣道憎トノ急ナル時ハ惡寒ノ發熱ス。或恐驚ノ氣道憎トノ急ナル時モ亦必惡寒ノ發熱ス。寒熱往來ハ氣道ノ急結ノ疎條

セザルカ故ナリ。詳義柴胡ノ條ト参考スヘシ。惟大地人身ノ道ハ緩急ノ兩道ニ在リ。天地ノ陰陽五行。人身ノ虛實補瀉。盡緩急ノ二岐ニ止者ナリ。女子血閉氣熱肺分ニ鬱シ。上逆ノ嘔下セザルガ故。經水不調者。用之。婦人ハ性執ノ氣鬱ス。氣鬱則熱ヲ肺ニ積。肺熱シ氣鬱則上逆ノ不下。氣不下則經水順流スルコト不能ナリ。故經閉ノ症。其因多端タリト雖氣熱上逆ノ症。黃芩ニ宜者。尤多シ。

安胎 胎中ハ清熱養血ヲ以テ法トス。故ニ補血ノ劑中ニ黃芩ヲ合同ス。然レ胎育ノ道。專胃氣ノ培養ニ從。苦寒者ハ胃氣ヲ損易シ。明ニ氣熱ノ候アルニ非ハ妄ニ用コト勿シ。

小兒腹痛 肺金與脾土母子ニシテ其氣相通ス。故ニ氣熱肺ニ鬱ノ此ヲ中焦ニ及則腹絞痛ス。黃芩主之。其症必渴ノ冷飲ヲ欲シ。小便赤澁。大便秘結シ。右寸脈實數ナリ。此症小兒胎熱肺ニ鬱者ニ多シ。故ニ別錄ニ小兒

腹痛ノ大。大人ニシテウシ獨小兒ニシテ此病アルニハ非ス。夫腹痛者多ハ宜。溫順不飲寒。然レ亦熱厥肺熱ノ腹痛ナキニ非ス。彼昧者ハ仲景少陽證。腹中痛者去黃芩等ノ法ヲ見テ。絶ノ苦寒ヲ不可用トス。惟其因其脈。其證ニ從テ。或寒或温以勝者制之。楊士瀛云。若熱厥腹痛。肺熱而小便不利者。黃芩其可不用乎。故善觀書者。先求之理。毋徒泥其文下。此彼仲景腹痛去黃芩。小便不利去黃芩ノ法ニハ執滯者ヲ辨セリ。

火欬 肺分ノ火熱上逆ニ因テ欬嗽喘息者。主之。若非熱症勿用。肺疼。肺熱ニ因テ胸中疼。痛者。主之。其疼。肩背月ニ引テ且胸ノ左右乳上ノ痛。尤急ナリ。

秘結 大便秘結者ハ肺熱ヲ大腸ニ移テ然リ。故ニ黃芩ヲ主之。蓋黃芩ニ實空ノ兩種アリ。黃芩堅實者ヲ實腸。凡條芩凡号。大腸ノ熱ヲ瀉スルニ宜シ。秘瀉泄痢ノ症用之。黃芩中枯ニ空。飄者空腸。凡号。凡号。上焦肺熱ヲ瀉スルニ宜シ。詳

新言本草 卷之五 肺熱

義ハ俗治ノ條ニ見タリ。壅氣肺ハ氣ヲ主ル。氣ハ陽トス。氣壅鬱則熱
レ熱鬱肺。黃芩肺ニ入テ苦ハ疎氣寒ハ清熱スルカ故ニ壅氣ヲ利
スルノ功アリ。右胸氣ヲ利スルニ宜シ。然レ其症熱ニ非バ勿用。一槩
ニ利氣トノ三覚ヘカラス。痰熱風熱濕熱凡除熱ノ藥氣一同ナラス。
或發汗ノ除熱者アリ。或通下ノ除熱者アリ。或行レ或潤ノ熱ヲ除
者アリ。黃芩ハ非出汗非下非行潤惟氣熱ヲ清涼スルノ劑タリ。夫
肺ハ金トス火ノ爲ニ乗セラレ易シ。故ニ諸火熱邪肺分ニ從スト云フ
ナレ。黃芩能肺熱ヲ清則諸熱ヲ通治スヘキコト明也。然レ熱只其
本藏ニノ三有テ肺ニ乗セラサル者アリ。詳ニ用之。大槩痰ハ熱ニ
從風熱ハ皮毛ニ始ル。肺ハ主氣及皮毛カ故ニ痰熱風熱邪十カ
八九ハ肺ニ在。且苦ハ濕ニ勝寒ハ制熱。黃芩ノ苦寒ナルハ濕熱ヲ治
スルニ宜ル。此モ亦濕熱氣分ニ有ニ非バ勿用。皮膚痒痛皮膚ハ

肺ノ合タリ。故ニ肺分ノ風熱痰熱等ニシ然者主之。痞滿肺熱
アリテ痞滿者。黃芩ノ苦寒ヲ以テ肺熱ヲ清レ。胸氣ヲ利レテ愈
上逆氣上逆ノ胸中煩熱者主之。喘息喘急症多ハ肺分ノ風
熱痰熱氣熱ニ屬ス。故ニ黃芩ヲ用テ然レ元氣
不足ノ虛熱ニ逆セララル者アリ。詳ニ用之。
ノ熱ヲ除キ。上焦及皮膚ノ風熱ヲ去。
胸中ノ痰熱ヲ退氣熱ヲ利スル要藥也。
得テハ屬熱腹痛ヲ治ス。桑白皮ヲ得テ能肺火ヲ瀉ス。白朮ヲ得
テ安胎。芍藥ヲ得テ下痢ヲ治ス。柴胡ヲ得テ寒熱往來ヲ治ス。五
味子。牡蠣ヲ得テ子アラシム。黃耆。白欝。赤小豆ヲ得テ癭癰瘰癧ヲ
治。
毒 肺虛者。○脾胃性弱者。○肌寒者。
○肺中ニ寒氣アル者。皆勿用之。
畏惡 葱實ヲ惡。丹
砂。牡丹。藜蘆

使藥

山茱萸。龍骨ヲ使
トス。厚朴。黃連ヲ

總條

肺熱ヲ瀉
レ亦大腸

痞滿

肺熱

附方

灸瘡血出 不止手足冷テ絶セントスル者酒炒黄芩二錢爲末酒ヲ以テ服ス出怪證奇方 産後飲水不止

者黄芩麥門冬等分小煎ヲ温服ス出家藏方 黄芩湯 肌熱ノ如瘰癧引飲痰嗽晝重ハ氣分ノ肺熱也片苓一兩水二鍾煎一鍾服

東垣方 眉睚痛 風熱痰也黄芩酒浸白芷

愚案

李梴曰黄芩 養陰羅天益

等分爲末每服一錢茶ニテ下ス索古方

云補氣ト此兩説ヲ見テ直ニ補陰補氣ノ劑ト不可覺養陰トハ火熱ヲ瀉スルガ故ニ云補氣トハ火與元氣兩ナガラ不立熱ハ氣ヲ傷ガ故ニ其熱ヲ瀉則氣ノ傷ヲ免故ニ補氣ト云ノニ時珍ハ謂ク衆ハ手少陰足少陽本經ノ藥トス愚案ニ仲景少陽證下後心下滿テ不痛者ヲ治スル瀉心湯ニ黄芩アリ成無己云黄芩苦而人心ト云カ故ニ黄芩ヲ以テ手少陰ノ藥トス其少陽ノ本藥トスル者ハ小

柴胡湯ニ黄芩アルヲ以テナリ此義皆不可トス黄芩ハ手少陰手陽

明ノ本藥ニシテ手少陰足少陽ノ本藥ニハ非ズ學者決ノ勿惑或問

元素謂療上部積血トハ何如曰凡一切積滯則熱ヌ熱則加積滯

入黄芩ハ直ニ逐瘀血者ニ非ト雖其苦ヤ氣血ノ留積ヲ破ルヘシ其

性寒ヤ積滯ノ熱ヲ瀉スヘシ太飲積血ノ下焦ニ在者ハ血ヨリ始ル

上焦ニ在者ハ氣滯氣熱ヨリ始テ積血トナル黄芩利氣清氣熱且

上焦ノ藥タリ故ニ上焦積血ヲ療スト云學者深上焦ノ兩字ニ眼則

此ガ積血ヲ除ノ意

修治

黄色深者ヲ擇テ外衣ヲ削リ内ノ腐ヲ去到用ユ一偏ニ爲熱トノ三欲

セハ主ヲ用ユ又酒ニ浸炒則上行ノ且苦寒ノ氣味ヲ緩ス上焦ノ

濕熱ヲ瀉スルニモ亦酒ニ洗炒用ユ○黄芩ノ腐爛ノ中枯輕飄者ヲ

枯苓片空腸片片苓片宿苓片号上行ノ肺火ヲ瀉胸氣ヲ利シ

痰熱之消。風熱ヲ除。肌膚ノ熱ヲ去。ニ用之。細實ノ中枯サル者ヲ
 條芩也。實腸凡号。大腸ノ火ヲ瀉シ下部ノ濕熱ヲ除。下痢秘結ニ用
 之。圖ノ實者ヲ子芩ト号。治功條芩ト同シ。片芩ハ旧根條芩ハ新根
 也。或其上ヲ分テ黃芩ノ上半身ハ上部ニ用ヒ。下半身ハ下部ニ
 用ユ。各其方ニ從ベシ。○案ニ藥店ニ朝鮮黃芩アリ。色淺苦味サシ
 不堪用。或誤テ南天竹撒沙翁起草ノ根ヲ掘テ黃芩ニ偽者アリ。
 絶ノ不可用。宜擇之。

柴胡



煩熱嘔吐筋掣。熱痰血凝。氣聚食積濕痺。婦人經水不調。熱入血室。
 小兒疳積。宜氣血去肌熱。△柴本作此音柴。此草山中ニ生。嫩則可

苦微寒。○治寒熱往來。陽氣下陷。傷寒
 瘧疾。口苦耳鳴。脇胸痛。目赤眩暈。
 角痛。肩背痛。潮熱。心腹結熱。心下痞滿。

如老則米テ柴トス。故ニ根ヲ呼テ柴胡トス。治寒熱往來柴胡ハ

足厥陰肝。足少陽膽經ノ藥トス。少陽經ハ陰陽表裏ノ際トス。是
 以諸寒熱往來ヲ病者ハ皆少陽經ニ屬ス。且寒熱往來ノ本マ少
 陽ノ熱ニ因。熱其半表半裏ノ間ニ爵ノ氣道急則惡寒發熱ハ性
 來ヲ致ス。惟寒熱往來ハ少陽ノ熱ニ因テ陰陽ノ氣急ナレバナリ。
 柴胡ハ少陽經ニ入テ清熱且氣薄味苦ヲ以テ其氣ノ急ヲノ緩
 ナラシム。故ニ寒熱往來ヲ主治ス。蓋熱邪陽經ニ爵則惡寒陰經
 ニ爵則發熱ス。少陽ハ陽明與太陰ノ間ニ居ス。故ニ熱邪少陽經ニ
 在則或陽ニ出。或陰ニ入テ寒熱往來ヲ致ス。好古曰。前行則惡熱
 却退則惡寒トハ是也。人身十二經ノ中手少陽足少陽アリト雖
 手少陽ハ臑臂ニ流。足少陽ハ上下ニ通行ノ膝脇ヲ行。脇ハ腹背
 之際トス。背ハ陽經ノ行。腹ハ陰經ノ行タリ。故ニ熱邪足少陽經ニ

在テ引則或腹部或背部ニ往來ノ。腹背陰陽ノ經氣ヲ急引セシムルヲ以テ。惡寒發熱ノ往來ヲ致ス。是以寒熱往來ハ獨足少陽經ニ屬シ此ガ本藥タル柴胡ノ主治スル所トス。仲景小柴胡湯モ亦此意ナリ。陽氣下陷足厥陰肝。足少陽膽ハ。膈下ニ在テ東方少陽木發生升騰ノ清陽タリ。四時ニ在テハ春陽生物ノ氣トス。故ニ人身ノ腹内ヲ春陽發生ノ氣令テ得セシムル者ハ肝膽少陽ノ木氣ニ在。此氣ヤ順升其宜ヲ得則濁陰下降ノ陰陽交通シ。胃氣中宮ニ生發シ。當衛周躰ニ生榮ス。是以東垣常ニ此清陽順升ヲ主トシ。胃氣ヲ補ノ最要トス。柴胡ハ足少陽ニ入テ彼清陽ノ下陷シ上行不能者ヲ順升セシムルコトヲ得タリ。東垣曰能引清氣而行陽道。又曰能引胃氣上行升騰而行春令。章宜曰肝爲春令。主升發。故陽氣下陷者不可缺トハ是ヲ謂ナリ。或問本草謂升

引陽明清氣上行。柴胡引少陽清氣上行ト。升麻ハ本經ニ平微寒ト。元素曰性温ト。柴胡ハ本經ニ平。別錄ニ微寒トスル。遂ニ温トスルノ說ナシ。夫性温者ハ實ニ上行スベシ。寒性者ハ當下行。柴胡何ゾ引清氣上行ノ功アルニ至ヤ。曰本草匯曰按柴胡稟仲春微寒之氣。春氣升而生ト。此實ニ章宜ガ明達ニ出テ古人ノ未辨ノ義ヲ發セリ。夫仲春ノ月ハ時陽タリ。故ニ温氣微アリト雖。但冬ノ殘陰存ノ其令ハ微寒ナリ。然ニ春陽生發ノ氣ハ順升ノ地上ニ行草木萌芽ス。此其令ハ微寒ナリト雖。其氣ハ順升生發ノ氣ヲ存メ。下焦清陽氣ヲ引テ上行セシムルニ至ル。然ニ柴胡獨用テ此功ヲ成コト不能。仲春月微寒タリト雖。温陽化ヲ兼ト非ハ升發ノ政ヲ致コト難シ。故ニ參朮木耳等ノ補氣滋陽ノ劑ト命入スル時ハ能清陽ヲ上行セシムルノ功ヲ明ニス。東垣補中湯ノ

方意是ナリ **傷寒** 傷寒陽症ノ邪熱少陽經ニ入テ半表半裏者用之。仲景小柴胡湯ニ用之和解者是也。若或傷寒熱邪太陽經ニ在者誤テ柴胡ヲ服スレバ熱邪ヲノ反テ少陽ニ入レム。若或熱邪既ニ陰經ニ入者誤テ用之重テ表ヲ傷ル。彼庸工未知之傷寒ノ熱邪表裏ノ辨ニ難者ヲ見テハ必柴胡ヲ用テ治之害ヲ致者間存セリ。章宜曰世俗不知柴胡之用每遇傷寒傳經未明為不汗不吐不下可以臧拙輒混用之不死何待 **瘧疾** 瘧ハ此熱病經足厥陰少陽ニ屬メ寒熱往來ハ故ニ諸瘧症皆用之 **口苦** 膽熱ニ因テ膽汁ヲ吐カ故ナリ。柴胡ハ肝膽ノ熱ヲ除バナリ。又心熱ニシテ口苦者ハ肝脈ニ從テ辨之 **耳聾耳鳴** 足少陽膽經ハ耳後ヲ行耳ヲ貫テ耳前ニ行故ニ膽熱ニ因テ耳聾耳鳴者ニ用之。或陽氣下陷ニ濁陰上ニ行テ然者亦用之清氣ヲ上達スレバ濁陰下行ノ愈 **脇胸痛脇ハ肝**

膽部者故ニ脇痛症ハ足厥陰少陽兩經ノ結熱ニ屬ス柴胡主之。左脇痛者右宜シ或脇ヲ主トシテ胸痛ニ引者亦用之。或清陽上行セズ濁陰上ニ埋テ胸痛者亦用之 **目赤眩暈** 眼ハ肝ノ竅トス柴胡ハ足厥陰ノ劑タリ故ニ諸眼病用之。眼赤腫痛テ肝膽ノ風熱ニ屬者尤宜之。或陽氣下陷ノ鹿眼障翳者亦補氣其温ノ劑ト合用スレシ **頭角痛** 足少陽經ハ頭ヲ用テ行故ニ少陽經ノ熱ニ因テ頭角痛者用之 **肩背痛** 足少陽經ハ肩ヲ行背ノ胛骨ニ流故ニ少陽經ノ熱ニ因テ肩背痛者用之 **潮熱** 時ヲ定テ來熱ヲ潮熱ト云日中ハ總テ陽虛ノ潮熱日中後ハ總テ陰虛ノ潮熱トス柴胡ハ下陷メ陽氣ヲ升提スルガ故ニ陽虛ノ潮熱ヲモ主治ス柴胡ハ足厥陰ノ藥タリ。足厥陰肝ハ藏血者ナリ故ニ陰虛ノ潮熱ニ亦用之。元素謂治旦辰潮熱トハ陽虛ノ熱ヲ云章宜謂治日晡潮熱往來トハ陰

和言本草

卷之五

五

虛ノ熱ヲ云也。蓋羌胡ハ除熱劑タリ。東垣曰諸有熱者宜加之。故
ニ傷寒半表半裏ノ熱。寒熱往來ノ熱。瘧疾ノ熱ヲ除凡使藥ニ
從テ表裏中外氣血陰陽ノ熱ヲ治ス。心腹結熱。肝膽ノ火ニ因テ心
腹ノ剛ニ熱ヲ結者。用之。心下痞滿。清陽氣上行セザルガ故。瀉陰不
下ノ心下痞者。又肝膽ノ熱火ニ因テ痞者皆用之。煩熱。虛實俱
ニ用之。嘔吐。肝火乘胃。嘔者。又清氣不上。濁陰心下吐者。俱用之。無
執者ハ斟酌スヘシ。筋挛筋ハ肝膽ノ合タリ。故ニ肝膽ノ熱ニヨツ
テ筋挛多者用之。熱痰。肝膽ノ熱ニ生スル痰。無涕ヲ治ス。其症多ハ
胸脇ニ塞テ病ヲ致ス。血凝。肝熱ニ因テ血分凝滯者用之。若因寒
血凝者勿用。氣聚。肝ハ血ヲ納。肝膽俱ニ屬木。發生角。益ノ陽
氣ヲ致ス。故ニ肝熱則血凝。氣聚。柴胡ハ肝膽ノ傳ヲ順行セシムル
ナリ。是以氣分ノ積聚ヲ治スルニ至ル。然惟熱ノ有無ヲ察シ

無熱者ハ斟酌スヘシ。李杲曰用柴胡以散諸經血結氣聚。功與連
翹同也。故ニ瘧家有熱者亦用之。食積。神麴。麥芽等ノ如ク。此
カ直ニ食飲ノ積滯ヲ消化スルニハ非ス。蓋柴胡ハ清氣ヲ引テ上
行セシムル者ナリ。清陽一度升則胃氣生發シ。中焦健ニ行テ食積
消散スヘシ。然則尤カチニ過飽ノ食積ニハ非ス。清氣下陷シ胃氣生發
セザルガ故ニ中焦ノ行不健ノ食積下成者。神中。行中。藥ニ合用ノ治之
章宜。日陽升則清氣上升。脾胃健行。食積消散。下。濕痺。濕熱ヲ除
經ヲ行カ故ナリ。瀝曰柴胡爲風藥。風能勝濕也。又曰氣薄能行經也。
婦人經水不調。肝ハ納血藏タリ。柴胡ハ肝經ニ入テ氣血ヲ順シ。肝熱
ヲ除ガ故ナリ。熱入血室。血室ハ血海也。婦人經水行時ニ或傷寒熱邪
ヲ病。或諸熱症ヲ患テ熱其血海ニ入テ苦者。柴胡ヲ用テ其熱ヲ除
ニ宜シ。小兒疳熱。小兒ノ疳熱多ハ肝膽ノ兩經ニ屬スレバ也。宣氣血

和言本草 卷之五 十一

若ハ氣血ヲ疎條レ微寒ハ氣血ノ執ヲ清シ此カ清氣ヲ引上スルノ
氣ヲ兼テ氣血ノ結聚ヲ宣通ス去肌熱柴胡氣味薄ノ輕性微寒
故肌熱ヲ去元素曰
惣案 柴胡ハ肝膽ノ熱ヲ除下焦ノ清氣ヲ
引テ上行セシメ氣血ヲ宣暢ス故ニ

寒熱往來ヲ治シ肌熱及骨髓ノ熱皆ヲ去陽氣ノ下陷ヲ升提ノ
胃氣ヲ上行セシム
使藥 半夏ヲ使トス黃連ヲ佐トスレハ瘡熱
尤瘡疾ノ要劑也
ヲ療シ又手足厥陰ニ行黃芩ヲ佐ト

スレハ手足少陽ニ行三稜莪朮ト合ノ堅積ノ滯血ヲ消入升麻ト合
ノ胃氣ヲ
毒 傷寒熱邪太陽ニ在者用之熱ヲ三陰ニ入シム又三陰
上行セシム
ニ在者用之重テ傷表少陽半表半裏者ニ非ハ其ニ
勿用○柴胡ハ五勞七傷羸瘦ヲ治スルノ說アリト雖實執アルニ
非ハ通用ヘルコト勿レ東垣曰傷寒外諸有熱則加之無熱則不加

此○勞症雖有執久用コト勿レ得效早止ヨ宗奭曰熱去即須急止
○下元虛冷ニ相火上炎者勿用○實氣上逆ノ嘔吐喘息咳嗽者

俱ニ對
畏惡 火ヲ忌又銅鐵ヲ忌皂莢ヲ惡女苑蘇蘆罌粟ヲ
酌スベシ
畏○本綱ニ銀カヲ以テ鬚頭ヲ去用ト入門忌

銅鐵ト然ニ今ノ庸工多ハ鐵カヲ以テ柴胡ヲ割實ニ誤リ蓋本綱
ニ所謂銀カハ惟其製ヲ重スルノ義ノミト覺テ不及用之且世ニ銀カ
ヲ存スル家希ナリ故ニ無ニ任テ惟鐵カヲ用テ銅鐵ヲ忌義ヲ不知

附方 傷寒餘熱傷寒ノ後餘熱經絡ニ入テ身瘦肌熱者柴胡
四兩甘草一兩每一貼三錢二分チ水一盞煎服出本事方

積熱ニテ下痢者柴胡黃芩等分半酒半水煎七分浸水冷テ空心
服出濟
愚案 本經ニ勞症ヲ治スルノ說ナシ後世五勞七傷
急方 勞之羸瘦ヲ治スルノ說アリ故ニ今人勞症ヲ

和語本草

治スル方中ニ柴胡ヲ不用者アルコト鮮シ。蓋柴胡ハ苦寒劑ナリ。熱ノ有無ヲ辨ノ用之。夫劣症執邪アリテ脾胃虚シ陽氣下陷者ハ少用テ清熱下陷氣ヲ升ベシ。若或無執者妄ニ過用スルコト勿シ。宗奭曰今人治劣方中鮮有不用者嗚呼凡此誤世甚多ト又曰或無熱得此愈甚ト真宜曰日華子竟信爲實謂補五勞七傷除煩益氣藥性論又謂治劣之羸瘦如此等病苟無實熱醫者執而用之不死何待可見本草釋註一字不可忽也明達者固知去取中下者寧不聽其輒哉愚察ニ宗奭ハ一槩ニ劣症者ニハ不可用トス蓋本經ニ其說ナキガ故ナリ。然凡劣症有熱者氣陷者寒熱在來者ハ必用ベシ。若或無熱及氣陷者ハ不用ノ可也。然凡劣虛ヲ病テ全ク熱ナキ者アルコトヲ不見惟病源ヲ詳ニシ加減使ノ道ヲ盡テ用之何ノ恐カラス。章實論ハ宗奭ガ言ヲ取テ無實熱ノ三字ヲ加テ辨

スト雖味定蓋柴胡ハ必實熱ニ從テ用者多クハ東垣内傷不足ノ大熱ヲ治スル補中益氣湯ノ中ニ何ゾ柴胡アルニ至ヤ。不思甚也。柴胡ハ苦ケレ凡薄シ。寒テレ凡微ナリ。且氣ハ陽ニノ上行ス故ニ除熱ノ功不烈使引導ニ從テ虛實表裏氣血諸經ノ熱ニ用ベキノミ。然下雖虛怯者ニハ過用スルコト勿シ。時珍曰精思病原加減使可也。冠氏不分藏府經絡有熱無熱乃謂柴胡不治劣之一槩擅片殊非通論。龐元英談藪曰熱有在皮膚在藏府在骨髓非柴胡不可。此豈盡實熱ノミノ謂ナラシヤ。李士材曰銀柴胡王用相做勞羸者尤爲要藥。修治 銀力ニテ蘆頭鬚ヲ去米泔水ニ洗淨シ銀力ニテ判用ユ。尤火ヲ忌コト甚シ雷散ハ赤薄皮ウ許ヲ削去ト雖強テ不及去之。○上行ニハ根ヲ用酒ニ浸干乾使下行ニハ根細ヲ用外感ニハ用生。○和産ニ鎌倉柴胡沙柴胡ノ兩種アリ時

修治

和産ニ鎌倉柴胡沙柴胡ノ兩種アリ時

珍曰其苗有如韭葉者如芥葉者以竹葉者為勝。今ノ鎌倉柴胡是也。沙柴胡ハ即雞腿兒草也。又犛牛柴胡ト云アリ即猫草根也。俱ニ柴胡ニハ非ス不可用。近世銀柴胡ト号者ヲ渡セリ。根形ハ沙參ニ類ノ大ニ皮皺色黃白。肉ニ黃紋アリテ真種ニハ非ス。此時珍謂近時有一種根似桔梗沙參白色而大市人以偽充銀柴胡殊無氣味トスル類者ナリ不足用。○章宜曰產銀夏者獨勝色微白而軟者為銀柴胡用以治勞弱骨蒸也微黑而細者用以解表散熱。李念莪云治勞與痺證乃銀州柴胡別為一種ト。此兩說不同李氏ハ銀州ノ柴胡ハ別種トス。章宜ハ銀夏ニ産スル同柴胡ノ中ニ於テ白黑軟細ヲ以テ分之何カ是ナル味詳

前胡



苦辛微寒。○去風除熱下氣消痰開胃通食治嘔吐喘息咳嗽胸滿煩悶小兒

夜啼婦人安胎△前胡ハ何ニ由テ名ケルカ其義不明時珍曰名義未解去風除熱下氣前胡ノ要能也此カ辛寒ハ風ヲ去苦寒ハ除熱下氣也熱痰ニ宜シ寒痰者ニハ斟酌スベシ開胃通食苦辛ヲ以開胃下氣故ニ通食及胃隔症ニ用者此義也然凡中焦虛弱虛寒者勿用因實熱因結氣者宜之治嘔吐喘息咳嗽胸滿煩悶此皆開胃去風下氣除熱カ故ナリ小兒夜啼前胡ノ末ヲ蜜ニテ赤小豆ノ大ニ丸ノ日一丸熱水ヲ以テ服セシム多用コト勿レ五九ニ至テ愈者膏方ニ出タリ婦人安胎下氣除熱カ故ナリ然凡久用コト勿レ若ハ胃氣ヲ損寒ハ氣ヲ伐易ケレハナリ

總要 前胡 小肝

膽二經ノ風痰ヲ去膈上ノ熱ヲ除下氣ノ要藥タリ通玄曰種人功力皆是搜風下氣之效肝膽經風痰為患者捨此莫能療

使藥

半夏ヲ使トス木仁。桑白皮。甘草。桔梗
ト合メ。風痰熱嗽ヲ豁ニ去リテ致ス

毒

氣虛者○下
陷者○血虛

症皆勿用之○陰火盛ニ氣不飯元ノ胸脇滿内熱心煩寒熱往來
咳嗽ヲ發メ外感ニ似者アリ禁用之○前胡ハ辛ト雖性微寒也

虛寒者

畏惡

火ヲ忌息皂莢ヲ
惡藜蘆ヲ畏

附方

小兒夜啼ヲ
治方見干石

愚案

前胡與柴胡俱ニ風痰ノ要劑タリ。故ニ不知者ハ謂柴胡前胡其功
均トハ誤ナリ前胡ハ手足太陰陽明藥。上焦胸中ノ氣ヲ降ス。柴
胡ハ足少陽厥陰藥。ニ下焦清陽ヲ升提セシム。實ニ不同陶弘景
曰與柴胡同功非矣。治證雖同而所入所主則異李士材曰柴胡主
升前胡主降
爲不同耳
修治
蘆頭ヲ去テ土氣ヲ洗淨メ割テ日ニ乾用ニ
或甜竹瀝ニ浸乾用コトアリ。痰火ヲ去者

宜之○野高根。此ト相似誤用レハ人ヲメ反胃ヲ發セシム宜擇之○

本草家ニ謂前胡ニ數種アリトハ非也其實ハ一物也其根白色ニ
ノ香氣アリ。蒙莖曰秋月採根。色白兼黃。氣香甚。竄ト藥店ノ者ハ
多ハ夏月ニ採テ洗淨コトヲ不善故ニ色淡黑香味不佳ナリ○本草
家言前胡葉野菊ノ如ク根黑皮白肉ニ其黑皮ヲ削去トハ誤ナリ

升麻



辛甘微苦平○治額鼻牙根痛肌間風
熱邪毒發浮汗瘰癧疹治肺痿行瘀血
治陽陷眩暈胸膈痞痛及瀉下痢後重

脫肛遺濁崩帶喉痛衄血下血血淋狂亂△此草葉麻ニ似テ
其性能上升入故ニ号升麻額鼻牙根痛升麻ハ手足陽明太陰ノ
藥升テ頭高ニ達シ浮テ皮膚ニ行且去風除熱逐毒者ナリ。夫足陽
明胃經ハ鼻莖ニ起テ牙根及額ニ行。手陽明大腸經モ亦牙根ヲ行鼻

孔ノ旁ニ至ル。升麻ハ手足陽明經ニ入テ去風除熱逐毒故頭額痛或
鼻莖痛或牙根痛腫爛惡臭ヲ發者ヲ治スル。用之九太陽頭痛ハ
兩頰ニ在。陽明頭痛ハ額中痛テ鼻莖ニ引。升麻能陽明頭痛ヲ治
ス。蓋頭痛症ニ因アリ。曰。虛曰實。虛モ亦二因アリ。曰氣虛曰血虛
也。升麻ハ陽明經ニ入テ去風除熱逐毒則陽明頭痛ハ實邪者モ
宜之。又胃氣虛シ清陽下陷ノ不升則濁陰上ニ埋テ不降故頭痛
者アリ。參芪ノ類ニ合メ用之。肌間風熱升麻ハ足陽明胃經ノ藥
胃ハ肌肉ヲ主。且升麻ハ浮テ肌表ニ達ス。故ニ肌皮間ノ風熱ヲ去
ニ宜シ。大抵裏熱者ハ苓連半表半裏ノ熱ハ柴胡肌熱ハ升麻ヲ用
若肌熱ノ其本連胃者ハ葛根ト合用ス。邪毒升麻ハ百毒ヲ除ニ
宜シ。故ニ疫癘風毒腫及蠱毒ヲ解ス。若人毒物ニ中ラル者ハ爵
金ト合用ス。毒在上吐在腹下テ愈神ノ妙方也。發浮汗汗肉間ニ

浮テ未出者用之。發之升麻葛根湯ノ意是也。然升麻ハ陽明ニ
入ノ聖藥タリ。若邪熱太陽分ニ在者誤テ升麻葛根湯ヲ用則反
テ邪氣ヲ陽明ニ入シメ害有コト不少。詳ラ宜用之。東垣曰初
病太陽證服升麻葛根湯是遺太陽不惟遺經反引太陽邪氣入干
陽明不能解也。療瘡疹好古曰爲瘡家聖藥ト或風斑或口瘡或
豆瘡麻疹症去風除熱逐毒治之。蓋瘡疹痘瘡ノ初毒逆肉表未解
者用之逐毒解表出發セシム。升麻葛根湯症是也。豆瘡序病時多ハ
此湯ヲ用テ逐之。豆瘡已ニ出ノ後ハ升麻ヲ勿用。若其出豆ノ後ニ
用之重テ解表起張スルコトナレ。或出後ト雖元氣弱或泄瀉者ノ
如ハ補中ノ劑中ニ合用ス。然升麻用ヨ勿多。其升麻葛根湯ハ出豆ノ
後ハ必勿用。時珍曰其升麻葛根湯則見後必不可用爲其解散也。
○痘瘡患上古二百コトナレ。後世父母ノ慎ヲ過テ胎毒盛ナルカ故ニ

此患アルコトヲ致ス是ヨリ其始ニハ此ガ治法モ亦未具或升麻一味ノ煎湯ヲ以テ綿ニ浸テ瘡上ヲ拭或蜜煎ノ升麻湯ヲ時飲シムルノ治ノ此痘瘡ヲ療セン温腸ナリ甄權曰療豌豆瘡水煎綿沾拭瘡上治肺癆又咳吐膿肺癰膿ナキ肺癆升麻ハ升テ肺ニ入除熱毒逐肺膿ヲ消シ宜シ行瘀血陽明胃ノ瘀血ヲ行ス然凡獨此一物ノミヲ以テハ行瘀血ニ類行血ノ劑中ニ合用ノ此功アリ古人謂陽明ノ瘀血ニノ吐血衄血者犀角地黄湯ヲ用ニ若犀角ナクハ升麻ニ代用ト蓋升麻ハ彼地黄等ノ藥ヲ引テ陽明ニ入レモ兼テ瘀血ヲ行ガ故ナリ陽明此升麻ノ要能ナリ陽明トハ陽氣ノ下陷ヲ云夫柴胡ハ足少陽ノ清氣ヲ引テ升ス升麻ハ足陽明ノ陽氣下陷ヲ升提ス此東垣益氣湯ノ意也夫陰ハ降陽ハ升此陰陽ノ常氣也若其陰虛則反テ升陽虛則反テ降陽虛ノ降則人ノ腹内秋冬收殺ノ令トナリテ遂ニ死

惟清陽能升發ノ春令アルコトヲ貴故ニ或飢飽失宜或生冷ニ傷ラレ或勞役ヲ太過ノ脾胃ヲ損元氣ヲ虛セシメ内傷ノ諸症ヲ致ス者ハ皆陽氣ノ下陷ニ生ス故ニ補中ノ藥中ニハ必升麻ヲ用テ胃中清陽氣ヲ升發セシメ諸甘温ノ劑ヲ引テ陽道ニ上行セシム此東垣家ノ奧旨也李杲曰升麻升胃中清氣又引甘温之藥上以補衛氣之散而實其表故元氣不足者用此於陰中升陽云滙曰升麻稟極清之氣升散提氣功最大得陽氣之全者也故補脾胃藥中非此爲引未能取效能升陽氣于至陰之下ト凡人五十以上ニ至テハ氣ノ消者多長者少降者多升者少秋冬ノ令勝テ春夏ノ令劣故ニ老病ヲ療者多ハ補氣補中ノ劑ニ升麻柴胡ヲ合用ノ春升ノ令ヲ得セシムルニ宜シ或問方書ニ謂柴胡ハ左ヨリ升シ升麻ハ右ヨリ升ストハ何ゾマ曰此南面ノ云ノ左ハ東方ノ木位右ハ西南

ノ間土位ナリ。柴胡ハ肝膽木部ノ清陽ヲ升ス。升麻ハ胃土ノ陽
氣ヲ升ス。故ニ左右ヲ以テ云。此左右ニ不可拘惟柴胡ハ下焦ノ清
陽ヲ升シ。升麻ハ中焦ノ清陽ヲ升ス。左右ニ偏ナレユ。有テ
弦運 清陽升提セサルカ故ニ濁陰上ニ爵ノ眩運者用之。或清陽下
陷ノ虚眼病亦宜之。其逆上實邪ノ眩運ニハ禁用。**胸脇虚痛** 虚字
ヲ眼トス。裏ニ實滯アルニ非メ。惟清陽不升故ニ濁陰埋上胸脇虚
ヲ痛者用之。久瀉下痢後重此皆升提ノ功ニ從ナリ。**脱肛** 此モ亦升
提ヨリ致所ナリ。大抵痢疾脱肛ノ症ニハ必用之。升提入。然其虚冷ニ
属者ハ獨多用コト勿レ。温藥ト合ノ少用ニ宜シ。**遺濁崩帶** 遺精白
濁婦人崩漏帶下ノ症其清陽下陷ニ属者用之。**喉痛** 足陽明經ハ
喉ヲ統升麻ハ陽明ノ本藥タリ。故ニ喉痛ヲ治スルノ能アリ。**衄血**
吐血陽明經ノ瘀血ニ因テ然者宜之。若其實火ノ升逆ニ属スル者

ハ勿用。又陽明胃氣虚陷ノ不能復血ガ故ニ然者ハ補氣行血ノ劑ニ
合ノ用之。**下血血淋** 此モ亦升提スルカ故ニ治之。**狂乱** 狂症ハ皆陽
明ノ熱ニ属ス。故ニ清熱行氣開胃ノ劑中ニ用之。藥ヲノ能陽明ニ
升シシ
總論 升麻ノ功能總テニアリ。諸藥ヲ引テ陽明ニ合
ガ爲セ
ル第一也。中焦脾胃土ノ中ノ陽氣ヲ升提セ
シムル第二也。頭面及皮膚ニ行テ
除熱去風逐毒掃瘡第三ナリ
使藥 葱白。白芷ト合ノ手陽
明太陰ノ散風邪除頭
痛石膏ヲ得テ陽明ノ齒痛ヲ治ス。參芪ト合ノ元氣ヲ升補。柴胡ト
合ノ生發ノ氣ヲノ上行セシム。葛
根ト合ノ陽明ノ汗ヲ發スル也。**毒** 實氣升逆者禁用。陽氣虚冷
出ノ後升麻葛根湯ヲ用コト勿レ。自汗アル者勿過用。升麻ハ能
下陷氣ヲ升提ス。此陽氣在下不升者ヲ升シム。若其陽氣下ニ不

足ノ元氣不升者用之下益虛ノ元氣愈不足入此章宜滙ノ發明也故李士モ亦謂下虛者勿用○熱邪太陽ニ

在テ未入陽明者勿用反テ邪氣ヲ陽明ニ引人

附方

升麻ヲ醋

ニ磨テ類ニ塗出肘後方胃熱齒痛升麻煎湯熱ノ口漱或加生

地黃出直指方口舌瘡升麻一兩黃

愚案

李杲曰胃虛傷

連三分爲末綿ニ裹含嚥出本事方

脾土爲火鬱之病者宜升麻葛根以升散其火鬱ト時珍モ亦如此

一病者升麻葛根湯ヲ用テ治ノ神效アルコトヲ言世ノ庸醫多ハ

升麻葛根湯ヲ以テ外感發散ノ劑トシ覺テ此義アルコトヲ未

知蓋胃ハ陽トシ脾ハ陰トス胃陽不足ノ脾ニ陰邪旺者安ニ寒冷

物ヲ飲食則陰邪益旺ノ胃陽塞リ遂ニ火鬱トナリテ病ヲ致ス

其証實火ニ似誤テ苦寒陰劑ヲ用則陽彌鬱ノ病加甚シ故升麻

ヲ以テ胃陽ノ陰邪ニ屈セラル者ヲ升發セシメ葛根ヲ以テ陽

明ノ火鬱ヲ伸則陰邪自開陽氣能和ノ效ヲ致ス若其胃氣不足

スルコトノ太者ハ四君子湯與升麻葛根湯合劑ニ柴胡蒼朮黃芪

ヲ加若其人常嗜酒者ハ時々温酒少許ヲ與テ發陽ヲ助此時珍

發明ノ意也由テ愚案ニ夫酒ハ大熱物也故ニ酒病者ハ冷寒劑ヲ

以難如可治寒藥反テ阻陽遏濕不能治惟辛温劑ヲ以テ陽鬱ヲ

發シ濕滯ヲ散則效アリ此東垣葛花解醒湯ノ意也故ニ酒モ亦絶

ヘカラス時温酒少許ヲ與テ酒鬱ヲ發ノ助トスベシ酒ヲ絶トキハ

酒鬱難發藥力難行然凡久ク飲シムルコト勿レ鬱稍發病稍退ニ

至ハ反テ絶テ酒ヲ飲シムルコト勿レ凡酒病ハ續ハニ酒ヲ與コトハ

愚カ臆見ニ非ス河間ノ法也酒病ハ少與酒藥功ヲ助者ハ時珍ノ

意也然ニ今醫者酒病ヲ見テハ必酒ヲ悉テ禁之此皆醫書ニ不傳

經

修治

氷海水ニテ土氣ヲ洗淨シ黑皮及腐下蘆頭下ヲ削
 去若鬚アル者ハ其毛ヲ去剝用ユ○升麻ハ細黒色
 堅實者良青緑也者雞骨升麻トス外黒裏白ノ緊實者ヲ鬼臉升
 麻トス有鬚俱ニ用ヘシ鹿犬者不堪用○今藥店クリト云者ヲ
 上片麻トス惟細黒色堅實者ヲ擇テ第一トスヘシ○和謂升麻ハ
 息火ト然凡本草ニ此説ナシ案ニ獨此ノミナラス本草ニ息火ノ説無
 ノ和ニ息火者多シ蓋本草ニ焙炒ノ製ナキ者ハ皆以テ爲息火豈製
 焙炒セサルヲ以必息火トセンヤ或如有香氣者悉失其芳香息火ノ新
 法ヲ立者ハ或可也升麻ハ芳草ニ非ス何以力息火トスルマ未審トス
 苦寒○治命門相火有餘瀉肺火療消
 渴熱中傷寒久癰心煩熱厥頭痛骨蒸
 勞熱熱欬熱痰陽明熱△知母本人名



知母 本綱 始原

ハ蟻母也宿根ノ旁ニ初テ生子故ニ母ト号シ根ノ狀蟻蟲ニ似
 タリ故ニ蟻ト号ス後世訛テ作知母 治命門相火有餘 知母ハ
 氣味俱ニ厚沈テ下降ス足少陰腎ノ本藥也夫命門ノ相火
 ヲ以テ獨右腎ノ火トスル者ハ誤也兩腎水中ノ龍火ヲ以テ命
 門ノ火トス此火ヤ水靜ニテ潤則水土ヲ養テ陽氣ノ源トナル水
 動テ不足則此火熾ニ升テ水ヲ涸シ土ヲ乾シ金ヲ燥シ元氣ヲ
 賊呼テ命門相火有餘トス此ヲ消除者ハ知母黃蘗ニ過者ナ
 シ蓋黃蘗與知母俱ニ腎火ヲ瀉スル良劑ニテ間兩藥兼行ト雖
 其清火ノ部有不同黃蘗ハ足少陰太陽ニ入テ腎膀胱ノ熱ヲ
 涼シ知母ハ足少陰ノ藥ニシ且手太陰肺ニモ亦入者ナリ然則知
 母ハ獨腎熱ノミナラス腎火ノ上焦肺分ニ薰者ヲ清ス此龍火ノ
 炎ノ在上者上ヨリ逐テ次第ニ降り下焦冰底ニ達シ相火ノ熾

砂ヲ涼極ス。黃蘗ハ水中ノ浮火ヲ清メ。知母ハ炎陽ヲ逐テ水底ノ
火ヲ清ス。古人謂黃蘗無知母猶水母之無蝦也。蓋水母無目以蝦
爲目。水母ハ從蝦行。蝦動水母沉テ互ニ依附ス。黃蘗ハ知母ニ從テ
能下焦水底ニ沉。知母ノ肺腎ノ火ヲ清スルニ從テ黃蘗能腎火ヲ
瀉ス。肺ハ金。腎ハ水トス。肺火ヲ瀉スル者ハ化源ヲ清スルノ義。金生
水ノ理ニ合シ。此兩藥相依附ノ其功ヲ合扶者ハ水母與蝦ノ相依附
ノ水母ハ蝦ニ從テ行ニ似タリ。水母ハ黃蘗蝦ハ知母ニ譬テ云ナリ。
然則腎水不足ノ無根ノ相火。水底ヨリ熱升テ肺ニ上炎者ハ知母ヲ
用ユ。腎水弱ノ相火水面ニ升遊者ハ黃蘗ヲ用ユ。瀉肺火肺熱ヲ治
スルノ法ニアリ。ハ熱惟肺分ニ在者ハ黃蘗ヲ用ユ。若心脾ノ熱肺
ニ客者ハ黃連ヲ用ユ。知母ノ治症ハ不然。腎水不足ノ無根相火升テ
肺ニ在者用之。獨肺ノハ火熱ニハ反テ勿用。際消渴熱中多食ノ數

腹首ヲ消中ト云。多飲テ數溲者ヲ熱中ト云。多食シテ消渴シ且數溲
者ヲ消渴ト云。消渴熱中ハ熱火雖在胃其木ハ下焦腎部ノ無根
相火。上中焦ヲ煎熬シ然レム。故ニ用之。傷寒傷寒邪熱陽明胃ニ
入者用之。仲景白虎湯ニ石膏ヲ君トシ。知母ヲ佐トシ。傷寒陽明ノ
邪熱入胃惡熱有汗作渴脈大ヲ長者ヲ治ス。或問然則知母ハ瀉
胃火ノ劑タリヤ。曰元素言入足陽明ト按ニ知母ハ瀉肺火去腎火
ノ劑タリ。胃ハ肺腎ノ中ニ居ス。故ニ知母ノ上下兩焦ノ火邪ヲ瀉スルニ
從テ中宮ノ火熱ヲモ亦瀉スルニ至ル。然レ獨胃火ノミナラス。白虎湯ノ
症不眠ノ煩躁ヲ本トス。蓋煩ハ肺熱躁ハ腎熱ニ出カ故ナリ。此仲景
白虎湯ニ用知母雖治胃火獨胃火耳ニ非ス。熱邪肺腎ニ繫一有テ
以ノ故ナリ。久瘧久字ヲ眼トス。瘧熱久ノ陰分ニ入テ肺熱。或夜陰
ニ熱シ。盜汗口乾ニ至者用之。心煩腎火升肺胸煩熱スル者ヲ治ス

熱厥頭痛下熱逆厥ノ頭痛者ヲ治ス骨蒸勞熱勞瘵骨蒸ノ
熱ヲ治ス益腎火ノ所爲ナレハ也或問本經謂補不足益氣好古
曰滋腎水李杲曰法當用黃蘗知母大苦寒之藥以補腎與膀胱
ト然則知母ハ滋陰補氣ノ劑タリヤ曰諸氣血ヲ補益者ハ其味ノ
劑ニ非バ不能苦寒劑ハ瀉火損陽者也何如ノ知母ノ苦寒補陰
益氣ノ義アラシヤ大腎苦燥氣惡火東垣謂火與元氣不兩立下
知母苦寒腎火ヲ瀉ノ其燥ヲ除カ故ニ滋腎水ト云命門相火ヲ
瀉スルガ故ニ益氣ト云ノ直ニ滋陰益氣ト覺ベカラス凡苦寒劑ハ
損陽伐氣勞熱症ト雖勿通用暫用テ其火ヲ瀉シ火熱稍收則速
ニ止ヨ久用則損胃氣減食泄瀉シ損肺氣反テ咳嗽盜汗ヲ致ス滙
曰苦寒之味非長養万物者也即實火燔灼亦宜暫用而世皆
以爲滋陰上劑勞瘵補丹虛病大柱何子勝數又問曰腎火若ハ

通ノ可用之マ曰不然腎火症虛實ノ二辨アリ虛實ハ水部ノ沙
汰ニ辨ス腎中ノ陽氣ノ虛實ニ因テ此ガ可否アリ蓋腎水虛スト
雖水中ノ元火未虛ノ相火上炎者此ヲ實火ト入知母黃蘗等ノ
苦寒ヲ用ユ若腎水虛シ水中ノ元火モ亦從テ不足シ命門ノ虛火
上炎者ノ如キハ桂附等ノ溫劑ヲ用テ其火源ヲ養則虛火自本
位ニ返ス若誤テ知母黃蘗等ノ苦寒瀉火劑ヲ用則加燔灼ノ虛
炎ヲノ上騰セシム此玉水謂人火與龍雷火也下氣未虛實火ハ人
火也得水寒消者也下氣不足ノ虛火ハ龍雷火也得水寒ナラ炎
上入以火逐之虛炎自退者也此二症似同異者難明難治渾スル
コト勿レト云熱欬熱痰腎火升トノ欬ヲ致シ痰ヲ成者用之陽明
熱仲景白虎湯ニ用之故元素謂治陽明火熱ト然凡陽明熱邪肺
腎ニ繫者ニ非ハ勿用之獨胃火ノミノ症ニハ勿用前ノ傷寒ノ條

和親本草 卷之五 三十五

總纂

知母八命門相火熾ニ上焦肺分ニ向フ者肺ヨリ逐テ上下兩焦ノ火實ヲ清者也

使藥

黃藥ヲ得テ腎火ヲ瀉ス

酒ヲ得テ肺火ヲ瀉ス

毒

久用則損氣伐陽傷胃氣弱肺氣不食者○大便瀉易キ者○陽痿

者皆禁用之○胃虛肺虛諸虛寒者勿用之○通玄曰多服令人泄瀉亦令人減食此惟實火燔灼者方可暫用若施之干虛損之人如水益深矣蓋苦寒之味行天地肅殺之令非長養萬物者也近世未明期義誤以為滋陰上劑勞瘵神丹因而天柱者不可勝數余故特表而出之永

畏惡

鐵器ヲ忌塩逢砂ヲ伏ス

附方

紫癩風 知母ヲ醋ニ磨テ捺コト日三度

愚案

古人ノ謂知母ハ氣分ノ火ヲ瀉シ黃藥ハ血分ノ火ヲ瀉スルヲ以テ故ナリ分ノ火ヲ瀉ス上愚案ニ知母黃藥俱ニ腎火

燥之

ヲ瀉スルノ良劑タリ古人何以氣血ニハトヤ蓋知母ハ主氣腎ハ精血ノ藏ナリ知母ハ肺火ヲ瀉シ黃藥ハ腎火ヲ瀉スルヲ以テ故ナリ然氏知母ハ肺部ノ本藥ニ非ズ腎經瀉火ノ本藥タリ相火腎ニ旺ニノ肺ニ不向者ハ黃藥ノ所治腎火向肺者ハ知母ノ所治知母ノ肺火ヲ瀉スルハ餘力ナリ獨肺分耳ニ非ズ何ゾ氣血ノ分アランヤ惟知藥兩種ハ腎部本藥水分ノ火ヲ瀉者ナリ通玄曰知母爲腎經本藥兼能清肺者爲其肅清龍雷勿使僭上則手太陰無銷燥之虞也ト時珍謂潤腎燥而滋陰トハ腎火ノ向肺者ヲ瀉則金清ノ金生水ノ義アルニ取必シモ潤燥滋陰ノ劑ニ非ズ○或問古人謂小便閉塞ノ渴者ハ淡滲劑ヲ用ニ不渴者ハ知母黃藥ヲ用上然則此兩藥俱ニ小使通利ノ劑タリマ曰此東垣說ナリ本經モ謂下水ト蓋渴者肺中ノ伏熱ニ因テ水道不通ニ故ニ知藥ニ不宜不渴者ハ

熱ノ本腎膀胱ニ在テ其標向肺故ニ知礫ヲ用テ肺腎火熱ヲ除則
 金水ノ氣清ノ水道通利ス然ル必シモ渴與不渴ニ不可拘惟肺熱ノ
 ミシ水道不行者ハ知礫ニ不宜腎熱升テ肺ニ伏スルガ故ニ水道
 不行者ハ用之ニ宜トスヘシ夫小使ハ膀胱ヨリ出ト雖專肺氣ノ傳
 送ニ從故ニ水生高源ト云知母黃蘗ハ直ニ通水ノ劑ニ非ト鉉此カ
 腎火ヲ瀉シ肺熱ヲ除則膀胱不熱金氣清水ノ源委俱ニ淨シ水道
 自通入内經ニ

修治

鐵器ヲ忌竹刀或銅刀ヲ以テ毛ヲ去
 謂求本ノ治也 焙用エ○和ニ多ハ粗皮ヲ去用エ然ル
 本綱ニ去毛ト云テ去皮ノ説ナシ案ニ龔氏萬病回春ニ去皮毛
 ト世人皆從之然ス○腎水不足ノ瀉火ニハ塩水ニ浸焙肺火ヲ瀉
 スルハ酒ニ浸焙乳汁ニ浸焙者ハ胃氣ヲ損コトヲ恐テナリ思實
 火ヲ瀉スルニハ生ヲ用エ○知母ハ肥潤衰白者ヲ擇用エ○或問

知母常ニ製置テ通用スルニハ何ノ製法ノ以ヒン白酒ニ塩少許ヲ加
 テ瀉ス又炒テ褐色ノ如ク用エ此李士材カ法ナリ

天麻



微辛微温○主諸風濕治諸痺四肢拘
 急眩運頭痛小兒驚風中風癱瘓通血
 脉強筋力利舌本疏痰氣中風家要圖

△釈名ノ義未詳此カ本名ハ赤苻也主諸風濕天麻一名ハ定風
 草有風不動無風自動故号是ヲ天麻ハ勝風者タコトヲ知且辛
 温ハ能外ニ發達ス故ニ天麻ハ風濕ノ内ニ散者ヲ逐テ外ニ出入
 ト是也經ハ足厥陰太陽ニ入足厥陰ハ肝木風化ノ經ニ筋ヲ主九
 足太陽ハ膀胱水濕化ノ經ニ筋ヲ主九故ニ風濕ノ内ニ散筋
 骨經絡ニ塞者用之逐之治諸痺痺ハ痛風也風濕ノ筋骨經

眩暈

終三塞ヨリ致ハナリ四肢拘急風濕ノ經絡筋骨ニ鬱メ然者ヲ療
入眩運頭痛至真要大論曰諸風掉眩皆屬干木下諸頭施眼運黑者
八斤風ノ鬱トス風木ハ動搖ヲ主ハナリ天麻ハ足厥陰肝木ノ經ニ入
テ風鬱ヲ逐故ニ眼運ノ良劑トス東垣半夏白朮天麻湯ニ用者
是也羅天益曰眼黑頭旋風虛内作非天麻不能治下又此カ頭痛ヲ
瘡スル風熱ノ鬱ニ因者ヲ治ス天麻ニ宜キ所ノ頭痛ハ其症多ハ眩
運頭旋ヲ兼此風鬱ノ兆也小兒驚風肝風ヲ逐カ故也中風癱瘓
真中風風鬱内手足癱瘓皮膚不仁語言不遂者必用之通血脈風
濕ニ血脈滯者用之強筋力風濕ニ筋骨ノ力衰テ腰膝緩弱
等者用之風濕ヲ去血脈ヲ通則筋力自盛ナリ和香本筋ハ肝ノ
主リ下ハ陰器ニ聚上ハ舌本ニ會天麻ハ入肝去風故ニ風ニ因テ肝筋
不和香本或緩リ或強テ舌不利者用之中風舌麻ノ語澁不語症

必用之疏痰氣風痰氣上焦頭面ニ鬱塞者用之故ニ風痰ニ属スル
頭暈眩運ノ治ハ宜之中風家要劑逐風疏痰治癱瘓舌麻諸真
中風家ニ必用ノ要劑タリ
羅天益曰爲治風之神藥
頭旋目眩中
風ノ要藥也
毒 天麻風劑トス燥易シ故ニ血虛津液不足口乾
明乾舌燥大使燥閉血虛頭運類中風不属風
皆勿用以上諸症若其風
醫ヲ兼者ハ或サ用之
附方 天麻丸 去風痰利頭目寬胸
膈治頭運頭痛肩項拘急肢
節煩痛皮膚癢痒面目虚浮天麻半兩川芎二兩爲末煉蜜ニテ丸
茨子大食後一丸茶
酒ニテ下ス出警濟方
愚案 天麻ハ風劑ノ裏藥ナリ何如トナ
レバ風在表者アリ宜發散風在裏
者アリ宜驅逐天麻ハ風氣ノ内ニ鬱者ヲ逐テ外ニ達セシム驅逐ノ

和香本筋ハ肝ノ主リ下ハ陰器ニ聚上ハ舌本ニ會天麻ハ入肝去風故ニ風ニ因テ肝筋不和香本或緩リ或強テ舌不利者用之中風舌麻ノ語澁不語症

劑タリ。時珍曰。今有久服天麻藥。遍身發出紅丹者。是其祛風之驗也。
 也。附風ノ逐ノ義明ニ知ヘシ。且天麻ハ佐使ノ藥ニ從テ其功ヲ見
 ス。和用テハ功力不減。宗奭曰。天麻。頌別藥相佐使。然後見其功。仍
 須加而用之。

修治
 洗淨ノ酒ニ浸コト一宿。取出。濕紙ニ裹テ糠火ノ中ニ煨シ。取出テ剉焙用之。○奥州ヨリ天麻ヲ出入。根莖花形皆本草ノ說ニ合ト。雖和天麻ニハ枝葉アルコトナシ。本草ノ諸說ニ皆枝葉アルコトヲ辨則。惟唐ヲ用テ可ナリトス。○天麻ハ煨熟ノ破開シ。明亮取實者ヲ佳トス。○奥州ヨリ出入所ノ天麻ヲ野人呼テ盜人ノ足草トス。○雷斅說ヲ案ニ。御風草ノ一種アリテ似天麻。御風草ハ根莖斑葉背白青點アリ。若誤テ御風草ヲ用則人ヲノ腸結ノ患アラシムト也。

遠志
 遠志ノ原形



遠志ノ原形

志氣ヲ存ス。此藥腎中ノ志氣ヲ心ノ遠ニ能達セシムルノ功アリ。故遠志ト号。強志。夫心ハ藏血血中ニ存。神氣腎ハ藏精。精中ニ存。志氣心腎ノ神志交通則水火既濟ノ陰陽精血平和ナルコトヲ致ス。遠志ハ足サ陰腎經ノ氣藥。乃腎中ノ志氣ヲ強ク上心ニ通達セシム。志氣通心則心神モ亦安定也。故遠志有定心氣功。然凡心家ノ本藥ニハ非ス。定心氣者ハ補腎志ノ餘力也。通玄曰。主治雖多。總不出補腎之功。或以爲心經藥則未也。

固精
 遠志ハ補陰ノ劑ニ非ス。腎經補氣劑。陰中氣ヲ補者ナリ。腎中氣虛則精不固。遠志補腎中志氣ヲ強ス。則精自固守ニ至ル。時珍益精補陰氣ト云モ亦腎中

去氣ヲ強スルヲ以テナリ。定心氣腎志不通心氣浮動テ不定驚
腎志ハ心氣カ爲ニハ牛馬ノ羈縻ノ如シ。羈縻ニ從テ牛馬定テ妄
不動カ如ク。腎志能心ニ通則心氣自定テ妄ニ動キ跡コトナシ
治健忘此遠志ノ要能ナリ。夫人ノ事ヲ志サシムル者ハ心腎
神志ノ所致也。然凡獨神獨志耳ニテ亦致コト不能。神志ノ兩氣互
ニ通ノ志コトナカラシム。蓋心神ハ陰陽靈妙無測主人公也。腎ハ北
方水藏タリ。水性能遠ニ達ス。志ハ腎ノ水中ノ神タリ。故ニ心神ノ主
人公ト。腎ノ水神遠ニ達スル所ノ志氣ト。其氣ヲ相通ノ持則永忘
ト云コトナシ。是以健忘症心腎二氣ノ不足ト雖。其本ハ腎志不足
不通心故ノニ。遠志ハ志氣ヲ強ノ心ニ達セシムルノ良劑タルヲ以テ
治健忘ノ要藥トス。陽痿陰莖柔弱ニノ不舉者ハ腎中ノ氣虛ト
ス。遠志主之。太者ハ肉桂ト合用ノ下元ヲ温補セヨ。夢洩夢中ニ

悲精者ハ下焦ノ氣虛ノ精固カラザルガ故ナリ。遠志ヲ以テ固精
則多クハ不洩精。聰明耳目耳ノ聰ハ精氣ノ盛ニ從。目ノ明ナルハ
精血ノ潤ニ從。遠志ハ腎志ヲ強ノ心ニ達セシムル者ナリ。腎志強ノ上
達則精氣從テ耳目ニ潤。故聰明ノ功アリ。療驚悸妄。驚悸者ハ
腎志不足ノ上達セザルカ故ニ。心氣ハ浮腎氣ハ陷テ。上下ニ氣交通
セザルヲ以テナリ。故ニ遠志ヲ以テ腎氣ヲ強ノ上達セシムレバ。上下ニ
氣互ニ固張テ驚悸ノ患アルコトナシ。客忤小兒睡中ニ旁人ノ息
氣ニ犯サレテ驚者ヲ客忤トス。遠志治之者ハ右ノ療驚悸ノ理ト
同シ。腎積各テ奔豚ト云。臍下ヨリ逆ノ心下ニ升衝此本腎氣弱
ノ下ニ收コト不能。故ニ逆ノ奔并。遠志ハ腎氣ヲ強ノ下元ヲ固スレハ
也。長肌肉助筋骨此皆腎氣ヲ補ノ餘力也。理癰疽。遠志多クニ
不拘米泔水ニ洗。搗去心爲末。每服三錢。温酒一盞ノ中ニ調少頃。澄

神醫心方 卷之五 腎

テ清酒ヲ飲津ヲ腫上ニ傳此一切ノ癰疽ヲ治ノ神効アル者也出ニ
因方遠志ハ補腎氣ノ良劑タレバ熟地參芪ノ劑ニ合用ノ癰疽ノ
不足ヲ補
三宜者ナリ

總槩

遠志ハ腎ノ水中氣ヲ強シ此ヲ上達セシムル
者也下氣ヲ固シ心腎氣ヲ交通シ健忘驚

悸ヲ治スル
ノ要藥也

使藥

茯苓冬葵子龍
骨ヲ得テ良

毒

心腎實火實
逆者勿用之

畏惡

遠志ハ去心宜用不去心煩心セシム珍珠藜
蘆蠶蠶齊蛤ヲ畏天雄烏頭附子毒ヲ殺ス

附方

腦風頭痛
甚ノ不可忍

者遠志ノ末鼻ニ啗出宣明方乳腫小兒口中ノ惡氣ニ吹レテ乳腫
者吹乳ト名ク遠志焙研酒ニテ二錢ヲ服シ滓ヲ腫處ニ傳出袖珍方
或問遠志ハ腎中氣ヲ補ヒ志ヲノ上心ニ達セシムルトキハ
此木上行ノ劑タリヤ否ヤ曰遠志ハ下焦水部ノ氣藥タリ

愚案

此木上行ノ劑タリヤ否ヤ曰遠志ハ下焦水部ノ氣藥タリ

此ガ志氣ヲノ心ニ達セシムルノ義アリト雖強テ上行トスルニ不至
惟腎中氣ヲ強クシテ志氣ヲ心ニ通サシムルノ劑トスヘシ上行ヲ必ト
スルノ劑ニ
ハアラズ
修治
米泔水ニテ洗淨シ蘆頭ヲ去其草湯ニ浸シ
一宿ノ中ノ骨ヲ去皮ヲ取テ判日ニ乾焙用ユ
中ノ骨ヲ不去人ヲノ煩心セシム○案ニ今時師遠志ヲ製スルニ或
忌鐵器者アリ然凡本草ニ此説ナレ未詳トス蓋遠志ハ腎經ノ本藥
タリ腎ハ水トノ肝木ノ母トス忌火者火氣ノ燥ヲ恐忌鐵者ハ
伐木傷肝子能母ヲノ虐セシムルノ義ニ取者欤此皆庸工ノ所致
必シモ忌ニ不及○今人葉細ニ紫色ノ小桔使花ノ根ヲ採テ遠志ト
入然凡此真ノ遠志ニハ非ズ謬ト勿レ



辛若微寒○治心下滿煩熱消燥痰潤
肺散下癰腫心下噎痺乳難咳嗽惡瘡

△形貝子ヲ聚ニ似タリ。故ニ号^{ホウ}治心下滿煩熱。貝母ハ手太陰肺經ノ藥也。ハ下^レ辛ハ散^レ寒ハ清^レ胸中。胃結ノ氣ヲ下散^レ胸中ノ鬱熱ヲ清^レ心下。滿^レ及煩熱ヲ治^ス。仲景治結胸小陷胸湯ニ用^テ貝母作^ス。至^レ者是ナリ。消燥痰。此貝母ノ要能ナリ。半夏ハ濕痰ヲ燥^レ去^レ貝母ハ燥痰熱痰結痰ヲ潤^テ消化者也。故ニ陰虛火實ノ燥痰ニ必^ズ用^テ之。潤肺。貝母雖潤肺。麥門冬ノ類ニ非^ズ。肺中結熱熱痰アリテ燥^レ者用^テ之。肺氣虛燥者ニハ勿^ク用^テ。若辛寒ハ肺氣ヲ耗^レ虛^レ易^クガ故ナリ。散項下癭瘰。癭瘰ハ俗謂古武也。瘰ハ瘰癧皮間ニ結核ヲ生^シノ^レ際^ニタル者ヲ云。癭瘰ハ皆痰飲ノ結聚者也。貝母ハ手太陰ニ入^テ上部ノ痰結ヲ消化ス。故ニ項下癭瘰ヲ治^スルニ宜^シ。治喉痺熱痰邪肺ニ爵^シノ喉痺者宜用^テ之。漚曰除胸中煩熱喉痺自愈。乳難。婦人乳汁難通者ハ皆胸中ノ氣結結熱結痰ニ屬ス。故

ニ貝母ノ辛ハ氣結ヲ開^キ。苦寒ハ結熱結痰ヲ通^シ。乳汁自出。咳嗽肺中燥痰ニ屬者必用^テ之。惡瘡。一切無名ノ惡瘡ヲ療ス。昔江左ノ商人左膊上ニ一瘡ヲ生^シ。形如人面。病者戲ニ酒ヲ其口中ニ滴^シ。ハ其瘡面赤色ナリ。食ヲ含^シムレハ能^ク食^ス。多食^シムレハ膊内ノ肉脹不食。則臂痺^ニ。醫アリテ諸ノ金石草木ノ藥ヲ含^シムルニ皆無所^ク。貝母ヲ含^シムルニ至^テ瘡面自^ラ聚^リ。開^キ。病者喜^ビ。貝母汁ヲ以^テ多^ク灌^テハ逐^ニ瘡ヲ成^テ瘡タリ。此實ニ惡瘡ヲ治^スルノ兆也。

總條 貝母ハ燥痰ヲ潤去^リ胸中ノ煩熱氣結ヲ除^クノ要劑。

使藥 厚朴。白朮ヲ使^ス。天門冬。麥門冬。桑白皮。枇杷葉。百部。桔梗。甘草ト同^ノハ肺熱效。嗽胸中煩熱ヲ治^ス。百合。百部。慈苳。以仁。麥門冬。紫蘇子。罌粟。金童便ト同^ノハ肺熱吐血ヲ治^ス。番降香。鬱金。橘紅。遠志。蘇梗。蘇子。香附子。白豆蔻ト同^ノハ爵痰

川芎。神麴。上同ノハ一切ノ氣鬱ヲ
開ニ宜シ。遠志。下同。服ノ項下ノ瘤ヲ治ス。
寒痰ノ虛寒。○肺
氣怯弱者ハ勿用之。

畏惡

秦艽。莽草。礬石ヲ畏。
烏頭ニ反シ。桃花ヲ惡。

附方

燥痰ノ嗽ヲ治ス。貝母
末ヲ砂糖ニ和メ丸

レ合。惡瘡ノ口ヲ飲。貝母燒灰ニシ油ニ調塗。以上大明法。目中膚
贅ヲ去。貝母研末ノ點目。難産及胞衣不出。貝母七枚爲末。酒ニ
テ服ス。以上甄權法。紫白癜。貝母。南星等分爲末。生姜汁ニ合メ
擦。蛇蝮咬傷。咬處ヲ縛テ毒ヲ不行。貝母末。酒ニテ半兩ヲ服ス。
醉ニ至テ良久ノ酒化水。落口ヨリ水出盡テ痰出。仁濟直指方。目
生弩肉。貝母。丁香等分爲末。乳汁ニ調テ目中ニ點ス。出楠女方。

愚案

半夏ハ有毒。且濕痰ヲ燥ス。故ニ世人其毒與燥ヲ恐テ
古方中ノ半夏ヲ貝母ニ代テ用者アリ。蓋半夏ハ辛温

脾胃家ノ濕痰ヲ燥ス。貝母ハ辛寒。肺家ノ燥痰ヲ潤化ス。其位其
功天淵異ナリ。豈代用ベケンヤ。肺ハ燥熱ヲ惡。脾胃ハ寒濕ヲ惡。故
寒濕痰食積痰。脾胃濕痰。腎虛邪水。溢痰。痰世。痰厥。頭痛等ハ
辛温ノ痰藥。半夏。南星。天麻。蒼白朮。茯苓ノ類ニ宜シ。此ニ貝母ヲ代用
ハ濕瀰旺シ。痰加甚カラントス。凡古人ノ方ヲ製スル各主トスル所
アリテ。或ハ半夏ヲ用テ脾胃家濕痰ヲ燥シ。或ハ貝母ヲ用テ肺家ノ
燥痰ヲ潤ス。然ニ其方意ノ本旨ヲ不知。古方中ノ半夏ヲ以テ去
貝母ニ代用。則方劑ノ所向ヲ異ニシ。所治ノ寒温ヲ過テ。及テ害ヲ致
サン。
修治
黃白色ニテ輕嫩ヨリテ兩ニ劈ハ中ニ米粒ノ如者。一
顆アルヲ良トス。其中ノ米粒ノ如者。一
到。糯米ト曰。拌炒テ米ノ炒タルヲ度トシ。米ヲ去。用。或。姜汁ニ浸焙
用。則大ニ結痰ヲ開。○蒙筮曰。黃白輕鬆者。爲良。○油ツキテ黑色

重硬者勿用。○破ナク夕圓兩ニ不劈中ニ半顆ナキ者ハ禁服用此
ヲ丹龍暗ノ号誤服スレハ筋脉永不收若此毒ニ中者ハ黃精小
藍汁ヲ合服スレハ愈○今藥店ニ小者ナク一由ハシ。ハ者ノニ由
トス。然レ本草ニ以其大小辨スルコトナシ。本草原始ニ土貝母ア
リ。頗類栗仁色黃白治馬ト云。此ガ形類栗仁ト云則大者ナリ。然
則藥店ニ大者ヲ下品トスルハ土貝母ニ類似スルコトヲ嫌カ故乎。
惟形ノ大小ニ不可拘。黃白色ニメ輕微ヨリ。劈ハ兩片ニ分テ中ニ
一顆アル者ヲ佳トスヘシ。尤_モ澁壞者ハ擇捨ヨ_リ。入_ルハ谷王トスルハ潤
辛_ク寒_ク藥_半長_南星_天和_養白_木身_本。く_照ニ_宜ハ_出ニ_貝母_ト分_用
寒_熱食_毒氣_類官_新習_魚派_水滋_寒類_出寒_熱類_雨露_等ハ
天_氣異_{ナリ}世_外用_テハ_和ハ_類枝_ト惡_胃ハ_寒熱_ノ惡_類
廣益本草大成卷之五終世ハ辛寒和寒ノ類類ノ階外ス其外其

下

