



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

廣益本艸大成卷之七

洛下

法橋

岡本爲竹一抱子

撰

五味



酸甘辛鹹溫○收耗散氣滋腎家不足生澤止渴治喘嗽潤利煩熱自汗。瞳子散太強陰固精補元氣○此ガ皮肉ノ味甘酸核中ノ味辛苦都テ鹹味ヲ含實ニ五味全具ル。故ニ

名テ五味子上收耗散氣五味ハ手ノ太陰足少陰肺腎ノ兩經ニ入且此ニ五味皆具ト雖モ酸味尤勝リ故ニ耗散氣火肺氣浮テ不取耗散シ易キ者用之收補せし。肺ハ上焦ニ在テ諦升氣ヲ主ル若逆氣肺浮者毛亦用之收降ス其性溫タラ以テ寒逆在肺者尤宜之。或火熱在肺嗽者毛亦用之夫五味子ノ性溫何バ熟嗽ノ者ニ用之ア益酸八收氣聚津氣津收聚則金肺潤潤則肺金熱火燥

ラ除テ嗽喘愈。故東垣曰五味子收肺氣乃火熱必用之藥。故治嗽以之爲君ト。五味子ノ性温ナリト雖也。惟其酸味ナルヲ以テ肺部ノ火熱ニ必用ノ劑トスル者深意アルカナ。補腎家不足。孫真人云。五味子予湯以益肺金之氣在上則滋源在下則補腎ト。丹溪亦曰五味大能收肺氣宜其有補腎之功ト。此が補腎者ハ收肺氣潤肺也。以テ金生水ノ義ニ從孫真人謂滋源ト是也。或曰。腎ニ兩牧アリ。左腎ハ水陰ニ屬レ。右腎ハ氣火ニ屬ス。五味子補腎者ハ在水ヤ在氣也。金潤テ水ヲ生則腎液ヲ補ノ義アリト雖也。五味ノ性温。肺氣ヲ收補スルヲ以テ本トレ。金ヲ潤ヲ以テ標トス。是以腎藏ノ元氣ヲ補ノ功アリ。其水ヲ補者モ亦暖ノ義ニ過ズ。丹溪曰補腎非暖水藏乎。好古曰入足少陰氣分ト。五味子ハ腎ノ氣水俱ニ補ト雖也。補氣勝補水トスレ。故三張仲景八味丸ニ用之。補暖腎氣。生津止渴氣散則津

耗テ不澤故ニ用之。肺氣ヲ收則津不散。肺潤體澤渴止渴八肺氣ノ燥耗ニ由テ津液上焦ニ不聚故ナレバ也。治喘嗽五味子八喘息嗽ノ要藥也。蓋肺ノ氣逆ヲ收メ。肺部ノ燥ヲ潤メ。火熱ノ肺ニ溼入シ者ヲ收降スレバ也。然レ外邪ニ由テ喘嗽スル者ハ妄ニ勿用邪氣ヲシ收束セシム既ニ發散ノ邪去ノ後ハ亦用之補ニ宜レ。○黃耆ニ嗽者五味子尤主之。此陰火ノ肺中ニ浮入ノ症トス。涼藥ニ不宜。五味子ノ酸溫ヲ以テ收降スルニ宜トス。瀉利肺與大腸表裏タリ。五味子收肺氣則大腸モ亦收固シ泄利止。或ハ脾腎ノ氣虛ノ五便瀉下ノ者。五味子ヲ以テ五味更湯ニ泡浸スルコト七次。炒香ソ末ニ米飲ニ服用ス。腎氣ヲ強レ。脾濕ヲ除テ。脾腎瀉ノ要藥也。煩熱肺氣不足ノ煩熱ヲ除ク。其虛氣ヲ收メ。其金燥ヲ潤スガ故也。若肺部ノ實火ニ因テ胸中煩熱スル者。勿用。自汗肺ハ表氣ヲ主ル。五味子ハ肺氣ノ耗散ヲ

收則表氣固^{ルマハ}。汗止。瞳子散大。瞳子ハ眼中至明ノ府。氣精ノ會スル所也。若此が散テ不聚。大ニレ不收者。火氣精ノ耗虛。視コトモ亦不明。五味子ハ能肺腎ノ耗氣ヲ收^{サバ}。則氣精收^{カシム}。固^ルノ瞳子收^テ明ナシコトヲ致ス。強陰固精^{カタヒヤクシキ}。五味子ハ腎氣ヲ補^フ。故ニ陰事ヲ強レ精ヲ固レ。遺精^{カイジン}。精滑^{カイハツ}ヲ收^{カム}。補元氣^{カム}。參芪^ト合^シ肺心ノ元氣^ヲ補^フ。桂附^ト合^シ丹田^ト元氣^ヲ補^者也。

總驗

收^テ不散^{スル}肺金

ノ虛燥^{カタハツ}ヲ潤^{ハス}。腎藏^ヲ暖^テ下元^ヲ保^ク。欬煩渴。自汗。遺精^ヲ治^ス。要藥也。章宜曰。功用雖多。總之收肺保腎四字盡之。上勞嗽症肺金虛燥者。麥門^ト合^シ必用^レ剷^ス。使^ス藥^ヲ治^ス。參芪^ト合^シ元氣^ヲ補^フ。丹藥^ト合^シ逆氣^ヲ收^フ。肺血^ヲ補^フ。乾姜^ト合^シ肺寒^ノ逆氣^ヲ治^ス。熟地黃^ト合^シ補^フ。桂附^ト合^シ腎藏^ヲ暖^ム。阿膠^ヲ佐^ス。喘及^シ吐血^ヲ止^ス。三良

毒

多用^テ收補^ニ過則熱^ヲ肺部ニ鬱^{セシメ}。加嗽^ヲ聚^ス痰^益虛熱^量テ惟少^ク用^ルニ宜^ス。○肺家ノ實熱。火鬱^ノ者○腎藏ノ鬱熱アル者○外邪アリテ欬嗽^{スル}者

畏惡

鐵器^ヲ忌^ム。葵藜^ヲ

皆禁用^ス。蓋其收補^ヲ以^ノ故ナリ。

附

惡鳥頭^ノ毒ニ勝^カ

方

陰戶冷^ニ五味子四兩爲末。如律^ニ粘^テ。兔矢^ニ大ニ丸^メ。陰戶ニ納^ス。出近効方^{陽事不起}新五味子一斤爲末。酒^ニ方寸匕^ヲ服充

コト毎日三^合忌^ム。豬魚蒜^ス醋^ヲ出千金方^{火嗽不^止}五味子一兩真茶

四錢。晒研爲末。甘艸五錢^ヲ煎^レ膏^ヲ以^シ之綠豆^ノ大ニ丸^ニ。沸湯^ニ服^ス。出攝生方^{入肝鹹八入腎}

辛八入腎苦八入心。甘ハ入中官脾胃。故三千金曰。常服五味以^シ補五藏之氣^ト。然^レ惟所勝者八酸味^ニ在^ス。收補^ニ盛^{ナリ}。所入^モ亦


肺腎ニ在ノミ。肺氣ヲ收テ肺液ヲ持。腎氣ヲ
收テ。水中ノ氣ヲ温功ヲ以テ要トスベシ。

修治

五味子ハ和
産不宜。朝鮮

國ヨリ來者ヲ良上忌。鐵製スニ枝并ニ帶ヲ擲去テ。或ハ銅刀ヲ以
剉^{キサツ}劈^{キサツ}。或六日ニ干乾碾碎^{カシタケシキザクスル}。補藥ニ入ハ蜜ニ拌^{カキマサセ}。蒸熟^{ヒヤシ}し。再米泔水^{カキラクス}
浸^{ヒダス}コト一宿ノ間乾用^ス。或ハ酒ニ浸^{ヒダス}日ニ乾燶^{ヒヤシ}。使嗽藥^ス生^ス用^ス○按^{スル}

五味子ハ皴^{カタマリ}根三用^ス。今人多ハ皮ヲ去テ使者^{アリ}誤也○五味
子ニ南北ノ產兩種アリ。南產ノ者乾枯^{カキラカ}。北產ノ者ハ濕潤^{カキラク}生津止渴
潤肺補腎勞嗽^ス。北產ノ者ハ濕潤^{カキラク}生津止渴
和產ハ五味全^ス具^ス。ラスソ不可^{カキラ}よス



甘寒○潤肺燥滌痰結治嗽喘息○利咽喉降火利大腸治消渴口乾胸
癰癰腫瘍毒○本名ハ果臘說文曰

木上曰果。地下曰蓏。此物蔓生ノ附木。故ニ果臘ノ名ヲ兼得タリ。後
世音ヲ轉^スメ枯樓^{カクロ}ニ作^ス。或瓜蔓^ス三作^ス。潤肺燥甘、潤^ス寒、ハ熱^ス除^ス。
故ニ肺燥^ス潤^ス。肺熱^ス除^ス。滌痰^ス。結胸中^ス。結燥^ス。ノ痰^ス。潤^ス去^ス。故ニ滌
上云。滌^ス大其結痰^ス。潤^ス流^ス。利^ス去^ス。ノ義。以不燥^ス也。治嗽^ス。喘息^ス。結痰^ス
因^ステ欬嗽^ス。喘息^ス。不^ス流^ス也。利咽喉^ス。胸中^ス。痰^ス。氣^ス。凝^ス。結^ス。不^ス出^ス。或^ス出^ス。
上^ス其痰^ス。結聚^ス。不^ス流^ス也。利咽喉^ス。胸中^ス。痰^ス。氣^ス。凝^ス。結^ス。不^ス出^ス。或^ス出^ス。
不快症^ス。治^ス降火。火邪胸中^ス。迫^ス者用^ス之。火迫^ス降^ス其甘寒^ス。不^ス
利大腸^ス。肺太腸^ス。燥熱^ス。或^ス熱痰^ス。因^ステ大便秘^ス。結^ス。冗^ス者用^ス之。
治消渴^ス。口乾^ス。肺熱燥痰^ス。去^ス。故ナリ。胸痛^ス。胸中^ス。急迫^ス。痛満^ス。懊^ス。腹^ス
レテ不安^ス者^ス。其因胸中^ス。熱燥結痰^ス。生^ス。故ニ瓜蔓^ス。實能治之。癰腫瘍毒瓜蔓^ス。結熱
結痰^ス。去^ス。故ニ諸瘡腫毒^ス逐^ス宜^ス。

總纂

肺胸ノ鬱熱。燥痰^ス潤^ス。去^ス。欬嗽^ス。消渴。胃痺。

口乾ヲ治ス

使藥

貝母ト合シ能肺ヲ

毒

肺寒○寒痰○濕痰

ノ要劑ナリ。潤燥結ノ痰ヲ去ル。○太便滑泄者皆勿用。○元氣不足者過用允ト勿レ。○或問時珍曰。張仲景治胸痹痛引心背歎。喘唏息及結胸滿痛皆用枯萎實乃取其甘寒不犯胃氣。能降土焦之火。使痰氣下降也。不犯胃氣ト云則元氣不足者ト雖凡何。恐力アラシヤ。然ニ吾子勿過用。トスル者何如。曰。瓜萎甘寒ニ苦寒ナズ。苦寒ハ喜テ犯胃氣耳。胃ノ所欲也。故ニ不犯胃氣上云。然足胃氣ハ生陽不欲寒。タヒ此が味耳。ト雖トモ其寒性ヲ以テ益元氣ヲ不犯コト有シヤ。時珍ガ說ニ執メ。妄ニ過用スルコト勿レ。

附方

青瓜萎焙研毎丁服一錢。

七分ニ煎。臥時ニ服ス。五更ニ黃水ヲ瀉下シ愈。或過酒ノ黃疸病ニ亦用之。出普濟方。又痢不止者。瓜萎一個。煨テ存性。爲末。溫酒三テ

服。不出本事方。婦人痰嗽。夜熟月經不調形瘦者。瓜萎仁一兩。青黛香附。童便製一兩五錢。爲末。蜜三調。噙出丹溪心法。胞衣不下。瓜萎實丁箇取。細研。酒與童便各半盞ヲ以テ七分ニ煎シ温服ス。或ハ瓜萎根毛亦可也。出婦人良方。便毒初發。瓜萎丁箇。黃連五錢。水煎メ。頻ニ服。

愚案

或問瓜萎與半夏俱ニ除痰ノ劑。其辨

ス。出永類方。潤ス。雲泥不同蓋此ノ穢器ヲ淨スニ。譬。半夏ノ去痰。穢器ヲ拭乾。ノ。溼スルが如。瓜萎ノ去痰。穢器ニ水ヲ流洗テ去が如。故時珍曰。滌痰結。滌字ヲ以テ此意ヲ知ベ。半夏ハ濕痰ノ潤者ヲ去。瓜萎ハ燥痰ノ凝結ヲ去ル。故三匯曰。洗滌胸膈中。肺膿外。肺膿二字ヲ以テ其凝結ノ點。痰ヲ去。コト知ヌ。レ


修治

堅ニ。採テ剉。土器ニ入テ炒。用ユ。○或此方

油ヲ去テ用コトアリ。或ハ殼皮細膜俱ニ用ヒトアリ。其殼皮ヲ去テ用者ヲ瓜薺仁ト号シ。一說三形圓色黃ニ皮厚蒂小者ヲ男子ニ用。形長皮赤色蒂粗者ヲ婦人ニ用ト。○和ニ謂之瓜薺ハ忌鐵也。李艸ニ於テ遂ニ此義アルコトヲ不見。然カ否ヤ。○今ノ藥店ニ柿核瓜薺布目瓜薺ト云二一種アリ。柿核ニ似者尤佳。又玉章ト呼者アリ。蝠蠅頭ニ似テ玉章ヲ結ガ如レ此。瓜薺六非ス玉瓜也。多ハ玉瓜ヲ以テ瓜薺ニ混ス。擇テ勿角之。

瓜薺

原始白根
天花粉內有
花文天然而
成也故名



身天
花粉甘微苦酸微寒

○治消渴身熱煩滿結痰欬嗽唇乾口燥腸胃瘤熱

黃疸止尿通經水及乳汁。油瘡毒瘀血。○瓜薺根ハ枯燥ヲ潤シ津液ヲ通ジ。結熱ヲ除キ。凝瘀痰ヲ退シ。腫毒ヲ消シ。少ノ瘀血ヲ行ス者也。是以治消渴潤燥行津故也。身熱煩滿煩熱ノ胸滿スル者用之。除

熟潤燥結痰欬嗽結熱ノ燥痰粘滯ノ欬者用之。唇乾口燥潤燥除熟去痰故也。腸胃瘤熱腸胃ニ鬱積スル所ノ瘤結ノ熱ヲ去。黃疸属熟專痰ノ黃疸用之。然ニ小便澁ル者ハ勿用。止尿其味酸收之故也。通經水有熟及痰經水不調者用之。然ニ此直ニ血分ノ劑ハ非矣。因熱及痰月水不行者ヲ通ズ。乳汁除煩滿去熱潤燥降痰故ニ。乳汁ヲ通スルノ功尤足盛ナリ。消瘡毒腫毒ヲ消スルノ功ハ瓜薺仁ニ勝レリ。瘀血清熱去瘀則瘀血自通スルノ義アリ。淮曰通經者。

總緊

天花

非若桃仁善黃之直行血分也。熟清則血不瘀耳。

粉通經止尿去腸胃瘤熱ノ治アリト雖也。此が功ノ専ナル者ハ心肺間、胸膈中ノ燥ヲ潤シ。熟ヲ去テ止渴去煩除嗽通乳汁ノ要藥也。

使藥

枸杞子

毒

陽氣不足者。脾胃虛寒。○小便閉澁者皆勿用。

畏惡

乾姜ヲ惡。牛膝乾

滌ヲ畏。烏頭ニ反ス

附方

小兒陰囊腫。天花粉一兩。炙甘艸一錢半。水煎メ入酒服ス。出全幼心鑑

腫。痛。瓜蔓根一兩。乳香一錢。右爲末。溫酒三錢。服ス。出永類方。乳汁不通。瓜蔓根燒テ存性爲末。或方寸匕。或五錢。酒水三煎。服ス。出

楊氏產乳箭。鍼鍼刺入肉。不出瓜

蔓。搗塗之日。二易。自出。出海上方。

愚案

瓜蔓ハ根實ノ氣味。性功ハ皆根ノ

結痰ヲ去。ノ功。ハ蔓實ヲ勝トス。蔓實ハ全寒ニ能熱ヲ去。根ハ微寒。ヲ

除熱ノ功不烈。故ニ簡便方ニ。虛熱ノ效歟。治久。天花粉一兩。人參

三錢ト合。末レ。米湯ヲ以テ服ス。然。瓦實ハ甘寒。根ハ苦味ヲ兼。苦只宜。

解結。故ニ積積ノ痼熱ハ。反テ蔓根ニ宜。潤燥止渴。消腫毒通乳汁ノ

功ハ皆根ノ

修治

古方ニ謂レ瓜蔓根ハ皆天花粉アリ。秋冬ニ瓜蔓根

力勝トス

力勝トス

ヲ采皮ヲ削去。寸許三切。水三浸コト四日四夜。毎日

換水。日足テ白ニ入。搗爛レ泥ノ如シ。細布ヲ瀘。去糟。此ノ器中ニ入レ澄。浮水ヲ捨。底ニ所居ノ粉ヲ用テ。日ニ晒乾レ使フ。火ヲ以テ焙燥コト勿レ。此ヲ名テ矢花粉ト云。即、瓜蔓根也。○脩治纂要ニ。瓜蔓仁。天花粉。瓜蔓根ノ三製ヲ出ス。案。生瓜蔓根ハ。即、天花粉也。本綱ニ於テ。別ニ根ノ製ナレ。纂要ニ曰。瓜蔓根ハ土氣ヲ洗。皮ヲ削去。米泔ニ浸レ。破テ白ニ干ス。鐵ヲ忌。剉。土ニ深ク入モノ佳ナリトナ。惟。天花粉ノ製ノ三存ス。愚案ニ。纂要ニ。土ニ深ク入モノ佳ナリト云。則。此快リテ玉瓜ノ製ヲ混ズ者歟。瓜蔓根ニ土ニ深入ノ義。本綱アルコトナレ。玉瓜ノ條ニ。時珍曰。深掘二三尺。乃得正根。且。瓜蔓根鐵ヲ忌。火ニ焙ノ義モ亦未考。然カ否ヤ。

葛根

原始



甘辛平。○解肌。發表。出汗。治頭痛。煩熱。酒毒。瀉痢。發狂。嘔逆。止渴。發痘。宣

班利二便散鬱火生者墮胎○時珍曰葛從葛諧聲也解肌發表

出汗

葛根

足陽明太陰脾胃兩經入脾胃八肌肉主故二葛

根八肌肉分二入八卦八綴辛八開散入三肌邪解表而開汗

出

葛根

太陰脾胃兩經入脾胃八肌肉主故二葛

總纂

葛根

解テ渴ヲ止酒毒ヲ消ス肌熱ヲ解テ發汗痘瘡疹出難ヲ發シ陽

明ノ頭痛ヲ

治ス聖藥也

使藥

ノ出レ肌表ノ毒ヲ解胃ノ氣ヲト行セヒ

毒

邪氣太陽ノ表ニ在テ未入陽明者不可用○痘瘡已三

紅點ヲ見者○表虛自汗上盛下虛者俱三用シコトヲ禁ズ

附方

升麻ヲ得テ能陽明ニ入肌邪ヲ發シ痘瘡

愚案

問

葛根本經ニ平支然レ此が發表出レ胃氣ヲト行セヒ者。陽止温トスレ又止渴解酒毒治狂者ハ涼ノ如レ吾子其何如曰其性似温不溫似涼不涼故ニ平ト云然レ此微溫ニ近者トスベレ此が胃熱ヲ除テ止渴解酒毒治狂モ皆甘辛微溫ヲ以テ陽明結鬱ノ熱ヲ解ガ故也。案二葛根ノ治熱者ハ非涼熱解結熱者草リ。涼劑トスルトキハ發表出

活ノ功何ヨリ此ヲ

修治

土氣ヲ消。蘆頭ヲ去皮ヲ削干乾シ剝ニ

致サ。深ク考察スレ

修治

用ニ或ハ焙使白者ヲ以テ良トス○今野

人掘出ス者ハ皮ヲ去テ干乾來ハ故ニ其儘剝用テ可也○方書三謂


葛根ハ皆干乾ス葛根ナリ。即干葛ト云。若生ヲ用則生ノ字ヲ上ニ加。

○今ノ藥店誤テ葛蔓ヲ以テ乾葛トス甚非ナリ葛粉葛根ヲ以テ洗淨シ天花粉ノ製ノ如ニエ。白粉トス。今吉野ヨリ出ソ食ニ供充ノ物尤佳。其功乾葛根ト同也○葛ハ家產ヲ宜トス。山產ハ熱烈婦人良方曰當用家葛活人指掌曰姫女藥用家園葛不可使山葛動胎氣ト然庄家葛希ニ存ス強テ不及拘方

葛花

甘平○消酒毒治腸風下血○赤小豆花ト同ク乾末ソ酒三テ

服ス六飲酒而不醉。治腸風下血亦酒熱ノ下血ニ用之。凡酒毒功ハ葛根三勝トス。故ニ東垣解醒湯ニ用之○干乾藥與莖去テ剝用

草
本綱

苦平○強筋骨肌肉去風濕治中風。

周痹。惡瘡。膀胱宿水。白濁。葷痛。癰癧。頭旋。陰痿○時珍。

草
原始

老血。腰脊脚緩痛。頭旋。陰痿○時珍。

曰。草薢名義未詳。強筋骨肌肉去風濕。草薢ノ此要能ナリ。草薢ハ足陽明胃足厥陰肝經ニ入ル。胃土八主肉屬濕。肝木ハ主筋屬風。故風濕ヲ去。筋骨肌肉ヲ強ク。或間筋與骨俱ニ精血ヲ以テ潤養ス。草薢ハ筋骨ヲ強則精血ヲ補者也。曰。精血不足ニ因テ筋骨肌肉緩弱者ハ此ガ治スル所ニ非ズ。風濕ニ因テ筋骨肌肉ノ緩弱者。草薢ヲ用テ其風濕ヲ去。則筋盛ニ。骨強ク。肌肉堅キコトヲ致ス。治中風真中風症。手足癱瘻失音者ヲ治ス。周痹痛風ノ一症也。此モ亦風濕ヲ去ガ故ナリ。惡瘡肌肉ノ濕ヲ去。筋骨ノ風ヲ除。故ニ一切惡瘡難瘳者ヲ治ス。膀胱宿水。冒家ノ濕熱下焦ニ流テ。水ヲ膀胱ニ宿。

積レ。小便不通者用之。其濕ヲ除。則小便自利ス。或ハ中焦ノ濕。膀胱下流ノ下焦不固者。故ニ小便頻數者モ亦用之。白濁莖痛。胃濕下流。小便白濁。或ハ小便ノ通利澁。莖痛者用之。瘡瘻皮肉麻痺不仁者。瘡瘻元者ヲ瘡瘻上ス。此胃濕肉ニ注テ然ハガ故ナリ。老血瘀血也。風濕ニ因テ老血トナル者ヲ除。腰脊脚緩痛。風濕ニ因テ腰脊脚定。或ハ緩弱。或ハ疼痛スル者ヲ治ス。故ニ脚氣ノ症ニ多用之。頭旋。風濕ニ因テ頭旋者。治ス。陰痿男子ノ莖ハ筋ノ燬元所ナリ。故ニ筋強則陰痿ノ患アルト希也。筋受濕緩弱ヲ陰不舉。草薢ヲ以テ去濕。筋強則陰痿者能起。史國信曰。欲興陽先滋筋力。于是也。瘦脚氣。手足腰膝ノ緩弱。疼痛ヲ治スルノ要劑ナリ。

使藥

薏苡仁

中下焦ニ濕ナキ

總槩

草薢ノ風濕ヲ去。筋骨ヲ

強シ。肌肉ヲ堅シ。中風。癰

ヒテ。溺餘瀝。或莖痛者○腎虛ノ無濕腰膝緩痛ノ者。皆禁用。蓋草薢ハ風濕ヲ去ノ功アルトキハ燥易レ。故ニ真陰不足ノ無濕者ハ勿

用
畏惡

牛肉ヲ忌。葵根。太

附方

草薢分清散 濑如油。或所通澄下テ。器中ヲ如膏。

者。真元ノ不足。下焦ノ虛寒トス。草薢石菖蒲。益智仁。烏藥等分。每貼四錢水一盞。鹽一捻ヲ入レ。七分ニ煎ジ。食前二溫服ス。楊俊家藏方。如聖散。草薢。貫衆等分爲末。每服二錢。溫酒三斗空心三服。出家傳秘寶方。而主治之功不相遠。豈亦一類數種乎。章宜曰。祛風除濕補益下元虛冷之要藥也。上案。凡三土茯苓ハ。甘淡ニ。溫氣ヲ疎利ス。蕤八甘酸溫ニ。滋潤ス。草薢ハ。本經ニ苦平ト云ト雖是。此が風濕ヲ去白濁陰痿等ヲ治スル從則。苦甘微溫ニ。足ノ陽明厥陰足少陰

愚案

時珍曰。草薢。蕤。土茯苓。三物形雖不同。

太陽四經ニ入者乎。此藥。肝胃ニ兼テ。腎膀胱ニ入ル。故ニ別錄曰。治陰痿失湯甄權曰。治腎間有膀胱宿水十。大明曰。補水藏。堅筋骨。ノ功ヲ致者是也。本艸滙曰。入足太陽陽。明少陰厥陰經。實ニ章宜ガ發明ナリ。修治。水ニ拌炒。或六酒ニ潤シ。烘用ユ。○今人土茯苓ヲ以テ草薢よス。甚誤ナリ。○和ニ度古呂ヲ以テ草薢よス。然凡本艸ノ說ニ不合。滙曰。產河陝荆蜀狀類山芋。二種莖有刺者。根白實。一種莖無刺者。根虛軟。軟者爲勝。又。蕤與草薢相亂。蕤。莫作塊赤黃。草薢細長。液白。以此辨之。茯苓。其形。茯苓ニ似。名ヲ以テ名ク。○土茯苓ハ。足ノ陽明胃足厥陰肝經ニ入。能風濕熱ヲ去ト雖是。此ガ專主治スル所ハ。濕ヲ利

土茯苓



甘淡平

健脾胃。強筋骨。利關節。治手足

拘攣。楊梅惡瘡。骨痛泄瀉。去風濕熱。

○土

茯苓。其形。茯苓ニ似。名ヲ以テ名ク。○土茯苓ハ。足ノ陽明胃足厥陰肝經ニ入。能風濕熱ヲ去ト雖是。此ガ專主治スル所ハ。濕ヲ利

冗ニ在ノミ。若其濕鬱メ熱ヲ生冗ノ濕熱モ亦能去。獨熱ノミ存冗者ハ去コト不能。机曰此藥長于去濕。不能去熱。是也。健脾胃。強筋骨等ハ皆去濕除濕熱ニ因テ也。彼楊梅瘡ノ濕毒。筋骨ニ鬱冗者。及輕粉ヲ服冗コト度ニ過。毒氣經絡筋骨ノ間ニ入テ。不能出者。皆用此治之。

總槩

濕邪ノ經絡筋骨ノ間ニ

其功尤大也。

懶

者ヲ治冗ノ要劑ナリ。

毒

脾胃不足ノ濕無者○陰虛

燥乾者俱ニ勿用○

畏惡

鐵器ヲ忌。又茶茗。牛。羊。鷄。

附方

搜

好慾久ハ勿用之。
解毒湯治楊梅瘡。或輕粉ヲ服ノ筋骨攣痛。手足癱瘻不能動履等者用之。土茯苓一兩。薏苡仁。金銀花。防風。木通。木瓜。白鮮皮。各五分。皂莢子四分。水二大盃。煎服ス。日ニ三服。若氣虛者。人參七分。血虛者當歸七分。加減。蓋秘方也。

愚案

土茯苓八

甘淡也。淡ハ泄ス。故ニ留濕ノ邪ヲ除ニ宜シ。其濕モ亦尋常ノ濕ニ非ズ。經絡筋骨ノ間ニ畜積冗ノ濕毒也。世ニ謂ル土茯苓ハ健脾胃。過服ソ恐ナレ。無病人モ亦宜食之。蓋藏器說。食之ハ當穀不飫ト云。ソ以ナリ。愚案冗ニ脾胃ハ屬土。濕化ヲ主ル。若濕化過則脾胃氣損。若濕化ヲ失。テ脾胃乾燥冗者モ亦中氣ヲ損フ。土茯苓健脾胃。大其湿ニ過テ中焦不足冗者。用之濕ヲ去。則脾胃自健ナリ。若或服之。大過。脾胃濕土ノ本化ヲ失。テ乾燥せ。或ハ中焦濕邪亢所ノ者。シカニ此ヲ過服セムトキ反テ脾胃ヲ傷リ。精血ヲ損キノミ。藏器說ハ當穀不飫。太陽氏が說。昔禹行山之食。采此充糧。上云三始。故呼之艸禹餘糧。トス此惟名ニ從。テ其理ヲ解ス。必易穀食。ヘキ補益ノ物六非ズ。本艸ノ諸條ニ益壽延年不老不衰。久用多用等ノ言アリト雖。多ハ其藥ヲ稱スルノ辭ニ。實ニ補益ニ非ル者多也。考ニ其言アリト

信ノ用兵。反テ害人甚多カラン。孟子

謂盡信書則不如無書ト云者ナリ

修治

米泔ニ浸柔龜皮ヲ削去剉用○白柔者ヲ良

トス。赤脾虛ナル者不佳。○和ノ山歸來ト云者ハ眞ノ土茯苓ニ非。唐物ヲ用ヨ。本綱附方ノ條ニ療瘻潰爛者。冷飯團切片。或爲末水煎服。或入粥内食之。須多食爲妙。江西所出色白者良。忌鐵器發物。陸氏積德堂方。冷飯團ハ土茯苓也。以之視則。土茯苓ハ鐵器ヲ忌者名コト明也。然ル今人鐵ヲ忌スノ謂ハ本艸ニ利力切片ノ言アリトス。此言本綱草薢ノ順カ説ニ。土茯苓ノ製ニ非ズ。甚誤。土茯苓ハ不忌鐵。土茯苓ハ忌鐵。誤ルコト勿

菟絲



辛甘平○益精強陰。堅筋骨。止遺精。溺餘瀝。治莖中寒。膝腰冷。寒血積。尿血。明日○

此艸ノ初生元時ハ根アリテ鬼握ニ似タリ。此ガ漸ク長ズルニ及テ他艸ニ

延蔓ノ其根ヲ斷。苗莖ニ纏ノ黃綠ノ如レ。故ニ菟絲ト号ク○菟絲子八腎肝ノ兩經ニ入テ氣ヲ補アリ。尤下元ノ陽氣ヲ助ク故ニ益精強陰莖堅筋骨亦皆肝腎ノ陽氣虛冷ヲ補ニ從古止遺精。溺餘瀝。治陰莖寒。腰膝冷モ亦腎氣ヲ補ガ故アリ。下元固則持精。小便長通ノ餘コトナレ。下元溫則陰莖中不寒。腰膝モ亦不冷也。寒血積。尿血。血氣。肝得寒。凝積レ。陽氣ヲ得。運行ス。菟絲子能肝腎ノ陽氣ヲ行ス。故ニ寒血積ヲ治ス。且尿血モ亦腎肝ノ虛冷ノ血ヲ不攝故ニ致者用之。明目目ハ肝主之。肝氣ヲ補ガ故ニ然リ

總繫

肝氣

ヲ行シ。腎藏ノ陽氣ヲ補。下焦虛冷ヲ治スノ要劑タリ。使藥。得酒良。薯蕷。松枝ヲ使トス。毒。胃家ノ熱アル舉テ不廢者皆勿用。○大便燥結者三モ亦不宜。○久用則下氣ヲ壅テ二便閉塞。其過○肝火旺者不宜用。

畏惡

藿菌

附方

補虛損 蔴絲子。敷地黃等分爲末。酒糊三茶梧子ノ

ヲ惡

沈香煎湯三茶下ス。由簡便方。茯菟丸思慮大過心腎ノ真陽不固。漏餘瀝レ。小使白濁多夢。小便頻數ノ者ヲ治ス。菟絲子五兩。白茯苓三兩。蓮肉二兩爲末。酒糊三茶梧子ノ大丸。空心ニ鹽湯ヲ以下出。和劑局方婦人橫生手ヲ先出者ヲ橫產トス。菟絲子末。酒三茶一錢ヲ服ス。或車前子末等分二加。出聖惠方。

愚案

菟絲

子性平ト云ヒ雖疎。愚案ズルニ微温十九キ者歟。其功北方坎中ノ真陽ヲ補ニ在ノミ。或問子ガ謂微温ニテ補下陽ノ說。是十九似タリ。然庄甄權曰。治消渴熱中ト。涼劑ノ如ニ似タリ。吾子其何如。曰甄謂消渴熱中ハ實火實熱ノ者ニ非ズ。此眞陽不足ノ虛熱。陰火ニ因ア然者ヲ云。眞寒假熱ノ症タリ。此ヲ見テ。菟絲子ハ涼劑タリト覺エガラズ。

修治

溫湯ヲ淘沙土ヲ去。酒三浸コト一宿レ焙乾用之。或酒三浸蒸。臘瘤用当トアリ。○粉ニスルトキハ酒三浸コト四五日。石臼三入。

搗扁又日ニ干炒テ末ス。不然粉ニ成難レ。

使君

本綱

甘溫○殺蟲治小兒五疳百病健脾胃除虛熱癆瘍白濁瀉痢○瀋州ノ郭使君子

云。君多々此ノミヲ以テ小兒ヲ療ス。故ニ号。○殺蟲ノ要藥ナリ。太低殺蟲ノ劑ハ多ハ苦辛ナリ。故ニ胃氣ヲ伐正氣ヲ耗易レ。使君子ハ甘溫ヲ健脾胃。夫蟲蚀ノ生ズ。多ハ脾胃不足ノ乳食停滯レ。濕熱癆瘍ノ致ス者ナリ。使君ノ甘溫健脾胃則蟲何ニ由テカ生ヲ致サ。穀物ニ虫ヲ生ズルトキハ。其ヲ日ニ臘レ乾バ。虫走出。使君ノ甘補脾胃溫其脾胃ヲ溫則濕熱ノ壅鬱ヲ發テ。虫自走死ス。實ニ除虫ノ良劑タリ。脾胃不足ノ虛熱。及脾胃虛ニ濕熱下流ノ小便白濁ヲ療ス。

潟痢ヲ治スルモ亦健脾胃^{セイヒ}故也。凡小兒ノ病。其所因數種アリト雖也。多ハ脾胃虛與蟲症ノ二端ニ屬ス。故ニ小兒百病ヲ治ス上云。瘧瘧濕熱生蟲然リ。故ニ使君子治之ノ功アリ。愚俗謂蚊蟲皆殺スカラズ。蟲盡則食消ズトハ誤ナリ。樹ニ有蟲屋ニ有蟻國ニ有益皆禍兆ナリ。人ニ虫アルトキハ遂ニ生ラ。蟲次シテ去盡ス。キコト明レ。總纂^{ゼンソウ}殺虫補胃。小兒ノ諸病ヲ

蟲次シテ去盡ス。キコト明レ。

總纂^{ゼンソウ}

療ズ尤就痛ノ要藥ナリ。

毒^{ゼン}脾胃ニ熱アル者

使君子ヲ服スル者ハ熱茶ヲ過用スルコト勿レ。

畏惡^{ゼン}

禁る若不^ホ禁之即泄瀉ス。

附方^{ゼン}

小兒腹大肌瘦黃^{ハタケ}三。癥疾ト成者ヲ治ス。使君子三錢。木鼈子仁五錢爲末。水ニテ龍眼ノ大ニ丸ノ鼈子一箇ノ頑ヲ破リ。藥一丸ヲ入レ。飯上三テ蒸熟レ。空心ニ食フ出簡便單^{カク}。修治^{ゼン}。殼ヲ去内ノ白仁

方蟲牙痛使君子煎湯^{カツヤウジ}頻嗽出集簡方

修治^{ゼン}

殼ヲ去内ノ白仁

希ニ存シ難得。故ニ殼俱ニ用者アリ。其跡頭ヲ去剉少ク炒使フ。宗奭曰。醫家亦兼用殼。原始曰。經末耳。即是用肉。然肉少難得。今醫家或兼用。○油^シキテ黑色丸者不宜用^シ。

威靈仙^{ゼン}本綱始^原

辛鹹溫○散風泄濕推積滯消痰飲治積聚癰痕瘀癰。腹內冷滯。腰膝冷疼。療折傷。

○其藥ノ猛烈ナラ以テ威^{タケ}ト云。其功ノ神靈ナルヲ取テ靈仙ト号。○威靈仙ノ辛ハ諸風滯ヲ散ス。鹹ハ水濕ノ瘀留^シ泄^ス。藥性猛烈ラ^シ諸ノ積滯ヲ疎^シ。經脉ノ壅塞ヲ通ズ且^シ。藥性亦溫ラ^シ。冷滯ヲ去是以^シ。痛風脚氣ヲ治レ。五藏壅積ノ風ヲ去^シ膀胱宿惡ノ水ヲ逐^シ。胸中ノ濕痰冷痰ノ留滯ヲ除^シ。ノ功アリ。久年ノ實積ヲ除^シ。風寒濕ノ留滯ヲ去^シ。痛風脚氣積聚。腰脚腹内ノ冷痛。久年不瘥ヲ治スル^シ要藥ナリ。毒^{ゼン}嵩陽子

威靈仙ノ傳ヲ作テ。其主治至大也コトヲ稱スト雖也。此ガ氣性陳利猛烈也。元氣ノ壯實ナル者ニ非也。妄三用コト勿レ。氣弱ノ者絶テ禁用久服多服則五藏ノ真氣ヲ損ス。實入ト雖少用テ病少愈ハ速ニ止之○久病實積ノ者ニ非バ不可也。新病邪氣輕者ハ斟酌スベシ○

大便泄允

畏惡

密薑湯ヲ忌。其艸梔子ノ湯ヲ以。

者勿用

畏惡

此藥ヲ服允間ノ飲ニ代テ可也。

附方

腰脚諸痛

威靈仙末温酒ヲ空心ニ服允ト一錢。

大便微利廿六藥ヲ止出乎金方

修治

乾時ハ深黑方。故三鐵

脚威靈仙足弓或ハ黃或ハ白色尤者不可用。土氣ヲ洗。細鬚及蘆頭ヲ去。剉微焙。或ハ酒ニ濕。シ微焙。バ其功尤烈。レ○今人ノ謂威靈仙ハ忌火ト誤ナリ。本綱附方ノ條ニ炒用ル者多シ。本艸滌ニ洗焙。ト遂ニ忌火ノ說アルコトナレ○和人ハ徐張卿及仙人艸ヲ以テ威靈

防已



仙上々尤非也。今ノ九蓋艸上云者。是威靈仙ナリ。然ニ惟唐ヲ用テ宜トス。辛苦寒○通行十二經療風腫。水腫。去膀胱熱利大小便散癰腫惡結消留瘀。治手足拘急。以上漢防已之功。療脚氣。喘嗽。膈間有苔。健テ兜敵。防已。宜レ。故ニ防已ノ名アリ。○防已ニ漢木ノ二種アリ。治風木防已。治水漢防已ヲ用。防已ハ足ノ太陽ノ本藥。秋燥ノ氣ヲ得テ。風水ヲ療允ノ要劑。專ニ下焦ノ濕熱腫痛。膀胱留滯火邪。十二經壅塞。血中ノ濕熱ヲ通去レ。小便ヲ泄利ス。故ニ風腫。水腫。脚氣。風毒腫ヲ治允。用實滯ヲ泄レ。諸經ノ壅實ヲ通スルノ要藥ナリ。

使藥

殷孽ヲ使トス。龍胆艸ヲ得テ。

總纂

下焦ノ濕熱留火ノ

實滯ヲ泄レ。諸經ノ壅實ヲ通スルノ要藥ナリ。

使藥

膀胱ノ濕熱ノ實滯。及下焦ノ

留火

毒

防已ハ通利ノ剛齊。秋冬寒殺ノ令ヲ行テ。春夏生

ヲ除

陽

ノ令ヲ瀉スル者也。故ニ實塞ノ者ニ非ハ用コト勿レ。

故ニ内傷不足者○元氣及冒虛者○穀食少者○精血不足症

○大便泄利者皆禁用○熱邪上焦肺經ノ氣分ニ在テ大渴者

○風寒在肺經氣分。小便黃赤ヲ不利者○自汗盜汗○胎前產

後皆勿用○下焦濕熱ノ實邪流テ血分ニ入十二經壅塞メニ使

不通者ハ用之病上焦氣分ニ在テ血分ニ不屬者ハ皆用コト勿ヒ

凡防已ハ悍猛峻通ノ利藥苦寒ノ劑也其症ニ適用瓦諾ニテ

大過スルコト

畏惡

細辛ヲ惡。草薢。女茹。鹵鹹ヲ

ナキヲ要よス

畏惡

雄黃ノ毒ヲ殺シ消石ヲ伏ス

附方

防已

黃薯

湯風水腫惡風汗出身重脉浮丸者ヲ治ス。防已一兩。黃芩二兩。二錢半。白朮七錢半。炙甘草半兩。每一貼五錢。生姜四片。棗一枚。水

一錢半煎八分溫服ス。腹

愚案

苦ハ疎泄。辛ハ散通ス故防已痛ガ芍藥ヲ加フ。仲景方

滯壅塞ヲ疏通スルコト。矛ノ盾ヲ突カ如レ。實ニ尋常

ノ用ヒ易キ者ニ非ズ。元氣健ニ實熱ノ候アルニ非ハ勿用

トレ根ヲ漢防已トス。米泔ニ浸シ麩皮ヲ刮去。剉酒ニ浸シ干煎用ス

或ハ焰モ亦可也○木防已ハ色黃ニ腥皮皴々也。青白虛軟ナル者

不宜用。漢防已ハ外白内黃。破バ黑紋アリ○今所渡ノ者蘇頌所謂漢中ノ防已也。和三所采者ハ頌カ所謂木防已ニ近トス

木通

瘻瘍血塊積聚墮胎出聲通導入本名ハ通艸ナリ。細孔アリテ兩頭

通ス。故ニ通艸上号。後世通脱木^ミ以テ通艸上ス。士良分テ此ヲ木通トス○木通ノ功用多^レ雖也。惟小便ヲ利シ氣滯ヲ泄シ氣血ヲ宣通スルニ在ノミ。木通艸孔^{アリ}テ通ス。故ニ九竅血脉關節^{モカ}ヲ通シ。小便ヲ利スルガ故ニ淋病水腫腹滿^{モカ}ヲ治ス。通血脉。故ニ女子ノ經閉及血塊積聚癰瘡^{モカ}ヲ治ス。通敷^{モカ}故ニ婦人ノ乳閉及喉瘻。鼻塞。息肉ヲ治シ癰瘻^{モカ}ノ膿^{モカ}ヲ排^ス。黃疸^{モカ}ハ中焦ノ濕熱トス。木通小便ヲ利ヒテ濕熱ヲ泄^ス。共バ也。喜^テ眠^ス。又^テ煩^ス。心脾ノ熱トス。木通小便ヲ以テ熱勢^{モカ}トス。便ヨリ導^キ去^ス。則^{モカ}熱除^ス。氣降^ス。愈^ス。聲ハ肺ニ出。耳ハ腎ニ通ス。濕熱肺經ノ氣分ニ鬱^ス。則^{モカ}聲音不出^ス。腎家ニ濕火アルトキハ耳聲ヲ致^ス。通艸^{モカ}ヲ以テ肺ノ濕熱。腎ノ濕火ヲ小便ヨリ泄^ス。キハ聲出^ス。聲愈^ス。頭痛^{モカ}ヲ治ス。毛亦氣逆ヲ引テ降^ス。が故ナリ。木通ハ氣味薄^{モカ}ノ下降^ス。故ニ墮胎^{モカ}ノ義アリ。孕婦ハ尤^{モカ}不可服^{ドス}

總要^{モカ} 氣血^{モカ} 通^ス。小

便ヲ利シ濕熱ヲ泄^ス。下虛者○陽氣下陷者
火熱ヲ導^キ降^スノ劑^{タリ}。毒^{モカ} 津液不足者皆勿用
コト^{モカ} 忌^{モカ} 附方^{モカ} 生地黃。炙^ス甘草。等分。水竹葉七片ヲ入煎服^ス。錢氏方^{モカ} 愚案^{モカ} 或問。木通ハ利水道^ス。通氣溌^ス。何^カ要^トせん。曰。肺ハ金^{モカ}也^{モカ}。トニテ水ノ源氣ノ母^{タリ}。水ハ從氣行^ス。木通ハ心肺^{モカ}熱火^{モカ}導^キ降^ス。氣滯^ス通^ス。肺熱清財^ス。水^{モカ}源化^ス。氣滯通^ス。財^{モカ}水行^ス。津液運^ス。小便能利^ス。濕泄^ス。熱去^ス。然則氣滯^ス通^ス。テ以^テ本^{モカ}小便ヲ利^ス。ラ^シ以^テ標^ト通^ス。此^ガ功用^ラ知^ト欲^セ。此^艸ノ中孔^{アリ}テ通^ス。味淡性寒ニ^{モカ}降^ス。以^テ察^ス。則^{モカ}主治^ス。數因不^待辨^ス。明ナベシ。又問。木通^ス。防已^ス。俱ニ濕熱ヲ泄^ス。木通澤^ス。俱ニ火ヲ小便ニ泄^ス。其辨何如。曰。防已ハ苦寒。血分ノ濕熱ヲ漏^ス。木通ハ甘淡氣

分ノ濕熱ヲ瀉ス。故ニ濕熱在下者ハ防已ヲ用。濕熱在上者ハ木通ヲ用テ下ニ引泄ス。且澤瀉ハ下焦ノ相火ヲ水道ニ泄ス。本通ハ心ノ君火爲熱邪者ヲ水道ニ泄ス。故時珍謂能泄丙丁之火。是也。培ルコトアリ。

艸通



甘淡寒○利小便。治淋病。水肿。瀉肺退熱。明目。通乳。催胎。○此艸ノ功專水道通利ヲ以ス。故ニ名ク。此が本名ハ通脫木ナリ。○

李杲曰。與木通同功。但通艸ノ功太微。木通ト同。又小便通利ノ功木通ニ勝レリ。燈艸ノ功ト同。瀉肺逆氣ヲ引テ降火。退熱。熱ヲ

小便ニ下ス。明目。熱氣逆上ノ

目疾ニ用之。水道ヨリ引下ス

修治

剉テ生
三丁用

忍冬葉




甘小寒○治中風。張滿。血痢。傳尸散熱解毒。治癰疽。諸瘡。○此艸冬ニ得テ不凋。故ニ名ク。蔓ヲ金銀藤。花ヲ金銀花ト云。葉藤花。

三物功用皆同。○諸瘡腫毒ヲ治スルノ要藥也。後人此ガ瘡藥丸コトヲ知ドモ。彼中風脹滿血痢勞瘵傳尸ヲ治スルノ功アルコトヲ不知。蓋忍冬能熱ヲ散ジ毒ヲ解者ナリ。故ニ治功モ亦タ如斯ナルノニ。附方 一切腫毒。下瘡。便毒ヲ治ス。然汗ヲ半盆煎。八分服ス。渣ヲ瘡上ニ塗。瘡已潰未潰ニ拘皆用。積善堂方。熟毒血痢。忍冬藤濃煎ノ服。出聖惠方。勞瘵傳尸病。忍冬莖葉剉テ多煮汁。濃汁ヲ煎ノ膏ト。温酒ヲ以テ毎日化服。出肘後左

修治

陰乾ニス。花藤葉俱ニ連剉テ用。或微燒コトアリ

蛇牀子



辛甘微苦溫○治男子前陰癰濕癢痛。婦人陰中腫痛冷溼。療腰痛。脫肛帶下。大風。產婦陰脫。行瘀血。治癆損○蛇此艸ヲ喜デ葉下ニ臥。其子ヲ食。故名○蛇牀子ハ右腎命門。手少陽三焦氣分ノ藥。補陽ノ要劑也。故三下焦虛冷ノ陰莖不舉。及陰莖囊。或漏。或痒。或腫痛。婦人ノ陰戶中。或痒痛。腫或冷者皆治之。又能令人有子。又腰痛帶下。胎胚也。此皆下焦虛冷ニ因者ヲ治ス。又煎湯ノ大風身癩。又產後三陰戶突出テ不收者。蛇牀子繖ニ盛。蒸熱テ熨。或ハ蛇牀子五兩。烏梅十四箇。煎ジテ日三洗。佳也。

惡

牡丹。巴豆。貝母ヲ惡。

附方

陽事不舉。蛇牀子。五味子。菟絲子等分爲末。蜜ヲ梧子ノ大三丸。

畏

因テ陽事剛強ノ者。但勿用。

愚案

李經ニ蛇牀子性平。上。愚按。此藥事下陽ヲ補助シ。男ノ

溫酒ヲ服ス。出辛金方。蛇牀子散子。信陰戶ノ冷ヲ溫。蛇牀子仁爲朱白粉ヲ許ヲ入。和匀如棗。大綿二裏。于陰戶中ニ納。出玉函方。婦人陰戶癢。蛇牀子一兩。白礬二錢。煎湯頻ニ洗。出集簡方。

陽事ヲ益。婦人ノ子宮陰戶ヲ溫。則平丸者ナランヤ。當爲溫。荷王此が温ナル者ニ非シ。甄權謂浴男子陰大益。陽事ノ功ハ。其何以力致キ。修治。塵土ヲ去。自ニ入。靜ニ擣テ皮毛ヲ去。仁ヲ用。微煙洗浴。用則生ヲ使。○今人ニルムレロノ葉實ヲ用。甚誤也。

和謂ヤブシラニ凡。野ニシジン凡。呼者ノ實此真ノ蛇牀子也。辛溫○去風寒濕。治頭項痛。腰痛脊強化。小便通。治酒齶。粉刺。疖。炮排。癰膿。治破傷風○齒下似沫。故名本ハ根ノ義ナリ。



藜本

○藁本ハ足太陽經ノ藥。其氣雄壯。ニ風寒ヲ去。故ニ風寒。足ノ太陽ノ本經ニ鬱メ頭頸痛者非。此不能除。太陽經ハ腰脊ノ行。故ニ腰脊痛強ヲ治ス。足ノ太陽ハ膀胱ノ經タリ。故ニ化示便通血風寒ニ因テ血不通者ヲ利ス。此藥能風寒濕ノ皮膚ニ塞者ヲ治ス。故ニ酒サルギ薑粉刺サツシ點胞ハラコヲ治シ。排膿治ハラウ破傷風。亦此が太陽經ノ風邪ヲ逐ガ故也。

總纂

太陽經ノ風寒ニ因テ頭項痛。

テ齒頰ニ連ル者。過用スルノ劑ナリ。使藥木香ト同メ霧露清涼ノ邪上焦ニ治スルノ劑ナリ。

使藥

木香ト同メ霧露清涼ノ邪上焦ニ治ス。白芷ト同メ頭面ノ風濕ヲ去。

毒

藥性雄壯也。若

畏惡

蘭茹ヲ惡。青葙子ヲ畏。

附方

願眉頭ヲ洗乾。藁本。

白芷等分爲末。夜擦日梳。

修治

洗淨。蘆頭ヲ去。剉用或焙。

火燒自去。出便民圓纂。

芎手ト名。此弘景謂川芎ノ根鬚ヲ乾タル者。真ノ藁本ニ非ス。一ハ犛牛手ト名。此真ノ藁本也。今和產ノ藁本二種アリテ。此モ亦川芎手ト呼。俱ニ真ノ者ニ非ズ。犛牛手ノ外ハ不可用。



辛大溫。○溫胃寒。治癰逆。嘔吐。惡心。心腹痛。瀉痢。噎膈。反胃。酒毒。宿食。霍亂。轉筋。冷癥。瘡瘍。○此艸始テ高良郡ニ出。根狀姜ニ似タリ。故ニ名。○良姜ノ主能多端タリト雖凡。皆胃中ノ寒ヲ温メテ氣逆ヲ下スニ止ル。酒毒ヲ治スルモ亦温散ノ義ニ取ル。惟脾胃温散ノ劑トメ用。毒者勿用。

附方

心腹冷痛男女怒テ受寒。心腹痛。或心煩。

醋二洗コト七次。焙末。若寒甚ハ良姜一錢。香附一錢。怒甚ハ香附一錢。良姜一錢。若寒怒平ニ兼者ハ。各一錢半ヲ用ユ。米飲ニ生

姜汁一匕。鹽一捻ヲ

入服。出周顥仙碑文。

剉テ七器ニ入。火三點。杉ノ箸ノ末ヲ細ク削リ。其ニ胡麻油微許ヲ塗テ此ヲ以テ拌テ炒則箸三良姜ノ細末ノ付ヲ拭テ。又拌せ又拭テ。如此四五片ノ宜トス。此蓋吾朝ノ醫傳也。

紅豆蔻

辛苦溫○治心渴。心腹絞痛。霍亂。吐酸水。宿食痢疾。噎膈。反胃。酒毒。寒瘧。寒脹○良姜ノ子也。辛熱芳香。燥濕散寒。肺脾ヲ温。食ヲ消下。氣主治大低良姜ニ同シテ。温散ノ功彼ニ勝ル者也。辛苦溫芳。

毒

多用則舌粗不思飲食○過用則動火傷目致衄○脾肺ニ伏火アル者勿用之。

炒過テ用ユ○今ノ藥店ニ伊豆縮砂ト云者是紅豆蔻也。

修治

毛及蘆頭ヲ去。剉炒過テ用。或東壁社ニ拌炒過テ用。○一法ニ良姜

艸
果



辛溫溫○治心腹寒痛。嘔吐。霍亂。酒毒。宿食。傷暑。瀉痢。噎膈。反胃。痞滿。吐酸。濕痰。寒瘧。積聚。婦人惡阻。帶下○本名ハ艸豆蔻也。

肉豆蔻ニ對ノ云。宗奭曰。花乾則色淡紫。爲能消酒毒。故爲果爾。時珍曰。今雖不專爲果。猶入茶食料用。尚有艸果之稱。治心腹寒瘧。草果ハ辛溫香烈。故ニ胃口ノ冷寒ヲ温散し。滯鬱ノ氣ヲ開破。是ヲ以テ外寒冷ノ邪ヲ受。或ハ冷物ヲ食飲。寒氣胃口ニ客滯。心腹疼痛者用之温散ス。嘔吐霍亂。溫胃散寒。開鬱下氣。故也。酒毒酒濕ヲ温散ス。宿食中焦寒。則不消食。溫則能消ス。故用之溫中。則食滯消化ス。尤ニ魚肉ノ毒ヲ殺。ニ宜シ。傷暑直暑者熱傷ハ者ニ非ズ。夏熱ノ甚キニ因テ。外冷寒ヲ受。内冷寒ノ物ヲ飲食シテ。其客寒ニ因テ病者用之。瀉痢噎膈反胃吐酸。溫中。故也。熱ニ

屬スル者ハ勿用。痞滿中焦寒滯ノ症ニ用ユ。寒瘡外寒邪ニ感シ内冷

寒ノ物ヲ受。兼生濕痰ヲ以スルノ瘡症ニ用之。或ハ寒濕不正ノ瘡。

瘡モ亦用之。積聚草果ノ辛香ハ散レ。温ハ行レ。滯鬱ノ氣ヲ開破

スルガ故ナリ。然モ寒滯ニ属サル者ハ勿用。婦人惡阻帶下胃寒ニ因

惡阻嘔吐スル者。及寒濕ニ属スル者ノ帶下ノ症用之温散ス。

所ノ帶下ノ症用之温散ス。總槩。艸果ハ脾胃兩經ニ入テ。胃

滯鬱ノ氣ヲ開破レ。食鬱ヲ消ス。且氣味

辛溫浮散ス。故ニ外寒ノ者モ亦或用之。使藥。截縮砂ト合ヒテ

中焦毒。胃冷者。或外受寒。內ニ鬱熱ナキ者。及寒濕痰アル者ニ

ヲ温

非バ勿用。多服久服則脾熱ヲ生メ。傷肺損目。○熱鬱

者○陰虛津液燥

方。因寒心腹脹痛短氣ノ者ヲ治ス。艸果丁

乾。煮禁用之。附方。兩爲末。木瓜生姜ノ煎湯三丁半錢ヲ服ス

出千金方。口臭者。服之。臭氣ヲ辟。口

中ノ香ス。艸果細辛爲末。含出。附方。

愚案。艸果ハ辛ノ大温。且ツ

香烈ナリ。故ニ寒濕ノ

鬱滯ヲ刲ス者也。妄用則反テ生熱傷元氣ノ恐アリ。若多用久服

スル者ハ或ハ少ク山梔子ヲ以テ友佐スベシ。○時珍本綱ニ。草豆蔻ヲ

舉テ別ニ草果ノ條ヲ不立。蒙筌ニ於テ始テ艸豆蔻與艸果ノ主

治ヲ辨ス。曰艸豆蔻甚辛。香行經惟胃與脾去膈下寒止霍亂吐逆。

厥臍上痛逐客忤邪傷酒毒最消。口臭卽解。嘉謨曰。艸豆蔻用治

中脘冷痰。又蒙筌曰。艸果氣每薰入消宿食立除。脹滿去邪氣

且御冷痰同縮砂溫中焦佐常山截痰瘡辟山嵐瘴氣止霍亂惡心。ト嘉謨曰。艸果雖專消導大耗元陽。老弱虛羸切宜戒之。ト由

案。爾艸豆蔻與艸果一物ヲ微異アリ。艸果ハ長大ニ如訶子。皮黑

厚ノ稜密ニ子粗ノ辛臭也。艸豆蔻ハ大如龍眼形微長皮黃白薄

ニテ稍峭。其仁大如縮砂ニシテ辛香。此が主功モ亦二藥太槩同ノ輕重ノ不同アリ。草果ハ温散ノ功。艸豆蔻ニ勝レリ。尤モ瘧ヲ截。濕痰ヲ刲レ。胃寒ヲ散スルノ功烈。嘉謨曰。艸果本經原未載名。今考方書補其遺缺。但性辛烈過甚。凡合諸藥同煎氣獨薰鼻則可知。ト艸菓ハ艸豆蔻ヨリ其烈コトヲ知ベレ。

修治

兩ニ切破テ仁ヲ取。布袋ニ入スリ揉テ皮殼ヲ去使ベレ。

縮砂



辛苦溫○枳中行氣消食止冷痛治瀉痢。霍亂轉筋噎膈嘔吐。脾胃結滯暖肝腎治上氣欬嗽奔豚咽喉口齒浮熱女子崩中。安胎化銅鐵骨哽○縮砂名義時珍モ爲未詳。○縮砂ハ屬土脾胃入溫性ヲ以テ溫中。辛ヲ以テ開胃散冷行氣苦ヲ以テ疎滯溫中。

順和ノ良劑也。故ニ消食進食腹中冷痛ヲ去。瀉痢霍亂轉筋噎膈嘔吐ヲ治ス。モ亦溫胃開胃行氣ニ因テ也。然ニ縮砂ハ辛香煎湯其薰香撲鼻。嘔吐家ニ使之製ノ舊ク。香烈ノ薄ヲ用ヨ。不然惡心ニテ嘔吐ヲ加ルコトアリ。脾胃結滯モ此ガ辛苦溫ヲ以ナリ。然ニ不因冷レテ熱結ニ属スル者ハ不宜用。縮砂ハ獨中焦ヲ溫化スルミナラス。暖肝腎諸藥ヲ引テ躋下丹田ニ歸レ。下焦ヲ溫ヘ。故ニ補腎ノ藥中ニ用。地黃ヲ蒸ニ和ス。治上氣欬嗽モ此皆肝腎虛冷ノ氣不歸源浮升ニ然者ニ用。奔豚ハ腎積ナリ。下モ虛冷ノ積氣卒ニ躋下ヨリ心前ニ逆上スル也。咽喉口齒浮熱モ亦下焦冷テ熱上ニ浮テ咽痛齒疼スル者ヲ治スル也。皆中下焦ヲ溫ヘ。虛氣ノ淫者引テ下源ニ歸宿セし允ノ功ナリ。崩中安胎モ肝腎ヲ暖メ氣ヲ血ヲ攝ス。安胎ノ義アリ。然ニ崩血胎動多属熱詳ニ可用。或曰婦人ノ孕胎躋ハ土ノ種ヲ含テ育出。

か如レ専中焦ノ育養ニ因テ。孕胎ノ義アリ。縮紗能中焦ヲ温順
調化スルトキハ實ニ良劑タルベシト。此義亦發明ナリト雖庄然庄熱ノ
有無ヲ察メ當用之。温助熱^ヲ温積熱^ヲ成ハ也。化銅鐵骨哽^ヲ人過^ヲ
銅鐵ヲ呑^ム或骨竹木ノ哽^ヲ者用^フ之能出ス。此藥物ノ神靈ヨリ致^ム。
人意ノ知^ルギニ非^ス也。

總槩

胃氣ヲ温化シ。胃口ヲ開キ。中焦ノ結氣ヲ順^ジ。

ギニ非^ス也。

氣

丹田ニ引^カテ臍下ヲ温^ムノ要劑タリ。

使藥

藏器曰得謂子。豆蔻白蕪^ト蜜鼈甲^ヲ良○好古說ニ白檀香

豆蔻ヲ使^フ入肺。人參益智ヲ使^フ入脾。黃蘗茯苓ヲ使^フ入腎。赤白脂ヲ使^フ入大腸。

毒

縮砂辛溫燥易^シ陰虛火病津液燥耗^ガ者○肺熱胃熱者○胃燥テ渴亢者皆

勿用○氣虛ノ孕婦^ヲ妄^ニ多^ク用^ルトキハ難產ノ患アリ

附方

孕婦觸事或^ハ跌墜等ニ胎動腹痛スル者。縮砂^ヲ半ノ内

二^トテ炒熟^シ去皮用仁^ヲ擣碎^シ每服二十錢。熱酒三調服^ス須臾^レテ腹中ノ胞極^テ熱スルコトヲ覺^テ即^チ安^レ出孫尚藥左牙齒疼痛縮砂常^ニ嚙^シ出直指方^{魚骨入咽縮砂耳艸等分爲末綿^ヲ二裏含汁^ヲ漱^ム瘻^ニ隨^テ出百一選方^{吞金銀銅鐵等物不化者縮砂濃煎}飲出得効方^{一切食毒縮砂仁末水煎^シ服^ス}出事林廣記}

愚案

令人多^ハ縮砂ノ中焦温化

田ニ歸^ム臍下ヲ暖温^シスルノ義^ヲ不知。章宜^カ曰。縮砂勝干桂附熟^ト毒之害多矣^ト然則下源ヲ温暖^シムルコト^ハ和暖^ニ不烈得^ム也宜^ム者也。中下兩焦ノ冷者宜^ム用^フ之。或問。韓悉醫通曰。腎惡燥以辛潤^シ之。縮砂仁之辛以潤腎燥^ト然ニ吾子^カ謂縮砂燥易^シ陰虛者勿^ム用^ハ何如^日。以辛潤^シ之ハ內經ノ法ナリ。蓋^シ津ハ從^テ氣行^ス辛ハ氣^ヲレ^テ達せ^ム故^ニ辛ハ潤^ス此津未虛^セ唯^シ結聚^シ不行^ス故^ニ不潤者以辛^シ

潤之。譬ハ水凍ハ不潤、以火溫之水解テ潤流スルカ如レ。縮砂ノ辛温以潤之ト云モ亦精津雖未燥虛下焦ノ冷ニ因テ結聚ノ不潤者以之潤之也。精津燥虛ノ者此辛温ヲ用則益燥ヲ加テ陰虛ヲ重子稀ヒルノ患ノ免ルコト不能トス。

火ニア炒熟シ碎破テ布二包ニ搗擗テ殼及白膜破ヲ去剉テ又少

炒用ユ○今ノ藥店ニ碎タルナシ上ス其儘ナル者ヲ縮砂ト名此說誤ニ非ズ。縮砂甞ト云ハ總名ナリ。殼ヲ去テ其仁ヲ用。縮砂仁トス。

白豆蔻



辛大熱○止嘔吐去積冷散肺中滯氣寬膈消穀進食下氣治目中紅筋寒腹痛寒故ニ名テ白豆蔻トス。楊雄方言云凡物成多曰蔻○白豆蔻ハ胃冷ヲ去肺中ノ冷滯ノ氣ノ行ス其止嘔吐消穀進食令腹痛ヲ治

修治

殼俱慢半

癪解酒毒○其色白其狀豆ニ似テ盛多也。

故ニ名テ白豆蔻トス。楊雄方言云凡物成多曰蔻○白豆蔻ハ胃

冷ヲ去肺中ノ冷滯ノ氣ノ行ス其止嘔吐消穀進食令腹痛ヲ治或大陽經ノ風寒ヲ目内此頭紅筋ヲ生ビ赤眼暴アキタ痛ヲ治シ寒瘡ヲ治スルモ亦風寒ヲ散ズガ故ナリ解酒毒スルモ酒濕ヲ温散スバ也。或ハ噎膈カクイヲ治スルノ義アルハ暖胃開胃口下氣故也。

白豆蔻ハ手太陰肺經入テ。冷滯ヲ去下氣及暖胃開胃ノ劑也。艸豆蔻與白豆蔻其氣味主治大槩同少不同アリ。艸豆蔻ハ脾胃二入コト專也。白豆蔻ハ肺二入コト專也。

脾胃二入コトハ肺三次トス

使藥

得入參生姜陳皮藿香胃虛反

附方

瘀停胃ノ嘔吐ヲ治ス

毒

肺熱○胃熱○陰虛燥熱ノ者勿用

畏惡

火ヲ忌

附方

人忽惡心ニ白豆蔻多嚼テ良出射後左小兒叱乳胃寒者白豆蔻縮砂仁各十四箇生甘艸炙甘艸各一錢爲末常ニ小兒ノ口

中二移入出

得効方

乘流點服ト。言ハ研細ニ末レ。餘藥ノ湯沸時ニ其末ヲ振立テ用
人義也。愚家傳亦從之爲當穴也。

益智子



辛溫○治遺精、小便餘瀝、夜漏寒腹痛利。

三焦調氣安神、進食止吐血○智、脾、神

胃命門ノ氣ヲ温メテ陰寒ヲ退ク。故ニ下焦ノ寒ニ因テ遺精、或ニ夢泄
小便餘瀝、夜漏多々。或多睡者、或利三焦益智子、金集香丸入肺合四君子湯入脾合大鳳髓丹入
腎、此能利三焦義。諸ノ補藥二合ノ三焦ノ陽氣ヲ溫利ス。調氣益智
子辛熟鬱結ノ開發レ。氣ヲ能宣通セム。安神心與脾子母相通入

修治

殼ヲ去、布ニ包操テ白膜ヲ去、仁ヲ用ユ○時珍曰入藥去皮炒用ト。章宜曰研細不見火

益智子。脾胃ノ陽氣ヲ補則心神自安。進食宣氣溫胃故ナリ。吐血
中下焦ノ陽氣虛ノ血ヲ收サシガ故ニ吐血レ。或ハ婦人ノ崩血用之。
然ニ血症多々熱ニ屬ス。諸方ア此辛熱ヲ用ヘシ。夷堅志秀川ノ陸
遜者忽吐血、不止氣厥驚狂。頭躁直視ノ戶ヲ出サシト欲ノ義ニ至ル。
陶公夢ニ觀音一方ヲ授ク。服之當除病根ト。夢サヌニ其方ヲ服ス。公
ニテ病癒。方ハ益智子一兩。生硃砂二十錢。青橘皮五錢。麝香一錢。爲
末。每服一錢。空心ニ燈心ノ煎湯ヲ用下ス。愚案ニ此說アリト雖凡
益智ハ辛熱硃砂ノ性ハ寒青皮ハ破氣ノ物麝香ハ香竈耳。妄信
之通用ト。總要心脾腎ノ陽氣ヲ温養レ。陰寒ノ邪ヲ去ノ要藥也。
者勿用。久用則生。熟過用スルコト勿レ。

附方

心虛尿滑。赤白濁ノ者。益智仁、白朮等分爲末。每服三錢。白湯二

テ 修治

殼ヲ去。布ニ包。揉テ白礪波ヲ走少々炒用。或、鹽水ニ用。

草



辛大溫○溫中下氣消食治霍亂。心腹冷痛水瀉虛痢。嘔逆。醋心。陰疝。頭痛。鼻淵。牙痛○
草撥ハ番語ナリ。本名ハ草爰也。摩伽陀國呼
辛大溫○溫中焦。溫下氣。故三消食霍亂心腹
冷痛ノ治ス。腸胃ノ寒ニ因所ノ水瀉。腸胃虛冷ノ痢疾。胃寒ノ嘔
逆。及醋味心三刺者ノ治ス。陰疝ハ陰囊腫痛ノ疝ナリ。多下焦ノ
寒ニ屬スルが故ナリ。治頭痛。鼻淵。牙痛者。草撥ノ辛熱。陽明ノ辨
熱ヲ散エバ也。鼻淵ハ濁涕流テ不止ヲ云也。草撥ノ主治多端有
ト。難病中下焦ノ冷滯ノ開散。

使藥

阿魏ト同クメ產後ノ泄痢。下陽溫ノ氣ノ致スニ越ヨトナレ。治不調子。人參。桂心。乾姜ト

辛大溫○溫中下氣消食止瀉痢。治霍亂。心腹冷痛水瀉虛痢。嘔逆。醋心。陰疝。頭痛。鼻淵。牙痛○
草撥ハ番語ナリ。本名ハ草爰也。摩伽陀國呼

合ノ藏府虛冷ノ

毒

脾肺腎ニ熱アル者勿用。○多用則目盲。過服則真氣ノ散。○腸虛下重ノ致ス

修治

醋ニ浸コト一宿。シ薺ヲ去頭ヲ用ヒ。焙乾波葉。守ノ削去使

剗用ル者アリ。製ノ畧ナリ不宜從。

肉



辛苦溫○溫中下氣開胃消食止瀉痢。治
冷積心腹脹痛霍亂。中惡。冷症。嘔逆。小兒。乳霍解酒毒。痰飲。蟲痛。消皮外絡下氣○

艸豆蔻ニ對シ云フ。使二肉ヲ用ヒ故ニ名。○肉豆蔻。辛苦溫也。辛ハ散シ。苦ハ躁テ下ス。故ニ溫中下氣開胃消食止瀉痢。暖脾胃固大腸也。

惟屬寒及虛冷者ニ宜シ。心腹脹痛因冷者ニ用。霍亂暖胃。故方中惡。惡毒ニ中。ノ云。一切中惡ノ症ハ皆毒氣ノ中焦ヲ犯也。肉蔻

ノ辛温芳香。此ノ温散ス。冷症虚冷ニ属スル傳尸症也。嘔沫胃寒ニ因テ水沫ヲ嘔者ヲ治ス。小兒乳霍。小兒胃寒ニ因テ吐乳下利ノ霍乱。或ハ胃寒。吐乳。不下食。腹痛。不者ヲ治ス。解酒毒温散スル也。痰飲冷瘀ヲ治ス。蟲癟肉蔻ノ辛苦温ヲ以テ。蟲腹癟ヲ治ス。消皮外絡下氣。肉蔻ノ辛温皮膚絡脈下ノ冷滯氣ヲ消ス。凡土ハ喜暖。喜芳香。故ニ肉豆蔻ノ辛温芳香能脾胃ヲ理テ。吐利ヲ治スルノ要劑。且調中氣ノメ。運化順下セシム。

使藥

鐵器 千
人參。補骨脂。吳茱萸。五味子。砂仁。合ノ清セシム。

查。藿香。麥芽。ト合ノ開胃。進。食。消。食。止。渴。痢。二宜シ。毒。下血皆勿用。○濕熱積滯ノ初用之反。清セシム。

畏惡

鐵器 千

附方

霍亂吐瀉者。肉豆蔻爲末。生姜湯三茶。一錢。服。出普濟方。

修

補骨脂



油色ヲ肥實スル者良。白ノ瘦輕虛ナル者不宜。麵粉ヲ水二杯。世豆蔻ヲ裹テ。糖ノ火中ニ埋ミ。煨熟レ。麵粉ヲ去テ。搗碎テ。用ニ。

鐵器ヲ犯スコト勿レ

辛大溫。○治骨髓冷精流腰疼。膝冷。囊冷。濕陽事不興。婦人墮胎。止小便。去腹中冷。明耳目。治腎泄。通命門。煖丹田。斂精神。○

此州能骨髓ノ脂液ヲ補フ。故ニ名。或ハ呼テ破。故紙トス。○補骨脂。命門丹田ノ陽氣ヲ溫補ス。骨髓冷精妄流漏。腰膝冷疼。陰囊冷。冷テ。胎孕墮者ヲ治ス。又下焦虛冷ノ小便妄通。不治。明耳目。治腎泄。亦暖腎故ナリ。若腎熱ノ目疾。勿用。肉豆蔻。與。補骨脂。相表裏ス。肉豆蔻能脾胃ヲ溫補ス。補骨脂能腎家ヲ溫補ス。故ニ孫

真人謂^ル「補腎」不若「補脾」。ト^ル者ハ肉豆蔻ヲ用^ユ。許叔微謂^ル「補脾」不若「補腎」。ト^ル者ハ補骨脂ヲ用^ユ。兩義相兼者^ハ。二藥兼用^ユ。然^{レバ}

二藥ノ性^ハ補^ニ過^リテ順行^シ難^ク。故ニ少^ク

總槩

命門ノ元陽ヲ堅^リ木香ヲ佐^シテ其氣ヲ順^リスルニ宜^レトス

總槩

固ニレ骨髓ヲ溫實^リ木香ノ要^ニ使^ス藥

胡桃^ハ胡麻ヲ得^テ其功大ナル。時珍曰^ハ。胡桃屬木潤^リ。火相生之妙。故語云^ハ。破故紙無^ハ胡桃猶水母之無鱗也^ト。胡桃補骨脂俱^ニ腎命門ノ藥トス。補骨脂ハ溫燥^リ。胡桃ハ溫潤^ス。故ニ兩藥合^ス同則溫^テ潤^シ燥^ニ

劑^{トス}

使^ス藥

胡桃^ハ胡麻ヲ得^テ其功大ナル。時珍曰^ハ。胡桃屬木潤^リ

火相生之妙。故語云^ハ。破故紙無^ハ胡桃猶水母之無鱗也^ト。胡桃補骨脂俱^ニ腎命門ノ藥トス。補骨脂ハ溫燥^リ。胡桃ハ溫潤^ス。故ニ兩藥合^ス同則溫^テ潤^シ燥^ニ

毒

丸劑ニ宜^レ。不宜煎^リ。○陰虛燥熱ノ者○

至ルコトナレトス

○下熱ニ因^テ夢遺^ハ。小便赤短^{タシ}○腎火^ヲ易^ク飢嘈雜者○

○熱在膏^ヲ無^カ力者^ハ。俱ニ勿用^ハ。惟腎熱津燥ノ家ハ禁用^ハ

畏惡

苅

○^下熱ニ因^テ夢遺^ハ。小便赤短^{タシ}○腎火^ヲ易^ク飢嘈雜者○

○熱在膏^ヲ無^カ力者^ハ。俱ニ勿用^ハ。惟腎熱津燥ノ家ハ禁用^ハ

諸益ヲ忌^ム

附方

二神丸^ハ脾腎ノ虛漏^ヲ治^ス。補骨脂炒半斤。

肉豆蔻生四兩爲末^{。撒}肉^ヲ梧子^ヲ大^ニ丸^ス。

空心^ニ米^ヲ飲^ム服^ス。木香一兩ヲ加^テニ神丸ト^シ号^ス。出本事方^{通氣}

散^ハ補骨脂二兩炒香^シ爲末^{。先}胡桃肉半分ヲ嚼^ミテ^後ニ溫酒ニテ

未藥二錢ヲ服^ス。出婦人良方^{。小兒夜尿}膀胱ノ冷^也。

修治

枝皮^ヲ擇^ム

去^カ酒^ニ鹽^少許^ヲ雜^ヘ浸^カ之^{一宿}レ^テ復^カ蒸^{コトニ}三時^バカリニメ^{日ニ}而^キ

乾^カ炒^ム使^ス。或^ハ鹽酒^ニ浸^カ一宿^レ不^シ蒸^ム。即^ハ干^カ乾^カ炒^ム用^ス。略製^也

苦辛溫[○]通瘀血[○]治積聚[○]癰^ノ瘕^ノ心腹痛^通

月經^止撲^損痛^下血[○]消食[○]開胃[○]治^{小腸}疝[○]

氣[○]腎積[○]疫癘[○]鬼氣[○]吐酸[○]冷積[○]冷瘻[○]○義茂^ハ

ノ名義未^詳。或^{義木}ニ作者^ハ義述^ノ略^也○義茂^ハ黑色ニシテ氣

義



中ノ血ヲ破ル。婦人積塊ノ主剤トス。入肝破瘀血其功尤烈シ。故積聚癰瘕ヲ治シ。或ハ瘀血。或ハ冷氣ノ心腹痛ヲ治シ。因瘀血月經不通ヲ治レ。撲跌損傷ニシテ痛者ハ瘀血ニ属ス。用此治之。下血瘀血ニ因テ下血スル者ヲ治ス。消食開胃。莪茂。脾胃ニ入テ温散スル也。小腸疝腎積奔豚ハ。冷ニ属ス。用之冷滯ヲ温散ス。疫癘鬼惡邪毒莪茂ノ辛溫氣烈ニ因テ惡邪ノ氣ヲ驅逐ス。吐醋。胃寒ニ属スル故也。冷積冷瘀此ガ苦辛溫ノ氣烈ヲ以テ冷積冷瘀結ヲ治。莪茂與三稜太槻同ノ少異也。三稜ハ血中ノ氣ヲ破ル。莪茂ハ氣中ノ血ヲ破ル。諸藥ヲ用ヘラ。血積ナキ者ハ此兩藥ヲ妄ニ不可有用。

總槩

結氣ヲ治スルノ要剤ナリ。

使

酒醋ヲ藥得テ良。毒用バ補劑ト合同スベシ。獨用ハ積不去ノ真氣ノ

擗ス○孕婦○氣血兩虛者○脾胃怯弱者皆不可用。○積滯薄者ハ皆斟酌スベレ

附方

如ニ痛者ヲ治ス。九月ニ采テ粗皮ヲ

莪茂二兩醋煮。木香一兩煨。各爲末。每服半錢。燄湯三ト用ユ。出衛生家寶方。修治。解去暴乾使ニ熱火ノ中ニ煨レ。柔ガ。擣碎丁醋ニ拌テ干乾炒用ニ蓋シ。醋酸ヲ以テ血中ニ引コトヲ欲ス。或以醋煮ノ法アリト雖ニ。醋氣高撲鼻不可也。

三稜苦溫○治癰瘕。積聚。經閉。氣脹。撲損。痛心。腹痛。血運。瘡腫堅硬。消食。通乳墮胎○此艸ニ有三稜。故三名其生元。荆楚ノ地ニ多シ。

故三荆三稜凡号。○主治太槻莪茂ニ同ノ。三稜ハ入肝血中ノ氣ヲ破益。莪茂ハ辛溫。三稜ハ苦溫タルヲ以テ辨也。惟瘀血ヲ主トスル者ハ。莪茂ヲ用ユ。瘀血ニ滯氣ヲ主トスル者ハ三稜ヲ用ユ。二藥ノ功太槻同ニテ。

我术ハ直ニ瘀血ヲ破リ。三稜ハ血中ノ氣滯ヲ破者ナリ。此ガ癥瘕積聚ヲ破リ。女子ノ經閉ヲ通す者ハ、三稜能血中ノ氣滯ヲ行ス。血行氣行ル。氣聚則血不流。氣行則血流也。故也氣脹。氣滯ニ因テ腹脹者ヲ治ス。撲損^{テラボウ}。跌撲損傷ノ痛者ハ、我述三稜ノ治スル所ト雖也。尤ニ三稜主之。蓋レ跌撲稽墜者ハ、氣聚此血塞^{フサ}ル故ニ。三稜ヲ以テ其氣滯ヲ行^メ則血流^シ。痛去。心腹痛^シ。氣ノ結滯ニ因^ス者ヲ治ス。血運婦人產後ニ血氣逆上メ。眩暈頭旋^シ者ヲ云用。此氣ヲ下行^シテ消^ム。瘡腫堅硬^シ諸瘡腫ノ堅硬ラ^ム。未^タ潰^ス痛者ハ、專氣滯^シテ血不行^ス。故方^シ。消食三稜ノ苦溫。氣ヲ行^シ。食ヲ疎^ス。通乳^シ。婦人乳汁不通者ハ、專^シ肝經ノ氣滯^シ也。墮胎破氣通血^シ。墮胎孕婦ニ尤^モ禁忌トス。槩^ノ堅^シ削^リ。聚^ヲ碎^クノ良剤タリ。毒^シ。實^ノ者非^シ妄^ニ勿用○

總

眞氣健實^シ者ト雖也。單服久服スルコト勿レ
○胃氣不固者ハ尤^モ恐用○孕婦用此禁也

附方

本綱ニ此ガ附
方ヲ載^ルコト

多シトイドモ皆攻撃ノ剛劑。今ノ愚案^シ。凡^シ三稜。我述等ノ剛劑ヲ人タ^シ用^ヒキ者ニ非^シ。故^シ之^ヲ愚案^シ。用テ消導^シスル者ハ人參。當歸等ノ補藥ヲ佐^シ。血氣ヲ助^シ。胃氣ヲ養^フ。コトヲ兼^ベし。胃氣不^シ健^シ則消導^シト雖^シ。運化流行スルコト不能^シ。彼^ノ疲^リハ鞭^シ。然^シが如^シ。元氣一度盛^シ。消導^シ劑得^シ。助^シ積^シ能^シ銷^ス。磨^シ開^シ散^シ。平復^シ。功^ヲ收^ム。専^シ消^ム。ノミ^シ用^ヒハ胃氣虧損^シ。反^テ病^ヲ加^ヘ。邪^ヲ助^ク。故ニ東垣治^シ五積^ノ方中ニ皆人參ヲ合^ス。以^テ之^ヲ此意^ヲ知^シ。修治^シ。黃白色^ヲ重^シ者ヲ良^ス。麵粉ヲ濕^シ包^ムテ乾^シテ用^ヒ。或^ハ醋^ヲ煮^テ剉^シ焙乾^シノ用^モ亦佳ナリ。廣益本艸大成卷之七畢。

