



飯沼  
徳齋  
著述

新訂草木圖說 草部

二

VOL. II



草木圖說前篇卷二目錄

草部

第三綱 三雄蓋

第一目 一雌蓋

- 一 カノコサウ
- 三 ハナシヤウブ
- 五 アヤメ
- 七 子ヂアヤメ
- 九 シヤガ
- 十一 ヒアフギ
- 十三 ハナスゲ
- 十五 ミヅマツバ



- 二 イチハツ
- 四 カキツバタ
- 六 コカキツバタ
- 八 ヒアフギアヤメ
- 十 ヒメシヤガ
- 十二 スキセンアヤメ
- 十四 イボクサ

第三目 三雌蓋

十六 ドクダメ  
十八 スブタ

十七 ザクロサウ  
十九 スブタ

第四目 齊頭四雄蓋

第一目 一雌蓋

二十 ヲトコヘシ  
廿ニ キンレイクハ  
廿四 タウチサウ  
廿六 オホバコ  
廿八 ヤクラオホバコ  
三十 サバオホバコ  
卅ニ ヤツマタオホバコ

卅一 ヲミナヘシ  
卅三 ワレモカウ  
卅五 ビンビ子ルラ  
卅七 ハクサンオホバコ  
卅九 チヤボオホバコ  
卅ニ タウオホバコ  
卅三 ニチニチクワ

卅四 ハシカクサ

卅五 フタバモグラ

卅六 マツムシサウ

卅七 アカ子スギセン

卅八 カハラケツノイ

卅九 子ムリクサ

四十 ゴセンタチバナ

四十 ベワリ

四二 カナヒキサウ

四三 マヒヅルサウ

四四 ホザキノイカリサウ

四五 イカリサウ

四六 バイクワイカリ

四七 チヤラン

四八 フタリシヅカ

四九 ヒトリシヅカ

五十 ミヅトラノヲ

五一 ミヅユキノシタ

五二 ヒシ

五三 ヒメヒシ

五四 ツルアリトホシ

五五 ヒヤクブ

五六 ツルヒヤクブ

五七 ビンボウカヅラ

五八クハエンサウ

第二目 二雌蓋

五九ムグラ

六一ヨツバムグラ

六三アカ子

六五クルバサウ

六七オホキヌタサウ

六九子コノメ

第三目 三雌蓋

七一ツルムラサキ

第四目 四雌蓋

七二ヒルムシロ

六十キクムグラ

六二ホソバノヨツバムグラ

六四マルバアカ子

六六キヌタサウ

六八カハラマツバ

七十ハナイカリ

七三イトモ

七四サ、モ

以上七十五種

七五エビモ

草木圖説前篇卷二

VOL. II

大垣

飯沼愨齋 著述

東京

田中芳男 增訂  
小野職愨

久保弘道 同校  
横川政利

TRIANDRIA.

草部

第三網

三雄蓋

トリアネリア

MONOGYNIA.

(一) カノコサウ ハルオミナヘシ

(敗醬科)

伊吹山中多ク自生ス。莖高二尺餘條道アリ。披針狀ニノ鋸齒アル數葉錯雜ヲナシテ對生シ。春莖梢細垂ヲ對生スルヲ數層。各極又ヲ分チ略繖狀ヲナシテ花アリ。每節針狀葉アツテ護之。ソノ花各二箇一葶ニアリ。甲落テ乙漸開ク形漏斗様ニノ五裂大<sup>サ</sup>一分餘水紅色。實礎<sup>ニ</sup>ノ圓尖内ニ一子ヲ収メ。一柱長ク瓣上ニ出頭纒ニ三裂。雄蕊亦長ノ白葯。根ニ佳香アリ生時ハ恰モ茸松ノ香ニ似タリ。故ニ舊俗知ノ茸松ト稱ス。一種草稍小ニノ常種ノ如ク簇生セズ行根ノビテ芽ヲ出スモノアリシハ<sup>第五種</sup>ハレリアナ。ラヒシナリス。羅<sup>ウ</sup>イルテ。ハレリアーン。蘭

按林氏ハレリアナノ類ヲ舉ル<sup>二十種</sup>ニノ。ソノ殊功ヲ稱スルハ專ラ此種ニアリ。ソノ用名物考詳之。阿須氏所圖ノ此種アツテハ。莖葉共ニ毛茸アルモノ、如クナレトモ。林氏ソノ<sup>ヲ</sup>不説。且西勃氏本邦所産ノ種尤佳品ナル<sup>ヲ</sup>云ハバ。ソノ眞品ナル<sup>ヲ</sup>可證



(1)  
KANOKO-SŌ.  
VALERIANA OFFICINALIS  
L. VAR.  
ANGUSTIFOLIA MIQ.  
(VALERIANACEAE.)

卷之二

三十一目

二

平林生稿

(2) ICHI-HATSU.  
IRIS GERMANICA L.  
(IRIDACEAE)



(二) イチハツ 鳶尾

(鳶尾科)

人家多栽テ花ヲ玩ブ。葉劍狀ニメ脊ナク數片扁列シ長一尺餘形蝴蝶草ニ似テ光澤ナク色淡綠。三四月葉間莖ヲ抽ク一亦一尺餘。冬ハ一葉アツテ岐ヲナシ毎頂數片ノ苞アツテ花ヲ出ス。大抵三花甲萎テ乙次之。初頭ハ梗ナク終末ナルハ短梗ヲ見ル。花大小六瓣。大瓣ハ展開微ク垂レ。形燕子花<sup>カキツバタ</sup>ニ似テ幅更ニ濶ク色淡紫碧ニメ紫點アリ。瓣心ノ本ニ剪裁毛様ノ裂片アリ。白質紫點。小瓣ハ卵圓ニメ上ニ立キ色同ノ紫點少ク毛様裂片ナシ。又白花或淡黃褐色ノ品アリ。實礎橢圓ニメ一柱粗ノ三裂半ニ至ル。末端ニ尖頭齒刻アツテ略花瓣ノ如ク色亦同ク。花心ニアツテ小瓣ノ間ニ開ク。三雄蕊柱背ニ沿ヒ灰白色ノ長葯アリ。圖在燕子花下可照見實熟ノ鈍三角三區ニメ内ニ薄片子ヲ多ク蓄フ。根横行結節多毛味辛ク口舌ヲ刺戟ス。内外用共ニ功アリ。此類花實根形率<sup>子</sup>前説ノ如シ。故ニ已下ノ諸種ニハタゞソノ殊態ヲ舉ルノレ

イリス。 第三種ケルマニカ。 羅 トレイゼ・イリス。 蘭

本草綱目

卷之二十一

十三

平林上林

本草綱目

卷之二十一

平林上林


(三) ハナシヤウブ

玉蟬花


(鳶尾科)

葉狭長劍脊アツテ白<sup>キツク</sup>葉ノ葉ニ似テ夏花アリ。莖高ク葉上ニ出ツ。大瓣ハ鳶尾ノ大  
瓣ノ如クミノ毛様片ナク。小瓣ハ燕子花ノ小瓣ノ如クナレトモ稍短ク圓頭ニメ  
立ツ。兩蕊ノ形燕子花ニ同シ。故ニ略之。此品花色ノ種々アル不暇毎舉ソノ伊勢ニ

テ種殖スルモノハ尤美ナリ。一種山中ニ自生スルモノア  
リ之ヲドンドバト云。葉劍脊アツテ家殖ノ品ト同シケ  
レトモ花小ニノ不堪觀  
イリス<sup>第十二種</sup>。シビリカ 羅 シビリセ イリス 蘭



(3)



HANA-SHIYŌBU.  
IRIS TECTORUM MAX.  
IRIDACEAE.)

平林莊藏



(四) カキツバタ 燕子花

(鳶尾科)

水澤池中ニ生シ人家亦多ク栽ユ。草鳶尾ヨリ大ニ葉長二三尺。夏莖ヲ抽キ花ヲ放ク。大抵葉ヨリハ低シ。大瓣鳶尾ヨリ狭ノ長ク小瓣亦小ニノ長シ。柱頭瓣端扁圓ニメニ片。色總テ紫碧ヲ常トス。又白色紅色翠碧色白質紫斑アル等種々アリ。根イチハツト同シケレドモ味彼ノ如ク峻ナラス


按イリスノ一種ナレトモ的當ノ種名未詳。或ハ林氏所謂ワール。イリスノ一種ニ可收乎



(4) KAKITSUBATA.  
IRIS.  
(IRIDACEAE.)



(5) AYAME.  
IRIS.  
(IRIDACEAE.)



(五) アヤメ 又ハナアヤメ

或云溪蓀

〔鳶尾科〕

人家多栽ユ。葉燕子花葉ニ似テ狭小。高一二尺直上シテ不垂。花莖短ノ枝ナク頭ニ  
二三花ヲ放ク。形燕子花ノ如ナレトモ小。外瓣扁圓ニメ長カラズ。色紫碧ヲ常トス  
又白色ナルアリ。瓣爪蜜槽部稍長ノ毛様裂片ナク。黄褐及暗紫ノ斑點アリテ鳶  
尾燕子花等ト同シカラズ。内瓣ヒ様柱頭ニ尖ナルヲ鳶尾ノ柱頭ノ如ク。竇礎ノ形  
似類ノ常套ニ外ナラズ。根形ハ稍小ニメ味又峻ナラズ。一種カマヤマレヤウフト  
稱スルハ。葉狭ク色粉白ヲ帯ヒ花莖高ク葉上ニ出花稍大ニメ色尤深シ。又チヤホ  
アヤメト稱スルハ形小ナリ。ソノ種ニモ亦形ノ大小花色ノ不同等ノ種々アリ

第十三種

イリス。フルシコロ作。羅

ボンドブルーミゲ。イリス 蘭

春氏  
研定

(6) KO KAKITSUBATA.  
IRIS CRISTATA AIT.  
(IRIDACEAE.)



(六) コカキツバタ

(鳶尾科)

葉直上高五七寸花黄色。一種淡紫花ニノ葉微ヨレテ馬蘭ノ態アルアリ。共ニ微ノ  
劍脊アツテカキツバタト不同。亦アヤメノ種属ニ係ル

(七) 子ヂアヤメ

馬蘭

(馬尾科)

本草啓蒙形状ヲ詳ニス。葉アヤメニ似レトモ尤狹シテ縦理アツテ劍脊ナク。花瓣狭ノ尖リ白質淡紫色ノ線條並ニ淡紫暈アリ。生殖部ノ形ニアツテハ似類ノ常套ヲ具ス。根形鳶尾ノ如ク小味亦差緩

第十二種

イリス。シビリカ。羅

シビリセ

イリス。蘭

春氏所定


以余見之不加花菖蒲之約當

(7) NEJI-AYAME.  
IRIS.  
(IRIDACEAE.)



(8)

HI-ŌGI AYAME.  
IRIS.  
(IRIDACEAE.)



先之ニ

(三)

(八) ヒアフギアヤメ

〔鳶尾科〕

葉イナハ鳶尾ハツ又ハ射干ヒナギノ葉ノ如ク。中心花莖ヲ抽テ二三尺ニ及ビ。數枝ニ分レ每頭ニ花ヲ放ク。外瓣并ニ兩蓋ノ形ハ。アヤメノ花ニ同フ。色微ク淡シ。特リ内瓣ニアツテハ大ニ不同。至テ小ニテ殆トナキガ如ク。只長三四分ノ針狀ニテ黃褐色。本ニ黄色ニ紫條アル箭羽狀ノ細瓣アルノミ。今附ニ倍圖示其狀。根味微苦ヲ帶テ亦刺戟ス。按亦「イリス」ノ一種ニ可収而ノ種名未詳

(九) シヤカ

蝴蝶花

(蔦尾科)

草狀射干ニ似テ稍小ニシテ光澤アリ。凌冬不枯春中心莖ヲ抽キ枝ヲ分チ花ヲ著ク  
ルヲ射干ノ如ク。花射干花ヨリ微大ニシテ。大小六弁ノ形蔦尾類ノ花ノ如ク。瓣縁毛  
様剪裁アリ。色白質ニ淡紫碧暈并ニ紫碧ノ條點。又大瓣ノ心ニ黄色ノ條點アリテ  
一家ノ形色ヲナス。兩莖ノ形根狀等ハ蔦尾類ノ如ク。味亦酷烈刺戟ス

第五種


イリス。スクアレンス。羅

ホイルコレユリゲ。イリス。蘭

春氏  
可定

イリス。ヤポニカ。西勃氏

按林氏第五種ノ下所説ノ形狀本条ニ相似レトモ、西勃氏更ニ新名ヲ製シテ下  
之ヲアルニ因レバ、春氏ノ説尚不穩ルヲアルカ



SHYA-GA.  
IRIS JAPONICA TH.  
(IRIDACEAE)

(9)

卷之二

〇三編一目

十

平林氏蔵

(10) HIME-SHYA-GA.  
IRIS SIBIRICA L.  
(IRIDACEAE.)



卷之三  
三十一

十一  
平林在

卷之二  
三十一

(十) ヒメシヤガ

〔鳶尾科〕

草状コカキツバタニ似テ差大ニ。花莖高ク立テ枝ヲ分チ花ヲ著ルノ形テニ花辨  
潤メ頭ニ一陷缺アル等ハ。蝴蝶花ノ態アリ。故ニノ名アリ。花ニ淡紫色ト白色ト  
ノ二種アリ。又吾邦北山ニ産スル者ハ葉末微垂ル。共ニ根味頗ル峻ニノ刺戟ス

第十二種

イリス。シビリカ。羅 シビリセ。イリス。蘭 西勃氏  
所定



按林氏所載ノ形状ヲ閱ルニ的當ナラズ姑ク存疑

(11) H. OGI.  
 PARDANTHUS CHINENSIS KER.  
 (IRIDACEAE.)

第六種  
 イキシア。シ子ンシス。羅  
 シ子ーセ。イキシア。蘭  
 モレア。シ子ーシス。春氏

〔十一〕ヒアフキ 射干  
 山中ニ自生シ家園亦多栽テ花ヲ賞ス。花色黄赤ヲ常トス。或ハ鮮黄淡黄或ハ淡紅  
 等アリ。又矮生又葉形ニ種々アリ。形狀象所通知故ニ一々セズ。花無萼六瓣裸子室  
 ニ一柱。頭三出筒様ニメロ三裂シ裏ニ軟細毛アリ。雄蕊三莖葯黄赤色。附柱郭大

〔鳶尾科〕



卷之二

三十一頁

平林花



(十二)ス井センアヤメ

(賣屋科)

十餘年前舶來シ漫ニレリーナルニスノ名ヲ傳フ。蓋シ舌人ノ誤認ニ出ツ決シテ其類ニ非ス。世人又水仙アヤメト稱ス。根橢圓ニ芋塊ノ如ク葉ハ恰モアヤメノ葉ノ如ク中心一道尤モ著クメ微劔脊ヲナス。寒地ニアツテモ纔ニ露雪ヲ防ケバ冬尚不凋。春抽莖二尺餘數葉ヲ互生シ十餘花ヲ以テ片側穂ヲナス。毎花間ツテ五六分其間少ク枉テ不直。苞萼二片内者小ニメニ尖。外者大ニメニ三尖。質膜様ニ薄ク。花鐘様六裂大サ一寸餘。色淡黄ニメ紫褐ノ條脉アリ。實礎橢圓ニメ三稜一柱頭三裂扁片ニメ微反シ。雄蕊三莖。長葯紫黑色ニメ黄粉ヲ吐キ柱頭下ニ立ツ。

第六種

イキシア、セクシンダ、ロー、エー、ン、セー、ゲ、ゲ、イ、キ、ア、蘭

按林氏所説ノ花色ニアツテハ嫌アルカ如クナレトモ。形狀些異ナレ故ニ不容疑

SUISEN-AYAME.  
GLADIOLUS.  
(IRIDACEAE)

(12)



林氏所説ノ花色ニアツテハ嫌アルカ如クナレトモ。形狀些異ナレ故ニ不容疑

(十三) ハナスゲ

又 ナモ

知母

(知母科)

啓蒙詳説アリ可見。花六瓣長披針狀ニシテ纒ニ咲テ正開セズ。色灰白淡紫碧ノ條暈アリ。雄蕊三莖内瓣ニ出テ扁莖ニシテ黄緑葯アリ。實礎柯子狀三縱道アリ。頸一柱ナス。一種白花ノ品アリ。

按三綱一目ニ可収品ニシテ所属未考

HANA-SUGE; CHIMO.  
ALETRIS JAPONICA LAMB.  
(HAEMODORACEAE.)



(13)

本草綱目


三綱一目



十四

本草綱目

(14) IBO-KUSA.  
 BLYXA ROXBURGHII REICH.  
 (HYDROCHARIDACEAE.)



卷之三

三綱一目

十五

千林莊藏

卷之三

三綱一目

千林莊藏

(十四) イボクサ 水竹葉

(水竹科)

草状啓蒙ニ詳説アリ。萼三片花亦三瓣。白色ニ淡紅紫暈アリ。實礎繸状口纒ニ多キ淡黄白色。三雄蕊葯丁字様ニノ色青ク條道アリ。雄蕊ノ間ニ莖短小ニノ頭ニ淡紫色ノ圓帽アル蜜菌ニ。又實礎ノ下ニ白色ノ纖長毛アリ。附郭大圖示其諸事

所屬未詳

(15) MIDZU-MATSUBA.  
ELATINE ALSINASTRUM L.  
(ELATINEAE.)



十六

平林館藏

(十五) ミヅマツバ

〔九松葉科〕

夏秋ノ際乾田ノ中ニ生ス。高二三寸莖多液ニ淡青或ハ帶淡紫色線條アツテ殆  
ト方初メ地ニ塌シ節々根ヲ下シ多ク枝ヲ出ス。肥者ハ四葉瘠者三葉或ハ二葉相  
對シ形披針狀每葉腋無梗無萼ノ一花ヲツク。鐘狀五尖實礎三縦道アツテ三起ニ  
ノ一柱。全體水紅色ニノ莖黃色。附郭大圖詳諸事

所属未詳

(16) DOKU-DAME.  
 HOUTTUYNIA CORDATA TH.  
 (SAURURACEAE.)



十七

本草綱目卷之二十一

第三目  
 三雄蕊

TRIGYNIA.

卷之二

三雄蕊

(十六) ドクダメ 戟菜

(三白草科)

草狀啓蒙ニ詳説アリ。花大小四瓣卵圓ニノ無萼白色。中心兩性蕊ヲ攢簇シ穂狀ノ一柱ヲナス。分之ハ柯子狀ノ實礎三頭ニ分レ。每頭一柱反捲レ。三莖ノ黃葯アル雄蕊コレヲ圍ムニ成ル。蓋シソノ花瓣ナルモノハ、一種ノ苞ニノ。中心ノ一柱ニ無瓣ノ多花滿布シテ穂狀ヲナスモノナリ。一種重瓣花ナルアリ。鈍披針狀白色ノ多瓣繖敷レ。本大末漸小ニノ頗ル穂形ヲナス。檢之一瓣毎ニ實礎兩蓋ヲ具シテ。他ノ重複花ト其趣ヲ異ニス

ホユトユイニア。コルダタ、春氏

按春氏ハ十三綱ニ収ム今移入于此

(17) ZAKURO-SŌ  
 MOLLUGO STRICTA L. VAR. LATIFOLIA.  
 (CARYOPHYLLACEAE SEU PORTULACACEAE MIQ.)



(十七) ザクロサウ

(石竹科  
馬齒莧科)

田園路傍普ク生スル所ノ雜草。高四五寸葉披針狀ニノ對生シ。多ク枝ヲ分チ。五月  
 房狀ニ細花ヲ綴ル。形卵圓五瓣ニノ黃褐色。實礎圓長ニノ三柱。頭白色ニノ反シ。雄  
 蕊三ニノ白葯。萼五出。蕾ニ黃褐色暈アリ。附全花郭大圖

所属未考

(18) SUBUTA. [A]  
 BLYXA.  
 (HYDROCHARIDACEAE.)



卷之二

三編三目

平林在菴

(十八) スブタ [イ]

〔水鼈科〕

水田中ニ生ス。莖高二三寸葉狹長ニノ尖。質軟脆ウナギモノ葉ノ如クノ多葉莖ニ  
 互生ス。初秋葉腋ヨリ二寸許ノ纖細梗ヲ出シ頂ニ一花ヲ開ク。萼鈍披針狀三葉。花  
 狹長三瓣白色。雌蕊一莖三裂殆ト三莖ノ如クノ白色長メ恰モ瓣ノ如シ。雄蕊三莖  
 纖細葯長メ黄色。實礎ハ梗本籜葉ノ中ニアル。クロモニ於ルガ如シ。  
ニシテ、昔常ノ  
 花梗ニ非ス 按ニ此梗ハ  
 即一種ノ蒂

附花瓣兩葯莖籜等郭大圖

所属未考

(19) SUBUTA. [B]  
 BLYXA.  
 (HYDROCHARIDACEAE.)



卷之二

三三三

(十九) スブタ [B]

(水鼈科)

亦水田ノ中ニ生ス。葉ノ形質全ク前条品ト同ノ微大。且前品ノ如ク莖ヲ起サズ。多  
 葉一窠ニ簇生スル。略ウリカハノ如ク。葉間ヨリ莖ヲ抽キ花ヲ開ク。梗状花瓣亦  
 前条種ト一般異ナクノ微大。タゞ萼一苞ニノ頭三裂ナル。彼ノ殆ト三葉ノ如キ  
 ト不同ノミ。故ニ別ニ郭大圖ヲ不贅



(20)



OTOKO-MESHI.  
PATRINIA VILLOSA JUSS.  
(VALERIANACEAE.)

第一目  
二雄蕊

MONOGYNIA.

卷之二

第四綱

齊頭四雄蕊

テトランドリア

TETRANDRIA

(二十) ヲトコヘシ

敗醬

(敗醬科)

啓蒙形状ヲ畧説ス可見。惣テヲミナヘシヨリ大ニノ莖四五尺ニ及セ。花鐘狀五裂  
白色喉ニ白毛アリ。其五裂中。二裂ハ差小ニノ一雌蕊柱ツテソノ二小裂ノ上ニ出。  
頭菌様雄蕊四ニノ葯淡黄色。實礎橢圓ニノ裸。鱗形苞莖アツテ擁之。

ハレリアナ。ヒルロサア、

春氏

パトリニア。ヒルロサア、

西勃氏



OMINA-MESHI.  
PATRINIA SCABIOSAEFOLIA LINK.  
(VALERIANACEAE.)

(廿一) ヲミナヘシ

敗醬

(敗醬科)

平林莊

啓蒙形状畧説アリ可見。生殖部ノ形ヲトコヘシト一般ニナシ只瓣莖黄色ナルノ  
 一種黄色差淡ナルアリ。ヲトコヘシノ条可併見

ハトリニア。ルペストリス、 西勃氏

(22) KINREI-KUWA;  
HAKUSAN-OMINAMESHI.  
PATRINIA PALMATA MAX.  
(VALERIANA CEAE.)



本草綱目

三十三

平林生哉

卷之二

四編一目

平林生哉

(廿二) キンレイクハ スハクサシラミナヘシ 地花菜 大萼葉敗醬 (敗醬科)  
加州白山勢州菟野山等ニ産ス。莖高一尺餘。長柄葉ヲ對生ス。形畧山カヘデノ如ク  
五岐或ハ三岐ニノ粗鋸齒アリ。五月梢頭ニ細黄花攢簇スルノ狀。殆トヲミナヘシ  
ノ如シ。故ニソノ名アレ。花筒萼ニ接スルノ處ヨリ萼ト並ビテ距ヲ出シ長サ萼ノ如シ。實  
狀鋸口ニノ不裂。花筒萼ニ接スルノ處ヨリ萼ト並ビテ距ヲ出シ長サ萼ノ如シ。實  
礎萼ノ中ニ藏レ。一柱頭菌狀。四雄蕊ニノ短葯。共ニ黃色。附郭大圖示花筒爲距狀  
所屬未考



(廿三) ワレモカウ

地榆

(薔薇科)

啓蒙形状ヲ詳説ス可見其種不一。根ニ横延アリ直行アリ草ニ大小花穂ニ長短ス。殆ト圓ノ毬形ナルアリ。色ニ紅白粉紅暗紅。又花候ニ早晚アリ。葉狀亦從テ小異同アレ。花。概ルニ萼二片。或ハ之ヲ苞ト見花又別ニ萼葉ニ似タル一小片アツテ之ヲ護シ。花楕圓四弁。阿須氏ハ一實礎裸ニノ楕圓四稜弁下ニアリ。牀亦圓ノ一柱。頭ニ細粒ヲ滿布ス。雄蕊四莖ニノ短葯色花色ニヨツテ不一。其多種ナル不暇每舉。今野生秋花アル尋常ノ一種ヲ圖ノ概標ヲ示ス。附一全花。ニ實礎并柱。萼。萼葉等共

郭大圖

第一種

サンクイソルバ。ラビシナリス。

ゲウアーン。ソルペンコロイド。

蘭

穂形卵

圓者

第二種

サンクイソルバ。メヂアス。

ミッテルスラク。

ソルペンコロイド。

蘭

穂形軸

第三種

サンクイソルバ。カナデンシス。

羅ゴローテ。

ソルペンコロイド。

蘭

穂形大

大

コローテ又井ルデ。

ピムピルレ。

鐸氏

野生者

ケレイ子

又タムメ。

ピムピルレ。

同上

園生者

按往取呀船載之品

按西洋亦多種ナレドモ。林氏ハ穂形ヲ以テ三種ヲ掲ク。鐸氏ハ大小ヲ以テ二種ニ分ツ。ミナソノ概略ニ出テ子細ニ不及トス。

平林在載

(24)

TAUCHI-SŌ.  
SANGUISORBA OBTUSA MAX.  
(ROSACEAE.)



二十五

平林生蔵

卷之二

四編一目

三才集

(廿四)

タウチサウ

地榆一種

(薔薇科)

草長大ナラザレドモ葉大ニノ幅廣ク。面深綠色背帶白。花穂長三四寸許雄蕊長ノ粉紅可愛蝦夷亦此種ヲ産スレバ蝦夷産ハ花本ヨリ開キ。白山産ハ末ヨリ開テ本ニ至ル。共ニ春花ヲ放キ花四弁白質淡暗紫色ヲ帯ビ。雄蕊長ノ淡紅葯黃褐色。實硬指圓ニノ白毛アリ一柱頭毛毬様

附全花郭大圖

按此種生殖諸部前條種ト一般ナレバ。蓋長クノ美觀ナル一殊態アリ。林氏說中如是ノ品ヲ載セザレドモ。亦ソノ第三種ノ中ニカ、ル

胡蒼耳

(薔薇科)

(廿五) ピンピテルラ 胡蒼耳

舶來種ニノ普クピンピテルレノ名ヲ傳フ。草薔種ノ地榆ヨリ稍小ニノ高二尺許。葉亦小ニノ色緑白タウ、キサウノ葉色ノ如シ。夏初花アリ球楕圓弁萼ノ形常種ト一般ニノ。實礎麥粒狀二顆並接シ。常種ハ各頭柱ヲナシ頭纖裂糸ノ如ク。初メ白色後漸ク紅變シ。多雄蕊<sup>常種ハ五蕊</sup>。莖系ノ如ク色紅ニノ莖黃色。一穗ノ中小花ヲ交ユ。ソノ大者ハ穂ノ下邊ニアツテ僅ニ五六花ニノ雄蕊尤長ノ垂下シ。恰モタウ、ケサウノ雄蕊ノ如ク。雌柱ハ小花ノ柱ヨリ短小ニノ頭毛亦小。大花ノ上穗末ニ及ブマデミナ小花ニノ。ソノ形大花ト同ノ殆トソノ半ニノ雌柱及テ大ニ。頭毛亦長シ。ソノ小花ハ多クハ雄蕊ヲ不具。間マ亦具スルモノアレトモ大花ノ雄蕊ニ不及。遠クノ僅ニ花心ニ立ツ。蓋シ此種雌雄異花ナルモノ、如クナレバ。熟實ノ際ニ至ツテ大花ノ實礎亦大ニノ小花ノ實ト異ナラザレバ。取テ雄花ト斷シ難シ。之ヲ下地レテ苗ヲ生ルヤ否ニ在ツテハ未試。殆期後日之檢 附一大花 二小花

三 花弁見實礎葉萼 四 實礎並柱共郭大圖

按鐸氏ノ引レイ子又タムメ。ピムピテルレノ圖全此種ニ當ル。又云此種細目共ニ地榆ニ不同レバ。他ノ形狀ソノ種ニ不外ヲ以テコ、ニ併セ收ム。




PIMPINELLA.  
POTERIUM SANGUISORBA L.  
(ROSACEAE.)

(25)

二千六

平林住藏

(26) ŌBAKO.  
PLANTOGO MAJOR L.  
(PLANTAGINACEAE.)



開花筒見實礎兩莖郭大圖

全花郭大圖

(廿六) オホバコ

車前

〔車前科〕

隨處普ク生ズル者ハ、葉橢圓ニシテ鋸齒ナク、往々微鋸齒アリ毛茸ナク、花莖圓ノ一長  
 穂ヲナシ、夏花アリ、萼卵圓四片筒様ヲナシ、一鱗葉アツテ護之、花漏斗狀ニシテ五裂  
 尖外反シ、色白メ微黃褐ヲ帶ヒ、實礎卵圓一柱ニシテ短刺毛アリ、雄蕊四莖、纖細長ク  
 辨ヒニ立葯白色淡紫暈アリ、地ニヨツテ草ニ大小形狀ニ不同アリ、三井寺産ナル  
 ハ惣テ常種ニ同メ只小、纔ニ二三寸ニ不過

第一種  
 フランタゴ。マヨル。

ゴローテ。

ウーフレ。

名義ニヨレバ主トシテ  
 大葉品ヲサス如シ

按林氏第一種ノ下ニ、本邦普通ノ品大葉品多穂品等ヲ併説シテ別ニ種名ヲ分  
 ズ。蓋其大小不一トモ、概ルニ葉橢圓ニシテ無毛、花莖圓ノ長穂ナリ、同一扱ナ  
 ルニヨル乎、其他十九種ヲ掲ク、本邦ニ於テモ品種少トセス、今余ガ所見ノ十許  
 種ヲ列擧ス、ソノ中西人ノ種名ニ的當ナルモノアラシ、未タ参考ノ暇ヲ得ス姑  
 ク期他

(27) HAKUSAN-ŌBAKO.  
 PLANTAGO MOHNISEI MIQ.  
 (PLANTAGINACEAE.)



卷之二  
 四十一頁  
 (廿七) ハクサンオホバコ 車前一種  
 (車前科)  
 葉常種ヨリ微ク狭長ニノ尖リテ。微モアリ。邊縁疎ニ微鋸齒アツテ脈五縦道ヲナス。夏花莖ヲ抽ク。五六寸線條アツテ不圓。疎ニ花ヲ綴テ穂ヲナス。瓣萼ノ形常種ト同ノ雄蕊尤長シ。蝦夷地所産ノ品亦略本条ニ同シケレバ。根葉好テ地ニ塌レモ充多ク草稍大ナリ。



(28) YAGURA-ŌBAKO.  
PLANTAGO  
(PLANTAGINACEAE.)



二十九

本草綱目

卷之二

四十一目


本草綱目

(廿八) ヤグラオホバコ

(車前科)

葉形略常種ト同シケレ厄時々小缺刻ヲ交ヘ花莖五六寸。梢ニ至テ圓尖ノ小葉ヲ  
散布鱗次シ穂狀ヲナス。寸餘。每葉腋一花ヲ出ス萼瓣蓋等ノ形惣テ常種ト一般  
ナリ。又穂下ノ二三葉ハ稍大ナルヲ交ユル。アリ。又莖頭ニ頗ル大ナル數葉ヲ散  
布密簇シテ一層ヲナシ。葉腋細莖ヲ抽テ上ニ小葉鱗次ノ穂ヲナシ花ヲ出ス。亦  
アリ

(29) CHYABO-ŌBAKO.  
 PLANTAGO.  
 (PLANTAGINACEAE.)



三十

平林在藏

卷之二

四十一

平林在藏

〔廿九〕 チヤボオホバコ

〔車前科〕

草高數寸ニ不超。葉潤短殆ト圓ク質トウオホバコノ如ク七縱道アツテ尤厚ク。面  
 凸凹不平邊縁不齊ノ缺刻アリ。初夏花アリ。莖纒ニ葉上ニ出花密簇穂ヲナス。寸  
 餘瓣萼ノ形色常種ト同ク。只雄莖短ク柱尤短粗ナルノ異アリ。附郭大圖示子室  
 柱形

(30) SAZAYE-ŌBAKO.  
PLANTAGO.  
(PLANTAGINACEAE.)



卷之二

四十一

(三十一) サバイオホバコ

(車前科)

此品自生ノ地ヲ不聞。或云尾州某氏ノ園中ニアツテ初テ得之ト。或然。柄扁大ニ  
ノ短ク。葉多クハ中筋ノ一方ニツキ或ハ刻缺或ハ分裂。縁邊或ハ雲頭或ハ鋸歯ヲ  
ツテ一様ナラス。全葉直立セズ横ニ螺轉シ。中心ヨリ次葉ヲ出ス。亦多クハ共ニ相  
轉シ相重リ。恰モ螺殼ノ態ヲナス。其狀尤奇ナリ。故ニサバイヲバコノ名アリ。中々  
花莖ヲ抽キ長穂ヲナシテ花アリ。生殖部常種ト異ナク又往々全ク常種ト一般ナル葉  
ヲ交ユ。西書中如此品ヲ載ルヲ見ズ蓋常種ノ變生ニ係ル

三十一

草木往載

TŌ-ŌBAKO.  
PLANTAGO PALUDOSA TURCZ  
(PLANTAGINACEAE.)



本草綱目卷之二十一  
三十一  
平水在藏

(車前科)

〔卅一〕タウオホバコ  
形状常種ト同シフシテ大ニ葉長一尺ニ過ヘ。花莖二三尺ニ至ル。生殖諸部ニアツ  
ラハ全ク同シ



YATSUMATA-OBAKO.  
 PLANTAGO MAJOR L. VAR.  
 (PLANTAGINACEAE.)

(32)



Handwritten Japanese text in vertical columns, likely describing the plant's characteristics and medicinal uses. The text is faint and partially obscured by the illustration.

(18)

卷之二

四十一目

亦相似  
 テタツ  
 ナスノミ  
 十數岐ヲ

PLANTAGO MAJORA TURCA  
 (PLANTAGINACEAE)  
 YATSUMATA-OBAKO



〔車前科〕

Handwritten Japanese text at the bottom right of the page.

(33) NICHINICHIKUWA.  
VINCA ROSEA L.  
(APOCYNACEAE.)



〔卅三〕ニチニチクワ 鴈來紅

〔大竹桃科〕

春實生シ。莖高一二尺。帶微紅色。葉對生シ。葉間枝ヲ出シ。夏各梢葉  
ニ一花或ハ二花ヲ出ス。萼鐘樣ニノ針狀五尖。花細筒樣長一寸餘。色淡黃綠。白苔末  
瓣下ニアツテ四ノ隆起アリ。即裏面葯ノツク處ニ當ル。筒上五裂殆ニ三瓣。本狹細末  
扁大面淡紅紫色。背白色。實礎麥粒狀二顆併合シ。一柱長ク花喉下ニ至シ。頭  
狀ノ如ク下ニ膜樣ノ短筒アツテ。ソノ狀奇ニノ他花ニアツテ未見アリ。又  
葯アリテ淡黃粉ヲ吐ク。花後細莢ヲ結ブ。アラセイトウノ莢ニ以テ小。又白  
生殖部ニ於テ異ナレ

第四種

ヒンカ。ロセア。羅 ローセコレユリグ。マークデパルム 蘭

按ニ「ヒンカ」ハ林氏五綱一目ノ品。日々花ハ一柱四葯ナレバ。雄蕊ノ數符合セザ  
レバ。他ノ形狀些異ナケレバ不容疑

(34) HASHIKA-GUSA.  
 OLDENLANDIA JAPONICA MIQ.  
 (RUBIACEAE.)



四國一

三十五

平木在成

卷之二

四九


(卅四) ハシカグサ

(茜草科)

藪陰路傍ニ生ス。莖軟ニノ塌地節々亦鬚根ヲ下シ漸ク起立ス。葉對生形卵圓ニ。尖兩葉相對ルノ間ニ三五針状ノ托葉アリ。葉腋ニ枝又ハ花ヲ著ク。無梗ニノ莖鐘状四出。花亦鐘状ニノ四裂白色。實礎莖ニ藏レ。一柱頭白粉ヲ撒ス。四枚蓋筒ニ出葯。淡藤花色實熟シテ莖不脱。子室二區ニノ細黒子ヲ收ム。附全花并半熟實部大圖。

所属未考

(35) FUTABAMUGURA.  
 OLDENLANDIA BRACHYFODA DC.  
 (RUBIACEAE.)



三六

平木在哉

卷之二

四一

(卅五) フタバムグラ

(西草利)

夏田園ノ間ニ生ス。莖高四五寸或七八寸。葉狹長濶一分許長一寸許對生。葉腋短梗細花ヲ開ク。萼圓ノ四出。花鐘狀四裂白色或尖ニ微紅暈アリ。實礎半萼ニ藏レ。一注ニメニ裂雄蕊四ニノ葯淡黃褐色。子室二區各一子ヲ収ム。一全花 二半熟實共

郭大圖

單種  
 チラヂア。ヒルギニカ。羅

ヒルキニセ。テウース。フロング。蘭



(卅六) マツムレサウ

リンボウギク

山蘿蔔

(山蘿蔔)

救荒本草啓蒙草狀ヲ略説ス可見。花周邊ト中心ト瓣形不同ル。苜蓿類ノ莖アリ然トモ缺筒完筒ノ状ニアラス。周邊花ハ大ニシテ差唇状ヲナシ。中心花ハ小ニシテ缺下唇大ノ三裂殆ト三瓣ノ如ク。中者尤長ク色淡紫。塞心ハ小ニシテ筒様四裂色淡ノ殆ト白色。往々ニ裂大ニ裂小ナル者惣萼披針状ニシテ十數葉。各萼ハ鐘様ニシテ上縁齒尖。實礎萼中ニ藏レテ一柱。雄蕊四葯紫褐色。白粉ヲ吐。花後實ヲ成ス。數十顆聚ツテ圓長毬状ヲナス。每顆頂五尖起アツテ。尖上紫色ノ刺毛ヲ立ツ。

第十八種

スカビヲサ。アトロプルプレア 羅ズワルトパールス。スクルフトコロイド 藤

林氏ハ花色暗赤ト云ヘバ。吾種ノ淡紫ト不同トモ。幾尼法氏卯葉圖モ的當ナレバ。其同種タルヲ昭然タリ

MATSUMUSHI-SO.  
SCABIOSA JAPONICA MUQ.  
(DIPSACACEAE.)

(36)



三十七

三十七

(冊七) アカ子ス井セン

(馬月)

弘化年間舶來シ「ホスメン」或ハ「ヒツキ」ノ名ヲ傳レトモ。余未詳出處。囊根格ハ仙ノ根ノ如シテ外皮紅色ナルヲ以テ。花ハアカ子水仙ノ名ヲ下ル。形恰大葉ノ水仙ニ似テ差大。五月簇葉ノ本ヨリ一莖ヲ出ス。尺許。梢ニ梗ヲ出ス。三處。ソノ處ニ短葉アツテソノ本ヲ以テ梗ヲ包ミ。每梗上苞アツテ一花ヲ出ス。射子蝴蝶花ノ類ノ如シ。花大サ一寸許。白色六瓣。略日々花ノ如シ。實礎圓長數縱道アリ。苞中ニ藏レ。一柱四分シ少ク反シ。四雄蕊莖短粗ニメ。深黃色ノ長蕊アリ。北花朝ニ蕾ヲ見シ申時前ニ至テ初テ放キ黄昏即チ萎ム。盛開ノ間一時ニ不過花時ノ尤短ナル者トス。一日ヲ間メ更ニ又花アリ。連々五六ニ至ル。

ホユトトイニア。カーペニス。羅。カーフセ。ホユトトイニア。蘭。

按此種本喜望峯草ニノ。林氏モタゞ一見ノ圖說ヲナスヲ以テ猶精密ナル至サレドモ。アカ子水仙ヲ云ニ不外如シ。

(37)



實礎兩蓋郭大圖

AKANE-SUISEN.  
TRITONIA CAPENSIS MIQ.  
(IPHOACEAE.)

(38) KAWARA-KETSUMEI.  
 CASSIA MIMOSOIDES L.  
 (LEGUMINOSAE.)



兩蓋實破郭大圖

三十九

平水在哉

卷之二

四十一

(卅八) カハラケツメイ 山扁豆

(荳科)

原野ニ多ク生シ。莖葉合崩ニ似テ苗短小ニノ剛ク。莖實シテ高尺許ニノ皮紫アリ。  
 夏秋ノ際葉腋ニ有梗花ヲ著ク。萼披針狀四葉。花橢圓ノ五瓣白側ニテ正開セス。實  
 礎圓長頸延テ莢ニ臨ム。雄蕊四。莖短ク莢管様淡黄粉ヲ吐ク。花後扁莢子ヲナシ内  
 ニ褐色ノ細豆ヲ收ム。合崩ノ莢ノ長大ニノ粒々膨起シ横ニ折ル、ニ異ナリ。本邦  
 ノ俗。或ハ此草ヲ種藝シ。葉ヲ採テ茶ニ代ルコトアリ。故ニ之ヲ子ムチヤト名クシ

所属未考

(卅九) 子ムリグサ

含羞草

(荳 科)

百品考載之可見、ソノ晩ニアダテ兼ヲ合シ。又觸之レハ直ニ併合垂下スルヲ以テ、世人皆、ニナリ  
 クサノ稱アリ。夏草ニ肥地ニ生スレバ、莖頗ル剛ク高二尺ニ及フ。脚葉間又枝ヲ出シ有柄葉ヲ  
 互生ス。柄長二寸許、頂ニ鱗様ノ四葉ヲ手指様ニ相對ス。一鱗二十余ノ小葉ヲ對シ、ソノ本ニ更ニ狭小ノ二葉アリ  
 テ、形略合歡木葉ノ如クナレバ、小鱗ノ中筋殆ト葉心ニアツテ、彼邊側ニヨルガ如クナラズ。故ニ擔圓ニノ尖ルモ  
 彼ノ扁尖ナルガ如クナラズ。又末鱗ノ中心ニ針狀ノ一葉、柄本亦狹細ノ二托葉アリ。莖、柄、葉背、共ニ白毛  
 アリ。又莖ノ處々ニ剛刺アリ。夏梢葉腋ヨリ二三四五ノ有梗、花ノ出ス。梗長サ寸餘、タウ、チサウノ  
 花ノ如ク、多小花ノ簇聚ニ成ル寸許ノ短穂ニシテ、毎小花ニ白色ノ一苞アリ。筒様ニノ頸四裂シ、内ニ  
 實礎兩莖ヲ収ム。雄蕊粉紅色ニシテ、四莖黃葯アリ。實礎擔圓ニシテ白色。一柱亦淡紅、苞外ニ又狹長一  
 莖アリ。色淡黃緑、縁綠白毛アリ。花後實ヲ結フ。一梗上刺毛アル十數莖ヲ簇生シ、内ニ三四ノ扁子ヲ  
 収ム。林氏ハ灌木類ノ二十三綱内ニ併ス今分テ収于此。 一全花 二實礎并柱共郭大圖

第十四種  
 ミモサ、フユギカ、羅 スカームアツチケ。ミモサ、蘭 コロイダー。ルール。メー。ニート、鐸氏 華爾氏

(39) NEMURI-GUSA.  
 MIMOSA PUDICA L.  
 (LEGUMINOSAE.)



子ムリグサ  
 四下  
 五木三并補

(40) GOZEN-TACHIBANA.  
 CORNUS CANADENSIS L.  
 (CORNACEAE.)



四十一

木在藏

卷之二

四十一

(四十) ゴゼンタチバナ

(山茱萸科)

北地白山等ノ高山ニ生ス。莖高サ三五寸。莖脚ニ小葉。梢上卵圓披針狀ノ四葉或ハ六葉ヲ簇生ス。莖葉共ニ頗ル剛クメ小類木ノ態アリ。中心一花莖ヲ抽ク。一寸許。上ニ楕圓ニノ尖ル四葩ニ者小ニ者大。白苞アツテ。内ニ十數ノ短梗アル細花ヲ開ク。形漏斗様ニメ四裂白色。實礎圓長ニメ一柱雄蕊四ニメ黃蕊。後實ヲ結ブ。熟レテ赤色。形南天燭ノ如ク稍小。蓋白山最高ノ巔ヲゴゼント稱ス。此草ソノ地ニ産實カラタチバナノ實ニ似タルヲ以テソノ名アリ。附苞中細花部大圖

所屬未考

〔四〕ナベワリ 黄精葉鈎吻

〔土茯苓科〕

深山陰地ニ生ス。近隣勢州ニ自生アレ。吾邦ニ産セズ。莖高七八寸三四葉ヲ互ニ  
 シ。黄精萎蕤ノ類ノ如ク又牛尾菜葉ニ似テ尖銳。五ノ縦脉著ク邊縁皺波紋ヲテ  
 レテ細鋸齒アルヲ見ルガ如シ。每葉腋ニ寸餘ノ細梗ヲ出レ頭ニ一花ヲ綴ル。或ハ  
 梗岐シテ兩花ナルモノ亦アリ。花下垂レ一大瓣三小瓣ヲ以テ成ル。ソノ大小二瓣  
 外ニアツテ上下ニ分レテ縦トナリ。二小瓣内ニアツテ兩側ニ開テ横トナル。尖ミ  
 ナ反ス。雄蕊四莖形略牙齒ノ如ク。本小末大。色紫黑頭白齒ノ如ク白處即葯ニノ深  
 黄赤色。兩莖並立シ。ソノ上下ヲ挾各一莖アツテ殆鈍長方形ヲナス。中心實礎緑色  
 ニノ平圓中心纒ニ尖頭アツテ色微淡シ。此品花形異態莖狀亦尤奇ナリ。附排開一  
 雄蕊露實礎郭大圖

所屬未詳

(41) NABE-WARI.  
 CROOMIA JAPONICA MIQ.  
 (SMILACEAE.)



田岡一

四十一

平林作

(42) KANABIKI SŌ.  
 THESIUM DECURRENS BL.  
 (SANTALACEAE.)



全花部大圖

四十三

平林在藏

卷之二

四十一目


(檀香科)

(四) カナビキサウ 百葎草

原野ニ多ク生シ。莖高一尺許。葉互生ニシテ形狹長。幅一分許長一寸許厚シ。帯白緑色。梢葉間枝ヲ分チ細花ヲ簇生ス。每花一二細葉アツテ護之。別ニ萼ナク。花鐘状四裂。表淡緑裏白色。四雄葎筒ニツキテ黄葎。實礎葎中ニアツテ一柱ニシテ結頭アリ。一連尾州知多郡ニ産スルモノハ。高二尺許ニ及ブ。

所属未考

(43) MAIZURU-SŌ.  
 MAIANthemum BIFOLIUM DC.  
 (SMILACEAE.)



四十四

平林生藏

卷之二

四十一

(四三) マヒツルサウ

(土茯苓科)

北地高山白山尤多ク吾能郷山亦コレアリ。根細メ延長一杆一葉時ニ一莖ヲ抽ク  
 一四五寸ニメニ葉ヲ互生スレバ上ニ花ヲ著ク。葉圓メ尖リ本深ククリコミ縦脉  
 葉形ニ循フテ分明略フタバアフヒノ貌アリ。故ニ白山アフヒノ名アリ。又ソノ  
 リコミ深キニヨツテマヒツルサウノ稱アリ。莖頭數梗ヲ出シ疎穂ヲ為シテ。無莖  
 楕圓ノ四瓣ニメ微反スル細白花ヲ放ク大サ二分許。實礎二顆一併シ柯子状ヲナ  
 シ各頸柱ヲ為シ結頭アリ。雄蕊四ニメ葯淡黄色後圓實ヲ結フ熟メ老褐色。附全花

郭大圖

第八種

コンハルラリア。ビホリア。畢

テウーブラーダク。タルコロイド、蘭

エーニブラードト 鐸氏

按林氏本条ヲ六綱一目ノ「コンハルリア」ノ属トシ其第八種ニ列ス。花瓣數不  
 同レバ。宜別属トナスベキモノタリ。姑クソノ名ヲ假テ別テコ、ニ列ス。




(四四) ホザキノイカリサウ

淫羊藿

伏牛科

傳云漢種或云江州ニ産ス。草狀啓蒙詳之。春新莖ヲ抽キ梢ニ於テ二枝或三枝ニ分レ。扱ト共ニ一梗ヲ出シ疎總ヲナシテ花アリ。ソノ本ナルハ一莖ニ三花末ニ至ツテハ各垂一花碎小僅ニ二三分。四葉ノ麥粒狀ノ苞アリ。花放ケハ即脱ス。花四瓣卵圓ニノ尖リ白色四密槽アリ。薄ノカ、へ色黄大。殆ト花瓣ニ超ユ。子室角様柱頭長ク。四雄葇園之。葇長ノ略莖ト齊クソノ披開スルヤ。三片トナリ。二ハ翻上シテ黄粉ヲ吐キ一ハ莖上ニツイテ粉ナク。又莖ノ如キ用ヲナス。其状大ニ他花ノ葇ト異ニノイカリサウノ葇ト一般趣ヲ同フス。 附一全花 二雄葇 共郭大圖

第一種  
エヒノヂユム。 アルピヌム、羅 阿尔ピス。モイルチースブルーム、蘭



HOZAKI-NO-IKARISŌ.  
ACIRANTHUS SAGITTATUS SLEB.  
(BERBERIDACEAE.)

(44)

四十五

四十五

四十五

四十五

四十五 イカリサウ


淫羊藿一種

〔伏牛科〕

草狀前条ト同ノ稍矮小ニノ軟弱。往々凌冬ノ種アレ。多ハ凋テ宿根ス。花枝葉枝ノ間ニ出ズソノ下邊ニアリ。花ヲ綴ルノ數少ノ穗狀ヲナサズ。苞同様ナレ。花大ニノ形亦異ナリ。ソノ開ヤ。下ニ向ヒ心藏狀ニノ尖タル四瓣上ニ被ヒ。瓣下ニ四嘴アリ。嘴モト漏斗狀ニ。ソノ四口相聚テ花體ヲナシ。筒外ヲサレ勾リテ趾ヲナス。ソノ狀恰モ錨兒ノ如ク然リ。口内ノ上縁各一雄蕊アツテ下垂ス。莖短ク葯大ニ長シ。披開三分シ黄粉ヲ吐ニ至テハ。一斥。莖ノ用ヲナスカ如キ。漢種ノ葯トソノ趣一般ナリ。子室角狀。按ニ此種花形漢種ト異レトモ。趾即蜜槽ニ。漢種ノ蜜槽ノナルニ同ク。雄蕊葯所歸一様ナレバ。ソノ同属異種ノ妙巧實ニ一奇トス。花色ニ白ト淡紅紫ノ二種アリ又葉尖岐シテニニヲナスアリ。附蜜槽並雄蕊郭大圖

(45)

IKARISŌ.  
EPIMEDIUM MACRANTHUM  
MORR. ET DEC.  
(BERBERIDACEAE.)



(46) BAIKUWA-IKARISO  
ACERANTHUS DIPHYLLUS M ET D.  
(BERBERIDACEAE.)

卷之二

四綱一目

四十七

平林莊藏



〔四六〕 バイクワイカリサウ  
産處不詳或云薩州ニ自生アリ。草略イカリサウト同フノ小。高尺許ニ不過一枝ニ  
葉ニ不起花頭ノツキ方イカリサウノ如クナレトモ形小ニノ白色微ク梅花ノ態  
アリ。蜜槽ノ形<sup>オタマキ</sup>斗葉ノ蜜槽ノ如ク嘴ナク。兩蓋花心ニアルヲ漢種ニ於カ如ク  
反翻スルヲ亦同シ。ス草状相似テ一枝ニ三葉ヲツケ花形略同ノ淡紅色ナルアリ。  
別ニ一種ニノ本条ノ花色異ナルモノニアラズ。附雄蕊郭大圖

按種名未詳

〔伏牛科〕

卷之二

四綱一目

平林莊藏

(47) CHA-RAN.  
 CHLORANTHUS INCONSPICUUS SWARTZ.  
 (CHLORANTHACEAE.)



四十八

草木生

〔四七〕チャラン

金粟蘭

〔金粟蘭科〕

葉生亦枝ヲ分チ高二三尺。莖細ク節膨起シ。婀娜トシテ直立シガタシ。葉茶葉ニ似テ對生シ鋸齒鈍ニメ少ク背ニ反ス。每葉針狀ノ托葉アリ。莖葉深綠色。此品暖國産ニメ微畏寒。故ニ暖室ニ栽レバ冬猶蒼翠可見。夏枝梢ニ寸許ノ花莖ヲ出シ四五重ヲ對シ。每重黃綠色粟狀粒ヲ穗樣ニ綴ル。花體頗ル奇ニメ略及巳ノ花ノ如ク。瑛樣ニメ三指ヲ屈スルノ狀ノ如ク。莖ニ向ツテ著ク。腔内四雄葯アリ淡褐色ニメ白粉ヲ吐ク。葶殆。軸圓。實礎ソノ牀上内側ニ立チ。亦軸圓。頭ニ茶褐色ノ疣瘡ヲナス。莖上向外ノ餘地ハ。即瑛體安之ノ處トス。花佳香アツテ可愛。

- 一 花背
  - 二 花腹
  - 三 實礎并葶
- 共郭大圖

所属未考

(48) FUTARI-SHIDZUKA.  
 CHLORANTHUS SERRATUS R. ET SCH.  
 (CHLORANTHACEAE.)



本草綱目卷之四十九

四十九

平木生

卷之二

四十一

本草綱目

(四八) フタリシヅカ 及巳


(金粟蘭科)

形状啓蒙ニ説可見。莖頂穂ヲナシ細花ヲ互生點綴ス。花白色球様殆指ヲ屈スル字ノ如クノ莖ニ向テ居ス。萼ハ的指スベキノ形ナク。只實礎ノ片側一稜ヲナス處ニ著ク。實礎柯子狀頸繞折裂ス。四雄蕊洞中ニ立チ。短莖長葯色黃褐ニシテ白粉ヲ吐ク。其狀頗ル奇也。一種根際ヨリ枝ヲ出スモノアリ。葉花ニアツテハ異狀ナシ

- 一 全花
- 二 實礎并萼 共郭大圖

按金粟蘭ト屬ヲ同スルモノ乎

(49) HITORI SIDZUKA.  
 CHLORANTHUS JAPONICUS.  
 (CHLORANTHACEAE.)



五十  
 平林生載

卷之二  
 四十一

(四九) ヒトリシヅカ 銀線草


(合嬰蘭科)

草及巴チヂマニ似テ稍小。高七八寸ニノ亦二三節アリ。莖頂四葉近ク相對シ。光澤アリ。莖ニ紫色ヲ帶フ。春中心一小莖ヲ出肥者ハ二三莖ニ及フモホアリ。二寸許。細花ヲ對綴シ。一寸許ノ穂ヲナス。實礎柯子状頭菌様ニシテ白色。花瓣ナク直ニ蒂ニツキ。雄蕊三莖糸ノ如クノ白色。長二分許形三齒爬ノ如ク。實礎外面ノ下側ニ著キ。兩側ノ二莖ハ下邊ニ黃葯アリ。中位ノ一莖ニハ葯ナシ。フタリシヅカノ花形トハ大ニ不同レトモ。實ハ頗ル同形ヲナシ内ニ一子ヲ蓄フ

- 一 實礎
  - 二 兩蕊
  - 三 伏蕊見葯
- 共郭大圖

按三綱一目ニ可收品ナレトモ。草形葉状フタリシヅカノ類ニ外ナラザルヲ以テ。姑ク列其下

MIDZU-TORANOWO.  
DYSOPHYLLA JAPONICA  
MIQ.  
(LABIATAE.)



卷之三

四十一

五十一

平木生

卷之三

四十一

五十一

(五十一) ミツトラノヲ


溝瀆水邊ニ生ス。莖高大低一尺。葉長三四寸幅二三分四葉對生細鋸齒アリ。葉腋細枝ヲ分チ梢頭細花ヲ簇生シ長寸餘ノ花穗ヲナス。萼鐘狀五裂花亦鐘狀一ノ四裂四雄蕊長ク瓣外ニ立チ。蕊ノ中間ニ多ノ纖毛アリ。葯白色。實礎一柱ニ頭ニ裂。長雄蕊ニ比スレバ微短。瓣蕊共ニ淡紅紫色ニ美ナリ。ソノ形頗ルトラノオ類ノ如クノ小ナリ。故ニミツトラノオノ名アリ。莖溝道アツテ四稜ヲナシ。穗ニ至テモ猶然リ。每稜三花ヲ簇列ス。ソノ萼ニ對シテヒソ如キ小葉五片ニ列ニ並ヒ。内ナルモノニ小。外ナルモノニ大。正中ナルモノ尤大也。ソノ色萼ト共ニ淡緑ニモ茸アリ。 附全花郭大圖

所属未考

小葉

五十一

(51) MIDZU-YUKINOSHITA.  
LUDWIGIA OVALIS MIQ.  
(ONAGRACEAE.)



(五二) ミツユキノシタ  
池澤水邊ニ生シ。莖塌地節々鬚根ヲ下シ。又枝ヲ出シ。蔓延水上ニテク。葉互生。橢圓  
倒蛋形ニシテ本漸殺ク。淡緑ニシテ紅色ヲ帶莖最多シ。初秋毎梢葉腋ニ一花アリ。萼鐘  
樣卵圓四縱道アツテ殆鈍方。即裸子室ニシテ頭四尖瓣ヲナシ。別ニ花瓣ナク。色淡黄  
綠。子室頭四起ニシテ中心一柱結頭アリ。雄蕊四莖。四ノ黄葯集ツテ柱頭ヲ擁ス。蒂下  
別ニ二尖アル小萼アリ。子室四區ニシテ多ノ細扁子ヲ収ム

- 一 全花    二 雌蕊立子室上    三 半熟實    共郭大圖

所属未詳



(52) HISHI.  
TRAPA BISPINOSA ROXB.  
(ONAGRACEAE)



和名 鱒魚菜

三十三 和名 鱒魚菜

卷之二 (四十一)

三十三 和名 鱒魚菜

(五二) ヒシ 菱  
 形状衆所皆知。吾郷邊所在大小二種アリ。大者コレヲヲニピシト稱ス。葉扁尖ク。鋸齒アリ。萼鐘様披針狀四片。花擔圓四瓣白色。衰後淡紅微暈ヲ見ル。實礎柯子狀一柱結頭四雄蕊ニノ黄蕊。實礎ヲ圍テ邊縁剪裁アル黄色ノ蜜槽アリ。小者草梢小ノ葉尖銳鋸齒亦銳ル。生殖諸部同様ナレ。花辦缺ノ尖ル。實熟ノ頗ル大小アリ。附兩蓋弁蜜槽部大圖

トラパ。ナタンス 羅  
 ズムメンデ。ワーテルノート 蘭

(53) HIME-BISHI.  
TRAPA BISPINOSA ROXB. VAR. INCISA.  
(ONAGRACEAE.)



五十四

平水科

卷之二

(四)

平水科

(五三) ヒメビシ

説載上条下

(柳葉科)

(54) TSURU-ABIDŌSHI.  
MITCHELLA UNDULATA S. ET Z.  
(RUBIACEAE.)

蒂並雌蕊郭大圖



卷之二  
四編一頁  
五十五  
平林生藏

卷之二  
四編一頁

(五四) ツルアリドホシ

(茜草科)

山原地ニ塌シテ生シ。處々根ヲ出ス。葉大ニ三分心藏狀ニメ對生シ。一二枚ヲ分チ。各頭ニ花並蒂シ。每蒂四尖。花筒様ニメ五裂白色。筒ニ微紅暈アリ。實礎蒂ニ藏レ。一柱頭四裂白色。雄蕊四ニメ葯褐色。花後圓實ヲ結フ色赤

所属未考


(五五) ヒヤクブヌホドツラ

百部

(土茯苓科)

特生蔓様ノ二種アリ。共ニ同一類ニメ。特生ナルハ莖高二尺許。形圓尖ニメ三縱道アル四葉。或三葉ヲ對生スル。十餘層。下邊ノ三四層間ノ葉ニハ。ソノ面ノ中筋ノ上ニ五七分ノ細梗ヲ出シ。一二花ヲ著ク。無萼四瓣披針狀。色淡緑ニメ紫暈アリ。雄蕊亦四瓣。略同形ニメ稍細ク。尖淡緑本暗紫色。裏面ノ半腹ヨリ下ニ。二ノ長クメ白粉アル葯狀アリ。葯ノ上ニ淡綠色ノ細長鱗片アリ。四瓣蕊コノ片ヲ以テ相併接スルガ如シ。蔓様種ニアツテハ此併接ヲ去ベカラス實礎卵圓柱ナク。只頂ニ一細尖点アツテ。ソノ本ニ黃褐粉ヲツク。又一種孳生ニメ葉狹小ナルアリ 附實礎郭大圖

所属未考



卷之二

四十一頁

五十六

平林在

56) TSURU-HIYAKUBU.  
 ROXBURGHIA JAPONICA BL.  
 (SMILACEAE.)



五十七

卷之二

四十一

平本

(五六) ツルヒヤクブ

蔓生百部

〔玉茯苓科〕

蔓様ナルハ。長二三尺微々延纏ノ態アリ。二葉或三葉對生シ。形卵圓披針狀ニシテ  
 柄亦三縱道アリ。四五層ヨリ上ニ。葉心花梗ヲ出ス。特生品ノ梗ヨリ長ク。一花或ハ  
 二花ヲ著ク。形略同ケレトモ。瓣細メ尖リ。雄蕊亦瓣様ニシテ長ク。尤尖銳。葯鱗片。實礎。共  
 ニ特生品ト同様ニシテ亦柱ナク。頂ニ少許ノ毳毛集結スルヲ見ル。二種共ニ塊根ニ  
 メ。略天門冬ノ根ノ如シ。 附全莖郭大圖

(五七) ビンボウカヅラ 又 ヤブカラシ


烏欒母 (葡萄科)

啓蒙草狀ヲ説可見。夏葉腋或葉柄ニ對シテ花莖ヲ出ス。長二三寸。上三垂ヲナシ。各房狀ニ又分レ細花ヲ點綴ス。無萼四瓣ニノ反捲シ。形圓長ニノ大。色淡綠。抹黃亦色邊縁ニ四ノ微刻缺アリ。四雄蕊沿之テ立。黃蕊ヲ開ク。葶即實礎ニノ。一柱短粗ニノ黄色。尋テ瓣蕊共ニ落。葶上牀柱ヲ留ム。此花一齊ニ不開。故ニ實熟シテ未開ノ花尚存ス。 附全花郭大圖

ヒチス。ヤホニカ 春氏

(57)

BINBŌ-KADZURA,  
YABUKARASHI.  
VITIS PENTAPHYLLA TH.  
(AMPELIDEAE.)



五十八



雌蕊郭大圖

雄蕊郭大圖

KAYENSŌ.  
 MANETTIA CORDIFOLIA MART.  
 (RUBIACEAE.)

(五八) クハエンサウ

(茜草科)

嘉永年間舶來クハエンサウハ花戸所命ト云。蔓蔓延イヨカヅラノ如ク。葉圓  
 ノ尖リテ對生。略女青ノ如クシテ柄短殆無カ如ク。葉腋多ク枝ヲ出シ夏秋ノ際花  
 梗ヲ出長寸許。花筒様四裂紅色。恰モ葛蘿ノ如ナレトモ。色微ク淡ク。形差大ニノ瓣  
 尖反捲シ。又葛蘿ノ五裂ナルト不同。實礎半萼ニ藏シ。頭扁圓ニメ一道アリ。一柱結  
 頭纒ニ二裂シ。色黄緑。四雄蕊筒ニ著キ。喉ニ至テ離レテ花外ニ立。葯暗紫ニノ白粉  
 フ吐。萼鐘状ニノ四葉。各葉間又各鱗様ノ細片アリ。

所属未詳

DIGYNIA

猪殃々

茜草科

(五九) ヤハムクラ  
昔ク藪澤陰地路傍ニ生シ。塌地蔓延數尺。葉柳葉狀ニ小。七八五六輪。層ナシ。每層細枝ヲ對生シ枝上又葉ヲ輻次シ。葉腋梗ヲ對生シ花アリ。花細小輪樣ニ四裂。殆四瓣ノ如ク裸子室ノ上ニアリ。子室ハ二圓體併接シテ二柱アリ。雄蕊四ニノ黃藹。莖線稜アツテ方後上細刺毛アリ。葉背中筋子室等皆然リ。故ニヨク衣服ニ鈎著レテ不脱。雜草中尤可賤ノ品タリ。 附全花郭大圖

第三三種  
カリユム。アハリ子、羅 ケレーフコロイド、蘭

按春氏ハ第六種カリユム。ユリキノス。ハヲ以テ本条トス。今林氏ノ所說ヲ闕スルニ不的當。或有說姑存疑。又云林氏カリユムノ類ヲ一目ニ收ム阿須氏所圖已ニ二柱トス。故ニ目ノ下ニハル。

(59) YAYE-MUGURA.  
GALIUM APARINE L.  
(RUBIACEAE.)





(60) KIKU-MUGURA.  
 GALIUM TRIFLORUM MICHX.  
 (RUBIACEAE.)



六十一



卷之二

四十一


平

(六十) キクムグラ ヒメムグラ 猪殃々一種 (茜草科)  
 全形ムグラノ如ナレド。莖短ク初ニ塌地テ擡頭シ。長一二尺ニ不塌。ラヨリ濶短ニシテ軟。下層大抵五葉末ニ至ツテ六葉。花梗ヲ出ス。子室花形蓋數亦同シケレドモ。花稍大ニメ子室及テ小。刺毛不剛シテ短。莖葉ニ在ツテハ全ク毛ナシ。  
 一 全花 二 子室并雌蕊 三 半熟實 共郭大圖

(61) YOTSUBA-MUGURA.  
 GALIUM POGONANTHUM FR. ET SAV.  
 (RUBIACEAE.)

卷之二  
 四十一

六十二



卷之二  
 四十一

(六一) ヨツバムグラ


(茜草科)

細莖地ニ塌テ生シ。莖方葉楕圓ニノ尖。大サ二三分。四葉輻次シテ層ヲナシ。葉ニ毛ナク。梢頭枝梢分叉一分許ノ細花ヲツク。四裂淡黄白色。形ヒメムグラト同シ。實圓ノ毛ナレ。此種秋ニ至テ盛ニ花アリ。 附一 全花 二 半熟實

共郭大圖

アハリ子。キアドリホリア。ミノル 物印滿氏

(62) HOSOBANA-YOTSUBA-MUGURA.  
 GALIUM TRIFIDUM L.  
 (RUBIACEAE.)



六十三

六十三

卷之二

四三三

(六二) ホソバナノヨツバムグラ

(茜草科)

上条ノ一種ニシテ葉倒蛋形ニシテ細ク。方莖微ク糙澁アリ。花大サ略上条ノ如ク。裂白色。二柱三雄蕊。實形上条ニ同ク又毛ナシ。此種亦秋盛花アリ。附全花郭大圖

(六三) アカ子 茜草

(茜草科)

啓蒙所說形狀可見。葉卵圓ニメ尖リ長柄アリ。花輪様四出亦卵圓ニメ尖リ淡黃白色。實礎ニ顆併接ニ柱並立シ各々結頭アリ。雄蕊四ニメ黃蕊。一種葉潤短心藏狀ニメ柄長ク花五裂五雄蕊ナルアリ。共ニ圓實ヲ結ビ熟シテ黑色

第五種

ルビア。コルギリホリア、羅ハルトホルミゲ。カラッペ 蘭 春氏 所定

按アカ子ハルビアノ正當品ナラザレドモ。葉形略同ク莖ニ刺毛アツテ根ヲ採テ赤色ノ染料トナス等ノ一全ク同ケレバ。ソノ屬タルニ論ナク。又林氏ノ第四種ハ花五裂トス。今アカ子亦五裂花ノ一種アリ。春氏ソノ第五種ヲ擧テ直ニ茜草ノ名ヲ下ス。林氏ヲ閱スルニ一二可議ノ不同アツテ的當トシガタケレドモ。ソノ屬ニ外ナラザルヲ可見。又云林氏ルビアヲ一柱ニ裂ニ結頭アルノ品トシ四綱一目ニ收レドモ。余ハ之ヲ二目トス。此類花様類ニ亦アリ可併見

(63) AKANE.  
RUBIA CORDIFOLIA L. VAR. FORMA.  
(RUBIACEAE.)



金花一倍圖

(64) MARBA-AKANE.  
 RUBIA CORDIFOLIA L. VAR.  
 (RUBIACEAE)



卷之二  
 四十一

六十五

巨木

卷之二  
 四十一

(六四) マルバアカ子

附全花并實礎二柱郭大圖

説載前条下

(茜草科)

平林

(65) KURUMABA-SŌ.  
 ASPERULA ODORATA L.  
 (RUBIACEAE.)



卷之二  
 四十一

(六五) クルマバサウ

(茜草科)

根地中ニハフテ處々ニ芽ヲ出ス。莖方ニノ直立五七寸。葉ムクラノ如ク六七片。幅次スルヲ數層。梢頭分又シテ花ヲ綴ル漏斗狀ニノ四裂大サ二分許。實礎蓋狀ムク。ラト同シク。花後實ヲ成スヲ亦同フシテ刺毛アリ。然レトモ莖葉ニ於テハ絶毛ナシ。

按葉形<sup>ムクラ</sup>殊々ニ似タレドモ莖直立ニノ無毛。只實ニ於テ刺毛アルノ狀大ニ下条ノ二種ニ近シ。

六十六

六十六

(六六) キヌタサウ 特生茜草

(茜草科)



深山ニ生シ。行根長ク地中ニ蔓延シテ芽ヲ出ス。方莖一二尺。披針狀ニシテ無柄ノ四葉相對スル。蔓生茜草ノ如クニノ四五層。每節微ク隆起ス。夏莖端及ヒ梢葉腋ニ細枝ヲ出シ多ク分叉シ花ヲ綴ル。輪様四裂白色。形猪殃々ノ花ノ如ク。實礎裸ニシテ二箇併接シテ二柱。柱下白色密腺アリ。雄蕊四ニシテ葯點褐色白粉ヲ吐ク。此種全形茜草ノ態アリテ根亦赤ケレドモ刺毛ハ絶テナシ。又産地ニヨツテ葉狭細ナルモノ。濶短圓頭ナルモノ等アリ。 附一 全花 二 實礎并柱 共郭大圖

第十九種

カリユム。ポレア<sup>レ</sup>ノールドス。ワルストロー 蘭 印葉圖 可併證

按此品又エッヘン。スピツブラーヂケ。ヘルドカラ<sup>レ</sup>ペノ名アリテ根ヲ採テ漆科ノ用トナス。カラ<sup>レ</sup>ハ茜草類ノ屬名ニ係ル

(66) KINUTA-SŌ.  
GALIUM BOREALE L. VAR. LATIFOLIUM TURCZ.  
(RUBIACEAE.)



〔六七〕オホキ又タサウ

〔茜草科〕

伊吹山上多く自生シ。全形前条ニ相似テ稍大ニシ。一窠ニ多く簇生シ莖ニ微糙沙アリ。又葉ニ短柄アツテ花五裂雄蕊亦五ノ異アレ。葉状實形ソノ種ニ外ナラズ。根色亦赤クノ即「カリユム。ホレアレ」ノ一種タル「昭々タリ」 附一 全花

二 實礎并柱郭大圖

(87)

Ō-KINUTA SŌ.  
RUBIA CHINENSIS REEGL.  
(RUBIACEAE)



本草綱目

四十一

六十八

本草綱目



(68) KAWARA MATSUBA.  
 GALIUM VERUM L.  
 (RUBIACEAE)

本草綱目

六十九  
 平林在藏



卷之二  
 四十一

〔茜草科〕  
 蓬子菜

葉大低一層八片。花披針狀四瓣外反。實礎圓長二顆併接。二柱併出分岐各結頭。雄蕊四。ノ黄葯。近道所在ノモノハ花白色微黄ヲ帶ヒ伊吹山上ニハ黄色差深キモノアリ。日光山所産ノモノハ高終五六寸。近道ノモノハ二尺ニ及フ。功用林氏詳シ。 附全花實礎柱等一倍圖

第十一種  
 カリユム。ヘルム 羅  
 ヲプレクト。ワルストロー 蘭

(69) NEKONOME.  
 CHRYSOSPLENIUM MACROCARPUM CHAM.  
 SAXIFRAGACEAE.)



本草綱目

卷之二

七

本草綱目

卷之二

本草綱目

本草綱目

(六九) 子コノメ

猫兒眼睛草

(虎耳草科)

水中或ハ湿沔ノ處ニ生ス。初生ノ葉ハ圓ノ石胡荽葉ノ如ク。莖塌地處々鬚根ヲ下  
 レ萌芽ヲ分チ春ニ至テ高五六寸。柔軟多液。楞條アツテ稍方。葉ヲ對生ス大サ三四  
 分。楕圓ニノ圓頭齒アリテ淡綠色。正二月ノ際莖頂ニ枚ニ分レ。每枝又又レ每頭三  
 花ヲ並ブ。每花一小葉アツテ承之。又心又別ニ一花ヲツク。花瓣扁圓大小四出淡黃  
 綠色ニノ無萼。或見テ萼トシ無花各瓣内深黃色ノ葯アリ。子室柯子狀ニノ差扁。二  
 箇並接シニ尖頭外ニ反シ。内ニ細子ヲ収ム。ソノ莖頂並花ノ形。略澤漆ノ如クナレ  
 トモ。花形莖狀不同。又莖葉ヲ切テ白汁ヲ出ス。亦ナクノ味苦シ。附一 全花稍  
 老者 二 雌莖亦稍老者 共郭大圖  
 所屬未詳

(70) HANA-IKARI.  
 HALENIA SIBIRICA BORKH.  
 (GENTIANACEAE)



(七十) ハナイカリ

(龍膽科)

北地高山駒ヶ嶽白山等ニ生ス。莖稜條アツチ方高尺許。葉對生形圓尖三縱道アツ  
 テ恰モ百部根葉ノ如ノ小。秋每葉腋一花ヲ出ス。梗四五分萼披針狀ニノ四片。花體  
 短筒様ニノ四裂體下四距ニ分レ色淡黃白。略イカリサウノ態アリ。子室長角頭總  
 ニ哆キ。四雄蕊筒ニ出葯黃褐色。附兩莖一倍圖

按可屬未詳

(71) TSURUMURASAKI.  
BASELLA RUBRA L.  
(CHENOPODIACEAE.)



本草綱目

卷之二

十一

早林在哉

第三日  
三葉草

TRIGYNIA

卷之二

四葉草

(七一) ツルムラサキ 落葵 此種収五綱三目下爲正誤入于此 (落葵科)

啓蒙略草狀ヲ記ス可見。葉腋枝ヲ出シ無梗無萼ノ花ヲ踈ニ穂狀ニ著ク。其花初メ白色ノ細點ニメ微々紅暈ヲ帯ビ。漸々豐長殆ト麥粒ノ半ニ至リ紅色亦加ル。外ニ瓣ニ分ル。外者四裂内者三裂シ肥厚ニメ密閉ス。盛花ノ際ニ至テ瓣尖少ク哆キ中心黃蕊ノ一端ヲ見ル。剖視スルニ實礎圓大ニメ三柱五雄莢莖ニメアリヲ黃花老テ瓣不脱膨脹遂ニ實形ヲナシ。色漸ク緑ニ變シ尖ニ一紅點ヲ餘ス。熟スルニ至テ全深紫色トナリ汁ヲ搾ツテ紫色ヲ染ルノ用トス。内ニ一核アリ。又初メ花點下ニ如萼一點アリ。長ニ至テ葉狀トナル。故ニ一花必ス一葉アリ。又肉眼繞ニ見得ルホドノ二細點アツテ葉ヲ夾ム。花長ノソノ點長セズ後微黃色ヲ帯フ。蓋シ一種ノ萼ト云ベキモノ、如シ。又近來一種大葉ノ品アリ傳云フ海外種ト附全花并兩

第一種  
バヒルラ。ルムブラ 羅  
ローデ。メーキーリム、蘭

第四日

四維五

TETRAGYNIA

(七二) ヒルムシロ 眼子菜



〔眼子菜科〕

根水底ニアツテ莖葉水面ニ浮フ。葉匙狀稍ヤ竹葉ニ似テ潤短深綠色ニ滑澤光アリ。葉背莖柄等ハ淡黃綠ニ帶褐色。地ノ肥瘠ニヨツテ葉ノ大小長短不一。ミナ長柄アツテ互生或ハ對生。柄本必棒アツテ包之。夏葉腋或ハ柄ニ對レテ花莖ヲ出ス長二三寸。頭ニ多花穗狀ニ綴テ殆筆頭菜ノ如シ。花ハ四片ノ萼ニノ無瓣形扁圓ニノ柄アツテヒノ如ク。實稜麥粒狀頭平ニノ粟起レ色茶褐。大抵二顆或三ノ者亦アリ圍之テ八箇ノ雄蕊葯連列ス。檢之ニ箇ツ、併接レ至短ノ莖アツテ牀ニツク。ソノ二箇ノ中間ヲ穿テ萼ノ柄出テ葯ノ莖ニ接メ共ニ牀ニ根ス。其狀尤奇ニノ此類ノ外未、如是ヲ見ス。葯淡黃白色綻テ黃綠白粉ヲ吐ク。後實ヲ結ブ大サ櫻ノ如ノ扁圓ニノ有稜。老茶褐色ニノ光アリ。時ニ萼猶存ス。附 一 全花 二 示萼出葯間 三 實

礎共郭大圖 按本条四柱ヲ必トセザレトモ此類大抵四柱。故從林氏例収于此

第一種 第一種 第一種  
ホタモゲトン。ナタンス、羅 ロンドブラーダグ。ホントインコロイト、蘭

(72) HIRU-MUSHIRO. POTAMOGETON NATANS L. (NAIADACEAE.)



平林在藏

四編四目

七二

平林在藏


(七三) イトモ 又ミヅヒキモ 眼子菜一種

(眼子菜科)

溝瀆止水ノ中ニ生シ。莖纖細糸ノ如クメ長ク。葉無柄披長幅一分ニ不足長三五寸。木本類ノ葉ノ如クメ互生シ。水ニ沿フテ浮泳ス。故ニ邦俗イトモ或ハミヅヒキモノ名ヲ稱ス。春晚夏初ニ至ツテ。莖頭處々ニ別ニ長一寸許。幅二三分ノ披針狀ノ數葉ヲ出ス。形質眼子菜ノ葉ノ如ク。光澤アツテ色暗淡緑ニ背微褐ヲ帶ヒ。ソノ葉間ヨリ花ヲ出ス。形亦眼子菜ノ花ノ如クシテ稍小ナレ。花体ニ於テハ全ク同ノ子室多クハ四顯ナルノミ。實形亦同シ。

按「ホタモケト」ノ屬ニ可收種名未詳

(73) ITOMO,  
MIDZUHIKIMO.  
POTAMOGETON HYBRIDUS MICHX.  
(NALADACEAE.)



(七四) サ、モ ヤナギモ 互生對生二種 馬藻


(眼子菜科)

小河細流ノ中ニ生シ。流ニ從テ長ク數尺ニ及ブ。莖細ノ扁葉對生互生ノ二種アリ。對生ナル者。狹長四五寸幅二三分。互生スル者長二三寸ニノ鈍頭。共ニ夏月葉間ヨリ二寸許ノ扁莖ヲ出シ頂ニ花ヲ擧テ短穗狀ヲナシ。水面ニ立テ花ヲ開ク。萼四片ニノ扁圓匙様色暗淡黃綠。別ニ花瓣ナク。實礎麥粒狀四顆並立。頭楮圓菌様ニノ赭褐色。雄蕊亦四。短莖ニノ葇荑柄ノ爪ヲ挾ミ。色淡黃褐ニノ白粉ヲ吐ク。 附全花部

大圖

按下條所舉ノ「ポタモゲト」ノ一種タルニ論ナシ。且林氏下條ノ下ニ對生互生ノ二種アルヲ説ク。亦此種ト同シ

(74) SASAMO;  
YANAGIMO.  
POTAMOGETON OXYPHYLLUS MIQ.  
(NAIADACEAE.)



平林左武

七十五

平林左武

(七五) エビモ 馬藻一種

(眼子菜科)

馬藻ノ一種ニモ亦同處ニ生シ。葉形同フシテ邊縁皺縮波紋ヲナシテ互生ス。莖ス  
扁ニシテ花亦馬藻ト同シ

第五種

ポタモゲトン。シリスプム、羅 ゲリルルド。ホステインコロイド 蘭

(75) YEBIMO.  
POTAMOGETON CRISPUS L.  
(NAIADACEAE.)





草木圖說前篇卷二終

