

家傳預藥集目録

第一　凡例
第二　圓之類
第三　丹之類
第四　丸之類
第五　散之類
第六　雜方

凡例第一

湯散丸丹之註解　入門　序例
分兩之定法　家法　序例
用水之例　本綱
煉蜜之法　本綱　家法　蒙筌　集要　序例
煅煉煎煮用火之例　全書　本綱
圓丸大之定例　本綱　序例

安永戊子
己十一月日

散藥抄計之例　序例
丸散擣之法　序例
丸散節之法　序例
修合守法則之例　序例
圓之類第二
牛黄清心圓　医林指掌　大全　玉杭　大全良方　入門　医監　局方　玉杭　入門　方考
麝香圓　医林指掌　袖珍　玉杭　入門　回春　全書　全書
牛黄圓　笛
又牛黄圓　笛　正傳　明監
保童圓　出処未考
又保童圓　出処未知
又保童圓　出処未知
又保童圓　武衛方
神秘保童圓　出処未考　医監　全書

五拜保童圓　医林指掌　明監
青代黒圓　出処未考　得効方　正傳
磨積圓　大全
無比山薬圓　医林　大全　得効方
耆婆萬病圓　和劑
丁沉圓　出処未知
丁子圓　出処未知
二姜圓　大全　方考
七宝圓　出処未知
白虫圓　出処未知
同方　出処未考
脩急圓　医林　得効　正傳　方考
神仙巨勝子圓
麻仁圓　出処未考

又神仙巨勝子圓　奇効良方
金露圓　大全　明監
阿魏圓　得効方　大全　明監
又阿魏圓　出処未知
又阿魏圓　出処未考
大阿伽陀圓　出処未考
萬病解毒圓　得効方

丹之類第三

延齡丹　家方
至宝丹　医林　明監　玉機　大全　指掌
延壽反魂丹　儒門事親
延齡固本丹　四春
鳳髓丹　盛方院
千金丹　出処未考　大全

豐心丹

丸之類第四

六味丸　方考　入門　得効　本綱　全書　玉機　正傳　医監　四春
八味丸　方考　入門　得効方　明監　大全　医林
木香丸　家方
木香檳榔丸　正傳　医林　大全　方考　得効方　明監
又木香檳榔丸　家方
養胃丸　家方
自安丸　家方
潤腸丸　出処未考
又潤腸丸　正傳　指掌　医林　大全
入門　方考　医監　全書
硃砂安神丸　方考　入門　医監　四春　全書
正傳　医林　方考　正傳　明監
枳木丸　雜着　医林

滾痰丸 入門 醫林 方考 正傳 醫監 全書 大全 指掌 入門醫監 全書 田春

丁香脾積丸 大全 醫監 明監

勝紅丸 醫林 大全 醫監 明監

天童丸 校坂

秘真丸 醫林 正傳

集効丸 玉抗 醫林 正傳 室監 正傳 指掌 明監

駐車丸 大全 醫林 正傳 醫說

三黃丸 指掌 方考 醫林 入門

朱雀丸 正傳 指掌

神應丸 全啓

阿膠梅連丸 大全

木香調気丸 田春

草萱蔻丸 東垣丹溪活套 正傳 明監

安神丸 正傳 明監

瀉青丸 正傳 醫林 指掌 明監

凉驚丸 正傳

肥児丸 醫監 田春 全書

又肥児丸 得効方 醫林 指掌

脾約丸 玉機 大全 格致 正傳

化虫丸 醫林 大全 正傳 指掌

趁鞘丸 心法 方考 正傳 指掌 雜着 入門 醫監 本綱 田春 全啓

紫霜丸 指掌 醫林 正傳 明監 入門

大和丸 田春

補天大造丸 田春

補陰丸 正傳 方考 雜着

琥珀丸 醫林

又琥珀丸 醫林

健步丸　正傳　入門
神教　全書　指掌　回春
棗山藜芦丸
安虫丸　正傳　宝鑑
痩虫丸　出処未知　明鑑
良姜丸　正傳　明鑑
黄竜丸　太全　医林　明鑑
寛虫丸　出処未知
清肺丸　回春
鎮神丸　出処未知
通氣丸　出処未知
益胃丸　神教　回春
保和丸　方考　正傳　医鑑　入門
大倉丸　大全　回春
抱竜丸　正傳　明鑑　医鑑　全書

散之類弟五

正舌散　大全　得効方
安神散　入門　方考　医林　正傳
香蘇散　家方　惠德方　配剤
征虫散　家方
益中散　家方
生神散　惠德
快気散　出処未考
又快気散　出処未考
點頭散　医林
寧嗽散　医林
三稜散　出処未考
黒神散　大全　正傳　方考
清心散　医鑑　全書　明鑑　指掌

神仙散　半井方

雜方第六

屠蘇酒　禦邪代酔　冶說　下學

竜脳膏　奉生養生

千金餻子　全書

家傳預案集

醫學入門曰湯散丸丹註曰案有宜膏煎者亦有一物無宜者宜水煮酒漬者宜丸宜散者咬細含如麻豆大但古人以口咬為粗未煎之使茶水清汁飲於腹中徧行經絡易升易散今人以劒剉如麻豆大亦咬咀法也若一概為細末不分清濁矣如治至高之病加酒煎去湿加姜煎補元気加棗煎發散風寒加葱煎去膓上病加蜜煎○散者病及臟腑之氣味厚者白湯

調服気味薄者水煎和查服○丸者治下部之病其丸極大而光且圓治中焦者次之治上焦者極小綢糊麪丸者取其遲化直至下焦或酒或醋丸者取其收斂之意也犯半夏南星或去湿者以生姜汁煮糊為丸制其毒也稀糊丸者取其易化也水浸炊餅為丸及滴水為丸者又易化煉蜜丸者取其遲化而気徧經絡也蜘丸者取其難化而旋旋取効也○大抵湯者蕩也去久病者用之散者散也去急病者用之丸者緩也不能速去其病従緩而治毋即丸之大者也○凡茶宜預修合若臨病旋制衣茶多不徧其能効乎

○庠例曰按病有宜服丸者服散者服湯者服酒者服膏煎者亦無參用察病之源以為其製也

分両之定法

廣秤

宋朝司馬温公仲景ノ時分ハ皆半秤ヲ用ヒシヨリ以来廣秤ハ二十両ヲ一斤トス故道三ハ皆此廣秤也

一字　二分五厘也
一分　六朱也即二銖五分也
一両　四分ツ也即三十四朱也是十銖也
一朱　四分有奇也

又私曰引類考之

一錢　四字也即一朱也

一㕮　十六兩也即百六十朱也

一秤　十五㕮也即二貫四百目也

○序例曰古秤惟有銖兩而無分名今則以十黍為一銖六銖為一分四分成一兩十六兩為一㕮雖有孑穀秬黍之制從來均之已久正需依此用之今方家所云等分者非分兩之分謂諸菜㕮兩多少皆同爾先視病之大小輕重所須乃以意裁之凡此之類皆是丸散㕮依節度用之陽酒之中無等分也

用水之例

本綱節氣水條曰

立春清明二節貯水宜浸造諸風脾胃虛損諸丹丸散及菜酒久留不壞

寒露冬至小寒大寒四節及臘日水宜浸造滋補五臟及瘀火積聚虫毒諸丹丸并煮釀菜酒與雪水同功

庚午日午時水宜浸造瘡癬瘍金瘡百虫蠱毒諸丹丸

又井泉水集解頴曰平旦第一汲為井華水其功極廣井華水主治堪鍊諸菜右投酒醋令不

腐

新汲水條曰無時初出曰新汲發明虞博曰新汲井華水取天一真氣浮於水面用以煎補陰之劑及鍊丹者若性味同於雪水也

阿井泉條曰珍曰陸羽烹茶辨天下之水性美惡烹茶者反不知辨此豈不戾哉

煉蜜之法

本綱曰凡煉蜜一斤只得十二兩半是數若火少火過並用不得雷公同珍曰煉沙蜜每斤入水四兩銀石器內以菜柴火慢煉掠去浮沫至滴水成珠不散乃用謂之水火煉法又法以器盛置重湯中煮一日候滴水不散取用亦佳也且不傷火也○蒙筌曰入茶煉熟滴水成珠○集要曰生山谷岩崖間色白如膏者良也○序例曰用蜜皆先火煎掠去其沫令色微黃則經久不壞掠之多少隨蜜精麁○白蜜ヲ上トス黑蜜ハ劣ル黑蜜ノ中ニ善悪アリヨクく擇ヒ求ムベシ沙糖ヲ二セテ偽リ賣ル左悪シ○煉法先布ニテ蜜ヲ濾大釜碗カ菜鍋ニ入テ湯煎ニシテ子ル十リ蜜ノ又カサト

外ノ湯ノタカサト考ヘ置テ熳火ニテ煉
煉ハ悪物皆沫ニ成ル上浮ヲヘラニテ取
リ去ル沫ノ尽ル程煉テ水ニ冷メ使フ也
○至宝丹ナトニ用ルハ別メヨク煉ツメ
テヨシ石菜多キ故ニ和合シ難キ故ノ○
焼物十ト合スルハ生ニテ用ルヲモ有又煉テ
モ用ユ何レモ其時ニ随ヒ其丸丹ニヨリ相傳
次第ニ煉加減有ベシ○済世全書曰毎自蜜一斤熳
六味丸ノ方ノ後ニ
火煉滴水成珠ル方ノ入レ自水一碗即乾ル用蜜丸
攪勻和菜ニ晒ス一
俱依ル此ノ制ニ
煅煉前煮者用灰之例
本綱火部曰

菜紫火條珍曰凡一切補菜諸
膏宜此火煎之発明抱朴子云
一切仙菜不得菜煎不服菜乃
箕星之精能助菜力除風寒痺
諸痛久服終身不患風痰故也
炭火條曰主治攀炭火宜煅錬
一切金菜煙炭火宜膏煎炙
百菜丸散時珍
圓丸大之定例
本綱曰凡丸菜云如細麻者即
胡麻也不必扁也略相称尓黍
粟亦然云如太麻子者准三細
麻也如胡豆者即今青斑豆也
以二大麻准之如小豆者今赤

小豆也以三大麻准之如大豆
者以二小豆准之如梧子者以
二大豆准之如彈丸及雞子黃
者以四十梧子准之○序例同
上

散藥抄計之例

序例曰凡散藥有云刀圭者十
分方寸匕之一准如梧桐子大
也方寸匕者作匕正方一寸抄
散取不落為度錢五匕者今五
銖錢邊五字者以抄之亦令不
落為度一撮者四刀圭也十撮
為一勺十勺為一合以藥升分
之者謂藥有虛實輕重不得用
升平之藥升方作上
徑一寸下徑六分深八分內散
藥勿按抑之正爾微動令平調
爾令人分藥未復用此

丸散篩之法

序例曰凡篩丸藥用上黍蜜絹令
細於蜜丸易熟若篩散草藥用
輕踈絹於酒中服即不泥其石
藥亦細絹篩合如丸者

丸散擣之法

同曰凡篩丸散藥畢皆更合於
臼中以杵擣之數百過視其色
理和同為佳也
修合守法則之例

同月九云二一兩一分一銖者正
用今絲綿秤也勿得將四銖為
二一分有誤必所損無傷菜力也
○九云散只作散丸只作丸或
酒煮或用醋或乳煎一如法則
○九云修事諸菜物等一一乞並
須專心勿令交雜或先熬後煮
或先煮後熬不得改移一依法
則也○九修合丸菜用密和用
蜜用餳止用餳用糖秫用糖勿
交雜用必宜瀉入也

圓之類第二

牛黄清心圓○医林曰治諸風
緩縱不隨語言蹇渋痰涎壅盛
心怔健忘或発癲狂並皆治之
○医書大全同上○玉機治論大半同上略
同上○明監出処
之発明云九用丹剤者為凡入
骨髄不能得出故用竜麝牛雄
珀珠金皆入骨髄透肌膚之剤
使風邪得以外出也若中血脉
中腑之病初不宜用竜鹿麝牛黄
恐引風入骨髄如油入麪莫之
能出若中臓痰涎昏冒煩熱者
宜用之下痰鎮墜清神○指掌
中経脉圖曰汗吐下後初症既
定宜大茶養之同方後曰諸風
癱瘓語渋心怔忡恍惚眩暈煩

癇延壅精神皆憒○局方曰治心氣不足神志不定驚恐顛狂語言譫妄虛煩少睡甚至棄衣而走登高而歌踰垣上屋等証○正傳出處同上○入門曰治諸風緩縱語言蹇澁怔忡健忘喜怒無常悲憂少睡頭自眩胸中煩癇痰涎壅塞精神皆憒顛狂乃通關透肌骨之劑也○醫鑑曰專治男婦諸風緩縱不隨語言蹇澁洪頭自眩暈胸中煩癇痰涎壅盛率然倒仆口眼相引手足挛搐脊背強直口吐涎沫或心下怔忡健忘顛狂痫病言語錯乱神不守舍或歌或哭或痴或呆忽如見鬼或驚悸恐怔心神恍惚夢寐不安虛煩少睡喜怒無時悲憂慘慼或積熱吐血肾蓄勞病及小兒五痫天吊急慢驚風潮熱發搐頭目仰視或発瘖瘂痰疹癇結不出驚過皆遂一切怪病並宜服之○中風虛証寒熱共用○中風癲痫之氣付也○諸病無分別時用之通治之方也醫鑑通治門載之正傳癲狂門載之余皆見于中風門

○心ウキくトメム十サワキニ上気ス

○物ニセイ尽テ退屈スル二用ユ

三剤分　牛黄清心圓家傳

羚未三分　参焙　曲炒
蒲炒各七分五分　匿焙　鞘焙　柴
圓焙各三分七分五厘　屏焙　伽焙
餘焙　文　靭酒ニ浸各五分
雄水飛二分四分　預焙二十一分　犀末六分
永炮各二分五厘　黄卷焙五分二分五厘去豆用芽
官　膠炒各五分二分五厘　芎煙一分五分
以上二十三味　脳另研　麝另研各三分
牛三分六分　今入前末内　東去皮乾十分五分
今入前末内　愛去心四分五分　徳去皮尖三分七分五厘
金箔四十五枚　合テ三十味也

○諸書本方之修合之法器之
○家傳修合之法曰脳麝
東麦徳　金箔煉蜜研調テ
而後入抹茶和匀呑白拌之
○煉法先乳鉢ニ蜜少入麝研次
脳ヲ入レ蜜少ク加ヘ能研合次牛
黄ヲ入テ末茶ニ入ノ之也次ニ金箔ヲ
一牧ツヽ入レ研合スル

蘇香圓　本名蘇合香丸今忌四字銘故号ニ蘇香圓一也
○医林ニ曰ク專能順ニ気化ニ痰并治ス傳屍骨蒸諸煩労祭卒暴心痛鬼魅癖癚赤白下痢小児驚搐等証並宜ニ服之一○明監出処上同○袖珍正傳並出処局方治ニ気中ニ気卒暴気逆心痛鬼魅悪気按此手

足太陽足陽明手足太陰足三陰菜也○入ニ門ニ曰厥初昏時蘇合香丸灌ニ一鍾一注ニ曰老人小児酒化下一丸凡痰気及中風痰涎壅上喉中有ニ塩不一能下者合ニ青州白丸子一同ニ姜汁一化下立効中風如ニ見鬼神一者白湯下脚気衝心用ニ蕳麻和一丸搗爛貼ニ脚心一疼痛立止心腹絞痛卒痛中滿嘔吐姜湯下ニ風嗽嗽姜葱汁煎治傳尸骨蒸肺癆痃癖凡ニ尸厥時気

宜以
乃主之○不事云飛尸者
遊走皮膚穿腠脉每發刺痛變
作無常遯尸者附骨入肉攻鑿
血脉每發不可得近見尸喪聞
哀哭便發風尸者漾濯四肢不
知痛之所在每發昏沉得風雪
便作沉尸者纏骨結臟衝心脇

下小兒用緋袋盛當
一切邪鬼不敢近○方
傳疰門曰古称尸疰有
遯尸風尸沉尸注尸也

每發絞切遇寒冷便發注尸者
舉身沉重精神錯雜常覺昏癈
每節気至輒變大惡是方也香
能辟邪惡故用沉且腦麝安息
薫陸蘇油青木香附温能壮胃
気故用蕳発丁香硃能辟鬼魅
故用硃砂并能守中気故用白
木酸能致津液故用訶梨犀能
主畏疰故用生犀互考見中風

門曰病人初中風喉

叫腦摩之也醫者仍不
「救」急慎毋令人多服也○
指掌曰中気者厥逆身冷脉沉
伏勿作中風治藿香合丸一灌
醒然後調治続用烏薬順気散
或八味順気散同方後曰順気
化痰祛邪辟瘴止痢定驚開関
透膈○田春治論與医林同○
全書厥証門曰尸厥飛尸卒厥
此即中悪也因犯胃不止之気
忽然手足厥冷肌膚粟起頭面

青黒精神不守或錯言妄語者
緊口噤或昏不知人頭旋暈倒
此是卒厥客忤飛尸鬼撃昏死
閙喪入廟登塚多有此病以藜
合丸灌之此論田春類中風証
亦載之

○中風中気之気付也
○月二イ気ノ滕々トシタルニ吉ヒ
○気ノ煩ハヒキ時ニモ
○産ノ時モ月二イニ用
○小児ノ驚風ニモ用

二剤分 藤香山 家傳
泉 蜜 且 攪 安息
酒 敷 膏 辰 犀 俟 残テニ分入藤油

伽訶梨勒去皮各八文　鹿茸六文另研
腦子另研　薫陸　蘇合香各四文
粉一煉一各四文

已上十五味煉蜜調

○煉法先脳子ヲ別ニ研蘇合香ヲ細布ニテコシ過シ鍋ニテ蘇油ニ蜜少シ入レ湯ヲ湧シ蘇油ヲ燒器ニ入湯ノ中ニ入レ湯蘇油ノ中ヘワキイラヌヤウニ前ツ蘇油ユルク成リタル時分右ノ殘リ置タル俟ノ粉ヲ先ツ半分程入ヘラニテ能ク研合蜜ヲモ少ツヽ入テ煉合スル也サテ器ヲ湯中ヨリ取アケサニテ後彼ノ殘リ半分ノ俟ノ粉ヲ入蜜少ツヽ入テ乳鉢ニテ研後ニ蘇油ノ煉タルト脳子ノ研タルトヲ乳鉢ニ入テ能研合蜜ヲ入ルヽ也蘇香圓ハ清心圓ヨリモ少シ丸キ加減ニ煉テ菜白ニテ拌法諸丹菜ト同シ

○牛黄圓　竹田家方半剤分

丁且泉　婆樧伽
圖屏各二分五厘　鬱一分八分
俟匿各一分二分　五厘　尼一分三分　羚羊
永辯訶　田
雄麝　安息各九分五厘　耳八分
脳各六分

右二十二味煉法与清心丸ト同シ矣

○又牛黄圓　竹田正方秘傳

寛永九正月於江戸御調合

腦吉　星麝　五靈　紅
藍實　弓　神　兵　良七分五厘
雄訶　丁　辰　蒲焙蜜
沉田　乳　參　犀　栢各一
分五厘延　胡　郵　皎　黛

右四十一味煉法同前

○保童円　本名香蟾丸也
正傳ニ曰治ニ痃ノ消ニ食積虫肉積及
治ス小兒ノ痃積食積肉積気積冷
積腹脹大ニ効鼓脊黄肌瘦泄瀉
発熱不ル能ス乳者○同剤後曰山東徳府傳
右方治ス一切諸痃ニ消ニ補平
和之剤○全書有リ加味香蟾丸
蓋菜味大半同而小異也

○小兒之萬病二吉

○家傳之分両

穀　皓　蘗　曲
茯　苓　川楝子　史
澤　瀉　伽各二　川芎
聯　翹各八分　伽各一　木
熊トキヲ糊ト合テ丸之也　無分両
蜜四分　力二ヶ

右十六味

五積餅ト矣方後曰山東徳府傳
治ス小兒痃積食積肉積気積冷
積腹脹大効鼓脊黄肌瘦泄瀉
発熱不ル能ス乳者○同剤後曰按
右方治ス一切諸痃ニ消ニ補平
和之剤○全書有リ加味香蟾丸
蓋菜味大半同而小異也

○小兒之萬病二吉

○家傳之分両

穀　皓　蘗　曲
茯　苓　川楝子　史
澤　瀉　伽各二　川芎
聯　翹各八分　伽各一　木
熊トキヲ糊ト合テ丸之也　無分両
蜜四分　力二ヶ

右十六味

又保童丸

イリコ 五両茶性少アル程ニ薄ク劉土器ニテ黒炒
兵一両 クリ 三両 黒炒 能洗 右糊丸

○又保童丸

乾漆一分ニ厘 丁同 成二分
童一分五分 三稜 同 木香同
聯丁分 代黒五分 史君同

已上九味米飲ニテ是程ニ丸ス

○又保童丸 武衛之正方

戍十両 削童 各六両 干漆
広香各一分 黛カー センツ
夜明砂 白センケ 苦楝根
熊竜膽 参 丁

故貰連 各一両 是四分各一両也

右代茶

○カニノ代アカ、イルヲ陰乾
○センツノ代イリコ
○夜明砂ノ代カウムリ黒焼
○白センケノ代トウコニノ白花陰干

神秘保童丸

代赭石 赤石脂
漆 我 各一両
熊水ニテトキテ 草蛎 巴 各一両半
良ニ分 右糊ニテ丸ス

○五痢保童丸

治小兒五痢鬼下赤爛歳瘦痢
瘡出蛇虫腹痛吐瀉

芦薈 另研　夜明砂 裹布潮洗去土砂
連　臍林 作熊又有中竜旦
蝟皮灸　楝根皮　蕪　蝉殻
夫土　伏黛　五倍 生用各等分
麝 少另研

右細末粟米粉糊丸米飲下

○私曰前方未考本書蓋医林入門指掌圖明監等有五癖保童丸前方去蝉殻蕪加白鱔膏皮雄黄天漿字熊膽胡黄連矣按示知前方与医林別方取同方加減耶猶可考之○医林方後曰治小児五癖蓋小児其脊肉軽軟腸胃微細若乳哺有節則臓腑相調或乳母寒温失理飲食無常酔飽喜怒及小児百脾以後五歳以前乳食漸多不択生冷好食肥濃甘酸之物即成五癖二曰肝癖三曰心癖四曰脾癖五曰肺癖五曰腎癖並皆治之

○青黛圓　得効方五福化毒丹治瘡疹餘毒上攻口歯及治温積毒熱攻鳥惕狂躁頬赤咽乾口舌生瘡夜卧不寧譫言煩渇頭面身体多生瘡癤朱眼等疾亦名青黛圓

○癖虫三ノ目白ク成ヲ治ス

玄一兩　吉彡　馬牙硝
於各二錢　甘一朱　右爲三丸一銀箔五牧
入金箔爲衣每兩作三十二四一
歲兒一四分四服用薄荷湯下
瘡疹上攻口齒誕血臭氣生地
黃自然汁化二四用雞翎刷在
口內熟痺肌肉黃瘦崔目夜不
見物陳粟米泔水化下食後臨
臥服○正傳治急驚風變熱搐
搦

○磨積四　治小兒乳癖蛔虫
衝上涎嗆酸水
迴小　聆中　青小　木小
我中　兵小　綾中　朮中
涉中　史中　百彡中半生半炒
葸根中　蕎中　曲小
右細剉拌和飲爲丸○按醫書
大全有磨積丸治論茶剤各別
也

○無比山茶四　醫林　虛損門二
曰治丈婦諸虛百損五勞七傷
頭痛目眩手足逆冷或煩熱有
時或汗痺骨疼腰臗不隨飲食
雖多不生肌肉或少食而脹浦
体無光澤陽気衰絶脹気不行
此茶補經脉起脉次魂魄開
三焦破積聚厚腸胃強筋骨輕

身明目除風去冷〇医書大全
同上二
赤石脂醋浸燒七次 神巴
戟去心剉焙 半酒製ス 山茱
蹉酒浸炒 芋 五味各五分
頭十分 仲 兎絲十五分
肉蓯蓉二十目酒一宿浸布三
ヲ去リ日ニ乾焙
右十二味蜜三ヲ丸ス〇医林丙
目少異也可互ニ見ル〇剤後曰右
為末煉蜜丸如梧桐子大一毎服
二十丸至三十丸食前温酒下ス
或米飲下服七日後令人身軽
体健潤澤唇赤手足煖面光悦
身体安音声是其験也十月

後長肌肉此条通中入脳梟必
酸疼効〇得効方両目亦異于
右也
〇者婆萬病円 或人曰和剤
方也〇水病積聚心腹脹滿心
腹気滿下血痔虫蛔虫寸白虫
疾飲胸中痰血赤白下痢小児
疳臭耳龍耳梟寒治ス
仆 芍 蒲 弓 圭 令
蚰 芸 川椒 雪 細 蔻
詩 乡 茅 西 連 文
犀 芎 遂 大戟
雄 辰 牛 乾花 烏余粮
呑蜥蜴三 節 芝苦七枚 巴各冬
已上三十味

右等分研末入停練蜜小豆大二
可用破除日平旦空服酒以捂
桐子大三十丸服但吐利為度若
吐利即酸飲二三口喰止之
○丁沉四　此一茶八虫二吉二服冷痛
三十丸以下吉二過酒ノ後ムカヒケニヨシ
丁　戍　陳　各三分　童二分
泉二分　芎五分
右八味煉蜜調和
○丁子四
良内桂　木戍　永訶子　丁各二両
芎
異本伽二両アリ余茶一両
○二姜丸
医書大全心痛門二

曰治二心脾一冷痛暖胃消痰○般
与車酔○寒虫三毛
永　良各等分右為末麪糊
圓如梧桐子大毎服三十丸食
後橘皮湯下或煉蜜調○方考二
曰二姜丸腹痛脉遅者此方主
之○腹痛之由有二数種一今曰脉
遅則知寒矣故用二永光之辛熱
者一以主之辛可二以破一滞熱可二以
散寒不滞不寒痛斯失矣
○七宝四　木便不遍妙茶也
兎二両　奴介　柴各
桃三分　芎少
右煉蜜三丸九

○白虫四　寸白秘方
引　參　令　細　圭
兵谷一本良夏半　粉皿三生　粉焙
衣二ヲ一ニ●是程ニ丸ス塩湯三下
○同方
良　兵一本　菜　陳　吉　令
成　曲　圭　右九用
○倫急四　萬下
巴一兩去心皮　姜三分　大二分炒　香
皂子廿一粒　香黒ス
右除巴豆外三味為末而巴豆
研調和飲丸ス
○前方ノ虫処求考蓋医林得効
方正傳等有倫急四前方去皂

子一兩自亦異也医林方
乾姜炮一兩　大黄各二兩　治論曰療心腹諸
巴豆霜　李暴百病中悪客忤心膜脹滿
痛如刀刺気急口噤或飲食過
度気白急盛乃傷于太陰脾経
宜下之○劑後曰右為末煉蜜
丸如梧桐子大毎服三十丸或五
丸姜湯下若困重不能吞扶起
頭令下咽未瘥再服若轉利吐
効○得効方頭痛門曰治積聚
頭痛劑後曰右三味等分為末
煉蜜四如豌豆大米飲下一四
巍人服半四○同十巻救臞死

法下曰傷急山療心膜諸率暴
百病中悪客忤心腹脹滿卒痛
如刀刺気急曰噤〇同十四巻
保産部曰治婦熱而大便秘
脉實死胎皆不知人温水下七日
即活〇正傳号修傷急大黄丸内
傷門曰治心腹諸卒暴痛秘結
門曰治胃中停滞寒涼之物大
便不通腹痛〇方考曰飲食自
倍冷熱不調腹中急痛欲死者
急以此方主之〇脾胃以飲食
而養亦以飲食傷故飲食自倍
塡塞至上焦不行下脘不通則
令人腹痛欲死經曰升降息則

気立孤危是也以平葉与之性
緩無益於治故用大黄巴豆奪
門之将軍以主之佐以辛利之
乾姜則其性益速而効益捷矣
〇神仙巨勝子丸
巨勝 酒浸一夜九蒸九暴 膠 酒浸
巴戟 閑山 牛膝 酒浸
酸棗 覆盆
右煉蜜丸如梧子大空心温酒下
廿丸一方加服一月身軽体健万
病不侵
右方有聖剤總録百九十九明
監巻之二終之紙餘載之可考覧

又神仙巨勝子丸
○奇効良方虚損門曰安魂定
魄致易容顏通神仙延壽余添
髓駐精補虚益気壮筋骨潤肌
膚髮白再黒歯落更生目視有
光心力無倦行歩如飛寒暑不
侵能除百病
巨勝一両　牀子　各四両
枸杞　五味　酸棗
破故紙　炒　桑螵蛸
麝木香　蓮蕊　巴戟　去心
膝酒浸肉蓯蓉　酒浸三日　天門
桂心　参　匿　楮實　韮子
天雄　炮去皮臍　附子　炮去皮臍
蓮肉

續頒　各一両
右細末煉蜜丸　秋冬蒸棗肉入
久服去天雄用鹿茸亦得此薬
耳聾後聰眼昏再明服一月元
臓強勝六七月髪白変黒一百
日容顏改変日明可黒一処穿鍼
冬月単衣不寒若將白雞用薬
拌飯喂六十日則変為黒雞矣
巨勝本綱殻部胡麻釈名巨勝
行義巨勝即胡麻之角巨如方
勝者非二物也集解弘景曰純
黒者名巨勝者大也巨本生太
究故名胡麻又以蓋方者為巨
勝四者為胡麻〇私考集解諸

多蓋時珍結語曰即胡麻中了
葉巨勝而子肥者故并誤啓疑
如此云云○崇筌曰黒者良白
者劣○本綱修治取烏色者當
九蒸九暴熬搗餌之

○麻仁丸 秘結

麻 五兩 杏 二兩半 實 半兩 酌
丑各一兩 右按前方出処未考
蓋諸書脾約丸号麻仁丸雖然
薬味小異也脾約丸載千丸類
可互見

○金露丸 ○医書大全癲痫門
曰治痰迷心窻恍惚狂言婦人
痰血上衝或歌或笑言語狂乱
並皆治之○明監出処同上○
大全小児門亦有金露丸別方
也○左之分両各別
両自各別

牡蛎 貝苑 参 奴 茱萸 姜 朴 恚
椒 吉令 烏頭 星 芎藭 松
芒三兩 連各三兩 巴一兩
能ク煎ジ酢ヲ煎ジ付ジリ〳〵ト成時
取上能ク研テ後残ル茱ヲ入糊
三ツ可丸ス小児二粒大人十粒或
十五粒

○大全金露丸 剤後曰心中痰

患姜湯下心痛酸石榴皮湯下只磨窒湯下頭痛石羔湯葱茶下一切脾氣橘皮湯下水泻氣陳皮湯下赤白痢茸草乾姜泻陳皮湯下胸膈噎悶通草湯下婦人血氣當歸酒下疝氣嵐氣小腸氣及下墜附子湯下傷冷腹痛酒食所傷酒疸黄疸結氣痞塞鶴膝並用塩湯塩酒下

○阿魏四

貴童我削 胡椒各三分

侯五分 魏一分

右大便結加巴一分

○私曰前方出処未考蓋家傳加減之一方乎按得効方諸虚門醫書大全宿食門明監内傷門等皆有阿魏四與前方小異也得効方大全等之方如左

阿魏 官桂 蓬朮 麪神曲 青皮 雞蘭

于姜各等分 百少霜三分 巴豆三七个

右為末和勻用漸糊四如菉豆大每服二十四不拘時姜湯送下麪傷用麪湯下生菓傷用梨香湯下○同治論曰治脾胃怯弱過食肉麪生菓之物停滯中焦不能消化以致腹脹刺痛呕悪不食或利或秘悉主之

○又阿魏四 霍乱胶痛
ヒキヲコレ 十分共侵葉ヲ用六月 立 用ノ内二取
二夕ニ去腐生ナル時割
于姜 各五分 胡椒 三分
右抹メ丸ス

○又阿魏四
良香 苦参 楊梅皮 葛粉
各一両 胡椒一分
右為レ末糊リ丸●之 大丹ノ如ス

○諸虫霍乱冷胶痛等ハ塩湯下
○洪リ胶ハ飲ノ取湯ニ下

○走胶ハ灸冬ハ上モ冷水ニ下
○瘧ハ滾湯ニ下間日前夜含服之

○諸症一度七粒ツヽ令服之妙方

○大阿伽陀四
貴 令 良 胡椒 各三両
恚五両 参 一両 虎 霍 各一両二分
嵩金 弓 各一両 木 二分
青 各一分 右蜜丸

○小児痃気冷浮十ト二用

○万病解毒四 此方与丹ノ之
類千金丹雑方千金錠ノ下ニ異名
同方也蓋薬味全ク可ニ互見一矣○得効方ニ曰治ス蠱毒
桃生毒薬毒中ル毒畜毒獣ノ
灸蛤 即チ五倍子ノ下ニ両半 山茨菰 即チ金
灯花根一 全蝎 五枚 大山豆根
両洗焙 續隨子 取仁去油留性 射香一銭
各半両

朱砂 雄各二 紅牙大戟洗焙
半右先以五味茶入木臼搗羅
爲末次研射香続隨子朱砂雄
黄麦和糯米糊山分作二十五
端午七夕重陽臘白淨室修合
毎服一丸生姜蜜水磨下井水
浸研傳患處解毒收奪救病神
妙朱砂雄黄乃攻五毒第一用也

丹之類第三

延齢丹〇凡ソ延齢丹者一溪老
翁徒道導連師受授相傳之秘
方也故至于今當家続用之秘
方也他家聊無知之敢非門下ノ
生縦雖爲賢子安不可譲與之
當家之禁戒如此可愼ム
〇第一痰ニ吉〇気ノヨワキ人ハ用ヒ
〇気ノヨワキ人ハ大捻気ノ方ニ
常ニ用テ吉〇血ノ通ノ気付モヨシ
〇痰ニテ噎ノ痛ニモ吉

三剤家方

桂 砂 嬌 泉
且各一分 蜜 吉
井九分 射香三分 脳四分

右十四味〇煉法先ヅ前十二味
粉ニシ置次ニ脳射ノ塵ヲエリ置次
乳鉢ニテ煉蜜少スリテツノヲキ程ニスル次ニ脳ヲヨク
スリテツノヲキ程ニスル次ニ脳ヲヨク
スリテ後脳射一ツニ入合テヨク研

合而後蜜少ツヽ入テトロ〳〵トスル程
ニヲ後抱ノ茶末ヲ入研合ス其後ニ
茶臼ニ入ヨク拌合法常ノコトシ後茶
器ニ入テ封メ置也
○至宝丹○医林ニ曰ク治ス卒中急
風不語中悪気絶ヘ及心肺積熱ノ
小児諸痫急驚心熱並皆治之
○明監出慶同上ニ○玉機ニ曰ク急
中卒風気絶不語至宝丹主之
連進生姜汁○大全ニ曰ク小児風
痫門ニ曰ク治ス諸痫急驚卒中客忤
並宜服之○指掌小児驚搐圖
曰ク治驚有熱者○同方後曰ク治ス
諸痫急驚心熱卒中客忤不得

眠頬燥風涎搐搦及傷寒狂語
伏熱呕吐
○中風熱症用ヲ
○諸病急証ヲ治ス
○熱而痰ノツニル時用
○大酒ノ後十ト用ヲ有
○中風ノ月ニイ童ノ驚尽或疱
瘡十ト用ヲ有
犀角　辰砂　雄黄　琥珀
研安息香　酒煮各三分　牛黄一分
脳麝各七分　五厘　金箔　銀
箔各五片
右十一味
○生犀玳瑁搗羅為細末研入

餘薬令勻將安息香一以煎湯煮
凝成和搜為剤如乾即入少熟
蜜丸如桐子大二十歳服二丸入参湯
化下太小以意加減大全
○煉法牛黄清心丸延齢丹等
同腦麝ヲ蜜ニテ研交ニ金箔銀箔
ヲ入研合捻ノ粉ヲ入テ研已上ノ
餘丹ト同シルキ加減ニ少口傳有
ハラ〳〵トスル程ニシテ石臼ニ入能ツクヘシ
此丹ハ石薬故ニ初ヨリ堅ク煉テモ亦
ユルク成易キ也此心持余丹ト別也
是口傳也
○延壽反魂丹　今俗ニ云反魂
丹也○家傳号ニ麝香丸ト是也○

出東儒門事親巻第十五号ス妙
香十二一九ト治ス痛ヲ云
○一切之虫薬ナリ
儒門事親与左之方薬味両自
大同小異也儒門事親之方剤
別聞書載之故不記于爰矣
○家傳修合之方剤如左ノ
蜜　虱　戌　削　貴　將
聯　遡　各三　五厘　雄　奴
童　文　各二　五分　乳　嬌　各一　分五厘
丼少　巳上十　味先乃未　黒丑　微炒雷
熊トキヤウ湯ニテトキ水ニ浸腥気スケテ而後トキ麪
曲麹ヲ入煉各三ヲ七分五厘
麝射　另ニ研一ヲ二
分五厘

白丁香 少焙 百十粒 口傳下小有 赤小豆 生用 百八十粒 之重并合三說
右 合テ二十一 粒慶長十八年東井御調合之時文ヲ去リ小豆三十粒入也今ハ則不レ然矣
已上六味 後和勻 右合テ二十一 味麹麦麹 蕎麦粉等分 糊ニメ丸ス
● 此大并ニ辰砂為レ衣ト
○ 校坂傳 參ノ三分三色ニメ入ト云說有
○ 儒門事親 剤後曰 右廿三味為レ末赤小豆 爛煮研泥同蕎麦打糊和作二十九朱砂為レ衣陰乾服時水漫一宿化一丸大便出隨病各有形狀取出為驗或作化一番不可再服曾經水炙者不レ治遠年愈効○私按儒門事親之方中有輕粉巴豆等之疎通峻下之候乎蓋家方大黄牽牛之類亦猶下利疎通之剤也縦雖無大便下利之的驗可知下利疎通之剤也
○ 福島道牛夏瀉丹之方
連 木 青 蜜
錢 楝子 陳 吉
分 虱 弓 丑 迦二 各
射 各一 朱 白丁香 三十 粒 小豆 同上 七 粒 胆 各一分 乳

右羅勒ヲ熱湯ニ漫シ糊ト十レ丸ス辰
砂為衣ト
○延齢固本丹　町春ニ日ノ治ス五
労七傷諸虚百損顔色衰枯形
体羸瘦中年陽事不挙精神短
少未至五旬鬚髪先白并左癰
右瘓歩履艱辛脚膝疼痛小腸
疝気婦人久無子息下元虚冷
関　　虺　　馳　　山　　勝
仲　　巴　　戟　　茱　　昤　　玄
参　　蜜　　桐　　萸　　各二両　川椒
菖　　遠　　志　　沢　　各一両半
覆盆　　車　　肉蓯蓉　各四両
右為細末蜜丸〇婦人加仁赤

呑服各一　右好酒打稀麺糊為
丸如梧桐子大毎服八十丸空
心温酒送下服至半月陽事雄
壮至二一月顔如童子目視十里
小便清滑服至三月白髪返黒
久服神気不衰身軽体健可昇
仙位ニ
〇鳳髄丹
木　　泉　　木　　鈴　　成
　　　　　　佚　　発
胡椒或一分　　没　　薫陸
丁子一両半　　辰　　各五分
麝　　脳
右蜜丸金箔為衣ト
〇千金丹　四類号万病解毒

川雜方号二千金錠子一
茨去レ皮一夫レ被一去レ仁焙二一兩
文去レ肉一虫一小一頃浸二清水一日一晒焙
三一兩三一十一目一
續擣二土一器一去レ油一一兩十一分
戟去レ芦洗淨刻一一兩半

麝三分

〇大全二号一解毒方病丸一治癰疽
発背及魚鰕毒人多不レ知二治諸
風癮疹赤膿卅瘤能解二一切一毒
被一狐狸毒蛊毒悪菌河魚毒或蛇犬悪虫二
食一レ疫死牛馬肉毒一
所レ傷

〇豊心卅

砂木丁翟泉

洗発 且各二分 圖 弓各一分 九卅一分 廣五厘 樟脳 竜脳各三分 古茶十五五厘 カ十 餅三一年二ナルヲ糊二煮テ丸ス卅ジ衣トス合十七

味

〇退睛丸 治レ遠年近目一切
日一疾内外翳瘢攀睛努肉挛弦
風眼及年老虚弱目昏多眵迎
風冷一淚視一物昏花久成二内障一此
茉最能降レ火外水可レ宜久服夜
読細書ヲ

参一兩半 決明 一兩 蛍一 鞠七 的一兩 兎絲一 兩 甘物 肉蓯 川芎 膝 川仲 蚯 各一二 朮

石斛各一兩五味
半
川椙一酒炒二兩德一兩半
奴一兩白蒺藜兩羚防風八錢
菊花一兩青相子一兩半夏明
烏犀八錢炙甘七錢
右共九味為細末煉蜜丸如梧
桐子大每服三十五十九空心溫
湯送下

丸之類第四

○六味丸　一名地黃丸一名
腎氣丸或云六味地黃丸
半八兩萸肉各四兩牡
沢各三兩　右煉蜜和丸

○方考虛損門曰腎虛不能製
火者此方主之○腎非獨水也
兪門之竝要腎不虛則水足以
制火虛則火無所制而熱証生
矣各之曰陰虛火動河間氏此
所謂腎虛則熱是也今人足心
熱陰股熱腰脊痛率是此証老
人得之為順少年得之為逆乃
咳血之漸也熟地黃山茱萸味
厚者也經曰味厚為陰中之陰
故能滋少陰補腎水沢浮味甘
鹹寒甘從濕化鹹從水化寒從
陰化故能入腎水中之陰而浮水中之
火丹皮氣寒味苦辛寒能勝熱
苦能入血辛能生水故能益小

陰平虛熱山茱萸麥味茸者也
茸從土化土能防水故用之以
製衰水臟之郭且益脾胃而培萬
物之母也寔考見咳嗽門○咳
嗽門曰腎虛移熱於肺咳嗽者
此方主之下暑之可考見○呃
吐門曰陰虛於下令人多呃者
主此方塩湯吞之脉解篇曰諸
陽気浮無所依走故呃咳上気
喘此陰虛於下而令孤陽上浮
爾是方也芊葉質潤味厚可使
陰滋毋次気鹹寒可制褒陽光預
冬味茸而淡可使調下五是六
物者皆有益於陰也故主之○

消渇門曰下消者煩渇引飲小
便如膏此方主之先有消渇善
飲而小便如膏者名曰下消懼
其燥熱漸深將至水矣故用此
方以救腎水下暑之可考見○
麥痺門曰六味丸加黄柏知母
方腎気熱則腰脊不挙骨枯而
髄減発為腎痿此方主之下暑
之可考見○○門曰如心気不
足及有瘀血加牡丹皮至八一兩
如脾胃弱加山茱萸至八一兩如遺
精頭昏加山茱萸至八一兩如痰
火小水不清加茯苓至八一兩如
腎無邪水有遺漏者去沢瀉茯

苓加茯神二錢薑棗五味子麥
門各二錢共白湯温酒下有痰
姜湯下治少年水虧火旺腎氣
久虚瘦弱無力盜汗発熱五蔵
夲損遺精便血淋濁等症及婦
人気血虚弱子閉經潮熱咳紅
煩渴能収精養気伐火導水使
杭閔利而胖大健實一方加知
母莵桓治陰虚大潮渴如中寒
少食易泄者去知母加砂仁炒
黒乾姜北五味子〇医林載于
火煠二門同小児行遲解顱二
処載之即明監出之〇王執眼
目門曰治目不能遠視能近視
或亦妨近視同淋門載之〇正
傳補益小児等出之〇得効方
弟十二諸痺門曰治腎痺極痩
身有麈疥寒熱作時頭極熱脚
冷如氷〇同解顱門曰治年大
小鬼頭縫開解不合凡腦髄欠
少如木耳根不過于月終成癈
人六味為末煉蜜丸梧子大毎
用二十四温水空心送下仍用
大南星微炮為末米醋調傳於
緋帛上烘熱貼之〇同行遲門
曰治気血不充骨髄不滿軟弱
不能行或肝腎俱虚肝主筋之
弱不能束亜致也一方加川牛

膝五加皮酒炙鹿茸妙也○小
児茶治㆓熏受不定血気不㆑充故
肌肉痩薄骨節呈露鶴膝乃腎
虚得㆑之腎虚則精髄肉耗層草
不㆑栄易為㆓邪気㆒所㆑襲曰乾枯痺
其始鶴脚之節乎本方加鹿茸
酥炙川牛膝各二銭修合服餌
並同三歳以下与十丸三歳以
上与十五丸右見鶴膝門○本
綱沢瀉條発明珍曰仲景地黄
丸用茯苓沢瀉者乃取其瀉膀
胱之邪気非引接也古人用補
某必兼瀉邪去則補茶得力
一闋一闔此乃玄妙后世不知

此理專一㆓于補㆒所以久服必致
偏勝之害也正誤珍曰典術曰
沢瀉久服令人身軽曰行五百
里走㆑水上㆓一名澤芝陶蘊皆以
為信然愚切疑之沢瀉行㆑水瀉
腎久服且不可又安有此神切
耶其謬可知○古今医監万病
回春済世全書皆補益門載之
治論之巨細各別也省其多而
今畧于爰可㆓互見㆒之俱以不可
不考見焉○全書曰麦門五味
子名八仙長寿丸加大附子肉
桂名八味丸
○八味丸

芍藥 預各四兩 牡丹 龄各二兩 桂附各一兩
右為末煉蜜丸
○方考稱崔氏八味丸腎間水火俱虛者此方主之下有木火並之命畧之六味者前之地黃丸也所以益少陰腎水桂附辛熱物也所以益命門相火得其養則二腎復其天矣考見小便不禁門曰腎間水火俱虛小便不調者此方主之腎臭水主二便而司開闔腎間之火熄則水猶治能開而不能闔令人小便不禁是方也以附桂之温熱益其火以熟地山茱濡潤壯其水火故實則補之虛則瀉之之酸鹹者可以收而浮之之水故實則苓瀉之淡者可以制而滲之水火既濟則開闔治矣正考見虛損勞瘵門渴門○消渴門曰渴而不消者此方主之此為心腎不交水不足以濟火故令亡津液口乾乃是陰虛而不降火上升陽無陰而不降水下火上不相既濟耳故用桂附壯其少火用六味益其真陰二味真陰不可降少火壯則陰自外故竈底加薪枯籠蒸濕稿禾得雨生意

維新惟明者知之昧者鮮不以
為遷也昔漢武帝病渴張仲景
為処此方至晉玄関令猶可想
○麥痺門云入房太甚宗筋縱
弛発為陰痿者此方主之下瞥
可見○入門曰治老年水俱
虧腎虚気之下元冷憊腑腹腰
痛夜多漩溜脚軟体倦面黄或
黒及虚労不足渇欲飲水小便
不利一切湿熱等症並皆治之
○医書大全咳嗽門曰治脾虚
不得剤制腎水多吐痰唾而不
咳者○同虚損門曰治下元冷
憊心火上炎渇欲飲水或腎水
不能接養多吐痰唾及男子消
渇小便反多婦人轉胞小便不
通皆治○同脚氣門云治腎經虚
寒脚気入腹二腹疼痛上気喘
急○医林虚損門曰加五味子
名腎気丸○銭氏去附桂名地
黄丸治腎気虚損久新憔悴寝
汗発熱五蔵脊損痩弱虚煩骨
蒸痿弱下血随證加茱法血虚
陰衰地黄為君補腎水益血精
滑山茱為君小便或多或少赤
黄状若為君淋瀝沢瀉為君心
虚腸胃間積熱心火盛心気不
足牡丹為君皮膚燥渋山茱為

君以上但為君者分兩与熟地同春夏宜服腎气丸〇又曰治脚腰疼痛〇又曰治冷淋〇又曰治房労傷腎腰痛本方加飯草続斷〇得効方

秘渋門虚證條曰治腎虚小便秘渋不能通或過服凉葉者〇又曰治虚人下元冷脬轉不得小便膨急切痛經四五日困篤欲死〇又曰治大小便秘渋此血弱不能栄養藏府津液枯渋数服即愈〇又痰飲門之論与医書大全同〇又身病門曰治耳聾及虚鳴右用好全蝎四十九枚炒微黄為末每服三銭以温酒調仍下二八味加百粒空心只三十兩服見効〇門春全書補益門載之治論大同少異可互見也〇全書淋閉門曰益火之源以消陰翳即此茱也〇全書淋閉門若老人陰痿思色精不出而内敗小便道渋痛如淋依本方加車前子牛膝若老人精已竭而僂耗之大小道牽痛愈痛欲便愈便則愈痛此茱最効

〇木香丸　家傳之秘方也

〇諸虫痛二吉ヒ胸ツカヘタルニ用テ吉侠炒　三十月　屠蘇　黒炒　遊少炒　十朱砂

精五分 忌火 右四味糊三丸ス

○木香拆榔丸 正傳腹痛門ニ稱ス河間木香拆榔丸治食癖気ト滞作痛○家傳之茉劑兩肖如左

蜜 洗童 伽 皓各二分 淡四分 桂洞六分 月七分

右八味曲ノ糊三丸ス 此方常ニ御調合痢痛十ニ用ヒ玉フ多シ正傳ニ後重者積与気墜下故無外慕消此方主之ヲ

○又木香拆榔丸 医林気門ニ曰疎三焦利胸膈破痰逐飲快気消食加三稜名各導飲丸ト○

明監気門亦出之○林気門ニ又有異方木香拆榔丸心下痞悶門亦木香拆榔丸皆同銘異方也○方考ニ曰痢疾初作裏急後重腸胃中有積滞者此丸主之ヲ○内經ニ曰湿淫所勝乎以苦温故用木香熱者寒之故用連芩梢ノ柳者散之故用青陳沙強者瀉之故用大黄丑朱逆者行之故拆枳留者攻之故用裝稜煤者十補勿一ニ泻之ヲ木 兵 童 貴 我 連

奴各一兩　百兎　候　丑各四兩

右十一味為細末丸食後姜湯下○方考前方加稜皆○得効方氣門踈導三焦寬刹胸膈破痰逐飲快氣消食木　皂　都

醫書大全氣門同上○醫書大全積聚門家藏方木香檳榔丸治脾積氣塊脇腹走痛口吐清水木　檳　滌　硇　肉蔻　胡椒

桂○木香檳榔丸諸書各別也唯家法正傳方調合之　朔公時一云醫林方有御調合故記右

○養胃丸　或号檳榔丸○家傳之方也酒積氣尅腹痛宿食虫積食ヲ進兵　蜜　桂　伽　匿　侯　我　皓　稜各百目

并二十目或一兩

右十一味為末糊丸

○自安丸

楊梅皮　胡椒各二　苦辛　于　漆各一兩

右為抹丸

発日之早天湯用服数口傳殊虫瘧佳也虫積脇痛奇妙後清三ノ用フモ有後清二味丸啓ノ作方茶味口傳不註之

○潤腸丸　出處未考此方常
御調合
將十分桂一分
右二味煉蜜三ヲ丸ニ空ヨリ桂ト木ト
代ルヲ有異本潤腸丸將一味炙
春夏木ヲ加秋冬圭ヲ加也
加茱將ノ十分一也木ヲ加ル方モ
亦其効尤妙也
○又潤腸丸　正傳ニ曰ク治脾胃
中伏火大便閉渋或乾燥閉塞
不通全不思食及風結血閉皆
能治之○明監出處同上ニ明医
指掌同上ニ
桃麻仁各一勘　虎　各五分

右五味
桃麻別研如泥其餘為末煉
蜜為丸如梧桐子大每服三五
十丸空心白湯下加風湿而大
便不行加皂角荵芄○正傳後
三味各半分也○医林燥門右
二味之加茱入本方有潤燥和
血疎風自然通矣之論○同大
便不通門潤腸丸出二方俱以
別方也○同諸痔門以將奴打
之三味名潤腸丸○医書大全
秘結門出潤腸丸三方入門燥
結門方考秘結門古今医監閉
結門済世全書大便閉門並皆

出潤腸丸諸書各方皆異也唯
家傳用於二味之潤腸丸而已
間亦用五味之潤腸丸矣其餘
用猪也故方劑不載于妄雖然
依証隨耿考各方之治論可選
用者分之宜也偏執於經驗之
家方而豈捨於古聖之名方哉
盖師之家訓如此可信可仰
凡 方考曰愛中
○硃砂安神丸
驚悸心神不安者此方主之○
夢中驚悸者心血虛而火熾裝之
也是方也硃砂之重可使安神
黄連之苦可使瀉火生羊之凉
可使清熱當歸之辛可使養血
乃甘草者一可以緩其炎上之
焔一可以養氣而生神也○个
門曰黄連六錢苦寒去心煩除
湿熱為君甘草生地各一錢半
甘寒瀉熱瀉火補氣滋陰為臣
當歸二錢半補血硃砂五錢約
浮遊之火而安神明也○治心
煩懊憹胸中氣亂怔忡心下呑
酸食入反吐及傷寒汗吐下後
餘熱留於心胞絡不睡○医林
怔忡門曰治心神伺亂怔忡○
明監出処同上○明医指掌痫
証痰圖曰痰者動則有声沫出
脉滑必用吐後用安神丸○後

集凡類号東垣安神丸〇同補中益気湯方後曰気浮心乱以硃砂安神丸鎮固之〇古今医監治血虚心煩懊憹驚悸怔忡胸心気乱〇四春全書共同上〇四方前曰心栝神乱者血虚火動也聯三本辰酒虫焙酒仆各一本并水

右五味曲糊三丸為衣啓ノ御調合六衣十丸

〇枳朮丸　潔古製方也雑着詳論之

伽目　十洞本方　皓各十朱加茶也

右三味荷葉二飯ヲ包三焼テ打糊ニ丸ス〇雑着枳朮丸論署之可考見方後曰此法ニ補ニ消取飲食緩化不止令有傷東垣加陳皮二両名枳朮橘皮丸治老幼元気衰弱飲食少進久服令人多食而不傷已下有加減法署之

〇医林脾胃門洞伽二味称枳朮丸治痞消食強胃同門陳洞伽三味称橘皮枳朮丸治老幼元気虚弱飲食不消或蔵府不調心下痞悶〇方考傷食門曰健脾消痞此方主之消補調養之方也故用伽以補脾洞

以消痞焼飯取其香以益胃荷葉取其仰以象震仁者欲其升生甲膽之少陽巳此易老一時之方來東垣未年之悟孰謂立方之皆易図耶○正傳方後有加減之法明監亦出之俱畧之可互見○私曰九省畧之方論上件如同者異曲同功者取用要少而久句斂繁者日用之書而見易者亦皆除之舟丸散之類准之

○滾痰丸　入門釈方曰滾轉而下痰也○入門痰門曰滾痰丸大黄黄芩各八兩瀉陽明濕熱沉香五錢引諸気上天下泉礬石燔硝各一兩隂痰二味同入砂礰内蓋之鉄線縛定塩泥固済晒乾火煅紅候冷取出同前茉為末水丸梧子大或加硃砂二兩為衣每四五十丸量虚實加減食後臨卧茶清温水任下攻腸胃痰積及小児食積痰驚風痰盛實熱者最為要茉休弱者加六君子湯一料入竹瀝姜汁和如稀糊以磁器盛晒乾再以竹瀝姜汁拌晒如此者三次又用竹瀝為丸小豆大每百丸食遠米飲下名竹瀝達

痰丸能運痰於大腸從大便出
不損元氣妙惟有泄有孕者忌
用〇医林曰一切失心喪志或
癲狂茶証中風痰壅風毒脚気
遍身遊走疼痛頭風牙疼腸気
胸痞心下嘈雜胠中気塊亢上
呕吐吐飲心下怔忡短気驚悸
唉閉目赤痰気喘嗽頭目眩運
腮頷腫硬頸項結核口噤胠脹
股疼倦労痰盛男婦小兒又患
心疼下連小腹痛発必呕緑水
黒汁乾呕悪心下痢腸垢積滞
脚気腫浦凡服茶必須臨卧就
床用湯一口送下不可起動言
語若下得三十两次者次夜減十
丸若終夜不下或止去二十行
者次夜加十丸若病在上者以
五六十丸同蜜少許一処嚼吸
噙化徐徐并之〇方考曰實熱
老痰此方主之〇太黄能推蕩
黄芩能去熱沉香能下気礬石
能墜痰是方乃攻擊之剤必有
實熱者始可用之若乏虚寒之
人則非宜矣又礬石由煆硝煆
煉必陳久為妙若新煆火毒未
除則不宜服〇正傳曰王隠君
之作方也治濕熱食積成窠囊
老痰〇右今医監方後痰症古

今未詳之事并一切痰症令此
方服之事数條又服時養生之
法並皆詳也雖取用之要不少
者其敘祭多而畧之不可不考見
焉○四春方前同千般恠症者
多無痰火也劑後之数條同上
○濟世全書方後之論与古今
医鑑同矣可互見
將文蛤各二十
石 焰硝二本 泉一本二 青礞
分五厘 水五 分水二入土器
焼
右為末水丸辰ヲ衣ニス修合之法諸
書詳也可考
○丁香脾積丸 医書大全気
門曰治諸般食積気滞胸膈脹
滿心脇刺痛○同宿食門曰治
食積心脇膨脹不得尅化○明
医指掌与大全気門同矣○今
門曰傷冷木香丁香以煖脾注曰
丁香脾積丸方後曰麻子大毎
十丸五十更湯下利去三十五行以
粥補住治諸般食積気滞胸膈
脹滿心脇刺痛如止脾積気陳
皮煎湯下吐酸姜湯下呕吐藿
香芽単煎湯下小腸気炒茴香
湯下婦人気血刺痛醋湯下呕
吐萵苣湯下○医抹宿食門有
丁香脾積丸茱味少異也不記
于奚焉○家傳号寛中丸

丁香 蜜 巴 良姜 一 我 六
麸 四 童二 皂角 一 百草霜 三
右糊ニテ丸ス
○勝紅丸 医林ニ曰ク治脾積気滞胸膈痞悶気促不安呕吐清
水ヲ丈夫婦人脾血積気小児食積並皆治之○医書大全
古今医鑑明監並同上○医監
剤後曰按右方治寒積之剤○
家法号温中丸ト
皓 童 我 削 光 禾 各
一 両 候二一両
右七味醋糊丸○同春積裹門
同上ト

○天竜丸 板坂之方也○癩
癩之妙方也
我七分 削 童各六分 木四分
矯三分 水童 水浸少 遊
三分 天竜 水浸各二 膝去枝葉
二クリ 水浸各一分六分 焙焼
芦薈 五厘 洗一分 睇
泉各一分 井 松一分 官桂八分
右合十六味
○秘真丸 医林ニ曰ク治遺尿失
禁○正傳曰ク治思想無窮所願
不遂意淫于外入房太甚宗筋
弛縦発為筋痿及為白濁及白
物随溲而下或夢与陰人通泄
耳不可多服大秘或用兼白朮

湯下
龍骨一両 訶大者五枚 縮半両
辰二朱半為末
右糊丸空心温酒下臨卧熟水
下冷水亦可

○集効丸
弱或多耳肥致蛇動○医林一曰
治蔵府虚弱多食耳肥蛇虫動
作心腹病疼発作往来腹中煩
熱口吐涎沫即是蛇交也又療
下部有虫生痔痒痛○正傳出
処全監○明監出処医林○又
明監腹痛門治虫痛也指掌治
虫心痛

蜜 風炒
附 永 虎各三枚 梅五枚
右煉蜜丸一方加文連又明監
方後有加連柏各一両半直考
見○小児虫積痛ヲ治ス

○駐車丸
木全曰治一切下痢無間冷熱
○医林曰冷熱不調下痢赤白
日夜無度腹痛甚○正傳痘後
餘毒條下曰下痢者黄連解毒
湯黄連阿膠丸駐車丸○明監
亦医林正傳共引用之○得効
方曰治休息痢因腸胃虚弱紅
白相雑両二三點滴作発作止○

濟世全書曰治下痢赤白肢痛甚者及休息痢○駐者止也言茉止痢如車之駐也○一方治休息痢用四物湯吞下駐車丸一百粒醫說經驗方

連三兩 膠 各一兩半 炙炮一兩

右醋糊丸

○三黃丸 明監明医指掌將文連号三黃丸治三焦諸熱○又蒼陳連栢翹号三黃丸治積熱便血又芩栢連上焦諸熱加梔名梔子金花丸○方考勞祭門曰消渴贏瘦不生肌肉其人善穀者此方主之

上件皆火証也火炎則水乾故令消渴燥万物者莫煙乎火故令贏瘦不生肌肉火甚則速於傳化故善穀苓連大黃苦寒物也寒能勝熱苦能瀉火去而肌肉自生陰生而肌肉長矣○医林曰治消渴及服丹石成消渴○医書大全積熱門曰治丈夫婦人三焦積熱咽喉膈閉心膈煩躁小便赤渋大便秘結並宜服之○又水煎号三黃湯治積熱結滯藏府大便秘結心膈煩燥○正傳火門曰河間三黃丸治三焦火盛消渴不肌肉○入

門丸湯共同于大全矣○全書曰上焦有熱攻冲眼目赤腫頭項腫痛口舌生瘡中焦有熱心膈煩燥不美飲食下焦有熱小便赤渋大便閉結五藏俱熱即生癌癤痰癖及治五般痔瘡嚢門腫痛或下鮮血○小兒積熱亦宜服之

文蛤 虎杖各分 右糊丸

○小豆加赤可也○加茸小兒赤白痢吉○全書曰煉蜜丸捂乎大毎三十丸熟水下如藏府瘧實倍加丸数

○朱雀丸号保真丸或茯神丸正傳曰河間朱雀丸治怔忡驚悸等証○明監出処同上○明醫指掌曰治心病怔忡不止

神二両 泉半両 辰或半両又半

右丸辰為衣人参湯下

○神應丸 泄瀉痢留茶

治世全書痢門曰治水瀉食泻積泻赤白痢休息痢不拘新久

連半生半炒 御蜜炒各二両 各一両 右為末丸

木呉茱湯泡

全書按右方治休息痢宜之

○阿膠梅連丸 医書大全曰治下痢無間久新赤白青黒疼痛諸証

豹 矜 百
末 冇 水 分
右入麝研勻末丸
○木香調気丸 私按此方出春
脊門木香調気散也今世師
經奇効而為丸者乎○出春方
前曰気鬱者服服脹滿刺痛不
舒脉沉也方後曰治気鬱症気
通虫積治
童 陳 卜
奴 各一 木 宦 各五 圭 芎 各三分 蒼 朮 侯
右為末丸
○按田春右方中有芎今除之
乎蓋脫落乎後自可問考矣
梅連豹

預菜集二十本按今之共魚芎
○草豆蔻丸 東垣草豆蔻丸
治客寒脾胃作痛或因湿鬱結
作痛亦可却而止之又治気弱
心痛亦妙也○丹溪活套云草
豆蔻一味性温能散滯気利膈
上痰若胃脫呆因寒而作痛用
之如鼓應桴若湿熱鬱結成痛
者服之多効若因熱鬱而痛者
理固不當用此但宜以涼菜監
制如芩連梔子之属其功最速
東垣草豆蔻丸寒熱心痛俱獲
奇効但因熱者不可多服久服
恐有積温成熱之患耳若久病

尿熱已膠(ニカワノコトキモノ)固者斷不可用此(ノ)茱萸也○已上俱(ニ)見于正傳胃脘痛門(ニ)同(シ)明監(ニ)心痛門(ニ)亦出(ス)之(ヲ)

章蔥(サウソウ) 麪炒(タマヒヤ)沢瀉(小便多者田(ニ)各一兩半) 橘皮(キツピ) 參(ニンジン) 蒼朮(サウジユツ) 蚕砂(ヒキノカヒ) 益智(ヤクチ)各八(ハチ)分 生薑(ショウキヤウ)半夏(ハンゲ)各一兩半 甘草(カンゾウ)炙(アブリ)半(ハン)兩 黄芩(オウゴン)炒黄(キツヒ)東瀉(トウシヤ)胶不痛姜黄(キヤウワウ)各四分 桃仁(トウニン)七十(シチジフ)枚(ケ)右桃(モヽ)仁(ニン)別(ニ)研(ケン)如(ク)泥(ノ)入(レ)諸(ノ)藥(ヲ)中(ニ)和(シ)勻(ヒトシク)蒸(シ)餅(ヲ)為(シ)丸(ト)

○安神丸 正傳急慢驚風門(ニ)

号(ス)錢氏(カ)安神丸(ト)治(ス)邪熱驚啼心(ノ)痒面黄頬赤牡(ノ)熱(ス)○又曰(ク)丹溪(カ)曰(ク)慢驚爲(ス)脾虚所(ル)生(ス)多(ク)死宜(シ)温(ヲ)補(シ)之(ヲ)云(フ)當(ニ)養(ス)脾用(ヒ)參(ヲ)朮煎湯(ヲ)下(ス)

安神丸○又發搐門(ニ)曰(ク)傷食發搐身体温多睡(ル)或吐(シ)不(レ)欲食(ヲ)而搐(ス)當(ニ)先(ツ)定(メ)搐(ヲ)後(ニ)退用(ヒ)白餅子(ヲ)服(ス)安神丸(ヲ)○明監夜啼門(ニ)出(ス)之(ヲ)治(ス)驚啼邪熱乘心(ニ)也安神丸主(ル)之(ヲ)

硝(セウセウ) 冬(トウ)

門(モンジン) 辰(シンサ)砂(シヤ) 脳(ノウ)子(シ) 預(カンソウ)寒(カンスイ)水(ヲ)各半(ハン)兩 丼(ドンブリ)少(スコシ)

右為(シ)末煉蜜(ヲ)丸(シ)如(ク)茶實大(ノ)毎(ニ)服(ス)半(ハン)丸白水下(ス)

○瀉青丸 正傳名(ヅ)瀉肝丸治(ス)肝熱急驚搐搦等証(ヲ)○医林(ニ)号(ス)涼肝丸(ト)並皆一方也○正傳發搐因(テ)申酉(ノ)時(ニ)潮發搐門(ニ)曰(ク)日晩(ニ)發搐

熱搐而喘目微斜視瞳則睛手
足冷大便下薄淡黄水此是肺
病當補脾而抑心肝補脾益黄
散抑心導赤散抑肝浮青丸主
之○明監亦出之○明医指掌
曰治肝熱搐搦脉洪實
羌活 大芎 各ホ一分
風
右為細末煉蜜丸菜實大每半
丸至二丸温水化下
○涼驚丸 正傳曰治驚痫○
同發搐門曰已未時発搐潮熱
驚悸目上視白睛赤色牙関緊
急口流涎手足動搖此心火太
旺當補肝瀉心補肝地黄丸瀉
心導赤散涼驚丸主之○又云
玄子丑時潮熱不甚搐而肋不
穏身体温無壮熱目睛緊斜視
喉中痰有大便銀褐色乳食不消
多睡不醒當補脾抑心補脾益
黄散抑心導赤散涼驚丸主之
膿風 黛各三 鉤藤二戔 勝一
二戔 腦一戔 牛西
右麺糊丸
射香各一
字

○肥児丸 古今医監諸痫門
曰肥児丸刘尚書傳消痫化積
磨癖清熱伐補脾進食殺虫養
丸気○田春殺虫之下有潤肌

胃之三字其餘同上○済世全書癖疾門号參木肥児丸治癖塊発熱王道之剤久服除根同劑後曰按右方治癖疾攻掠兼補多服收功
胡五分 史四分 參 縣曲 各三分 朴 查 各三分 丸 半夏 二分半 蕎 伽匿 各三分

硫盛泥封固置坑中一晝夜穀糖火煨透用 丹三分 右十一味為末粟ヲ粉ニメ煮テ糊トナシ丸ス

又肥児丸○得効方曰治諸痺多因嗣乳嗽食大早或因久患歳有胃虚ヲ動日漸羸肢大不能行髮竪発熱無精神○医林同上○明監亦出之ヲ

連曲各一分 半夏 各半兩

右如常丸ス

○明医指掌有肥児丸別方也

○済世全書痺疾門有加味肥児丸並皆別方也 家傳唯右方也

十一味之一方御調合也

○脾約丸又号麻仁丸○玉機曰仲景曰小便利大便硬不可攻下以脾約丸潤之○医書大全秘結門号脾約麻仁丸治腸胃熱燥大便秘結○又傷寒門

曰治ニ傷寒燥熱糞結ニ大便秘ニ小便自利ニ○私ニ曰格致餘論ニ有ニ腑約丸論一冊溪凝成魚已之腑約之註解ヲ而詳論ニ之ニ又語意而詳述之ヲ於熱葛而気實与西北ノ人稟賦壮實者ニ無ニ有ニ不安若用ニ之於東南人ト与熱盛而気血不實者ニ雖ニ得ニ暫通將ニ見腑愈弱而腸愈燥矣須知在西北ニ以潤結為主ト在東南以潤燥為要学者其可不知此乎云云

麻一分 杏一分 實 朴各三分 芍大四分

右六味煉蜜丸

○化虫丸

馬木香 神麹各五分 杉心 木的各五分 甘矣一分 百草霜三両

右九味方出処未考○医林蒐

連 曲 肉

右四味号化虫丸○医書大全

同上○正傳指掌医鑑 虽

兵 楝 胡粉 白礬

右五味号化虫丸○外臺 硫

木 陀僧 附

右四味号化虫丸家傳預

○按右七味之化虫丸家傳預

茶集載之出処未考

○越鞠丸 或曰麹麹丸○私

按心法指掌雜著入門方考医
監田春全書並皆作越鞠丸正
傳一書作越麴丸〇正傳曰麴
音七細麴也一名芍木丸玉篇
麴与力切麦麴直韵麴音蜀姓
也麴音匚麦麴玉篇麴俗麹字
毛韵麴酒媒亦作鞠今正傳作
麴麴者二字共取麦麴之義乎
鞠亦通麴然則方中指神曲而
作方名者乎〇越鞠按韵會尓
雅越揚也易正義発越揮散之
貴啓太成云内經曰高者因而
越之木鬱則達之之謂也鞠玉
篇右六切推也左傳鞠音芎入
門釈方云鞠鬱也其能発越鬱
結之気方多誤為越麴方考亦
云越鞠者発越鞠鬱之謂今人
門方考以釈越鞠之意見之則
所謂方後解諸鬱之論亦能通
之乎然則正傳作越麴者恐誤
乎〇本綱芎藭條下曰芎藭秋
名山鞠蘭時珍曰丹溪朱子治
六鬱越鞠丸中用越桃鞠藭故
以余名今時珍之意見則越鞠
之二字越桃鞠藭之二味也然
則正傳神麴之意入門方考解
鬱之意俱以雞信未知何説是
非矣〇重按作麴麴者正傳一

書而已諸書皆作越鞠義若取多分則以越鞠為是而可也方釈之意若取近代之理則以時珍之義為是而可也所謂取多分取近代等最可信之如上件乞義次難用不可信之麩麹之以愚意難決定宜受師説耳

曲 俗 精 鞠 冊 各本分

右一九〇方考曰諸痞者此方主之〇越鞠者発越鞠痞之謂也香附理気痞蒼朮消濕痞撫芎調血痞施子治火痞神麹攻食痞此以理気為主乃不易之品也若主濕痞加白芷茯苓主痰加南星海石瓜蔞主血痞加桃仁紅花主食痞加山査砂仁此因病変通也如春加防風芨加苦参秋冬加呉茱萸乃経所謂非降浮沉則呉之寒熱温涼則逆之〇医監曰春曰解諸痞火化痰順気開胸膈〇神穀曰諸般痞結扶脾理胃消積散熱開痞行気〇全書曰治痞結気滞以致胸膈痞悶或肚腹膨脹或咽喉不清或痰気不爽或飲食少思或呑酸不腐宜用此茶清之

〇紫霜丸〇明医指掌曰変蒸

發熱不解并挾食傷寒溫壯汗後不解及胸中有痰癖宿食則吐哯先寒後熱或發痼大便酸臭○方見于医林正傳明監等並皆同之

代赭石　赤石脂各一兩　杏五十粒
巴三十粒　右為九

入門方尺曰紫碧色也霜巴豆霜也私曰俗曰紫元子是也

○太和九　田春飲食門方前曰調理脾胃者医中之王道也方後曰治元気脾胃虛損不思飲食肌体羸瘦四肢無力面色痿黃專神気生血健脾養胃開胸快膈消食順気平和調理之劑

木谷五錢　伽四兩　鈴一兩　狛一兩
月半兩　谷一兩　陳二錢　連一兩
田二兩　實一兩　查一兩
白蔻三枚　龍眼同上并七枚　仜二兩

右為末荷葉一仜煎湯打倉米糊為丸指子大每百丸米湯下

○補天大造丸　田春補益門曰滋養元気延年益壽若虛勞之人房室過度五心煩熱服之神効平常之人年過四十以来服之接補以駐期頤地仙已下有紫河車之制法畧之

也 蒺藜 膝 各一兩
熟地 各二錢 仟 苗 百 伽
各一 枸 五味各七 陳 永 各二
錢 錢 錢
右為細末用蒸熟河車汁并
河車共搗為丸如梧桐子大〇
服春有加減之法可考見
〇補陰丸 正傳曰丹溪補陰
丸一名虎潛丸〇方考虛損門二
曰虎潛丸一名補陰丸治陰分
精血虛損之方也〇虎陰也潛
嚴也是方欵封閉精血故曰虎
潛下畧之又痎气門曰气痎者
拂鬱則翌丸膲大悲哀則不樂
而清宜此方主之〇邪之所奏
常乘其虛拂鬱而翌丸膲大者
肝气乘腎之虛也悲哀不樂而
清者气有所泄也先鑒云肝腎
之病同一治下畧之〇明醫雜
着詳有補陰丸論又備加減法
於方後俱以畧之此方修合之
時宜考見之其畧曰及至老与
天真漸絕只有孤陽故補陰之
菜自少至老不可缺也
百 知 龜 各三 及 靶五 頭
枸 閔 皸 各三 及 靶双
末三錢 宻月丸 五味一及
右為末煉蜜和入猪脊髓三條
和菜末拌極勻九如梧桐子大

〇琥珀丸　医林ニ曰治ス婦人血痕小ク腹腰共ニ相引而痛ミ琥珀　鼠粘子　川烏　膝驚我　朴　皷各一匁　木　桂　沢蘭　射干各半匁　右為レ末酒糊丸梧桐子大

〇又琥珀丸　医林曰治ス婦人血風虚労上熱下冷月水不レ調肌肉黄瘦腹痛或有レ気塊攻沖上琥珀　介　木　芎　風兵各四匁　戎穀各五匁　羌　桂各一匁　木　柴胡　参各一匁　二　童　呉茱　附　牛蒡　射　柏葉各三匁　蝎　各六匁　鼈各六匁　桃六匁

右為レ末蜜丸

〇健歩丸　脚気麻角霜一分　百分　已　蒼各三分　右糊丸塩湯或酒下

〇一方　麻角膝各大百　已　蒼各小百　右挍正傳入門指掌曰春神穀全者等有レ健歩丸倶于前方各別也前方出処後日可考之

〇正傳方如レ左　蒼　甪　地　芎　文　胶字　茱　桂　陳　膝　右為レ丸諸書与二正傳茱味太一同小異可互見

〇来山藜芦丸

藜洴水浸三日 彭焙各一分 我炮一分 麻陳三分 研栢黒焼二朱 右五味糊丸〇自茉山法下傳長曾加部即写雲可秘々々

〇痃虫丸

苦楝良 兵蓋 鬼箭各三錢 胡一錢五分 巴豆一錢 右為丸

〇良姜丸 正傳脇痛門号東垣高良姜湯治因寒心痛大抵同上

〇明監虫処同上 良二分 桂朴各一分 右為末飯丸

〇黄竜丸 即千黄連丸也〇治瘧発黄小便不利〇医書大全

積熱門 酒慫 芙連丸治膈熱解酒毒傷腸胃〇同黄疸門曰治酒疸〇医林曰治酒疸発黄小便不利〇明監虫処同上 連去毛炒一斤 好酒五升 右将連以酒煮乾為度為末水煮麺糊丸食後二陳湯加葛茵等分煎湯送下傷酒下血米飲吞下

〇安虫丸 治虫痛 侯百半生 我各二 畜兵 連 穀各一 膽一分 右丸 掻各二分 永同上 童

〇同方 楊梅皮中苦辛小

招大生用

右糊丸〇已上二方俱出処未考〇正傳有安虫散又宝監用米糊丸名安虫丸其方如左

黄耆　兵　川練　虱　枯凡　右為細末

〇寛虫丸　号往蛔丸〇治寸白虫

楊十戔　参一戔　右為丸炎未詳

〇清肺丸　田春咳嗽門称清肺湯方前曰痰嗽者嗽動便有痰色痰出嗽止是也嗽而痰多者是脾虚也喘滿氣急也〇肺脹嗽者嗽則喘急不得眠者難治之若気血衰敗色咄失音者亦難治也已上三條俱宜後方〇方後曰治一切咳嗽上焦痰盛

苓一戔半　招匿　貴貝　雪各一分　忙戔　関関　丹杏各七味七粒　井三分　右加水煮蛇各一戔合十六味為末丸

〇鎮神丸　治建忘出處未考

忙　地　貴各一戔　苟一戔　芎各一分　弓　田　圭　連

芎各六分　右為丸下出處未考、

○通気丸　奴下出処未考、

地榆　芩　虎杖各三分　木一丹皮二分　芍同上　芎　火右

○益胃丸　按即香砂養胃湯也

○神穀方　前曰飲食冷停積寒涼傷太陰嘔噦腹痛消散病難侵○田春方前曰飲食不思痞悶者胃実也方後曰治脾胃不和不思飲食口不知味痞悶不舒

俟宿倉　杜仲各八分　参　伽一戔七曉分　蜜各五分　芎火右十一味為末蜜丸或糊

丸

○大倉丸　医呑大全曰治脾胃虚弱不進飲食久胃不食亦宜服之○田春曰治噎膈反胃脾胃虚弱不思飲食

白豆蔻　砂各二倉米一升炒

右為末姜汁為丸

○保和丸　方考曰飲食内傷令人悪食者此方主之傷於飲食故令悪食諸方以属茶攻之是傷而復傷也是方茶味平良補剤之例也故曰保和○正傳曰丹溪保和丸治一切飲食所傷胸腹飽悶不安或腹中有食

積癖塊多服日漸消散脾胃虛
者勿服
木香五分 曲 田各二分 莪 陳
蘿 翹 月各一分
右為細末別用生神麹五兩入
生姜汁一小盞水調打糊為丸
如梧桐子大每服三十丸白
湯或清米飲送下〇一方去麥
芽麹有白朮二兩名大安丸健
脾胃消食積最効〇一云脾虛
者服之虛之禍疾如反掌或
以四君子等作湯使送下蓋山
查一物大能尅化食物若胃中
無食脾虛不運不思食者服之
則尅伐脾胃之氣故云然也〇
古今医監有保和丸茉味異也
〇个門方釈曰保脾氣以去食
積

〇抱龍丸 治痰涎壅盛昏憒
昏曚氣魘鳳熱痙癎驚風潮搐及蠱毒中目者壯實小
兒宜時与服之則免痰熱驚悸
之証見正傳明監亦出之〇医監有
牛黄抱龍丸左方加琊珠琥珀
牛黄金箔之四味治論大体同
上今畧之可互見〇全書号神効抱龍
丸与左方茉剤同而分兩少異
也治論抱龍之義抱者保也龍

者肝也肝應東方青竜木一ト生
火謂生我者父母也肝為母心
為子母安則子安況心藏神肝
藏魄神魄既安不徒何生故曰
抱竜丸理嬰兒諸驚四時感冒
瘟疫邪熱致煩燥不寧痰嗽気
急并瘡瘍欲出発搐並宜服之
其茶性温平不僭不槩常服駆
風化痰鎮心解熱和脾胃益精
神大有神効

雄二戔半 辰五戔 竺黄 一 朱 膽星
四 朱 焙 赤蜈 月納 牛 麝 半 朱 另
膽中陰乾而研用 黄 研 恐 太
多 今用
二戔半

右為細末煮茸草膏丸如皂子
大温水化下百日兒每丸分作
三服一歲兒半丸五歲二十丸五歲童
即三十五丸臘雪水煮茸草和丸
充佳也〇一方漿水或新水浸
南星三日煮三十五遍去皮取自
肉切焙炒黄色為末每八一両以
茸草二両半拍破用水二碗煨
火煎至半碗去查旋入南
星末徐ゝ研之入餘茶

散之類茅五

正舌散　医書大全曰治中風
舌本強難轉語〇得効方曰治
中風舌本強難轉語不正神妙
蝎梢去毒茯苓炒一分　龍脳薄荷

焙二
研右三味為末每服二錢
温酒下或擂牙頰亦可○左才
十四清心散可互見矣
○安神散　即辰砂妙香散也
或曰妙香散家傳号安神散
○入門釈方曰木香和氣麝香
通氣經曰通則不痛々則不通
香茉之妙如此○方考曰此安
神正氣而精自固之方也夢中
遺失者宜主之○精氣神人身
之三宝也神役氣々役精三宝
之用也是以神昏則氣蕩々
則精窮神明則氣正氣正則精
固是方也不用固渋之剤以固

精但用人参茯苓神遠志辰以
安神用麝香木香黄芩桔梗其
草山茱以正氣神清氣正則遂
夢不作邪火不起精不必渋而
自固矣内経曰主則下安此之
養生則壽沒世不殆此之謂也
○医林曰治男婦心氣不足精
神恍惚虚煩少睡又曰治酔後
行房酒熱蓋於心経并加辰二
朮茵蔯湯下又曰産後有因血虚
心氣不足驚悸恐怖者宜用蘊
香合丸温童便調服或辰砂妙
香散生地黄當帰煎湯調服○
正傳曰治心虚遺精白濁又曰治

心氣不足虛煩少睡盜汗〇得
効方曰治男婦心氣不定志意
不定驚悸恐怖悲憂慘慼虛煩
少睡喜奴不常夜多盜汗飲食
無味頭昏眩叉治渴証小便澁
數而澁魚有油渭用燈心茯苓
煎湯下叉治夢中遺精每服一
匕虛者溫酒調熱者麥門冬煎
湯調〇医林血汗門黃芪建中
湯方後曰治血汗出汚衣甚如
垢染皆由大喜傷心喜則氣散
血隨氣行故也体虛者宜服此
辰砂妙香散治証同前虛實皆
可服

匿神梵要各一微桔
各五預蜜各三辰三或四分
分分
丼少俎一分右十一味家傳去
麝故不載于右
〇香薷散家方〇一包三分
薷百目淡五十目皓匿各三十目
丼三水今去之右五味
按右方有香薷散香薷飲黃連香薷散
十味香薷散香薷飲黃連香薷散等並皆
治暑熱霍乱吐利腹痛家方亦
治証同前雖然家方之經驗百
発百中可信可秘
〇征虫散家傳之制方也〇
治諸冷虫呕吐心腹痛

○益中散 家傳制方也○治泄瀉腹痛冷利○留下腹不渋而止之劑也○宿食加砂○腹痛甚加木○月用之經驗不可勝計可秘之○恵徳方家傳配剤ホ出之 各三分 陳二ホ一分 匿ホ 伽四分 餘 匿各三分 陳二ホ一分 ホ一ホ 雜着去ホ泄瀉之主方也号ホ苓苟某湯両耳少異也

○生神散 出処未知 恵徳方ニ出之○産後気付ノ某也

蒲一ホ 炒 參半ホ 炒 耳少 右搗ノ耳カキ胡椒ヲ加ヘ毛ヨ

○快気散 気付也 出処未知 蒲婆 葛粉ニ 七日曝各 參 胡椒 各一 右末メカウカイノ耳一ツ

○快気散 治ス婦人頭痛悪血滞下ノ○出処未考 沙酢煮 右為細末

○點頭散 医林ニ曰ノ治ス偏正頭疼ヲ 芎二 芷四 右抹茶清服○偏頭痛連睛痛ニ加膏菊粘子ヲ

○寧嗽散 医林ニ曰ノ神効寧嗽

散治勞嗽諸嗽通用
田五分 玄 令
奴 吉 井 鄉谷二半 芎 梅
各少 右為細末○按醫林前方
有芎三分頭芎餘芎集二本校合之
共無芎家傳除之乎傳字脫之
子未知其是非矣
○三稜散 治虫積未考
稜三 奴 兵
各一 姜二分 芎少 右姜棗加
○黒神散 本処未考気アリ
ニテ目ニ一心トヲクナルニ用ル
廓角器ニ入スリコメ炭火ニテ一日一夜
焼キメ湯ニテモ四物湯ノ奠湯ニテ
モ可也 ○按諸書ニ有黒神散皆各

別之方也○大全曰治食飽吐
血并血妄行口鼻俱出但壱未
矢皆効百中霜取村中焼中鍋
底煤最妙為末毎服一銭糯米
飲調下○明監吐血門出之○
正傳曰治産後悪露不尽亦胎
衣不下攻冲心腹疼痛及血迷
血暈等証
黒豆炒半 馳 竹
各四 蒲 竹 挂 姜
附子 右為末毎服二銭童便
和酒調服○方考曰胎死腹中二
此方主之○胎死者産難経日
而胎死也法以姙娠舌頭青黒

為験是方也蒲黄能逐敗血熟地苟某當改能養新血乾姜肉桂能引新血而逐敗血甘草黒豆能調平気而逐敗気師云此方更治胞衣不下產難血暈餘血奔心児枕疼痛乍見鬼神等蓋諸証皆是瘀血為患故並治之○指掌医監全書等皆有此方可互見

○清心散　医監治吞強不能言語○全書同上○私聞此方正名散加減之方也治幺草全号正名散用此方効如神

青黛　硼砂各二　木片三分

牛黄二分　薄荷三戔右五味為末先以蜜水洗舌上後以姜汁擦之將某蜜水調稀揉舌根上頻頻与之数日効○右弄上正名散可互見矣○全書同上話曰當時延壽翁治舌三十寸計突出右方用之治二十人其証舌三寸計内縮右之方用立得補効矣右両医之治療為表裏

○神仙散　通仙院之秘方也

蓝　紫檀各十　百升　青木香　南木香各二　桑各三　連各二　丁一　及止　加三　虎戔　胡椒一　桂　射

各一味双 右㕮咀〇婦人胎前産後血ノ道気并三專可用也

〇又手肩ニ用之酒三テモ熱湯三テモ一服ツヽ力キタテ、与也

〇又巴豆ヲ加テ八下ニ便ヲ也老少強弱ノ人ニ因テ巴豆ノ多少可有斟酌也〇煉蜜之時延命丹ト云〇丸蜜之時神仙散ト名也

〇又方 苗十三双 紫且十三双 芷一双 分 泉三双 連三双 蔓二双 朱丁 胡椒 圭各二双 蔚三双 木三双 参二双 柏二双 芍五双 朱一分 朱一分

右末ノ毎服四分酒下産前産後

湯或水三下又水三下丸服ス

〇兎血丸 本綱小児服之終身不出痘瘡或出亦稀少臘月八月取生兎一双刺血和蕎麦麹少加雄黄四五分候乾丸如菉豆大初生小児以乳汁送下二三丸遍身発赤紅斑是其徴験也

〇雑方才六 珊瑚代酔三十七

〇屠蘇酒 穆参軍巻曰屠蘇蒿名叟雲賦曰鼇擎愚之飛棟没屠蘇之高鄰始飄舞於圓池終享華於方井杜工部沓滄詩曰願憑金騶鳥走置

錦屠蘇 ニハ、蕃也、廣雅ニ云、屠蘇、平屋也、通俗文曰、屋平曰屠蘇、魏略曰、李勝為河南太守、有屠蘇酒方、蓋取蕃名以名酒、後人遂以屠蘇為酒名、矣、何逊詩郭勤二頃形体、一蘇又木冠亦曰屠蘇、禮曰童子憤奄屋、凡冠有屋者曰屠蘇、晋志元康中商人容者大鄭詵曰、屠蘇、障目覆兩耳、會見鴨兒作天字、百藥府痺腰銅匕者障目、錦屠蘇或作屠廩

○治曰屠蘇諸説多、去鬼氣蘇生神気、此義尤可也

○下學飲食門曰屠蘇白散正月一日飲、此茶也、一人飲之一家無病、一家飲之一里無病、自少飲之、然後至老也

○屠蘇玄朔ヨリ玄冶法ヲ八御相授之正方也

伽吉 撒

一分 今去之

右 吃咀

○度嘽散

草 伽 各六分 細

芸 吉 禾 各三分 圭 一分 将

○白散 伽 各三分 圭 各三分 右

右細末メ酒ニ入

○膏茉 細 禾 撒 圭

将各七分

右雷丸油ニテ煉也

圖如左○ㇾ方一尺四寸也
高廿八寸五分合カヨリ三ヲ一ヲ也
○上書三八白散一貝卜真中書也



○龍腦膏　泰定養生主論十五ニ曰余撰此茉隨身自用及治人每高不倒遂利吉但是上焦風痰熱壅胸膈不利等証並宜服薄苛一ヶ別本二十五ヶ卜ヲ丼二別本二風桔梗　芎藭各二ヶ半別本二ヶ五ヲ砂五粒別本一ヶ五分白蒺藜三十粒ヶ白朮一ヶ右七味勻為細末入ㇾ鶏研細二ヶ及梅花片腦半錢和勻生白沙蜜調摟成膏每以一彈ヲ大許化開潤喉津如年老枯裏痰熱喘滿者以二彈ヲ大許噙潤頓作一嚥遂覺胸中清凉痰延立轉或吐或散大小強弱之人並加此法昔有故由冨長者強健威武忽患喘滿不睡不吐痰病月久腿脚脹裏尽為水腫倚卧眉鬼

困極之至余深閔之謂其人曰非木証也但有一胸膈敗痰宜服衰麥四患者曰非四五人扶持不能登溷遂已之至於用医藥刺於木備受諸苦弁餘漸醫忽吐臭痰患人甚躁木壱口是中前言吾不知攻至今患今則痰敗必成肺癰急請余謝遣未治遂合竜腦膏一劑服未竭醫○千金錠子○四類解毒万病四丹類千金丹異名同方也某劑少異也可互見矣○全書曰解蠱毒蠱毒瘴気百病百般瘡毒皆能奏効

文蛤去内皮山豉二兩 乳香三錢 紅芽大戟二錢 朱砂二錢 射香各二錢

右為末用糯米粥為丸搗千下即成錠子四十个端午日合為妙每服半錠京米磨服及搽患上泊一切菜毒蠱毒瘴気瘧疾及自縊溺死驚死未経宿心頭温者磨水灌入即甦中風百病熱酒服小兒蜜水磨服○私按大全方者五味也得効方者九味也全書方者七味也未知孰是宜受師說焉

寛文六丙午歳

九月吉日　平田長左衛門

開校之

一有磨墨横団

一千濱二束　一荻末一両

一三稜二束　一青苔二束

一二千子二束

石縄二十二筋程九し用ル

十六筋ハ定木ハ用し

右之寺納之

昭和三年ニ百六十三年前