





新刊惠德上目錄

中風

一

痺

二

痛風

三

痿

四

傷寒

五

中暑

六

中濕

七

霍亂

八

癘疾

九

內傷

十

泄瀉

十一

感冒

瘧疾

大頭病

兩感

瘧證

勞役

中寒

傷風

麻木

肩背

痛

痢病 十二
 氣 十三
 痰飲 十四
 咳嗽 十五
 喘急 十六
 附肺痿肺癰

惠德方卷之上

中風門

内經曰風者百病之長也以其善行而數變至其變化乃爲他病

右云如クナハ病風ヲ始テ諸ノ病ト變ル也
 ○九ツ中風傷風ハ云フニ不及風癩頭風歷節風
 風痺癩風之疹破傷風腸風ト悉ク風邪
 病也又瘧痢咳嗽眩暈瘡瘍ニ至ルニ風ヨ
 リ不生云々ト故百病ノ長ト云フ

○九ツ中風ト名ツル病昔ハ眞ニ風邪中リ頭
 痛汗出テ惡風發熱ニ表証アリテ傷寒
 如クテ中風ト名ツル小續命湯ノ類ヲ以テ
 表邪ヲ發散シテ愈療治也近代ニ至テ少
 異ナリアリ河間ハ中年ノ後チ腎水衰ハ心
 火甚ノ心神昏冒ニ筋骨痿テ卒ニ倒レテ
 不知入世ニ風ト云標ト云其本ハ心火ヨリ

生ス上云ヘリ東垣者中風外來ノ風邪ニ非ス
氣ヲ本トシ病ハ人四旬ノ後氣衰テ多中風
証ト成テ心神暗ク卒ニ倒レ故ニ壯年ノ人ハ
全クテ若シ肥盛テ者ハ壯年ニ中間中風元
リ又是形盛ニ氣衰故也上云テ氣虛ヨリ
生ス上丹溪ハ氣虛アリ血虛アリ痰盛アリ西
北ニカニ真ニ風ニ中レリ東南ノ人ハ濕盛テ
痰ナリ痰熱ヲ生シ熱風ヲ生ス上云テ濕ヨリ
生ス上右ノ三先生ノ論如則名ハ中風ト
云テ病因ハ氣虛ト云火上云テ濕ト云テ風ト
云ハス古人ノ風ヲ治スル方ヲ以テ近世中風
ノ証ニ与テ水炭ノ異ナルニ恒德老人醫
學正傳ヲ著ス凡例ニ曰ク凡集錄諸員成
方蓋爲後學設繩墨耳學者不可固執
古方以售今病云 當流ニ專ニ此理ヲ明テ
丹溪恒德ノ遺籍ヲ信スル也

一經臟腑之辨

表証アツテ面五色ヲ加ハ風寒ヲ惡ニ脈
浮ヲ拘急トキツリ不仁ト身トモヲボヘス腑
ニ中レ也是レ真ノ風邪也故ニ古人ノ治法隨
小續命ニ加減ノ風邪ヲ發散シ表解ノ後
氣虛血虛ヲ分テ調フニ
唇緩リ失音シ鼻塞眼昏耳聾大便秘
スル臟ニ中レ也是レ九竅ノ滯ル也多難治
ニツニ化湯ニテ裡ノ滯ヲ通ノ後血氣ヲ調フ
表証モク又裡ノ滯モナク四肢不舉舌強
テ不能言及口眼喎斜ニカハ經ニ中レ也大
秦朮湯ニテ血ヲ補ヒ筋ヲ養フニ
一卒中風ト云ハ暴ニ倒レ氣純ノ不能言至室丹
灌續テ姜汁ヲ進ムニ或ハ蘇合香圓ヲ灌
此時中風モ中氣モ定ムハカクテ醒テ後
脈証ヲ辨シ病名ヲ定ムニ至室丹中風門ニ

入蘂香圓氣門入故至室丹ヲ用之然
上毛又中風ノ治法蘂香圓ヲ牙ニ入レト云
介殊ニ卒ニ倒中風中氣疑キ時ハ蘂香圓
尤モ可也

○中風ハ身温ラ痰涎多ク脉浮リ。中氣ハ
身冷テ痰涎ナク脉沉リ氣中上モラ憂
思恚怒ニ氣逆ノ痰心竅ヲ塞キ心神昏
不関緊急ノ中風ニ似タリ或ハ風癩暴ニ發
口緊眼昏筋牽リ痰涎多ク余ク中風ニ似タ
リ醒テ時アツテ又發ス中風ハ醒テモ悉ク本
復ス久ク養生ノ愈ニ癩疾ハ醒テハ瘡ノ醒
タ分如ク又暴ニ發スハ無性ニテ中惡片
厥酒病皆卒ニ倒中風ノ如ク醒テ後脉証ヲ
モテ辨ス

一 中風脉浮遲ハ吉。急疾ハ凶。沉大ニ滑ハ
卒厥上ス卒厥下中氣ト少異アレトモ皆内
因ナルヨツテ沉也中風ハ外因ノ風邪ヲ故浮也
一新久之辨

○初テ中風ヲ患レ表証アス小續命ニ表
ヲ發シ有裡証者ニ化ニテ裏ヲ通シ然
後千烏藥順氣八味瀕氣人參瀕氣ノ類
ヲ以テ氣ヲ順シ痰ヲ退シ日々不愈口眼喎
斜シ手足不遂者大秦朮四物等ニ加減
血ヲ養ス初リ風邪ノ急証ナク手足
漸ク力弱ク或ハ筋牽或ハ痛ニ或ハ皮膚不仁
肩臂麻痺シ舌強リ口眼喎斜スルハ血虛腎
虛ノ内因也然レモ中風ノ証ニ近代ノ來故
中風門ニテ治スル也大秦朮湯類也

一 半身不遂ハ左ハ死血カ少血ナルニ四物ニテ血
生ス死血トス桃紅ヲ加テ血ヲ行スベシ
右ハ痰ト氣虛トナルニ痰ニ陳湯氣虛ハ
四君加減ノ姜汁竹瀝ヲ加フベシ

一肥人ノ中風ハ左右モ三痰ナリシ貝母瓜蒌湯
ニ加減ノ治スシ

一瘦人ノ中風ハ陰虛火熱也四物ニ膝苓栢
ヲ加ヘ痰涎アラスニ陳ヲ合フ竹瀝姜汁ヲ加シ
一丹溪治法之妙傳

○卒中風醒テ後小便少正不可利蓋之發表
攻裡津液耗減ス故ニ尿少熱退キ止汗者
小便自能行。卒ニ倒ル時藜香圓類ニテ
醒テモ氣甚虛ノ精神不正者參耆者ニテ
可補氣血俱ニ虛者大補湯ニ加減ノ可用
有痰者二陳ニ姜汁竹瀝ヲ可加フ。中風
遺尿ハ氣虛也參芪ニテ可補。中風
表証ヲ小續命ニテ散シ裏証ヲ三化ニテ下
邪既ニ尽テ後大秦苳湯羌活愈風湯ノ
類ニ加減ノ可用。下月ニ二度計リ微汗出
下月ニ三度計リ大便ヲ可下表裡無鬱滯
様ニ下也

△小續命湯中風表証寒熱ニ先ツ是ヲ用テ
發汗ヲ出則不可服ハクイラキイワシキヤシキヤカ已桂クニ苓クニ杏クニ梟クニ
甘クニ麥クニ麻クニ去クニ參クニ各クニ一分クニ風クニ附クニ炮クニ七クニ
右二貼三分ノ水二盞生姜片五東一枚核一枚去テ
入八分ニ煎テ服ス是古方ノ煎ヤウ也今下
貼ノ分兩モ小服ニ調フ水數モ應ニ姜東モ
其分別アルニ詳ニ口傳スヘシ。精神恍惚ト
ホルニ遠神ヲ加。心中煩ハクニ驚ハクニニ犀ノ末
煎萊ニカキ立テ用ユ。骨節熱ノ痛ニ去附
倍クニ芍クニヲ冷痛ニ倍クニ桂クニヲ。嘔逆腹脹ニ加ハクニ半
倍クニ參クニヲ。臍寒テ下利共去ハクニ已クニ苓クニ倍クニ附クニ
加クニ木クニヲ。自汗アラス去ハクニ麻クニ木クニ加クニ木クニヲ。身
疼ニ加ハクニ羌クニヲ。失音ニ杏クニヲ加フ。無汗惡寒
共麻風杏ヲ倍ス。有汗惡風ヲ桂
芍クニ杏クニヲ倍ス

右

△人多煩氣散 風邪有表時用 烏藥 煩氣上
同但し氣虛中風之元二可用汗多不用之
參 姜 各二 甘草 桔 枳 木 陳
去 麻 節 各五 葛 半 右 姜 末 薄 荷
ヲ入テ煎ス

△貝母瓜蒌湯 中風表裏急証 寸方四肢麻木
ヒリメキスク三口嚼ハ痰証也可用之 貝 姜 末
星 炮 煎 風 羌 栝 枳 連 陳
去 木 半 薄 桂 甘 炙 威 天 花 粉 等
分 右 姜 末 入

△擗鼻法 卒中風不知久牙關緊急ニ
菜 咽 二 入 下 ア 々 ハ 細 皂 等 分 右 細 末
管 三 入 鼻 中 二 輕 及 下 吹 入 嚏 ヲ ナ 三 進
不 嚏 死 ス

△八宝回春湯 諸虛不足ニ而經絡拘急痰
涎壅盛 飲食不進 可用血氣虛微ニ風氣
アルニ用ユ 白芍 五 歸 三 木 粉 一 小
生 半 熟 地 甘 桂 烏 姜 附 炮 參
麻 節 芥 巳 莎 陳 去 杏 風 芍
磁 神 各 一 沉 川 烏 炮 各 半 右 姜 末 入

△白氣散 中風中氣口眼歪斜半身不遂或
心下痛ヲ灸去痰涎氣去嵐ヲ 木 半
苓 甘 各 三 沉 炙 多 陳 龍 骨 並 各
天 木 姜 蕪 蘇 瓜 各 一 右 姜 末 入

△灸法 風入臟眼黑不言神思乱ニハ百會
七 鬢 際 二 入 五 寸。風 池 二 穴 各 三 項 鬢 際
際 中 去 各 各 二 寸。大 椎 二 七 第 一 推 骨
骨 上。肩 髃 二 穴 各 二 七 上 岐 骨 七 寸
二 指 之 並 第 一 指 下。間 使 二 穴 各 二 七 掌
後 三 寸 手 腋 陰 之 經。三 里 二 穴 各 二 七 膝 眼 之
下 三 寸 肘 骨 外 大 筋 之 內。手 足 不 遂 肩

井一穴 各三 曲池二穴 各年 肘曲骨文頭
 風市二穴 各年 腿外兩筋之間立二兩手
 下三寸中指之頭 各年 手三里二穴
各三 曲池在肘手陽明經之絕骨二穴 各七
七壯 曲池在肘手陽明經之絕骨二穴 各七
壯 外關在肘上三寸骨之端 各七 左右之口傳 各七
 阿是之灸 各七 口眼喎斜六聽會二穴 各七
 耳前口張陷丸處 各七 頰車二穴 各七
 耳前口張陷丸處 各七 頰車二穴 各七
 下二寸二韭菜地倉一穴 各七 口喎 各四
 分微下動脈アリ 各七 口喎 各四
 音二八支溝二穴 各七 腕後三寸手少陽
 經。巨闕 七壯 鳩尾下寸
 中風不治之証
 口開 心純 手撒 脾純 眼合 肝純 遺尿 腎純
 傳薪 肺純 已上五臟之純証也此內二証
 見其猶治之 但遺尿口開二証甚 思
 証也 豎直其沫插頭上 筋直視不知久
 面赤 糝 方如汗連珠如之面也青
 黑已上皆惡証也

痺門 二 附麻木

經曰風寒濕三氣雜至合而為痺 今治之
 右三寸內多少見分別之 風氣勝者風痺
 云又行痺上云是即醫方大成之風門也
 風痺也行痺名付タル心 痺 處不定他處
 移上云義也 寒氣勝者寒痺上云又痛
 痺上云此則痛風也 痺 痛依之痛痺上
 云之 濕氣勝者濕痺上云又著痺上云 痺
 處 重者 重之痺也 古方三五痺上云 皮
 肌肉筋骨痺アリ 今皆不分 風寒濕三
 氣多少之分 去邪 退之後 血氣 養
 筋骨皮膚之可調又中風門內 三 方如
 外邪 ナク 肉 ヨリ 生 ス 痺証アリ 是血氣 虛

或酒濕傷引發之偏二外邪之散入カラス能
々塵實ヲ分別ス

○麻木ト云者アリ筋ハ繩ニテ木ノ初テ解タ
ル如クヒリメク也又麻木内ヲ分ツ麻ハヒリメ
スル丹溪曰麻氣虛木濕痰死血也

○麻痺風敗寒痺浮ヲ緩緩瀉瀉ノ乳死血
浮ヲ濡ハ氣虛

○麻痺大テ痺處不足或頭痛身熱スル
風痺也ハ參頰氣散ニ加減ノ風ヲ散ニ氣ヲ

瀉俄ニ發リ大暑外邪九ハ漸々痺ハ内
因九ハ邪ナク麻葛ヲ不可用又風邪ア

リモ頰氣散ヲ用テ汗出ハ即モ麻葛ヲ去
レ。寒痺濕痺ニ性料五積散ニ加減ノ邪

可去汗アラズ麻ヲ去レシ是モ俄ニ發ス証
ノ也又病ニ五積ノ類不可用。血氣

滯テ手足痺或ハ拘攣スルハ三痺湯ニ加減

可用續仲皮ヲ去テ蒸汁桂風細
參苓酒ニシテ甘芫酒ニシテ生地各二右姜東ヲ入

○兩手麻木脈濇氣虛散大參中柴小

外小甘炙白芍小五味小瘦人六散中
芎小桂小加少肥人六半小苓小陳小加少

○十指麻木八胃中ニ濕痰アリ或死血アリ陳
蒼桃白木各紅小加少身冷手指冷

附少加少。腿脚麻木ノ重キハ氣虛ノ按濕ヲ
可升提散大散中甘少升小紫小貴小

泥小五味中紅小芍小。冷ニ桂小加少
○肥人六苓中半小生薑多加少

○肩背痛痺及腰痠痛大太陽ノ經ノ風ヲ
去ル散羌大獨大風中藜中葛大

芎大甘少。脈遲及身冷ニ桂中加少
甚久附加。熱スルハ芎中加少

沙カサ小コ加カ下カニニアアスス威イ升シヲヲ去キテテ酒サ栢ク
已イ中チウ通ツウ小コ膝セツ加カフフ婦フ人ニ六ロク飯ハン尾ビ中チウ酒サ
紅コウ小コ加カフフ腫シュ其キ八ハチ腹ブツ沃バク中チウ七シチ小コ
沒モク小コ加カフフ

○脈マク數スウ八ハチ瘀ウ血ケツアリアリ桃トウ中チウ紅コウ小コ鼠ス尾ビ中チウ
將マカ小コ沒モク加カフフ太タイ便ベン下カララ將マカヲヲ可カ去キルル

○脈マク瀉シャ小コ短タン氣キニニ汗カン出デテテ歷リキ節セツ痛ツウ八ハチ酒サ後ゴニニ
中チウ風フウ也ヤ酒サ栢ク大ダイ威イ中チウ酒サ炒シヤウ中チウ蒼ソウ朮ジツ

中チウ甘カン陳チン少ショウ去キ白ハク芍シャク小コ葛カク中チウ右ウ生シヤウ姜キヤウ入ニル

○頭カウ痛ツウ身シン熱ネツ脈マク數スウ實ジツニニ或シ腫シュ或シ痺ヒテテ痛ツウ
甚シハハ風フウ熱ネツ表ヘ邪ヤ也ヤ敗バイ毒ドク散サンヲヲ用ユユユニニ惡アク寒カン

甚シクク無ム汗カン者ヤ先マカツツ神シン湯トウヲヲ用ユテテ出デ汗カンヲヲ惡アク
寒カン退タイニニテテ發ハツ熱ネツ許コ甚シ者ヤ敗バイ毒ドク散サンヲヲ用ユユユ

○四シ肢シ冷レイ痺ヒ痛ツウ或シ八ハチ腹ブツ內ナイ痛ツウ脈マク遲チ寒カン濕シツ也ヤ
生シヤウ料リョウ五ゴ積シツ散サンヲヲ可カ用ユ一イツ身シン冷レイテテ脈マク絶ケツ唇シン
青セイクク面メン黑コク者ヤ可カ加カ附フヲヲ

○九ク痛ツウ風フウニニ八ハチ新シン久ク虛キョ實ジツヲヲ分ブンテテ可カ治チ新シン病ビョウハハ
多タハハ外ガイ邪ヤ也ヤ久ク病ビョウハハ多タハハ血ケツ氣キ虛キョ也ヤ或シ八ハチ痰タン或シ八ハチ
瘀ウ血ケツ

○灸シウ法ホウ外ガイ邪ヤアアスス不フ可カ灸シウ邪ヤ退タイ後ゴニニ可カ灸シウスス
孔コウ最サイ二ニ穴ケツ各カク三サン七シチ壯ソウ腕ワン上ジョウ七シチ寸スン半ハンニニアアリリ手テノノ太タイ陰イン

ノノ經キヤウ也ヤ○外ガイ關カン二ニ穴ケツ各カク三サン七シチ壯ソウ腕ワン後ゴ二ニ寸スンアアリリ手テ
ノノ小コ陰インノノ經キヤウ絡ラク也ヤ○肩ケン二ニ穴ケツ各カク二ニ七シチ壯ソウ省ショウノノ端タンシシ

臂ヒヲヲ牽ケントトククホホムム處チナナリリ○豐ホウ隆リョウ二ニ穴ケツ各カク三サン十シウ壯ソウ外ガイ
踝クワンノノ上ジョウ八ハチ寸スンアアリリ足ソクノノ陽ヤウ明メイノノ經キヤウ也ヤ此コノ外ガイ中チウ風フウ

門メン痺ヒ門メン見ミ合カフテテ可カ灸シウスス

痿門 四

夫人身ノ陰血衰弱而不養筋故ニ手足痿テ
手足不遂也素問ニ風論痺論痿論比別
立篇近代ノ醫書ニ多ク痿門ヲ不立中
風門ノ中ニ混雜メ出方故ニ俗醫誤テ以テ

風藥治痿丹溪是ヲ懼テ痿証ノ治方ヲ
著メ曰ク痿見所不足者乃陰也血也トス
又日有濕熱有痰有血虛有氣虛又有死
血者有食積妨礙升降者ト云

右云ヲ如キハアニタノ病因アリ所詮外邪全リ
ナレ故ニ治風某ヲ用テ禁スル也中年ノ後
一身漸々ニ瘦筋骨弱ナリ行步難遂手
難舉左ノ脉虚小ナルハ心肝腎ノ血液衰乏
スル也壯年ノ人全房勞過度メ手足或ハ偏

痿或ハ左右トモニ痿也手ハ如素足痿腰
ヨリ下ノ瘦ハ腎虚也一身等痿ハ血虚也
四物ニ栢酒サレキツ中トキツ仲姜製ス炒ハヤトヤ門中
五味小酒サレキツ酒浸ハ酒炙モス小トキツ桃少
加ハ生姜ヲ入煎服ス。大便秘共潤腸丸

ニテ可通小便滯滞ス可去仲ヲ。食少
者栢門酒サレキツ膝地ヲ減ニシテ小甘ガ加フ
○冬時ニ足冷及痿方ノ足偏ニ冷ハ桂中加フ
○甚冷脉遲トスハ附ヲ加フ

○脉濡數ニ手足熱メ無力濕熱也卷中
活酒サレキツ柴中柴中風中巳酒沢小栢酒
芥酒サレキツ小芥蒼中生地中右姜ヲ入煎ス

○大便結共加將ヲ。氣弱キ人ニ右方用ニカス
○肥白人身重手足力弱行步難遂氣
濕痰アリニ陳ニ西君ヲ合シ蒼中酒中栢中
沃小老中加ハ生姜ヲ入ルヘシ

○脉沉微ハ氣虚四君ヲ可倍ス
○脉滑大ハ痰ニ陳ヲ倍ヘシ
○瀦八濕蒼芥中沢中倍ヘシ

○手足痿處重メ或ハ痛ニ昼ハ輕ク夜ハ重ク脉
乳ニ瀦八痰血也四物ニ桃中紅小ヲ加テ
血ヲ行スヘシ
○怯弱ノ人食少メ肌肉衰筋骨弱ク脉數テ

行步艱難右關脉弦或弱二桑瀉胃ノ氣
 弱キ也補中益氣湯ニ酒桶ハヤシ酒ハヤシ已ハヤシ可加
 食積アツテ腹堅ク或ハ微シ痛ニ手足力十
 キ八平胃散ニ枳トシヤク小麴トシヤク中トシヤク藥トシヤク半トシヤク
 陳トシヤク中トシヤク麥トシヤク少トシヤク加フ。氣虛ニ脉弱ナラ時ハ
 補中益氣ヲ用テ中氣ヲ補ヒ平胃散ニ加
 味ネトリ友ク用ニシ又枳木丸ニ陳トシヤク中トシヤク麴トシヤク中
 藥トシヤク中トシヤク木トシヤク少トシヤク加テ丸ニ補中益氣湯ニテ
 送下スル可也

△大防風湯足痿或ハ麻痺或ハ腫脹ニ或ハ冬
 病得痢後足弱行歩不遂治ス
 熟地トシヤク酒トシヤク白芍トシヤク仲トシヤク姜製炒トシヤク者トシヤク
 風トシヤク各トシヤク一トシヤク木トシヤク半トシヤク羌トシヤク參トシヤク膠酒トシヤク甘トシヤク各トシヤク
 芍トシヤク附トシヤク炮各七トシヤク右姜棗ヲ入若小便緩川
 滯ラハ去トシヤク仲トシヤク執トシヤク去トシヤク附トシヤク
 一灸法痿証ハ外邪全クチキ病ナル故ニ因灸

法專ニスル也曲池間使三里純骨風市
 已上中風門ニ詳ナリ。偏歷二穴各三腕一
 後三寸手ノ陽明經絡。木女中二穴各二
 脛中横文中動脉ノ處。三陰交二穴各三
 内踝ノ上三寸。陽陵泉二穴各三膝下一
 寸外踝ノ上七寸三里一寸計外三内三按
 バ筋アリ。漏谷二穴各三内踝上六寸足
 太陽經。賢俞二穴各五十四椎下兩傍
 各一寸半腰已下瘦テ筋骨痿弱ニ灸ス
 陰蹻二穴各二内踝下一

傷寒門 五 附中寒傷風

夫冬月道途衝片ニ寒氣ニ中レ一晝身
 痙痛厥冷レ口噤不知人是ヲ中寒ト云フ
 無汗惡寒レ頭痛レ項強發熱レ手足
 微冷是レヲ傷寒ト云フ

中寒ハ胃氣大ニ虚スルニ因テ卒ニ寒邪ニ
中レ故ニ急ニ理中湯或ハ姜附湯ヲ用テ
寒氣ヲ温散スヘシ胃氣ノ虚甚キニ理中湯
寒邪ノ甚キニ姜附湯甚ク四肢厥冷ニ
腹中絞痛唇青鼻氣冷ハ丹田ノ穴ニ干壯
五十壯或ハ百壯可灸手足燂ルヲ為度
傷寒初工日ハ先ツ汗ヲ發スヘシ麻黃湯
輕ニ汗神湯ヲ可用汗快出ハ隨証別藥
可用○汗スル太過ナルキハ心下悸動ニ
或ハ振搖シ或ハ筋惕トスチツキ肉瞤ト肌
肉ヒタク或ハ蠅ヲ出ス邪甚キニ汗スル不
及則邪不退裏ニ入テ難治ノ証ト九邪ノ
輕重ヲ視テ汗ノ多少セシ簡要也
○有汗惡風頭項痛發熱ス是シ傷風ト云
傷寒者脉浮緊傷風者脉浮緩傷寒ハ
表實ノ無汗傷風ハ表虚ノ有汗故桂枝湯
用テ汗ヲ止ムヘシ

冬中寒即チ病ヲ傷寒ト云春至テ温亦ツ
發スルヲ温病ト云夏至ニ熱ニ變テ發ス少
熱病ト云醫家ニ皆傷寒ト云内經曰人之
傷於寒則為病熱之雖甚不死若兩感於
寒者不免於死矣云々是寒傷ナルト云
トモ温熱ノ病ニ亦スル也麻黃湯冬月春
初ニ可用春未及ニ夏月ニ汗神湯麻ヲ
去テ用ユヘシ熱キ時麻ヲ用ヘハ黃連狂悶
ヲ發ス○汗出テ惡寒少退キ發熱頭
痛セハ敗毒散ヲ可用○二三日過テ表熱
未解寒熱往來頭痛ノ小便色黄ナルハ
半裏ニ入也是シヲ半表半裏ト云又漸ク
裏ニ入テ蒸外ト内ヲ蒸如ク發熱ニ小
便ノ色猶清ルハ未裏ニ不入也是シ半表
半裏也小柴胡湯ヲ用熱甚ク大便秘ス

ルニハ大柴胡ヲ用ユ四五日過テ熱裏ニ入テ
惡寒ハ悉ク退キ熱甚ク服下ニ汗出テ渴
小便黄ニ木便秘スル此裏熱也大柴胡湯
ヲ用ユ。大便數日不通腹滿潮熱狂言喘急
其ハ小柴胡湯ニテ可下小便少ク手足心并
服下不潤者ハ裏ヲ攻ヘカラス

○身熱ノ反テ衣厚クシハ内寒アリ 芍薬小
柴胡湯 桂枝 大 姜 中 甘 少 東 以煎服是
表熱裏寒ヲ和シ解スル藥也内ノ寒去
後小柴胡湯ニ桂 少加テ用ユ

○身寒テ及テ衣ヲフニ脱フアリ内ニ熱アル也
白朮加人參湯ヲ用先ツ内熱ヲ去テ後猶ラ
表冷ハ桂枝湯ニ加減ノ用ユ但ニ白朮用元
ニ六口傳アリ

○表証汗出テ後惡寒スルハ虚証也 芍薬大
甘 附 小 桔 小 木 小 甘 小

○裏証下ノ後惡寒ノ脉微ナルハ表裏俱ニ
虚スル也 芍薬中 桂 中 甘 小 姜 小 木 小

○汗下後不解身熱ノ時々惡寒 渴者白朮湯
○潮熱上六未申ノ時發熱スラ云邪胃入也

○脉浮ニ潮熱シ又少ニ惡寒スルハ小柴胡
湯ニ桂枝ヲ加

○汗後潮熱ニ惡寒セズノ脈滿喘スルハ小柴胡湯
○下後潮熱ニ木便又硬クハ大柴胡湯

○汗下後不解潮熱ノ衣ヲ循床ヲ摸リ喘急
スルハ小柴胡湯ニテ可下ノ脉弦ハ生ク

○脉瀯ニ直視スルハ死ス

○自汗トハ汗ス藥ヲ服セサレトモ自汗出ラ云
初發ニ自汗アリテ惡風者傷風也桂枝湯
ニテ汗ヲ發シ汗出テ不止 桂枝 大 芍 中
甘 小 附 小 木 小

○陰証四肢厥冷自汗スルハ四逆湯

○汗多ノ渴スル柴大サシ中チ參中シ枳中チ甘小カン

○自汗ノ小便數者チ芍大シ甘小カン

○自汗レ身熱ノ不渴柴大サシ苓中レイ半小ハン參小シ桂小ケイ芍中シ

○四肢ニ汗アル多肢汗上云ラ大便結レ結證言シノ

○睡中ニ汗出テ覺覺則止止盜汗上云雜病ノ

盜汗ハ虚ナリ傷寒ノ盜汗ハ邪半表半裏

ニアリ盜汗アルテ微レ惡寒共柴大サシ苓中レイ芍中シ半小ハン桂小ケイ甘少カン

○一身ニ汗ナク頭ニカク汗出少頭汗上云頭

汗下下後頭汗出テ胸滿小便不利寒熱往

來スル柴サシ中チ桂枝小ケイ芍中シ枳チ小コ姜カウ少シ

○頭汗出テ惡寒スル柴大サシ苓中レイ參小シ

○頭汗不止者難治頭汗出テ喘スル毛難治

○心下滿テ按者不硬不痛痞上云桔大キョウ半ハン

○小便不利心下痞者五苓散

○心下硬ノ痛ヲ結胸上云下スコト阜阜ノ為結實也

○按痛サ不結胸上云不按痛ヲ大結胸上云結

○結胸ニ有熱渴共小柴胡ニ加實實ヲ

○渴多飲水因心下留結胸上云アリアリ半大ハン

○熱甚脉沉緊テ心下痛者大結胸也大陷

蜜丸ニ湯ニ下ス

○熱証_{心下}按痛_{脈滑}小陷胸湯

○下後_{心下}硬痛_{結胸}也未_下心下滿悶_{心下}

結胸_ニアラス邪胸_中ニ入也_{小柴胡}ニ枳_枳

加_テ用_ニ如_味効_ハ小柴胡_{小陷胸}ニ方_合

枳_枳加_スヘシ

○腹脹滿_ノ痛_三木便_{不通}者_小兼_氣三_下

ヘ_シ下_ノ後_腹滿_ノ時_三痛_久桂_芍中_炒甘

少_芍小_陳小

○小腹硬_ク小便_{自利}ニ木便_結ノ或_ハ狂_スハ

瘀血_ノ証也_{桃仁}兼_氣湯_三可_下ス

○小腹硬_多小便_{不利}瘀血_ニアラス_{小便}利

ス_ニ五_苓散

○腹痛_按者_痛止_ハ虛也_芍大_桂小

甘_小生_姜

○按_弥痛_ハ實也_桂芍_中甘_小將_小枳_小

○洩利_ノ尺_脈弦_而痛_者桂_芍中_炒甘

小_芍中_陳小_生姜

○陰証_ノ腹_痛足_冷自利_ニ脈_微而_面赤_不

惡寒_ニ表_熱裏_寒也_姜中_附小_參小

芍_中甘_小

○咳嗽_表証_時ノ咳_ハ發_散ノ藥_三愈_ニ

惡寒_少退_手發_熱ノ咳_者芍_中陳_小

柴_中芍_小半_芍小_甘少_柴小

○汗_過肺_虚ノ咳_共參_小桔_中桂_中甘

少_五味_小貴_小芍_中生_姜

○喘_急表_証未_解喘_共汗_下後_力上_毛亦

表_可發_十神_湯ニ去_麻ヲ可_用ニ

○汗_後潮_熱ノ不_惡寒_腹滿_木便_實ノ喘_急

者_小兼_氣ニ_可下

○陰証_ノ喘_急脈_沉微_或伏_者理_中湯

○多_ク飲_水小便_{不利}腹_滿ノ喘_急共_芍中_枳小

中_サ半_サ中_サ五味_サ小_サ細_サ小_サ姜_サ小_サ桂_サ小_サ甘_サ小_サ苓_サ中_サ陳_サ中_サ

○喘滿ノ直視_セ譫語_ススル死ス

○汗_テ如_ク油_ノ不止_ル者_ハ死ス。頭_テ汗_ヲ出_テ喘_ム不止_ル死ス

○嘔吐_シ渴_ム多_ク水_ヲラ_シ三_ニ嘔_スル_ハ苓_ヲ大_ニ半_ニ中_ニ

陳_中。半表半裏ノ嘔ハ小柴胡

○裏_ニ熱_シ心_ヲ下_ニ急_ニ鬱_シノ嘔_ハ大柴胡_ニ下_ス也

○陽邪_ハ漸_ニ入_リ裏_ニ渴_ス也。脉_ハ弦_ニ嘔_ハ元_ハ半表

半裏也小柴胡_ニ加_フ

○汗_ハ多_ク渴_ム共_ニ柴_ヲ大_ニ苓_ヲ中_ニ甘_ヲ小_ニ參_ヲ中_ニ枳_ヲ中_ニ

芍_ヲ中_ニ門_ヲ中_ニ。有_リ汗_ヲ渴_ム脉_ハ洪_大或_ハ長

ニ_テ發_シ熱_シ共_ニ白虎湯。自利_ノ渴_ム小_ニ便

清_ハ下_ニ焦_リ虛_ニ寒_也。姜_ヲ中_ニ甘_ヲ大_ニ芍_ヲ小_ニ桂_ヲ小_ニ

○脉_ハ沉_シ實_シ煩_シ躁_シノ渴_ハ共_ニ枳_ヲ大_ニ芍_ヲ中_ニ知_ヲ小_ニ甘_ヲ

○汗_ハ下_ニ後_ニ煩_シ躁_シノ渴_ハ脉_ハ洪_大者_ハ白虎湯_或

益元散。脉_ハ微_シ上_ニ五_ニ苓_ヲ散_{桂_ヲ減_シ枳_ヲ}

加_フ。衄_ハ血_ヲ表_ニ邪_ヲ下_ニ汗_ヲ熱_シ鬱_シノ衄_ハ夫_レ脉_ハ浮

緊_ハ麻黃湯_{浮緩_ニ汗_ヲア_ラ桂枝湯}

○脉_ハ微_シ而_ハ衄_セ共_ニ苓_ヲ大_ニ芍_ヲ中_ニ甘_ヲ小_ニ

○口_ハ燥_シ舌_ハ乾_シ漱_キ水_ヲ不_レ欲_シ飲_ム。衄_ハ者_ハ經_中ノ

血_ハ熱_也犀_ノ角_ノ地_ノ黃_ノ湯

○足_ハ冷_シテ無_シ汗_ヲ強_テ發_スル_ハ血_ハ動_乱ノ口_ハ鼻_ヨ

リ_テ出_ス血_ヲ難_ク治_ス。衄_ハ者_ハ頭_汗出_テ身_ニ汗_ヲナク

或_ハ汗_ヲ出_テ不_レ至_リ足_ニ皆_ハ死_ス。譫_語ト_ハ色_ハ微_シテ

言_フ倫_ナ子_シ狂_言ト_ハ声_ハ高_シ盛_シ而_ハ身_ハ躁_シトク

タ_ハコ_ト也。譫_語身_ハ微_シ熱_シ脉_ハ浮_大ナ_リトク

○身_ハ逆_冷ノ脉_ハ沉_細ナル_ハ日_ノ内_ニ死_ス。譫_語言_ハ

直視_シ喘_滿ス_ルハ死_ス。下_痢ス_ルモ死_ス

○傷_寒五_六日_ニ大_ニ便_秘シ_テ小_ニ便_赤シ_テ身_ハ熱_シテ

譫_言ス_ルハ大_ニ柴_胡ニ_テ思_フ也。譫_言ノ煩_シ

不_レ眠_ル白_虎ニ_テ枳_ヲ加_フ。下_痢譫_言ハ燥_榮アリ

外_ニ兼_テ氣_ヲニ_テ可_ク下_ス

婦人傷寒發熱月水來昏明^レ夜^レ譫
言^レ是^レ熱入血室^{ト云}小柴胡^{ヲ用}

在^レ口^レ邪熱至極也熱甚^ク脉大^ク渴^シ在^レ
言^レス^レ六黃連解毒湯^{ヲ用}不止^レ兼^レ氣湯

脉沉實^ニ表証有^テ在^レ共^ニ大柴胡湯

小腹硬^{カク}大便不通^シ在^レ桃仁承氣湯
吐下^ノ後煩渴^ノ在^レ共^ニ白虎湯^{ヲ用}多^ク辰^{ヲ加}
狂言^ノ直視^{スル}死^ス

發癍^下太早^ニ因^テ熱^氣胃^ニ入^テ癍^ヲ
發^ス下^リ太遲^ク熱^氣胃^ニ留^ツ
癍^ヲ發^ス下^リ陽証^ニ設^テ熱藥^ヲ用^テ

胃^有久^シテ癍^ヲ發^ス下^リ赤癍^ハ五^死
一生^ニ黑癍^ハ十^死一^生又^ニ赤癍^ハ十^死
一^生黑癍^ハ十^死一^生

赤癍熱甚^ク咽^痛玄參升麻湯

發癍面赤^ク譫言^{脉大}血^刃或^ハ絶^也

參^大生地^大附^炮將^中甘^少

自利^ト八藥^ニテ攻^下カ^レトモ自^瀉泄^{スル}ヲ

云^レ脉微細^ハ瀕^實大^ハ逆^也譫言^{直視}
下利^ハ死^ス下利煩躁^ノ不得^レ眠^或下利^ノ
厥^不止^者死^ス下利四肢厥冷^ノ無^脈者^氣
氣^海丹^田各^七壯^或可^灸々^ノ肢^不溫^肢
不^出者^死ス

下利後重泄也黃赤^ニ身熱^シ脉數^シ滑

八宿食也小^廉冷^ニ可^下清^水下^レ心^下
痛^口燥^モ下^スシ自利^ノ渴^共白虎湯^不
渴^者理^中湯^但熱^証ハ^不可^用之^ヲ

陽証自利^下膿血^者犀角地黄湯^下後

熱不解^脉數^而下^膿血^犀角^地黃^湯

四肢^上八四肢逆冷^ス云^レ初發^言四肢
逆冷惡寒^ノ脉沉細^ニ下利^ス八陰厥^上
四逆湯^{ヲ用}手足指頭^冷六理中湯

戰慄 戰外ノ事也慄ハ心ノ病也病
解セントス時キ正氣ト邪氣ト
也桂 中ニシテ大ニシテ木 小ニシテ甘 小ニシテ生薑ヲ入
發汗後仍シテ發熱ノ振ニシテ真武湯
下後振ニシテ桂 小ニシテ木 小ニシテ生薑ヲ入
甘 少 生薑 少

蛔厥 蛔ト蛇ト同シ長虫也厥ハ逆也胃中冷
虫逆上ス也或咽中上ニシテ或嘔吐ニ虫出也
身ニ大熱アリト寒藥ヲ用ニカス睡中ニ姜
炒鳥梅ヲ加テ煎服ノ虫定テ後小柴胡ニ
加減ノ熱ヲ退クニ

陽毒ハ初發ヨリ邪毒甚キ汗下スレテ輕ク
熱毒深ク成テ陽毒ト成ル或ハ誤テ熱藥ヲ
服ノ陽毒ト成リ或ハ陽証ニ誤テ灸治シテ
陽毒トス其証必ス發狂ノ高熱ニ登リ
衣ヲ奪テ走り發斑出テ錦紋ノ如ク鼻

燂舌 燂舌焦黑脈洪大五日ハ可治七日ハ不可治
陽毒淋麻湯ヲ用ユニシテ紫藥ヲ服スニシテアタハ
スハ布ヲ新汲水ニ漬ニシテ胸ニ搭類ニシテ取換
カスベシ

陰毒ハ初發ヨリ寒毒甚ク陰毒ト云又熱
証ニ寒藥太過ニシテ變テ陰毒ト成ル其証ハ
面黑唇青厥冷ニ身疼テ打々方如ク腹
中絞痛或ハ自利ニ咽不利虚汗出テ嘔吐
脈沉微三日ハ可治五日ハ不可治ニシテ真武湯
或ハ中ニシテ桂 外ニシテ中ニシテ甘 小ニシテ椒 小ニシテ雄 小

酸魚 小 水煎ニシテ雄ノ未シカキタテ用テ衣ヲ
厚蓋テ可出汗ヲ或ハ葱熨ノ法ヲ以テ臍下
温ニシテ續テ四逆ノ類ヲ用ユ慰ニシテ肢不温者
不治又慰ノ不醒ニ海關元各ニ三可灸ニ
手足温テ即チ醒者生ク手足不温汗出
不知久ク死ス

陰証怯弱ノ人寒ニ感シ發熱不食ノ數日
後俄ニ不知人言語乱ニ面青齒黑必ス死
証トス。脉沉細四君ニ附數日ヲ加ヘ煎シ
ニ入水ノ上ニ置テ少時ノ熱毒ノ性ヲ殺シ結
温ニ服ス脉ヲ精神回然ノ後別藥ヲ用ヘシ
又下後二五日ノ妻言シ脉沉細足冷ハ氣
微口乾ニ面黒クハ補中益氣湯ニ參多ク倍
竹葉ヲ加フ

一傷寒不浴之証

證言シ身熱脉洪大生ク。身冷脉沉細
死ス。發斑ニ陰脉ハ死ス。發斑ニ自利ハ死ス
下利脉實ハ死ス。咳逆ニ耳聾ニ脉散死ス
吐衄血脉浮大ハ凶。厥逆無脉某ヲ用テ通
脉ヲ漸ク續ク生ク暴出ルハ死ス。結胸
ノ如クニ飲食能進ニ時々下利シ舌胎アツテ
臍痛 脹震ニ引テ其人及テ靜ニ六載結

云死ス。夜ヲ猶寐ヲ撰テ熱内ニ結テ肢肢生ク
瀆ハ死ス。咳逆不止者死ス。舌卷囊縮ハ
死ス。亦甲青キハ死ス。口乾キ舌黒ハ不治
。汗出テ如貫珠者死ス。喘不止死。發黃
亦及メ黒クナルハ不治。目張目陷ハ死ス。汗後
嘔吐メ水禁不欠凶。腹大ニ滿下利スハ不治
。傷寒七日以上大ニ發熱スハ難治。汗後汗
不止發汗者汗不出發熱肢躁疾狂言ニテ
不能食者 是レニ死ト云フ

一傷寒ノ禁戒

服藥止痛ニ中ニ即後服ヲトム。瘧後少瘧
邪ヲ食セヨ飽テ不可食ス。魚鳥諸肉油膩
物ヲ不可食。早ク熱ヲ勞レ頭ヲ梳ルナカレ
。音息ヲ使フナカレ。多言スルナカレ。早ク足ヲ
洗フナカレ。早浴スルナカレ。躁怒思慮
ヲ忌ム。燒肉ヲ食スト渴ヲ生ス

魚鮮ヲ食スハ黃ヲ發ス〇麩ヲ食シハ熱
〇黃瓜ヲ食スハ再發ス〇茄子ヲ食スハ
生ス〇生菜ヲ食スハ顔色不復也〇菜
ヲ食スハ目明ヲ失ス〇飲酒太早ナク狂
悶ス〇白酒ヲ飲ハ浮腫ス

△麻黃湯 脉浮緊ニハ頭痛身痛ヲ惡寒
發熱ハ無汗喘スヲ治ス汗出則後服止
麻黄根節 桂枝一分 杏仁十
ニテ衣ヲ覆テ汗ヲ出ス冬及春ノ初ニ
可用ニ夏至ノ後用ユ六斑黃狂罔ヲ發ス
ソ蓋シ麻黃桂皆性熱スル故ソ稟受性
弱ノ人ハ可斟酌ス

又感冒ノ輕証用ニハカラス神湯ヲ可用
△桂枝湯 脉浮緩ニハ發熱ハ惡風自汗出
鼻塞ニテ治ス桂枝 芍藥 甘草 一
右一服トシ生薑三片大棗二枚ヲ今煎ス

今ハ一劑ヲ分テ四五服ニス故ニ生薑厚之其分
別アル此モ亦ク冬及春ノ初ニ可用夏至
前ハ芍藥一加ハ夏至ノ後ニ知一芍藥一
加フ但レ膏ハ依人可依脉

△小柴胡湯 傷寒四五日寒熱往來脉弦
實ニハ心中煩悶ニ腹痛ニ或ハ嘔ニ邪半表半
裏ニ有テ治ス柴胡 芍藥 枳實 芍藥 各一
甘草 半斤 右姜棗ヲ入

△大柴胡湯 傷寒內熱大便難ク熱甚ク
治ス柴胡 芍藥 枳實 芍藥 各二 將 各二
實 一 右姜棗ヲ入

△白虎湯 汗後煩渴メ脉洪大ヲ治ス
石膏 一斤 知母 六分 甘草 二 右水煎ス
口燥渴不止或ハ赤斑出ヒ 參 二 加テ
人參白虎ト名ク後太便不固熱不
者ニ 蒼朮 六分 加フ 九ツ白虎湯ハ春ノ表

及至夏月二可用三陽明胃ノ經ノ熱ヲ去ス
胃熱ナキニハ不可用

△小柴氣湯 六七日大便不通腹脹潮熱狂
言又喘急ヲ治ス少モ表証殘テ惡寒スル
ニハ不可用 大 各七 朴 實 各三 右煎
服ス太便利共ハ後服ヲ止ム

△大柴氣湯 大便不通腹脹煩渴ノ證言潮
熱アリテ脈沉實ナルヲ治ス 特 各七 朴 各
實 各一 右煎 右煎又主粗入芒ヲ下
沸又服ス太便利共ハ後服ヲ止ム此柴樾
熱甚ト云フトモ素ヨリ胃弱キ人ニハ可對歟

△挑仁兼氣湯 外証悉ク解シ小腹急滿シ
大便黒ク小便不利此瘀血アリ是可用可下
大 各三 桂 各一 甘 各一 桃 各一 皮尖ヲ
右水煎去粗入芒ヲ一二沸又服ス
△犀角地黄湯 熱血分ニ入大便黒ク或ハ切

血出テ脈微ニ又狂ヲ發シ黃ヲ發ス此瘀血ノ証
ナリ可下 不行者瘀血ト九此瘀血熱ヲ去也
芍 生地 牡 犀 各等 右水煎又犀角ノ
末カキ立テ用若シ犀ナキ時ハ升麻ニ代ヘシ

△黃連解毒湯 汗下後大熱不止煩渴乾嘔呻
吟又寢テアタハサルヲ治ス 連 各一 芩 各一 柏
梔 各二 右水煎ス或ハ小柴胡ニ合メ汗
下ノ後ノ大熱ニ用コ

△加減涼膈散 汗後熱不退煩渴全ヲ治ス
下後餘熱ニモ用膈中煩胸ヲ治ス也 翹 各一
梔 各一 竹葉 各半 芩 各半 甘 各一 右

△升陽散火湯 下後元氣乏シ虛火不退撮
空 擦床ノ證言スルヲ治ス如小便不利者ハ不
治 參 各半 柴 各半 芍 各半 芩 各半 木 各半 甘
陳 神 各等 右姜枣入 ○大便燥結
煩渴ノ證言セハ大黃ヲ加○大便溼セハ升

米 炒加フ

△益元湯 身熱頭痛 不煩面赤 欲水不得
入口 此元氣虛弱 二虛火上升也 脈濡
弱 大心 芎藭 附炮 參 中 甘 小
姜 小 附 中 連 知 五 味 小 芎 藭 人

△小陷胸湯 下ス 其氣 結胸 心下 硬
痛 治ス 連 三分 半 二分 姜 二分 半
右水煎ス

△大陷胸湯 大結胸 心下 高 手 不可 近
治ス 時 芒 半 甘 遂 一 右 先 大 煎
ヲ 煎 入 去 相 芒 入 一 沸 入 棗 未 入 服 大

△陽毒升麻湯 陽毒 發 癰 狂言 或 吐血 治ス
升 麻 二 升 芎 藭 射 干 各 一 升 甘 一 升 右
△玄參升麻湯 發 斑 咽 痛 治ス
玄 參 升 麻 各 等 分

△五苓散 煩 躁 渴 小便 不利 或 大便 自 閉
治ス 沢 一 兩 半 苓 木 各 一 兩 桂 一 兩
右 末 湯 三 下 或 姜 棗 加 煎 服 熱 甚 者
挂 去 テ 姜 加 フ

△益元散 天水 散 压 云 治 煩 渴 利 尿 身 滑 右 六
甘 一 升 末 湯 三 下 夏 月 可 用 三

△姜附湯 中寒 及 即 病 傷 寒 陰 証 四 肢
厥 冷 脈 沉 細 或 下 後 又 發 汗 身 冷 不 得
眠 治ス 姜 五 附 一 枚 右 水 煎 ス

○下利 厥 逆 脈 絕 三 六 甘 加 姜 三 倍 ス
○利 止 暎 不 出 參 三 加 通 脈 四 逆 湯 下
名 多 而 赤 三 葱 白 加 嘔 六 生 姜 多 加

△理中湯 即 病 自 利 不 渴 寒 嘔 腹 痛 吐 衄 衝
上 或 吐 出 不 止 治ス 參 木 姜 甘 各
分 吐 後 八 去 木 生 姜 多 加 下 利 脈 沉

遲 又 微 十 者 炮 附 加 フ
△四逆湯 即 病 自 利 不 渴 及 陰 証 四 肢 逆 冷

脈沉細又遲身痛之治 附 一校 薑 五 右煎服少汗可出

△真武湯 即病後証脈沉細身痛或汗發 蘇 一校 薑 五 右煎服少汗可出

スル過多ニ筋惕肉瞤ト筋肉ト多ク治ス 芍 生 姜 附 炮 去 皮 各 三 木 各 三 右 下 利 共 去 芍 姜 二 加 フ 嘔 吐 附 去 生 姜 倍 ス 小 便 利 共 芍 姜 去 〇 咳 ア 五 味 姜 細 各 一 加

△生料五積散 感寒濕頭痛身痛惡寒 無汗嘔吐之治又寒濕二傷之腰脚痺痛 芍 各 三 桂 枝 各 三 枳 實 各 三 陳 皮 各 三 桔 一 兩 蒼 朮 二 兩 右 姜 葱 各 三

△人參養胃湯 外所傷風寒內所傷生冷 增寒壯塊頭痛スル治ス 蒼 朮 半 枳 實 各 一 橘 紅 七 分 藜 蘆 各 一 參 各 半

甘 一 兩 右 生 姜 入 或 烏 梅 加 フ 一 兩 感 經 曰 兩 感 於 寒 者 死 蓋 表 裏 俱 病 頭 痛 發 熱 惡 寒 表 証 口 乾 煩 滿 渴 者 裏 也 表 裏 証 俱 見 表 裏 不 能 治 故 死 也 然 三 眞 受 壯 實 久 服 藥 不 誤 則 間 可 愈

△東垣方 藜蘆解利兩感神方 大 菴 活 湯 上 各 用 之 七 二 三 救 上 云 菴 風 獨 已 苓 連 白 朮 甘 各 三 細 分 知 芍 生 地 各 一 右 水 煎

△中和吳室飲 此方兩感ノ神方也 脈 洪 大 九 菴 風 芍 甘 細 芍 生 地 柴 葛 芷 膏 右 等 分 姜 枣 黑 豆 入 微 汗 出 三 後 表 証 多 殘 不 敗 毒 散 裏 証 多 殘 大 便 秘 共 大 柴 胡 寒 熱 往 來 嘔 吐 了 小 柴 胡 大 熱 不 解 解 毒 湯 証 三 隨 之 加

了 小 柴 胡 大 熱 不 解 解 毒 湯 証 三 隨 之 加

了 小 柴 胡 大 熱 不 解 解 毒 湯 証 三 隨 之 加

了 小 柴 胡 大 熱 不 解 解 毒 湯 証 三 隨 之 加

減之可用

一瘧証

太陽經中風又寒濕感之瘧又太陽証發汗過多而瘧者又下瘧者如此瘧治之可ナクテ壞証因之成スリ皆汗下過多之損血津液ヲ亡ノ如此ノ

身熱無汗惡寒之脈弦長急急之口禁眼開足掣急之甚則搐搦及張スル剛瘧上云

身微熱汗有之不惡寒脈遲濡細弦三日閉或六搐搦スル柔瘧上云此ノ二證全ク似癰々身軟ニ時ニ醒テ復作瘧ハ強直反張ノヲヨリサメテ

葛根湯無汗惡寒スル剛瘧ヲ治ス葛根湯三桂枝芍甘各二右羌東多入煎服之衣ヲ蓋ヒ汗ヲ出ス

桂枝加葛根湯有汗惡寒甘生柔瘧ヲ治ス桂枝芍甘各二生薑三葛根四右東多入

防風當歸散發汗過多ヲ發熱之頭搖口噤及張スルヲ治ス此卷盡去風也風散芍地各等水三煎ス

如聖散剛柔ノ二瘧俱ニ用之神方也羌風芍芷柴芍甘散烏半苓等右羌多入煎之竹瀝姜汁ヲ加フ

口禁大便秘スルニ加大黃○無汗剛瘧者麻蒼蒼ヲ加○有汗柔瘧ニ桂枝芍加是發汗過多ノ瘧ニ可用

一勞復并餘証陰陽易

病愈後早起頭梳面洗身之勞心之勞多言スハ勞復ス愈後酒肉菓麪及雜物ヲ食之或飽食スハ食復ス

○瘥後百日内気が全不復房事者女勞復成テ死ス

△枳殼梔子湯 治勞復發熱 枳殼一升 梔子三分 右水煎之

△麥門冬湯 治勞復發熱渴 氣絶 麥門冬一分 炙甘草一分 粳米一升 右前入口嚼者ニ灌之

△大柴胡湯 食復腹滿 證言脈實 治方ハ右ニナリ

△白朮散 食復勞復及病後氣弱 不復用 白朮一分 芍藥一分 炙甘草一分 枳實一分 右三味 炮 右姜末ヲ加フ 或瓜 藜麥ヲ加フ 吐瀉ニハ白朮ヲ入 右ニ方補海懸隔也 虛實ヲ辨ノ可也

△竹葉石膏湯 病後煩渴不止 治方 竹葉二兩 石膏二兩 麥門冬一分 炙甘草一分 右三味 煎之 取汁 分服 八分 門 半 參 甘 各 三 分 半 四 分 半

竹葉二兩 右粳米ヲ今テ煎之 膏ヲ去テ名 竹葉湯 脈弱ニ用ユ

△梔子烏梅湯 治病後虛煩不得眠 梔子一分 烏梅一分 右生姜竹葉 豆豉ヲ入

△溫膽湯 病後虛煩之不能 心中忪悸 治方 枳實一分 橘紅一分 茯苓一分 半夏一分 右姜竹茹ヲ入

右姜竹茹ヲ入

△逍遙湯 勞復及陰陽易ヲ治ス 男病愈 婦ニ交リ 病ヲ陽易ト云 婦病愈テ 男ニ交リ 病ヲ陰易ト云 參知連 甘生地 滑 韭根 柴犀 竹青 等 姜麥久煎 梔子 燒末ヲ今テ服ス 粘汗出テ愈ニ 棍檔男病 女ノヲ用ユ 女ノ病ニ 男ノヲ用ユ 口傳ナリ 一感冒

傷寒溫病熱病ノ外ニ 四時感冒ノ輕証ナリ

鼻塞、頭痛、惡寒、發熱、如傷寒、但輕微、在少儀、俗是、之咳、氣、ナ、ト云、フ、無汗、不、十神湯、香、換散、百解散、之類、ニ、微汗、ヲ、出、シ、汗、出、テ、熱、ス、ス、參蘇飲、敗毒散、之類、ヲ、用、テ、寒、熱、往、來、脈、弦、ナ、ス、小、柴、胡、ヲ、可、用、汗、ナ、ラ、ズ、正、氣、散、之、類、ヲ、解、ス、或、正、氣、散、桂枝湯、ヲ、各、ノ、可、用、

△十神湯 四時感冒頭痛寒熱之汗ナキヲ治ス
麻黄 芍药 甘草 茯苓 升麻 赤芍 陳皮 薄荷 羌活 独活 中蒲 枳壳 加

△香蘇散 治証同前但十神湯ヲ輕キニ用ニ
香薷 蘇合 各二 陳皮 甘草 茯苓 右姜葱心ヲ介
○頭痛ニ芍药 芷ヲ加

△消風百解散 感冒頭痛發熱鼻塞声重ク咳嗽喘急スルヲ治ス
麻黄 去 荊穗 陳芷 各一 甘草 右姜

葱ヲ入。咳甚キニ烏梅ヲ加

△參蘇飲 感冒頭痛發熱咳嗽甚重涕唾稠粘スルヲ治ス 膈塞ヲ快クシテ瀕ス
參 蘇合 木 半 前 各三 枳壳 炒 甘草 陳皮 去白 各二分 右姜東ヲ加
○ニ盛ニ六ニ木ヲ去

△敗毒散 一名人參敗毒散 傷寒感冒頭痛壯熱惡寒及咳嗽鼻塞甚重ヲ治ス
羌活 独活 柴前 枳壳 參 苓 芍药 甘草 右生姜薄荷加 熱甚 舌乾 六分 枳壳

△不換金氣散 傷寒感冒瘟疫寒熱ヲ治ス 及速方ニ出テ水ニシテ得利ニ身汗ヲ治ス
朴 炒 陳皮 白 藿 半 蒼 各一 甘草 姜 東 各三

一瘟疫 冬寒ニ感ニ春ニ至テ温病ト云ハ傷寒也 瘟

疫上云疫癘也

○疫癘ハ四時モ三ニハ疔瘡ニ春月ニヤル者也故
癘上云春ノ傷寒ヲ温病上云温ノ字也疫
癘ノ癘病上云癘ノ字也

○癘疫ハ老少男女ノ般ニ病也天下ニ流行
スルヲ大疫癘上云或東國或西國或一州
一郷ハヤルヲ小疫癘上云悉ク運氣ノ鬱發
因テ發ス傷寒上同ノ大ニ汗ト大ニ下スカラス
敗毒散ヲ用テ毒ヲ可散猶瘰疬証ニ隨テ
加減スヘニ感冒閉ト見合スヘニ温毒上云ニ發斑
出ルニトアリ疹ノヤル上云大男各癘毒也故ニ
小兒ニカキラス疹ヲ病トアリ敗毒散ニ介
考キョウ木キ風フウ荆ケイ生地ジチヲ加フヘニ熱甚
升シヨウ葛カクヲ加フコト咳嗽ノ心下痞咽痛トニ
玄參升麻湯ヲ用ユ方ハ右ニアリ○疫癘ノ
人ニ逢ニ雄黃ヲ研テ水ニテ鼻孔ノ中ニ

塗ニ

一大頭病 亦云

頭大ニ腫ニハ升麻葛根湯耳ノ前後大腫ニ
小柴胡ニ方俱ニ羌キョウ風フウ荆ケイ苛カ桔コヲ
加ヘシニ熱甚キニ酒炒ノ苓レイ連レンヲ加スニ食
後ニ藥ヲ服スニ○冬月及春ノ初メ頭面腫
ヒキカイト背ノ如シ故ニ蝦蟇蠱上云又頤ヨリ
腫多シ鵝鴒蠱上云治法皆同ニ猶温疫ト
下同也温疫門ト見合治スニ

中見名門 六

夏月炎暑ノ時深堂ニ納涼ノ病多シ申見者ト
云陰証也頭痛惡寒或手足痛ニ或肌熱ニ
無汗是陰寒皮膚ヲ冷ノ周身陽氣伸發
其故也温散ノ藥ヲ可用○行人農樵日
中ニ勞役ノ炎熱ニ所傷ノ病多シ熱上云苦ニ

頭痛と躁熱皮膚大ニ熱シ大ニ渴シ汗大ニ出テ
甚則昏ノ不知人此陽証也天熱皮毛ヲ傷也
皮毛八肺ノ主ル也故ニ寒ヲ禁ニテ暑熱ヲ解シ
甘温ニテ肺氣ヲ養フ令肺虚微ニ清暑益
氣湯洪實ニ白虎湯

○中暑既ニ死者冷水ヲ用ユヘカラス熱湯ヲ用テ
臍中ヲ熨ス生姜或ハ大蒜ヲカニテ灌ク令

△香薷飲 中暑腹痛心煩霍亂吐瀉ヲ治ス
藿香 二ツ 蘇合 二ツ 香薷 二ツ 白豆 一ツ 右水煎ス或ハ為
細末湯ニテ用ユ香薷散ト名ク氣虚者多
服スカラス此藥性温ニ能ク暑氣ヲ治レ
宿食ヲ消ス

△黃連香薷飲 天熱ニ傷レシヲ治ス前方
ニ加テ連ニ半ヲ加フ

△清暑益氣湯 脾胃虚弱ノ人長夏ノ濕熱
感レ四肢困倦トクタヒレタルク精神短少身

熱或ハ渴或ハ不渴自汗出テ大便溼小便
黄ニ脈大ニカチキ用ユニ參 各一ツ 蒼朮 各一ツ 茯苓 各一ツ 白朮 各一ツ 甘草 炙 各五分 右水ニテ煎ス○汗多者著ヲ倍ス

△白虎湯 中暑者渴甚ヲ治ス○脈虚ニハ參加
方ハ傷寒門ニ見タリ

△五苓散 中暑煩渴尿少身熱頭痛スヲ
治ス方ハ傷寒門ニ見タリ○恍惚ニ辰砂加
辰砂五苓散ト名ク

○暑月途中ニテ常ニ用テ元氣ヲ世ニ暑
ヲ消スニ參 一分 朮 一分 白朮 一分 白苓 一分 各一ツ 五味 一分 知母 一分 陳薷 一分 右水ニテ煎ス

卑地ノ湿ノ深キ処ニ居レ雨中ニ旅行シ水ヲ
涉リ辛苦ノ汗衣ヲ沾ク類ハ皆外湿也
酒ヲ飲ム菓温麪ヲ食レ冷水ヲ飲ム類ハ
内ノ湿也

○外湿ハ癢痺腫疼痛ヲナス内湿ハ中滿
泻利ヲナス此皆諸病ノ病因ナル各其病ノ
門ニ治法ヲ著ス

○脉沉ヲ緩沉ニ細微ハ皆中湿也
○脉滑數ニノ尿赤淡引飲スルハ温熱也知
相滑

○脉遙瀉ニ小便自利ニ大便溏瀉自汗ノ身
痛ハ湿寒也木 朴 桂

○中湿ハ身痛ニ致黄ニ大便快ク小便澀脉
沉細ニノ緩五苓散用方ハ傷寒門ニアリ

○風湿ハ肢躄重痛ヲ難轉側額ニ汗多ク
惡風身腫テ白晡ニ病其脉浮除風湿羌活

湯ヲ用ユ ○温濕ハ暑湿相搏テ胸ニ汗多
頭臂ガ如ク腫冷テ妄語ス寸脉濡ニ弱
尺脉小ニノ刺汗ヲ斂スヘカラス

△茯苓白朮湯 熱甚キ手ハ白虎湯 蒼朮加
或ハ清暑益氣

△除風湿羌活湯 風濕相搏テ身痛ヲ治ス
羌活 七分 風 升 柴 各五分 藿 蒼 各一
分 右

△防己黃耆湯 風濕脉浮ニ汗出惡風身重
痛ヲ治ス已 甘草 一分 木 一分 右 蒼朮 一分
右 羌活 一分

△二陳湯ニ酒芍 羌 蒼 通ヲ加テ風ヲ
散レ湿ヲ行ス

△茯苓白朮湯 濕温脉沉緩尤ニ用ユ 苓
姜 炮 甘 炙 桂 枝 等 分 右

△平胃散 生冷ヲ食レ濕麪ニ傷レ脾胃不和ヲ

腹中飽悶スルヲ治スサヤ五葉姜子去白各
小朴製陳三小半
甘多二右羌藁ヲ入。食不消嘔逆スルハ
麩等藥半樹ヲ加フ

霍乱門 八

心腹俄カ痛嘔吐下利寒熱頭痛眩暈カ是
霍乱上云フ 多人食傷ニ因テ生ス先カ後カ風
寒暑湿ノ氣ニ感シ先カ脾胃ヲ損シ飲カ食不
消胃脘ニ滯テ胃氣ノ升降ヲ隔ツ故ニ心腹
絞痛又外邪多無ノ無病者人俄カニ霍乱
シ猶以テ食傷也飢食々過多ニ難消
食物吐泻ニ悉ク出テ腹痛止ム者也中焦ノ
氣食ノ滯シ因テ塞ル故ニ脉沉伏シ足冷也
先カ塩湯或カ麩等ヲ煎シ足ヲ漬メ温ムカ腰カ背カ
下ヲ漬スモ木モ可也又布カ熱湯ニ漬シ臍下
可温ム

○脉結促代上モニ霍乱ニハ非患脉ニ縱代脉伏
脉也トモ吐泻ニ食物出テ中焦クシク次第ニ
少カ脉續皆ハ治スニ次第ニ脉微弱ニテリ
漸々ニ遲ナルハ必ス死スカ

△治法身冷腹痛甚ク脉沉細或ハ伏スルハ
桂ニ姜ニ中カ良カ小カ半カ中カ陳カ中カ生
姜ヲ入カ煎ス。身冷カ甚カ久カ附カヲ加フカ
吐少定テ理中丸ヲ可カ与カフ

○暑氣ノ霍乱ニハ香薷飲ヲ用ユ身熱カ黃
連香薷可也熱湯スルハ五苓散ヲ用ユ
○冬月ノ霍乱ニハ理中湯ニ生姜多々入テ用ユ
寒甚カ久カ附カヲ加フ

○吐セカ下カ不利カ霍乱腹痛甚カキ
乾霍乱ト云塩湯ヲカ与カハ咽カヲ羽カニ探テ
吐逆サスカシカレカニテモ不吐カ又塩湯ヲ与カハ
可吐ス理中湯ノ類ヲ早ク与カフハカラス吐少定

瘧疾傷寒發分難

○傷寒八翌日ノ朝脉ヲ診ニ朝サスルトイ
ト毛脉ノ動數モサニ減スルナレ瘧ハ翌日ノ
朝脉ノ動數皆退テ沉チリ也毛無病ノ
時ノ如シ又傷寒ハ初發ニ發熱甚ト人
ト毛湯世ス瘧ハ最初ヨリ咽乾チ伸死也
初發ニ汗ナク先ツ汗ヲ可發

○寒ヲ感シ惡寒甚シク汗ナク桂 中陳大
小サシニ大カキ小麻中羌中蔞中姜
葱入心汗ヲ出シ過スヘカラス

○惡寒ハ少ク熱甚ク汗ナク柴 大蔞中葛
大枲中甘少升小陳中 右水前ニ脉弦
實ナラハ汗ヲ發スヘカラス

○汗出テ寒熱前ノ如ク或ハ毎日或間一日ヲ
發スルニ清脾湯ヲ用エ柴 芍青枳
枳 芩果半甘炙 右等分姜枣入

○渴甚シク漿 半ヲ去テ參 小門 中
小極中極小極中天花中加る大便
結共將ツ加フ。左ノ關脈弦實ナラハ此ホ
倍ス。右關脈弦實ナラハ天ヲ倍ス

如此ニ發四發ノ後病勢弱ク成テモヲ知
ハ七室飲ヲ可寫但シ胃氣虛弱ノ者ニ先
參 木 二服与テ後七室飲ヲ可寫フ

常 木 菓 楨 甘 炙 枳 陳 各半
右酒ト水ト入合テ煎又水ニテ煎テ酒少加
服スルモ可也但シ寒多ニ酒ヲ加ヘ熱多ニ不

如空心ニ令服ス熱茶湯ヲ下日八忌ヘシ胃氣弱
ニ是ヲ用ユ六老瘧下左ノ。暑瘧熱甚ク汗
出テ渴シ脉洪大ス人參白朮

○久瘧ニ無汗ニ陳二 蒼 大 白 木 中 葛 中
芍 小 柴 中 加

○有汗脉弱ナラハ參 中 藜 中 枳 中 桂 小

三寸兩傍各五分。偏歷二穴各七壯腕後三寸
頭指ノ上リ。譙譙二穴各七壯六椎ノ下
兩傍各三寸。京骨二穴各十壯足外側大骨
下白際ノ際。臨泣二穴各七壯足小指次指
本節ノ後外側。勞瘡二穴各二壯膏肓二穴各二百壯
。脾俞二穴各五壯三里二穴各三壯。瘧母二穴
門二穴各五十壯或ハ左ヲ百壯右ヲ五十壯又

内傷門 十

惡寒發熱ノ病ニ外傷アリ内傷アリ詳ニ辨ム
ニ外傷風寒ハ有餘ノ病也寒熱併作スト
云テ寒ノ内ニ即チ熱氣アリ熱氣皮毛ノ上ニ
テ鼻塞病漸クニ増スリ

。内傷飲食勞役ハ不足ノ病也寒熱間作スト
云テ寒キヲ去テ熱氣來ル熱氣蒸々ト云テ
蒸々如ク肌肉ノ間ヲ熱ス也口鼻ノ氣短ク
息弱シ肢中不和ニノ口味ヲ不知大小便或
秘シ或ハ澹ス或ハ心下痞或ハ胸中痛ム

。内傷不足ト云テ補藥ヲ用シ宿食鬱痰
アリハ補藥ニテ胸中滿悶スルノ不足ノ中ニ又
有餘不足ヲ可分ク勞倦ノ脾ヲ傷ルハ真ニ不足
也食傷ハ不足ノ内ノ有餘也先ツ傷物ヲ下然
後脾胃ヲ調スシ輕キハ平胃散ニテ食ヲ消ス
シ稍重キハ枳朮丸ヲ可用甚重ク心腹絞痛云
備急圓ニテ可下。温熱ノ食物ニ傷ラレハ枳實
道滯丸ニテ下スシ。下ノ後參苓白朮散用テ
脾胃ヲ可和ス

。内傷外感兼作者アリ補中益氣湯ヲ用ス
シ但シ外感重キハ先ツ正氣散ニ羌蘇ノ
類ヲ加テ邪ヲ散シ内傷重クハ正氣散ニ枳
朮ノ類ヲ加テ食ヲ消シ内外ノ邪去テ惡
寒ハ止ミ只微シ發熱シ汗少シツ出テ補中

益氣ヲ可用真氣弱ク口鼻ノ氣短ク食少ク

右ノ寸関ノ脈弱ニ四君子ヲ主トメ加減スヘシ

○食傷ノ氣口ノ脈緊盛ニ胸塞ノ食氣ヲ惡ニ或

吞酸ス又頭痛發熱タル外感ハ身痛内傷

ハ身ニ痛ナシ

△補中益氣湯 食傷勞倦ニ因テ惡寒發熱ノ

汗出ヲ治ス如食前痰滯アス取法後可用ニ

蒼朮一ニシシ 參一ニシシ 木 各七 炙 陳 各五分

柴 各三分 姜 東シ入右ノ方ニ惡寒發熱ノ

証ヲ見テ内外因ヲ明ニス即傷寒トナシテ仲

景カ方ヲ用ヒ治メ誤ルヲ見テ東垣先生補中

益氣湯ノ方ヲ製ス發熱頭痛ノ脈數或ハ

微細ニシ管カキニ可用ニ如氣口ノ脈緊盛ハ宿

食アルヘシ不可用之。咽乾カハ葛ヲ加フ

○頭痛ニ葛 芷ヲ加。項痛ニ藜 細シ

如ノ痰アス半 生 姜ヲ加フ。心下痞悶ニ

連ヲ加。腹脹ニ實 枳 木 縮ヲ加

○大便閉澀ニ枳 芍ヲ加。寒月ハ桂 生

姜ヲ加。腹痛ニ白芍 甘ヲ加。寒アス

桂ヲ加フ

△四君子湯 脾胃不調飲食不進治ス參 朮

各二分 炙 右水三テ煎ス

○如汗出テ小便利スル者ハ苓ヲ去テ薑ヲ加

○嘔吐ニ藜 縮ヲ加フ。浮腫ハ木 薑 姜

東ヲ加フ。氣アス參ヲ去リ木ヲ減ニ麴 炒

青ヲ加フ。傷寒飽悶共 實 枳 木ヲ加フ

△枳朮丸 心下痞滿ヲ治シ食ヲ消シ胃ヲ強ス

枳 朮 各二分 炒 右末ノ枳湯ニ荷葉ヲ漬

頃ノ葉ヲ去リ其湯ヲ以テ晚ノ粳米ヲ浸シ

煎湯ヲ以テ糊ニ煮テ丸ニ米湯或ハ白湯ニテ

下ス。虛弱ノ人食不消心下痞スルニ陳 枳

加フ。飲食太過ニ心腹滿悶スルニ 枳 朮

各二分 炒 一兩

藥一兩加フ

△枳實導滯丸 温熱ノ物ニ所傷痞滿悶乱

ヲ治ス 大 兩 實 炒 麩 炒 各 半 兩 苓 各 半 兩

連 木 各 三 分 右 糊 三 九 分

△備急大黃丸 食傷心腹卒痛ヲ治ス 大

巴 皮 膠 及 姜 各 等 分 右 未 之 煉 蜜 三 九 分

今 秘 大 兩 巴 兩 姜 半 糊 三 九 湯 三

下 是 備 急 口 上 秘 二 各 三 分 用 止 口 傳 了

參 苓 白 朮 散 脾 胃 弱 食 不 進 或 嘔 或

浮 スル 治 ス 太 病 愈 テ 後 用 テ 脾 胃 補 功 極

妙 也 參 苓 木 山 扁 姜 汁 三 浸 二

枳 甘 蕒 蓮 各 二 右 細 末 之 東 湯 三

下 或 姜 東 之 煎 服 ス

○灸法 脾胃虛冷ノ食難消或ハ食後急墮

ニ或ハ能食ノ瘦ルニ可灸○脾俞上ノ椎下

兩傍各一寸半○胃俞十二椎下兩傍各一寸半

○腎俞十四椎下兩傍各一寸半○陽明七椎

下兩傍各三寸○意舍上ノ椎下兩傍各三

寸○章門脐ノより季肋ノ端側ニ卧シ下ノ

足ヲ伸上ノ足ヲ屈臂ヲ挙テ取ル

以上完各一處五十壯百壯ツ可灸ス

○斷門 鳩尾ノ下兩傍各五分○中脘脐上

四寸○膈俞七椎下兩傍各一寸半

○三里○維骨

以上完各一處三三壯五壯ツ可灸ス

泄瀉門 上

水穀ヲ下スラ泄瀉トシ膿血ヲ下ス利病也

泄瀉ニ寒熱アリ小便清白ヲ不澁寒ナリ

小便赤ノ澁ハ熱也食物ノ穀肉不消屯モ

不變下ハ寒ナリ消化スルハ熱ナリ身冷脉遲

寒身熱ノ渴レ脉數ハ熱○腹痛ノ瀉瀉ノ

後痛少減スハ食積水之得腹不痛温ナリ
主方木 苓 芍 各一分 陳 甘 五分
右姜東之入煎ス或細末采湯三下ス
尤可也

凡ノ前藥三六止リカス者ナリ粉藥丸藥三
テ能ク止ル者ナリ右ノ方ヲ用テ余之益中散ト
名ケ暴卒ノ泄瀉ニ寒熱ヲモ不分用ユツ

冷証ニ姜ヲ加ヘ熱ノ瀉スルハ葛粉ヲ加ヘ
食積ト之ノ腹痛ニ枳實麩ヲ加消スニ

食ヲ消スル時ハ煎藥可也
水瀉ハ温也 猪瀉 茯苓ヲ加フ
過酒ノ瀉ニ葛大 縮小加ヘ熱共連ニ

茵ヲ加フ暑月ノ熱瀉ニ藜大 連小加
寒月ノ冷瀉ニ姜ニ 縮小 木ヲ加フ

又ク瀉ノ胃氣下陷シ利水藥ニ止ラスハ
參中 麥中 木小 姜小 柴小 加

升柴ハ酒ニ浸シ少シ焙テ寒毒ヲ去テ分氣
分リ用ユヘシ又ク瀉ノ胃氣弱ノ食難化參

中者 麩中 縮小 木小 加フ
久瀉ノ腸胃虚ノ々々多滑泄共 訶煨 煨木 姜赤 石指ヲ加末ノ采湯

二調ヘ下ス
脾取且虚ノ晝ハ不下曉夜ノ明ルヲ待カテ

一ニ度下ルアリ四神圓ヲ用ユヘシ補骨脂
酒浸妙ニ 葱研ク四 木微 木二

一右細末ノ姜東ヲ水ニ煮テ東爛ニテ
東ノ核上姜ト去テ東ノ肉ヲ并ニ膏ニ

粉藥ヲ入テ丸ニ塩湯ニ下ス
灸法吐得不正者天樞氣海ニ各二十母

久瀉胃氣下陷ハ百會ニ各七也又脾俞
中腕腎俞大腸俞長強各一處 大腸俞

十六椎下兩傍各一寸半長強八龜尾

骨ノ頭ヲ 已上宛右煎詳也

痢病門

十一

夫痢病外感ニ内傷ヲ兼テ病也初發ニ惡寒發熱ニ頭痛身痛外邪ノ風濕也腹痛後重窘迫ニ下ス内邪ノ飲食也外内ノ多少ヲ分テ可治

○外感表証甚ク脈浮數トス先表ヲ可解ス
羌活中 獨活中 柴大 芍中 芩中 陳中
枳中 芍中 甘少 此藥ニ表邪少ノ解シ汗出外イハモ内熱多クテ渴之後重甚ク脈沉實トスハ將ヲ可加フ

○内傷裏証甚ク腹痛窘迫後重甚ク表証ナキハ先ツ裏ヲ下ス
將 小 芍 中 實 小 朴 中 白芍 大 枳 中 桂 小 甘 小 此分ヲ用テ内熱少ク退シ後重モ少クバハ將ヲ去ルニ

○食傷甚ク食積内ニ滯テ腹堅ノ痛ニ按之痛愈甚ク初先ソ備急圓ヲ五粒カ七粒カ用テ積滯ヲ下シ右ノ煎藥ヲ用ユ
ヘシ下ノ後トス將ヲ可去但シ病ノ輕重ハ
ノ虛實ニヨルヘシ老人小兒及怯弱ノ人ハ少少内熱アリモ 芍連ニテサスニ巴將ノ類可斟酌

○右ノ如ク二兩日療治ノ外邪散ニ内邪モ退クトイヘトモ圓ニ行ク度數モ臆モ前如ニテ黃芩莫少モ不采間ハ止ル藥ヲ用ユヘカラス
△主方 芍 各ニ 連 木 枳 各一 甘少 此分ヲ用テ可加減ス

後重甚ク滑ヲ加フ
○白痢ニ 芍 陳ヲ加フ
○赤痢ニ 芍 中 桃 小 壯 小 桂 加
○腹痛ニ 白芍 炒 大 甘 小 絞尾 小

○身热共 栢酒炒 身冷ハ桂小ヲ加

○初將 苓連ノ類多ク用ヒテ寒毒腫

胃ニタリ腹痛共 姜 桂ヲ加合ニ終身

热ニ脉数ナリトモ苦寒ノ藥用ユカラズ病
ニ參木ヲ用ユ口傳アリ

○乳痛ト人死ノ痛ナク也

○身热ニ脉数ナラズ 苓中モ連 木 小 枳

中カキ 姜炒 ○久病身冷自汗ニ脉沉細ニニテ
乳痛共 桂中モ姜 木 小 枳

○後重 枳ヲ用テ中気下陷ノ愈甚キ
アリ此ノ名痢ノ後重大腸ノ際下也

參大 苓 大 枳 小 用ユ合

○久キ血痢ニ四物ニ倍ニ倍ニ地 芍ヲ酒ニ

テ炒テ用テ 桃紅ヲ少ニ加フ 枳ツラハ酒

炒ノ栢ヲ加フ○過酒ノ人ニ葛 栢 茵ヲ
加フ猶下血門ヲ見合テ可治ス

○久キ白痢ニ 參中 木 苓 中 甘 小 枳

中多 木宿 小隄 姜東 入

○虚坐努責トハソノイキツ也下ハキ物ハナク

ニテイキツニタテ淡紅ノ血カ白阜沫カ少シ

出テ内ヨリイキツニ立テ不正無血証也

皀尾 大多 地大 枳中 桃小 陳小

○疫痢ハ倭ニ服疫病ト云疫病ノ如ク世ニヤリ

热气甚キヲ云敗毒散ニ 苓加 陳倉米

姜東 小合 煎服ス

○内熱甚ク脉沉實トス大柴胡ニテ下ノ後

敗毒加味ニ用ユニ热气退キ痢不愈右

論ヲ見合テ可治ス猶多疫痢ハ運氣ノ過不

及多可察事簡要也口傳アリ 瘧痢兼作

者アリ治法同

○禁口痢ハ余ク不食痢ヲ云也胃口ニ熱ア

ル故也連 參 二 味 煎湯ヲ細ク一口ニ

可用藥ヲ強テ用ヘシ若シ葉ヲ吐スルモ
強テ用ユヘシ一口ナリトモ咽ニ下レハ効アリ又
田螺ヲ搗テ膈中ニ置胃口ノ熱ヲ引下
安シ又禁口痢ニ胃氣虛冷ノ者リ寒劑ヲ
多用テ後不食ス大略虛カハ脈証ニ
寒熱ヲ可分ク証ニ參冬白朮散ニ
藜蘆 陳倉米ヲ加テ用ユヘシ

○又蓮 陳壁土炒ニ味ノ末束姜煎
湯ニ調下ス妙也冷熱トモ可用

△神効參香散痢久穢惡ノ物ハ冬テ
腹痛毛ク渋リモノク只淡紅汁及白沫
下テ不正治ス器多穢ノ者テ醋テ 陳一分
炙一分二分 藜蘆 煨多藜蘆ニ聚ニ 藜蘆 四分 木 參
各二分 右為末米飲ニ調下ス此藥内外
邪未悉ク去ラレニ用ハ忽惡証トナ
口傳アリ

○塵腐ノ色ト云テ塵ノクサリタル如クナク下
純血ト云テ血ハカリ下テ別ノ物ナク屋漏
ト云テ雨モリノ色ノ如ク唇朱ノ如ク赤ク口
開テ不_レ合以上皆死証也
魚腦髓ノ如クナク下ニ身熱ニ脈大ナル以
上半死半生也

○脈沉小或滑大皆生 ○浮大弦急或
沉伏或數大皆死但初發ニ數大浮
強ハ汗下ノ後和緩ニナク生ク又病ニ右
惡脈ヲ見ス死ス又下ス物セナケ臭ク
又キ小便所ノ臭キカ如ク丸者死ス○又
足冷テ膝ニ至テ甚ク冷ハ死ス

○灸法 痢腹痛不止 幽門 内傷門アリ
氣海 泄瀉アリ 関元 二十壯 臍下三寸
脾俞 大腸俞 腎俞 天枢 長強 各
海 陽剛 内傷ニアリ

夫命始於父母之精血相交于先之腎
生之草木始於先之葉生之分於其兩
腎內左水右火右火右水先始於者
男子下元水也始於者女子上元故
右腎之元氣以命門之女子左腎之真
水以命門之左腎之陰水一身之潤
養之主右腎之陽火一身之溫理之守
護之外邪入又役者也故是元氣也
又守邪之神云又其陰精陽氣之間
主人公之司之神云即心之神也此
身之運行之千變萬化之行故古人曰
以氣為主一息不運則機穢窮一毫
則弊壞判不然生養生之道不聞人
欲七情起之云日之故二神氣之損
病是之生也本痛論曰百病生於氣

有結散之異喜樂恐驚ハ氣ヲ耗散
憂思悲ハ氣ヲ鬱結ス又男子ハ陽
氣易散縱思慮ニ符結スフアリト
或交友語或ヨロムフニ逢ハ即
女子ハ陰也故ニ氣易鬱然ノ自
釈スルヲアタス心胸部悶之頭重
積聚痰飲喘嘔吐膈噎勞瘵眩暈
結等ト成未々他病ニ変セザル
スニ所以ニ此氣門ヲ立ス既ニ他
其病ヲ見ス治スニ是誠ニ百病
ス也氣結ス則痰生痰盛則氣愈
結ス故ニ氣ヲ治スニ必先痰ヲ去
理ヲ以テ丹溪先生氣ヲ治スニ
主ト加減ス氣上焦滯六頭重目
咽喉窒碍胸中痞痛ス 痰 積
枯 萎之類ヲ加フ

景因病以子製方局方八製藥以子修病
今世此理三達不者少悉少局方袖珍方
方ヲ用テ無限病ニ應セントス方公有涯病無
涯必有涯隨無涯殆厄又予先生丹溪カ
遺風ヲ慕テ古方ヲ不用因病製方ヲ見テ
本草ノ藥性ヲモ不明内經ノ處方要法ヲモ
不知乱ニ隨意製方誤者多ク如此者ノ
古方ヲ用ヨリ千萬ノクナリ也今始テ如此ナ
ルケレニアラス節齋王論者明醫雜著者曰
近因東垣丹溪之書大行世醫見其不用
古方皆效輒治病輒自製方云々先生
專信此言當流傳授之切紙ヲ都ク削去
方鑑ト名ク學者能明此意者可ナラシ
九ノ用藥ノ意如石氣証ノ治法ヲ言ク
古方ノ理製方ノ法ヲ言フ傍題ニ似タレ
トモ當流ノ深意ヲ知レメ妄トニ自方ヲ
製スルヲ戒メタメ也サレ給テ病ニハ神方

聖禁ヲ用ユト云トモ患者ノ神志ヲ改メスハ
驗アルカラス臞仙ガ曰古之神醫ハ能療
人之心預使不致有病云云七情ノ内何
情ヨリ發ルソト能ク辨ノ怒分高カ思カ其
心ヲ改メヨト病人ニラシユヘキ一簡要也不然
者我神志ヲ不敗禁病ニ不應ト云テ一切ノ
病ニ病因アリ病因ノ者當病ニ甚謹ヘシ何者
風ヨリ作タル病ニ風ヲ戒メ食ヨリ作リタル病ニ
其ノタリタル食物ヲ戒メ勞カ役ヨリ作タル病
ニ形ヲ勞スラシ戒メ房勞ヨリ作タル病ニハ
房事ヲ戒メ七情ヨリ作タル病ニハ志ヲ改メ
也猶氣証ノ方ヲ粗記錄ス學者ノ繩墨
ニスキ者也

△七氣湯 氣管滯ノ為、痰心腹痞悶、或ハ
面目四肢浮腫、大小便秘、淡スラ治ス

半五桂 各一 甘 炙 參 各半 右 姜 入

△三和散 氣不調三焦不和妨食胸膈滿

關元ヲ治ス及ヒ氣滯大便不通治ス貴

木 檉 枳 各九 卷 蘇 沉

瓜 腹 各一 芎 三 六分 取 一 方 二 生 姜 縮

灯 各二 加

△木香流氣飲 氣痞胸腹脹面四肢浮腫

二便秘沙スヲ治ス 半 枳 青 蘇

甘 炙 沙 各二 兩 去 白 三 桂 枳

我 煨 丁 皮 腹 藿 木 果 各六

通 八 門 芷 赤 苓 木 瓜 參

昔 各四 右 姜 東 入

一 方 二 去 昔 藿 沉 枳 枳 將

二 加

△分心氣飲 惡息二因テ氣胸中滯痞悶

嘔吐口舌乾食減シヤツク瀰瘦スル

治ス 莎 藜 陳 藿 各一 枳 枳

果 腹 皮 甘 炙 丁 皮 各一 枳 枳

腹 子 枳 木 參 各半 姜 東 入

△正氣天香湯 婦人氣滯ニ心腹二塊アツテ痛

因テ月水不調或ハ眩暈嘔吐及ヒ産後

ノ氣病ニ可用 莎 六 枳 藜 姜 各

分 鳥 一 右

△紫雲種子湯 憂思二因テ心腹脹閉二便

不利麻濕緊ニノ瀉ナク治ス 藜 枳

果 半 枳 木 陳 通 木 實 炒

甘 炙 參 各半 姜 東 入

△參附正氣散 虛弱ノ人氣不和ヲ治ス

參 白 豆 蔻 木 各半 芎 姜 炮 甘

芪 蜜 薑 苓 酒 丁 香 桂 陳

芷 縮 青 木 附 炮 半 各一

右 姜 東 入

○灸法 心気ノ病ト云テ氣ヲ瀉テ死ニ至ルヲ孫ニ
傳テリ 焮灸アリ 男左女右五指ノ寸ヲ取
又同ク身ノ一寸ヲ添テ又其五ノ指ト一寸ト
寸ヲ押心ノ長サノ如ク押心ヲ二筋ノ寸ニ結
合其結ヲ喉ニテ二筋ノ寸ノ押心ヲ背ニテ
兩押心一処ニ齊スル処ノ脊中是穴也 二
十壯五十壯灸スル此徐氏秘傳ノ灸也
悲哭ノ死シトノ手足既ニ冷ルニ百會壯神道
七五、椎ノ下也。○氣痰胸中滿悶スル天
池二穴各七壯 腋下三寸乳後一寸。常悲
一、藥甚ク癩疾ト成ルニ日月ノ二穴各七壯
鳩尾ノ下一寸半兩傍各三寸。○氣ノ疾冬ノ
勞瘵トナラトスニ膏肓四花患明眼
等ヲ灸スル勞瘵明ニ詳也 灸穴ハ傳アリ

痰飲門

夫榮脈中行キ衛脈外ヲ行ク此榮衛十
二經ト督脈任脈陽蹻ノ脈ト都ニ十六文
二尺アル經脈ヲ一日一夜百刻ノ間二五十
度行ク毎朝胃ヨリ水穀ノ精氣ヲ手ノ大陰
脚經ニ注キ十二經ニ順行スル也其病入行ス
少津液ト名ク皮毛筋骨藏府ヲ潤シ也
氣滯レハ其津液即滯テ痰ト成ル飲ト云
ハ飲物カ滯テ未タ痰ニナラカニ先キ飲ト云
○痰上ニ三滯レハ頭重ク目昏耳鳴眩暈レ
咽喉或腫或痛胸塞テ食不下中ニ滯レハ
食難消脹滿レ腸鳴○下ニ滯レハ小腹硬滿
レニ便後ハ腰重ク脚痺 表ニ滯レハ皮膚如
刺痛ニ或ハ皮膚浮腫或ハ手足項ノ辺ニ
結核ヲ生ス 裏ニ滯レハ不食レ 腹脹腸鳴
二便艱レ 痰肺ニテハ喘咳ス 心ニ入レハ怔忡
恍惚ス 肝ニ入レハ眩暈レ 腹脹痛ニ不仁ス

腎ニ入ル喉ニ痰涎出ス 脾ニ入ル喉ニ痰涎出ス
然則痰ハ諸病ヲ生ス也他病ニ亦在ル各々
其病門ニシテ可治未タ他病成ラス痰飲
ト名ル時此ノ門ニテ治スヘシ

△三陳湯 凡ソ治痰ヲ加減ノ可吊 粉ニ貴

去フ各一 甘草 右姜ヲ入

○風感レ痰ヲシテ受喘共 羌 風 星

樹ノ類ヲ加フ。温ニ感レ痰ヲシテ倦

息共ハ二木 羌ノ類ヲ加フ

○熱痰アツテ版脹喘滿共 今 連 栝類加

○寒痰アツテ咽不利不食共 姜 附 桂

麴ノ類ヲ加フ

○酒痰アツテ胸腹飽悶共 昔 枳 縮

麴ノ類ヲ加フ

○食痰アツテ腹堅ク不食共 枳 枳 麴

○氣痰アツテ心塞痛ハニ 枳 枳 枳

縮 枳 枳ノ類ヲ加フ

○燥痰喉中ニアツテ吐沫不出 姜 貝

五味 杏ノ類ヲ加フ

○上焦ニアツテ頭重ク眩暈共 外 柴

風 芷ノ類ヲ加フ

○下焦ニアツテ腰膝重ク不仁共 枳 通

已ノ類ヲ加フ

○氣盈ノ痰アラハ 姜 枳 枳

△蘇子降気湯 上盛下虚ノ人痰涎壅気

不下治ス 故 甘 炙 前 枳 桂 陳

三白 各 蘇子 粉 各五 姜 東 入

○灸法 肺俞 膏肓 脾俞 幽門 中脘

咳嗽門 十五 附 肺痿 肺癰

感冒風寒表ニアツテ鼻塞舌濁惡寒

咳モ八十神湯ニテ風邪ヲ散ノ愈ニ汗アリハ
麻 蘇ヲ可去此葉ニ汗出テ咳不止肺
數ニ桑サカ 梔シ 小酒サカ 杏コ 大君サカ
桔キ 小陳チ 去白チ 炙チ 五味チ 小
外邪未散肺熱甚キ間ハ五味ヲ用ユカラス
麻各風寒咳ニ初發ニ二三服ハ用ヘレ春
未以後用ユカラス

○春風ニ感ノ鼻ヨリ清涕出テ咳スレニ六續チ
杏キ 中チ 桔キ 小陳チ 去白チ 炙チ 小風チ
荆キ 中チ 甘チ 少

○夏咳ハ多ハ暑熱也 桑サカ 中チ 知チ 中チ 杏コ 中門チ
中チ 曹チ 小甘チ 小陳チ 去白チ 桔キ 小但チ 初チ 邪チ
○春ノ風邪ノ如ク先ツ散ノ後咳不止身熱
レ脈洪數ナラ此藥尤可用ユ

○又膏ハ脈証ニ口傳アリ是亦熱退テ咳
尚アラハ五味ヲ可加四時トモニ外邪感冒甚

感冒門ニテ治スニ

○咳嗽久ク不正者 莎サ 陳チ 桑サカ ノ類肺氣ヲ
得スル藥ヲ多ク用テ肺ノ正氣耗散ヲ汗出
止チ 要勞嗽ニ成ル者也

○咳又ノ肺虛ニ自汗出テ脈弱スレニ參チ 中チ 膠チ
中チ 中チ 五味チ 中チ 桔キ 中チ 膠チ 中チ 數チ 小門チ
中チ 芍チ 酒チ 陳チ 去白チ 甘チ 少 生薑ヲ入肺熱スレ
右ノ寸脈ニカラズレニ參チ 多ク用ユカラス

○午後ニ咳ス著ハ陰虛ノ勞嗽也四物ニ極チ
知チ 小チ 五味チ 中チ 附チ 中チ 薤チ 中チ 桔キ 中チ 貝チ 中チ 加

○五更ニ午前ノ間ニ咳ス者ハ胃中ニ熱アリ
貝チ 大チ 膏チ 中チ 五味チ 中チ 桔キ 小チ 杏コ 小連チ 中チ
甘チ 少 陳チ 去白チ 加チ 勞嗽痰血ヲ出スレニ四物
膠チ 中チ 附チ 中チ 知チ 小チ 貝チ 中チ 桑サカ 中チ 五味チ 中
甘チ 少 加チ

○久手咳嗽寒熱往來アラズ 桑サカ 大チ 杏コ 中チ 知チ

小蘇中參小五味中桑小甘少痰
了不粉生姜多加

久咳虛出者 五倍五味 訶櫻去
甘等分蜜三九含化ス

△溫肺湯 冬感寒 咳嗽痰出治ス又ノ

肺熱ニ変共不可用 麩去粉 五味姜

桂杏各一 細膠甘各半 右姜枣入

下方ニ考一ホト

△金沸草散 感寒鼻塞 舌重咳不止寒

熱無汗治ス初發ニ二日用テ汗出ハ後服

之云 薤四 麻去 節各三 甘炙赤芍

粉各一 旋ホ 右姜枣入

△加減浮白散 上焦熱下焦冷 氣不下咳

喘之或嘔吐スラ治ス 桑一 鐵七 陳

靜五味 甘參各半 白苓三 右粳米二

十粒入煎ス

允山散 外邪悉退 咳久不止治ス 參

款桑 桔五味 膠各一 烏梅一 貝

半蜜炙 右姜枣入煎ス

△貝母湯 久嗽ヲ治ス 麩姜汁 浸五味 共

姜陳 各二 桑炒 粉桔 各一 木

甘炙各 杏炒 右姜入煎ス熱共

姜橘 紫可 借ス

久嗽ニ款 甘炙 桂各一 榔水飛 右為

末喉中 二可 吸ス

△寧肺湯 虛勞發熱自汗 喘痰出而

声嬰 治ス 木茸 為酒 地

甘炙五味 桑炙唯 苓各一 膠二

右姜入

一肺痿 肺熱引生 又ノ肺ノ津液カハ 盡カ

痰ニ血ヲ出シ 或ハ膿ヲ出ス 自汗盜汗 或

熱ノ喘咳 不止胸中乳上隱々トノ痛ム 肺

癰二紛之也肺癰ハ咳ノ濁涕ヲ吐肺散ニ
有力。肺癰ハ壹燻咳ノ脈細ニ有力

又肺癰ハ散ニ發ノ外邪アリ肺癰ハ内因肺
熱ヨリ發メ咳ス久ク成ル虛實迥別也

△保和湯 勞嗽肺癰テ痰ト成テ治ス知
賦 天門冬 明 款 薏 杏 炒 五味

各ニ生地 故膠 各一 甘炙 薏 苑
百合 檉 薤 各一 右姜ヲ入

痰盛尤者 星 小 粉 中 楮 紅 大
粉 中 枳 小 加フ

熱盛尤者 樞 中 將 小 連 小 苓 中
樞 中 翹 小 加フ

喘盛尤者 桑 中 陳 中 腹 中 蘇 子
大 蘿 菴 子 中 加フ

風盛者 風 中 荆 中 旋 中 蘇 中
細 小 沙 中 加フ

肺癰者 感風寒 咳嗽喘滿ノ胸中隱々
痛 痰ニ血ヲ出ス既ニ膿出者 雉 治 肺 収 緊
小ニ數テハ未膿 大ニ數テハ既ニ有膿
鍾ニ瀉ナル自ラ登ニ浮大ハ難治面也
白キハ吉レ赤キハ凶

○治法 先ツ小青竜湯或ハ參蘘飲ヲ用テ
可發表ヲ邪大テハ小青竜邪小テハ

參蘘飲表ノ風寒ノ邪氣既ニ散ノ然ノ後
桔梗湯ヲ用テ加減ノ治スヘシ既ニ膿出則

黃芩湯ヲ用ヘシ表邪未タ悉ク不解早ク
桔梗湯ヲ用テ肺ニ餘熱滯テ膿ニ 又表

散過多テ肺ノ津液燥テ肺癰ト成ル能
ク可見冷

△小青龍湯 治寒邪散心下有水氣咳
麻 芍 五味 粉 各ニ 細 姜 甘

桂枝 各一 石

△桔梗湯 治肺癰胸中气塞咳嗽吐血
 膿血ラキ 桔梗キキョウ 貝カイ 各各 一一 葶テイ 芩チン 各各 八八 枳チ
 炒炒 已イ 桑サン 著ジュ 各各 半半 甘カン 竹チク 杏コウ 去去 皮皮
 百合各三 右姜ヲ入。大便秘共特トク 加
 小便澀セ 通トウ 加 一方五味地骨知チ アリ
 △黄昏湯 肺癰膿出胸中隱痛スヲ治ス
 合カ 穀コ 一一 漿ジヤウ 水スイ 三三 匙シ 煮シ 至シ 一一 盞サン 半半 分分 テ
 三服ニス

△排膿散 肺癰膿出服ス排膿補肺
 薤シヤク 苳ソウ 五味炒シ 參サン 各各 等等 未未 之之 蜜湯ミツ 三三
 食後三服ス肺癰二葉イ 苳ソウ 苳ソウ 仁ニ 末末 糯米飲
 二調下ス或六粥内ニ入入 煮シ テ食ス食 可可 也
 又水ニテ水 可可 也

○咳嗽ノ灸法 新咳邪アス 不可灸久咳久 可可
 灸兩乳ノ下黑白ノ際各 三三 十十 壯壯 乳頭乳 背背
 一一 押シ 心心 三三 テテ 一一 ハハ 上上 下下 ナナ キキ ヤヤ ヲヲ 其其 通通 リリ 脊脊

滑滑 二十壯或二十壯 ○咳嗽上気胸中二気
 備備 八中府二穴各 五五 十十 壯壯 天突天 ノ下二寸兩傍
 各六寸也 一曰乳上三肋中去去 各六寸
 ○咳嗽短気及風勞ニ瘵 井井 二穴各 五五 十十 壯壯
 穴八中風門ニ詳也但シ口傳アリ

○咳嗽上気短気胸塞令 痰出肺ノ俞
 二穴各 五五 十十 壯壯 第三椎ノ下兩傍各一一 寸半
 ○咳嗽咽令喉鳴去去 天突天 七壯結喉
 ○咳嗽喘鳴ニ花蓋花 七壯 天突ノ下二寸
 又天池ノ二穴各 三三 十十 壯壯 腋下三寸乳後一寸

○咳嗽喘急ニ輸府ノ二穴各 二二 七壯 天突ノ下一寸
 兩傍各二寸 皆ノ第五節ノ下年壯年
 切ノ咳ニ灸ス 勞嗽ニ膏膏 盲肺ノ俞各 一一 五五
 十壯或 三里三 在在

九ノ費痰火内ニ蓄シ風寒外ニ束發ス先シ
表ノ風寒ノ邪ヲ可散風ハ六參藜飲寒ニ
十神湯痰盛則十緒湯或八道導痰湯二方
合シ服ス。持病ニ喘促及久ハ平生養生業
ヲ可辨ニト簡要也

△寧肺湯ニ加減ノ可用方ハ咳嗽閉ニリ既ニ發
ス則ハ風寒ノ暑温或酒毒食傷ニ因ルニ証
隔ニ内外ノ邪ヲ散シ後又寧肺湯ニ加減
可調フ

△杏仁飲治身熱喘急杏仁 蘇子 枳殼 桑葉 蘇子 枳殼 桑葉 蘇子 枳殼 桑葉
蘇子 枳殼 桑葉 蘇子 枳殼 桑葉
右姜ヲ入

△分氣紫葳飲治脾胃不和氣逆喘急紫葳 桑葉 蘇子 枳殼 桑葉 蘇子 枳殼 桑葉
桑葉 蘇子 枳殼 桑葉 蘇子 枳殼 桑葉
右紫葳生薑鹽少入

△十緒湯治風痰壅塞桑葉 蘇子 枳殼 桑葉 蘇子 枳殼 桑葉
桑葉 蘇子 枳殼 桑葉 蘇子 枳殼 桑葉
黃甘各一 右姜二片

△導痰湯治濕痰風痰喘急桑葉 蘇子 枳殼 桑葉 蘇子 枳殼 桑葉
桑葉 蘇子 枳殼 桑葉 蘇子 枳殼 桑葉
右姜ヲ入

△五味子湯治喘促脉伏四肢厥逆五味子 桑葉 蘇子 枳殼 桑葉 蘇子 枳殼 桑葉
五味子 桑葉 蘇子 枳殼 桑葉 蘇子 枳殼 桑葉
參門 杏 陳 白 生 姜 各 二 各 三 右

△浮白散治風寒傷肺喘急咳嗽桑葉 蘇子 枳殼 桑葉 蘇子 枳殼 桑葉
桑葉 蘇子 枳殼 桑葉 蘇子 枳殼 桑葉
錄 各 一 半 右 姜 入 〇 方 風 荆

〇冬月風寒ニ感スニ尤可也
〇灸法風寒ノ邪盛則先ツ表ヲ解メ後ニ灸ス

肺俞三七 天突七 中府二穴各二 已上咳嗽
門三 璇璣三七 天突下二寸 膻中二七
兩乳間猶ヲ咳嗽閉ト見合テ可灸治ス

惠德方卷之上終



