



新增家傳預藥集卷之六目錄

○散之類

佐藤安司蔵書

- | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 七十 | 五十 | 三十 | 一十 | 九 | 七 | 五 | 三 | 一 |
| 神仙散 | 增新
又方 | 黒神散 | 寧嗽散 | 又快氣散 | 生神散 | 征虫散 | 安神散 | 正舌散 |
| 八十 | 六十 | 四十 | 二十 | 十 | 八 | 六 | 四 | 二 |
| 又方 | 增新
又方 | 又方 | 三稜散 | 點頭散 | 快氣散 | 益中散 | 香薷散 | 清心散 |





○新增

九十	當歸散	十二	立効散	三	養元散	五	禹功散	七	香桂散	九	川芎散	一	香穀散	三	潜行散	五	絳雪散	七	石蓋散
十二	救苦散	二	神香參香散	四	立安散	六	神消散	八	川芎散	十三	紫金散	二	加味五苓散	四	椿皮散	六	琥珀散	八	又方

九	丁香散	一	沒藥散	三	三聖散	五	琥珀散	七	調經散	九	倒換散	一	通頂散	三	三五七散	五	行軍散	七	回陽散	九	漿水散
十四	南星散	二	清魂散	四	四物一黃散	六	七珍散	八	二妙散	十五	稀涎散	二	通関散	四	化風如聖散	六	甘露散	八	錢半散	十六	五味子散



一十六	實腸散	三	百中散	五	三香散	七	人參散	九	鬱金散	一	石蓮散	三	海金沙散	五	三味葶藶散	七	縮砂散	九	參苓散	一	牡蛎散
二	益元散 <small>油鹽散</small>	四	安脾散	六	古橘耳散	八	參花散	十	七傷通氣散	二	人中白散	四	又方	六	顛倒散	八	斷紅散	十	白木散	二	三味玄胡散

三	沒藥散	一	七聖散	九	倉卒如神散	七	又方	五	八仙散	三	千金還少散	一	洗肝散	九	抑氣散	七	速効散	五	愈痛散	三	古飯木散
四	蔓菁子散	二	推氣散	百	四聖散	八	神効散	六	茶調散 <small>菊花茶調散</small>	四	聰明散	二	菊花散	十	二仙散	八	二仙散	六	鉄刷散	四	香附散

五百 槐花散

七百 髮灰散

九百 補損當版散

二百 無極散

三百 大黃散

五百 玉仙散

七百 蓮砂散

九百 白薇散

三百 神應散

五百 奇効散

七百 八珍散

九百 烏金散

三百 三母散

五百 乳頭散

七百 犀角散

九百 宜風散

三百 碧玉散

五百 麝香散

七百 參苓白朮散

九百 無價散

六百 川芎三黃散

八百 當歸散

十百 乳香定痛散

二百 尾松散

三百 五倍子散

五百 四仙散

七百 瘦胎散

九百 催生散

三百 失笑散

五百 大調經散

七百 孤鳳散

九百 桑螵蛸散

三百 湧泉散

五百 乳香散

七百 千金散

九百 牛黃化癖散

三百 漏黃散

五百 天靈散

七百 牛黃奪命散

九百 周天散

五百 人齒散

七百 千金內托散

六百 二活散

八百 神仙排膿散

十百 二活散

二百 二活散

三百 二活散

五百 二活散

七百 二活散

九百 二活散

三百 二活散

五百 二活散

七百 二活散

九百 二活散

三百 二活散

五百 二活散

七百 二活散

九百 二活散

三百 二活散

五百 二活散

七百 二活散

九百 二活散

姜汁搗之將藥蜜水調稀搽舌根上

頻與之數日與前方正舌散可互見○全藥

話曰當時延壽翁治舌三寸計案出

用此方春曰予曾治一人其証古三

寸計內縮用此方立得神效矣右兩

醫之治療為表裏

三 安神散 即辰砂妙香散也或曰妙香散 家傳發安神

散也嚙 血道氣付妙也

茯苓 茯神 黃芪

遠志 各一分 人參 桔梗 各五分

山藥 木香 各三分 辰砂 四分

甘草 少但一分

右入麝香十一味家傳去之十味細

末故麝香之分兩不載于爰○入門

釋方云木香和氣麝香通氣經曰通

則不癩痛則不通香藥之妙如此○

方考云此安神正氣而精自固之方

也夢中遺失者宜主之○精氣神人

身之三寶也神役氣氣役精三寶之

用也是以神昏則氣蕩蕩久則精離

神明則氣正氣正則精固是方也不

用固滋之劑以固精但用人參茯苓

茯神遠志辰砂以安神用麝香木香

黃芪桔梗甘草山藥以正氣補精氣

正則滯夢不作邪火不起精不必滋

精自固矣內經曰主則下安以此養

生則壽沒世不殆此之謂也○醫林

曰治男婦心氣不足精神恍惚虛煩

少睡於心經再加辰砂二箇煎湯下
又曰產後有因血虛心氣不足驚悸
恐怖者宜用蘇香圓溫童便調服或
辰砂妙香散生地黄當歸煎湯調服
○正傳曰治心虛遺精白濁又曰治
血氣不足虛煩少睡盜汗○得効方
曰治男婦心氣不足志意不定驚悸
恐怖悲憂慘慙虛煩少睡喜怒不常
夜多盜汗飲食無味頭昏眩又曰治
渴証小便澀數而澀兼有油濁用燈
心茯苓煎湯下又曰治夢中遺精每
服一匙虛者溫湯調熱者夾門冬煎
湯調○醫林血汗門黃芪健中湯方
後曰治血汗出汚衣甚如坏漆皆由
大喜傷心喜則氣散血隨氣行故也
躰虛者宜服此辰砂妙香散治証同
前虛實皆可服○氣
付水用

四

香薷散

家方

香薷百

厚朴五十

陳皮

茯苓各三

甘草各三

右五味為細末○一包三分○安石

方有香薷飲黃連香薷散十味香薷
散香薷劉散等並皆治暑熱霍亂吐
利腹痛家方亦治証同前雖然家方
之經驗百發百中可信可秘

五

征虫散

家傳之制
方也

治諸冷虫嘔吐心

腹痛

良香七

香附子十

丁子五

菝木

陳皮各三

右五味為細末

六

益中散

家傳之制方也 治泄瀉腹痛冷利 留小腹不澀而止之劑也

白木各四 芍藥 茯苓各三

陳皮各二 乾姜各一 甘草各三

右六味 宿食加縮砂 腹痛甚加

木香 日用之經驗不可勝計可秘

之 惠德方家傳配劑等出之 新

著去乾姜泄瀉之主方也 吳本苓 藥湯兩目亦異也

七

生神散

出處未知 惠德方出之 產後氣付藥也

蒲黃各一 人參各半 甘草各少

右抹耳力キニスクヒ湯ニテ用ニ或ハ

胡外少加ルモヨシ

八

快氣散

氣付也 出處未詳 蒲黃炒

葛粉七个 人參各二分 胡椒各一分

右末カカライノ耳一匕

九

又快氣散

治婦人惡血滯下頭痛

香附子酢煮 右為細末

十

點頭散

醫林曰治偏正頭疼

川芎各二 香附子各四

右抹茶清服 偏頭痛連睛痛加石

十一

寧嗽散

醫林曰神效寧嗽散治

嗽諸嗽通用 半笈五分

五味子 茯苓 紫菀

桑白皮 陳皮 枳殼

桔梗 阿膠 罌粟殼各二分

甘草 烏梅各少

右為細末○按醫林方有川芎分三預藥集二本校合之共無川芎家傳除之乎傳寫脫之乎未知其是非矣

二十

三稜散

治虫積出處未考

三稜分三 枳殼 檳榔

青皮 木香 肉桂各一分

乾姜分二 甘草少

右為細末或加生姜棗煎服

三十

黑神散

出處未考氣アカリシテ目ニイ

心トラクナルニ用ユ 麤觔器ニ入火ニテ下一夜燒

湯與也○按諸昏有黑神散皆各別

之方也○醫者太全黑神散治食飽

吐血并血妄行口鼻俱出但聲未失

皆効 百草霜村中燒草鐵底燒也

右為末每服一錢糯米飲調下明鑑吐

四十

黑神散

正傳曰治產後惡露不盡

或胎衣不下攻冲心腹疼痛及血迷

血暈等証 黑豆炒去皮半升

熟地黄 當歸 桂心

乾姜炒黑 甘草 芍藥

蒲黃炒各四分 舊預藥集為黑豆半升非也半升也

方無蒲黃有附子

右為末每服一錢童便和酒調服○

方考云胎死腹中此方主之○胎死

者產難經日而胎死也法以妊娠舌

頭青黑為驗是方也蒲黃能逐敗血

熟地芍藥當歸能養新血乾姜肉桂
 能引新血而逐敗血甘草黑豆能調
 正氣而逐敗血師云此方更治胞衣
 不下產難血暈餘血奔心兒枕疼痛
 乍見鬼神等証蓋諸症皆是瘀血為
 患故並治之補按此方治產後十八
 症者一曰因熱病胎死腹中二曰產
 難三曰胎衣不下四曰血暈五曰口
 乾心悶六曰乍寒乍熱七曰虛腫八
 曰乍見鬼神九曰目內不語十曰腹
 痛泄瀉十一曰偏身疼痛十二曰血
 崩十三曰血氣不通咳嗽十四曰寒
 熱心痛月候不來十五曰腹脹滿嘔
 逆不定十六曰產後口鼻黑色起及
 鼻衄十七曰喉中喘急十八曰中風

五十
增黑神散

醫鑑 治產後敗血致諸疾

者 當歸 熟地黃

芍藥酒炒 肉桂 甘草炙各一兩

沉香 櫻灰燒存性 蒲黃炒黑

沒藥 赤芍藥各一錢 乳香三錢

血竭五分

右為細末每服二錢空心無灰酒調
 下此方可代奪命散○將產血多兒
 食不盡餘血裹胎難產服此棄子救
 母○臨產用力太早兒不及轉橫生
 倒出亦當急救母命服此方○子死
 腹中母必肢體冷痛口角出沫指甲
 青黑服此即出○產後胎衣不下○

血暈眼花起生不得○血迷心竅不能言語○敗血乘虛散流四肢浮腫○敗血為害口渴舌燥乍寒乍熱似瘧○月中飲冷敗血凝聚腹痛難忍或致瀉痢○敗血入心煩燥發狂言語錯亂或見鬼神如癲○敗血停留肢節間遍身疼痛○敗血流入小腸小便出血○敗血結聚小便閉澀大便艱難○惡露未盡失而不治又起酸鹹收斂之物因而得崩漏○胎敗鼻中氣黑○敗血冲心氣急發喘○敗血滯脾胃中心腹脹滿嘔吐似翻胃衣不下敗血攻心眩暈欲絕并產後

六十

增黑神散

全唇 治婦人胎死腹中胞

一十八症 當歸 赤芍藥

白芍藥 生地黃 熟地黃

香附子炒 五靈脂 蒲黃炒

乾姜炒 玄胡索 棕灰各一兩

乳香 沉香各五錢

右為細末每服二錢童便和酒調下

產後一十八症俱童便酒下

七十

神仙散

通仙院之秘方也

茜根 紫貝各十錢 黃柏

升麻 白且 青木香

南木香 人參 川芎

沉香各三錢 黃連各二錢 丁子一分

白芷 肉桂各一錢 白木三錢

大黃二錢 胡椒一錢 辰砂

麝香各一 右丸味舊預藥集惟右丸味愚者藥味

十九味而非此味疑 胎前產後血道氣付轉可用也○又

手負用之酒三毛熱湯三毛二服ツ

力キタテク與ル也○又巴豆ヲ加テ

下ニ使フ也老少強弱ノ人ニ因テ巴

豆ノ多少可有斟酌也○此方煉藥

之時号延命丹丸藥之時号鬱金丹

散藥之時名神仙散也

散藥之時名神仙散也

八十一 又方

茜根十三分 紫且十三分

白芷一分 沉香三分 朱黃連三分

蔓荆子二分 丁子 胡椒

肉桂各二分 鬱金三分 白木三分

人參一分 黃栢二分 川芎五分

右末每服四多酒下產前產後湯或水下又水丸服

九十 增當飯散

婦人良方 治產後氣血虛弱惡露內停增寒發熱

當飯 芍藥炒 川芎

黃芩炒各一兩 白木五錢

右為細末童便調下二錢

九十二 增救苦散

醫學綱目 治死胎不下兼難產及橫倒生 桂心一味

為末每二錢痛陣密時温童便調下

九十一 增立效散

醫鑑 治痢腹中疔痛赤白相兼即止 黃連四兩酒洗去菜更用

枳殼一兩 右為末每服三錢空

心酒送下泄瀉米湯下噤口痢陳倉

米湯下。○按全書稀糊和為丸，立效無雙。丸每服七八十九，空心溫酒送下。治論云：痢不拘赤白，一服立止。非泄瀉亦效，不可言。

三

神效參香散

同上

治臟氣怯弱冷

熱不調積而成痢，或下鮮血，或如豆汁，或如魚腦，或下瘀血，或下紫黑血，或赤白相雜，裏急後重，日夜頻數。

鴛粟穀

醋炙

陳皮

茯苓

肉豆蔻

麩裏煨

人參

白扁豆

木香

右共七味為末，赤痢每九

九分加製黃連末一分，白痢每九

分加製茱萸末一分，赤白相雜每服

八分加黃連茱萸末各一分，青色黃

色無加減，每用一錢，俱用米湯調下。

忌生冷油膩炙燥。○製黃連茱萸法

二味等分，不剉碎，以老酒浸一宿，同

一處燥炒，分出各為極細末，別包聽

前用。

三

新養元散

同上

治泄瀉飲食少進

糯米

一升水浸一宿，瀝乾，燥慢火炒令極熟。

山藥

胡升

右各為細末，和勻，每日侵晨用半盞

再入砂糖少許，滾湯調服，其味極佳

且不厭入，大有滋補，其女子宮虛

冷不能成孕，久服之亦能懷孕。○下

方加蓮肉芡實山藥各三兩，亦效。○

一方用糯米磨粉不拘多少入百草

霜十分之二水和為餅烙熟食之○

一方單用糯米半生半炒者亦效

新立安散 同上 治氣滯腰痛并閃挫

腰痛腎虛腰痛 當歸 肉桂

玄胡索炒 杜仲姜炒 小茴香炒各一兩

木香五錢 牽牛子半生半熟一錢

右為末每服二匙空心陳酒調下一

方去牽牛以酒煎服

新禹功散 同上 治寒疝

黑牽牛頭末一錢 小茴香二錢五分 加木香一錢

右共為末每服三錢姜汁調下

新神消散 同上 治諸般疝氣外腎腫

脹疼痛 山梔子鹽水炒 橘核黑色

小茴香各一兩 益智仁炒七錢

青皮香油炒 檳榔一錢 荔枝核八錢

右為細末每服二錢燒酒調服如不

用酒以燈草煎湯加鹽詐調服立效

新香桂散 同上 治坐產澁滯心腹大

痛死胎不能下者急用之

香白芷三錢 肉桂三錢 麝香三錢

右為末童便酒調下即產

新川芎散 本事 治風眩運

山茱萸一兩 山藥 人參 川芎各半兩

右為細末每服二錢溫酒下

新川芎散 正傳 治頭目不清利

川芎五錢 柴胡七錢 羌活

防風 藁本 生甘草

升麻 各一兩
炙甘草 各二兩
生地黃 各二兩
黃連 酒炒各二兩
黃芩 酒炒各二兩

右為細末每服二錢食後茶清調下
新紫金散 同上 一名白芷散 治諸熱

苦頭痛 鬱金 一錢 白芷

石膏 各二錢 雄黃 一錢 芒砂

薄荷 各三錢

右為細末口含水鼻內擗之

新香散 局方 治小腸氣 脘腹疝氣

筋急陰股中痛悶暈不省人事

茴香 炒 鹽 枳殼 炒 各一兩 沒藥 半兩

右為細末每服一錢溫酒調下不拘

時併進二三服効

新加味五苓散 治疝氣 卒痛小

便秘 猪苓 澤瀉

白朮 茯苓 肉桂

川練子

右為細末每服二錢空心米飲調下

新潛行散 正傳 黃栢 浸曬乾

為細末每服方寸匕四物湯煎湯

下治血虛陰火痛風藥也 多服粘

取効

新椿皮散 同上 治血痢及腸風下血

神驗 樗根 白皮 二兩 槐角 仁

白礬 二兩 甘草 一兩

右為細末每服三錢清米飲調下

新絳雪散 同上 治消渴飲水無度小

便數者大有神効 黃芩

黃丹 防巴 天花粉各等分

右為細末每服二錢溫漿水調下臨臥時併進三服即止

六

增新琥珀散 同上 治五種淋溢痛小便

有膿血出証 琥珀

沒藥 海金砂 蒲黃

右為細末每服三錢空心煎葶草湯調下

七

增新石葦散 同上 治小便不利莖中作痛

石葦去毛 冬葵子各一兩 瞿麥一兩

滑石五兩 車前子三兩

右為細末每服方寸匕日三服 方

考云破淋痛盛者此方主之

八

增新又方 同上 治小便淋閉莖中作痛

神効 石葦去毛 滑石

瞿麥 篇蓄 冬葵子

木通 王不留行 地膚草各等分

右為細末每服三錢白湯調下

九

增新丁香散 同上 治乳頭破裂或因小兒吹乳血乾自裂開多痛

丁香 不拘多少 右一味為末

付裂處如燥唾津調付

十四

增新南星散 瘡瘍集治皮膚癩項面上

生瘤大者如拳小者如粟或軟或堅

不痒不痛宜用此藥切不可輒用針

灸多致不效 生南星大者一枚

右細研爛入好醋五七點杵如膏如

無生者即以乾者為末醋調如膏先

以細針刺患處令氣透却以膏藥攤

貼覺痒則頻換貼取效

一平 新 沒藥散 正傳 治小兒驚風 止血住痛

定粉 石灰 各一兩 白礬 二錢

乳香 五分 沒藥 一分

右各研為細末同和勻再研乾摻之

二平 新 清血散 同上 治產後血暈昏不語

澤蘭葉 人參 各一兩 荊芥穗 四兩

甘草 八錢 川芎 二兩

右為細末每服二錢溫酒入童便

下更用漆器燒烟薰之頻置醋炭更服此藥

三平 新 三聖散 產寶 治兒枕痛

當飯 肉桂 玄胡索 各等

右為細末每服二錢熱酒或童便調下

四平 新 四物一黃散 婦人 治產後腹中血塊作痛

塊作痛 當歸 炒 川芎 炒

熟地黃 芍藥 各五錢 蒲黃 炒二錢半

右為細末每服一錢空心溫酒調下

五平 新 琥珀散 同上 治產後瘀血攻心迷悶妄言見鬼

琥珀 玳瑁 各一錢

鐵粉 各一錢 人參 茯神

生地黃 阿膠 各七錢半 朱砂 五錢

甘草 麝香 各一錢

右為細末和勻每服一錢用金銀煎湯調下

六平 新 七珍散 局方 治產後不語

人參 石菖蒲 川芎

熟地黃 各一兩 細辛 錢 防風 錢 五

右為細末每服一錢用薄苛湯調下
不拘時服

七甲

增調經散

產寶治產後虛浮蓋敗血

衆虛停積府臟流注肌肉腐壞成水

令人面自四肢浮腫切不可用導水

泄利之藥是謂重虛其虛多致大亡

此藥主之

沒藥 錢一 琥珀 錢一

桂心

赤芍藥 當飯 各兩

細辛

麝香 各五分 別研

右為細末每服一錢姜汁溫酒童便

和勻服之

△明鑑有灸甘草

八甲

增二妙散

方考 黃柏 乳潤 蒼朮 一宿

等分為末空心酒服三錢○濕熱腰

膝疼痛者此方主之

九甲

增倒換散

同上 大黃 兩 荊芥 兩

右末每服二錢內熱小便不通者此

方主之

十五

增稀涎散

同上 皂角 四條去黑皮炙

白礬 一兩

右共為末每進三字

水下○病人初中風暴仆痰涎湧

此藥與之頻吐涎沫壅塞少疏賣

他藥○清陽在上濁陰在下則天冠

地履無暴仆也若濁邪風湧而上則

清陽失位而倒置矣故令人暴仆取

以痰涎壅塞者風盛氣湧而然也經

曰病發而不足標而本之先治其標

後治其本故不與疎風補虛而先為

之吐涎沫白礬之味鹹苦鹹能軟頑

痰苦能吐涎沫皂角之味辛鹹辛能利氣竅鹹能去垢垢名之曰稀涎固奪門之兵也師曰凡吐中風之痰使咽喉疏通能進湯涎便止若攻不其痰則無液以養筋能令人癱急偏枯此大戒也○又喉閉門云喉閉數自不能食者以此方吐之涎不病愈○皂角之辛利能破結氣白礬之鹹苦能湧稠涎數以湧之涎去而病失全

一季

增通頂散

同上

藜蘆

生甘草 川芎 細辛

人參 各一錢 石膏 五錢

右共為末病人初中風不知人事口噤不能開用此藥一字吹入鼻中有嚏者肺氣未絕可治○中風不知人事病則急矣以平藥與之不能開其壅塞故用藜蘆與人參細辛相反使其相反而相用也肺氣上逆故用石膏之重以墜之其草之平以緩之乃川芎之用取其清氣利竅而已

二季

增通開散

回春

治中風痰厥昏迷

倒不省人事欲絕者

皂角 一兩 生半夏 各五錢 去皮 藜蘆 各五錢

細辛 各三錢 苦參 各三錢

右為末每用少許吹入鼻內候有嚏可治無嚏不可治

三季

增三五七散

八門

治陽虛風寒入腦

頭痛目眩運轉耳內蟬鳴一切風寒

濕痺脚氣緩弱及小風五痺肢體不

仁等症 附子 細辛 各三兩

山茱萸 炮乾姜 各五兩 防風

茯苓 各七兩

右為末每二錢酒調服一方無茯苓

有山藥五兩方考頭痛曰太寒中於

風府令人頭痛項筋緊急者此方主

之○風府腦後之穴督脉之所主也

寒者天地嚴凝之氣故令項筋緊急

乾姜附子辛熱之物也可以散真寒

細辛防風氣薄之品也可使至高鎮

山茱萸養腎脉之陰茯苓和腎脉之

陽河圖之義奇者為陽偶者為陰此

方名曰三五七者以補陽為義也

四季

新化風如聖散

治男婦小兒諸般風症

左癱右瘓半身不遂口眼喎斜腰腿疼痛手足頑麻語言蹇

澁行步艱難遍身瘡癩上攻頭目耳

內蟬鳴痰涎不利皮膚瘙癢偏正頭

風無問新久及破復風角弓反張并

蛇傷木咬金刀所傷出血不止數指

立刻久患痔漏膿血痛楚服之良驗

蒼朮 草烏頭 炮川烏頭 炮去

何首烏 木泔浸 全蝎 尾

天麻 各二錢半 姜蚕 隔紙炒 兩頭尖 錢

兩頭川烏頭 防風 荊芥

白芷 細辛 藁本

麻黃 當飯 川芎 各二錢半

人參 一錢 茯苓 一錢 石斛 半

白花蛇 浸酒三日去皮骨各五錢 羌活 二錢

甘草 炙 右共二十二味

右為細末每服三分或五分漸加至六七分臨卧酒調下茶亦可服後忌多飲酒并一切熱物飲食一時恐動風氣服後覺麻是藥之効也

五 增行軍散 同上 治傷寒

菜豆 麻黃 各一 雄黃 三錢

共為末每服一錢重者二錢無根水下走出汗愈 按潦水一名無根水山谷中無人跡新土耕凹中之水也

五 增中露散 同上 治傷寒時氣作熱發狂及解五毒治煩熱

寒水石 石羔 甘草

右為末新汲水入姜汁調服

七 增回陽散 同上 治陰症腹痛身冷

硫黃 胡椒

右為末每三分燒酒調服

八 增錢半散 同上 治一切諸執紅痢重急後重臟毒下血糞前糞後酒毒腹痛

熱肚痛赤眼四肢煩熱及諸熱結核瘡毒

黃連 山梔子

黃連 各二兩 生 下 半 酒 炒 連翹

芒硝 各一 薄芎 大黃 各三 生 半

甘草 炒 酒

右為細末每服一錢半食後茶調下

九 增漿水散 全吞 治暴泄如水周身汗

出一身尽冷脉微而弱或無脉氣少而不罷語其甚者加吐此為急病

半隻二兩 附子炮半兩 乾姜五錢
良姜五錢 桂枝五錢 甘草五錢
右為末地漿水服

十六

增新五味子散

同上治到五更胎下絞

痛而瀉泄 五味子二兩 吳茱萸五錢

同炒為末每服二錢陳米飲下

一卒

增新實腸散

同春治久痢去多不分赤

白用此末藥換出黃糞來

山藥炒黃 蓮肉炒各 黃米一合

右共為細末用沙糖調熱湯和勻前末藥不乾不稀漸令調服後用清米

湯漱口常服之最妙按此方世瀉 用之妙也

二卒

增新益元散

八門一名天水散天一生

水地六成之義也 滑石六兩

甘草一兩 為末每三錢入蜜

少許沸湯調服熱者冷水調服孕婦

慣半產者忌服如傷寒身熱不解加

蒼木末三錢葱豉湯調連進數服汗

出為度又汗出下後餘熱以此解之

甚妙虛煩不臥加辰砂少許身熱霍

亂嘔吐轉筋者先掘地坑傾新水一

桶在內攪勻澄清謂之地漿水別用

井水一碗入油一匙浮水面將此藥

撒在油華上其藥自沉碗底去清水

用前地漿水調服名油墜散一切風

熱上壅咽喉不利加青黛薄芎少許
 蜜丸噉化一切寒症瀉痢嘔吐反胃
 加乾姜五錢各溫六九中寒甚者再加
 硫黃少許用生姜汁浸炒餅丸又能
 代肝邪一切暑症作渴新汲水下感
 田禾燒氣作渴用帶泥稻稈煎湯下
 一切濕熱腸癖泄瀉滑石用牡丹皮
 煮過加紅麴五錢各清六九用陳米
 飲丸每五七九白湯下如產後腹
 痛白利用補脾補血藥下或加五靈
 脂一兩能行血止痢瀉甚加肉豆蔻
 少許一切痰熱吐逆反胃驚癩顛狂
 熱毒瘡痢腹痛加黃丹少許姜汁蒸
 餅為丸服方考者門云六府有實

火上有煩渴下有便秘赤澀者此方
 主之又云滑石性寒故能清六府之
 熱甘草性平故能緩諸火之勢

三卒

新百中散 同上治一切痢不問赤白

或日百行一服便疎再服即愈

嬰粟穀 去粗皮用姜汁浸一宿

炒乾為末每二錢米飲調服忌生冷

油膩魚鮓毒物三百

四卒

增安脾散 同上治停飲傷胃喫食噤

酸嘔吐黃水不化

良姜一錢用陳壁土和 草菓

木香 丁香 胡椒

人參 白木 陳皮

茯苓各五 甘草一錢

為末每二錢米飲入鹽少許調服

五卒

新三香散

同上 治胃冷飢逆經久不止

沉香

紫蘗

白豆蔻

右各等分為細末每服五七分柿蒂煎湯調下

六卒

新古橘耳散

同上 治痰嗽極有效驗

陳皮

兩

耳草

兩

為末每服二錢白湯調下

七卒

新入參散

醫林 治喘嗽 枯礬

人參

耳草

右為末每服一錢臨臥嚥之白湯調服亦可

八卒

新參花散

回春 治咳嗽發熱氣喘吐紅

人參

天花粉

右各等分為末每服五分蜜水調服

九卒

新鬱金散

治傷寒潮熱痰咳

鬱金

石膏

右共為末每服二三匙清茶送下

按右二方治小兒咳嗽痰喘

十卒

新七傷通氣散

回春 治十膈五噎腹

內久積氣塊復力嘔吐膨脹此方諸

病皆治

皂角

大黃

硃砂

當飯

巴豆

右為末每服一分或二分量人太小

虛實加減用之引用好酒一口調服

不飲酒者滾白水亦可引不許多引

多動一二行此藥服之不吐則瀉

不瀉則吐兼治小兒驚風痰響上竅

天吊吐痰即愈又治中風不語

一

增石蓮散

入門治夢遺泄精小便白

濁等症

蓮肉 益智

龍骨 各等分為末每二錢空心

米飲調服

二

增人中白散

同上治陰虛火盛及五

心煩熱等症

人中白二兩 黃柏

甘草

青黛各五錢

為末每二錢童便調服

三

增海金沙散

同上治膏淋

海金沙

滑石各二兩 甘草二分

石為末每錢麥門冬或燈心煎湯下

四

增新又方

同春治五淋一服如神

當飯洗

大黃浸 牛膝酒洗

木香

雄黃 海金沙各等分

右為細末每服一錢半臨卧好酒調

服兩服全愈

五

增三味葶藶散

入門治小便急痛小

利莖中疼痛

木通

茯苓各三兩

葶藶各二兩

為末每方寸匙水調日三服

六

增顛倒散

同春治臟腑寒熱或小便

不通或大便不通或大小便俱不通

大黃錢六

滑石

皂角各三錢

石為末黃酒送下如大便不通依前

分兩服如小便不通大黃錢滑石錢六

皂角如前如大小便俱不通大黃滑

石均分皂角如前

七

新縮砂散

八門治大腸虛而挾熱脫

肛紅腫

縮砂

黃連

木賊

為末每二錢米飲下

八

新斷紅散

全唇治腸風臟毒下血

烏梅

五倍子

槐花

枳殼

黃連

地榆

荊芥穗

白芷

右為細末每服三錢空心酒調服遠

年者亦斷根

九

新參苓散

醫林治睡中汗出

酸棗仁

人參

茯苓

為末米飲調下

十

新白朮散

正傳治飲酒中風多汗食

即汗出久不治必成消渴

牡蠣

白朮

防風

右為末溫水調下

十一

新牡蛎散

明鑑治脚汗

牡蛎

枯骨

蜜陀僧

黃丹

為末用少許乾摻脚指縫

十二

新三味玄胡散

八門治冷心痛

玄胡索

肉桂

木香

為末每二錢姜湯或酒調服

十三

新古皎木散

同上治心脾疼痛

當歸

白朮

為末每二錢沸湯點服

良姜

香附子

右各等分為末鹽湯點服一方加木

香烏藥○按香附良姜別以可煨若

同炒則不効○或為丸号香附九尤妙

五平 新愈痛散 同上 治急心胃痛

五靈脂 延胡索炒 菝木 煨

良姜炒 當眼 各等分

右為末醋湯調服

六平 新鐵刷散 同上 治心脾積痛婦人血

刺氣痛及中酒泄瀉 良姜炒二兩

甘草 灸 蒼朮 各二兩 茴香炒七

右為末鹽湯點服或酒調或煎服亦可

七平 新速効散 入門 治男婦腰痛不可忍

川練子 用巴豆五粒同 茴香

破胡紙 各一兩

右為末每服一錢空心熱酒調服○

一方明鑑治腰疼如神

肉桂 兩 木香 杜仲 各四兩

右為末酒調下

八平 新二仙散 入門 治纏喉風急喉痺

膽礬 錢 姜蚕 二錢

為末每吹少許入喉中

九平 新抑氣散 明鑑 治七情所傷中脘不

快氣不升降脈脹 香附子 四兩

陳皮 三兩 甘草 灸五

右為末每服二錢食遠白湯點服尤

妙也女人尤宜服 入門此方加茯神

十平 新菴活石羔散 入門 治遠年近白肉

外翳障風熱昏暗拳毛倒睫一切眼

疾兼治頭風 菴活 石羔 黃芩 藁本

蜜蒙花 木賊 白芷

蘿蔔子 細辛 麻仁

川芎 蒼朮 菊花

荊芥 甘草

各等分爲末每二錢用三次蜜湯調

服或加當皈枸杞山梔連翹柴胡薄

苛防風天麻桔梗等分爲丸服尤妙

一

新洗肝散

醫林治風毒上攻目暴腫

痛難開隱溢眵淚 薄苛

當皈 羌活 甘草

大黃 防風 山梔子

川芎 各等分

右爲末白湯調服剉煎亦可

二

新菊花散

同上治風毒眼目赤腫昏

暗瘵肉痛痒漸生翳膜

白蒺藜炒 羌活 木賊

蟬退 各三兩 菊花 六兩

右爲末食後臨臥茶清調下

三

新千金還少散

全吞補丈夫諸虛不

能尽述 魁絲子 茯苓

山藥 牛膝 肉苁蓉

枸杞子 續斷 五味子

山茱萸 巴戟 蛇床子

杜仲 酒炒

右十二味製羅細末酒調服方寸七

日三夜一惟禁醋蒜外無忌服後五

夜知覺十夜力壯○若多忘加遠志

茯神體溢加栝子仁或煉蜜爲丸每

服三十九日一夜以頭面身體

溫暖為度藥性平和調五臟健力加

遠志石菖蒲熟地小茴酒炒

增新 聰明散 同春号孔子大聖批

龍骨 遠志 石菖蒲

龜甲 右四味等分為末酒調

方寸匙日三服令人聰明

增新 八仙散 全昏服三十日精神倍六

十日氣力強志意足少壯素稟虛弱

或勞傷早衰多忘服之

天門冬 生地黃 肉桂

茯苓 各一 石菖蒲 五味子

遠志 甘草 右葺 各三

右為細末每服一錢或湯或酒任調

食後服勝加天主補心丹 方見丹

增新 川芎茶調散 同春治偏正頭痛

荊芥穗 川芎 薄荷

香附子 各四 羌活 甘草

白芷 各一 防風 七錢

右為細末每服二錢食後茶清調下

○一方加菊花 兩 細辛 五錢

錢生名菊蕊茶調散

增新 又方 全昏治頭風偏正頭疼及

寒作痛者 川芎 荊芥 各二

白芷 藁本 羌活 各一

細辛 防風 香附 各七錢

薄荷 四 甘草 五錢

右為末每服二錢食後茶調下

八

增新神効散

同春 治心痛作酸又治水

停心下作聲如雷又治口眼喎斜不

省人事 胆礬一分

九

增新倉卒如神散

全唇 治氣自腰腹間

攻心癱急痛不可忍腹中冰冷自汗

如洗手足厥冷又治寒疝入腹心腹

平癰及小腸膀胱氣痛刺脾腎氣攻

急痛不可忍屈伸不能腹中冷重

如石自汗出 山梔子四十九箇連皮搗碎炒

大附子炮去皮臍一箇

右為末每服二錢酒一盞入鹽少許溫服

百

增新四聖散

同上 治疝氣外腎腫脹

小茴香炒 穿山甲炒 全蝎炒

南木香 各等分為末每服二

錢下服痛止用酒調服

一百

增新七聖散

同上 治風濕流注經絡間

肢節緩縱不隨脚膝疼痛不能履地

牛膝 杜仲 續斷

草薢 防風 獨活

甘草各一兩 右烘乾為細末每

服二錢空心溫酒調下

二百

增新推氣散

同上 治肺邪入肺右脇痛

甚脹滿不食 姜黃

枳殼炒 桂心各五錢 甘草三錢

右共為末每服二錢姜湯調下水煎亦可

三百

增新沒藥散

明鑑 治婦人脇痛

香附二兩醋一分鹽半兩同煮乾 芍藥

肉桂 延胡索炒各一兩

右為末白湯調食前服

四百 新蔓菁子散醫林 治黃疽皮膚眼疳

如金色 生蔓菁子

為未熟水調每三錢不拘時服

五百 增槐花散 治吐血

陳槐花炒二兩 百草霜各二錢

為未熟根煎湯下

六百 新川芎三黃散醫林 治積熱血

大黃煨 川芎 黃芩

黃連各等分

右為末每服三錢食後并水下

七百 新髮灰散醫林 治血淋

亂髮燒灰 麝香少許

右醋湯調空心服又治婦人轉胎不

尿又男子尿血皆效

八百 增當歸散明鑑 治打撲傷損皮肉破

筋骨斷瘀血壅滯結腫不散或作癰

疽疼痛甚及傷後中風手足痿痺

澤蘭葉 當歸 牛膝

續斷各十兩 芍藥 白芷

川芎 肉桂 白楊皮不用

細辛各五兩 川烏頭 川椒各三兩

桔梗 甘草各兩

右為末熱酒調下

九百 新補損當歸散同上 治隊馬落車傷

腕折臂服三日筋骨即相連神效

澤蘭葉 附子炮去皮各一分 當歸炒

川椒炒 甘草 肉桂各二分

川芎分六 右為末每服二錢溫

酒下忌海藻菘菜葱猪肉

新乳香定痛散 入門治打撲墜傷

填一切疼痛 乳香

當歸 白木各二錢 白芷

沒藥 甘草 羌活

人參各一錢

為末每二錢溫酒并童便調服如血虛者去羌活人參加川芎芍藥生地

黃牡丹皮 按此方落馬別而炒也

新無極散 醫林名通經甘露散

名四順丹治經血不通崩漏腸風帶下血風五淋產後積血

大黃分四處

四兩 用紅花四兩入水取汁浸

四兩 大黃一日不用紅花曬乾

四兩 用童便入鹽二夕浸大

四兩 黃一日取出晒乾不用便

四兩 用當歸四兩入淡醋內

四兩 浸一日不用當歸曬乾

四兩 用好酒浸一日令乾如

杏核大晒乾巴豆三五

粒去皮同炒豆黃色不用豆

右四分同為一處入南木香兩一百草

霜五為末每服三錢好酒空心調下

又煉蜜丸如桐子大每服三四十九

空心溫酒下即四順散也九修合用

新尾松散 入門治經水三年不行者

尾松即土牛膝 當歸尾

各等分尾上焙焦有性為末先一日

白水調服七分五更再進一服即通

三草 增新 大黃散 全屑 治婦人室女經脈不通服之如神 大黃燒存

生地黃 三錢

為末作一服空心好酒調下

四草 增新 五倍子散 明鑑 治血崩帶下

艾葉醋煮 五倍子二兩炒 烏梅赤色

川芎各五 右為末米飲下

五草 增新 玉仙散 全屑 治赤白帶下

乾姜炒 芍藥酒 香附炒各

甘草生用 五錢

右為末每服三錢空心溫酒送下

六草 增新 四仙散 同春 治婦人白帶

蒼朮一兩酒浸去 白芷

川芎 附子麵包煨去皮 各五錢

右為末每服五分空心好酒調下

七草 增新 蓮砂散 全屑 治婦人常懷小產常服此以保胎孕十月完足

蓮肉四兩 縮砂炒二

右為末每服二三錢米飲調下月服三四次

八草 增新 瘦胎散 同上 治胎肥壅隘動止艱難臨月眼之縮胎易產

枳殼麸炒 香附子三錢 甘草一錢

右為末每服二錢百沸湯調服

九草 增新 白薇散 醫林 治妊娠遺尿不知止

白薇 芍藥各等

為末每服三錢食前酒調服

增新 白薇散 醫林 治妊娠遺尿不知止

白薇 芍藥各等

為末每服三錢食前酒調服

百

新催生散

同春治難產并胞衣不下

白芷

伏龍肝

百草霜

滑石各等分

甘草煨半

右為細末用芍藥湯入酒童便少許調前未服之二次立効

百

新神應散

醫林

治難產及橫逆皆因

坐草太早努力過多兒轉未速或以破水先下其血必乾若先露手謂之橫產或先露足謂之逆產此藥再固其血服之如魚得水

白芷

百草霜

右等分為末童便米醋各半盞調藥二三錢沸湯泡溫服分二次服服畢又用蜀葵子四十粒滑石末三錢順流水煎湯調服如人行五里即生

百

新失笑散

明鑑

治產後心腹絞痛欲

死及兒枕痛

蒲黃炒

五靈脂各等分

右為末醋調二錢熬成膏湯化服之

百

新奇効散

治產後血上心已死

真鬱金燒存性

右為末溫米醋調灌下立効

百

新大調經散

同上

治產後血虛惡露

未消榮衛不調陰陽相乘增寒發熱或自汗腫滿皆血氣未平所致

木豆炒去皮

茯神一兩

琥珀一錢

右為末每服三錢濃煎紫蘇黑豆湯空心調服喘急煩悶小便不利亦効

新八珍散

醫林

治產後不語

人參

石菖蒲

生地黄

酒蒸

川芎

朱砂

防風

各五

細辛

甘草

炙半

右為末每服三錢薄荷湯調服地黃

總隔脾胃不快者以當歸代之尤妙也

增孤鳳散

明鑑

治產後閉目不語

明礬

為末一錢白湯調服

新烏金散

醫林

治產後血迷血運敗

血不止淋瀝不斷腹痛疼頭目昏

眩多汗又治崩中下血不止

血竭

百草霜

男子亂髮灰

松墨

鯉鱗

當飯

延胡索

肉桂

赤芍藥

右等分為末每服二錢空心溫酒調服

新桑螵蛸散

明鑑

治產後小便數及

遺尿

桑螵蛸

十五兩

鹿茸

黃芪

牡蠣

人參

赤石脂

厚朴

右為末每服二錢空心米湯調下不

禁者加龍骨一方無赤石脂厚朴有

甘草生姜

新三母散

全唇治產後無乳

貝母

知母

牡蠣使

為末豬蹄湯下

新湧泉散

同春治乳汁不通不問虛

盛先用木梳刮乳房後服藥効

穿山甲

炒肉豆蔻

麩包

白姜蚕

煨熟

四錢

包角五錢 胡桃仁去皮四兩 胡麻炒半斤

右為細末每服不拘多少溫酒調下
任意食之

乳頭散 明鑑 治夜啼不止腹痛

黃芪 甘草炙 當飯

赤芍藥 木香各等分

各為末塗乳頭與吮

乳香散 同春 治盤腸氣痛

乳香 沒藥各等分

共為細末以木香煎湯調服

犀角散 同上 治客忤驚啼壯熱

天麻 犀角 門冬

鈎藤鈎 辰砂各一分 鉄粉

雄黃各半 麝香少許

右為末每服半錢金銀煎湯調服

于金散 同春 治小兒一切痰喘急

慢驚風雖至死但能開口灌下無不

活者 全蝎炙 白姜蚕各二分

牛黃六厘 龍腦一分 辰砂

黃連 天麻各四分 牛膽南星

甘草各二分

右為末每用五七厘薄荷燈心金銀

煎湯不拘時調下

宣風散 正傳 治急驚風搐搦不定

檳榔子二枚 陳皮 甘草各五分

黑牽牛子四兩半生半炒 本取頭末一兩

右為末蜜湯調下二三歲兒半錢四

五歲一錢食前服

三

新牛黃化癖散 全治小兒癖疾

牛黃 芫薺 姜蚕 各二錢

孩兒茶 阿膠 甘草 各三錢

大黃 一兩 穿山甲 十片 黃土 炒焦黃色

右為細末每服五分蜜水或黃酒調

空心服忌生冷按此方虛者慎之

生

增碧玉散 同上 治小兒十介潮熱五

七日不退 滑石 一兩 青黛

石膏 煨 生甘草 錢五

右為末每二錢滾湯調服熱不退柴

胡薄荷湯下

大

新瀉黃散 醫林 治脾熱目黃肚大口

唇生瘡眼生偷針等証

藿香 山梔子 石膏

甘草 防風 各等分 蜜酒 微炒香

右為末溫湯調服

三

新麝香散 明鑑 治鼻痔鼻下連唇生

瘡赤爛 麝香 牛 雄黃

外麻 各二錢 枯心 五錢

右為末人乳調敷

百

新天靈散 全存 治小兒諸癩如神

天靈蓋年久白者燒存性為細末

每服五厘黃酒調下立止○又治婦

人血崩不止空心溫酒調服其效如神

百

新參苓白朮散 同春 治脾胃虛弱飲

食不進多因少力中滿痞噎心中氣

喘嘔吐泄瀉此藥中和不熱久服養

氣育神醒脾悅色順正辟邪

增補家傳卷

七

人參 白朮炒 茯苓

山藥炒 甘草炙 各二錢 白扁豆一錢

蓮肉炒 縮砂

桔梗 薏苡仁炒 各一錢

石為細末每服二錢棗湯調下量兒
歲數加減○同春方前云小兒泄瀉
者乳食傷脾也此方主之

百四

新牛黃奪命散

醫林小兒肺脹喘滿

氣急兩肋扇動鼻竅張悶亂嘔渴聲

嘎痰涎潮塞俗呼馬脾風如不急治

死在旦夕牛黃奪命散無價散主之

白牽牛子 黑牽牛子各半生半熟

大黃 檳榔子各一兩

右為末三歲兒一錢冷漿水調下涎

多加輕粉如無如

百三

新無價散

同上治風熱喘促悶亂不

安俗呼馬脾風 珍珠二錢

輕粉半錢 甘草炙 乾

石為末每服一字用溫漿水少許滴

香油一點抄藥在油上沉下去却漿

水灌之一方加滑石二錢 名油墜膏

百四

新問天散

明鑑治痘黑陷膜脹直視

喘急發搐 蟬退五錢 地龍一兩

石為末每服半錢太兒一錢研乳香

湯調下連進二服愈

百五

新入齒散

明鑑治痘初出光壯然黑

陷心煩性躁氣喘妄語或見鬼神小

連治毒氣入藏必死 人齒燒 性

右為末每箇作一服酒下

百四十六

增神仙排膿散

同春 治惡瘡毒風毒

疔瘡背花瘡小兒惡瘡膿血俱從大便中出亦治氣滯腹脹及婦人經閉不通此方壯寔之人可用虛弱者當慎之

大黃 十二兩酒浸一宿晒乾

白芷 沉香 木香

乳香 沒藥 穿山甲 陳壁土 炒各五錢

右各為細末量入虛寔用之寔者不過三錢虛者二錢牛臨卧用好生酒調服服後禁飲食湯水動三五次以稀米粥神之服此藥內有穿山甲恐令人作嘔須忍之即嚼生葱可止凡修合此藥要誠意切不可令婦人雞犬見又不可多合恐久放則不効矣

百四十七

新千金內托散

同春 治癰疽瘡癤未成者速散已成者速潰敗膿自出無

用手擠惡肉自去不用刀針服藥後疼痛頓減此藥活血勻氣調胃補虛祛風邪辟穢氣乃王道之劑宜多服之大効

黃芪 蜜炙 當歸 酒洗

人參 各二錢 川芎 防風

桔梗 白芷 厚朴 姜汁炒

甘草 生用 薄桂 各一錢 加金銀花亦好

右為細末每服三錢黃酒調下不飲酒木香湯調下亦可或都作一劑用酒煎尤佳 癰疽腫痛倍白芷不腫痛倍官桂 不進飲食加砂仁香附

子○痛甚加乳香沒藥○水不乾加
知母貝母○瘡不穿加皂角刺○咳
加半夏陳皮杏仁生薑五片○大便
閉加大黃枳殼○小便澀加麥門冬
車前子木通燈草

百四

新二活散

明鑑義十三疔狀雖異

皆熱毒之甚也治法先以雄黃丸下
之去其毒辨○雄黃丸雄黃礬金皂
角全蠍各一各巴豆十四

粒麝香少許右為末滴水丸如菉豆
大每服二十九丸亦量虛實加減丸數
茶清次服二活散病勢緩而用引經藥
送下

菘活 獨活 當歸

烏藥 赤芍藥 金銀花 洗酒

天花粉 白芷 蓮翹

耳草節 各四 蘓木 紅花

荊芥 蟬蛻 葛根 各三

白檀 二 右為末蒼耳煎湯下

百五

新百一散

同上又名護心散 治發疔瘡煩躁

手足不任發狂者 耳草節

菉豆 辰砂 各等

右為末每服三錢熟水下

百六

新退毒散

同上 治便毒腫結

穿山甲 半兩 醋 猪苓 三錢 醋

石為末食前老酒下 次醋煮肥皂研

膏敷之妙

百七

新百二散

同春 治遍身瘡癩經年舉

發者 威靈仙 蔓荊子

何首烏 荊芥 苦參

右各等分為細末每二錢食前温酒

調服日進三服忌發風物

百五十二

新通天再造散

同上 治癩瘡

欒金 五錢 皂角刺 黑大者 大黃 煨各一兩
白牽牛 頭末六錢 牛生半炒

右為細末每服五錢日未出時無灰酒送下向東服之當日必利下惡物或臭不可近或膿或虫如虫口黑色乃是多年赤色乃是近者數日後又進一服無虫乃止

百五十三

新胡麻散

全書 治紫白癩風并癩面上酒瘡又名粉刺面刺俱可服之

胡麻子 赤色扁者佳 別碾五兩 白芷 二兩
何首烏 二兩 防風 二兩 蔓荊子 半兩
耳菊花 一兩 苦參 酒炒三兩 威靈仙 二兩

升麻 當歸 牛旁子 炒

芎藭 各二兩 白茯苓 荊芥 各三兩

薄荷 片苓 酒炒 黃連 酒炒

白芍藥 酒炒各二兩

右為細末每服三錢食遠服秋分後至春分白酒調服春分後至秋分茶調服用米糊細匕丸食遠白湯下

百五十四

新合掌散

明鑑 治遍身生瘡百藥不効

檳榔子 五箇 為末 硫黃 生者五文 研 膩粉 半兩
右和勻每用二錢安手心內香油調夜則時塗外腎不可洗手但揩擦令乾一二日愈

百五十五

新玉真散

回春 治破傷風及金刃傷

打撲傷損并癩狗咬傷能定痛生肌

天南星 為防風所制 防風 各等

右為末破傷風以藥敷瘡口然後以
溫酒調一錢如牙關緊急角弓反張

用藥二錢童便調下

百五十六

新解毒散 明鑑治毒蛇傷入眼黑口

噤手足強直 白礬研 耳草

右各等分為末冷水調下

百五十七

新石膏散 治急頭痛 石膏一味為

細末半錢許茶清點服立効 事林廣記

百五十八

經驗百中散 家方治一切痢疾不問赤白

日夜無度只服便疎三服全愈可秘可秘

嬰粟穀 蜜炒 厚朴 姜汁製

右為細末米湯調下二冬忌生冷無毒物

百五十九

新上工散 家方治虫霍亂腹痛

吉野葛 兩 黃栢 三色 胡椒 兩

右為末鹽湯下

百六十

新沉香散 家方頭風血道妙也 沉香 八

當歸 大黃 檳榔子 各二

右為細末酒用

百六十一

新黑聖散 家方赤白帶下諸藥不効服之甚

得効兼治大小便血 乱髮霜 棕毛霜

各等 右為細末服

百六十二

新通氣散 家方頭下 當歸 黃芩

沉香 川芎 各一 茯苓 芍藥 各三

百六十三

新楊梅皮散 家方治白神妙可秘 楊梅皮

苦參 黃栢 少炒 乾漆 二分 烟

右為末茶一服程湯立用

新增銀白散

家方治小兒百病、升麻、知母

甘草、扁豆炒、山藥、人參

白木、茯苓各等分、右為細末○

次驚薄荷葱白湯下○渾身壯熱面赤敬靈

銀薄荷湯下○驚吐下痢不止丁香湯下○

疝氣肚脹氣急白湯下○喫食不知飢飽不長

肌肉炒麥芽生薑湯下○諸病後無精神少氣

力不思飲食姜棗湯下○稟受氣性每日

一服量兒加減

新增長命散

家方、沉香、白檀、益智

茸松各五分、丁子、人參、肉桂

甘草各一錢、肉豆蔻、琥珀各一錢半

右十品為細末服○此方氣付產後金瘡氣付

尤妙也○霜腹加加不天古布羅五分最妙

新增家傳預藥集目錄卷之七

○雜方之類

佐藤安司藏書

一層藕

二度嶂散

三白散

四膏藥

五龍腦膏

六千金錠子

七新紫雪

八新紅雪

九新碧雪

附錄單方

附錄膏藥

十萬病無憂膏

十一太乙膏

新增家傳預藥集卷之七

雜方之類

一

屠蘓酒

琅琊代醉三十七卷曰屠

蘓蕭子雲雪賦曰韜翠愚之飛棟汝

屠蘓之高影始飄舞於圓池終亭華

於方井杜工部冷淘詩曰願隨金驪

裏走置錦屠蘓屠蘓菴也廣雅云屠

蘓平屋也通俗文曰屋平曰屠蘓魏

略云李勝為河南太守有屠蘓酒方

蓋取菴名以名酒後人遂以屠蘓為

酒名矣何遜詩郊郭勤二頃形勢想

一蘓又太冠亦曰屠蘓禮曰童子饋

無屋几冠有屋者曰屠蘓晉志元康

中商人皆著太冠諺曰屠蘓障自覆

兩耳會見賜兒作天子古泉府押腰
銅匕首障目錦屠蕪或作屠蕪

二

屠蕪

玄明玄治法印御
相授之正方也

白朮

桔梗

川椒

防風

各三分

肉桂

一分

大黃

一分半
去之

右咬咀紅絹袋入之

三

度嶂散

草撥

椒

各六分

細辛

防風

桔梗

乾姜

白朮

肉桂

各三分
右

四

白散

白朮

桔梗

各一分

錢半

細辛
二分半

右細末酒入

五

膏藥

細辛

乾姜

椒


肉桂

大黃

各七分

右雷丸之油煉也

屠蕪白散之膏



○名ニフチ四方一尺四寸也高ハ八寸
五分合カウヨリニテユク也○上書白
散一頁真中書也○按屠蕪白散正
月一日飲此藥也一人飲之一家無
病一家飲之一里無病自少飲之然

後至老也○治曰屠蕪諸說多屠去
鬼氣蕪生神氣此義尤可也

新本草綱目卷二十五穀部屠蕪酒

陳延之小品方云此華佗方也元且
飲之辟疫癘一切不正之氣造法

白木 桂心各七錢 防風一兩

菝葜五錢 蜀椒 桔梗

○大黃五錢 烏頭二錢 赤小豆十四枚

以三角絳囊盛之除夜懸井底元且
取出置酒中煎數沸舉家東向從少

至長次第飲之藥滓還投井中歲飲

此水一世無病○時珍曰蕪魁氣名

此藥屠割鬼爽故名或云草庵名也

○韻府群玉卷之三虞韻屠蕪思

庵名屠絕鬼氣蕪醒人魂四時纂要酒名

元且飲之除瘟氣博雅愚按廣韻作屠

蕪前輩多不從方頭纂要訓義明白

今附此

六

龍腦膏

秦定養生主論十五曰余

撰此藥隨身自用及濟年高小任遂

利者但是上焦風痰熱壅咽膈不利

等証並宜服

薄荷一介別本 甘草二兩別本

防風 桔梗 川芎各二錢半

犀 砂仁五粒別本 白豆蔻二十粒別

本一錢 右七味勻為細末入

確二錢 梅花片腦半錢 和勻生白沙蜜

調搜成膏每以一彈子大噙化潤嚥

津如年老枯衰痰熱喘滿者以一彈
子大畧嚼潤頓作一嚥遂覺胸中清
涼痰涎立轉或吐或散大小強弱之
人並如此法昔有故舊富長者強健
感武忽患喘滿不咳不吐痰病日久
腿脚陰囊衣為水腫俯即肩息困極
之至余深聞之謂其人曰非水証也
但有一胸膈敗痰宜服滾痰圓患者
曰非四五人扶持不能登溼遂已之
至於用醫鍼刺於水信受諸苦年餘
漸瘥忽吐臭痰患人撫牀大聲曰果
中前言吾不知以至久患今則痰敗
必成肺癆急請余謝遇未治遂合龍
腦膏一劑服未竭而愈

七手金錠子

濟世全書曰解蠱毒兼

治瘴氣百病百般瘡毒皆能奏効

文蛤五倍子也去毒 山茨姑二

大戟一兩 朱砂二錢 雄黃

麝香各二錢 續隨子壓去油一

右為末用糯米粥為丸楊子下即成

錠子四十個端午日合為妙每服半

錠涼水磨服及搽患瘡上治一切藥

毒蠱毒瘡氣瘧疾及自縊溺成驚厥

末經宿心頭溫者磨水灌入即甦中

風百病熱酒服小兒蜜水磨服○此

圓類解毒萬病圓丹類

千金丹少異可互見矣

增紫雪本草綱目療陽寒濕瘧一切積熱

煩熱狂易吐走瘴疫毒癘卒效脚氣

八

五尸五疰心腹諸疾疔刺切痛解諸
熱毒邪熱發黃蠱毒鬼魅野道熱毒
小兒驚癇百病

黃金一百 石膏 寒水石

滑石 慈石各三 搗碎水一

解者四斗去滓入 犀角屑

羚羊角 青木香 沉香各五

玄參 焙 升麻各一 甘草炒八

丁子一 入煎汁中煮取一斗五

外去滓入 朴消十 消石三十

於藥汁中微火煎之柳木不住手攪

至水氣欲盡傾木盆中待欲凝入

麝香一兩二 朱砂三攪勻收之

每服二錢涼水服臨時加減甚者一兩

九 增紅雪 同上 治煩熱消宿食解酒毒

開三焦利五臟除毒熱破積滯治傷

寒狂躁胃爛發斑溫瘴脚氣黃疸頭

痛目昏鼻塞口瘡喉痺重舌腸癰等

朴硝十斤鍊 羚羊角 黃芩

升麻各三 人參 赤芍藥

檳榔 枳殼炒 生甘草

淡竹葉 木香各二 木通

山梔子 葛根 桑白皮

大青藍葉各一 蕪荊木六

並剉片水二斗五升煎至九外去滓

瀘過煎沸下消不住手攪待水氣將

尽傾入器中欲凝下 朱砂一 麝香半 經宿成雪

每服一二錢新汲水調下欲行則熱湯化服二兩

十

增新碧雪

同上治一切積熱天行時疫

發在昏憤或咽喉腫寒口舌生瘡心中煩燥或大小便不通胃火諸病

朴消

芒消

馬牙消

消石

石膏

寒水石

木飛

以甘草

煎水

五升入諸藥同煎

不佳手攪令消

得所入

青黛

和勻傾盆內經宿結成雪為末每含

嚥或吹之或水調服二三錢欲通利

則熱水服二兩

十一

附錄

○經驗救急方

○諸疾

●治中風痰厥不省人事即將病人

頭髮提起勿放用木指指刻人中穴

將兩手足頻々往上下稍擡之便痰

氣不上攻心即以半匙末少許吹入

鼻內或牙包細辛等分為末吹之亦

可候有嚏可治無嚏不可治○一方

用白礬末二錢以生薑汁調灌立醒

方○治手足拘攣不用皂角木香

等分煎服立効全

●傷寒發在踰垣上屋用黃連寒水

石各二錢為末濃煎甘草湯冷調服仙

○治傷寒熱極發狂不認親疎燥熱

之極熊膽一分研末涼水調服立已全

○傷寒多日不出汗白蜜一盤小好黃

酒一鍾同煎極熱服當時汗出仙

●四時瘟疫頭疼發熱衆人病一服

者用黑砂糖一盞入熱汁二盞化開

服之當時增寒壯熱汗出立愈仙○

辟瘟病赤小豆新布囊盛之置井中

三日出壑家服男十枚女二十枚林

○一方用雄黃末以筆濃點鼻內兩

傍中則疫氣不能入亦辟諸惡惟夢

仙○疫病不深五月五日午時多采

蒼子嫩葉陰乾收之臨時為末冷水

服二錢或水煎舉家皆服能辟邪惡

金○或以麻油塗鼻孔中後入病家

則不相傳染既出以紙捻探鼻深入

金嚏之為佳全○天行疫癘者東行

桃枝坐煮湯合家灑浴佳林○治天

行時氣宅舍惟異用降真香燒之小

兒帶之能避邪惡之氣仙

●辟蠱用葶苈果俗名地栗瀝用江

南野產大者切晒為末常隨身每以

白湯調二錢匕傳聞下蠱之家知有

此物便不敢使其術全

●治瘴毒用犀角尖羚羊角水磨濃

服之全

●中暑迷悶用蒜研熟湯灌之或用

連皮生姜一大塊研爛熟湯灌下卒

急不得熱湯以冷水研搗亦可仙○

一方治中暑卒倒路上熱土熨臍中

以人尿溺其上以大蒜研爛熱水調

灌即活切勿用冷水臥冷地正如凍

倒人不宜近火恐逼寒氣入內即效也

●中濕筋急拘攣不能屈伸及風濕

痺用薏苡仁和米煮粥常食之功勝

諸藥○男子玉莖濕痒用肥皂箇燒

灰存性香油調搽

●胸中酒食停積或被入勸飲過多

一時心下脹滿只用鹽花擦牙齒溫

水漱下不過三次如湯激雪即時寬

暢通快也○燒酒醉傷不醒者急用

菘豆粉盪皮切片將筋開口用凉水

送下○酒醉不醒搗葛根絞取汁一

二盞服之或乾葛水煎服亦可○食

肉太多不化腹脹發熱用山查一兩

水煮先飲湯後食山查子仙○食瓜

過傷瓜皮煎湯解之諸瓜皆同事林

○食韭口臭沙糖解之摘要

●食已即吐胃中有火也大黃一兩

甘草二錢水一升煮半升外溫服至簡

●痰嗽用白糖生姜搗爛露一宿自

蘿蔔湯下

●氣喘用葶藶汁飲一杯効○積年

上氣喘促咳嗽唾膿血者用蘿蔔子

一合煎湯食後服

●哮喘厚味發者用蘿蔔子淘淨蒸

熟晒乾為末姜汁浸蒸餅為丸每三

十丸津下○胸喘用枯礬末一匙臨

臥滾白湯調下○哮喘秘方用苧麻

根和沙糖爛煮時々嚼嚥下永絕病根

●一切瘧疾用老生姜自然汁露一

宿臨發日五更時令患者面北立飲

即止未止再服○一方靈天蓋燒存

性為末每服五厘空心黃酒調下治

諸瘧如神○一方百草霜黃丹等

末每服二錢發日空心米飲調下不

過兩服愈發時再服○截瘧疾小蒜

不拘多少研泥入黃丹許九如芥子

大每服一九面東新汲水下至妙○

勞瘧驚甲三兩酖灸黃為末臨發時溫

酒調下三錢匕

●痢疾不問赤白益元散方懸

黃連末一錢水一鍾煎八分空心一

服立止效妙也○赤痢百草霜末五

錢熱酒調下○白痢肉豆蔻麵包根

乳香粒為末每二三分米湯調服○

一方蠟退炒黃為末每服一錢白痢

燒酒調下紅痢黃酒調下○禁口痢

湯飲米穀不下石蓮肉去殼並內

末每二三錢用井花水調下日進二

服○久痢不止陳蘿蔔煎湯一服立

止○老人久痢不止肌瘦如柴晝夜

無度命已將危人參兩水煎服之鼻

有微汗而甦○疫毒熱痢將松花篩

細末每二錢用薄荷煎湯入蜜調下

○七月立秋日面西以井花水吞赤

小豆七枚，一秋不犯痢疾。五行登

●泄瀉用生薑一塊艾把水煎熱服○

暴瀉痢用百草霜末每二錢米飲調

下○一方治暴瀉不止小便不通

用煎子炒為末每二錢米飲調服其

根葉亦可搗汁服此藥利水道而不

動元氣○泄瀉二三日或腹冷痛生

薑豆豉胡椒煎湯熱服立已○久瀉

不止飲食不進用黃米炒為末每數

匙用沙糖調吃

●霍亂吐瀉腹痛服藥即吐無法可

施用百沸湯半碗并梘冷水半碗合

而服之即安○霍亂吐瀉枯礬末一

錢百沸湯點服○霍亂吐瀉但下煎

胃氣存者服之回生陳皮去薑香各

等分每一兩水煎服○乾霍亂欲吐

不吐欲瀉不瀉急宜多灌鹽湯探吐

之冷物出尽而愈○乾霍亂欲吐不

吐欲瀉不瀉痰壅胸脹汗出冷氣欲

絕鹽一生薑半兩右二味同炒令色

變以童便兩盞煎一盞分為二溫服

○一法委中穴出血或十指頭出血

是良法○霍亂轉筋欲死氣絕畏有

暖氣者以鹽填臍中灸鹽上七壯即

甦○全唇云此症切忌米湯服之必

碎生薑五片水煎熱服立止○胃寒

嘔吐日夜不止用生半隻五錢瀉

嘔吐不止陳皮三錢生薑六錢水煎

熱服○一方治注船木吐發渴若飲
承即效以童便飲之最妙○胃氣冷
吃食即欲吐白豆蔻五錢為末以好
酒一盞微溫調服日三盞○卒暴嘔
逆虛弱困乏無力及久病人嘔吐飲
食不入口即吐者人參一兩水煎服
之立已

翻胃噎膈用枳殼子殼燒灰每服
二錢酒下○隔食秘方用乾柿餅三
箇連蒂搗為末酒調服甚勿以藥
而忽之○翻胃吐食上氣者白朮子
日乾為末酒調服

效逆用柿蒂燒存性為末酒調服
○久患效逆連飲四五十聲者用生
薑汁半合蜜一匙煎熟溫服○效逆

灸氣海三五壯切

吞酸醋心用吳茱萸一合水煎去
渣頓服縱濃亦須強飲

膈氣風氣寒氣憂氣驚氣喜氣怒
氣山嵐瘴氣積聚痞氣心腹刺痛不
能飲食時止時發攻則欲死用香附
子鬱金甘草剉一劑生姜入煎服○
一切氣不和走注疼痛用木香溫水
磨濃熱酒調服

心腹腫脹用蘿蔔子搗礮水半升
頓服少頓得利或吐或汗腹中自寬
○腹內氣脹用檳榔為末每服二錢
水煎食前服○鼓脹身乾黑瘦多渴

煩悶馬鞭草細坐曝乾勿令見火以酒或水煎至味出去滓溫服以六月中雷鳴時採有切

●酒腫及脾虛發腫蘿蔔十包鮑片

右二味用水同煮乾去皂角將蘿蔔搗爛入蒸餅和丸如雞頭實大蘿蔔

子煎湯送下○一坵水腫紅花二兩

杵爛入水半錢取汁服之不過三服

便痊

●食魚鱸及生肉不化或瘕搗馬鞭草汁飲一升入生姜亦可○茶積石

膏黃芩升麻為末砂糖水調服

●五疸黃腫綠礬不拘多少炒至白色為細末煮紅棗肉為丸如櫻桃大

每服五九早午晚各一服用冷黃酒

送下忌醋生冷發物百發百中或有

虫即吐出○酒疸遍身面目發黃如

金色者好茵陳兩黃酒半煎至八

分食後溫服不過四五服全安○黃

疸絲瓜連子燒灰為末因麵得病麵

湯下因酒得病酒調數服可愈○皮

層眼睛如金色生蔓菁子為末熟水

調每服三錢不拘時服

●陰證手足厥冷心腹平痛硫黃四

胡椒六為末每三分燒酒調服○陰

症腹痛面青甚者鴿子糞一大抄研

末極熱酒一盞衝入攪勻少渣飲之

去渣頓愈

吐血咯血一切失血或痰嗽喘熱

心慌用生地黄搗取汁重便各半盞

入姜汁少許重湯煮溫服○一切吐

血及傷酒食飽低頭擲損吐血至多

并血妄行口鼻俱出但聲未失者無

有不効用百草霜為末每二三錢糯

米煎湯下一方加白芷亦好○又治

吐血陳槐花兩炒二百草霜五為末茅

根煎湯下○損傷吐血側栢葉研汁

調下右炒○右止出血如線槐花炒

未摻之○又蒲黃炒焦末付之好○鼻

衄不止將頭頂髮介解百會穴將新

汲泉水一匙滴穴上即止○一方加

冷患人知以井花水忽然猛噴其面

立止○又方用山梔子炒黑為末

入鼻中立已○又用新汲水隨左右

洗足即止累用有効○尿血升麻兩

水煎空心溫服○暴熱尿血用山梔

子去皮炒水煎溫服○便血白芷五倍

子丸服効○下血白姜炒烏梅

半一兩右醋糊丸醋湯下神妙○瀉血

乾柿餅燒灰存性清米飲調下二三

錢立已

●自汗盜汗五倍子為末津液調搽

臍中一宿而止○一方用柳首烏為

末津液調搽臍中即止○夜出盜汗

黃芪炒山梔子炒各三錢水煎臨服

入牡蠣煨研末調服立止○心汗盜

汗

汗只心頭出者名心汗茯苓為末每服一錢以烏梅陳艾煎湯臨臥調服
○陰囊汗出用蜜陀僧研細加蛤粉撲患處○脚汗用白礬二兩水煎洗脚
●眩暈不可當皆痰火所致用大黃酒拌九蒸九晒水丸如梧桐子大每五七十九白水下○一方用枯礬為末姜湯調服

●癲狂不識人用伏龍肝末水調方寸匕日三服効○一方卒狂言鬼語用朱砂末酒調方寸匕日三服○一方治久心風癲氣血虛弱用紫河車焙為末煉蜜為丸酒送下○癲狂熱病大黃四兩酒浸一宿水三升煎之分三服

○癲癩結熱狂亂不避親卑醜罵豆烏梅五箇右同研水丸如桐子大辰砂為衣三五丸加十五丸姜湯夜臥吞下通利三五行白粥補之○又癲狂不避水火狂言聞使穴灸二十壯有掌後三寸兩筋間○驚癩白礬一兩半生半枯薊芥穗二兩為末麵糊丸辰砂為衣每服二十九姜湯送下○風痰癩病生白礬一兩細茶五為末煉蜜丸如梧子大茶湯下一歲十九太人五十九久服痰自大便中出斷病根

健忘白茯神遠志用茸草水泡去骨取肉右菖蒲三味等分水煎服一日四五次也

久服之能且誦千言名聰明湯

●心下怔忡眠倒即大聲打鼾即

醒不寐用羚羊角鳥犀角各用水磨

濃汁入所用湯藥內服之蓋打鼾睡

者心肺之火也○多睡及不睡酸棗

仁微人參各等水煎服如不要

睡師熱服如要睡即冷服○人耽睡

卧花穀葉晒研末湯服一二錢取瘡

止○膽虛睡卧不安心多驚悸酸棗

仁一兩炒香為末每二錢不拘時竹

葉湯調下

●中百邪鬼魅用頭垢作丸一小豆

大水吞服○中鬼氣死口鼻出血用

雄黃末一錢煎桃葉湯調下○妖魅

猫鬼病人不肯言鬼用鹿角屑搗末

以水調服方寸匕即言實也

●中惡平皮用菖蒲生根搗絞汁灌

之立瘥○又用韭搗汁灌鼻中

●白濁淋瀝痛因房慾不節或精末

施泄而成將成下疳者菘豆不拘多

少搗并花水澄清空心服○一方治

白濁用枯礬兩為末早米糊為丸如

梧桐子大每五十九空心米飲送下

●朱精暫睡即泄用龍骨兩韭子合

為末每二錢空心酒調服○一方男

女夢與鬼交心神恍惚者鹿角骨撮

酒調一日二服○精滑久不愈龍骨

細研水飛過每服一錢用好燒酒調服

●五淋并小便不通用硝石生研為末每服二錢卒患諸淋空心冷水送下勞淋勞倦虛損即發用葵子湯化下通後瀉服補藥血淋熱淋并花水化下小便不通小麥湯化下○血淋血下赤數疼痛不可忍用槐子炒去火毒為末每服一兩好酒送下○血淋痛澁但利水道則清濁自分海金沙末新汲水或沙糖水服一錢○平淋牛尾燒存性每服二錢空心白湯服○石淋髮灰為末每服一錢空心并水調服○血淋用乾柿餅燒存性米飲調下

遺尿者枯礬牡蠣煨等分為末米湯調下 夜多小便益智子四箇碎入鹽同煎服有奇驗 一方小便多者夜煎草薺一味服之永不夜起

●小便不通火淋燒灰黃酒調服效 又方車前子草不拘多少連根帶葉搗自然汁入蜜少許同服立通

又方大黃酒煮乾為末酒丸用扁竹根煎水送下

●大便閉結以蘿蔔子一合搗碎冷米調包角灰末二三錢服立通 又用商陸搗爛敷臍上立通并小便不通亦効 一方大黃皮硝包角三味等分水煎一服立通 大小便不通不通為末黃酒送下大人多用小兒少用

●五痔蒼耳莖葉端午日採陰乾為

朱空心水服方寸匕○痔瘡風腫疼

痛胡麻子煎湯洗之腫即消○又木

鱉五倍為末付○痔漏蒲黃一血竭兩

兩為末少許貼患處○痔久不瘥用

熊膽塗神效一切方不及○洗痔用

山查子水煎先薰後洗以山查肉為

末貼之不三五次全好○一方用芭

硝二自己小便二碗同煎至一碗頻

頻洗之

●脫肛用五倍子白礬水煎溫洗○

又用浮萍草為末敷之○一方木賊

燒存性為末搽肛門上按入即愈

●蛇虫攻心心痛慧故根二水七升

煮三升先食空服之虫效不出○蛇

虫攻心如刺吐清水者龍膽一水煮

去相隔宿平且頓服○寸白虫雷丸

水浸去皮切焙乾為末五更初先食

炙肉便以一錢匕藥稀粥調服之○

寸白之敷藥鶴虱大蕎麥粉中醋糊

調敷患處家傳

●頭痛不可忍多是風痰所致山枕

子末和蜜濃傳舌上吐即止○頭風

痛遇天陰風雨先發者肉桂一為末

酒調傳頂上額角○時氣頭疼不正

朴硝二研末生油調塗頂上○又頭

痛欲死鼻吹硝末○偏正頭風用白

芷為末煉蜜為丸如圓眼大每服二

三九食遠細嚼茶清送下○因氣惱

冲動頭痛用香附子二錢川芎一錢細茶

撮水煎服○又少年強壯人氣實有

痰或頭暈而重痛用太黃酒拌炒如

此三次為細末清茶調服○頭痛欲

死滑石末吹鼻內即愈

●白髮變黑烏麻九蒸九曝為末以

麩骨丸服○治白髮極効燒已髮令

頭垢等介丸如大豆大每服三九令

頭不白○髮落不生側柏葉陰乾為

朱菜油調塗○無髮甜瓜葉搗汁塗

之即生

●面上黃水瘡用雞子煎煉取汁搽

瘡止立愈抓破面皮用生姜自然汁

調輕粉搽患處更無痕迹○洗面方

每早以漱口水吐在手掌中洗面令

々自然光潤○面頰赤痒其狀如癩

名頭面風以杏仁類々指之

●耳內腫痛膿血出白礬枯為末入

麝香少許吹耳日三四度或綿裹塞

其中立瘥○耳聾細辛為末焙黃蠟

椀為丸如雀糞大綿裹塞耳中○卒

聾并耳內卒痛石菖蒲附子炮去皮

分右為末醋糊丸如杏仁大綿裹置

耳中日二易之○耳聾雄黃硫黃各

分為末綿裹塞耳○耳痛卒聾杏仁

七粒去皮研綿裹塞耳○耳中常鳴生

地黃載寒耳數易之即愈○耳中出

孟龍骨為末吹入耳內○百虫入耳
好酒少許灌耳中却起行自出○又
灌藍青汁少頃虫出○又搗韭汁灌
耳中即出○惡虫入耳用桃葉按細
塞耳○蟻入耳用穿山甲燒存性為
末以水調灌之即出○蜈蚣入耳生
姜汁灌耳中韭汁亦可即出

●鼻塞不通用菖蒲皂角等分為末
每一錢綿裹塞鼻內仰臥少頃効○
老人鼻中流涕不乾名鼻淵獨蒜四
五箇搗如泥貼脚底心下用紙貼之
其涕無不出○治鼻赤生銀杏嚼爛
敷鼻上○久患鼻瘡膿極臭者百草
霜為末每服一錢食後冷水調服

○酒釀鼻及女人鼻上生黑粉刺以
白鹽常擦為妙

●口苦黃蓮為末水調服○口瘡黃
連乾姜各等分為末摻患處立已○
口瘡并喉痛甘草白礬等分為末摻
口內○白口瘡急惡狀似木耳用五
倍子青黛等分為末好酒調搽瘡上
咽瘡吹入喉中有津吐出○口瘡生
白礬末貼之極効○重舌五靈脂米
醋一椀同煎旋漱立安○舌上血出
香薷煎汁飲數盞瘥○舌無故出血
名曰舌衄檉花炒末乾摻舌上○舌
腫硬閉塞悶亂百草霜食鹽各等分
并花水調塗舌上○又用蒲黃摻舌

上充良○傷寒舌出寸餘連日不收

梅花片腦搽舌上應手而收○唇上

生瘡連年不瘥用八日監葉一筒搗

汗洗

●牙痛乾姜兩雄黃錢三為末擦之立

已○又方用蒼耳子濃煎汁含漱立

効○蛀牙石灰為末砂糖丸如黃米

大塞蛀孔○又方川椒五十粒巴豆一枚

右飲丸如豆大綿包塞蛀穴○茅根

動欲脫生地黃剉綿裹著牙上啞之

潰齒根三五次嚙之十日効○牙疼

諸藥不効甘草煎濃汁含嗽三五日

愈○齒齦宜露每且檢鹽納口中以

熱水含漱齒通不過五日齒即穿

蜜○齒縫出血百草霜末搽之立已

●一切新久眼疾腫痛用鹽湯頻

執洗立愈○一方眼昏暗或流冷淚

用夜脚不語吐沫洗眼每醒即洗久

則自明○倒睫奉毛木鱉一箇去殼為

末綿裹塞鼻中左目塞右目塞左一

二夜其睫自正○飛絲入眼睛脹突

出痛不可忍新筆兩三管需好墨更

換頻運眼上飛絲纏筆而出○稻麥

芒入眼取蛭蟪以布覆目上持蛭蟪

於布上摩之其芒出著布上○又方

以蕤荷根汁注目即出○目暴赤腫

煇車石火煨尿淬風化礞等分為末
新水化一粟點之○赤目浮醫古錢

一文塩方寸匕治篩點之○目洗藥

黃柏二黃連一明礬三分五右粉

綿裹水天目一入煎半分石菖車前

葉入洗之妙也○爛目方唐金口ク

白粉二艾葉三黑燒三右三味

合爛處塗之

咽喉腫痛桔梗一甘草三水煎

服○喉痺及喉中熱痛用青艾葉杵

汁灌入喉中○一方枯礬雄黃等分

為末吹喉中○纏喉風生白礬末冷

水調二錢下○又燈心草燒灰吹入

喉中○誤吞穀芒刺在喉中芝麻炒

湯點細々呷之○語音不出皂角一

去皮三蘿蔔三右水煎服之不過三服

能語聲出

頸項結核腫痛并瘰癧馬刀瘡不

問已潰味潰日久成漏者用夏枯草

水煎頻服○滿頸生小瘰子用天南

星為末醋調搽瘰子上數次即落

心胃痛不可忍者用山梔子十五

浸姜汁川芎一錢香附子童便浸水煎

熱服痛止不可就食○心痰用白礬

末一錢燒酒調服○心痛如錐刺要

人兩手重按其上百藥不用乳香

沒藥麝香各一為末滾燒酒調服○

一切心痛不拘大小男女太馬魁鈴

筒燈上燒存性為末溫酒服立効○

卒患心痛灸地作王字撮取中央土

水和一外服良○氣心痛五靈脂錢

枯礬二為末温酒調下○心疼黑沙

糖半熱燒酒調服立止○濕痰心痛

白螺螄殼去泥砂燬末方寸匕温酒

調下○心疼欲絕百草霜五鹽一研

湯調服○蟲咬心腹刺痛用苦練根

一劑水煎服打下蟲立愈

●卒患腹痛山豆根水研半盞服入

口即定○一方心腹作痛用白礬末

錢好醋半盞煎服○一方心腹冷痛

白礬胡椒各一錢每服五分黃酒調

服○腹痛成陣者飲凉水一碗即止

若綿綿痛不止者用滾燒酒加鹽一

捻服之○四時腹痛白芍藥炙甘草

各等加黃連因氣加香附子

●腎虛腰痛用破故紙酒炒為末每

三錢空心酒調服○一方對閃腰痛

甚者當歸肉桂玄胡索各等分為末

每二錢酒調下或對酒煎服亦可○

腰痛黑牽牛子半生為頭末水丸如

梧子大碗黃末為衣每服五十九空

心鹽湯下○又方肉桂一木香杜仲

各四右為末酒調下○卒腰痛木豆

兩水拌濕炒熱布裹熨之冷則易○

腰曲不能伸者針委中立愈

●脇肋諸痛用韭菜連根搗爛醋拌

炒緝包熨痛處○一方用芥菜子水

研傳○脇痛如打大豆半斤炒焦好
酒一升煮之熱飲取醉

●脚氣冲心用大欖榔一箇為末童便
姜汁溫酒共半盞調作一服○腰脚

骨節痛不止用威靈仙煎酒空心溫
服○脚氣衝心悶乱不知人大豆一

水三升濃煮取汁頻服半升如未定可
更服半升即定○脚氣作痛蓖麻子

粒七去殼研爛同蕪香圓貼足心痛即
止○腿轉筋用松節剉好酒煎服一

方加乳黍少
●疝氣危急玄胡索五錢全蠍去殼

為末每一錢空心鹽酒下○小腸備
墜氣用生姜二兩半去皮一半留一

半一處搗取汁傾在熱酒內加鹽少
許空心服不過三服愈○疝氣偏墜

服之一料斷根蒼朮一分浸童便
一分浸好酒一分浸人乳一分浸鹽

水各浸三日炒乾橘核二兩同為末
酒糊丸如梧子大每百丸空心酒下

○下元虛冷寒疝攻痛小茴香鹽水
每三錢空心燒酒調下○癰疽偏墜

氣脹不能動者牡丹皮防風等為末
酒服二錢甚効

●兩足痿躄不能動履鹿茸人參各
錢水煎空心連服

●飲酒濕痰痛風黃柏酒炒威靈各
蒼朮羌活耳草各三陳皮芍藥各五

右為末每服一錢匕姜湯下○走注

夜痛藏靈仙酒浸焙羚羊角燒三蒼

耳子半白芥子炒右為末每服

一錢匕姜湯調下

●消渴心熱天花粉水煎當茶吃○

消渴飲水無度身躰瘦弱用人參天

花粉等為末煉蜜丸如梧桐子大七

五十九食前麥門冬湯送下○三消

黃芪六兩耳草灸水煎無時服

●胃中熱消渴主之利尿陳粟米炊

飲食之良○凡消渴大忌飲酒房事

食油麵煎炙博藏鹹物及一切熱物

百日以上不可針灸瘡中生膿水或

成癰疽膿不止者灸○凡消渴藥

中大禁半葷及不可發汗

○婦人

○婦人百病香附子一斤分作四製

一斤分用蓋水加姜汁浸透煮畧炒一

分用米醋浸透煮熟畧炒一分用山

梔子四同炒去梔子不用一分用童

便洗過不炒為末一分加牡芍當歸

各二兩為末酒煮麵糊為丸如梧桐

子大每五七十九隨引下○經水不

調酒下○胎前諸病艾湯下○產後

諸病芎歸湯下○胸膈脹滿姜湯下

○頭暈前茶薄荷入姜汁下○婦人

百病可服之

●婦人經血逆行或血暈或吐血或

咳血用葦菜搗汁服之○一方婦女
月經不通生蒲黃錢乾漆炒為末三
錢紅花煎酒調服立通

●血崩不止天靈蓋燒存性為末每
二錢空心黃酒調下如神○一方香

附子炒為末每服三錢空心熱酒調
服米飲亦可○一方貫衆半兩煎酒
服之立止

●赤白帶下五倍子炒桃仁燂去
介為末燒酒調服○一方鹿角燒灰
存性為末每二匙空心好酒調下

●婦人下冷子宮久冷赤白帶下崩
漏不止久不受孕用鷄子不拘多少
每開頂入硫黃研末三分在內攪勻

用濕紙包裹慢火煨熟嚼吃溫酒送下

●妊娠胎氣動不安用鯉魚一箇
熟并湯食之○妊娠腰痛如折不能
轉側鹿角火燒令赤酒淬再燒再淬

以碎為度細末酒調服○一方因大
動胎逆上作喘急者用黃芩香附子

為末調服○妊娠傷寒恐致墮胎用
伏龍肝為末濕水調塗臍上一日一

換七日之後不墮○妊娠瘕疾用帶
皮老生姜取自然汁用紗帛蓋定一

宿發日天將明時分攪勻頓服○探
胎方如過月難明有無如月數未足

亦難明用好醋炆艾服半盞後腹中
番大痛是有孕不痛定無○妊娠諸

病此系極當歸川芎芍藥酒炒陳皮大腹

皮黑豆水洗香附子炒甘草入生姜葱白

水煎服另紫蘘和氣飲加減之法詳

千濟世全存

●難產用蛇退錢焙存性為末黃酒

調下即生○一方用在脚舊草鞋洗

淨燒灰三錢水下○婦人難產經閉

一坐生雲母粉半兩溫酒調服入口即

產不順者即順萬不失○橫逆手

足先出以其父名吞兒足即順生○

死胎用朴硝末二錢溫童便下○橫

逆不順子死腹中者用伏竜肝為細

末每二錢溫酒調下其兒帶土而下

○胞衣不下令產婦口嚼自己髮尾

於口中令嘔噦衣即下

●凡產後不問有病無病即用童便

半鍾好酒半鍾合而溫服即百病不

生○產後惡露不盡攻冲心腹疼痛

或作眩暈或寒熱交攻用益母草生

一大劑童便黃酒各半鍾煎溫服○

右方產後血大下不正用蒲黃炒黑

每二錢用芍藥煎湯調下○產後血

暈不省人事眼黑耳鳴當歸川芎各等

水煎入童便服○一方產後

血暈冲心悶絕五靈脂生半為末

作一服酒調下口禁者灌之湯調亦

可一方加荆芥穗焙未等分童

後血上心已灰鬱金燒存性溫米醋

調灌下立治

●婦人少乳用川山甲燒存性研末

每二錢空心熱酒調下○氣血虛無

乳當飯錢黃芪兩葱白十根水煎服

○乳子忽睡乳不時泄結痛亦有不

痒不痛腫硬如石曰吹妳不急治則

癰腫急與拈樓散以手揉之則散

香分拈樓根末一兩右末酒下○乳

汁不通木通川山甲炒等分為末每

二錢通草煎湯調服○乳癰未成者

師散已成者立消用蒲公英一把酒

煎服之

○小兒

●急驚風見生人如見虎面赤口紅

舌生芒刺喉中痰響眼目直視手足

牽連並治慢驚不可服用芦薈為末

麵糊為丸如菉豆大每服五七丸燈

心竹瀝湯下○小兒發搐眼翻口噤

抽掣痰喘氣促蟬退去翅足水煎白

附子磨濃溫服立已○小兒解牙反

張目直視因驚而致天南星半夏姜

三片煎熟入竹瀝姜汁灌服

●慢驚風人參錢耳草五黃芪二錢

煎服神也

●五疳丁子人參龍膽木香各一兩肉

豆蔻兩右蜜丸湯用○小兒疳瀉赤

石脂炒為末粥飲調服小兒不肯服

藥者服此甚妙

●痞癖大黃朴硝等分爲末蒜泥成膏用絹帛攤成膏藥貼之自軟消

●小兒吐瀉滯石煨水飛兩藿香六分

丁香三分爲細末用新米泔水調服方寸匕○世瀉山藥半生半炒等分爲末每

服一二錢黑沙糖水調下

●小兒痢疾腹痛不問赤白冷熱皆可用之老生姜切片細茶三錢用新汲

水煎服○噤口痢嘔逆不食石蓮肉炒去心爲細末每服一二錢陳倉米飲

調下如嘔加生姜汁二匙同服

●小兒瘧疾用雄黃人參神麩各五錢爲末端牛日午時用粽子尖七筒和爲丸如赤豆大病未發時面東

服七丸無根水送下

●小兒咳嗽發熱氣喘吐紅人參天

花粉等分爲末每服五分蜜水調服

●小兒喉中痰壅喘急巴豆一枚去

穀搗爛作一丸以棉花包裹男左女

右塞鼻中痰即墜下

●小兒赤眼用黃連末水調貼脚心

乾則以水濕之

●小兒牙疳用白礬裝入五倍子內

燒過爲末貼之

●小兒口瘡流水不絕用熟米一盞

自礬一勺將兒兩足頻洗之立瘥

○口瘡不能脫乳密陀僧末醋調塗

足心

夜啼黑牽子末一錢水調傳臍上即止

●小兒喫土用乾黃土一塊研末濃煎黃連湯調下

●小兒遍身生瘡膿水不乾用黃柏末加枯礬許擦之○小兒頭瘡耳瘡用竹葉燒灰和猪膽汁塗之

●痘疹初出以絲瓜連帶者三寸連皮燒存性朱砂水各為末等分量兒

大小或五分或一錢砂糖調服或蜜水亦可多者可少少者可無○一方

紫石粉水解眉間擦之妙也○小兒發熱鼻尖耳尖冷是瘡將出便升麻

葛根牛旁子糖菓子甘草水煎服其出必疎○痘瘡紫黑乾枯變黑白腎

身如火灸之熱犀角羚羊角一味磨井花涼水服之有即生之功須要認

得果是熱毒無不効○痘瘡結痂已盡忽又倒發好雄黃二錢為末黃酒

半碗煎滾待溫用綿帛蘸藥塗患處三五次立消○預解痘毒五六月取

絲瓜蔓上卷鬚陰乾至正月初一日子時用二兩半煎湯父母只令一人

知溫浴小兒身面上下以去胎毒永不出痘縱出亦少也○又方初發時

或未出時以朱砂末半錢蜜水調服多者可少少者可無重者可輕也

○外科

發背癰一切腫毒用白礬末一錢溫

酒調服外用五倍子炒為末醋調貼

患處○發背癰疽痛不可忍已成禍

芙蓉皮或葉或根皆可黃荆子為末等分搗

爛鷄子清調塗瘡上蠶頂○一方發

背痛欲死者用伏龍肝末以酒調敷

患處如乾則易不白平復○一方發

背及一切疔疼腫毒乳癰便毒不

已成味成痛不可忍者用樾花微木

煎入酒前服或金銀花如上煎服俱

效○發背惡瘡此藥托裏止痛排膿

金銀花四兩無花用苗葉嫩莖甘草一兩酒水

各半煎一方加黃芪

●癩癧未破者雄黃地龍糞小麥麵

等分研末醋調塗之○一方大田螺

通穀燒存性破末破者乾貼末破者

香油調付○一方南星半夏血竭

輕粉許少為末津唾調傅

●疔瘡腫毒用白芷為末每五錢煎

酒調服○又方用葶藶子為末鷄清

調搽○疔腫毒危急欲死者搗菊花

葉敷上即愈冬月無葉用根亦可○

疔瘡煩燥手足不往發狂者甘草節

菘豆辰砂各等分為末每服三錢熟水

下○一切疔腫取蒼耳根莖葉燒作

灰醋浸和如泥塗乾即易十餘度即

拔出其根

●便毒初作者大黃三錢枯礬一錢為末

好酒調服日久加穿山甲炒一錢○便

毒腫痛雄黃乳香各二兩黃柏一兩右為

末新汲水調敷腫處自消○便瘻牡

蛻太黃山梔子等分為末酒水煎露一

宿空心溫服

●下疳瘡先用黃柏煎湯洗淨或半

草煎湯頻々洗之後用天靈蓋燒存

性為末摻患處○一方五倍子燒存

性為末摻上○一方黃連黃柏輕粉

等分為末茶洗付之

●楊梅瘡土茯苓四兩桔梗防風各一兩

乳香沒藥各五右水五碗煎至三碗

溫下日服尽忌茶水諸物五貼全除

忌鉄器○一方楊梅瘡毒年久不愈

苦參連根帶葉摘下搗爛取汁和酒

飲之○楊梅天疱愈後疤痕紅黑用

太黃白礬各二味各等分同研擦患處

其痕即去色亦如舊

●膿瘡用枯礬末陳醋調敷○一

方用五倍子炒研末付上○一方賺

瘡濕痛及遍身熱瘡黃柏一兩輕粉三錢

共為末用猪胆汁調塗濕則乾擦

●疥瘡蒼木皮研煎水頻洗○遍身

風痒瘡亦茵陳煮濃汁洗瘡○癬初

生或始痛痒以姜黃末搗之妙○又

嚼鹽塗之妙也

●頭瘡以醋湯洗淨百草霜入臘粉

少許生油調塗立愈

●赤白癩風用芝麻花同自己小水

頻擦患處過半日洗去如失○紫白
癩風硫黃輕粉杏仁各等為末姜汁
調擦○黑癩風青胡桃橫破其切口
擦七日妙也

●諸瘡用五倍子炒末醋調塗患處
○又方用大黃末醋調敷患處○手
掌心生瘡牡蛎灰泡湯浸洗至湯冷
止不三次便可○脚上瘡鹿角燒存
性為末入輕粉香油調敷○脚指縫
瘡爛濕枯凡二黃丹半右末搽之○
漆瘡作痒非葉杵傳之○又方用川
椒煎湯洗之○凡至漆所嚼川椒塗
鼻上不生漆瘡

●杖瘡并打傷皮不破而肉損者用
蘿蔔搗爛登之○又方用菜豆粉微
炒鷓鴣子清調塗上○又用大黃末童
便調敷

●凡打跌傷損即用童便黃酒各一
鍾合而溫服下日三四次外用葱切
炒焦搭傷處冷則易○一方跌撲傷
損惡血入腸胃下血濁如者用百草
霜研細酒調下○傷手足折臂筋
損骨但有皮相連者用生地黃研汁
好酒和服一月筋皮連續并杵碎炒
熟封損處極效○腦破骨折蜜和葱
白搗勻厚封立效○傷損血出不止
以陳紫蘊葉蘸所出血接爛傳之血
不成膿且愈後無癢甚妙也

●破傷手足血出不止一時無藥用
自巳小便淋傷處雖痛甚即愈○金
瘡血不止兼痛麒麟竭末傳之立止
又方紫檀末傳之○又止血止痛白
芍藥末傳之即止○箭鏃及針刀不
出象牙屑水和傳上即出○金瘡傷
破出血并狗咬此藥端午日製之礦
石灰不拘多少炒研生韭菜連根同
搗作餅陰乾為末搽上止血生肌
軍中一捻金

●破傷風用槐子一合炒酒一碗煎
至八分熱服汗出為愈○破傷風解
引反張南星防風羌活甘草生薑五
片水煎服

●湯盪火燒腫爛疼痛用白礬末香
油調掃患處○一方用菜豆粉炒黑
為末新汲水調塗○一方百草霜輕
粉為末香油調搽○中熱油燒痛以
白蜜塗之○熱油及湯火燒瘡痛不
可忍石膏末傳瘡上○一人灸火至
五壯血出不止如尿手冷欲絕以酒
炒黃芩二錢為末酒服即止○燒失
烟薰致灰者以蘿蔔搗汁灌之即甦
●狗咬倉卒無藥用葱搗爛貼之○
又牛糞塗之一方嚼杏仁傳○又百
草霜末油調付○顛犬咬韭菜根搗
汁多服又灸傷處三五壯○又膽礬
為末貼瘡止○貓咬搗薄荷汁塗之

鼠咬麝香末津調塗之○毒蛇螫

入急掘地坑埋瘡處緊築其上毒即

入土中痛止○蛇咬赤腫欲死用白

芷為末每三錢麥門冬湯調服外用

白礬溶化滴傷處○中蛇毒加渡水

渡水則痛甚○蛇入人竅急用刀割

尾挾辛辣物用絲縛定自出不可拔

○辟蛇法雄黃五兩帶之入山則諸

蛇不敢近○蝎螫用韭菜汁擦之○

蜈蚣咬入嚼鹽塗之或鹽湯浸之妙

又蜈蚣螫傷處地作王字內取土摻

之即愈○蛇蜂蜈蚣諸虫傷雄黃末

水調敷仍酒調服○蜂蟻螫反手取

地上土傳之或入醋調○蜘蛛咬用

滑油擦之○蚯蚓咬入其毒如大風

屑鬚皆落以石灰水浸之良○頭上

虱子梨芦末摻髮中經宿虱子皆死

○去蚊五月取浮萍陰乾用之薰之

○又法用端午日午時登儀方一票

貼柱脚上能辟蚊虫○馬咬用栗子

嚼傳又燒灰油調付可○人咬龜板

燒灰末油調塗

○中諸毒只宜多准香油最妙○下

方用甘草菜豆煎湯飲之能解百毒

○中砒霜毒淡豆豉乾蚯蚓各一茶

水調服立解○中巴豆毒煮黃連湯

飲之中巴豆毒利不止炮乾姜黃連

炒等分為末每服二錢涼水調服○

中半復毒以生姜汁飲之○中杏仁
毒搗藍汁飲之○誤食川椒閉氣不
通取新汲水飲之又方涼棗食之即
解○解諸魚毒木豆煮汁飲之○食
雞子毒飲醋少許即消○牛馬肉毒
甘草煮濃汁飲一二升或煎酒服取
吐或下如渴不可飲水飲之即愈○
中六畜肉毒用犀角濃磨水服一碗
妙○中斑狗毒煮黑豆汁飲之○誤
吞木屑捨喉不下或在瀕更用鐵斧
磨末灌下即効○誤吞金銀銅鐵等
物不能化者以砂仁濃煎湯服之其
物自下○誤吞針蚕豆煮熟同韭菜
吃下針同菜從大便而出○誤吞水
蛭宜食蜜即化為水○又用濃茶多
服亦効

●諸骨體喉以象牙末吹之妙也○
又縮砂甘草等分為末綿裹喉之嚙津
久之隨痰出

●自縊死壓死溺水死壓死產乳死
是謂五絕并中風不省人事半復為
末如黃豆大吹入鼻中即活心頭濕
者一時可治○自縊者切不可割斷
繩宜以膝蓋或用手厚裹衣物緊頂
谷道抱起解繩放下揉其項瘻搗鼻
及吹其兩耳待其氣回方可效手若
便泄氣則不救矣○自縊死者宜從
容安定心神慎勿割斷繩抱取心下

猶溫者刺雞冠血滴口中即活男用
雌女用雄○一方用雞屎白如棗大
酒半盞和灌吸鼻中尤妙一方以藍
汁灌之○卒墮壓倒打死心頭溫者
皆可救將本人如僧打坐令一人將
其頭髮控放低用半隻末吹入鼻中
如活却以生姜汁清油攪勻灌之○
溺木死急解去死人衣帶將艾灸臍
中即活○又取竈中灰兩担埋之從
頭至足水出七孔即活○又搗皂角
末綿裹內下部瀝水出即活○死
不得近前喚但痛咬其脚跟及唾其
面○小省者移動些少臥處徐々喚之
元○有燈則存無燈則不可點燈用皂
角末吹兩鼻即活○忽不悟勿以火
照之必死但痛嚙大拇指甲際而唾
其面則活取薑汁吹鼻孔冬月用薑
根搗汁灌口中○卒魔用雄黃末吹
鼻孔中即活○又魘死及一切卒死
灸人中穴三五壯又灸臍中百壯○
凡冬月凍倒扶在煖處不得便與熱
湯及向火灸雪中行凍便近火脚指
墮落○又治凍死生薑研陳皮各一
兩水煎溫服挾暑死不可使冷水冷之
即死宜用溫湯常摩洗其心腹間如
路途急切用路土熱土置臍腹間冷
人更尿其臍中即活

●凡人正月元旦向東以菘菜水吞赤

小豆三七枚一年免諸疾

●凡辟難無人之境取白藜根洗淨咀嚼或石上晒乾搗末水服方寸匕可辟穀不饑

膏藥

十

萬病無憂膏

治風寒濕氣取傷跌撲閃挫傷損一切疼痛皆貼患處心腹疼痛俱貼患處哮喘貼背心瀉痢貼臍上頭痛眼痛貼太陽穴及治一切無名腫毒瘡疽發背疔瘡癩毒流注濕毒癰瘡初覺痛痒便貼患處即消已成亦能止痛縮膿長肉生肌百發百中其功不能盡述

川烏頭 草烏頭 大黃 各六錢

當歸 赤芍藥 白芷 連翹

白欬 白芨 烏藥 木鱉子

肉桂 檉枝 桃枝 柳枝

桑枝 棗枝 各四錢 加苦參包角

錢 右生散用真香油二升浸藥

一宿用火熬至藥焦色以生絹濾去

渣不用將油再熬一滾入飛過黃丹

十二兩炒過陸續下檉柳棍攪不住

手滴水成珠為度離火次入乳香沒

藥末各四錢攪勻收貯退火毒聽用

○又方加藜合香二錢尤妙

十一

六九膏

玄參 白芷 當歸

肉桂 大黃 赤芍藥 生地黃 各二兩

用油二斤半浸夏三冬十春秋七方入銅

鍋内文武火煎至藥枯黑瀝去渣入黃丹十二兩
 以槐枝不住手攪煎至滴水成珠軟硬得中即
 成膏矣治一切瘡疽腫毒不問年月深淺已成
 膿者並宜如發背先以溫水洗拭攤攤緋絹貼之更以
 冷水送下血氣不通溫酒下赤白帶下當飯煎酒
 下咳嗽及喉閉纏喉風綿裹含化一切風赤眼貼兩
 太陽穴更以山柈煎湯下打撲傷損外貼內服陳皮煎
 湯下膝痛外貼內服鹽湯下唾血桑白煎湯下婦人
 經閉腹痛作痛貼之經行痛止一切諸瘡別煉油
 少許和膏塗之虎大蛇蝎湯火金瘡傷其外貼內
 服諸瘰癧瘡癰及楊梅瘡毒潰爛先用鹽湯
 洗淨貼之並以溫酒下三五丸梧子大以
 蛤粉為衣其膏可收十年不壞愈久愈妙

寶永七庚寅歲五月吉日 大野木市兵衛板行
 大慈心齋橋筋安堂寺町秋里屋