



錦囊妙藥秘錄全





錦囊妙藥祕錄例言

夫醫不執方貴因病發藥但藥餌所不及或隨物以奏功至治療所難痊又無意而收效是能去病即良方也。因輯其明簡經驗者。用藥須辨病源倘病源微差即藥物不效不得徒諉於方也。且藥有分而西有修製必須一一詳察而其間藥品又有真偽有形似人命所關尤不可舛率以從事醫以濟人必不自任己見且屢試屢驗之方其中配合必經細心斟酌倘意為增



減雖識力或過前人而偏見之誤亦不少矣養生者自慎焉。

一症之內必備數方者非一方不驗又試一方也或藥有未便此處得之易彼處得之難或症有殊途誓之其症而對誓之彼症而不對因是並載惟用所宜。

是書專取藥品簡易便於窮村僻壤應手而得容有一二方藥較多者因立方奇驗不忍棄置且仁人君子製一料而能濟數十人蓄多品而能起數百命功孰

大焉因亦附錄於篇。

陸隱居修本艸以蠱蟲水蛭為藥功雖及人而害及物命以致淹留上昇是書雖有偶用者亦危疾中僅見之非得已也修製家慎勿多傷為幸。

病痊之後貴調養尤貴修省蓋始病之由必因六氣七情所傷以至若此今幸值方而愈則節飲食慎起居必矣而養心尤亟於養身修省可不猛乎。

是書始輯於丁酉成於乙巳俱屬初授經驗為多但字

內良方奇效者不少凡我
 同志更祈廣為惠傳嗣有
 續集悉當編入即諸君子
 之功德曷有既耶
 仁和醒菴主人王夢蘭
 敬識于寧壽堂
 順治丁酉槐七月之既望

(Faint bleed-through text from the reverse side of the page)

錦囊妙藥祕錄目錄

中風諸症	一	傷寒諸症	三
瘟疫諸症	七	傷風諸症	八
瘧疾諸症	九	吐瀉諸症	十二
霍亂諸症	十一	痢疾諸症	十五
痰嗽諸症	十二	勞瘵諸症	廿
虛損諸症	廿	吐血諸症	廿二
衄血諸症	廿一	下血諸症	廿三
腫脹諸症	廿五	水腫諸症	同
脹滿諸症	同	黃疸諸症	廿六
痞積諸症	廿八	痿痺諸症	三十
諸風諸症	同	頭痛諸症	卅二
耳疾諸症	卅七	眼目諸症	卅八
鼻疾諸症	卅三	口舌諸症	卅四
齒牙諸症	卅六	咽喉諸症	卅六
心痛諸症	五十	腹痛諸症	五十

脾胃諸症	五十二	膈噎諸症	同
腰痛諸症	五十四	腸痛諸症	同
大便諸症	五十五	腸風諸症	五十五
脫肛諸症	五十七	痔瘡諸症	五十七
小便閉諸症	五十九	淋疾諸症	六十
遺精諸症	六十一	疝氣諸症	六十二
脚氣諸症	六十四	婦人諸症	六十七
妊娠諸症	六十八	產育諸症	七十
產後諸症	七十二	乳病諸症	七十六
婦人諸病補遺	七十九	小兒諸症初生通用	八十
急慢驚風	八十四	五疳諸症	八十四
小兒雜病	八十六	痘疹諸症	九十
折傷諸症	九十一	破傷風	九十五
中毒諸症	九十七	虫獸傷症	九十七
瘡毒諸症	九十九	餘方補遺	百

錦囊妙藥秘錄

大明王夢蘭蕙子父編輯
皇和藤井以求子見隆和解

中風諸症

初中痰盛不省人事其症卒二暈倒

言語口不能言此時急三蘇合圓之用

竹瀝生薑汁三調入口中灌灌即醒

隨用方

白朮 天麻 當歸 川芎 薄荷 桂枝

天南星 陳皮 各等分 水一碗半 俗云一

也後入煎七分竹瀝小盞二生薑汁二

匙加一服服スベシ如獲合圓無之時ハ

急二星香湯ヲ用ユ 天南星 五

木香 煎服ス

又方 真牛黃一分研テ細ニシ湯ニテ

送下ス效アリ黄一分

○又方 細辛末鼻中へ吹入一嚏レハ

即醒天南星

○又方 五月五日白鳳仙花ヲ取燒酒ニ

浸シ能包置年月ニ拘ルヘカラス此レ狂ニ

遇ハ此燒酒ヲ温メテ一杯服スレハ其痰

立處消白鹽梅ヲ齒ニ楷付

中風口噤不能開白鹽梅ヲ齒ニ楷付

レハ即口ヲ開クモノナリ又齒ヲ傷フナシ

中風口噤不語 明礬ニ及研テ細末トシ

生薑汁ニテ調ヘ口ヲ開テ灌入ヘシ痰涎

ヲ吐テ即醒馬料ニ用ユル

○又方 黑豆小キモノヲ用ユ一升水ヲ入煮テ

其汁ヲ煉飴ノ如クニシテコレヲ含スベシ即

能言

因寒中風 其症身強直戰掉テ無汗者

ナリ用薑附湯温之 乾薑 附子 各

等分煎服ス或ハ麻黃少加

因虛中風 補中益氣湯或ハ六君子湯

ノ類ヲ用ユ人參白朮ニテ救ヲ取ベシ

書ニ見タリ

中風口眼歪斜 生瓜薑搗テ汁ヲ絞リ

大麥麩ヲ和テ餅トナシ炙熟シテ心頭

ニアテ、慰バシ口眼ノ歪正クナラハ便チ止

ベシ度ニ過コトナカレ

中風半身冷 桑寄生ヲ酒ニテ煎シ服

スベシ緩ニ用ルニ酒ニ浸シ置テ温メ服

中風口噤及口歪半身不遂 其症邪經

絡ニ中ルトキハ口眼歪邪血脉ニ中ルトキハ

半身不遂 白附子 白僵蚕 全蝎

各等分細末之每服二錢酒ニテ送下ス

○牛黄散 中風痰厥不省人事及小兒

急慢驚風ヲ治ス 牛黄 一分 辰砂 五厘

白牽牛子 二分 共ニ研テ末ニ痰厥ニハ温

香油ニテ用ユ小兒ニハ右ノ半劑ヲ用ユ急

慢驚風ニハ好酒ニ蜜少許入右ノ藥ヲ

與フヘシ

○史國公藥酒方 元臣史天澤ト云

人曰臣天子ノ聖恩ニ沐シ叨ニ官職ニ

居リ節氣ノ宜ヲ謹ス遂ニ風疾ニ流レ

身偏枯手足拘攣行歩ニ堪ス療治

ルト十年全ク才救ナレ官ヲ辭退シテ

里ニ歸リ廣ク名醫ヲ訪至元十七年三

月中驛道ニテ異人ニ逢面リ臣ガ疾ヲ

見テ神方ヲ傳ヘ大ニ靈驗アリト云臣方

ニ依テ酒ニ浸シイニ夕服セザル先ハ人ニ扶ラ

レテ起ルコト能ズ此酒一升ヲ次第ニ飲テ

手ニテ自髮ヲ梳ニ升ヲ飲テ手足屈伸

ニカアリ三升ヲ飲テ言語舒暢ニ行歩故

ノ如シ四升ヲ飲テ肢體通煖百節遂ニ

和シ歩コト飛カ如シ其效如神乞天下ニ

頒行テ万民壽域ニ至シト云云

防風 去蘆頭二十分治四肢

節疼痛痺身拘急 秦艽 去蘆頭二十分治四肢

節疼痛痺身拘急 當歸 三十分補

血生血 牛膝 去芦十斤治手足麻痺腫

膝疼痛補精髓行血脈 虎胆膏 二十分麻冬退骨

節中寒壯筋骨 蒼耳子 四分碎用去根

癰瘰癧 晚蚕沙 二十分黃炒治癰瘰癧

節不遂皮肉頑麻 羌活 二十分治風濕

補肝腎明目 枸杞子 五十分炒治五臟風邪

補腎明目 油松節 二十分槌碎用

壯筋骨 乾茄根 六十分飯上ニテ蒸熟不洽諸毒氣

凡在諸骨節不舒屈伸

杜仲

三ノク善汁拌炒
去絲補腰膝

白朮

二ノク去芦
炒補脾胃

右各坐三ノカ三布袋二ノカ入大ナル罈ノ内ニ置好酒
三十五斤ヲ入罈ノ口ヲ封シ浸コト十四日満
テ罈カメトモ共ニ大鍋ニ湯ヲ沸シ此中へ入テ煮
ルコト三時ニシテ罈ヲ取出シ土内ニ三日
埋メ火氣ヲ去ベシ如地ニ埋メサレハ二月過テ
服スレハ火氣亦出毎日
清晨午後ヒルスギニ右ノ酒ヲ五七杯應ニテ服
スベシ大ニ補益アリ他藥ヲ服スルニ愈
リト云

○傷寒諸症

傷寒六經辨 傷寒ノ書多シトイヘトモ
仲景ヨリ詳ナルハナシ但經ニ傳ルコト各時
アリ療治スルニ一法ヲ執ガタシ因テ脈法
ヲ尤ニ録ス閱者傳ル所ノ經ヲ知治ス
ル所ノ方ヲ知ハ服藥悞ナク病可愈

○脈浮紫無汗頭頂痛腰脊強者傷寒

ト云病太陽經ニアリ○脈浮長ニノ身

熱ニ目疼鼻乾不得眠病陽明經ニアリ

○脈弦ニノ胸脇痛耳聾寒熱往來ノ

嘔アル者病少陽經ニアリ○脈沉細ニシテ

咽乾腹滿テ自利者ハ病太陰經ニアリ

○脈微緩ニノ口燥キ舌乾者ハ病少陰

經ニアリ○脈沉ニノ澁煩滿ニテ陰囊縮

ル者病厥陰經ニアリ

傷寒諸症 陰陽虛實ヲ論セス一切ノ

症ニ潔白ナル沙糖五錢目ヲ用ニ症ニ

隨テ湯ニテ服ス○陰症ニハ葱生姜ノ

湯ニテ服ス○陽症ニハ百滾湯ニテ用ユ

○暑症中熱ニハ新汲水ニテ服ス○虛

症ニハ米湯ニテ下ス○實症ニハ陳皮湯

ニテ下ス。○傷食ニハ山査子ヲ煎シタル湯ニテ用ユ。○結胸症ニハ鹽湯ニテ用ユ。○蛔厥症ニハ烏梅ト花椒トヲ煎シタル湯ニテ用ユ。○腹痛ニハ新汲水ニテ用ユ。○婦人ノ血崩ニハ鍋臍煤ヲ湯ニ入拌テ此湯ニテ用ユベシ。

傷寒惡心 惡心トハ俗ニイフム子ワルキナリ不換金正氣散ニ白朮茯苓桔梗紫葳大腹皮ヲ加ヘ生姜入煎服ス。方八諸書ニ出タリ故

解利兩感傷寒 經云兩感不治。陰陽受ルヲ兩感トス所察有虛實所感有淺深若稟實感淺間亦可生治之而不救者有矣未有不治而生者。此方十中一二ヲ活スヘシ。羌活一五分獨活

防己 黃芩 黃連 白朮 川芎 各二分
細辛 五分 生地黄 知母 各二分 水煎熱服

傷寒狂走 雞子殼湯ニテ服スレハ即睡テ止ナリ。ニハトリノタニヨカラ

傷寒結胸停食 結胸トハ心下堅ク滿テ石ノ如クニソ痛心高ク起リ手ヲ近ルコトヲ得ズ頂強ルコレ傷寒身熱ニテ醫者コレヲ下スコト早シテ熱氣虛ニ乘ジテ入痞結ニテ散セザルヨリ致ス所ナリ停食トハ不食ト同シ。陳香糟右キ香ノ物ノカスナリ六両 生薑 四兩 石菖蒲根 四兩 鹽 二兩 共ニ

搗勻ヘ炒熱シ餅トナシ平テ胸ノ痛處ニアテ温熨ベシ内響テ即去ルモシ口渴ハ心ニ任セテ茶湯ヲ飲ベシ大便ニ惡物ヲ利下テ即愈。

傷寒熱結不解 枳實五分 大黃七分
瓜蒌四分 煎之服之

傷寒發黃 發黃トハ全身黃色ニナ
ルナリ傷寒五六日忽此症アラハ急ニ麻
油蓋ニ半分 水半分ト和シ雞子清一ツ
入攪ニセテ服ス神効アリ

傷寒并一切雜病嘔噦手足逆冷
陳皮 一两 生姜 一两 水二碗八分ニ
煎之徐々ト嚥下スベシ即愈

時疫傷寒舌黃狂言發熱 雞子一
枚生ニテ吞ベシ即時ニ氣清ク爽ナリ
○又生藕ヲ搗絏リ汁ヲ取テ冷服ス數
アリ

傷寒喉管 此症喉ノ中癢忍難シ其
時茶酒湯水ノ類ヲ飲ベカラス若コレヲ

知スレテ茶酒湯水ヲ喫スレバ頃ニ喉
塞テ救ベカラス 薄荷 二分 麝香 一分
極細末シ管ニ入レ喉中へ吹其氣通ズル
ヲ待涎ヲ一碗許吐出スベシ其後ニ陳
黃米湯ヲ茶碗ニ半分バカリ飲スベシ
即愈

傷寒發願 此症ハ原風寒ヲ受衣邪
盡ス日久シテ身熱退ス頂ノ前後ニ腫
ヲ結疼痛初起ニ身熱シ口渴クモノ也

柴胡 天花粉 葛根 黃芩 桔梗
牛蒡子 連翹 石膏 各一分 甘草 五分
升麻 三分 水煎シ時ニ不拘服スヘシ

○此症初起身熱ナク不渴上微熱ア
リテ腫ノ處不紅疼痛ニハ 牛蒡子
桔梗 陳皮 天花粉 黃連 川芎

赤芍藥 茯苓 甘草 各一匁 水煎服ス

○傷寒日久シテ汗不出者ニハ大ナル梨

一ツ生姜一塊同搗テ汁ヲ取童便一碗

ヲ入隔湯煮俗云湯煎熱ノ服スレバ汗即出

○傷寒藥ヲ服スレバ吐出シテ不納ニハ

生姜汁ヲ半盞温メ服スベシ吐即止

○發散傷寒法 陰陽二症ヲ不問倉

卒ニ無藥時ハ生姜一兩葱白好酒大茶

碗ニ二杯一碗ニ煎シ熱服シ被ヲ蓋テ

周身汗透シハ即發散ス然レバ汗ヲ太

適ナカレ葷菜ヲ食スルコト五七日忌ベシ

春秋此方ヲ用ユ夏ハ生姜葱白半減ノ

用ユ冬ハ黑豆炒テニ合加フ右煎服ル

效アリモニ旅次ニテ煎藥ナキ時ハ生姜

五片葱白四莖此亦茯苓葉ニハモト無之時ニハ

細切シテ用ユ

湯ニテフリ出シ熱服スベシ

○瘟疫諸症 赤名エヤミト云

瘟疫 丹溪曰衆人病一般者此天行時

疫治法ニアリ補ベク散ベク降ベシ

大黃 黃芩 黃連 人參 桔梗 蒼朮

防風 滑石 香附子 人中黃人ノ糞

右細末シ神麴糊ニテ丸シ毎服五七丸

症ニ從テ煎湯ニテ用ユ○氣虛ニハ四君

子湯ニテ用ユ○血虛ニハ四物湯ニテ用ユ

○痰多ニハ二陳湯ニテ用ユ何レモ症ヲ

照シテ丸藥ヲ送下若熱甚者ニハ童

便ヲ加フ

○神仙百解散 山茵陳 柴胡 前胡

人參 羌活 独活 蒼朮 甘草 葛根

升麻 防風 藁本 藿香 白芍藥

半夏 白朮 各一兩 立春已後不加減
立夏後柴胡赤茯苓當歸 各五分 加立
秋已後八柴胡一分減之當歸赤茯苓
除辛葛根 炮肉桂 各一分 麻黃 五分 加立
冬已後八無加減右細末之每服三々ツ
生姜三片棗ニツ水一碗半入一椀二煎
之此湯ニテ服スベシ如表散セント欲セバ
右ノ湯ニ葱白三寸加へ煎之藥ヲ服シ
被シ覆テ汗ヲ出セハ愈

○時疫不傳人方 蒼朮 三々三分三厘 煎湯切片炒

甘州 一々六分 六厘 川芎 六分 葛根 一々三分六厘

生薑 三片 葱頭 三片 右水二碗入八分ニ

煎シ空心ニ服ス已ニ病者ハ愈イニ多不病

者ハ不深 ○又雄黃ヲ酒ニ浸シ一杯飲

ベシ時疫ノ病家ニ至レ決ノ傳ナシ

○又疫大行時我家ノ水缸ノ内へ毎朝

黑豆一握ヲ入テ此缸ノ水ヲ家内用ニシ

又寅刻ヒソカニ黑豆一握ヲ井ノ中へ

投入ベシ但人ニ見スベカラズ凡此水ヲ

飲家ニ時疫ヲ染ルコトナシ

○辟瘟丹 時疫ヲ不傳方 蒼朮 紅

棗 各等分 共ニ研 杵テ膏トシ 彈子ノ

大サニ丸シ 疫病時行ニ丸ヲ火ニ焼ベシ

○時疫方 半夏 川芎 茯苓 陳

皮 山查子 白朮 甘州 各等分 蒼

朮 為君 右水一碗半 一碗ニ煎シ服ス

頭痛セハ酒製黃芩ヲ加フ 口渴ハ葛

根ヲ加フ 身痛ハ羌活 薄荷 防風 芍

藥ヲ加フ

蝦蟆瘟 其症頂腫頭大ニ或ハ頰ハシテ

薑ノ如シ 白僵蚕 二兩 姜黃 二五五分

蟬蛻 六五五分 大黃 四兩 各細末シ糊ヲ

姜汁ニ煉右ノ藥末ヲ丸シ重一匁トス

蜜水ニテ服スベシ 大人二一丸ヲ用 小兒二八半丸ヲ用

○傷風諸症 俗ニ咳ノ氣ト云ハ感冒ノコト外 邪ノ淺キモノ也其ノ深キヲ傷風ト云

四時感冒風寒 初ニ起ルトキ葱白鬚

トモニ五根生ニテ酒ニ入温服ス

○一方 蒼朮 三匁 其叶 三分 生姜 大ニシテ

葱根鬚トモニ五根 春夏ハ荆芥 一匁五分

秋冬ハ防風 一匁五分 加ハ水煎之服之被

シ蓋ニ汗ヲ出シテ即愈

傷風身熱有汗脉浮咳嗽痰多

陳皮 八分 紫蘇 杏仁 半夏 桑白皮

貝母 白朮 各二匁 五味子 七粒 其叶 六分

生姜 三片 棗 一棗 水煎之熱服ス

傷風頭痛發熱無汗 冰沙糖 五匁

生姜 五匁 煎湯熱服取汗

傷風發熱頭痛咳嗽 川芎 白芷

紫蘇 各八分 陳皮 七分 香附子 一匁

其叶 五分 生姜三片 葱頭二個 水二

碗入八分二煎之空心ニ服ス

傷風頭疼發熱潮熱 細辛 白芷

石膏 各一匁 川芎 六分 水二碗入八分二

煎之空心ニ温服ス

傷風中寒重者 蒼朮 半夏 厚朴

各一匁 前胡 一匁 川芎 藿香 各八分

陳皮 七分 其叶 五分 水二碗入八分二

煎之温服ス汗出テ愈

風熱發癢起斑塊 防風 荆芥

黃芩 連翹 各一匁 其叶 五分 升麻 四分

木通 六分 枳壳 八分 桔梗 七分 水煎服

風疹 白雞冠花ヲ煎シ洗フベシ

○十神湯 時令不正瘟疫安行

冒發熱或疹ヲ出サント欲スルヲ治ス

此藥陰陽兩感ヲ不問並ニ皆治之

藥方諸書
出故書之

瘧疾諸症

瘧疾總論 王節齋曰瘧是風暑ノ

邪一日一發モノアリ二日一發モノアリ三

日一發モノアリ間一日二日連發モノアリ

日ト夜ト二度發モノアリ有汗モノアリ

無汗モノアリ上半日發モノアリ下半日

發モノアリ夜發モノアリ治法邪氣外

ヨリ入モノハ發散スベシ然レ胃氣ヲ

扶持ヲ為本ニ陽分陰分ヲ分劑ノ

藥ヲ用ユ邪瘧及新發熱スル者ハ發散

之或ハ截ヘシ虛瘧及久者ハ氣血ヲ補

ヘシ若截藥ヲ服シ過セハ脾胃ヲ傷

テ延綿テ不休

○瘧疾主方 柴胡 白朮 蒼朮 各一

已上三味瘧疾
必用ノ藥ナリ 陳皮 七分 甘草 五分 葛

根 一分二分 水煎服ス○一日一發及午前

發者ハ邪在陽分枯黃艾テ茯苓主長

各一々加フ○熱甚頭痛再川芎石膏

各一々加フ○口渴ハ石膏知母麥門冬

各一々加フ○間日或ハ三日二一發午後

或夜發者ハ邪在陰分當飯川芎芍

藥 酒炒 熟地黄知母 炒各 紅花 酒洗 黃柏

酒炒各 四分 加ハ陽分へ提起テ可截之○間一

日アリテ二日連發或ハ日夜各發者ハ

氣血俱二病也人參黃芪白茯苓各
 一各川芎當歸白芍藥熟地黃各一
 各加一以補氣血○陽瘧多汗者八
 黃芪人參白朮ヲ加ヘテ飲之無汗
 紫胡蒼朮白朮黃芩葛根ヲ加ヘテ
 發之○陰瘧多汗者八當歸白芍藥
 熟地黃黃芪黃柏ニテ飲汗無汗紫
 胡蒼朮川芎紅花升麻ニテ發汗故曰
 有汗者要無汗正氣為主無汗者要
 有汗散邪為主○病人胃氣弱少飲食
 少或八服截藥傷脾胃少食者人參
 五分芍藥酒製麥芽各一加フ○食ヲ厭
 痞悶或ハ食積ル者ニハ神麴麥芽枳
 實炒各黃連炒五加フ○痰盛者ニハ半
 夏南星枳實各各黃芩黃連各各

若欲截之枳榔黃芩青皮常山各二
 烏梅三ツ加フ○日久虛瘧寒熱不多或
 無寒但微熱者八邪氣無之只ハ物湯
方見諸書紫胡黃芩黃芪陳皮ヲ加ヘテ以氣
 血ヲ滋補スベシ

止瘧諸方間日或八日々發虛瘧汗
 多者ニハ 紫胡 知母 當歸 各一各
 桂枝 四分 防風 四分 黃芪 二各 何首烏
 青皮 各八 穿山甲土炒 八分 水二碗入一
 碗ニ煎之一宿露俗ニ星露ヲ發日ノ朝向北
 濕服

○又方 陳皮 澤瀉各八 當歸 紫胡
各一各 半夏 茯苓 黃芩各一各
一分 甘艸七分 人參八分但虛實ヲ考 水煎服
テ増減シテ用ユ
 ○又方 貝母 生半夏 各末トシ端午ノ

日午時一處ニ合セ瘡イニダ發ズ又發ン
トスル際飯ヲ喫間ホト前ニ右ノ藥末一
匁生姜汁ニテ調服ス之止

○又方 白沙糖四兩燒酒ノ内へ入レ温メ
服スベシ飲テ微醺ニ至レハ自止

陳月坡治瘡方

陳皮 半夏 當歸 各一

柴胡 黃芩 澤瀉 茯苓 各八 苳艸 各

升麻 乾葛 各五 生姜二片棗一桃五ツ

水ニ碗入煎シ熱服ス生冷ノ物魚類麩

類ヲ忌陳月坡云瘡方百種アリトイヘ

只此方總當無悞二十初ヲ服スベシ五六

初服ノ後ハ人參ヲ加ヘ更易愈

治陰瘡

午後ヨリ夜分ニ發ル瘡ナリ

茶碗ニ水半分入草葉一匁ヲ浸紙ヲ

蓋ニシ紙ノ上ニ人參三匁ヲ置一夜隔テ

次ノ日其人參ヲ飯鍋上ニテ蒸此人參

ヲ煎湯ニテ服スレハ即愈草葉ハ用ザル

ナリ如不愈再前ノ如クニテ服ス治セス

ト云フナシ

○又方常山一兩黑豆一合ト同ク煮テ

常山ヲ去黑豆ヲ取テ食ス神效アリ

再發ルナシ

治久瘡

貝母 五分 當歸 川芎 柴

胡 各三 水煎シ發ラサル前ニ服スニ效アリ

隔年瘡

乾姜 五匁 白朮 三匁 煎服ス

○又方 雄黃 三匁 龜版 去兩 火ノ上ニ

置雄黃末ヲ徐々ト龜版ノ上ニフリカ

ケ煨黒シ茶碗ヲ蓋テ存性取出シ研

テ細末シ酒ニテ服シ厚被ヲ蓋テ臥

ベシ立トコロニ愈

年久虚癰

人參 川芎

青皮

各二兩

當歸

白朮

炒黃

薏苡仁

白茯苓

各二兩

欒甲

醋二浸之 後黃色ニシ再ニ酢ニテ 煮之 焙ラ云 槐碎キ末トスニ兩

右細末ニ糊

三九

梧桐子ノ大サニノ早晚日々百餘

丸白湯ニテ用ユ

疔瘡

山嵐ノ瘴氣ニ感レ瘡作ニ實

症ニハ薤白香正氣散虚上症ニハ人參養胃

湯ヲ用ユベシ 方出諸善故畧之

○吐瀉諸症

嘔吐

食スレハ即吐ハ為火食停久ニテ

吐ハ為寒皆脾胃和セザルヨリ發ル

蒼朮

厚朴

各一

陳皮

八分

甘草

四分

半夏

茯苓

各一

寒症ニハ丁香乾姜

肉桂

各三

加フ熱アラバ姜製黃連五分

加ハ右煎服ス

胃虚食納ス吐

人參

白朮

半夏

各一

甘草

五分

茯苓

二分

陳皮

五分

丁子

三分

縮砂

五分

煎服ス

霍亂吐瀉

霍亂ハ揮霍撩乱ス也外

感内傷陰陽乖隔リ上吐ニ下利ス陽

偏ナルハ熱多ク陰偏ナルハ寒多ク此症

率然ニ發危ク一風前ノ燭ノ如シ吐瀉者

ハ濕霍亂ト名ツク輕ニ所傷物ヲ盡ク

出スユヘナリ吐セントノ吐セズ利セントノ利セ

ス乾霍亂ト名ツク所傷物ヲ出スヲ

得ズ死スル一甚速ナリ鹽湯ヲ用テ探

吐シムベシ吐ハ則寛五穀ノ食ヲ與ル

ナカレ口ニハ即死ス飢一甚ク吐瀉シタ

ル後二時三時過テ踰ラ少ツム良サス

ベシ

○治方 吳茱萸 木瓜 鹽各五 各炒
焦先磁罐 二水三碗盛煎能沸右藥
ヲ入煎ノ一碗半ニ入病人ノ立息ニ隨冷
ニテモ熱シテモ服ス

○又方 生半夏搗爛之臍ノ内ニ貼ベシ
立止モシ死ノ腹尚煖ナレ氣ヲ入鹽ヲ
臍中ニ入上ニ灸七壯スベシ立トコロニ生

○霍亂腹痛スルニ炒鹽一撮陰陽水一
杯ニ入調服ス腹痛稍止時服藿香正
氣散陰陽水トハ湯半碗ト水
半碗ヲ和勻ヘタルヲニテリ

霍亂但一點胃氣存者 陳皮 藿香
各五錢煎服愈

傷暑霍亂吐瀉 其症暑伏熱ヲ胃ニ
煩悶シ氣不舒降霍亂轉筋嘔吐泄瀉
寒熱交リ痰喘咳嗽胸痞頭目昏痛

肢體浮腫小便赤澀急愒臥ヲ好ム食
猪苓 澤瀉各七 赤茯苓 乾葛各一 天花
粉ニ 香薷 黃連 白朮 甘草各五分

生姜三片水二碗入八分ニ煎之温服ス○
池極ニ八分麻七分 黃芩石膏各八分 加フ
○熱極ニ八分石膏知母各一 加フ○腹痛ニ六

芍藥炒 肉桂三分 加フ寒痛ニモ此加味
ヲ用ユ○右ノ病症如藥ナキ時ハ絲瓜葉
一片白梅一枚并核中仁同研爛之新汲
水ニテ用ユベシ忽瘥

胃氣虛冷吐瀉 蒼朮一分 厚朴一分 陳
皮八分 甘草五分 水煎服ス

水瀉 艾三 水煎空心ニ服ス或ハ枯
礬炒 砂糖ニ和テ小ク丸シ三粒ヲ
用ユ油臍ヲ忌ベシ

五更浮

又腎浮ト名ツク早朝寅刻ノ
比浮ナリ蓋陰感然脾ハ濕ヲ惡ム濕則
濡テ困ム困ムトキハ水ヲ制スルヲアタハス
水性ハ下流則腎水不足五味子二兩
吳茱萸五々各炒細末シ毎服二々陳
米飲ニテ用ユ

○又方四神丸

破故紙

酒一夜浸

肉豆

蔻

麩二包

五味子

二兩

吳茱萸

二兩

石為

未生姜八兩切片大棗百ト同ク煮爛シ

生姜ヲ去棗肉ニテ右藥ヲ子リ桐子大

二丸シ毎服一々五分生姜湯淡ノ用ベシ

此丸藥原脾胃虛弱小便不利飲食ヲ不思或ハ泄瀉腹痛等症兼テ腎泄瀉最瀉泄者二三次毎手ヲ
不止者悉治ス

脾胃弱

沉香

二々

茯苓

石斛

白

茯苓

妙去刺

枳實

麩炒

南星

厚朴

姜炒

肉豆蔻

白朮

各五

山藥

八々

神麩

ノ糊二

テ丸シ毎服二錢ツ、白湯ニテ用ユ寒熱
ニ不拘服之皆能順氣理脾

○痢疾諸症

痢疾總論

王節齋曰痢是濕熱食積

ノ二者赤白青黃黑五色ヲ別テ五臟二

屬ス白者濕熱氣分ヲ傷ル赤者濕熱

血分ヲ傷ル赤白雜ル者ハ氣血トモニ傷ル

黃色ニ濁ル者ハ食積也治法腸胃ノ濕

熱ヲ浮シ鬱結ノ氣ヲ開キ積滯ヲ消

化ス其初ハ下之下後イニダ愈サレハ調之

痢病久シキ者ハ下スヘカラス胃虛スルユヘ

ナリ痢ハ多ク熱ニ屬ス亦虛ト寒トア

リ虛スル者ハ補ベシ寒ナル者ハ温ムベシ

老人又虛弱久ハ下スヘカラス

○主方 黄連炒五分 黄芩炒五分 白芍炒三分
 木香 枳殼炒各一分 枳榔子五分 甘草各三分
 煎服 ○腹痛ニハ當飯一分 宿砂一分 再木
 香芍藥各五分 加フ ○後コウチヤク 重小便シレ 法ニハ滑
 石炒一分 再枳殼 枳榔子芍藥 生黄芩各五分
 加フ ○白痢ニハ白朮 白茯苓炒 滑石
 陳皮各一分 加フ 初ニ欲下下 之加 大黃五分 ○
 食積ヲ兼ル者ハ山楂子 枳實各一分 ○紅
 痢ニハ當飯 川芎 桃仁各一分 加フ 初欲下下 之
 再 大黃五分 加フ ○赤白相雜ルニハ 當歸
 川芎 桃仁各一分 加フ 理血 滑石 陳皮 蒼朮
 各一分 加ヘ 理氣 食積アス 又 山楂子 枳實
 フ加フ ○白痢久シク 胃弱ク 氣虛シ 或ハ
 下後愈サルニハ 黄芩 黄連 芍藥 各七分
 ツ 減シ 白朮一分 黄芩 茯苓 陳皮各一分

宿砂 乾姜各五分 加ヘ 枳榔 枳殼ヲ
 去ベシ ○紅痢久シク 胃弱ク 血虚シ 或ハ
 下後愈サルニハ 黄芩 黄連 各五分 ツ 減
 シ 當飯 川芎 熟地黄 阿膠 陳皮各一分
 白朮一分 加フ ○赤白相雜ハ コレ 濕勝也
 小便法シカ 少キニハ 木通 澤瀉 茯苓各一分
 山梔子炒五分 加ヘ ツ 分利之 ○血痢ニハ 當
 飯 川芎 生地 黃桃仁炒 槐花各一分 加フ 久
 シク 不愈 黄芩 黄連各七分 減シ 枳榔子
 枳殼ヲ 去 再 阿膠 側柏葉炒各一分 黑炒 乾
 姜一分 白朮一分 陳皮一分 加フ ○痢病ス 已ニ
 久シク 後 重 不去 此 大腸 墜下 スルナリ 枳
 榔 枳殼ヲ 去 加 升麻一分 升提之 ○嘔吐
 食セサルニハ 石膏一分 陳皮一分 山梔子
 仁炒五分 加ヘ 生姜汁ヲ 入テ 緩ニ 呷之 以 瀉

胃口之熱

有一種氣血虛而痢者 四物湯二人參白朮陳皮黃芩阿膠ノ類ヲ加ヘテ補之痢自止氣下陷セハ加升麻

有一種寒痢

黃連木香酒炒芍藥當

飯炒乾姜宿砂厚朴肉桂之類ヲ用テ温之

痢疾誤服温熱止法之藥

稍久レキモノト

イヘ用テ前法ヲ用テ下之下後可調之又前法ヲ用テ下シイニダ愈サレハ又前調理法ヲ用テ治之然レ用テ久シク愈サル者ハ此虚寒ニ属ス前ノ虚ヲ補方寒ヲ温ムル方ノ中ヲ擇用テ更ニ竜骨赤石脂罌粟殼烏梅等ヲ加ヘテ收法之

治紅白痢方

三月三日薺菜花ヲ根ヲ

連子採テ風處ニ掛テ陰乾ニシ瓦上

ニテ焙乾ノ灰トナシ砂糖湯ニテ服ス

○又方 陳細茶 三匁 生姜 片三匁 水一

杯半ハ八分ニ煎シテ食ヨリ間アリテ服

ス痢疾近ニモ久レキニモ赤白共效アリ

噤口痢

男女共ニ痢ヲ病食物湯水

モ不下喉者ヲ云フ烏梅一升敲碎キ盆

中ニ置 此盆トハ全ク 水十餘碗煎シテ入レ

熱シテ病人ヲ其盆上ニ坐セシメ熱氣

ヲ肛門ニ冲上ルヤウニ温メ即此湯ニテ

病人ヲ洗ハハ睡出ル時扶テ寢床ヘ十

ラシ粥湯ヲ與ヘテヤウスヲ俟フベシモシ

食ヲ思ヒ氣アラバ又粥湯半碗ホト與ヘ

少頃シテ稀粥ヲ半碗與フ必一度ニ

多用ユバカラス小兒ニハ右方半減ノ可也

○又方 黄連三々 人參一々 水煎温服
藥入合即甦レ

○又方 木鱉子研テ 麩ニ和 餅トナレテ
脐中ニ貼ベシ 亦效アリ

○又方 五倍子五 車前子五 細茶各二
煎服ス

○又方 老蓮子ヲ 末トシ 陳米湯ニテ
調テ 三々服ス 或ハ秤錘ヲ 燒紅ク 醋ヲ 澆之 病人ニ 其烟ヲ 嗅シム 八即
胃口開テ 飲食ス

痢赤白俱治 蘿蔔搗テ 汁ヲ 取蜂
蜜ト 等分ニ 三四匙服スレハ 愈

○又方 白沙糖 茶葉 蓮肉 紫蘇
生姜各三 烏梅二個 水煎服ス 但赤痢
二八煎ノ 一夜露シ 翌日温服ス 白痢ニ

其煎服

下痢純血 生姜黒クナル 末トシ
每服二 飯末 飲ニテ 用ユ

○同久不愈 阿膠略務ニ妙 黄連酒洗
當飯洗酒各 烏梅肉ヲ焙燥 乾姜炒黒ス

右細末ニ 阿膠ヲ 解化 麩糊 二和桐子大
丸ニ 空心清酒ニテ 百丸用ユ

痢病三四月者 瓜蒂一個 子襖 共二
黑燒ニシ 為末 好酒ニテ 一服ニ 用ユ

○久痢二 木香五 耳柝多 黄連各三
訶子一兩半生 右為末 芍藥 白朮煎湯

ニテ二 飯ツ 服ス

疫痢 コレ一人痢ヲ 病テ 他人即 傳染

者ナリ 蒼朮一兩 水三 大碗入 二碗煎
之蒼朮 去其 煎湯ノ 中ハ 防風 白朮

白芍藥羌活人中黃各一匁入煎之
一碗トシ温服スヘシ

○痰嗽諸症

痰嗽總論

丹溪曰熱痰濕痰食積

痰風痰老痰燥痰有大法降之清
肺火降トキハ痰自除也經曰咳ハ無
痰有聲謂嗽無聲痰アルヲ云咳嗽
ハ肺氣ヲ傷テ脾濕ヲ動ス也病本
六氣ト五臟ノ殊ヲ分トイヘ凡其要ハ
皆肺ヲ主トス肺ハ氣ヲ主リテ聲出
治法新久ト虚實トヲ分ベシ新病
風寒者ハ發散之火熱ハ清之濕熱ナ
レハ瀉之久病ハ虚ト鬱トニ屬ス氣虚
ハ氣ヲ補血虚ハ血ヲ補一鬱時ヲ兼ルハ
鬱ヲ開キ滋之潤之飲之降之コレ治

痰之法也

○痰嗽諸症ノ藥ヲ服スルニハ
卧時ニ臨テ細々嚥下スヘシ能肺經ニ入也

○竹瀝達痰丸 此藥ヨク痰ヲ大腸ニ運
シ大便ヨリ出エ氣ヲ不損達痰如神一
切痰火咳嗽無不治之

半夏 二兩湯ニテ泡スル七度洗生姜
汁ニ浸晒乾切片微火ニ炒熟用之 人參 去芦 一兩

白茯苓 二兩 陳皮 去白 二兩 耳艸 炙 一兩 白朮 三兩
微火ニ炒 大黃 三兩酒浸 黃芩 三兩酒浸 沉香 五匁

青礞石 一兩 搗クダキ煨硝二兩ニ和合セ 銷銀罐ニ入レ
煨過シ主目礞石ノ名金ノ
コトク黄ニシ者ヲ取テ用ユ 右細末シテ竹瀝大碗ニ

一ツ半生姜汁二杯ト和勻ハ鎔ニ入煎スル
一刻許ニメ右ノ藥末ニ和攪テ醬ノ如クシ

磁器ニ入シ晒乾シ又竹瀝生姜汁ニ和攪
一前ノ如クニ再晒乾ス如此スル一三度其下

後竹瀝ニテ煉合小豆ノ大サニ丸シ食遠一

度二百九ツ、白米湯ニテ服スヘシ 丹溪曰痰在四肢非

竹瀝不

痰火 真麻油 三兩 牛黄 五ふ 羽礬 一兩

研末ノ油ノ内ニ浸シ痰火發時一二匙服スレバ痰自下ル

○又方 老足西瓜 熟熟多也 一個青皮ヲ

削去孔ヲ一ツアケテ蜜一碗ヲ入シ繩ニテ絡風處ニ掛テ冬ヲ過シ春ニナリテ取用

凡痰火嗽ニ鍾ニ半分ホト服スレバ立愈

○又方 天薤水 霜降テ後老冬天薤一握地ヲ取用二兩三碗 瓜蒌仁 天花粉 羌活 紅花 生姜汁ヲ加ヘ煉テ膏トシ服スレバ即愈

遠年痰火 肉桂 甘草 欬冬花 炒 旋覆花 炒 貝母 共研末シ芦ノ管ニ

入テ不時ニ咽喉内ヘ吹ヘシ肺癆嗽用テ咳

嗽ノ妨ナシ但一塵ニ多ク吹入ヘカラス徐々ト少ク吹ヘルヲ妙トス

○又方 飴二兩豆腐漿一碗煮テ化シ頻ニ服ノ愈

老痰 男女久シク老痰ヲ積或失音或發喘或氣促湯藥不效者蜜陀僧一

二々砂糖ニテ調ヘ白湯ニテ送下痰ト藥ト大便ヨリ出テ無礙愈

風痰喘急逆死欲吐眩暈欲倒 大九半夏 生ニテ 雄黄 三ふ 細末シ薑汁ニテ蒸餅ヲ

煉糊ニ胡椒ノ大サニ丸シ毎服五十九生姜湯ニテ用コ

痰暈 痰ニテメヒスルナリ明礬名火ニ煨研末シ生姜湯ニテ服シ吐逆シテ愈

○痰厥氣絶シ心温者八千百年ノ石灰一

合 古塔旧城十トノ端ニ 水一大碗煎ノ去水再ヒ

又リタル年冬季物ヲ取 清水ヲ入シ煎之澄清ヲ傾ケ出シ口中へ

灌之痰下テ自愈

久咳嗽連四五十聲者 生姜汁半合蜜

一匙加へ煎之温服ス

冷咳 咳トハ喉ニ痰ツリセアツクナリ

咳トハ喉ニ痰ツリセアツクナリ

清晨ニ豆腐漿ヲ服ノ愈

○又方 茯苓 乾姜 各一 南星 石膏

各七 生半夏 杏仁 各五 研末之烏梅ト

燈心ノ煎湯ニテ一度ニ三々ツ服スベシ

咳嗽吐膿 此肺傷也 知母 貝母 白芨

枯礬 各等分研細ニテ每服ニ錢生姜三

片煎湯ニテ藥ヲ嚼服スニ五度ニノ愈

聲啞 音ノ出サレリ椿樹皮 五 水煎服

○暴失音ニ猪油一升入鍋煎シ渣ヲ

濾去白蜜一升入再煎之少頃ノ濾淨ノ

磁器ノ内ニ入冷テ膏ト成時々ニ匙ヲ

服スバ其音次第ニ清ク頗固肺好也

○勞損諸症 勞瘵虚損ノイヲ註ス

傳屍勞 瘵瘵ノ中一證ナリニ尸虫トテ

人ノ臟腑ヲ食虫ナリ瘵瘵ヲ一人病ノレヨ

リ一家ノ親類ニ傳染テ悉死スル症ナリ

懶肝又ハ懶瓜ヲ粉ニシ酒ニテ服スハ愈

虚怯 勞症ナリ鰻魚一條一升ノ重サ

アル者古キ壺ニ入鹽泥ニテ壺ノ口ヲ壘

封之固メ火灸撃碎内ノ白キ麩并鰻

灰ヲ取研末トメ米飲ニテ二匙ホドツク

用レハ自愈

骨蒸勞熱 地骨皮 一兩 小青州 三々半

○二十一

六月霜五ノ 胡黃連一ノ 紫胡二ノ 蒼意

苡仁三ノ 鷄一隻四ノ 洗淨五ノ 右ノ

藥ヲ腹ノ内ヘ入レ線ニテ縫酒ト水ト等

分ニ合セ鷄ヲ丸ナカラ煮テヨク熟タル

時酒ニテ鷄ノ肉ヲ啖ヘシ其骨ハ炒燥

シ右ノ藥ト共ニ細末シ煉蜜ニテ桐子

大サニ丸シ毎日巳ノ時申ノ時ニ三々ツク

白湯ニテ服ス

怔忡 △チカワキ也其症心中ノ母ニ人ニ捕

ラレントスル狀ノ如ク思ナリ半夏茯苓

人參各等分 煎シ服ス即愈

○又方 辰砂五分 當歸五ノ 猪心肉血

ニテ丸シ睡ントスル時酒ニテ一錢ツク

服ス亦效アリ

腎經虛損 俗ニ水ノ其症目眩耳鳴四

肢倦怠心腹脹滿 足膝酸痛步履艱

難小便滑數或水道 微痛時有遺瀝

等此方治之 皂絲子五兩炒ヲ淘去 白

茯苓二兩 蓮肉二兩 山藥二兩 右為末

山藥ノ末ニ兩ヲ水ニ煮テ糊トシ餘ノ

藥末ヲ和桐子大ニ丸シ毎日清晨空

心ニ二三々ツク白湯ニテ用ユ

諸汗 黃芪 黑豆 煎湯飲之半月

ニシテ全愈

自汗盜汗 當歸六黃湯ヲ用テ效アリ

不寐 夜寐ラレサル症也病後虛弱及

子ノ 高ノ 人陽衰テ不寐者アリ大極補ノ 乳

安神 人參 乳香 硃砂各 酸棗

仁炒四 蜜ニテ彈子大ニ丸シ睡時分ニ

○三十二

毫眼肉ノ煎湯ニテ用ユ

○又痰^{タシ}膽^{タン}經^{キョウ}ニ在テ神不^シ飯^{ヘン}舍^{シヤ}不^フ寐^{メイ}者アリ温^{オン}膽^{タン}湯ノ加減^{カケン}用^ユ之^ヲ方^ハ諸^{シヨ}書^{シヨ}ニ見^ミタリ

見血^{ケンケツ}諸^{シヨ}症^{シヨウ}

此條下ニハ吐血^{トケツ}衄^{ノク}血^{ケツ}下^ゲ血^{ケツ}等^{トウ}ヲ註ス

吐血^{トケツ}總^{ソウ}論^{ロン}

人身ノ血ハ水ノ地中ヲ行ガ如

シ百川^{モウカハ}皆^{モトモト}理^リル^ルトキハ水^{スイ}壅^{オウ}逆^{ギャク}ノ患^{ウヰ}ナシ

身ノ榮^{エイ}衛^{エイ} 榮トハ陰血也 衛トハ陽氣也 調^{テウ}ヲ失^シシ七^{シチ}情^{シヨウ}四^{シヨウ}氣^キ相^{サウ}

于^ヲ之^ノ氣^キ血^{ケツ}逆^{ギャク}乱^{ラン}ヲ致^シシ變^{ヘン}メ吐血^{トケツ}衄^{ノク}血^{ケツ}ノ

諸^{シヨ}症^{シヨウ}ヲ生^シス夫^{ソノ}血^{ケツ}ノ妄^{マウ}行^{コウ}ハ固^{コウ}積^{セキ}熱^{ネツ}ノ致^シ

ス所^{トコロ}ニ因^ユ然^{シテ}レ其^ノ症^{シヨウ}多^ク端^{ハタチ}飲^{イン}食^{シヨク}ノ過^カ

ルニヨリ又^{マタ}重^{ジュウ}物^{ブツ}ヲ負^{オシ}テ胃^イヲ傷^{ヤラ}リ吐血^{トケツ}ス

ル者^{モノ}アリ思^シ慮^{リョ}ニ心^{シン}ヲ傷^{ヤラ}リ并^{ナラ}ニ熱^{ネツ}ヲ積^{セキ}

テ吐血^{トケツ}衄^{ノク}血^{ケツ}出^デル者^{モノ}アリ苦^ク勞^{ラウ}ニテ心^{シン}肺^{フイ}

ヲ傷^{ヤラ}リ又^{マタ}七^{シチ}情^{シヨウ}ノ為^ニ于^ヲサレ咳^カ血^{ケツ}吐^ト血^{ケツ}ス

ル者^{モノ}アリ心^{シン}ハ血^{ケツ}ヲ主^ストリ肝^{カン}ハ血^{ケツ}ヲ藏^{カク}シ

脾^ヒハ血^{ケツ}ヲ統^{トウ}ルナリ故^ニ思^フヲ過^スメ脾^ヒヲ

傷^{ヤラ}ル者^{モノ}モ能^ク吐^ク血^{ケツ}セシム治^ス之^ノ方^ハ其^ノ因^{ヨリ}ト

コロヲ究^キムベシ傷^{ヤラ}田^{テン}者^{モノ}ハ調^{テウ}胃^イ安^{アン}血^{ケツ}勞^{ラウ}

心^{シン}者^{モノ}ハ補^ホ益^{イク}心^{シン}志^シ積^{セキ}熱^{ネツ}者^{モノ}ハ清^{セイ}之^ノ氣^キ鬱^{ウツ}

スルトキハ順^{ジュン}之^ノ傷^{ヤラ}脾^ヒトキハ安^{アン}之^ノ其^ノ脉^{マク}ハ

宜^イ沉^{チン}細^{サイ}不^フ喜^キ浮^フ數^{スウ}血^{ケツ}ヲ吐^トテ不^フ咳^カハ易^イ

治^ス唾^{ツキ}中^{チュウ}ニ紅^{コウ}絲^シノ如^クナルヲ交^{カウ}ルモノハ

難^{ナン}治^ス損^{ソン}スルトコロアルカ為^キナリ

○止血^{チキウ}方^{ハツ} 蒲^ボ黃^ウ 生^{セイ}地^チ黃^ウ 各一兩 鐵^{テツ}ノ屑^{セツ}

磁^チ器^キニテ水^{スイ}ニ碗^{ワン}入^ルハ分^{ブン}ニ煎^{ケン}シ藕^ウ節^{セツ}

七^{シチ}枚^{バイ}搗^{トウ}テ汁^{ジツ}ヲ取^ル煎^{ケン}藥^{ヤク}ニ入^ルレ食^{シキ}後^ゴニ

温^{オン}服^{ボク}ス

○又^{マタ}方^{ハツ} 葦^シ菜^{サイ}根^{ケン}洗^{セン}石^{シヨク}白^{ハク}ニ入^ル木^キ梓^シニテ

搗^{トウ}爛^{ラン}童^{ドウ}便^{ベン}ヲ入^ル布^フニテ絞^{セウ}渣^サヲ去^ク

汁^{ジツ}ヲ茶^{チャ}碗^{ワン}ニ入^ルレ火^ヒ邊^{ベン}ニ置^キ温^{オン}メ濁^{ダク}者^{モノ}ハ

碗ノ下ニ居ルヲ不用上ノ汁ヲ澄メ服ス
夜熱咳嗽口燥吐血初起 黄芩四兩
猪胆三個ニ拌勻飯鍋ノ上ニ蒸晒
乾如此スルヲ三度ニメ為細末糊ニテ
丸シ空心ニ白湯ニテ用ユ輕キモノハ四
兩ニノ即愈重キモノハ一升ヲ服メ效
アリズト云フナシ

吐血咳嗽

阿膠

蛤粉ニ拌セ
炒テ五分

天門冬

去心
一兩

貝母

水洗去
心五分

白茯苓

五分

杏仁

湯ニ泡シ皮
ト去ラ去リ

炒テ黄色ニス五分 共ニ細末シ煉蜜ニテ竜眼肉
ノ核ノ大サニ丸シ時々一丸ヲ嚙化服ス
或耳聾五反加フモ可也

○又方

藕節汁

梨汁

茅根汁

和竜
眼肉

蘿蔔汁 鷄冠油 麻油 各四兩煎シ煉テ
膏トシ服ス

○又方 童便一杯ニ生姜汁一二匙入
緩ニ服メ自愈

血熱妄行

生荷葉

生艾葉

生栝葉

側柏葉
ヲ用ユ

生地黃 各等分搗爛シ鷄子
大サニ丸シ一粒ヲ水ニ碗ハ八分ニ煎シ

渣ヲ去テ服ス

血噴成升汁者

花葉石多少ニ搗ス

煨存性細ニ研童便一盞ヲ温メ右ノ

藥ヲ三々食後ニ用ユ男子ハ酒ヲ童

便ニ和女子ハ醋ヲ和テ藥ヲ服シ後ニ

獨參湯ヲ用テ補之睡テ覺レハ即止

痰中見血

白朮 牡丹皮

各一分
五分 當歸

芍藥

桃仁

去皮尖
研

貝母

各一分

黃芩

桔梗

七分

青皮

五分

耳朮

三分

水煎服ス

凡吐血下血

其症皆内損ニ因或ハ酒ト

色ト過度或ハ心肺ノ膜破血氣妄行
血泉ノ湧如ク口鼻ヨリ出ル者ニハ
側柏葉焙乾 人参焙 細末ニ毎服二々
以用ユ再ヒ飛羅麩二々加ヘ井花水ニ
調ヘ糊ノ如クニ服ス

○又方。荊芥一握干 黑燒ニシ火氣ヲ止シ
細末シ陳米ヲ煎シタル湯ニテ三々用ユ
二三服ニ不邁自愈

鬱熱在內衄血及咯血吐血下血

枸杞子

柴胡 黄芩 地骨皮 天門冬去心 白芍
藥 黄芩各一 黄連八分 生地黃 熟地
黃各一 耳聾四分 水煎空心服ス 下血
ニハ地榆一々加フヘシ
鼻血不止 麥門冬去心 生地黃各一
煎服ス

○腫脹諸症 鼓脹水腫脹滿等ヲ註ス

鼓脹 鼓脹ノ症ナリ氣鼓。食鼓。熱

鼓。風鼓。勞鼓。濕鼓。蟲鼓。疝鼓。胸腹腫
脹。并ニ四肢腫者アリ病人ヲ見ルニ腹ヲ手
ニテ按テ窩ハ可治脉壯ナル者ハ易治
脉細ニシテ臍腫出ル者掌上無紋米穀
不消陰囊無縫者ハ皆難治

雞裏金一貝ニハトリノコノク
ノ黄ナル皮ナリ焙 沉香 砂仁各三

陳香圓去核五分陳ヲ用
右細末シ生姜湯ニ

テ五々ツ、用ユ

氣鼓 大麥鬚陳キ者ヨシ煎湯ニシ

服ス泄氣即消ス

鼓脹水腫 陳皮 木通 大腹皮鹽水洗

茯苓各一 車前子三々 茵陳五分 薏苡

仁三々 水煎服ス淡物ヲ食スヘシ

○又方 絲瓜乾モ 去皮剪碎 巴豆十四粒入共ニ炒テ巴豆ノ色黄ニナルトキ巴豆ヲ去リ絲瓜バカリニメ其内へ陳倉米年ヲ経タヒ子米ナリヲ等分ニ入レ炒テ黄ニシ絲瓜ヲ去米バカリヲ研テ細末シ清水ニテ梧桐子大ガニ丸シ一度百粒ツ、湯ニテ用腫脹不服藥自去水方 水銀真ナル者粉ニスニ

巴豆去油四兩 硫黄生一 右研テ餅トナシ臍上ニ貼ベシ黄水自下貼ル時先糸ヲ一上ニ茶餅ヲ貼其上ヲ帛ニテクリ人一里ホド道ヲ行間アハ黄水自下ルニ五度下ラハ餅ヲ去テ病人ニ温湯ヲ飲ヘテ補之ヘシ久シキ病ハ一日ヲヘタテ右ノゴトク水ヲ取ナリ但一ノ茶餅 一十度用テモ神效アリ

水腫腹脹及黃疸火丹發腫 香圓陳久者去

穰四 人中白陰煉 共ニ為末 每服一匁白湯ニテ用ユ

火丹 丹毒ノ一種ナリ芥葉搗爛敷之

○又方 蚕沙 山梔子 黃連 黃芩 黃栢 大黃 寒水石 共ニ細末シ水ニテ調ヘ敷ヘシ立愈

○黃疸諸症

五疸 症有五トイヘ凡皆濕熱ヨリ發ルハ異ナルヲナシ蓋濕熱脾胃ノ中ニ積コトクシテ不散故ニ其土色面ト肌膚トニ形ルナリ

穀疸 食シテ後頭眩心中怫鬱不安

饑飽所致胃氣蒸冲而黄ナリ

苦參 龍胆 牛膽汁 煉蜜少

許八桐子ノ大サニ丸シ一度ニ五十九空心ニ生姜湯或苳艸湯ニテ服ス

酒疸 身目俱黄心中懊懣ニ足脛滿

尿赤ク面黄赤斑ナリ酒後胃熱醉卧

風水濕ニ當ルニ因テ此疾ヲ得

山梔子十五 大黄一兩 淡豆豉二兩 枳實五個 水煎シ服ス

女勞疸 額黒ク身黄少腹滿急小便不利房事ノ後水湿ノタメニ搏シテ

得之 硝石 礬石 各煨過シ等分細末シ大麥ノ粥ノ汁ニテ調毎日ニ々ツ、

日ニ三度服ノ汗

黄汗 汗山梔子水ノ如ク衣服ヲ染

テ黄ナリ咽不渴是脾熱汗出テ入水浴スルニヨツテ致ス所也

黄蘗 赤芍藥 茵陳各二兩 石膏四兩 麥門冬志 豆豉各一兩 甘草炙 右細末

シ毎服五々淡姜湯ニテ食ヨリ遠ク服スヘシ

黄疽 通身面目悉ク黄ニシ金ノ如シ

白朮 猪苓 澤瀉 茵陳各一兩 茯苓十五 細末シ白湯ニテ五々ツ、毎日三度

服シ多温湯ヲ飲テ汗ヲ出セバ愈

黄疽通治方 三白朮一把搗テ汁ヲ茶碗ニツ取白酒ノ内ヘ入空心ニ服ス

冬ハ用根汁ヲ取酒ニ和テ服ス若貯

ント欲セハ根ヲ晒シ乾シ服スルトキ細末シ三々ツ、酒ニテ用ユ

○又方 枸杞根搗テ汁ヲ取生白酒ニ和熱シテ服ス

○又方 土牛膝四兩生白酒三碗煎シ沸テ六七度空心ニ連服ス三日ノ除根

○又方 純黑猪胆一個 陳黄芩炒テ粉 猪胆汁ヲ入テ為丸生白酒ニテ送下ス

○又方 白芥子ニ反小兒 研碎燒酒ニテ
解トキ白布ニ攤ニハ五分之ホカミ脬ツツノ下少吐ノ上ニ貼ベシ
一時適スニテ貼ツキタルトコロ泡フクレヲ起スラ度ト
ノ藥ヲ去ル鹽又ハ甜物ヲ忌ベシ

陰黃陰濕黃濕二症

陰黃ハ四肢冷自汗

之シ泄利小便清白脈沉遲ナル者也虛黃
ハ耳鳴口淡怔忡微熱アリ四肢無力急
情嗜卧脚軟弱脈沉細ニノ寒熱之
澁白者是ナリ至方理中湯ヲ用テ治
之空心ニ服スベシ 方諸書ニ出
タリ故畧之

黃病

六味地黄丸加綠礬二兩醋炒

白湯ニテ朝夕服ス

瘀血發黃

且且之症發熱之小便自利之

大便黒ク脈コウ沈レヨクナルモノナリ

桃仁 大黃 芒硝 各一各 甘州六 桂枝八

牡丹皮一各 枳殼八分 右大黃芒硝ノ二味
ヲ別ツニシテ餘藥ニ水ニ碗入一碗ニ煎シ大
黃ヲ入一ニ沸ツカシシテ再芒硝ヲ入一沸シテ
熱服ス大便ニ黒物ヲ下シテ愈但此方
泄利ヒツナレバ人ノ虛實ヲ量テ用之ニ女リニ
投トウシテ悞アモシヘカラス凡ツ此方一切瘀血脹滿
大實シ大痛手モ近ツクベカラサル者服
之立ドコロニ效アリ

○痞積諸症

諸痞積 丹溪論ニ積聚癥瘕一症
ナラス積者停蓄ルノ總名也在中在左
在右ト云ラ分テ治スベシ凡塊ハ形アル
物ナリ氣ハ形ヲ成ナスアタハス痰ト食
積ト死血ト而已其積塊在中為痰飲
在右為食積在左為死血大法鹹ヲ

以テ軟之堅ヲ以テ削之行氣開痰為
 至久痞及老人ハ大約妄動ベカラス虚
 損ノ人亦乱治スベカラス孕婦ハ痞ヲ
 治スベカラス恐クハ其胎ヲ傷ラン慎之
 枳殼 八分 大腹皮 一分 藜蘆 八分 厚朴 一分
 青皮 一分 莪朮 八分 山查子 二分 烏藥 一分
 香附子 一分 宿砂 五分 木香 三分 水二碗入
 八分ニ煎シ空心ニ服ス三四劑ニ愈
 ○痞塊ヲ慰法 葱ヲ蜜ト搗合セ布
 キレニ攤患處ニ貼テ熨斗ニ微火ヲ入
 テ徐ニ熨之痞立トコロニ下ルナリ
 ○同貼藥 松脂 水煎シ乾シ 葶麻子肉
糖爛 皮硝 五分 共ニ搗テ膏トシ布ニ
二兩 攤痞ノ大小ヲ量テ貼ベシ或ハ貼ルトキ
 麝香二厘加テ弥良此膏藥痞退バ

自落ル一妙也

○又方 清油一升 蜜陀僧六兩 銀砂底
細末 先油ヲ煎スルヲ數刻次ニ蜜陀僧ヲ
 入シ羌活末一兩餘入シ煉テ膏ト成ント
 スル時阿魏五兩麝香二兩ヲ入シ煉テ
 水ニ一滴落シ見テ珠ノ如クナリ手ニ粘
 カルヲ為度止藥ヲ熬法春冬ハ軟ニ
 秋夏ハ硬クスベシ痞ノ大小ニ隨テ布ニ
 攤貼ベシ立トコロニ消セスト云フナシ
 諸物食積作痛 白朮 茯苓 半夏
 各一兩 藜蘆子 二兩 山查子 十五兩 陳皮 五兩
 細末シ煉蜜ニテ丸彈子大サニ空心
 ニ米湯ニテ一丸ツ、服ス
 食積血痞 木賊モツクヲ粉ニシ三四分空
 心ニ白湯ニテ服スレハ痞自消ス年久シ

キ者モ二服ニ不過ニテ愈

諸蟲積

苦棟根

東ニ向ヒ上ニ出サレ者佳シ皮ト滑トヲ去リ四兩

史君子

穀ヲ去

生姜

切片

右一服トシ水

五碗入三碗ニ煎シ渣ヲ去再煎ノ一

碗トシ白蜜四兩加ヘ又煎ノ一碗トシ

星月ノ下ニ一夜蒸次朝空心ニ服又但

一度ニ八服シガタシ三五度ニ用ユ凡此

藥ハ朔日ニ服シテ佳不吐不瀉喪大

便ノ中ヨリ團成テ出虫少キハ一服多

ハ二服ニテ除根

諸虫作痛

口中必涎流出湯水ヲモ

飲一アタハス命危者ニハ

烏梅

サセラ

花椒

生姜

煎湯ニテ服フ

○又方

蘆薈ニ々

史君子

去殼

雷丸

各四

苦棟根

東向者十五々

蕪荑仁

炒

鶴虱

枳椰子

各五

研テ細末シ砂糖ニテ一粒

重サニ々ニ丸シ五更ニ一丸服ス

或ハ猪肉ヲ煮タル湯ニテ

服シ立

如ニ愈

追蟲去積方

大黃

枳榔

木香黃

連

夏月ハ倍ス

各等分細末シ毎服三々白湯

ニテ用ユ治痢尤效アリ

貪食茶葉壁泥椽炭石灰生米等

此症

皆虫ニ屬ス

芝麻

炒一碟

雄黃末三分

二拌セ始

白湯ニテ用

下ス三日ノ後々

芝麻ヲ炒テ壺ハル半月ニ自愈

○又方

生樞

一介

每日砂糖ニ蘸

數十

粒喫ベシ二介ヲ食シ盡スラ度トス或ハ

史君子肉四五枚半生半熟ノ芝麻ト

同食シテ更ニ效アリ

○貪食茶葉面黃腹有蟲每日空心

川椒百粒白湯ニテ吞下ス自愈
川椒ヲ用ルモノ傷入

痞滿 心下堅如盤者ニハ 枳實 蘇枳 一合

白木 三合 水一杯七分ニ煎シ温服ス

○消痞法 独頭蒜 穿山甲 艾 卷上

冬等分先穿山甲ヲ洗ニ淨ノ瓦ノ上ニテ

煨炭ト成研テ細ニシ又艾ヲ揉碎拌セ

香ニ入蒜ト共ニ搗合セ薄キ餅トナシ

痞ノ大小ニ隨テハリ付線香一炷ノ間

置テ解ラ去ル痞忽消ス

○痿痺諸症 附諸風

痿症 痿症ヲ皆風ト作テ治シ悞テ

熱燥ノ劑攻風藥ヲ用ユベカラス凡不痛

者ヲ為痿屬虛痛者ヲ為痺屬實

症石有別蓋痿病ハ肺熱ヨリ生ス血氣

少々虛火盛ニシテ金ヲ制ス肺葉焦枯宗

筋不潤金既ニ水ヲ生シ以テ肝木ニ

乘シ旺スルヲタズ脾土受傷トキ八骨

痿軟ニシ筋弛四肢拳ガタク伸縮動

スノ不能狀若癱瘓者久此劑ヲ服

スベシ 當歸 白芍 杜仲 牛膝 黃

芪 白朮 熟地黄 知母 黃柏

各ハ 水煎空心ニ服ス

軟癱 樺皮燒テ灰トシ毎服ニ酒

ニテ服ス久用テ效アリ

筋骨疼痛手足痿不行 白朮 羌活

赤芍藥 當歸 甘艸 海桐皮 白芷

鬱金 烏藥 香附 各等分水煎

空心ニ服ス

風氣痛

老薑 鳳仙葉

香油

川椒 赤ク 共ニ搗テ痛ム處ニ搗ル或風仙
花ノ子ヲ煎シタル湯ニテ洗フヘシ皆效

鷲掌風 掌ニハタケ瘡生スルヲ云

槐花 花椒 大麥 地骨皮 艾葉

鷲糞 白芷 煎湯ニ先薰後ニ洗フ

1 毎日敷度ノ念

○又方 雄黃 穿山甲 火ニ燒テ熏之
敷度ニノ自愈乃呂祖法也

鶴膝風 三陰ノ氣不足ニ風邪乘之

兩膝痛ヲナシ久シキトキハ膝大ニノ腿細

ナル因テ鶴膝風ト名ク敗症ナリ

人參 防風 白朮 附子 當歸 白

芍藥 川芎 杜仲 黃芪 羌活 牛膝

甘草 熟地黄 各一 生姜三片 水二碗 八

分ニ煎シ食前ニ服ス 此方兼テ附脊疽及
色不變腿大腫痛及

痢病ノ後脚痛弱ク行ラズ
或ハ腿膝腫痛等症悉治ス

○又方 酒糟 皂角 皮硝 五

味子 各半 砂糖 姜汁 各一 右搗調

和膝ノ上ニ付包置テ十日餘モニ燥バ

燒酒ヲ敷度上ニヌリテ潤ベシ年久キ

者モ亦效アリ

○又方 艾半斤好醋ヲ入シ鍋ノ中ニテ

炒熱シ痛トコロ敷冷レハ取換ベシ敷

度ニヨク包内ニ服ス方 硃砂 雄黃

乳香 沒藥 川烏頭 草烏頭 各

一錢碾細末シ每服五分古酒ニテ用

白癩風 硫黃 蜜陀僧末トシ姜

汁ニ調テスリ付ル

○又方 白癩紫癩ニ 雄黃 硃砂

等分細末シ茄蒂ノ切口ニ藥ヲツケ癩

ノ上ニ擦ベシ三日ヲ経ズノ愈神效アリ
又白癩ニハ右ノ藥ノ内へ蛇蛻ヲ粉ニシ
加ヘテ右ノ如ク擦ベシ永ク痕ナク治ス

紫雲風

紫癩ノ如ク遍身ニテ出

ルナリ 其州一兩

川烏頭

姜汁浸

草烏

頭

黑豆ト同ク炒リ黑豆ノ熟シタルトキ豆ヲ去テ烏頭ヲ用ユ

防已

各五匁

牛膝

炒乾

羌活

上部ニ用ユ

獨活

下部ニ用ユ

白芷

馬兜鈴

炒各

共ニ細末ニシテ一度ニ

七分ツ、好酒ニテ服ス外蛇床子夏枯

仲二味ヲ煎湯ニシ風塊アル処ヲ數度

洗ハ即退

汗斑

汗出タル後ナニツノ如ク斑ニナル

ヲ云 硫黃 蛇床子 蜜陀僧各研テ

生姜汁ニテ解茄蒂ニ藥ヲ蒸シテ

細ク擦之ベシ甚效アリ

○頭疾諸症

頭疾總論

頭ハ乃諸陽ノ會目ナリ其

症一端ニアラス大約頭痛ハ十二經ヲ

分テ治之ベシ丹溪曰頭痛多ク痰ヲ

主トス甚シキ者ハ火多也吐者可下者アリ

又眉眶痛ハ風熱ト痰ト

ニ屬ス肝虛痛モノアリ

經ニ光明ヲ見

レバ眶痛甚眉後骨痛眼開カタキモ

ノアリ晝ハ輕ク夜ハ重モノハ屬痰

頭風ハ經ニ云首風之狀頭面多汗惡

寒スト云云其人素ヨリ痰火アツテ風

寒腦髓ニ入テ然リ婦人多クコレヲ

患ハ頭ニ中積ノ風寒ヲ禦クフナキ

故也偏痛アリ正中痛アリ熱アリ風

アリ血虛アリ痛尤ニアルハ風ト血虛ト

二屬ス右ニアルハ接ト熱トニ屬ス頭眩
 トハ目ニ花チリ黑暗ナリ旋倒ナリ頭
 眩ノ狀目閉身轉耳聾舟車ノ上ニ立
 如夕起ントスレハ倒ント欲ス虚極リ寒
 ニ乘ノ得之故ニ風ナレハ有汗寒ナレハ
 掣痛暑ナレハ煩悶之濕ナレハ重滯ル
 此四氣虚ニ乘ノ眩暈スル也或ハ七情
 鬱ニテ痰ヲ生シ火ヲ動シ之氣ニ隨テ上
 厥コレ七情虚ヲ致シテ眩暈スルナリ
 酒ト色トヲ過シ腎虚ノ氣ヲ飲メテ
 之ニ滯スルヲアタハズ氣逆奔テヒルコ
 シ氣虚ノ眩暈スルナリ吐血衄血崩漏
 或ハ産後失血脾虚ノ營氣ヲ收攝
 一アタハズ諸血ヲシテ失道妄行此血
 虚ノ眩暈スルナリ症各候アリ治各方

アリ聊其經驗者數種ヲ録ト云

十二經頭痛主方

川芎 羌活 白芷

柴胡 蒼朮 蔓荊子 石膏 防風 半

夏 細辛 藁朮 南星 天麻 各等

其艸 少 生姜三片葱白二枚煎服ス

○又方 太陽症 川芎 羌活 藁朮

麻黄 煎服 ○少陽症 小柴胡湯ヲ

用ユ ○陽明症 升麻葛根湯ヲ用ユ

○太陰症 蒼朮 半夏 南星 川芎

葛荊子 等分煎服ス ○少陰症 麻黄

去節 細辛 附子 煎服ス ○厥陰症

麻黄 羌活 吳茱萸 各 藁朮

本 升麻 黄芩 葛荊子 細辛 柴

胡 紅花 半夏 炮 黄连 炒各 黄芩

當歸 酒洗 黄柏 炒 蒼朮 未泔水浸一日一夜

川芎各一 水煎レ服ス

諸頭痛

生蘿蔔汁生イコンノ 蜆殼シミカラ ニツアツキヲシ 仰卧アツキヲシ テ

鼻ノ中ニ注クヘシハナ 左頭痛セバハナ 左ノ鼻孔右頭痛セバハナ 右ノ鼻孔ニ注テ即愈

諸虛痛

血虛ケツキ 作痛ス 川芎各三 當歸各三

水煎レ 食ヨリ遠ク服ス ○ 氣虛ケツキ 作痛

四君子湯煎服ス ○ 氣血兩虛ケツキ 作痛ニ

黃芪蜜炒一 人參各五分 陳皮 蒼朮 川

芎各五分 蔓荊子各五分 細辛各五分 黃柏 木香

柴胡升麻 升麻各三分 甘草各三分 生姜棗 入煎テ

服ス 巔頂痛ニシテ 必スニ 藁本 柴胡 防風ヲ

用

風熱痛

川芎 白芷 石膏煨 荆芥

各等分細末シ 一々ツ 湯ニテ用ユ ○ 寒

濕痛ニハ 紫蘇 川芎 花椒 茶葱頭水

煎レ 頭ヲ 蒸フ 一刻多ク衣服ヲ 蓋汗出

テ愈

半片頭痛

頭偏痛也 石膏熟 牛蒡子

各三 細末シ 酒ニテ調微醉ホトニ用テ汗ヲ

出ス

又方 白芷 天南星各一 川烏頭半

夏各六 分 細末シ 毎服一 水ニテ服ス婦人

甘草一 分 加フ へシ

頭痛週身癢

コレ風火也 雄黃三 分 輕

粉一 分 白礬 黃柏 川椒各二 醋二 碗入

煎シ 半分ニシテ煮 去週身ノ痒ト コロハ

刷ス ツクヘシ

頭風

偏痛正痛遠近ニ拘ズ 此方ヲ用

へシ 白芷 川芎各三 細末シ 黃牛腦ヲ 和

合セ 磁器ノ内ニ入シ酒ヲ 加ヘ 能煮テ 食ス

へし盡く食之其煮タル酒ヲ飲醉テ睡
子アリテ後酒醒レハ其痛ヲ失フ

○主方 葛根一分 柴胡五分 黄芩 黄芪

羌活 川芎 白芍 蔓荆子 甘菊花

各一 黄連 甘竹一分 甘竹生各 薑朮一分

蒼朮一分 升麻三分 葱白二 水煎之服ス

○又方 皂莢子七粒 薏苡仁三 奇良一分

四兩 水六碗入三碗ニ煎之次ニ水四碗入テ

二碗ニ煎之服之

偏正頭風 男女筋ヲ連痛極テ甚者ニ

ハ荻神ヲ細末ニシテツ、湯或ハ酒ニテ

用ユ敷服ニノ愈

○又方 雄黄 鉅辛 細末ニ少許鼻ノ

中へ吹入ル龙痛ニハ右ノ鼻孔右痛ニハ左

ノ鼻孔ニ吹入ルへし○頭風龙ニアルハ風ト

血虚トニ属ス風者荆芥薄荷ノ類ヲ用

○風熱者荆芥白芷麻黄各一分 陳皮一分

蒼朮一分 甘竹八分 水煎服ス○血虚者

川芎當歸各三分 荆芥防風白芷黄芩酒

薄荷蔓荆子各一分 煎之服ス○頭風在右

痰ニ属ス蒼朮半夏ノ類○湿痰頭風

ニハ酒製黄芩三分 蒼朮四分 川芎油辛

各二分 甘竹一分 為末生姜ト茶搗勻 服ス

へし○頭風属火酒製黄芩ヲ至トニ陳

皮半夏白茯苓甘竹薄荷川芎細辛

ヲ依トノ煎服ス○年久頭風ニハ天麻白

芷半夏川烏頭南星各一分 甘竹三分 生姜

五片水煎服ス或末トシ生姜湯ニテ服ス

諸頭眩 凡眩暈諸症アリ類ヲ分テ療

治スへし○風熱虚眩薄荷川芎各一分 荆

芥六分羌活 甘竹焙 白芷各五分 細辛防

風各三分煎服

○風寒上厥眩暈各五分 附子生 白朮 川芎

各一肉桂 甘竹各五分 生薑三片煎服ス

○暑火眩暈各五分 陳皮 半夏 白茯苓

甘竹 人參 白朮 山梔子 黃連 川芎

煎服ス

○傷濕眩暈各五分 白茯苓 白朮各二分 甘

竹 乾姜各一分 水煎空心服ス

○氣虛眩暈各五分 宿砂 木香各七分 白朮

陳皮 半夏 白茯苓各一分 丁子十四粒

甘竹各八分 生薑二片水煎食ヨリ遠服ス

○血虛眩暈各五分 右ノ氣虛方ニ當飯川

芎肉桂ヲ加ヘ用ユ

○痰火眩暈各五分 大黃ヲ酒ニ浸シ九蒸

九晒細末シ水ニテ菜豆大サニ丸シ一度

二百粒食後又臨卧清茶ニテ送下ニ治

スルノ神效アリ

○耳疾諸症

耳聾 精氣調和スルトキハ腎臟ツヨク

盛ニノ五音ヲ聞モシ血氣ヲ勞傷シ兼

ルニ風邪ヲ受シハ腎臟ヲ損シ精脱ノ

耳聾トナルナリ 上好新鉄小キヲ三塊

ヲ口中ニ含咬好磁石ニツニテ兩ノ耳

ヲ塞靜ニ坐スレバ其耳忽鳴テ通ズ

頃刻ニノ通スル者アリ右ノ法ヲ數日

用テ通スル者アリ

○通耳丸 率聾及腎虛耳内風水鐘

鼓ノ声ヲ作者ヲ治ス 穿山甲大者二片蛤

赤クシ蛤粉ヲ去テ 蝎稍七個即 麝香少 細末

穿山甲ヲ用ユ 金鷄尾

○三十七

之麻油ヲ入テ子リ丸ニ綿ニ裹テ耳ノ孔
ヲ塞ヘシ

氣閉耳聾

耳聾 耳逐 各五分 麝香 分
研テ細末シ葱ヲ切リニノ藥ヲ入耳中ヲ
塞ハ八愈

鼻塞豆蔻

柿餅 其法糯米焼一斗ニ大丸
乾柿五十八持テ粉ニ蒸
テ餅トス 切テ細シ糠米三合ノ内ハレ粥ニ煮
テ空心ニ食之

耳虚鸣

薄苛生葉十四枚ニ全蝎十四
麝香少 裹之瓦上ニテ焙乾シ共ニ研テ細
末シ水滴ヲ入テツク子耳ノ内ヲ塞クヘシ
極テ效アリ

耳内腫痛出膿及黄水

大人小兒トモニ
此方ヲ用ユ 枯礬 五分 胭脂 五分
麝香 五分 陳皮 五分 共ニ細末シ先綿

棍ニテ膿ヲ取テ此藥ヲ耳中ハ吹コム
ベシ

○又方 銅鐵ノ香炉ノ蓋ノ上ニアル香
烟ノ塊ヲ取輕粉ニ和研為末 菅管ニ
テ藥ヲ吹入ヘシ

○又方 金絲州ノ葉搥テ汁ヲ絞滴
ヲ耳ノ内ハ即傾出スヘシ日ニ三度ニ
シテ愈

耳爛 陳皮 燒灰 一分 輕粉 三分 麝香 五分
共ニ研テ耳ノ内ハ吹入レハ即乾クナリ

耳痛生瘡 昆布 蘇木 甘草 生

蒲黃 竜胆 各二分 連翹 牛蒡子 黃

連 黃芩 當歸尾 其叶 炙 生地黃
各三分 柴胡 黃芪 各四分 桔梗 一分 紅花 少

桃仁 三去皮去 另研 右水二碗入一碗ニ煎シ食

後ニ服ス寒藥大便ヲ秘藥ヲ忌ヘシ
耳中出血 竜膏ノ末ヲ耳ノ内ヘ吹入
レハ即止

○眼疾諸症

目疾總論 其症七十二種アリ治之
法其源ヲ究ヘシ大約紅ヲ為熱白
ヲ為冷瘡ヲ為風淚ヲ毒氣ノ作
トス風ナレバ散之熱ナレバ清涼之冷ナ
レバ温補之氣結ハ調順之刀針ヲ用
ユルナカレ偶愈モ倖倖ナレ尙不然
身ヲ終ルニテノ患トナル又涼藥ヲ多
ク用ユルナカレ怒ハ其血凝テ不流亦
痼疾トナル 俗ニ云ニ凡ノ老少ノ氣體ノ
期ニ被ト 虛實ヲ量テ藥ヲ用ユベシ又腎虛者
アリ眼目光ヲ失フ或冷翳ヲ生ス下部

ヲ補ヒ煖メ其腎水ヲ益ベシ自愈又
北方ノ人ヲ治スルハ南方ノ人ト異ナリ北
方ノ人ハ眼ヲ患者最多シ皆日々ニ
風沙ヲ冒寒國ニニ夜火ノ邊ニ眠ル
故ニニ氣更蒸テ眼ヲ疾治之寒藥
ヲ多ク用ユ北方ノ人ハ稟受原南方ノ
人ト不同也婦人ヲ治スルニ又男子ト異
ナリ蓋其藥中ニ胎ス傷産ヲ墜モノ
アリ懷妊尤モコレヲ除去ベシ當飯ヲ主
藥トノ血ヲ活ヘシ其餘ノ藥症ニ對シ
用ユ小兒ノ眼疾ハ又大人ト異ナリ胎
毒多シト知ベシ其母孕タル時熱物過
食スレハ其兒眼ヲ患フ生テ百日一週
ヲ過タリ疳胎毒トノ療治スベシ一ニ歳
ノ後眼ヲ患者ハ是煎炒熱物ヲ好

食テ五臟ニ毒ヲ受攻沖テ眼ニ發ス
 凡孩童ノ眼疾ハ有實症無虛症熱
 多く冷ハナシ若眼ヲ疾稚子ニハ吹點ノ
 藥ヲ用ユベカラス俗ニカケスリ世
 多クサレケリ名也 恐ニフクハ血
 氣イニダ定ラズ其目ヲ傷テ致ス冬
 敗毒散ヲ用テ治之ベシ又痘瘡疹瘡
 ノ後毒氣心肝ノ二經ニ鬱結シテ其
 毒氣池ルアタハズ眼ニ攻テ瞳子ヲ
 傷モノハ素ヨリ無治法

○眼疾通治方 荆芥 羌活 甘草 耳
 菊 防風 蔓荊 黃芩 當歸 山梔子
 赤芍藥 白芷 乳香 沒藥 各一々
 全蝎 三個 水二碗入一碗ニ煎シ空心ニ
 服ス凡眼疾初テ起十日餘ニ至ルニ急
 ニ一二劑ヲ服スレハ立トコロニ愈スト云

コトナシ藥味ヲ意ニ隨テ加減スレハ却
 テ不驗

眼痛 鷄肝水ニ落サレ
 用一個 蓮葉乾燥レ研テ
 粉ニス一々

竜膽七分 肉豆蔻五分 已上三味ヲ粉ニシテ
 右ノ鷄肝ノ肉ニ入レ飯鍋ノ上ニテ煮熟
 シテ食之初テ膳タル者モ多ク服スレハ
 能開ク也

目珠至晚疼甚 夏枯草 香附子各三
 兩

共ニ細末シ一度ニ一々五分ツ、茶清ニテ
 服ス三四日ニノ頓ニ愈

虚眼 氣惱怒ニ因テ肝經ヲ傷リ或

思想苦勞ノ氣血兩ナカラ虚ノ眼ヲ疾
 ナリ則 當歸 生地黃 赤芍藥 各四
 川芍 甘草 各一 水二碗入八分ニ煎シ空
 心ニ連服ス三四劑ニノ自愈

次眼 當飯 黃芩 連翹 菊花 山梔

子 生地黃各一 赤芍藥 紫胡 青皮

川芎 防風 竜胆各八分 桔梗 羌活各七分

黃連各五分 甘押五分 燈心二十 石水煎服

風爛眼 白梅二個 核一枚 去綠一枚 少許

山椒三十粒入古錢二文三テ白梅ヲ夾ミ

苧麻ヲ以テ紮任無根水ニ浸テ此水

ニテ洗フベシ 魚根水トハ昔ノ水ツルヨリ領ケタテ

若痘瘡出ル時此症アラハ右ノ方ニ小キ黒

豆ヲ小兒ノ歳ノ數ホト水中ヘ加ヘ浸置テ

眼ヲ洗フベシ 愚按スルニ凡爛眼ノ洗ケリハニキフタ

准 八ヨリテ洗テ目珠ヲアラハズニテ佳此方モ

眼流冷淚 菊花 蜜蒙花 石決明 白

芍藥 甘押 木賊去節 白蒺藜去刺 各

等分細末ニ毎眼一々二分ヨリニ女ニ至テ

此茶ニテ用ユヘシ

○凡眼昏暗或冷淚ヲ流スニハ夜半ヨ

リ後目覺タル時口ヲ開キ言サル唾ヲ

眼ニ捺ツケムニ是ヲ夕ニク用ユヘハ自愈

眼中起星 葶藶各五分 槌碎水ヲ入紙

ニテ漉タル汁ヲ取晒シ粉ニシテ乾タルト

キ少許許眼中ニ點ヘシ

洗眼方 自身ノ小便熱ヲソクニ眼ヲ

洗イ拭テ少頃目ヲ閉ベシ自愈

○雪水ヲ貯六月六日鹽ニ淋過シテ

置一切眼病腫痛時泡湯ニ頻ニ洗

ハ即效アリ常ノ鹽湯ニテ洗ノモ亦好

冷水ニテ洗フヲ忌

○又方 黃連 當飯 朴硝各一分 明礬

三分 杏仁七粒去尖 郁李仁四分去尖 銅

青三分 水二碗入一碗二煎之外三人乳一
小盞ヲ加へ先煎之テ後洗フへシ數度ニ
之テ神效アリ

【每月洗眼法】

朴硝六分 淨水一碗入七

分ニ煎之澄テ眼ヲ洗フ之年久シク眼
不明者モ能治スルナリ洗日身ヲツ之ニ
奇效ノ心ヲ清シ思慮寡クスヘシ其驗

如神

每月洗眼日

正月朔日 二月朔日
三月朔日 四月朔日
五月朔日 六月朔日 七月朔日 八月朔日
九月朔日 十月朔日 十一月朔日 十二月朔日

右日
ヲ選テ朴硝湯ニテ洗フ之

明目補腎兼治筋骨疼痛

小紅棗 十二

冷水ニテ洗淨帶ヲ去枸杞子三五 小馬

大豆四五 水二碗入一碗二煎之早晨空

心ニ藥味ト煎湯ト共ニ食ス之

○又明目方 枸杞子三五 菊花去蒂
七發

每朝白湯ニテ用ユ久服スレハ青盲毛復

明ニ九ハシ

赤眼暴發腫痛

先藍染ノ布一切水ニ

浸之洗テ乾之白礬ノ末ヲ生姜汁ニテ
解右ノ布ニ蘸コレヲ眼胞ノ上ニ搭目ヲ
閉テ少頃スレハ淚出痛即止也

○凡赤目ヲ疾人ハ熱湯ニテ好ヲ濯テ
佳若身ヲ浴スレハ必明ヲ失フヘシ犬雞
魚鴨蛋ヲ食スル大ニ忌之

雀目治方

菊花 乾 黃連 各三 夜明

砂七八 右細末シ水ニテ胡椒大廿九之

鹽湯ニテ七粒ツ用ユ

寒毛倒睫

サカミツケノ也本鱉子一ツ

殼ヲ去粉ニ綿ニ裹之眼ナ右ノ鼻
孔ヲ塞キ右ノ眼ナ右ノ鼻ノ孔ヲ塞之

一二夜ニノ睫毛自上下ニ分レテ愈

點眼方

カケ藥サシ藥也 羊胆一ツ割

用蜂蜜一匁入線ニテ紫兩半ニテ揉水

ニテ一滾煮テ即取出シ冷水ニ半日

浸シ水ヲ去胆ノ内ノ汁ヲ傾出シ眼ニ

點ベシ七十二種ノ眼疾ヲ治スルノ妙也

○又方 凡目ノ中弩肉赤筋及腫障

蔽アルニ白丁香ヲ用テ初産男子吞

乳ニテ解點之ヘシ障蔽ヲ去テ明ナリ

又此方ヲ用テ面ノ雀子班ニ傳テ即愈

雜物入目

東牆上ノ馬齒莧ヲ取テ灰ニ

燒昔頭ニ少許點スヘシ即出ルノ妙也

○鼻疾諸症

鼻塞

凡鼻フサカハ外感ニ因又ハ内火

熾ニ因此方何ノ症ニテモ鼻塞リ香臭

ヲ聞ガレニ用テ效アリ 通州 附子湯

細辛 各一 細末ニ蜜ニテ丸シ綿ニ裹シ

鼻孔ヲ塞ベシ立トコロニ通ス

鼻淵

腦漏トモ云風寒凝テ頭腦ニ

入太陽經ト濕熱交蒸テ此症トナル

鼻ニ清涕ヲ流之或ハ黄水ヲ流之滴

落テ濕ト乾トナキ也 白芷 一兩 蒼耳

子炒 辛夷仁 各ニ匁 薄荷 五匁 細末ニ

葱茶清ニテ調ヘ食後ニ服ス

○又方 鷓鴣兒不食性 石胡荽 鼻孔ヲ

塞ハ滂自止

○又方 藿香末一兩猪胆一個共ニ熬

テ膏トシ丸ス一度ニ二錢食後ニ百

滾湯 白湯ナリニテ服ス如日久クシテ

頭眩虚暈不已ニハ補中益氣湯ヲ用

テ源ヲ滋バ愈ヘシ

鼻紅 好古酒ヲ熱ノ足ヨリ浸シ洗テ

膝踝ニ至テ洗ヒ汗出ルヲ度トス

○又清薑ヲ搗絞汁ヲ服シ其渣ニテ

鼻孔ヲ塞グヘシ

○又方 孩児菊 檉蘭 搗爛之汁ヲ取

酒ニ和テ服又渣ニテ鼻ヲ塞グヘシ

○又鷄子清ヲ多ク食スバ皆效アリ

○乱髮燒テ性ヲ存シ火毒ヲ去并ノ

水ニテ一々五分服之再髮ノ灰少許ニ

麝香少入鼻中へ吹コミ外ニ紙一張

ハツニ摺冷水ニ浸濕シコレヲ頂心ニア

テ熨オヲ其上ニアテ、一二重ノ紙カハ

カハ即止

○又方 麥門冬 白芍藥 荆芥

山梔子 炒各一分 連翹 炒各一分 甘草 四分 生地

黃 右煎服ス止血後調理ニ此方

ニ黃芪 知母ヲ加フ

鼻瘡 百州霜研細ニシ三々冷水ニ

テ服ス

○又杏仁 去皮 乳汁ニ和テ鼻瘡ニス

リツケヘシ

鼻痔 俗ニ云 瓜蒂 炒 耳遂 炒各一分

松香 五分 右粉ニノ香油ニテ

硬ク丸シ松香ヲ衣トシ一粒ツ、鼻ノ

中へ入痔ニ點スレハ臭水ト化ノ一日ニ

度ツ、自爛下テ愈

酒齧鼻 サクロハナ也血熱入肺此症ト

ナル苦參 當飯 酒糊ニテ桐子

大サニ丸シ食後ニ熱茶ニテ八十粒ツ、

吞ベシ一初ヲ用盡セバ即愈

○又方 穀樹脂ヲ採テ鼻ニ度々搽塗
ベシ能散紅

○口舌諸症

口瘡 口瘡ニ涼藥ヲ服メ愈サル者ハ
中焦ノ土虚ニ属ス土八脾且相火衝上
テ無制理中湯ヲ用ユベシ人參白朮
并艸ハ土ノ虚ヲ補ヒ乾姜ハ火ノ標ヲ
散ス甚シキトキハ附子ヲ加フ或ハ肉桂
ヲ嚙モ亦妙也

○又方 黄連乾姜等分細末シ口瘡
ニ搽塗ベシ涎流テ自愈

口疳瘡 紅棗十黒燒ニシ竜腦二分梅
花小角
右研和吹ヘシ

口破 水ニテ漱各半ヲ禁ベシ滑石一分辰
砂三分竜腦二分右研細末ノ塗ヘシ又牙
疼イタミ鷲口アキチニ傳テ妙也

口唇燥裂 橄欖ヲ湯ニ漬テ服之同
核中仁ヲ研爛燥裂タル處ニ敷ヘシ或
ハ臙脂ヲ敷モ立トコロニ效アリ

口中生草 用醋スレキ口ヲ漱スレキ茄大ナルラ 鹽黒燒
白クカレ等分ニ醋ニテ子リ和常ニ擦ヘシ
即愈

口臭并狐腋體氣 丁子 藿香 麝香
香附子 甘松 零陵香 白芷 當歸

桂心 白豆蔻 栝柳 益智仁 各等分
煉蜜ニテ桐子大サニ丸シ毎日五丸ツク
嚙化ス一日ニメ口香二日ニメ身香三日ニ
メ衣香シ

舌出血 烏賊骨 蒲黃炒 研末ノ傳

○又槐花炒黃色ニシ粉ニフリカクシ

舌卒長大 竜腦ヲ研テ敷ヘシ即収

舌腫満口 蒲黃末ヲ舌ニフリカクヘシ

○又鍋膽煤ヲ研テ細末シ白酒ニテ
調塗ベシ立トコロニ腫消ス

重舌木舌紫舌 大人小兒共ニ皆心火

妄ニ動ヨリ起リ結成重舌木舌紫舌
腫硬ノ語言不利者ニ此方ヲ用ユ黃

連山梔子荊芥黃芩連翹木通薄
荷牛蒡子各一 甘草五分 燈心廿根 水ニ

碗入八分ニ煎シ食後ニ服ス

○又方 醋ニテ薄荷ノ末ヲ解口ニ含
テ涎ヲ出ス一教度ニノ愈煎炒ヲ十

日餘忌ベシ又治單蛾雙蛾

舌腫出不能入 草麻子油紙ニ蘸シ擦

テ火ヲツケ薰ヘシ即収

○齒牙諸症

齒牙痛 丹溪曰牙疼者乃陽明胃

經ニ属スルナリ風熱上侵トキハ感スル
所アリテ拳之有熱有風有寒有蟲

有濕熱皆能痛ヲナス

齒痛 石膏三分 生地黃 升麻各二

黃連二分 牡丹皮 當歸各一分 石水煎

ニ服ス

○又方 燒酒半盞馬牙三個燒紅シ

酒ノ内ヘテ淬酒ノ冷タルトキ馬牙ヲ
去テ此酒ニテ疼処ヲ漱キ吐出セハ立

トコロニ痛止ル咽ヘ吞ヘカラス

○又方 荔枝一個殼ニ孔ヲアケ鹽ヲ

入テ填黒燒ニノ細末シ齒ニスリツケテ

時ホト含^シ三再^ニ防風山椒^ニ甘草^ヲ煎^シ口漱^バ即愈

○又方 黃連生薑共^ニ杵爛^シ牙縫^ニ付^レハ痛亦止

○又方 橄欖一個磁器^ニ入^リ黑燒^ニシテ胡椒七粒^ハ共^ニ研^テ粉^ニシ綿^ニツク之痛^ハ処^ヲ塞^グヘ^シ一飯^ノ頃^ニ即愈^但多用^ユヘカラス

○又方 蟲牙痛^ニモ妙也雄黃^草各^各二麝香^{三分}共^ニ細末^ニ磁罐^ニ入置^テ疼時^中指^ニテ藥^ヲヒ^リツケ^ヘシ
○又方 滑石^{六分}耳聾^{一分}研末^ニスリツケ^テ愈

與^テ牙痛 竜腦^{一分}白茯苓^{一分}粉

○又方 松脂^煨軟^ク虫牙^ノ孔^ヲ塞^マクヘ^シ少頃^ニ虫^出テ脂^ノ上^ニアリ^即愈

齒縫^{出血} 薄荷 天花粉 連翹 桔梗 玄參 木通 葛根^各一分 甘草^{五分}水煎^シ服^ス

胃經^實火上^攻齒縫^或牙根^作腫^血出不止 黃芩 黃連 生地黃 牡丹皮

升麻 石膏^各一分 水煎^シ食後^ニ服^ス 田中^虛火動^牙銀腐^爛以致^淡血^滲流

連 牛蒡子 玄參 桔梗 山梔子 石膏 羚羊角 薄荷^各一分 甘草^{一分}升麻^各五分 淡竹葉^{十枚}水煎^シ食後^ニ服^ス

牙痛^{一切}主方 石膏^生八 荆芥 防風 牡丹皮^各一分 生地黃^{二分} 青皮^{二分} 甘草^{五分}

水煎之食ヨリ遠ク温服ス加味法○上ノ
正中齒痛ハ心火ニ属ス黄連八分麥門
冬一々二分加○下ノ正中齒痛ハ腎火ニ属
ス知母鹽炒黄柏各加○上ノ兩邊牙痛
ハ胃火ニ属ス白芷八分川芎一分加○下
兩邊牙疼ハ脾火ニ属ス白朮八分白芍
二分加○上ノ左邊牙疼ハ膽火ニ属ス羌
活一分竜胆一分加○下ノ左邊牙疼ハ
肝火ニ属ス柴胡山梔子各加○上ノ
右邊牙疼ハ大腸火ニ属ス大黃酒製
枳殼各加○下ノ右邊牙疼ハ肺火ニ属
ス黄芩各桔梗各加○右ノ症ニ隨テ加味
之煎服之徐々ト漱下ス三帖ニ即愈
油煎イロモ炒鴨蛋タマゴ糟醋酒ノ類火ヲ奪
スル物ヲ忌ヘシ

牙齦爛

生姜黃連搗爛ニテ貼ヘシ

齒疎陷物

齒ノ間スキテ食物夾ナリ

芦甘石煨寒水石生細研テ少ツ、擦ソ
ケヘシ久シクニテ齒自密クナルナリ此藥
ヲ用テ牙ヲ刷齒ヲ漱一ハ忌ヘシ

取痛齒法

白馬尾ヲ燒テ灰トシ齒ニ

點スヘシ即脫ナリ但シ輕々ニク點スヘカラス
好齒ニ看バ亦落ル也新シキ筆夫ニ此藥
ヲ一二重塗テ點スヘシ或ハ痛或ハ動ク齒
ノ上ニ用ユ先ミツ助ニテ上下ノ唇ヲサハハ開
テ藥ヲ點スルナリ

咽喉諸症

咽喉通治

其症十八二分ツ皆火熱内ニ

結スルニ因テナル也

○主方 喉初テ腫痛ヲ治ス荆芥祛風

牛蒡子 射干 黄芩 枳殼 独活 金銀花
牡丹皮 生地黃 天花粉 各等分 燈心 竹筋
入水煎之服ス

○同粉藥方 蜈蚣 頭ト脚ヲ去切米ト同ク炒
末ヨク熟スレハ止

辰砂 研テ細ニシ水
飛ス各五々 乳香 沒藥 俱ニ去
研 雄黃

各一麝香 二分 右細末之和勻大人ニ八七八
分小兒ニハ三四分ツ、前ノ煎藥ニテ用ユ

或ハ酒ニテ
送下ス

○同吹藥 薄荷 三兩極テ細ニ
未ト別ニスヘシ 硼砂 二五五
分

雄黃 三々 孩兒茶 一々 竜腦 三分 共ニ研テ

極細末之薄荷末ヲ入和勻確ニ貯テ
藥氣ヲ泄スヘカラス芦管ニ此粉藥ヲ

少許入テ喉ニ吹入ナリ或ハ茶匙ニテ舌ノ
上ニ批ケ火シ嚙テ嚥下スヘ一日ニ八九度

用ユ鎖喉風 コウヒノニハカニ灸ニテ
ニハカニ死スルヲ云 口ノ内乾モノニハ

井水ニテ此藥ヲ調ヘ灌ヘ之即閉ヲ用テ
津ヲ生ス若脾胃弱泄者ニハ多用ユヘカ
ラス其外ニ忌ムナシ

○同合藥 薄荷 三兩研テ極末
之別ニス 硼砂 雄

黃 各五 孩兒茶 三々 竜腦 五分 青黛 一々

共ニ細末之薄荷末ヲ入生蜜ニテ子リ合
セ確ニ貯テ亂ヲ泄スヘカラス用時黃豆

大サニ丸シ臨卧ニ丸夜半ニ丸甚者ニ
ハ三丸口ノ内ニ嚙藥自ルルヲ待テ嚥下

スナリ湯水ニテ用ユルヲナカレ脾胃弱者
ニハ多用ルルヲ忌ム 小兒ニハ半粒
ツ、用ユ

喉閉 喉腫ヲサガル也 石膏 燒紅シ火中氣ヲ
出入

菊花 杏仁 各五 麥門冬 一兩 苦參 四々

水三碗入一碗半ニ煎シ蜜一小盞加ヘテ
緩々ト服スレハ喉即開ク若急ニ藥無

之時ハ紫髮繩ヲ以テ手ノ大指ヲ紮
針ニテ甲邊ヲ刺血ヲ滴リ出セハ喉即開

喉腫痛

耳中 貝母 黄芩 黄連
薄荷 川芎 各一 桔梗 三枚 玄参 二枚
水煎服

○又方 扁柏葉 雪裏青 山豆根

皆搗テ汁ヲ絞服之效アリ

○喉腫ハ風ト火トノ分アリ風ニハ鶴虱仲

ヲ含ヘシ火ニハ玄参ヲ服スヘシ其苦水ヲ

吞下セハ即愈

双蛾單蛾

喉ノ間ニ癰小キ如ナル者腫
テ兩方ニ生スルヲ双蛾ト云一方ニ生スルヲ
單蛾ト云 平地木 木蓮蓬 雪裏青

各根ト葉ヲ取搗テ汁ヲ絞リ醋ヲ煎ジ

サシ右ノ汁ヲ入鴉翎ニ蒸シ喉中ヲ掃又

此汁ヲ少許含ミ漱テ吐出ハ即愈

○又方 醋バカリニテ漱ク一三五次スヘシ又

天蘿水ヲ吞ヘシ皆效アリ 天蘿水方痰 嗽見タリ

○又方 荔枝仲 搗爛ニ醋ヲ加ヘ

テ綿ニ裹ミ上ヲ縛喉中へ入ルテ救次ニ愈

喉癰腫脹不進水穀 胆礬三厘口ノ内ニ含

涎ヲ吐出セハ愈

喉瘡

百叶霜 枯礬 研細末ニ喉ノ内
ヘ吹入レハ自愈

喉痺

竜腦 五分 明礬 生三分 麝香 五
石膏 一匁 細末ニ吹入テ涼スレハ即愈

右通治ノ外ニ伏氣病アリ腎傷寒ノ名

ク暴ニ寒ニ中テ其毒少陰腎經ニ伏シ

始ハ衰テ不病日ヲ重テ乃チ其脈微

弱ニノ咽痛次ニ必ス下瀉ス此症ニハ辛

熱ノ藥ヲ用テ其本病ヲ攻其陰陽ヲ
順セバ水升火降テ咽ノ痛自ラ已又少陰
傷寒々々邪太陽ニ傳ヘズ抑鬱シテ
内陽氣ヲ格熱上リテ咽門經會ノ
処ニ行寒熱相搏テ喉痺トナルコノ
症ニ辛温甘苦ノ藥ヲ以テ其標病
ヲ制スレバ咽自通ス此ニ症ニハ特テ
前ニ出タル寒涼ノ劑ヲ用ユレハ救レズ
治療者慎テワキニヒルベキナリ

○心腹諸症

心痛 丹溪曰心痛者即胃脘痛
ナリ新久ノ殊ナルヲ分ツヘシ身ニ寒
氣ヲ受口ニ寒物ヲ食ノ病初メ發
ル時ハ温散湿利ノ劑ヲ用ユヘシモシ
病稍久シクシテ爵ヲ成爵スルトキハ

蒸熱ス熱久シケレハ必火ヲ生ス此
症ニハ温利ヲ用レハ火ヲ助テ病ヲ
添ナリ山梔子大ナルモノ七ツ或八九ツ
炒焦黃ニシテ水一盞入七分ニ煎シ生
薑汁一二匙加ヘ熱ノ飲之立トコロ
ニ痛止此病日殺多ク不食ストモ不
死若痛方ニ止ハ便物ヲ喫ヘシ病安
クシテ後ニ恣ニ飲食スレハ再發シテ

難治

○治心痛方 乳香 雄黃 各二分 砂

糖 三分 好酒ニテ調下ス

○又方 蚌子殼七次煨醋ノ内へ入テ
滓研テ細末シ痛及ル時少許香ノ
上ニ置酒ニテ送下ス

○又方 屋上猫糞炙乾シ末トシ三分

酒ニテ下ス

○又方 胡椒七粒 菘菜豆九粒 研テ末トシ 燒酒ニテ下ス 不止再服スヘシ即止

田胃脘痛

良薑

酒洗七次 焙研末

香附子

醋洗七次

焙研末ス

寒ニ因ッテ発ルハ良薑末ヲ香附子ノ

一倍ニス 怒ニ因ッテ発ルハ香附子末ヲ良

薑ノ一倍ニス 寒ト怒ト兼テ発ルハ各

等分ニス 清米飲ニ姜汁少許入テ右ノ

藥ヲ服スヘシ

○又方 雄黄末一匁 烏梅肉三匁 小

豆大サニ丸シ酒ニテ服ス 輕者ハ二九重

者ハ三九

心氣痛

胡麻

生ナルヲ用

銅鑄ニ入炒黒

クシ細末シ好酒ニテ送下ス 一服ニシテ

除根痛時取来テ炒用ユヘシ

冷心氣痛

乳香

二分火ニ炙 油ヲ去

明礬

火ニ煨過

共ニ末トシ好酒ニテ下ス

○又方 良香 甘竹 川烏頭 肉桂香

附子 芍藥 木香 各等分鹽少許

入水煎シ温服ス

熱心氣痛

錫脐煉

ナハスミ

三匁

童便熱ニテ

服スヘシ即愈

蛔厥心痛

虫ノボリテ心痛也

烏梅二個

川椒十四粒煎湯服ス

真心痛

芭蕉葉搗テ汁ヲ取

ハセラン

白酒ニ

ニツリサケ

テ服ス

急心痛

陳皮

香附

吳茱萸

良香

石菖蒲

各等分

水一碗入七分ニ煎シ茶

碗ニ入香油三五滴入小盞ヲ蓋ニシテ

ニツリサケ

藥ヲ淋下シ熱服スヘシ即愈

腹痛

腹痛ハ皆寒ニ由テ生ル惟大

便閉ノ一種熱ニ属ス陰症ニハ急ニ理中湯ヲ用テ治之方ハ諸書ニ見タリ故畧之

心疼腹痛

五倍子生ニテ研細末シ一

鉄杓ノ内ニ入炒テ烟ヲ起シ黒色ニナル時好酒一鍾ヲ入傾ケ出シテ服之立処ニ止ム臍下大ニ痛ミ人中黒色ナル者ハ多クハ死ス

冷氣腹痛

吳茱萸ニク搗爛シ酒一

鍾ニテ調ヘ香油一小盞鍋ニ入煎シ熱シ其肉ヘ右ノ吳茱萸酒ヲ入テ一滾煎シテ服スヘシ立トコロニ止

脾胃諸症

胃強脾弱

其症男女飲食運化スル

アタハズ胸膈脹悶シテ不舒腹脹ニ乱嘔吐

酸ヲ作口苦舌爛痰アツテ頭眩スルニ此方ヲ用ユ 蒼朮二斤去サア米泔水ニ浸シ洗ヒ黒皮ヲ去切片晒乾シ炒黄ニシテ磨

ニテ粉ニシ番

粉一斤ヲ用ユ

白茯苓刺ヲ去炒黄ニシ

細末ス十兩

黄連酒浸

炒細末

山查子飯上ニテ蒸フ三次細乾シ細末ソ五兩

右煉蜜一和

桐子大サニ丸シ毎日食後已申時白湯ニテ

七八丸ヲ服シ百九餘ニ至テ自愈

病後胃弱

蓮肉

炒米各四兩

白茯苓

二兩 細末シ砂糖二兩加ヘ一度ニ五六匙

時ニ洵ス白湯ニテ服ス飲食スルアマタハ

ル者ニ用ユヘシ

胃脘嘔雜吐清水

陳皮

上々白ヲ去

清晨

寢所ヲ起坐ノ陳皮末五分ヲ手ノ内ニ

安男ハ丸女ハ右ノ手 越テ喉ニ下ス又卧フナカレ三四

次如此シテ即愈

飲食不佳口易餓

菘豆

糯米

黄麥

各一升共トモ三炒磨ウスニテ粉ニシ酒杯サカ一ツ湯ニ
テ服ス三五日ニテ效アリ

心胸飽脹腹中又饑又痛 胡椒七粒研末
トシ好酒ニ入テ服ス立処ニ愈

胸膈飽脹虛腫等症 蒼朮製法如前 陳

皮 厚朴各五兩 川椒少許 猪肚一具脂ヲ

去大蒜ヲ入線ニテ口ヲ縫冷水ト熱湯

ト各七碗入猪肚ヲ煮テ水乾カクヲ度トス

取出シ搗爛カクシ石ノ藥ヲ細末カクシコレニ和

テ丸シ毎日空心ニ湯ニテニカクツ用ユ

胃脘不清將漸成噎膈 茯苓 陳皮

白朮陳生ニ并テ炒 枳實麥粉ニ拌テ炒 半夏製法各

黃連派浸 沉香五々 厚朴十五々 白茯苓

一兩 白豆仁四々 白芍藥 一兩 人參 一兩 各

細末シ水糊ニテ桐子大サニ丸シ粥ヲ喫

テ後白湯ニテ百丸余服スヘシ

膈噎嘔吐 芎根五兩切碎水ニ碗入煎

一碗空心ニ服ノ即止

膈氣 沉香一匁細末シ泉水ノ煎湯

ニテ徐ニ下ス

膈氣吐食 大ナル鯽魚一尾腸ヲ去鱗ヲトメ

紙ニテ十重ニ包ミ土ニテ平胃散一兩ニ和杵爛カクニ蜜

ニテ桐子大サニ丸シ三十粒ツ、米湯ニテ用ユ

翻胃吐食 樹上黃香圓ヲ採テ糞内ニ

七日浸シ再童便ニ七日浸シ風ニアテ、乾

シ煎湯ニテ服ス

○又方 仙人杖退竹也此ハ各竹トシトキ立死スル

煎シ汁ヲ服スヘシ

○又方 苳蕒汁一升ニ生姜汁二合入温

熱シ五次ニ服ノ效アリ

噎膈翻胃鼓脹 沉香 紫葳子 陳

皮各二 肉桂一 木香三 蘿蔔子三

俱上末トシ毎服三分狗宝一分加好泉

水ニテ通仲ヲ煎シタル湯ニテ空心ニ服

老年翻胃噎膈 辛香ノ氣ヲ散スル

等ノ藥ヲ服シ過シ米粒喉ニ不下病

危キニ至ル者ニハ 狗宝三 牛黃三

人參二 沉香二 右細末ニ時ニ拘ス

少許舌ノ上ニ置テ嚙徐ニ嚥下ス一日

三四五分服スヘシ尤效アリ

○腰脇諸症

腰痛 杜仲 骨碎補 青鹽共二油

末シ猪腰子ノ内ニ入濕草紙ニ包煨シ

熟シ好酒ニテ連服ス即愈 猪腰子ハ椒ノ陰莖ナリ

腰痛曲而難伸 山查子末三茶酒又

ハ鹽湯ニテ服ス

腰痛并或時閃挫 杜仲 破故紙 桃

肉各等分酒ニテ煎シ服ス

○又方 糯米一升炒極テ熟シ囊

ニ入痛処ニアテ縛置ヘシ大茴香三々

細末シ鹽酒ニテ時ニ隨服スヘシ皆效アリ

脇痛 草豆蔻炒 枳殼炒 赤芍藥

砂仁 香附子 烏藥 各等分水ニ碗

入一碗ニ煎シ温服

○又方 小茴香炒 枳殼炒 共二細末

之ニツ鹽湯ニテ服ス

腰閃 枳殼 桔梗各八 甘草 紅花

各五 防風 烏藥 當歸 杏仁炒去皮

半夏製 才通各一 右水煎シ服ス

○又方 凡打傷閃腰并二手足ヲ傷

損血ヲ出サス只青紫色ニメ内傷者
ニハ先葱白ヲ搗爛シ炒テ熟シ痛
処ヘ遍ク擦ツケ次ニ生大黃ヲ粉ニ
シ姜汁ニテ調ヘ傳其人少シ醉ホド
好酒ヲ飲シムヘシ三箇月或ハ半年
ニテ不愈者ニモ用此法神驗アリ

腿痛

生地黄

大ナル者ニ兩
兩ニ浸シ

何首烏

十五
兩

當歸身

十二
兩

白朮

二斤

金銀花 胡

麻

各二
兩

甘草

牛膝

十五
兩

酒浸
右好酒ヲ

用テ蒸熟シ毎日空心ニ服ス半劑ヲ
以テ度トス

○大便諸症

大便秘

皂莢ヲ末トシ蜜ヲ煉水ニ

落シ珠トナル時皂莢ノ末ヲ入棗ノ大
サニ丸シ肛門ノ内ヲ塞ハ即通ス

○又方 田螺ヲ搗碎キ麝香三四重入
臍内ニ傳ヘシ

○又方 苦練子六煎湯ニノ服スミナ
ニルニアリ

腸風下血

清血ヲ下メ色鮮ナルハ腸風

ナリ血濁テ色黯シキモノハ臟毒ナリニ夕腸

風下血ハ必ス糞前ニアリ近血ト名ツク
臟毒下血ハ必ス糞後ニアリ遠血ト名

○主方 生地黄 牡丹皮 赤芍藥
升麻各二水ニ碗入八分ニ煎シ空心ニ
服ス

○又方 當歸 生地黄 熟地黄 各五
小薊根 一兩 酒ト水ト等分ニ煎服
ス愈テ後十全大補湯十劑服スヘシ

方ハ諸書ニ
出タリ異之

○又方 茅根^{ハクコン}多少ニ拘^{カハラ}ス水煎^{カス}之渣^{カス}ヲ去テ温服ス即止

○又方 豆腐^{トウフ}ノイニ夕袋ニ入テ漚^{コシ}出サルヲ渣^{カス}トモニ取^ト鎚^チノ内ニテ炒^チ黄^キ色ニ燥^{ハチ}タルヲ研末^チ之紫^{ムラサキ}色ノ血塊^{ケツ}ヲ下ス者ニハ白砂糖湯ニテ清^{アハツキ}晨^{アサ}ニ三々ツク服ス紅色ノ血塊^{ケツ}ヲ下ス者ニモ同^{ドウ}之遠^{トシ}年^{ヒサシキ}下^シ血^{ケツ}面色^カ黄^キ瘦^ヒ危^キ者^キモ服^ス之^キ神^キ效^キアリト毎日三次用ユ

腸風^{チウフウ}臟^{チウ}毒^{トク}下^カ血^{ケツ}痔^シ漏^ロ 黄連^{ワウレン} 槐花^{クワイカ}各酒^{サケ}ニ浸^ヒ之炒^チ四兩共ニ細末^{サイマツ}之猪^{ブタ}大腸^{ダイチウ}一具^ツニ藥末^{ヤクマツ}ヲ入テ紫^{ムラサキ}韭^イ菜^{サイ}ニ竹^{チク}ト同ク水^{スイ}ニテ煮^ニテ爛^{ラン}之韭^イヲ去^クテ猪^{ブタ}腸^{チウ}ト藥ヲ搗^チテ桐^{キナ}子^シノ大^{オホ}サニ丸^マシ毎服^{マイボク}八十九^{ハチユ}心^{シン}ニ米湯^{マイトウ}ニテ用ユ

糞^{フン}後^{ノチ}下^カ血^{ケツ} 霜^{シユウ}下^カル時^{トキ}ニ冬^{フユ}青^{アヲ}ノ子^シヲ取^ル蜜^{ミツ}ニ浸^ヒ之晒^ヒ乾^カス一^{ヒト}三次^{サンジ}ニノ空^{カラ}心^{シン}ニ二三^ニ十^{ジュウ}粒^{リツ}湯^{トウ}ニテ吞^ノヘシ

脱^{ダツ}肛^{カウ} 此^{コノ}症^{シユメイ}多^{オホク}氣^キ虚^{キョ}ヲ主^メル 人^{ニン}参^{シン}黄^{ワウ}芪^キ 川^{ケン}芎^{クウ} 當^{トウ}歸^キ 升^{シヨウ}麻^マ 水^{スイ}ニ碗^{ワン}八^{ハチ}分^{ブン}ニ煎^ニ之食^シ前^{ゼン}ニ服^{ボク}ス血^{ケツ}虚^{キョ}者^キニハ芍^{シャク}藥^{ヤク}地^チ黄^{ワウ}ヲ加^カフ血^{ケツ}熱^{ネツ}者^キニハ黄^{ワウ}柏^{ハク}炒^チ加^カフ虚^{キョ}寒^{カン}者^キニハ黑^{クワク}炒^チ乾^{カン}姜^{カウ}ヲ加^カフ外^{ガイ}ニハ五^ゴ倍^ベ子^シ末^{マツ}ヲ以^テ托^{タク}テ上^ウ之^シ

○又方 蟬^{セン}蛻^{テイ}ヲ焙^ヒ黄^{ワウ}ニノ細^{サイ}末^{マツ}ニ脱^{ダツ}肛^{カウ}ニ點^{テン}スレハ即^{ソク}収^ウル

○脱^{ダツ}肛^{カウ}ノ人^{ニン}ハ拭^{スグヒ}紙^シノ代^{ダイ}ニ桑^{サウ}葉^{エフ}ニ枚^{マツ}ツ、倍^ベ中^{チュウ}ニ用^{ヨウ}ユヘシ治^チスルヲ效^{キョウ}アリ

虚^{キョ}人^{ニン}脱^{ダツ}肛^{カウ} 補^ボ中^{チュウ}益^{イキ}氣^キ湯^{トウ}ニ黄^{ワウ}柏^{ハク}知^チ母^モ艾^{アイ}蒼^{サウ}木^{モク}黄^{ワウ}芩^{キン}ヲ加^カフ肛^{カウ}門^カ痒^{ヤキ}ニハ同^{ドウ}方^{ホウ}ニ

秦芫批仁ヲ加フ大便閉ニハ皂莢ヲ加フ
痔瘡 苦參一斤 當歸四兩 雄黃三錢
白礬四錢 共ニ細末ニ楮大腸一具ニ藥
末ヲ入線一尺ニテ兩頭ヲ紫テ罐一具中へ入
水ニテ煮腸ノ爛タルヲ度トシ搥テ桐
子大サニ丸シ五十九ツ、酒ニテ毎日三
タヒ服ス

○又方 牡蛎二兩煨過シ地ニ坑ヲホ
リテ埋メ之火氣ヲ去リ研テ細末ニ痔濕
アラハ糝一升ケヘシ痔乾ハ津液ニテ調ヘ
スリツケヘシ

痔漏 胡黃連 一兩 穿山甲 麻油内ニ煮
石決明 煨 槐花 微炒 各五錢 共ニ細末ニ蜜ニ

テ煉麻子ノ大サニ丸シ一々ツ、空心ニ米
湯ニテ服ス早晚ニ度用ユ重者ハ四十

日服ノ愈此方針刀掛線等ヲ用ル
ナク苦ニ楚ヲ受スメ誠ニ痼疾ヲ治ス
ル良方ナリモシ漏四邊ニ硬肉突起ル者
ニハ蚕繭二十ヲ炒研テ右ノ藥ノ内へ加フ
ヘシ遍身ノ漏ヲ治スルニ皆效アリ

○丹溪先生漏瘡ヲ治スルニ先補藥ヲ
用テ氣血ヲ生ス人參黃芪當歸白朮
ヲ主トシ大劑ニテ服之外ニ附子ヲ細末
シ津液ニテ解丸ク平メ錢ノ厚ニシテ
漏ノ上ニ傳一錢ニテ灸シ微熱シ甚痛シ
ムハカラス藥乾ハ取易ヘシ困倦ハ即止テ
明日再ヒ灸セヨ肉平ニナラハ止ヘシ前ノ
補劑ヲ服シ漏ニハ生肌長肉ノ藥ヲフ
リカケテヨシ

○生肌散 五倍子 黃名二炒 沒藥 乳香

孩兒茶 絡一 白礬 飛過 五々 共二細末シテ
管ヲ用テ漏瀉ノ口ニ吹入ヘシ

痔瘡便血 凡痔新夕ニ拘ス肛門墜

重シ大便ニ血ヲ下シ疼ヲナス者ニハ

防風 秦艽 當歸 川芎 生地黃 白

芍藥 連翹 赤茯苓 各 梧椰子

豆豉 山施子 地榆 枳殼 槐角 白

芷 蒼朮 各六 水ニ碗八分ニ煎シ食

前ニ服ス大便秘結スル者ニハ大黃ヲ加

牛奶痔 イボ 痔也 孰種殼灰ニ燈研ニ細

末シ龜腦サシ入シクヘシ

洗痔方 五倍子 皮硝 煎スルノ數

十沸ニテ渣ヲ去熟ヲ木盒ノ中ニ入シ

板ヲ蓋ニシ板ノ中ニ一孔ヲアケ痔ヲ

蒸テ良久シクシテ後其湯ヲ手ニ掬

テ痔ヲ洗ヘシ湯冷レハ任甚效アリ

○又方 枳殼一味煎湯前ノ如クニシテ

蒸洗モ亦效アリ

○痔イニタ不破者ニハ茄蒂或ハ根ヲ

晒乾シ煎湯ニシテ數度洗ハ愈

點痔方 龜腦 五厘 熊胆 一分 蝟牛

大ナル者一ツ殼ヲ去リ研碎ス 共ニ研テ膏トナシ水ニ滴ホ

ド入テ痔ニスルベシ酒又ハ風ヲ動ス物ノ

類食スルヲ忌

○痔翻出ニハ大ナル田螺一個漆盒ノ内

ニ置シ龜腦五厘ヲ田螺ノ蓋ノ内ヘ入シ水

滴ノ下ルヲ鳥ノ毛ニテ痔ノ上ニ塗シ甚效

○小便諸症

小便閉 麥麩ヲ子リテ臍ノ外ニ圍

ヲ作り鄭莫鱗腸共ニ搗爛シ麝香三

分ハレ生蜜四兩ニノ和勻（ニトノノ）脐ノ孔ヲ填（クハ）圈ノ内ニ滿シメ其上ニ碗ノ覆テ睡レハ立トコロニ通ズ

○或ハ冬ニ葵子亦按冬各ニ水煎シ食前（セ）

○又方 小通 生地黄 絡ニ 甘草 八分 水煎シ服ス皆效アリ

小便不通上脹垂危者 琥珀（四）研テ末トシ葱ヲ濃煎シタル湯ニテニ度ニ用ユ漸々ニ通シテ自愈

小便閉腹痛難忍 木通 滑石（各二兩） 研末 黑牽牛（五錢） 磨テ 頭ホヲ用ユ 共ニ和（ニ）一々ツク燈心葱白ノ湯ニテ食前ニ服ス

○又方 車前草生ニテ搗汁ヲ半盞取蜜一匙入テ温服ス

小便不通肚腹脹悶 明礬（生） 細末（ニ） 脐ノ内ハレ指ニ水ヲ蘸滴ラ其上ハレ夏ニテ即通ス

○小便澀痛ニハ牛膝ヲ濃煎シ酒ニ入テ服ス（ニ）

五色淋病 萘菜ヲ搗テ汁ヲ取生白酒ニ和空心ニ服ス其渣ヲ煎湯ニノ陰莖ヲ洗フ（ニ）

熱淋有血 小便澀痛腰酸足軟ニ面ノ色黄ニノ無方精神倦怠久不止者ニハ地榆 陳皮 白茯苓 側柏葉 桑白皮 艾葉 生地黄 黃柏（藍水浸） 阿膠 蒲黃（炒） 沙參 蓮房殼（各等分） 生薑一片 加ハ水煎シ食ヨリ遠ク服ス

○又方 生地黄汁 一升 生薑汁 一合 和勻

服スルモ亦愈一切酒糟麴類炙炒山椒
生薑炙タル物海物ヲ忌ヘシ

○又方 乱髮ヲ黑燒ニノ麝香少許入
白湯ニ醋ヲ加ヘテ調服スヘシ

○乾柿 一升 蒂核共ニ切碎キ砂鍋ニ入
水ニテ煮只湯ヲ用テ時ニシタカヒ服ス一
日ニ服シ尽スヘシ枋殺ハテ周テ自愈

肉淋 小便ニ濃血ノ塊
因ノコトクナルヲ下ス 銀杏一年ニ一粒ツク
取咬用キ明礬一ニ厘入無灰酒ニテ煮
熟シ酒共ニ服スヘシニ三服ニメ愈

小便血 地骨皮新シキヲ洗淨ノ搗テ汁
ヲ取若汁ナクハ水ニテ濃煎シタル汁一盞
ニ酒少許加ヘ食前ニ温服ス心腎ヲ清シ
藥結ヲ開キ以テ分利スル治法也若專
温補スレハ及テ湿熱ヲ生シ害ヲナスト多ク

白濁 小便身
ニシテナリ 蓮子一兩炒テ為末空心ニ
酒ニテ一々ニ分ツテ服ス

○又方 淡竹葉 地骨皮 桑白皮 蜜炒
各等分煎湯ニテ服スレハ即止

○又方 藕節 多少ニ拘ス蜜ニ拌飯上
ニテ蒸連服ス三四次ニメ愈

○又方 車前叶四兩搗爛シ生白酒三升
ヲ攪シ七鹽少許入空心ニ熱服ス一二次ニ
テ愈小便道疼者ニ更ニ佳

○白濁淋疾痛忍ヘカラサル者ニ羊角
ヲ燒テ灰トナシ三々好酒ニテ服ス

遺精白濁 韭菜 二升搗テ
汁ヲトル 牡蛎 羊竹炭灰
三々三三

ノ莖ノ汁ニ浸
煨乾シ 研テ細末シ毎服三々空心ニ燈
心ノ煎湯ニテ服スヘシ

治遺精 白朮 高 苦參 牡蛎 各三兩

○六十一

共ニ末トシ猪肚一具水ニテ煮爛シ藥末ヲ入シ搗テ桐子ノ大サニ丸シ四十粒ツク一日ニ三次酒ニテ服ス

○又方 蓮子心二兩 硃砂一分 共ニ末トシ空心ニ服シ愈

精滑不禁如油 牡蛎 竜骨各屬二兩 白朮

炒ニ 青鹽五錢 益智仁一兩 蓮鬚 芡實

枸杞各二兩 香椿皮四兩 共ニ細末シ黄芩ノ嫩カナル者ト金櫻子刺ト接トヲ去リ一升

煎シ膏トナシ右ノ藥末ヲ丸シ毎日空心ニ鹽少シ入タル湯ニテ二三々ツク用ユ

夢遺膏藥 川練子三錢 龍骨一兩 牡蛎二錢

二錢 細末シ灸瘡ノ膏藥ニニセテ臍下一寸三分ニ貼ヘシ

○乳香指ノ矢サナルヲ一塊卧時トクニ 合

目醒テ吞之數度ニメ自愈

○疝氣諸症

七疝總論 七疝ノ症各不同治モ亦有別

○寒疝ハ陰囊冷結硬如石陰莖不舉或ハ

畢丸ニ控テ痛ム湿地ニ坐卧シ冷水ヲ得

之濕ヲ去ノ初ヲ用テ下之○水疝ハ陰囊腫

テ水晶ノ如ク陰汗痒シテ強ハ黄水ヲ出ス

或ハ小腹ヲ按ハ水ノ声ヲナス 酒ニエテ

房事ヲ行ヒ汗出テ遇風寒濕陰囊ノ中

ニ結スルヨリ得之逐水劑ヲ用テ下之○筋

疝ハ陰莖脹或ハ潰或ハ膿或ハ痛裏急

メ筋縮リ或ハ陰莖ノ中痛ム痛極ルトキ

ハ痒シ或ハ挺出テ不收精ノ如キ白物瀉ニ

隨テ出是房事ヲ行フ邪術ヲ使所ニ

因テ得之心火ヲ降初ヲ用テ下之○血疝ハ

狀黃瓜ノ如シ小腹ノ兩傍横骨ノ兩端ニアリ
俗ニ便癰ト名ツク今ニスミダク是春夏ノ大燠
ニ重感シ内ヲ勞シ其氣流溢ノ膨脹ニ滲
入結テ腫ヲナス血ヲ和スル藥ヲ以テ下之○
氣血ハ上腎ニ連リ下陰囊ニ及ヒ或ハ號哭
忿怒ニ氣鬱メ脹氣ヲ散スル藥ヲ以テ
下之○狐疝ハ狀瓦ノ如ク卧時ハ腹ニ入り行
時ハ出上下無定狐ノ惑力如シ故ニ名ツク
逐氣流注劑ヲ用テ下之○癰疝ハ陰囊
大ニ腫不癢不痛是濕氣ヲ受ルニ因テ
生ス去濕劑ヲ用テ下之
疝氣初起 鳳仙花陰乾 烏芋乾 等分
燒酒ニ浸シ日ニ二三鐘服ス
○又橘核去殼炒テ末トシ毎日空心ニ溫
酒ニテ一二服ス效アリ

○又方 山查子 蒼朮各五 好酒一碗半
ハ八分ニ煎シ熟服ノ被ヲ蓋卧テ汗ヲ出ス
數服ニノ愈

諸疝發痛不可忍 荔枝核炒脆 細末ニテ

空心ニ白湯ニテ下ス或ハ青皮山梔子各茶
黃各等分ニ炒末シ加ヘテ白湯ニ調服ス
○又方 茄蒂ヲ晒乾シ切片好酒ニ蒸
テ服スハ自愈恙疝ニハ砂仁五分 加ヘ蒸テ
服スハ不用

本疝 即本腎也凡人心火下降スルトキハ
腎水其温メサルヲ不患真陽下降スルトキ
ハ腎氣其不和ヲ不患温ニテ且和セハ安ソ
本強ト云者有ニヤ本強ハ則傷腎ナリ故
ニ純モヲ燥カ藥ヲ用ユハカラス温和散劑ノ
其邪ヲ逐トキハ邪自消シ榮衛流轉シ

愈^レ枸杞子丸ヲ服スヘシ 枸杞子 昆布
吳茱萸^{各四} 南星 半夏 白芷 山查子
神曲^{炒各} 滑石^炒 蒼朮^炒 黃柏^{酒炒} 各三兩
共ニ細末シ酒糊ニテ桐子大サニ丸ニシテ母服
七十九空^心ニ鹽湯ニテ下之

寒^心疝^及偏^墜

偏墜ハ疝ノ
カ多クモ云 老少ヲ不

論^レ病在^左荔枝核一歳一粒取タルヲ慢
吹ニテ煨テ存性研末ノ空心ニ好酒ニテ
服スヘシ 荔枝核年ヲ経タルモ好シニ手ニ
一棹ツク取ラタ敷服トシニ日ニ服スニ 病在^右小
茴香鹽水ニ浸シ炒研細末ニ空心ニ三五
ツ、燒酒ニテ服ス

○偏^墜ニハ雞子一ツ尖ノ上ニ孔ヲ開^テ硫黃
末ニ々入火ニ煨^テ炭トナシ研テ細末ニ白
湯ニテ用ユ

囊^癰

凡^ノ小^腹疼^ヲナシ陰^莖ニ引^ク不^ク多^シ

熱^少ク好^テ熱湯ヲ飲スル^テ疝^氣ナリ
如^ク陰囊紅腫^ス及^テ熱^シ小便赤^シ内熱口
乾^キ墜^重ノ作^ス痛囊^癰ノ候^テ疝^ヲ
治スル熱藥ヲ用ユヘカラス

○主方 川芎 竜胆 天花粉 當歸
生地黄 柴胡 山柎 黃芩 各一兩
澤瀉 木通 寸竹 各五
分 燈心ヲ加ヘ水

煎^シ食前ニ服ス
○囊^癰潰^後移^藥 蚌殼 黃連 青
黛^{各等} 研末ノ糝^{ヘシ}

陰^囊癢^者ハ油^核椒^油ニテ潤^シ之^ル
湿^者ハ五加皮千里光明葉劉寄奴等
稀^艾煎湯ニテ洗^之

脚^氣諸^症

脚^氣總^論

脚^氣ハ始^メ濕^ヲ受^テ復^テ風寒

暑熱ノ邪ヲ挾テ成故ニ先腿足ヨリ起
 テ必ス脚屈弱ク拳體轉弱之肢節疼
 テ足腫小腰不仁シ心中悸動之胸滿
 小便澀ル但桑熱頭痛身疼ノ候絶夕
 傷寒ニ似タリ人多ク得リ治ス仲景脚
 氣ヲ以テ類傷寒ノ症トシ別ニ篇目ヲ
 立テ以テ別之蓋為此也羅謙甫云南
 北ノ脚氣受病不同南方ハ卑濕ノ地
 濕每ニ襲虚病下ヨリ起ル此脚氣ハ外
 ヲリ受ル也北方ハ地高クシテ無濕其俗
 澆乳酒麪ヲ多ク飲快ク食ヲ為能或
 ハ奉養太過シ其濕ヲ滋水性潤下氣
 拘ルアタハス故ニ下テ足ニ注テ腫痛ヲ
 ナス此脚氣ハ内ヨリ受ルナリ所因ヲ推キ
 父テ可治之

濕脚氣

足痛腫腫ニ防己飲シ服

スヘシ 白朮 炒 犀角 蒼朮 炒 生地黄 兩

黃柏 兩 各 本通 防己 栝榔 川芎

各ハ 甘州稍 七分 水煎熟服ス有熱加

黃艾テ熱甚天冷熱セハ加石膏疼ニハ

加竹瀝薑汁或南星大便秘結セハ

加桃仁小便澀ハ加牛膝

○又方 蒼朮 米泔水ニ浸 黃柏 兩 炒 牛

膝 兩 炒 水煎シ空心ニ服ス或ハ為丸亦

可

○又方 萊菔根葉共ニ煎シタル湯ニ

テ洗フヘシ生ナル無之時ハ晒乾シタル者

モ亦可用

○又方 明礬各二兩ヲ地漿水十大碗入

テ六七沸煎シ半分ヲ汲テ脚ヲ浸シ

半分ノ湯ヲ徐々ト添入テ洗ヒ上ニ衣ヲ
重テ身ヲ圍微汗出シハ愈薄綿ヲ與
テ飲シムヘシ此方ヲ用テ如不愈前方
ノ内ヘ硫黄ニム加ヘ如前洗フヘシ效アリ
地漿水トハ地ヲ二三尺深ク掘其内ヘ水ヲ
傾入テカキニセ其水ノ澄タルヲ待テ取用ユ
風寒暑濕脚氣 鳳仙花葉ヲ晒シ乾シ
煎湯ニテ脚ヲ洗ヒ葉ヲ搗爛シテイタ
ムトコロヘシクヘシ

食積流注成脚氣 蒼朮炒 防己 黃

栝酒炒 白芷 犀角各一兩 栝各一兩 南星

姜切各ハク 川芎五分 肥タル人ニハ貝母 志陳

皮各一兩 加フ右細末シ酒糊ニテ桐子ノ大サ

ニ丸シ毎服七十九空心ニ白湯ニテ下ス

脚氣彙腫 馬鞭竹ノ煎湯ニテ二三
洗フヘシ即愈

又方 白米各一兩 白米各一兩 陳好酒糟ト同ク搗
爛シ患処ヲコレニテ裹只脚指頭ヲ露
シ出ス

○虚腫ニハ槐花山梔子藍酒炒 為末空

心ニ米湯ニテ下ス又脚瘡ヲ治メ效アリ

治脚轉筋コムラ 轉筋ハ皆血熱ニ屬

ス急ニ大蒜ヲ取テ脚心ヲ磨テ編ク

熱セシメ即四物湯ニ酒苓紅花ヲ加ヘ

煎服ス筋足ノ大指ノ上ニ動キ至腰

住者ハ風寒濕ニ因テ作又蒼朮天南

星ヲ加フヘシ

脚癢 脚ノ皮膚ノ間ニホコシ

津唾ニテツクヘシ自能疼ヲ止メ腫ヲ消

○脚裂 黃蠟六兩 降真香二兩 研テ

細末シ猪油半斤入熬テ傳之

脚城 勃脐半箇患処ニ貼テ一夜過
次晩再貼五六夜如此スレハ其城連根
脱出

○又方 葱根 勃脐 共ニ搗テ汁一
碗取テ煎シ再松香四兩ニ麻油ヲ入レ煎シ
水ニ滴ヲ落シ見テ珠トナル時右ノ汁ヲ
入煉テ膏藥トシ貼ヘ即落
○暑氣ノ時脚ヲ振破テ爛瘡トナル
ニハ茶葉ヲ口ニ嚼爛シテシクヘシ

○婦人諸症

婦女總論 經曰女子七歲腎氣盛
齒更髮長二七而天癸至任脈通太
衝脈盛月事以時下天トハ天真ノ氣
降ヲ云癸トハ壬癸ノ水ノ名故ニ天癸
ト云ナリ然モ衝ハ為血海任ハ主胞胎

腎氣全ク盛ナレハ二脈任衝流通シ經血
漸盈テ應時下ルコシ月事ト云ハ平和
ノ氣常ニ三十日ヲ以テ一見ル月盈ハ則
チ虧ニ象ナリ若シ經脈行時ニ遇ハ調理
ヲ謹ムヘシ調理トハ俗云
身持養生也調理宜ク失スレハ
産後ニ受病ニ似タリ輕ハ宿疾ト成
重ハ喪生蓋致スラ被トキハ氣血錯乱
シ經脈漸然トノ不行身ニ逆トキハ血
分癆ト瘵等ノ疾ヲナス若其時カラ旁
スレハ虛熱ヲ生シ變シテ疼痛ノ根トナ
ル若シ悲怒スルトキハ氣逆ス氣逆スル
トキハ血逆ス腰腿ニ逆ルトキハ經水行
時ニ遇テ腰腿痛重シ期ヲ過レハ安
シ頭眩心肺背脇手足ノ間ニ逆レハ經
水行時ニ遇テ其症亦然リ若シ怒極ル

トキハ傷肝眼暈脇痛嘔血瘰癧癰瘍
ノ病アリ加乏經血其間ニ滲漏テ遂ニ瘕
疔ヨリ血淋滲レテ已リテ九經水行時
風ニ中ハ病風冷ニ感スレハ病冷久レテ
不愈變症百出可不慎哉

○滋陰百補丸 專治女人勞傷氣血不
足陰陽不和乍寒乍熱心腹疼痛
痛之飲食ヲ不思羸瘦力乏者治之
香附子 一斤炒去毛四分テ製ス酒ニ浸四兩蒸水ニ
益母草 半斤蒸十日後 當飯 二兩 川芎 白朮
熟地黃 各四兩 芍藥 三兩 人參 茯苓 延
胡索 二兩 耳朮 一兩 右細末煉蜜ニテ
桐子大廿九粒空心時五六十九ツ、白湯
或ハ宿砂湯或ハ醋湯或ハ酒ニテ服ス
○調經順乳方 當飯 二兩 生地黃 二兩

白朮 米泔水ニ浸 炒各四兩 茯苓 川芎 鹽後浸 剉細乾 陳皮

鹽湯 洗 黃芩 水ニ沉公者 煎二浸炒 牡丹皮 去骨 玄胡索

酒炒各 二兩 白芍藥 煎炒 人參 一兩 沉香 五錢

右細末煉蜜ニテ丸之ニ每服三錢空心

鹽湯ニテ用ユ

○治骨蒸調經方 當飯 一錢 白芍藥

地骨皮 各八分 黃芩 兩炒 耳朮 各四分 白朮

陳皮 白茯苓 各七分 枳殼 五錢 半夏 兩製 三分

澤蘭葉 二錢 棗 二水二碗入煎服ス

經脈不調漸成瘕瘕氣塊 香附子 一斤炒 四製

艾葉 公兩醋煮 炒黃文 右細末醋ニテ桐子大廿二

丸之ニ每服六十九淡醋湯ニテ送下ス一日二

服生油臍等ノ物ヲ忌ム

月水久閉 蚕砂四兩炒テ半黃色ニシテ

無灰酒一壺ノ内ハ入砂鍋ニ湯ヲ沸シ其

内へ酒ヲ壺ナカラ入テ沸過シ取出シ磁器ニ盛テ盛テ去テ酒ヲ温メ飲テ養蓋ニノ即通ス

調經種子方

經水ヲ調子ヲ養ル方

艾葉 香附子

各八兩

當歸身

酒洗

生地黄

酒浸

熟地黄

杜仲

酒炒

續斷

鹽酒炒

山藥

炒黃連

芍藥

酒炒

茯苓

人乳三棗各五合

川芎

一兩

其神

炙八分

右為細末醋糊ニテ粟大二丸ニ每服二丸空心ニ淡塩湯ニテ用ユ

○又方

益母葉

七兩

生地黄

當歸

芍藥

藥

香附

四兩

熟地黄

各三兩

川芎

右細末シ蜜ニテ桐子大廿二丸ニ每服三

丸ツ、空心好酒ニテ下ス

○妊娠

妊娠心腹痛不可忍

鹽少許炒赤クシテ

一撮酒中入津服之即止

安胎方

茯苓

二兩色白堅重

條芩

即黃芩

堅者也

茯苓

去者佳

去皮

條芩

童便浸

去之不用酒二枚

白木

黃土炒

香附子

童便浸

去之不用酒二枚

玄胡索

酒炒

益母草

用

紅花

各二兩

各研テ細末シ煉蜜ニテ

桐子大廿二丸ニ每日空心ニ白湯ニテ七丸ヲ

服ス多用ユヘカス如胎不安一日間四五次

可用一度ニ多服スルナカレ胎安キトキハ

又一日ニ一服ス或ハ日ヲ間テ用ルモ亦可

七丸ヲ為極凡腹痛腰酸脹ヲ作ハ即

服スヘシ如胎三五月ニノ常ニ墮者ハ三ツ

一月ヨリ製シ服スヘシ恚怒勞力煎炒

氣ヲ殺スル物ヲ食スルヲ戒ム并ニ

冷水冷物房事ヲ忌ヘシ此方紅ヲ見

胎墜ントスルニ至テ服之往々ニヨク保テ

月ニ足テ産スニコトニ神方アリ

胎動不安腹痛下黄水 糯米一合黄芪

川芎各五々水一升八八合ニ煎シ二次ニ

温服ス

○胎重作痛不可忍鯉魚ヲ酒ニテ煮食之

○胎漏不安糯米ニ合糯米二煮生地黃

ヲ搗汁ヲ一合取粥熟シタル時ニ入シテ

調空心ニ服ス但煮ル時鉄器ヲ忌破

鍋ヲ用ユヘシ

○孕婦磕閃跌撲半産シ或ハ胎ヲ墜

ト欲シ安ニ毒藥ヲ服シ諸ノ惡症ヲ

見ス者ニハ胎已ニ下イタ下ヲ不論

此方ヲ用上當飯 川芎三々 益母

仲紫花者五々 白花者ヲ不用 水煎シ濃ク飲シムモ口

嚙者ハ開テ灌之胎可安即愈不可安

即下也産後ノ諸症モ亦治ノ古酒重

便各一小杯ヲ入テ用ユ各之如

妊娠卒倒 頃刻ニテ甦者兒輩ト名

ツク葛根 麻黄連節各 桂枝 芍藥兩枚

其仲各々 姜枣煎服微汗ヲ出ノ愈

束胎散 益母仲 當飯各三 川芎 茯苓

各一々 枳殼八分 陳皮 其仲各五 人参一々

煎服ス或々麥子四十九粒 胡麻半人加フ 人参ヲ服スルヲアタ

ハサル者ハ不用可也八九箇月ノ間一日一服

用ユ臨産後他患ナシ

○産云月

○衛生丹 早ク用ユエカラスニ産後日ニシテ

遅ク胞破ノ時服之 益母仲一介 當飯八両

其仲四両 乳香六両 麝香三々 右細末シ

端午日調合ス鷄犬不淨婦女近ツ多クヲ
忌煉蜜ニテ竜眼肉大ニ丸シ臨産ノ時
乳香五分煎湯ニテ送下ス或ハ前ノ妙
手散ヲ濃煎ノ飲之一服不生再服ス
又不生ニ服スレハ即生ス蓋州藥調和
氣血不致偏雜イニ夕正産ニ當サレハ
即能止胎止痛已ニ正産ニ當ハ即ヨク
催生ノ痛苦ヲ免ル既ニ産ノ後服之ヨク
去舊血生新血冲ヲ行シ補フ孕婦ノ
家ニ預メ救帖ヲ贖置ヘシ輕忽ニオモ
フコトナカレ

治難産

破水已ニ下時ヲ過メ不産
滑利ノ藥ヲ服スヘシ 車前子 一兩微炒
水煎服ス 催生ノタリヲ煎ス
六大河ノ順流水ヲ用ユ 或ハ車前子
免絲子等分細末シ温酒ニテ三五々服

ス亦效アリ

○又方 千里馬鼻 五個路工ニ拾タル
舊草鞋ノ鼻也 蟬蛻

五個去
首足 麝香 五厘 雄黄 五分燒
灰 共ニ細末

ノ每服三分好酒ニテ下ス被ヲ擁テ微
汗ヲ出セハ立処ニ生ス

夏月熱心難産 滑石 六分 甘草 二分 油

未シ新汲水ニ蜜少シ加ヘテ用ユ但酷
暑大熱ノ時ニ非ハ輕シク服スヘカラス

冬月為寒氣所逼難産 五積散生薑

葱白八煎シ熱服スヘシ 方ハ諸書ニ
出タリ 產門閉 前胡 二兩 川芎 三々 酒ニテ

煎シ服ス 姪有兩子一死一活 即妙手散 在前丹

參五錢加ヘ煎服ス 盤腸產 子宮先出テ後子ヲ産テ其

腸才サシラサルナリ 枳實 三々 肉桂 五分
水煎シ急ニ服ス

○腸已ニ出テ再不入者ハ驚シレウコカス
一ナカレ鉄銹水ヲ温テ灌テ灌之磁石真ナ
ル者ヲ煎湯ニテ飲シムヘシ即入也

臨産交骨不開

龜殼一個 男子ヲ生

タル婦人ノ髪一把俣ニ燒テ灰トシ存性
一度ニ三々ワ當飯一兩 川芎 五々 濃煎
シタル湯ニテ服ス人一里ヲ行向ホトアリ
テ交骨即開クタトヘ子死タリトモ俣ニ
下ルル母ナリ

橫生倒産

艾麥粒ホトニノ婦人ノ右

脚小指ノ尖ニ三壯灸ス即順ニ生ス

○又方 蛇蛻一條 蟬蛻 十四全キ
モヲ用 頭髮 握
共ニ黑燒ニシ未シニ服ニ分温酒ニテ調

下シ仰臥行時ニ順ニ生ル

○竈下ノ釜ニ對スル衣ノ紅焦土研テ細

ニシ酒ニテ一々服シ産母ノ臍ノ内へ塗ヘシ

生子ノ頭ニモヲ帶テ出

子死腹中不下 黃牛糞乾者白湯ニテ

服ス即下

○又方 苦葫蘆黑燒每服一々空急ニ

熱酒ニテ下ス

月數未足胎死不出

大豆ヲ醋ニテ煮令

服之立処ニ下ル未下ラサレハ再ヒ服

○子死腹中連日不出 巴豆 三粒 車麻

子 七粒 麝香 少許 研餅ノ如ニ臍ノ上

ニ貼ヘシ即産ス産スレハ速ニソノモチヲ去

ヘシ然サレハ子腸亦出 凡ノ産婦舌ノ口子

胎衣不下 荷葉剉水煎シ濃ノ服スレハ

即下

○又雞子清ヲツ吞ヘシ即下

○又產婦自髮ノ穢ヲ條テ口中ニ置キ一
夕ヒ惡心スレハ即下

○產後

產下保生錠

蒲黃 五靈脂 各十兩 延

胡索 五兩 醋炒 其仲 二兩 青皮 二兩 醋炒 麩糊二

テ錠子ニシテ丸ク平 産シテ後一飯ノ間ア

リテ薑湯ニテ化シ服ス此藥端午ノ日

修合ス雞犬不淨ノ女人ヲ近クムコト忌

定暈寧心散 澤蘭 荆芥 各一 當

歸 八兩 川芎 十兩 其仲 四兩 極細末トシ産

シテ後三ムツノ清米湯ニテ調服ス童便

半盞加ヘテイヨクヨシ

產後養暈

當歸尾 大川芎 山查子

益母草 五靈脂 各十兩 水煎服スル時童便

一盞加ヘテ用ユ

○又方 荆芥 炒黑 研末 童便半盞 白湯ニ

テ調服ス效アリ

產後血暈

惡心冲心人事ヲ不知者ハ之

兩手ニテ産婦ノ頭髮ヲ提起シテ放倒

ニスヘカラス放ハ血攻心テ不救急ニ醋ヲ燒

テ嗅セ醋少許燒熟シ口中ニ灌ハ自定

時ニ髮ヲ提ケタル手ヲ放テ坐シ正ク記

ヘシ大抵サリ飯湯ニテ荆芥黑燒ヲ調下

ス熟童便ニテ調灌下セハ即甦ル

血衝工昏暈欲絶 紅花 一撮 好酒 一

鍾數沸煎シ童便ニ盞入熟ヲ灌下

ス立トコロニ驗アリ

產後惡血下不盡上奔衝心煩胸腹痛

藕ヲ搗テ汁ヲ取、温服ス

或惡露不盡、腹痛及兒枕疼、山查子

百十 打碎煎湯ニ砂糖少許入、空心温服

產後發熱、大劑ノ當飯炮姜治之、如

風寒ニ冒ハ加減ノ治之愈、此症多ハ

血虚ニ由故ナリ

產後遍身疼痛、此症產ノ血氣ヲ走

動スユニ升降其常ヲ失ニ因、即ニ流

滯リ筋脈引急、是以ニ遍身疼痛甚

トキハ腰背強硬、俛仰スルヲアタハス、手

足屈伸シカタク、或ハ身熱ニ頭痛、他

病トナシテ治スハカラス、牛膝酒浸 當飯

去尾 肉桂火忌 白朮 黃芪 独活 生

姜 白僵蚕 桑寄生 甘竹 各等分

細末ニ母服四々滾湯ニテ調服、神效アリ

產後敗血流注、經絡結成腫塊疼痛者

香附子 赤芍藥 川芎 當飯 熟地黃

陳皮 紫葳 牡丹皮 紅花 牛膝 枳

殼各一 甘竹節 獨活各五 水二碗入

八分ニ煎シ酒一小盃入、食前ニ服ス

產後舌出不收、丹砂ヲ舌ニ敷ヘシ、或ハ

盆盞ヲ擲テ地ニ墮シ、声ヲ作ス、產婦

驚之舌即收ル

產後大便閉、當飯 生地黃 茜竹根

桃仁 延胡索 赤芍藥 紅花 水煎ス

如寒痛ニ木香ヲ加フ有汗木香ヲ去

人參 甘竹 酸棗仁ヲ加フ惡心ヲ作ニハ砂

仁三分加フ

產前產後痢疾、敗龜甲ヲ醋ニ浸シ

炙為末服スヘシ

○胎前產後通治

○回生丹 胎前產後三十六症及崩漏

淋經ノ諸疾不治云フナシ此誠ニ神驗ノ

妙方也 大黃 錦紋者一 三兩到河水 五碗入煎

三碗トシ渣ヲ 去汁ヲ用ユ 紅花 三兩黃色ニ炒好酒一大壺ニ入煎

黑豆 三升煮熟シ汁三碗ヲ取テ豆ヲ去リ 不用一方ニ此下ニ豆皮ヲ用ユト書リ 先大黃

末ヲ好醋三碗ニ入攪カキニシ始文火後武火ニ

テ煎シ煉テ膏トス 煮テ三遍ニシ 色黒クテハ止 次ニ紅花

酒ニ煮タル汁ト茯苓ノ汁ト黑豆ノ汁トヲ

合セ大黃膏ノ内へ入又熬テ膏トナシ取

出シ後ノ藥ヲ入ル 當歸 白ク大丸 洗 川芎 茶

地黃 好酒浸九 蒸九晒 白茯苓 烏藥 酒炒 蒼朮

米汁 香附子 便制表 酒製 延胡索 醋炒 蒲黃 火炒

牛膝 去芦 皮去別ニ 炒テ研各二兩 甘草 陳皮

木香 三稜 醋炒 羌活 五靈脂 酒ニテ絶ニ 淨

地榆 生用 山茱萸 酒蒸 白芍藥 酒炒各 五錢

良姜 壁土炒 四錢 人參 白朮 炒 木瓜 青皮

醋炒各 三錢 乳香 沒藥 各一 以上廿七味為細

末大黃膏ニテ彈子大サニ丸シ一九ツ陳

好酒古酒ナリニ化シ服スヘシ諸症治方丸ニ

録ス○産期未至惡露先下リ乾燥テ

難生俗ニ立漿ト云○横生逆産傷損テ

産盤腸産暑氣ノ産寒氣ノ産同乱

ニ日ヲ連テ生シ難ニ○子腹中ニ死シ昏

青ク腹冷ハ命須臾ニアリ已上ノ症ニ當

飯川芎益母各三水茶碗ニツ入七分ニ

煎シ好酒三分加ハレモタハメクヲ右ノ丸藥ヲ調服スヘシ

○胎衣不下脹胸昏迷スルニ○惡露上ニ

攻昏暈ノ不醒○産後無力時々暈

厥ニ或ハ喘促ニ汗出或ハ頭旋眼黒○

已上並ニ當飯川芎各三分水茶碗二ツ入
七分煎之酒三分加へ丸藥ヲ服ス再ヒ
童便半盞入テ用ユ○産後惡露不盡
或ハ不行以腹脹疼痛ス○産後寒熱
往来之瘧疾ニ似テ飲食不進日久シテ
骨蒸トナルニ○産後飲食ニ傷レ浮腫
痛ニ○産後胸脹滿嘔吐不止○産後
四肢浮腫ニ○産後麪ヲ食スルハ太早ク
血結在心口壅悶ニ○産後狂乱ノ鬼
神ヲ見ルカ如キニ○産後敗血經絡ニ流入
百節酸疼ニ○産後血心孔ニ入テ失音
不語○産後怒ニ因テ肝ヲ傷リ小便ニ血
ヲ下シ雞肝ノ如クナルニ○産後敗血肺ニ
入テ喉痺ノ鳴カ如クナルニ○産後體流腰
痛身及張ニ○産後養生ノ宜カラズ下

血崩漏ニ似タルニ○産後面黄舌乾キ或
ハ鼻血出遍身紅點アルニ○産後小便淋
瀝シ大便不通或ハ乍チ寒ク乍チ熱ク
醉タル如ク癡ナル如ニ○産後虚損身被
面黄飲食減少シ發熱盜汗漸勞瘵
トナルニ○婦人經水閉或ハ不調崩漏帶
下及臍冷テ孕ス或ハ胎漏半産等ノ症
○已上並ニ當飯川芎各少許水一茶碗
入七分煎之酒三分加へ丸藥ヲ調へ服ス
○産後傷寒頭痛身熱無汗麻黃末
三分加へ葱姜ノ煎湯ニテ丸藥ヲ調下ス
○如頭痛身熱自汗セハ冬ハ桂枝ノ末
三分春夏ハ防風白朮ノ末各三分加へ葱
姜ノ煎湯ニテ調下ス○産後乳ナキニハ
黃連天花粉當飯尾穿山甲ノ末各三分

加へ酒ノ内へ入化し服スへし其乳湧カ如シ
初産数日ノ内氣血定ルヲ俟テ服セヨ○
凡ソ症深ク重キ者ハ多ク服ノ自愈初
産之危急ノ際日ニ二三度用テ最效アリ

○乳症

乳汁不通 老絲瓜子ヲ連テ黒燒ニシ
細末シ酒ニテ服シ被ヲ蓋汗ヲ出セハ
即通スへシ

○又方 胡麻ヲ炒搗爛シ以タル鹽少
許入テ服ス

○産婦無兒乳ヲ喫サレハ乳腫堅痛忍
カタキニ 川芎 當飯 白芍藥 熟地
黄 各ニ 炒テ粉ニス 水ニ碗ハ八分ニ
煎シ食ヨリ遠ク服シ脚布ヲ用テ兩ノ
乳ヲ緊束手ニテ揉按ハ其腫消散ス甚

者ハ再ヒニ服用ユ

内吹外吹

懷胎ノ中ニ乳ノ腫ルヲ内吹

ト云ヒ兒ノ乳ヲ飲トキ腫ルヲ外吹ト云フ
寒熱作甚シキ者ハ惡心嘔吐ス此方ヲ
服スへシ 柴胡 陳皮 川芎 山梔子
青皮 石膏 黄芩 連翹 各一搗葉北
甘草 五分 水ニ碗ハ八分ニ煎シ食ヨリ遠
ク服ス葱白ヲ切碎キ炒熟シ搗爛シテ
乳ノ上ニ敷帛ニテ包ヘシ冷ルトキハ易ヘシ
自愈

○乳結核アリテ腫痛忍カタキニハ陳皮
白ヲ去晒シ乾シ麩ヲ微黄色ニ炒共ニ
細末シ麝香少許入再ヒ研和一度ニニ
女熱酒ニテ調服シ乳ヲ揉ハ即散也

乳癰乳疔

丹溪曰乳房ハ陽明胃經ニ

屬スル所乳頭ハ厥陰肝經ニ屬スル所也
兒ニ乳ヲ飲スル母或ハ忿怒肝ヲ傷リ或
ハ厚味ヲ食シ熱ヲ積以テ氣流行サル
コトヲ得ス結テ腫ラナシ痛ラナシ陽明ノ
經ノ血熱スルトキハ化メ膿ヲ為又兒ノ口
ノ氣吹テ嫩熱ニ次ニ結メ核ヲナス初起
時ハ痛ヲ忍テ揉散シ軟ナラシムルハ血脉通
シテ自然ニ消散ス此ヲ失スハ不治メ癰
疽トナ紅腫癰熱之疼痛者ハ是乳癰
ナリ堅クニテ潰爛者ハ乳疽ト名ツ初起時
ハ癰散シ流氣藥ヲ用ユ若己ニ膿ヲ成者
ハ又内托排膿ノ養血順氣ヘシ安ニ刀針
ヲ用テ処コヲ取フナカレ又婦人憂ヲ積テ乳
房ノ内ニ核子ノ大サニ核ヲ生シ其硬ト石
ノ如シ不痛不癢或ハ一年二年或五三年

ニテ始テ癰ニ瘡トナリ破陥リタルヲ乳癰
ト名ツク其深凹ト密穴ニ似タルニ也此症
多ハ難治此瘡ヲ得者ハ天命也トイフモ
若ヨク心ヲ清クシ思慮スナク暴怒ヲ戒
メ厚味ヲ不食ノ内托ノ劑活血順氣
藥ヲ服セハ可生ノ理アリ

乳癰初起 藕根切片無灰酒ニテ煎
之服其人ノ酒ヲ飲ホトラ量テ用ユレハ
即消散ス

○又方 五味子ニ女陳壁泥
ニ拌セ炒 阿膠ニ女麩ニ
ニ拌セ炒
各研テ末ニ陳好酒ヲ熱クシテ服之散ヲ
蓋汗ヲ出セハ即愈

○又方 蒲公英七五 金銀花二兩 穿山
甲三片灰拌黃色ニ
炒テ搥碎ク 橘葉七枚 白酒一酒杯 水一
碗ハ八分ニ煎シ半ハ飽時ニ服ス外ハ橘葉

煎湯ニテ洗ヒ其渣ヲ腫ル処ニ敷カシ腫ハ汗出テ即散也

○又方 鹿角尖シカクノトカニ寸蝦紅シカクノトカニ碾末シカクノトカニ三々熱酒調服ス重者ハ二服ニノ必ス消ス

結核作痛未成膿 酒ニテ白蠟ヲ化テ一錢服ス

乳癰乳腫 芭蕉葉ハセラハ搗テ汁ヲ取白酒ニテ服シ渣ヲ腫ル処ニ敷

乳癰治方 先甘草水ヲ以テ洗ヒ白蠟三々好酒ニテ化服ス五七次タビニテ亦愈

○又方 圓蛤殼ハシラリカラヲ研極細末ニ皂莢ノ末少許加ヘ醋ヲ煎シ右ノ粉藥ヲ調ヘ敷ヘテ即愈

○同穿爛ル者ニハ貝母各二々 知母各二々 麝香各二々 細末ニ雞子白ニテ調敷ヘシ

○凡諸瘡潰後ニハ皂角穿山甲ヲ服スヘカラス

乳癰 松脂色白者 川椒北粒 研テ細末ニ先槐枝ノ煎湯ニテ洗ヒ猪油ニテ藥末ヲ調擦ツケヘシ

○婦人諸病補遺

血瘕 婦人經水閉結ノ血瘕上ル腹腸脹痛欲死者ニハ 水菘花スイヨクク 馬鞭草イヌクサ

各一升 煎シ煉テ膏トシ 當歸 生地黃 洗淨 川芎 白芍藥各二 紅花 沒藥各二

延胡索 五灵脂各二 烏藥 木香各一 右細末ニ前ノ膏少シニ米糊ヲ加ヘ丸ノ

每服空心ニ紅花酒ニテ百丸ヲ送下ス 崩漏不止赤白帶下 烏梅黑燧ニテ

細末ニ白湯ニテ服ス止リテ後ニ蓮肉ヲ

黑燒ニテ香附子炒共ニ細末ニ毎服二
女湯ニ醋ヲ少シ加ヘテ服スヘシ按スルニ
此方男子小便ニ血出ルニ用テモ效アリ

血淋

淋疾血出
ルニ症アリ 青蒿子 八九月三服
ハモトクカタシ

一味研末シ冬米飲ニテ搗テ丸トシ清
晨ニ好酒ニテ三々ツツ送下ス輕者ハ半
月重者ハ二十日ニテ自效アリ但此藥ヲ
服ノ後ハ永ク孕メナシ子ヲ求メント欲
スル者ハ此方ヲ用ユヘカラス医家功ヲ奏
ノ易クハ貪メナカレ上帝母生徳ヲ絶ハ
速ニ天ノ譴ヲ受ニ如病危ト者ハ服之
母ノ命ヲ扶ルル亦重シ何ソ服スローヲ
妨ケンヤ

白帶

蕎麥麩雞子清ニテ丸シ大サ

藜豆ノ如クニ清晨湯ニテニ々々服ス

○又方 破故紙炒テ細末シ雞子ニ一ツ
ノ孔ヲ開破故紙ノ末ハ分入攪ニセ紙ニ封
シ固メ飯上ニテムシ空心ニ酒ニテ服ス重
者モ十次ニ不過メ即愈

小便不通

鯽魚一尾搗爛シサ許ヲ

麻ノ内ヘ入ヘシ即通ス

○又方 墙上蜒螺ノ内ヘ麝香ニ厘入
即蜒螺水滴出ルヲ取テ麻ノ内ヘ入ヘシ
即通ス

婦人顛狂失心

明礬 煨過 鬱金 七々

共ニ末トシ糊ニテ桐子ノ大サニ丸シ每服
五十九白湯ニテ送下ス數服ニテ即愈

鷄爪風

婦人不時ニ癢ス手足拘攣

拳束テ鷄爪ノ如クニナリ疼痛急ニ左
右ノ膝ノ骨ノ兩傍ニ小キ窟アル処ニ

四穴ニ各三壯ツ、灸スレハ立俗ニ鬼愈眼先也

鬼胎 婦人月ヲ過シテ不産一セカマ獲カマヲ抱ク

如クナル者ヲ云 是ニコトノ懐 胎ニアラズ 吳茱萸 川烏

頭 秦芫 柴胡 白姜 蚕 各等分 細末ニ

煉蜜ニテ桐子大サニ丸シ一度ニ七粒ツ、

蜜酒ニテ服ス惡物ヲ下メ自消ス○此症

ツミヒカ詳審ニ辨知テ藥ヲ與ヘシ古人多ク月

スキヲ過テ生スル者アリ率ソツホニ下スナカレ

鬼胎ノ説ヲ以テ却カッテ害ヲナスコアリ

可慎々々

○小兒諸症初生通用

○小兒初生先黃連甘竹ヲ濃煎急

ニ軟ナル絹或ハ綿ニテ指ヲ包ミ藥ヲ

蘸ビタシ兒ノ口ニ入口中ノ惡血ヲカキ出スヘシ

倘如モト此トリカタキ時ハ右ノ煎湯ヲツ

ツ、口ニ灌クヘシ惡沫ヲ吐出スヲ待テ後

ニ乳ヲ飲シム是胎毒ヲ去リ瘡瘡稀也

○兒生レテ七八十歳ノ老人ノ舊フルギ襦ヲ縫

改メテ小兒ノ衣服トスヘシ壽命長シ福

貴ノ家ナリ任新製タル衣服綾羅ノ類

ヲ用ユヘカラス小兒ニコレヲ看スレハ病ヲ

却ルフ不能壽シ柳テ福ナシ

馬牙 初テ生レタル小兒ノ口中ハ牙ハ銀ニ白

點シ生ス馬牙ト名ツク乳ヲ飲カタ此

胎熱ノワザナリ鷲口ト不同此症ハ療治

ヲ以テ緩ニスレハ救フアタハス急ニ針ニテ

白點ヲ挑破血ヲ出スヘシ証凶キトキハ

毎日如此ス緩ナレハ日ヲ間テ挑破ルナリ

挑テ後青絹ヲ用テ延ヲ取絞出シテ好

京墨ヲ薄苛ノ煎湯ニテ磨兒ノ口ニ遍

搽乳ヲ飲スヘカラス片時睡出ルヲ待テ後
乳ヲ飲スヘシ立処ニ效アリ若小兒ノ為ニ
痛ヲ護者ハ多クハ死ス

初生小兒面赤眼閉 大便不通不能進

乳者ハ多ク胎中ノ熱毒ニ由テナリ急ニ糞
清ヲ以テ解之 糞清ノ製法
本綱五十三詳

小兒生下遍身魚皮 急ニ早米粉ヲ遍

身ニフリカケテ即皮生スル時止ムヘシ

臍風撮口

此症ハ風濕ニ傷レ臍帶ヲ

断テ後イニ夕乾ス頻ニ浴サセ風濕臍ノ

中ニ入或ハ衣服ヲ換ル時臍ノ内ヘ風ヲ

受テ遂ニ臍風トナル面赤ク喘急シ啼

色不出撮口ト名ツク 蜈蚣 赤脚金頭者
一條

蝎梢 四尾全蝎
尾ナリ 白姜蚕 七 瞿麥 五分 共ニ

研テ細末シ鳥羽ノ莖ヲ管ニノ藥ヲ鼻ノ

内ヘ吹入噴嚏啼出セハ療治ノ活ヘシ即ハ

薄荷ノ煎湯ニテ右ノ藥末ヲ服スヘシ

○又牙銀ヲ見テ小泡ノ如キモノアリハ急

ニ淨綿ヲ温湯ニヒタシ手ノ指ヲ裹ニ輕

クト牙銀ニ出タル物ヲ擦破ハ即口ヲ開

ク也或ハ小兒ノ頭頂ニ五七壯灸ノ即愈

又小兒ノ臍帶ヲ煎シ服サセテ效アリ

○又方 多ク啼テ乳ヲ飲ス口ニ白沫ヲ吐

ニハ 全蝎 二十頭尾全者去毒
取兩ヲ塗アリ末トス 麝香 女許
別研

共ニ調合シ金銀ノ器ニテ湯ヲ煎シ藥

末ヲ服スヘシ

臍風疔筋

小兒初生七日ノ間若臍風

症發リ腹下ヨリ脊骨助引發リツ道ノ

如ク両方岔ノ如クニナリ上テ心ニ至レハ不

治此症ヲ見ハ其ハ疔筋ノ初テ發ヲ詳

二視ニ青筋ノ頭ニ灸ヲ三壯スヘシ或ハ兩
密ノ如クニ頭ニ灸ルル処ニモ兩方各ニ壯灸ス
ヘシ其効自消ノ必ス法

○又方 独蒜ヲ切片臍ノ上ニ安其上ニ
灸之口中蒜ノ氣アラハ即灸ヲ止ヘシ

臍腫出汁

枯礬ノ末ヲツクヘシ或ハ黄栢
ノ末ヲツクル皆效アリ

臍瘡不乾

兒臍出血

綿子燒灰フリカケテ即愈
小兒初生イニ夕月ニ満ス多

ク啼叫トキハ臍ノ中ヨリ血出ルコトアリ
白石脂ヲ末シ貼ヘシ愈若不愈トキハ
白石脂ヲ微炒テ貼冷レハ再ヒ貼ヘシ初
ツケタル藥ヲ剥取一ナカレ

臍久不乾

當飯焙乾之末トシ臍ノ中ニ
ニクヘシ頻ニ用テ愈

○凡臍帶ヲ斷時ニ明礬生ニテ細末シ臍
ニ多ク糝ヘシ總テ臍ノ病ナシ

止夜啼方

蟬蛻ニ十七 全者 頭ト足トヲ去辰
砂少許入細末シ蜜ニテ丸シ兒ニ吮シム
ヘシ自止

顛門腫

黄栢末ヲ水ニテ調足ニ塗
ヘシ或ハ顛門陷ニハ半夏ノ末ヲ水ニテ調

足心ニ塗ヘシ

葶瘡

凡小兒生シテ百日ノ内ニ生瘡葶
瘡ト名ツク胎毒ノワザナリ又主再瘡ト名ツ

ク身ニ出テ次第ニ頭ニ至ル者ハ愈ヘシ
若初頭ニ出テ次第ニ腹ニ至ル者ハ難治

犀角丸ヲ服スヘシ 牛黄 犀角 羚羊
角 全蝎 酒洗 白僵蚕 炒 防風 羌活

天麻 麻黄 牛胆南星 天竺黄 黄连

涼暈煨テ微烟 以上各三々細末ミツフキ之蒸餅カラスミヲ出シ
 糊カラスミニ打テ丸ミツフキニ艾實ミツフキ大ニニテ辰砂辰砂金辰砂泊辰砂ヲ
 衣トシ丸ミツフキツク薄薄苛苛ノ煎湯煎湯ニテ送下外送下ニハ
 付付藥藥々々守守ヲ用ユ用ユハカラス毒内毒内ニ入テ及及テ他他ノ
 疾疾ヲ生ス生ス藥藥煮煮ノ衣衣服服ヲ着着ススヘシ其法
 大黃大黃 甘州甘州 當歸當歸 朴硝朴硝 以上四
 味味青布青布木綿木綿ヲ兒兒ノ衣服衣服ニツツク右右ノ藥藥ト
 同ク鍋鍋ニ水水ヲ入入煮煮テ取取出出シ陰陰ニ乾乾メ早早晚晚
 トリカトリカテ兒兒ニ着着ススヘシ一度一度着着タルハ又又右右ノ如ク
 煮煮テ陰乾陰乾シ着着スルナリ愈愈ニテニ毎毎日日用用之
 又乳母乳母ニ煎煎藥藥十十劑劑用用ユユヘシ其方
 苦參苦參 羌活羌活 甘州甘州 連翹連翹 防風防風
 荆芥荆芥 牛蒡子牛蒡子 研研 金銀花金銀花 水煎水煎之服之服ス
 鷄鷄鷲鷲油油膿膿物物薤薤葱葱蒜蒜等等ヲ忌忌酒酒ハ少少飲飲
 テヨシ

○急慢驚風

○小兒小兒癆癆痲痲俗俗ニ驚驚風風ト名名ツク陰陽陰陽ノ症
 アリ身熱身熱シ面赤面赤ク搐搦搐搦上視上視牙緊牙緊タルハ
 陽陽症症也吐吐浮浮シ或ハ只吐只吐シテ不浮不浮日漸日漸ク面
 色色白白ク脾虛脾虛シ或ハ冷冷テテ癆癆驚驚搐搦搐搦甚甚シ
 カラス微微ツツ目上視目上視手足手足ススコシ動動者者ハ陰陰症症
 也陽陽症症ニハ用用涼藥涼藥陰陰症症ニハ用用温藥温藥一
 際際ニ驚驚風風ト作作テ治治ススハカラス又又癆癆疹疹癆癆世
 ントテ先先身熱身熱シ驚驚跳跳或ハ搐搦搐搦又此驚風
 ニ非非ス癆散癆散ノ藥藥ヲ服用服用ススヘシ
 ○癆驚散 半夏半夏 皂角皂角 為末為末少許
 鼻中鼻中ハ吹入吹入レハ即甦
 ○又方 牛胆南星牛胆南星 辰砂辰砂 研研テ細末
 シ毎服毎服五分五分ヨリ一一分分ニ至ル午前午前ニ服服午後午後ニ
 一服一服燈心燈心生薑生薑ノ煎湯煎湯ニテ送下送下ス

急慢驚風灸 眉心中二灸五七壯スヘシ即
喉ヨリ志出テ愈

○又尾尻骨下菘豆大ホトニ艾ヲ圓一壯灸
スハ即志ヲ出スニ壯ニノ立処ニ愈

○又鼻梁ノ両旁突突ニ窟アル処ニ點ヲ付
両方ニ三五壯ツ、灸スレハ立トコロニ愈
諸書言ニ多シ 故ニ畧之 驚風 治方

○五疳

疳症不同病ニ對シ藥ヲ用ユヘシ

心疳 小便不通口乾舌爛牙臭ク是心

臟ニ受積ナリ 羊肝散ヲ用ユ 穀精炒 五分

胡黄连 二分 柴胡 二分 甘草 五分 地骨皮 五分

盧菴 三分 共ニ細末シ羊肝一具竹刀ニテ剖

開キ右ノ葉末五分ヲ入肝内線ニテ肝ノ開

キタル処ヲ縫テ砂鍋ニ入テ煮熟シタル時ニ

服スルヲ七日ノ即愈

肝疳 熱ヲ積テ目ヲ損ス又雞矇眼ト

名ツク是肝臟受積ナリ 鷄肝散ヲ用ユ

夜明砂 水洗淨 雄黄 上 威灵仙 蛤粉 穀

精炒 各一分 共ニ末トシ雞肝一具葉末五分ト

共ニ砂鍋ノ内ニ入雞肝煮テ熟シタルトキニ

止テ服スヘシ

脾疳 夜盜汗ヲ出シ池浮口乾ク是脾

臟受積ナリ 白朮散ヲ用ユ 白朮 白

朮 土炒 澤厚 各二分 山查子 五分 胡黄连 一分

神曲 各三分 陳皮 一分 共ニ末トシ毎日清米

飲ニテ一匁送下

肺疳 龜胸咳嗽發熱夜啼是肺臟

受積ナリ 二冬膏 天门冬 麥門冬 苦

棟皮 桑白皮 陳皮 生地黃 各三分 河水

十碗入一碗二煎之白蜜八兩入共二膏トナ
之每山藥末一兩ヲ膏ノ内ヘ加ヘ和勻ヘ毎日
三次服スレハ愈

腎疝

肌體極ニ瘦遍身瘡疥瘻之

齒齦腫甚ニキトキハ牙齦潰脫ハ俗ニ

走馬牙疳ト云寒熱之頭熱之脚冷己

上五疝也 腎痛ノ治方ヲ不載者ハ走馬牙疳ノ
方別ニ一條アリ下ニ見タリ可參考也

五疝奇方

凡小兒五疝潮熱面黃肌瘦

煩渴吐浮肚大ニ助主日手足如柴精神驚

悸等ノ疝ヲ治ス 白朮 蜜水浸炒 白茯苓

史君子 切碎炒各 七各五分 蓮肉 隔紙 炒 麥芽 炒 金

櫻子 畧炒 陳皮 山查子 各五分 麥門冬 去心 一兩

芡實 二分 甘州 一分 青皮 二分 以上細末

藥末一兩ニ蜜四兩入煉調テ日中ト晚ト

温湯ニテ口ヲ漱テ此藥教匙服スレ

○身熱之咳嗽スルニハ地骨皮百部根各
五分加○稟氣弱ニハ人參一分五分加○

腹脹大便稀腸鳴テ色ヲ作或ハ虫吐テ

不和枳榔子ニ各五分木香五分加

疳病欲絶

黑牽牛子 雷丸 史君子

各一 共研テ末トシ小兒一歳ナラハ藥末一

厘ニ歳ナラハ二厘ヲ雞子黃一ツ分ニニセ

合セ紙ニ包ミ飯上ニテ蒸熟シテ用ユ三

四ツ分ヲ服ノ即愈

疳積諸病

雄黃 二分 研末 鷄肝 一ツ 不落水者

磁碗ニ入共ニ搗和好酒ニ盞入肝内飯上

ニテ蒸熟シ空心ニ服ス三四次ニノ愈

○瘦損ニ 神曲 十兩 陳者佳 山查子 八兩 馬子

城 四兩 醋浸シ 煨一三次 右細末ニテ砂糖ニ調テ服

ス小兒常ニ服ノ能生肌肉

○小兒雜病

○五福化毒丹 小兒胎熱大小便不通丹
毒瘡、湯赤疹、赤目、重舌、木舌、口瘡等
ノ症ヲ治ス 玄參 二兩 人參 七錢 茯苓
十五 馬牙硝 五錢 青黛 二兩 麝香 一分但夏ハ不用
甘草 十錢 一方黃連一兩 加以上細末蜜
ニテ丸トシ辰砂ヲ衣トス毎服一丸薄荷ノ
煎湯ニテ服ス瘡疹ノ後餘毒上ヲ攻ヒ
齒臭ニ生地黃ノ煎湯ニテ服スヘシ

赤遊丹

此症胎内ニテ毒ヲ受生シテ
後ニ発スルナリ身胎内ニアルトキ父母媼
慾ヲツ、ニミス淫火熾ニメ又厚味ヲ食ス
ルヲ戒ス又炭火ノツヨキニ烘又兒生テ
熱湯ニ洗ヒ衣類ヲツヨク烘テ着セ内ノ
毒ヲ觸動シテ此症ヲ発ス身熱ニ啼叫

驚キ搐搦次ニ紅腫ヲ生シ発熱ニ瞬
息間ニ紅腫身ヲ遊走ノ定レルトコロナシ
先頭額ヨリ起ル者天奪丹ト名ツク餘
ハ皆腹背ヨリ起リテ四肢ニ入者ハ輕ニ
四肢ヨリ起テ胸腹ニ入者ハ重ニ先生姜
汁葱汁燒鹽ノ煎湯ニテ種ノ処ヲ洗ヒ
洗時湯ヲ目ニ入ルヲナカレ若目ニ入レハ損
傷スルナリ洗テ急ニ服スル方

白芍藥 陳皮 各五分 麥門冬 一分 甘草 二分
藿香 木通 各四分 黃芩 五分 水一小碗入煎
ニテ用ユニ服ニメ愈乳母ニハ藥ヲ一倍
ニメ用ユ○赤遊腫痛ニ破草鞋亂髮共
ニ黑燒ニメ醋ニテ調ヘ敷ヘシ○平常ノ紅
腫ニ蒜頭 半個 葶藶 二個 煮熟ニ搗爛シ
白酒ヲ温テ服スヘシ自消ス

走馬牙疳

此症患迅速ナルヲ以テ走馬

ト名ツク治方遅ルハカラス是多ク痘疹ノ餘毒ニ中ラレ又雜病ノ熱甚シクシテ成モノ也
牙銀爛腫次第ニ黒ク腐臭シ不治者五種アリ口臭ク涎穢ルハ不治黒腐不脫不治齒落テ無血不治穿腮破唇ハ不治藥ヲ用テモ不效ナリ○初テ起ルニ用ル方
人中白煨テ紅シ 孩兒茶一兩 黃栢 薄荷
青黛各六分 竜腦五分 右極テ細末シ先温湯ニテ口漱淨ノ藥末ヲ爛タル処ヘ吹ヘ一日ニ六七次用ユ藥ヲ吹テ後涎外ハ流ルヲ吉トス涎毒内ニ収ルハ凶ニ内藥ノ方
芍藥 芫花 柴胡 黃連 胡黃連 牛蒡子 玄參 桔梗 山梔子 石膏 薄荷 羚羊角各五分 耳聾 升麻各三分 淡竹

桑葉十枚 水二盞入六分煎シ食後二服ス

此方穿腮破唇者ナリ凡服ノ效アリ或ハ黃連乾姜等分ニ細末シ吹入ヘ之即效アリ

小兒嘔吐 温中止吐湯凡清凉ノ物ヲ吐

ノ順ニ易出者ハ為寒此方主之

白豆蔻 白茯苓各一分 半夏五分 生薑五分

水煎シ沉香四分磨テ入熱服ス○酸物ヲ

吐ノ逆ニ難出者ハ為熱和中清熱飲主

之 黃連姜炒一分 半夏姜製一分 陳皮 藿香

砂仁各七分 白茯苓一分 水煎徐ニ服ス

同吐瀉 脾虚スルトキハ浮シ胃虚スルト

キハ吐ス脾胃不和陰陽不順清濁相干

トキハ吐瀉兼作ル 安胃醒脾湯ヲ用ユ

白朮 茯苓各一分 滑石水飛 砂仁炒各七分 木香

煨五分 姜棗入水煎シ服ス○不食ニハ枳實

山查子ヲ加○驚ヲ決ムニ天麻南星ヲ加
○風ニ防風葛根ヲ加○暑ニ香薷白扁
豆ヲ加○虚スル者ニ人參ヲ加○内熱アル
ニ黄連ヲ加○口渴ニ烏梅ヲ加○吐逆
不止ニ藿香ヲ加○浮不止ニ升麻ヲ加
○吐不止ニ砂仁二兩童便ニ拌炒一三四
次ニ末トノ丁香藿香各三加共ニ細ニ
粉ニノ毎服一匙ツ、生姜湯ニテ用ユ○吐乳
乳ヲア本香蚘蚘糞共ニ研テ末湯ニテ調
服スヘシ即安シ

小兒泄瀉

山藥半生 細末ニ砂糖水ニ

テ調服ス即愈

二痢病奇方

鷄子一個湯ニテ二三沸煮

テ殼ヲ破カテ白ヲ去テ黄ヲ取研テ生姜汁
ニ和勻ニ小兒ニ與ヘ服スヘシ茶ヲ飲テアルヘ

カラス其效如神

小兒浮痢肚疼

宿砂 川椒各五 炒テ研

生姜汁少許ニ和唾津ニテ丸ニ臍ノ肉ニ安シ
外ニ膏藥ヲ蓋ニ貼ヘシ

小兒瘧疾

小兒ノ瘧ハ大約食積一痰

飲ヲ以テ治スヘシ 栴椰子 草菓 半夏

貝母 柴胡 黄芩各等 甘草少 水煎ニ

服ス○陰瘧至晚即ニ凡月ヲ累テ不已ニ

ハ人參 白芍藥 炒 川芎 紫胡各一 甘草少

紅花各三 水煎ニ服ス即愈

小兒尿血

滑石六分 甘草一分 細末ニ甘

艸ノ煎湯ニテ服ス一方ニ升麻三分 加ヘテ

同煎ス更效アリ

小便不通者

木通 茄兒蒂 煎服ニテ

立トコロニ通ス

外腎腫大

木通 五分

甘州 三分

黃連 四分

當歸 六分

黃芩 七分

水一碗入五分二煎之

空心二服ス

遺尿

紅紙ニテ馬ヲ四匹剪コレヲ小兒ノ

穴腹下ニ安ヘシ毎夜如此ニノ自止

脫囊瘡

小兒陰囊ニ瘡ヲ生シ潰爛

テ皮脫テ欲墮ラ云也此濕熱ノ致ス

コロナリ紫菜葉ヲ細末ニ瘡濕ニハ上

ニ糝乾ハ清油ニテ調テ傳ヘシ又牆上ノ

蝸牛殼白者碾末メツクルモ效アリ

小兒卒死吐利不解何病

狗屎一丸汁

ヲ絞テ灌之濕ナキ者ハ乾者ヲ水ニ煮

テ汁ヲ取ヘシ

○又方 葱下下部ト鼻中へ納ヘシ之氣

ニ甦ナリ

小兒喉中痰壅喘甚

巴豆一粒搗爛シ

一丸トシ綿ニ包ミ男ハ左女ハ右ノ鼻中

ヲ塞クヘシ痰即墮下ル

白毛瘡

松脂研細ニシ一尺餘ノ青布

ニ表線ニテ縫蠟燭ノ形ノ如ク香油ノ

燈ノ上ニテ燒其滴ノ下レ油ヲ器ニ取テ

白毛ニ搽ツケヘシ即愈

○痘疹

痘瘡不快

絲瓜枯タル者ヲ黑燒ニシ

辰砂少許加ヘ研末ニ蜜水ニ調ヘ服ス

甚妙ナリ

癩瘡時作深

白朮

土炒一分

人參

山藥

焙蓮肉各一分

茯苓各一分

宿砂五分

藿香五分

木香三分

肉桂五分

蒼朮三分

肉豆蔻

麩包

訶子三分

右細末ニ飯湯ニ調一ニ分服ス

治痘瘡不起 荔枝殼共二ツ 橄欖核
共二ツ 搥碎キ煎服ス

○又方 紫艸茸四五分 砂鍋ニテ煎服
スレハ痘即起脹也再ヒ人參三四分ヲ加ヘ
テ更ニ炒ナリ

痘陷不起 其色黒ク氣欲絶者ニハ
穿山甲洗淨ノ黄色ニ炒末トシ紫葳
ノ煎湯ニ酒少シ加ヘ右ノ藥末五分ツ、
調服ス

倒陷色黒唇冰冷 狗蠅七ツ 狗ノ身上夏ハ
冬ハ耳ノ中ニ

カクルチスキヲ
以テ取ヘシ 焙乾シ末トシ酒ニテ服スヘシ時ヲ
移シテ即紅潤出ツ

痘疹濕爛不結痂 菜豆粉ヲ敷クヘシ

○痘ノ後頭上ヲ破カカシ結サルニハ黑豆ヲ
炒細末シ香油ニテ解ツクヘシ

痘後頭面抓破膿水淋漓 屋草年久

ニキ枯爛タル者ヲ炙乾シ末トシフリ刀ク
ヘシ痘後膿不收者ニモ可用内ニハ保元
湯ヲ服スヘシ 人參 一匁 黃芪 二匁 甘草 五分
生姜入水一椀半ヲ五六分ニ煎シ時ニ不
拘服ス

痘後餘毒 初癩紅腫ニ赤豆菜豆ヲ

如醋ニ浸シ爛シ搗テ汁ヲ取鳥ノ羽ニテ常
ニ患処ヲ刷ヘシ自消ス凡疔瘡瘡ノ後ニハ
豆腐腥魚肥肉ヲ忌ヘシ食之脾胃氣ヲ泄
シテ後ニ必ス多病ヲ生ス

痘毒出膿之後脾胃虛弱膿清不斂

人參 黃芪 白朮 各一匁 甘草 三分 姜一片
枣ニツ水ニ碗入八分ニ煎シ食ヨリ遠ク
服ス

痘瘡入目

凡痘初テ起ル時胭脂ヲ

眼ニ搭スルヘシ痘目ニ入ルコトナシ
○又痘初テ出ル時牛旁子ヲ其母カミ
クタキ見ノ顛門ニツクヘシ痘不入目障ノ
妙法ナリ

○痘瘡入目ニハ黑狗ノ耳ノエノ血ヲ取
滴眼ノ内ニ入ヘシ即除ク

○一方 蟬蛻洗淨ノ白菊花各等分ニ
研テ為散葉一度ニニム白湯ニ蜜一匙ハ
テ食ヨリ遠ク服ス一日ニ兩度用ユヘシ此方
或ハ病後ニ障翳ヲ生スル者ニモ用效

○又方 兔糞焙乾シ或ハ散葉又ハ丸ノ
モ艾布ノウハスニテ用ユ

痘後疳眼

菊花 蛤粉 兔糞 草決
明 穀精艸 西 蟬蛻 右細末ニテ

鷄肝一具

者不落水 竹刀ニテ開キ藥末一ム
ヲ入箸ニテ裏蒸熟ノ食之

折傷諸症

打身 金瘡 湯火傷 竹木刺
跌打損傷 氣絶不能言急ニ韭汁ヲ

童便ニ和テ一盞服ス

渾身打傷

小麥葉 菴蓴葉 青松毛
各一大把共ニ搗爛シ打タル上ニ攤ヘシ皮ヤ
フシタルニモ肉ニ貼其エヲ被ニ裏テ酒ヲ醉

ホトニ飲睡醒レハ即愈

○同傷處瀾大ニ血出テ不止麩ヲ上ニ

敷風ニアタルナカレ七日ニ愈或ハ麩ヲ

姜汁ニ和傷處ニ貼ヘシ亦能止血疼ヲ去

○跌打遍身腫疼拘頭骨ヲ灰ニ燒陳

香糟ト同ク和疼處ニ貼ヘシ

○同青腫ニ豆腐ヲ指ノ厚ニ切片鍋ニテ

炙熱し腫れ知ニ貼冷レハ又易ヘシ面ヲ折膏
腫ニモ数次貼レハ舊ノ如クニナル

打頭腦破骨折 葱白ヲ蜜ニ和搗勻ヘ
厚ク付ヘシ立トコロニ效アリ

肩破骨折 葱白ヲ蜜ニ和搗勻テ厚ク
付再ニ蟹ヲ瓦上ニテ灰ニ焼研末シ酒ニ
テ服シ醉テ睡ル其骨自合ロテ愈アリ

○又方 白茯苓炒テ末トメ毎服一匁熱
酒ニテ調服シ破ヲ蓋汗ヲ出セハ愈

從高墮下瘀血沖心欲死 倉卒ニ無忌樂
口ヲ開テ熱小便ヲ灌クヘシ

○同瘀血積痛難忍 當歸尾 五匁 大黃
酒煮 桃仁 去皮尖 酒ニテ煎シ鷄鳴ノ時服メ
至曉瘀血ヲ下シテ即愈

隊車路馬筋骨痛不止 延胡索末ヲニ匁

好酒ニテ服スルノ日ニ二次即愈

金瘡 急ニ已カ小便ヲ淋ニ淋ヘシ口渴凡
水ヲ飲ヘカラス但肥膩タル物ヲ食シテ渴
シ止ヘシ若薄粥ヲ食スレハ血沸出テ必ス
死ス慎テ勿犯之傳藥ニハ花葉石ヲ研末
シ敷或ハ荔枝核ヲ細末シ敷ヘシ或ハ竜眼
肉核殼凡ニ燒テ細末シ敷ヘシ皆效アリ

○若血出ル多ク寒熱シ口渴ハ補中益
氣湯ニ麥門冬五味子ヲ加ヘテ毒寒入
水煎シ空心ニ服スヘシ

金瘡磕損折傷 血出テ疼痛不止葱白
砂糖等分ニ研和テ傳ヘシ痛立トコロニ
止リ更ニ無忌樂

○生半夏研テ細末シ血ヲ帶テ上ニシクヘ
シ立処ニ終ヲ止且結痂ノ口ヲ収メ生肌

○止血方 石灰凡化 大黃切片 鍋内ニテ
共ニ炒桃花色ニ成テ取テ研末細ニ篩
收藏置テ金瘡折傷ニ敷ヘシ即時止血
妙ナリ

箭鏃傷

ツカラ凝テ愈

○毒箭ニ遇タルハ總ニ皮肉ヲ傷トイヘ
便膿沸爛テ死ス急ニ人尿汁ヲ飲又傷
ノ処ニ塗ヘシ救命為急臭穢ヲ嫌ナカ

杖傷

杖ニ打レテ後童便一碗ヲ飲ヘシ
血攻心イヲ免ル熱豆腐ヲ打レタルトコロニ
鋪テ其氣蒸カ如クニシ其豆腐紫色色ニ
ナル時ニ取易々スヘシ紫色散シテ淡紅色
ニナルトキ止ルナリ

○ソコク打レテ晝夜無眠種々ノ症出

木耳四兩砂鍋ニテ炒焦存性細末シ一度
ニ五錢ツ好酒ニテ服メ後少時坐スヘシ藥
力杖瘡ノ上ニ至レハ肉裏ヨリ外ニ透リ針
ニテ刺如ク瘡ニ甚シク不時血水流ル也
上ニ膏ヲ貼レハ次日自消ス

○杖瘡腫痛ニ雄黃二分 蜜陀僧一分 研

テ細ニシ水ニ調テ敷ヘシ極テ妙也

○又大黃末ヲ醋ニ調テ敷ク或ハ童便ニ
調テ敷ヘシ

○又方杖ニ打レテ後毎日白芨末ヲ米飲
ニテ下スヘシ神效アリ如潰爛ニハ乳香ヲ
香油ニ煎シ瘡ノ口ニ塗ヘシ

湯火傷

冷水ニ浸スヘカラス而特痛ス
トイヘ後ニ必ス爛テ膏ニ至リ難愈先
玄妙飲ヲ服スヘシ 天花粉 玄參各二

陳皮 桔梗 山梔子 各一匁 淡竹葉 二片
水煎服ス如急ニ藥ヲ求メカタキ時ハ蘿
蔔絞汁ニ碗ヲ服ス或ハ童便ヲ服シ其
心ヲ護_ヘ火毒内ヲ攻_ルル_ルアタハサ_ラシム外ニ
ハ大黃末ヲ桐油ニ調_ヘ付_ヘシ即_チ危者モ
此方ヲ用_レハ皆_テ愈_ス恙

湯火傷皮紅未破爛者 大寒ノ葉ヲ
付_ルル_ルヲ忌_ム酒ヲ以テ洗_ヒ其熱ヲ殺_トキ
ハ毒外ニ出_テ不_レ爛_ル

同爛去_リ肌肉或見_ル骨者 百竹霜 三匁 輕

粉 一匁五 共ニ末トシ香油ニ調_テ塗_ヘシ

○又金箔ヲ貼_テ其上ニ桐油ヲ塗_ヘシ
金箔ハムラナク
厚ク貼_ヘシ

○又方青黛ヲ敷_ヘシ或ハ白芨末ヲ香油
ニテ付_ルル_ル或ハ天蘿皮晒_キ乾_シ細末ト香油

ニテ敷_ク或ハ地榆滑石 各一匁 研細末ニ敷_ヘ
之皆能_ク止_ム痛_ヲ無_レ痕_ト

湯火傷毒入_リ裏 或ハ冷水ニ浸_シ火毒

内ヲ攻_メ煩燥之内熱口乾大便秘結ス

ルニ連翹 赤芍藥 羌活 防風 當歸

山梔子 甘州 各一匁 大黃 炒ニ 水ニ碗燈心

二十根入_シ八分ニ煎_シ食_{ヨリ}遠_ク服_ス

候被_レ鳥銳所傷 蜂蜜八兩煎_シ燒酒

上_ニ入_シ量_ニ隨_テ熱服_シ汗ヲ取_テ安卧

ス次日鐵子自_ラ被_レ上_ニ粘_ス

火藥沖_キ眼_ヲ 即_チ地ニ卧_シテ人ノ熱_キ小

便_ヲ眼_ニ澆_ヒハ痛_即止_ル徐_ニ已_カ小便_ニ

テ常_ニ洗_ハ明_ニナルナリ

○火藥ニテ傷_ル爛_ニ蜂_ノ殼 鹽_ヲ羅_中者
殼_ヲ研 茶ノ

葉ト同_ク搗_キ爛_ニ搽_ヘシ

人口咬傷

生粟ヲ搗テ付ヘシ毎日二次

換痛ヲ止紅ヲ消ス

抓破面皮

輕粉ヲ生姜汁ニテ調付

ヘシ無痕愈

竹木刺入肉不出

鹿角ヲ燒末トノ水

ニ調付ヘシ立処ニ出

久者モ一タラ
不逼出

○又方 粟子生ニテ嚼敷ヘシ即出

○又象牙刮テ水ニ調敷ヘシ

○破傷風

破傷風

皮肉損傷後外風邪ヲ受

龍テ経絡ニ入漸傳テ裏ニ入其患寒

熱文作口噤咬牙之角弓口ニ沫ヲ吐ク

陰ニ入トキハ身涼ク自汗之傷処及テ平

ニ陷如故者其毒即内ニ收ルナリ萬灵

丹ヲ用テ汗ヲ桑之風邪ヲ外へ出サシメ

次ニ玉真散ヲ用テ貼之膿ヲ出シテ為

效如汗ノ後前症不退傷処不高漸醒

漸昏時ニ桑之時ニ止口噤不用語多

不出者ハ終ニ死ス

○萬靈丹 蒼朮 八両 全蝎 石斛

天麻 當歸 甘竹 炙 川芎 荆芥

細辛 防風 麻 川烏頭 湯炮 草烏

頭 湯炮去 何首烏 兩 雄黃 一 細末

煉蜜ニテ丸之或ハ一兩 一 丸トシ或

ハ一兩ヲ分 一 丸トシ或ハ一兩 一 丸トシ

九九トス右三等 一 コシラユルハ 一 ノ老

ト壯ト又病ノ後 一 急ナリ 一 磁罐ニ收貯

ナリ辰砂ヲ之 一 磁罐ニ收貯 一 ル

時ハ葱白鬚トモニ九莖煎湯ニシ茶

碗ニ一ツニテ右ノ丸藥一粒ノコニ含化シ

熱服之被^フ蓋^フ汗^ヲ出^メ愈^ハ後^汗
出^ル遲^ハ再^ニ葱^湯
ス淋^カ如^シ小^頃ニ^メ被^フ去^ハ干^自欬^ル

此方凡^レ一切^ノ腫^毒風^氣癰^潰最^スヘキ者^ハ百^可保^ニ病^ニ
表^症相^兼ル^レ者^ハ發^散之^ガル^者ニ^テ服^シ後^ニ
風^ヲ稀^粥ヲ^食ス^{ベシ}冷^{タル}物^ニ
忌^ム此^茶子^婦ハ^服ス^ルヲ^カ

○玉真散 南星 防風 白芷 天麻

羌活 白附子 各等分 研細末之傷處敷之

此藥打傷欲死心頭微温ナル者ニ熱酒重便ニテニ及^ロニ
下^レニ服^ラ可^回生^如破^傷凡^ニテ^牙ヲ^クツ^メ腫^皆及^張
基^キト^キハ^咳ヲ^止ス^ルニ^右ノ^散ヲ^二三^服ス^{ヘシ}
内^ニ癰^血アリ^トイ^ハ亦^愈若^クニ^ハ多^クニ^ハ服^ス
ス^キ出^シ且^水ニ^テ洗^淨此^藥ヲ^咬タル^トコ^ロス^リス^ルニ^愈アリ

○一方 蕪木末ヲ酒ニニ及^テ服^スヘシ又蓮
房^灰ニ^燒研^細ニ^テ專^之再^ヒ泥^ニテ^服ス
皆^效アリ

○又方 蟬蛻四兩灰ニ燒存性魚灰酒
ニテ服^シ蓋^被出^汗愈

○中毒 并虫獸傷

解諸毒 腹中不快覺ハ生^豆ヲ^合嚼

テ腥^氣ナ^キハ^此中^毒ナ^リ急^ニ升^麻一^味
濃^煎之^連飲^手ニ^テ喉^ヲ探^リ吐^逆ス^レ
ハ即^愈

服藥過多生出毒病 頭腫如斗唇裂

流血或ハ心中飽悶之或ハ脐腹痛者ニハ
黑豆 小者 菜豆 各五合 煮^テ濃^汁ヲ^服之^其
豆^ヲ食^スヘシ即^愈

○百藥ノ毒ヲ解^ニハ^甘州^煎湯^ヲ飲^{ヘシ}
解附子川烏頭斑猫等毒 黑小豆ヲ煮

タル汁ヲ飲^{ヘシ}

解砒霜毒 凡^レ此^毒ニ^中ル^者ハ^煩燥^如
狂^心腹^痛頭^眩吐^セント^ノ吐^セス^面色^青
黑^{四肢}逆^冷之^命在^須臾^急ニ^甘州^湯ヲ

飲へし或ハ菘豆湯或ハ冷水数碗ヲ飲へ
し或ハ夏枯州ヲ濃煎之飲或ハ鷄子ヲ
五六枚碎和勻テ灌下ス總テ吐逆ノ毒
ヲ解シツルヲ度トス醒テ後不言者ハ
毎日菘豆水ヲ飲へし毒盡テ自愈

解巴豆毒

芭蕉根葉ヲ搗汁ヲ取テ

飲之或ハ黃連一ふ煎服ス或ハ冷水ヲ
ノムヘシ

鹽酒毒

豆腐漿ヲ口ニ灌下ス如無之

時ハ黃豆ヲ水ニ浸シ浸シ搗爛ノ灌下ス

酒毒至死

黑大豆二升煎之汁ヲ飲ハ

愈○燒酒ノ毒ニハ鍋蓋ノ上氣水ヲ半盞
灌クヘシ即醒

野菌毒

滑石 六分 甘草 一分 研末之毎

服ニム水調ヘ服ス效アリ

解菓毒

麝香一分煎湯ニノ服ス

河豚魚毒

香油一碗灌之吐出ノ愈或ハ

蘆根ヲ煎服ス

解蟹毒

藕根ヲ搗汁ヲ服ス或ハ冬瓜ノ

汁或ハ紫蘇汁ヲ服ノ解ス

諸骨哽喉

白飴ヲ寒ノ大サニシ

飲へし之処ニ下ル或ハ鹿角ヲ剉ミ津ニ含ミ
燻之如七日ヲ經テ不出ニハ鯉魚鱗皮ヲ

燒テ水ニテ服スヘシ

○悞テ吞鉄物栗ヲ燒炭ニシ紅ヲ其ニ

ニ研テ粉ニシ砂糖ニ調ヘテ二三回服スヘシ

之トコロニ愈

稻芒入喉

白飴糖ヲ食スヘシ效ナリ

○麥芒入目大麥ヲ煮タル汁ヲ以テ目
ヲ洗ヘシ即出

狗咬

百州霜

山野人家者之用
むしり百州ヲ燈整

香油二調

へし或ハ杏仁ヲ嚼テツクへし或ハ牛糞蚯蚓屎
ヲ敷へし皆能救急

馬咬及踏傷

傷處ニ灸テ人糞馬糞氣

糞此内何ニテモ一味ヲ燒細末シ猪脂ニ和
テ敷へし内ニハ糞木湯ヲ一碗服シテ即
止痛

蛇咬

針ニテ傷處ヲ刺血ヲ出シ雄黃

五々五五並脂一兩共ニ為末毎服ニ々好
酒ニテ服シ傷處ニモ敷之瘡口ヲ留出
スへし燥ハ油ヲ塗兩頭ヲ縛毒氣ヲ内
ニ攻入一ヲ防クへし

蜈蚣咬

只菜葉搗爛シ付へし或ハ

頭垢ヲ搔テ掩之

蜂螫

小便ニテ洗拭乾シ香油ヲ塗へ

し或ハ温湯ニ漬シ敷易常ニ煖カキテ
シム皆效アリ

○諸瘡毒

鐵箍散

一切腫毒初テ起ルニ圍之即散

已ニ成ニ圍之毒氣攻走ルニ不_レ至無膿圍

之有膿イニ夕潰アルニ圍之即潰已ニ潰ルニ

圍之膿ヲ追出ス 荷葉ハスル
九月九日ニ取
陰乾ニスル 薑黃

白欬 五倍子 白芨各五
二兩 大黃二兩
五 蠟殼五
個

陳小粉炒
二兩 右細末シ醋ヲ濕メカク多調テ

腫物ヲ圍貼ル

○又方 貝母 南星各七
分 連翹 五倍子

荷葉連翹者
各一兩 共ニ末シ水ニ調テ腫處ニ敷

中ニ孔ヲ留テ毒氣ヲ出ス效アリ

治癰疽方

一切癰疽諸毒膿已ニ成テ

不_レ穿破者ニ黃芪四々 穿山甲研末
一々 川

芎三々 崑崙飯二々 皂角刺一々
五分 水ニ碗入一

碗二煎之隨病前後服入酒一杯入之服入
ハ毒即出

疥瘡

煩燥之作渴惡毒攻心ニハ 清

二兩田者ニハ 雄黃 五々 麝香 許 蒼耳

燒二灰 右細末之ニ五ツク蜜水ニテ調下ス心ヲ

護ルヘシ

○疥瘡ニ針ヲ刺テ後餘毒走散シ腫ヲ

ナスニハ 鬱金 蟬ノ肝 如キ者 白芨 白藜 大黃

白芷 各四兩 黃柏 二兩 輕粉 五々 菴豆粉 一兩

共ニ末トシ醋ニ調テ腫ノ四邊ヲ圍ヘシ夏

月熟甚時ハ蜜水ニ調テ貼ル

嘴唇上疥瘡 西ノ腿腕ノ中紫黑筋ア

ルヲ針ニテ刺惡血ヲ出セハ之処ニ消ス

疥瘡初起 白芷 一々 生姜 一兩 共ニ搗テ

温酒一盞ニテ服之汗ヲ取テ即散ス

○疥腫欲死菊花一握汁ヲ搗テ之升入

口即活冬ハ根ヲ采テ用ユ神驗ノ方也

火珠瘡 其瘡珠ノ如ク始ハ髮ノ中ニ發

シ相染テ不已亦命ヲ傷者アリ生薑薑

ヲ搗爛シ滴ヲ取テ醋ニ浸シ患處ニ貼

ヘシ即愈

金絲瘡

形線ノ如ク大小不一上下心一

至レハ即死ス治法ハ瘡ノ頭ヲ截任針ヲ

刺テ血ヲ出シ浮萍ヲ嚼テ塗ヘシ即愈

疥瘡 今俗ニ云ヒセン 大風子油 五々 水銀

樟腦 油核桃 輕粉 各一 川椒 五分 共ニ

研テ搗ヌルヘシ自愈

○又方 鷄子五六煮テ黃ヲ取炒テ油

ヲ出シ此油ニテ搗椰子一ツ硫黃少 研

末シタルヲ調ヘ毎日三四次擦ヌルヘシ十日

ヲ不_レ過_レコ_レテ愈

○又方 松香_{一兩} 雄黄_{一兩} 共ニ細末シ紙ニ

捲テ條子トシ菜油ニ一夜浸シ取出シ倒ニ

ノ燧之滴下油ヲ瘡ニ塗ヘ之即愈

臙瘡 俗ニ云ハバ 杏仁_{皮去テ紙ニ包テ} 輕粉_五

共ニ和勻猪脂ニテ子リ先黄柏ヲ水ニ浸シテ

瘡ヲ洗ヒ拭乾ノ此藥ヲ敷箱ニ包ヘ之數日

ニノ自愈

癬瘡 俗ニ云タムコト也 癬ハセニガサ 班猫ヲ糯米

ト同ク炒末ヲ去テ班猫ヲ研末シ煉蜜ニテ

解テ付ヘシ黄水出ルヲ拭去ニ四次ニノ愈

○又方 頭上身上ニ風癬出テ癢ク抓破

テ疼ヲ作時ニ愈時ニ痊ニハ 巴豆_殼 ニム

明礬_分 研末シ生薑ヲ切片藥ヲツケテ

痒トキ上ニ擦ツケヘニ三次ニノ愈

○又方 芦薈_{一兩} 甘州_{多五} 研末シ先湯

ニテ瘡ヲ洗ヒ拭乾ノ此藥ヲ付ヘシ

楊梅瘡 牛黄_{如上身ニ在ニ五分} 丁香_{二分}

天竺黄_{三分} 羚羊角_{一兩} 木蓮蓬_{十個} 黄麻

花_{一兩} 葛麻花_{二兩} 生地黃_兩 皂角刺_{二兩}

奇良_{四兩} 以上細末シ煉蜜ニテ桐子大ニ丸シ

毎月清晨ニ白湯ニテ四五十九服ス

○同誤テ輕粉ヲ服シ遍身疼痛及爛

破者ニ土茯苓_{三斤} 煨_{三斤} 乳香 沒藥

各_{六分} 但油_{ヲ去テ} 川椒_{一兩} 牛黄_{一兩} 白蜜

一介十兩藥ヲ和勻_梅 一十餘下ニノ麻油ヲ

手ニ擦テ丸トス大彈子ノ如シ毎日清晨ニ

四粒服シ晚ニ三粒服ス土茯苓_{三斤} 煨_{三斤} 煎シ

タル湯ニテ用ニ藥一劑ヲ用盡セハ立トコロ

ニ愈ニ永ク再至セス凡_諸腫物ヲ食スルヲ

止へし

下疳瘡

洗藥方 荆芥 黃柏 馬鞭

艸 其艸 葱 右煎湯ニテ洗之 訶子ヲ

灰ニ燒テ麝香少シ入洗タル跡ニ糝アキラカへし

便毒

大黃 二兩 五靈脂 四錢 穿山甲 各四

白芷 四錢 乳香 沒藥 各五分 共ニ為末毎服

六分空心ニ好酒ニテ送下ス

陰頭生瘡

白蜜ニテ其艸ノ末ヲ調塗へし

并ニ諸惡瘡不愈治ス
又白蜜ハカリヲ用ハモ救アリ

疥肉

瘡癬諸毒新ニ愈努メ肉脹出ル

ニ烏梅肉搗爛シ蜜少入紙ニ攤貼之惡

肉即収リテ永無後患

熱瘡

菊花根搗テ汁ヲ取魚吹酒

テ調へ服ス上身ニアルニハ空心 服ス下身

凡ニ食後ニ服ス自消ス

諸瘡不収口

白槿花黑燒ニメフリカケへし

瘡ノ口碗ノ大サノ如キモノモ神效アリ

瘰癧

并 馬刀瘡已ニ潰ルニモ未潰ニモ或

ハ日久シク不愈者ニ夏枯艸六兩水ニ碗入

七分ニ煎シ食ヨリ遠ク服ス虚甚シキ者

ハ濃煎シ膏ノ如クニテ服シ腫処ニモ塗之

へシ多ク服ノ益善兼テ十全大補湯ニ

香附子貝母遠志ヲ加ヘテ煎服シ效アリ

○同傳藥 白玉簪花ノ葉ノ嫩ヲ取テ醋

ニ一夜浸シ飯鍋ノ上ニテ蒸爛シスリテ膏

藥ノ如クニ患処ニ貼へし即愈

手指天蛇毒

白粉 陳者 雄黃末 一匁

搗爛シテ貼へし

○又方 蜈蚣一條 雄黃 三錢 研末ノ鷄屎

清ニテ調へ患処ニ付へし即愈按此方俗ニ

云指ベウソニ用テ救アリ

黒子流目 續隨子熟スル時塗之自落

肺癰 口ニ臭キ膿ヲ吐ハ即肺碎テ難

治者服之神效アリ 第一四劑服スル方

薏苡仁 絲瓜 大甘竹 牡丹皮 赤芍

藥 貝母 桔梗 瓜蒌仁 陳皮 升麻

生姜一片束 三個 水二碗入八分二煎之食

後ニ温服ス如大便不通加麻仁始メニ此

方ヲ四劑服シテ後次ノ方ヲ用ユ 第二

服スル方 赤芍藥 天花粉 甘竹 瓜

蒌仁 桔梗 知母 貝母 百合 獨活

杏仁 連麩 各等 水二碗燈心十根 白果

去殼七 八八分二煎之食後ニ温服入此方ヲ

四劑服シテ後次ノ方ヲ用ユ 第三服ス

ル方 貝母 獨活 百合 甘竹 桔梗 麥

門冬 赤芍藥 知母 天花粉 瓜蒌仁

各等 燈心十根 白果 去殼七 水二碗入八分煎

之食後ニ温服ス此方四劑用テ即愈ス

後白養紅薤菹薑鴨蛋身ヲ終ルニテ食

ハカラス若食之再発ノ不治

○又方 白花百合洗淨搥テ汁ヲ取毎

日一碗時ニ不拘服ス七日ニシテ愈

肺痿 肺癰ハ寒風寒ニ感シ受ルニ因

テイニ夕發シ起ルヲ經ス肺中ニ停リ示

七情饑飽勞役ニ因テ脾肺ヲ損ノ生ス

ル者アリ其証初ハ毛聳テ惡風咳嗽声

重ク胸痛頂強轉スルノ不能其候ナリ

久之キトキハ飲食減少之嗽痰傷ニ至

リ痰血ヲ吐寒熱往來ニ膿ヲ咯声不出

咽痛其候轉ノ肺痿トナル如此者八百死

一生ノ病也 大ナル瓜蒌一個 孔ヲ彫内ノ子ノ殺ホト杏仁去皮ヲ入孔ヲ封シ黄泥ニテ包ミ煨テ烟ノ止時ニ取出シ冷シ去テ又杏仁ノ殺ホト貝母ヲ加ヘ共ニ研テ細末シ蜜ニテ調ヘ卧時ニ吞ツク燈心湯ニテ服ス

腸癰 小腹堅ク掌ノ如ク熱シ按之痛肉色ハ故ノトシ或ハ焮赤ク微腫モアリ小便頻ニシゲク汗出憎寒脈緊實ニノ有力服此神效アリ 大黃炒 朴硝各牡丹皮 白芥子 桃仁去皮尖 水ニ碗入八分ニ煎シ食前或ハ空心ニ濕服ス

○又方 明礬四兩 肥皂十五個 雄黃二兩 大黃酒拌蒸 共ニ為末空心ニ金銀花各酒ニテ煎シ此酒ニテ三々ツク服ス有膿大便ヨリ出無膿即消シテ不泄

○其脈洪教者ハ有膿可下其脈懸二緊ナル者ハイ一夕膿アラス不可下

肚内無名腫毒 鼈甲ヲ煨テ真性為末酒ニテ服ス二

○餘方補遺

早起辟穢方 凡人蚤起ハタチ下或ハ冷煖不時或ハ油膩ヲ食シ或ハ穢チカニ氣ヲ聞チ多ク嘔吐シ腹痛浮油等ノ症アリ用此方ニシ 蒼朮本藥水浸ス一宿 白朮壁土併 陳皮 厚朴姜炒各 草叶 白芷蘇 丹參各 右細末シ蜜ニテ龜眼肉ノ大サニ丸シ口ニ嚙化服ス或ハ淡薑湯ニテ服ス二感冒風邪寒暑瘧疾並ニ皆治之

許真君七寶如意仙丹 服之百疾悉瘳

川烏頭泡去皮尖 黃連去芦 人參去芦 茯苓

去乾姜煨又三 桔梗去芦 肉桂去粗皮 石菖蒲日三晒
 蒲洗淨 厚朴去皮 吳茱萸去核 紫胡去核
 紫苑洗淨 川椒去子炒 皂角去皮 當歸洗淨
 酒二 本香去皮 大附子一個童便泡 巴豆去殼紙包壓
 以上十八味各一兩外二枚桐子一兩加土地 選清淨二 五月五日午時或八每月七日庚申
 甲子福主日天德日等ノ吉日ヲ選擇シ雞
 犬ノ色ヲ不聞處ヲ丹ヲ煉室トス人事ヲ屏
 除キ先許真君ノ神位ヲ奉安置供物ヲ
 具ヘ拜シテ合藥救入ノ旨ヲ陳テ 如法
 炮製表 共ニ極細末トシ柁ノ中ニ入柁ノ
 三千ハカリニ煉蜜或ハ麩糊ニテ梧桐子
 大サニ丸ニ 上好ノ辰砂ヲ衣トシ際ノ收貯ヘ
 病人ニ遇ハ症ニ隨テ五更ノ時服スニ 立
 効ニ效アリ葷腥物生冷ノ物ヲ一日忌

へし用藥法○瘟疫熱病二 三九 井水三 角工
 ○傷寒傷風二 三九 薄荷湯二 下ス○陰症
 傷寒二 九生薑湯二 下ス○鬼祟邪氣二 八
 七○嵐瘴不服水上傳尸癘症五疳疔二 仲
 二八三 ○顛狂二 九五 ○已上俱二 寒ノ煎湯二 下
 下ス○大淋風成塊遍身麻木面虫ノ行カ
 如ク或ハ口眼歪斜眉脫肉爛左癱右瘓
 偏正頭風二 七九 ○鶴膝風紫白ノ癩風
 痰風癰二 三九 俱二 荆芥二 煎ニ タル酒ニ 下
 下ス○誤テ毒藥ヲ吞タル二 九 ○消渴池
 浮二 九 ○痢疾大小便閉二 七 ○酒毒二 三九
 ○喉閉二 七九 ○腮腫丹瘤癰疽疔瘰癧
 二八五 已上俱二 温酒二 下ス○赤痢二 二八
 黃連煎湯二 下ス○白痢二 甘草煎湯
 下ス○食積心腹膨脹心氣疼痛二 七九

○喘息咳嗽二三九 俱二三九 生薑湯二三九 下ス
 ○及胃吐食二三九 葶藶湯二三九 下ス
 ○腸中氣塊二三九 煨シタル 生薑湯二三九 下ス
 ○腹中成塊痛不止二三九 皂角煎酒二三九 下ス
 ○疝積二三九 莪朮生薑煎湯二三九 下ス
 ○腰背骨痛二三九 鹽湯二三九 下ス
 ○十種水氣二三九 茯苓湯二三九 下ス
 ○黃疸二三九 茵陳湯二三九 下ス
 ○虫毒二三九 甘草湯二三九 下ス
 ○瘧疾二三九 桃枝湯二三九 下ス
 ○五淋二三九 燈心煎湯二三九 下ス
 ○虫積二三九 史君子湯二三九 下ス
 ○腸風臟毒下血二三九 陳米湯二三九 下ス
 ○疝氣腫痛二三九 藜蘆子ヲ 研或ハ 茴香湯二三九 下ス
 ○諸痔二三九 淡豨薟湯二三九 下ス
 ○婦人血崩二三九 百種酒二三九 下ス
 ○血暈頭痛二三九 生薑湯二三九 下ス

下ス
 ○血勞咳嗽二三九 荊芥湯二三九 下ス
 ○血氣刺痛二三九 牛膝湯二三九 下ス
 ○月水不調二三九 子宮冷乃 孕ヲ ナク孕 テ或 突症二三九 艾醋湯二三九 下ス
 ○赤白帶下二三九 絲綿二三九 下ス
 ○產後腹痛下血二三九 阿膠酒二三九 下ス
 ○死胎二三九 苧麻二三九 煎ニタル 酒二三九 下ス
 ○鬼胎二三九 紙二三九 鍾二三九 下ス
 ○小兒急慢驚風二三九 金銀花二三九 薄荷二三九 煎湯二三九 下ス
 ○氣痛二三九 生薑湯二三九 下ス
 ○疳蟲二三九 史君子湯二三九 下ス
 ○睡涎咬牙二三九 俱二三九 淡鹽湯二三九 下ス
 ○此藥二三九 備二三九 湯二三九 急二三九 用二三九 カ二三九 下ス
 ○何二三九 白湯二三九 送二三九 下ス
 ○婦人忌服二三九 幼孩二三九 此藥二三九 服二三九 ス二三九 不能二三九 者二三九 又二三九 常二三九 ノ二三九 人二三九 毛

病家へ出入スル者ハ絳紗囊ニ三粒入テ身
ニ佩ヘシ最ヨク邪氣ヲ除ク高人仕官ノ
人旅ニ行ニ携之ヘシ亦人ヲ濟ニ便アリ○
凡此藥一劑ヲ合シ千人ヲ濟總テ奇戒
沐浴シ慎テ修製スルハ沈疴奇恙トイ
ヘ凡起死回生ノ功アリ予因テ為好善
樂施者勸焉

七情交感丹 一切公私佛情名利二失
志抑鬱煩惱七情二傷ラレ飲食不
進面黃形羸胸痞悶疼痛スル等ノ
症ヲ治ス 香附子 一升長流水ニ浸ス
神 各細末シ煉蜜ニテ彈子ノ大サニ丸
ニ清晨ニ一丸細ニ嚼白湯ニテ下ス或ハ
陳皮湯モ可也

脱類 俗ニ云フトカイノカチ
此症腎肺ノ虚損之神

ノ不足ヨリ起ル或ハ高ク矣談倦ヲ忘シ
元氣接續スルヲ不能シテ此患ヲ致ス也
先身ヲ平カニ正ク坐シ人ノ両ノ手ニテ
下頰ヲ托住メ腦後ヨリ穴竅ヲ送リ上テ
絹一條ニテ頰ヲ頂ヘ上ヘ包括リ風ヲ避
テ急ニ煎藥ヲ服スヘシ不然風邪ヲ外
ニ受テ必ス痰涎壅盛シ口眼歪斜ニテ
風臟腑ニ中十二無一生治方

附子 炮皮臍ヲ 白姜 蚕 當歸 各二
半夏 白朮 茯苓 各一 天麻 陳皮 各一
甘草 三分 川芎 八分 燈心 根 四十
木癩成瘡 南方多雨地ニ有物木癩

ト云大概臭湯ニ似タリ陰氣積テ古
木ノ上ニ生ス人氣ヲ聞ハ閃々トノ動々人
其下ヲ過レハ其體ノ間ニ墮テ即成瘡久

こて其肌ニ遍ク癩ス辰砂麝香ヲ塗ヘ
し即愈

烏鬚里髮方

茄樹ニ茄子ヲ一ツ留孔ヲ

一ツ用上々ノ京墨ヲ内ニ入紙ニテ塞封シテ
樹ノ上ニ留茄ノ老タル時取テ黒燒ニシ水
ニテ調ヘ指ニ蘸ノ鬚髮ニ搽塗ヘし即黒
クナリ是ヲ糊絲溜樹方ト云ナリ

雀子斑

皂角 三索 蜜陀僧 各二 白

丁香

直三立 連翹 各三 白附子 白芷 白薑 各四

右細末シ先皂角ヲ以テ面ノ垢ヲ洗イ
去生蜜少許ニテ藥末ヲ調ヘ面ニ塗一夜
過シ早辰ニ洗去ヘシ

玉肌散

一切風濕雀斑白屑皮膚作痒

モノヲ治ス 苧菜豆 五合 滑石 白芷 白附子

各二 共ニ細末シ一度ニ三匙ホト湯ニテ調

早晚面洗テ塗ヘシ

呂祖一枝梅

男女大人小兒新久ノ諸病

生死定カタキ時此藥ヲ豆ノ大ホト印堂
ノ中ニ貼印堂ノ額ノ中ヲ云線香一本ヲ炷間置テ

藥ヲ去後一時許ニ藥ヲ貼タル處紅斑
色ニ暈ヲナシテ腫起リ散スコレヲ紅霞

棒日ト謂其病危シトイヘ凡不死如藥ヲ
貼處一時ノ後紅色ナク腫起ス皮肉常

ノ如キノ不變者ハ白雲漫野ト謂其病
輕シトイヘ凡必ス死ス小兒急慢驚風一

切老少ノ痢病ニ貼之紅腫者ハ即愈
此方預生死ヲ知スト云一ナシ

辰砂 三々 銀珠 一々五分光明 五靈脂 三々

麝香 三分 革麻子 五分 雄黃 巴豆 各五分

各研細ニノ端午ノ午ノ時靜ナル室ノ中ニテ

共二能研油燕脂ヲ加ヘ膏トナシ磁盒ニ
入收置女人ノ手ニ觸ルナカレ用ル時豆ノ
大一圓印堂ノ中ニ貼其功立効ニアラハ
ル用テ後其貼タレ藥ヲ河ノ中ニ流シ
送ルヘシ

此書明正夢蘭先生輯選而病論詳治法
附以經驗神妙劑至難治病症發返視
之術揭速効之方濟世之要輒未有如此
之深切者因請國手藤井先生以諺文和
解速黃楊登實與王氏外臺葛氏射後鼎
峙之祕錄神方也杏林橘井苟資此書以
治療施起死回生之功可隨手而得焉享

錦囊妙藥祕錄跋

夫祕者止取其驗之復
何取乎祕而世人始因
祕求驗繼因驗及祕之
醒菴蕙子又有茲編也
即出而公世者最不祕
焉。嘗自述是言余細閱
之見其探治疾之源裁
試驗之方可謂濟生之
功大矣。僭乎本邦不
遍行於此是余忘編陋
而解之綴以和語遂為
自濟規格耳。題是書者

如何。試驗切要祕方是也

京師書林

花屋町油小路東

永田調兵衛

共三十五
七十四

