





新增家傳預藥集卷之六目錄

○散之類

一正古散

三安神散

五征虫散

七生神散

九又快氣散

一十寧嗽散

三十黑神散

五十新又方

七十神仙散

二清心散

四香薷散

六益中散

八快氣散

十點頭散

二十三棱散

四十又方

六十新又方

八十又方

○新增

九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十
當歸散	立効散	養元散	禹功散	香桂散	川芎散	香穀散	潛行散	絳雪散	石薑散	丁香散	沒藥散
二	二	四	六	八	十三	二	四	六	八	二	二
救苦散	神香參香散	立安散	神消散	川芎散	紫金散	加味五苓散	椿皮散	琥珀散	又方	南星散	清魂散

九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十
丁香散	沒藥散	三聖散	琥珀散	調經散	倒換散	通頂散	三五七散	行軍散	回陽散	漿水散	五味子散
九	一	三	五	七	九	一	三	五	七	九	十六
南星散	清魂散	四物一黃散	七珍散	二妙散	稀涎散	通關散	化風如聖散	甘露散	錢半散	五味子散	五味子散

一十六	實腸散	三	百中散	五	三香散	七	人參散	九	鬱金散	一	石蓮散	三	海金沙散	五	三味亭藤散	七	縮砂散	九	參冬散	一	牡蛎散
二	益元散 油墜散	四	安脾散	六	古橘耳散	八	參花散	十	七傷通氣散	二	人中白散	四	又方	六	顛倒散	八	斷紅散	十	白木散	二	三味玄胡散

三	古飯木散	五	愈痛散	七	速効散	九	抑氣散	一	洗肝散	三	千金還少散	五	八仙散	七	又方	九	倉卒如神散	一	七聖散	三	沒藥散
四	香附散	六	鉄刷散	八	二仙散	十	羌活石羔散	二	菊花散	四	聰明散	六	茶調散 菊花茶調散	八	神効散	百	四聖散	二	推氣散	四	蔓菁子散

五百	槐花散	七百	髮灰散	九百	楠損當散	二百	無極散	三百	大黃散	五百	玉仙散	七百	蓮砂散	九百	白薇散	三百	神應散	五百	奇効散	七百	八珍散
六百	川芎三黃散	八百	當歸散	十百	乳香定痛散	二百	尾松散	三百	五倍子散	五百	四仙散	七百	瘦胎散	九百	催生散	三百	失笑散	五百	大調經散	七百	孤鳳散

七百	烏金散	九百	三母散	一百	乳頭散	三百	犀角散	五百	宜風散	七百	碧玉散	九百	麝香散	二百	參苓白朮散	三百	無價散	五百	人齒散	七百	千金內托散
八百	桑螵蛸散	三百	湧泉散	五百	乳香散	七百	千金散	九百	牛黃化癰散	二百	漏黃散	三百	天靈散	五百	牛黃奪命散	七百	周天散	九百	神仙排膿散	二百	二活散

百一散

仙散

胡麻散

玉真散

石膏散

上工散

黑聖散

楊梅皮散

長命散

退毒散

通天再造散

合掌散

解毒散

經驗百中散

沉香散

通氣散

銀白散

增補家傳預藥集卷之六

散之類

一正舌散

醫書六全曰治中風舌本

強難轉語○得効方曰治中風舌本

強難轉語不正神妙

蝎梢去毒 扶苓炒 薄荷焙

右三味為末每服二錢溫酒下或蜜

牙頰亦可與後方清心

二清心散

醫鑑治舌強不能言語

之○私聞此方正舌散加減之方也

治甘草全弓正舌散用此方効如神

青黛 硼砂各二錢 龍腦分

牛黃分 薄荷錢

右五味為末先以蜜水洗舌上後以

姜汁搗之將藥蜜水調稀搽舌根上

類與之數日効與前方正舌散可互見○全藥

話曰當時延壽翁治舌三寸計突此

用此方春日予曾治一人其証舌三

寸計內縮用此方立得神効矣右兩

醫之治療為表裏

三

安神散即辰砂妙香散也或曰妙香散家傳號安神

散血道氣付妙也

茯苓 茯神 黃蘗

遠志 各一人參 桔梗 各五分

山藥 木香 各三分辰砂 四分

甘草 少但一分

右入麝香十一味家傳去之十味細末故麝香之分兩不載于爰○入門

釋方云木香知氣麝香通氣經曰通

則不痛痛則不通香藥之妙如此○

方考云此安神正氣而精自固之方

也夢中遺失者宜主之○精氣神人

身之三寶也神役氣氣役精三寶之

用也是以神昏則氣蕩蕩則精離

神明則氣正氣正則精固是方也不

用固滋之劑以固精但用人參茯苓

茯神遠志辰砂以安神用麝香木香

黃芪桔梗甘草山藥以正氣補精氣

正則淫夢不作邪火不起精不必滋

精自固矣內經曰主則下安以此養

生則壽沒世不殆此之謂也○醫林

曰治男婦心氣不足精神恍惚虛煩

少無於心經再加辰砂二錢陳湯下
又曰產後有因血虛心氣不足驚悸
恐怖者宜用蘇香圓溫童便調服或
辰砂妙香散生地黄當歸煎湯調服
○正傳曰治心虛遺精白濁又曰治
血氣不足虛煩少睡盜汗○得効方
曰治男婦心氣不足志意不定驚悸
恐怖悲憂慘懣虛煩少睡喜怒不常
夜多盜汗飲食無味頭昏眩又曰治
渴証小便澀數而澀兼有油濁用燈
心茯苓煎湯下又曰治夢中遺精每
服一匙虛者溫湯調熱者來門冬煎
湯調○醫林血汗門黃芪健中湯方
後曰治血汗出汚衣甚如坏冻皆由

大喜傷心喜則氣散血隨氣行故也
軀虛者宜服此辰砂妙香散治証同
前虛實皆可服○血道者酒用○氣
付水用

四

香薷散

家方

香薷

厚朴

五十

陳皮

茯苓

各三

甘草

右五味為細末○一包裝三分○按石

方有香薷飲黃連香薷散十味香薷

散香薷散等並皆治暑熱霍亂吐

利腹痛家方亦治証同前雖然家方

之經驗發百中可信可移

五

征虫散

家傳之制

治諸冷虫嘔吐心

腹痛

良香

香附子

丁子

莪木

陳皮

各三

石五味為細末

六

益中散

家傳之制方也

治泄瀉腹痛冷利○

留小腹不澀而止之劑也

白朮

芍藥

茯苓 各三

陳皮

乾姜

甘草 各三

石六味○宿食加縮砂○腹痛甚加

木香○日用之經驗不可勝計可秘

之○惠德方家傳配劑等出之○雜

著去乾姜泄瀉之主方也○木香芍

藥湯兩目亦異也

七

生神散

出處未知惠德方出之

產後氣付藥也

蒲黃

炒

人參 半

甘草 少

右抹耳力キニスクヒ湯ニ用或ハ

胡外少加ルモヨシ

八

快氣散

氣付也出處未知

蒲黃炒

葛粉

各七分

人參

胡椒 各一

右末メカクカイノ耳一匕

九

又快氣散

治婦人惡血滯下頭痛

香附子

酢煮

右為細末

十

點頭散

醫林曰治偏正頭疼

川芎

香附子

各四

右抹茶清服○偏頭痛連睛痛加石

膏鳳梧子

十一

寧嗽散

醫林曰神効寧嗽散治勞

嗽諸嗽皆用

半復

五味子

茯苓

紫蘊

桑白皮

陳皮

枳殼

桔梗

阿膠

罌粟殼 各二分

甘草 烏梅各少

右為細末○按醫林方有川芎分預

藥集二本校合之共無川芎家傳除

之乎傳信脫之乎未知其是非矣

三稜散

治虫積出處未考

三稜分三 枳殼 檳榔

青皮 木香 肉桂各一

乾姜分二 甘草少

右為細末或加生姜棗煎服

黑神散

出處未考 氣アカリシ目ニイ

心トラクナルニ用ユ 鹿角膠ニ入ル

火ニテ一日一夜燒 右末湯或四物湯煎

湯與也○按諸君有黑神散皆別

之方也○醫者太全黑神散治食飽

吐血并血妄行口鼻俱出但聲未失

皆効 百草霜村中燒藥

右為末每服一錢糯米飲調下明鑑註

黑神散

正傳曰治產後惡露不盡

或胎衣不下攻冲心腹疼痛及血迷

血暈等証 黑豆炒去皮

熟地黄 當歸 桂心

乾姜炒黑 甘草 芍藥

蒲黃炒各四分 舊預藥集為黑豆半升非也半升也

方無蒲黃有附子

右為末每服一錢童便和酒調服○

方考云胎死腹中此方主之○胎死

者產難經日而胎死也法以妊娠舌

頭青黑為驗是方也蒲黃能逐敗血

熟地芍藥當歸能養新血乾姜肉桂能引新血而逐敗血甘草黑豆能調正氣而逐敗血師云此方更治胞衣不下產後血暈餘血奔心兒枕疼痛乍見鬼神等証蓋諸症皆是瘀血為患故並治之補按此方治產後十八症者一曰因熱病胎死腹中二曰產難三曰胎衣不下四曰血暈五日口乾心悶六曰乍寒乍熱七曰虛腫八曰乍見鬼神九曰目內不語十曰腹痛泄瀉十一曰偏身疼痛十二曰血崩十三曰血氣不通咳嗽十四曰寒熱心痛月候不來十五日腹脹喘逆不定十六曰產後口鼻黑色起及

五十

新
增
黑
神
散

醫鑑

治產後敗血

竈血十七日喉中喘急十八日中風

者

當歸

熟地黃

芍藥

酒炒

肉桂

甘草

炙各一兩

沉香

櫻灰

燒存性

蒲黃

炒黑

沒藥

赤芍藥

各一錢

乳香

三錢

血竭

五分

右為細末每服二錢空心無灰酒調下此方可代奪命散○將產血多兒食不盡餘血裹胎難產服此棄子救母○產後用力太早兒不及轉橫生倒出亦當急救母命服此方○子死腹中母必肢體冷痛口角出沫指甲青黑服此即出○產後胎衣不下○

血暈眼花起生不得○血迷心竅不能言語○敗血乘虛散流四肢浮腫○敗血為害口渴舌燥乍寒乍熱似癰○月中飲冷敗血凝聚腹痛難忍或致瀉痢○敗血入心煩燥發狂言語錯亂或見鬼神如癲○敗血停留肢節間遍身疼痛○敗血流入小腸小便出血○敗血結聚小便閉澀太便艱難○惡露未盡失而不治又過酸鹹收斂之物因而得崩漏○肺敗鼻中氣黑○敗血冲心氣急發喘○敗血滯脾胃中心腹脹滿嘔吐似翻胃衣不下敗血攻心眩暈欲絕并產後

六十

新黑神散

全唇

治婦人胎死腹中

一十八症

當歸

赤芍藥

白芍藥

生地黃

熟地黃

香附子

炒

五靈脂

蒲黃

乾姜

炒

玄胡索

枳殼

乳香

沉香

各五錢

右為細末每服二錢童便和酒調下產後一十八症俱童便酒下

七十

神仙散

通仙院之秘方也

茜根

紫草

黃柏

外麻

白芷

青木香

南木香

人參

川芎

沉香

各三錢

黃連

丁子

白芷

肉桂

白木

大黃

胡椒

辰砂

麝香各一 右七味舊預藥集作石

十九味而非此味疑鬱金一 婦人

胎前產後血道氣付專可用也○又

手去用之酒ニモ熱湯ニテモ服ツ

力キタテ興ル也○又巴豆ヲ加テ

下ニ使フ也老少強弱ノ人ニ因テ巴

豆ノ多少可有斟酌也○此方煉藥

之時號延命丹九藥之時號鬱金丸

散藥之時名神仙散也

八十

又方 茜根十三 紫且十三

白芷一分 沉香一分 貴連一分

蔓荊子二 丁子二 胡椒

肉桂各二 鬱金三 白木三

人參一分 黃柏二分 川芎五分

右末每服四々酒下產前產後湯或

水下又水九服

九十

增當飯散婦人 治產後氣血虛弱惡

露內停增寒發熱

當飯芍藥炒 川芎

黃芩炒各 白木五

右為細末童便調下二錢

十二

增枚苦散醫學 治死胎不下兼難產

及橫倒生 桂心一味

為末每二錢痛陣密時溫童便調下

一十

增立效散醫學 治痢腹中疴痛赤白

相兼即止 黃連四兩酒洗去茶葉更

枳殼炒 右為末每服三錢空

心酒送下泄瀉米湯下噤口痢陳倉

米湯下。○按全書稀糊和為丸，五效無雙丸，每服七八十九，空心溫酒送下。治論云：痢不拘赤白，一服立止，并泄瀉亦效，不可言。

二十

神效參香散

同上

治臟氣怯弱，冷

熱不調，積而成痢，或下鮮血，或如豆汁，或如魚腦，或下瘀血，或下紫黑血，或赤白相雜，裏急後重，日夜頻數，無度。

鷲粟穀

醋炙

陳皮

茯苓

肉豆蔻

麩裏煨

人參 錢三 白扁豆 錢二

木香 錢二

右共七味，為末，赤痢每

九分，加製黃連末一分，白痢每九

分，加製黃連末一分，赤白相雜，每服

八分，加黃連、茱萸末各一分，青色黃

色無加，減每用一錢，俱用米湯調下。

忌生冷、沖膩、炙燥。○製黃連、茱萸法：

二味等分，不剉碎，以老酒浸一宿，同

一處燥炒，分出，各為極細末，別包，聽

前用。

二十一

新養元散

同上

治泄瀉、飲食少進。

糯米

一升水浸，一宿，瀝乾，燉慢火炒，令極熟。

山藥

胡升

各少許

右各為細末，和勻，每日侵晨用半盞

再入砂糖少許，滾湯調服，其味極佳。

且不厭人，大有滋補，其女子子宮虛

冷，不能成孕，久服之，亦能懷孕。○丁

方加蓮肉、芡實、山藥各三兩，亦效。○

丁方用糯米磨粉，不拘多少，入百草

霜十分之二水和為餅烙熟食之

一方單用糯米半生半炒煮粥食之亦效

四代

增新立安散

同上

治氣滯腰痛并閃挫

腰痛腎虛腰痛

當歸

肉桂

玄胡索

炒杜仲

炒小茴香

炒各一兩

木香

錢五牽牛子

半生半熟一錢

右為末每服二匙空心陳酒調下一

方去牽牛以酒煎服

五代

增新馬功散

同上

治寒疝

黑牽牛

頭末

錢一錢小茴香

五分加木香

錢一

右共為末每服三錢姜汁調下

六代

增新神消散

同上

治諸般疝氣外腎腫

腰疼痛

山梔子

鹽水炒

橘核

小茴香

鹽水炒

益智仁

炒七錢

青皮

香油炒

檳榔

錢一錢荔枝核

錢八

右為細末每服二錢燒酒調服如不

用酒以燈草煎湯加鹽調服立効

七代

增新香桂散

同上

治坐產滯心腹大

痛死胎不能下者急用之

香白芷

錢三

肉桂

錢三麝香

分三

右為末童便酒調下即產

八代

增新川芎散

本事

治風眩運

山茱萸

山藥

人參

甘菊花

茯神

川芎

各半兩

右為細末每服二錢溫酒下

九代

增新川芎散

正傳

治頭目不清利

川芎

錢五

柴胡

錢七

羌活

防風

藁本

生甘草

外麻各一兩 炙甘草各二兩 生地黃各二兩
黃連酒炒各二兩 黃芩酒炒各二兩

十三

新紫金散

同上 一名白芷散 治諸熱

苦頭痛

鬱金錢一

白芷

石膏各二錢

雄黃

芭砂

薄荷各三錢

右為細末 口含 水臍內攪之

十二

新香薷散

局方治小腸氣 脘腹疝痛

筋急 陰股中痛 悶暈不省人事

茴香鹽炒

枳殼麵炒各一兩

沒藥半兩

右為細末 每服一錢 溫酒調下 不拘

時併進二三服 効

十一

新加味五苓散

醫聖元戎治疝氣 卒痛小

便秘

猪苓

澤瀉

白朮

茯苓

肉桂

川練子

右為細末 每服二錢 空心米飲調下

十

新潛行散

正傳

黃柏浸味酒乾

為細末 每服方寸匕 四物湯煎湯調

下 治血虛 陰火痛風 藥也多服 貼敷

取効

九

新椿皮散

同上 治血痢及腸風下血

神驗

椿根白皮二兩

槐角仁

白礬二兩

甘草一兩

右為細末 每服三錢 清米飲調下

八

新絳雪散

同上 治消渴 飲水無度 小

便數者 大有神効

黃芩

黃丹 防已 天花粉各等分

右為細末每服二錢溫漿水調下臨臥時服進三服即止

六 新琥珀散 同上 治五種淋瀝痛小便

有膿血出証 琥珀 沒藥 海金砂 蒲黃

右為細末每服三錢空心煎黃草湯調下

七 新石薑散 同上 治小便不利莖中作痛

石薑 冬葵子 瞿麥 滑石 車前子

右為細末每服方寸匕日三服 方

考云砂淋痛盛者此方主之

八 新又方 同上 治小便淋閉莖中作痛

神効 石薑 滑石

瞿麥 薔薇 冬葵子

木通 王不留行 地膚草各等分

右為細末每服三錢白湯調下

九 新丁香散 同上 治乳頭破裂或因小兒吹乳血乾自裂開多痛

丁香 不拗多少 右一味為末乾付裂處如燥唾津調付

十四 新南星散 瘡瘍集治皮膚癰疽面上生瘡大者如拳小者如粟或軟或堅

不痒不痛宜用此藥切不可輒用針灸多致不效

生南星 大者一枚

右細研爛入好醋五七點杵如膏如無生者即以乾者為末醋調如膏先以細針刺患處令氣透却以膏藥攤

貼覺痒則頻換貼取效

一平 新設藥散 正傳 治刀箭傷止血生痛

定粉 石灰各一 白礬二錢

乳香 沒藥 各一

右各研為細末同和勻再研乾摻之

二平 新清血散 同上治產後血暈昏不語

澤蘭葉 人參 各一 荊芥穗 四兩

甘草 炙八兩

右為細末每服二錢溫酒入童便調下更用漆器燒烟薰之頻置醋炭更

服此藥

三平 新三聖散 產寶治兒枕痛

當歸 肉桂 玄胡索 各等

右為細末每服二錢熱酒或童便調下

四平 新四物一黃散 婦人治產後腹中血

塊作痛 當歸 川芎 炒

熟地黃 芍藥 各五錢 蒲黃 炒二錢半

右為細末每服一錢空心溫酒調下

五平 新琥珀散 同上治產後瘀血攻心迷

悶妄言見鬼 琥珀

鐵粉 各一 人參 茯神

生地黃 阿膠 各七錢半 朱砂 五錢

甘草 麝香 各一

右為細末和勻每服一錢用金銀煎

湯調下

六平 新七珍散 局方治產後不語

人參 石菖蒲 川芎

熟地黃 各一 細辛 錢 防風 錢五

右為細末每服一錢用薄荷湯調下不拘時服

七

新調經散

產寶治產後虛弱蓋敗血

果虛停積府臟流注肌肉腐壞成水

令人面目四肢浮腫切不可用導水

泄利之藥是謂重虛其虛多致大亡

此藥主之 沒藥一錢 琥珀一錢

桂心 赤芍藥 當歸各兩

細辛 麝香各五分 別研

右為細末每服一錢姜汁溫酒重便和勻服之

八

新二妙散

方考黃柏乳潤 蒼朮

等分為末空心酒服三錢○濕熱腰

膝疼痛者此方主之

九

新倒換散

同上 大黃一兩 荊芥二兩

右末每服二錢內熱小便不通者此

方主之

十五

新稀涎散

同上 皂角四條去黑皮炙

白礬一兩 右共為末每進三字

水下○病人初中風暴仆痰涎湧盛

此藥與之頻吐涎沫壅塞少疏續進

他藥○清陽在上濁陰在下則天冠

地履無暴仆也若濁邪風湧而上則

清陽失位而倒置矣故令人暴仆取

以痰涎壅塞者風盛氣湧而然也經

曰病發而不足標而本之先治其標

後治其本故不與疎風補虛而先為

之吐涎沫白礬之味鹹苦鹹能軟頑

痰苦能吐涎沫皂角之味辛鹹辛能利氣竅鹹能去垢垢名之曰稀涎固奪門之矢也師曰凡吐中風之痰使咽喉疏通能進湯涎便止若攻不其痰則無液以養筋能令人寧急偏枯此大戒也○又喉閉門云喉閉數目不能食者以此方吐之涎不病愈○皂角之辛利能破結氣白礬之鹹苦能湧稠涎數次湧之涎去而病除矣

一

增通頂散

同上

藜蘆

生甘草

川芎

細辛

人參

各一錢

石膏

五錢

右共為末病人初中風不知人事口噤不能開用此藥一字吹入鼻中有

嚏者肺氣未絕可治○中風不知人事病則急矣以平藥與之不能開其壅塞故用藜蘆與人參細辛相反便其相反而相用也肺氣上逆故用石膏之重以墜之甘草之平以緩之乃川芎之用取其清氣利竅而已

二

增通閉散

同春

治中風痰厥昏迷卒

倒不省人事欲絕者

皂角

一兩去皮

生半夏

藜蘆

各五錢

細辛

苦參

各三錢

右為末每用少許吹入鼻內候有嚏可治無嚏不可治

三

增三五七散

八門

治陽虛風寒入腦

頭痛目眩運轉耳內蟬鳴一切風寒

濕痺脚氣緩弱及八風五痺肢體不

仁等症 附子 細辛 各三兩

山茱萸 炮乾姜 各五兩 防風

茯苓 各七兩

右為末每二錢酒調服一方無茯苓

有山藥五兩方考頭痛曰太寒中於

風府令人頭痛項筋緊急者此方主

之○風府腦後之穴督脉之所主也

寒者天地嚴凝之氣故令項筋緊急

乾姜附子辛熱之物也可以散真寒

細辛防風氣薄之品也可使至高巔

山茱萸養督脉之陰茯苓和督脉之

陽河圖之義奇者為陽偶者為陰此

方名曰三五七者以補陽為義也

四

新化風如聖散全各一名治男婦小

兒諸般風症左癱右瘓半身不遂口

眼喎斜腰腿疼痛手足頑麻語言蹇

澁行步艱難遍身瘡癰上攻頭目耳

內蟬鳴痰涎不利皮膚瘙癢偏正頭

風無問新久及破傷風角弓反張并

蛇傷太咬金刀所傷出血不止數節

立刻久患痔漏膿血痛楚服之良驗

蒼朮 草烏頭 炮川烏頭 炮去

何首烏 各二兩 全蝎 焙

天麻 各二錢 姜蚕 三錢 兩頭尖 錢

兩頭川烏頭 防風 荊芥

白芷 細辛 藁本

麻黃 當飯 川芎 各二錢半

人參 一錢 茯苓 一錢 石解

白花蛇 浸酒三日去 皮骨各五錢 羌活 二錢

甘草 炙一兩半 右共二十二味

右為細末每服三分或五分漸加至

六七分臨卧酒調下茶亦可服後忌

多飲酒并一切熱物飲食一時恐動

風氣服後覺麻是藥之効也

五平 增行軍散 同上 治傷寒

菜豆 麻黃 各一 雄黃 錢三

共為末每服一錢重者二錢無根水

下走出汗愈 按瘰癧一名無根水

山谷中無人跡新土耕凹中之水也

六平 增耳露散 同上 治傷寒時氣作熱發

狂及鮮五毒治煩熱

寒水石 石羔 各一 甘草

右為末新汲水入姜汁調服

七平 增回陽散 同上 治陰症腹痛身冷

硫黃 四 胡椒 六

右為末每三分燒酒調服

八平 增錢半散 同上 治一切諸熱紅痢裏

急後重臟毒下血糞前糞後酒毒隔

熱肚痛赤眼四肢煩熱及諸熱結核

瘡毒 黃芩 山梔子

黃連 各二兩一兩 連翹

芒硝 各一 薄苛 大黃 各三

右為細末每服一錢半食後茶調下

九平 增漿水散 全吞 治暴泄如水周身汗

出一身尽冷脉微而弱或無脉氣少而不能語其甚者加吐此為急病

半隻二兩 附子 炮半兩 乾姜 五錢
良姜 五錢 桂枝 五錢 甘草 五錢

右為末地漿水服

十六

增五味子散

同上治到五更臍下絞

痛而瀉泄

五味子二兩 吳茱萸 五錢

同炒為末每服二錢陳米飲下

一卒

增寶腸散

同春治久痢去多不分赤

白用此末藥換出黃糞來

山藥 炒黃

蓮肉 炒各一兩 炒黃米 合

右共為細末用沙糖調熱湯和勻前末藥不乾不稀漸令調服後用清米湯漱口常服之最効○按此方泄瀉

用之妙也

二卒

增益元散

八門一名天水散天一生

水地六成之義也

滑石 六兩

甘草 一兩

為末每三錢入蜜

少許沸湯調服熱者冷水調服孕婦

慣半產者忌服如傷寒身熱不解加

蒼朮末三錢葱豉湯調連進數服汗

出為度又汗吐下後餘熱以此解之

甚妙虛煩不眠加辰砂少許身熱霍

亂嘔吐轉筋者先掘地坑傾新水

桶在內攪勻澄清謂之地漿水別用

井水一碗入油一匙浮水面將此藥

撒在油華上其藥自沉碗底去清水

用前地漿水調服名油墜散一切風

熱上壅咽喉不利加青黛薄苛少許
蜜丸噉化一切寒症瀉痢嘔吐反胃
加乾姜五錢名溫六九中寒甚者再加
硫黃少許用生薑汁浸煨餅丸又能
代肝邪一切暑症作渴新汲水下感
田禾燒氣作渴用帶泥稻稈煎湯下
一切濕熱腸癖泄瀉滑石用牡丹皮
煮過加紅麴五錢名清六九用陳米
飲丸每五七十九白湯下如產後腹
痛白利用補脾補血藥下或加五靈
脂一兩能行血止痢瀉甚加肉豆蔻
少許一切痰熱吐逆反胃驚癇顛狂
熱毒瘡痢腹痛加黃丹少許姜汁蒸
餅為丸服 方考 暑門 云六府有實

火上有煩渴下有便秘赤淋者此方
主之又云滑石性寒故能清六府之
熱甘草性平故能緩諸火之勢

三卒

增新百中散

同上治一切痢不問赤白

或日百行一服便疎再服即愈

墨粟穀 去粗皮用姜汁浸一宿

炒乾為末每二錢米飲調服忌生冷

油膩魚鮓毒物三百

四卒

增新安脾散

同上治停飲傷胃寒食嘔

酸嘔吐黃水不巳

良姜一錢用陳壁土和水煮至乾

草菓

木香 丁香

胡椒

人參 白朮

陳皮

茯苓各五 甘草一錢

分半

為末每二錢米飲入鹽少許調服

五卒

新三香散

同上治胃冷飢逆經久不止

沉香

紫蘊

白豆蔻

右各等分為細末每服五七分柿蒂

煎湯調下

六卒

新古橘耳散

同上治痰嗽極有效驗

陳皮

甘草

為末每服二錢白湯調下

七卒

新參散

醫林治喘嗽枯礬一兩

人參

甘草

右為末每服一錢臨臥嚥之白湯調

服亦可

八卒

新參花散

同春治咳嗽發熱氣喘吐紅

人參

天花粉

九卒

新金散

治傷寒潮熱痰咳

鬱金

石膏

右共為末每服二三匙清茶送下

按右二方治小兒咳嗽痰喘

十卒

新七傷通氣散

同春治十膈五噎腹

內久積氣塊腹力嘔吐膨脹此方諸

病皆治

皂角

大黃

礞石

當飯

巴豆

右為末每服一分或二分大人小

虛實加減用之引用好酒一口調服

不飲酒者滾白水亦可引不許多引

多動一二行此藥服之不吐則瀉

不瀉則吐兼治小兒驚風痰響上竅

天吊吐痰即愈又治中風不語

增新蓮散

入門治夢遺泄精小便白

濁等症

蓮肉 益智

龍骨 各等分爲末每二錢空心

米飲調服

增新

人中白散

同上治陰虛火盛及五

心煩熱等症

人中白 兩 黃柏

甘草

散錢各五

爲末每二錢童便調服

增新

海金沙散

同上治膏淋

海金沙

滑石 各二

甘草 二

石爲末每錢麥門冬或燈心煎湯下

增新

又方

同春治五淋一服如神

當飯酒

大黃 酒

牛膝 酒

木香

雄黃

海金沙 各等

石爲細末每服一錢半臨臥好酒調

服兩服全愈

增新

三味葶藶散

入門治小便急痛小

利莖中疼痛

木通

茯苓

各三

葶藶 二兩

爲末每方寸匙水調日三服

增新

顛倒散

回春治臟腑定熱或小便

不通或大便不通或大小便俱不通

大黃

錢六

滑石

皂角 各三

石爲末黃酒送下如大便不通依前

分兩服如小便不通大黃錢三滑石錢六

皂角如前如大小便俱不通大黃滑

石均分皂角如前

七

增新紅散

八門治大腸虛而挾熱脫

紅腫

縮砂

黃連

木賊

為末每二錢米飲下

八

增新紅散

全唇治腸風臟毒下血

烏梅

焙一兩

五倍子

炒五錢

枳殼

炒一錢

黃連

炒三錢

荊芥穗

錢三

白芷

錢二

右為細末每服三錢空心酒調服遠年者亦斷根

九

增新參冬散

醫林治睡中汗出

酸棗仁

人參

茯苓各等分

為末米飲調下

十

增新白朮散

正傳治飲酒中風多汗食即汗出不治必成消渴

牡蠣

白朮

防風

右為末溫水調下

十一

增新牡蠣散

明鑑治脚汗

牡蠣

枯芩

蜜陀僧

黃丹各等分

為末用少許乾摻脚指縫

十二

增新三味玄胡散

八門治冷心痛

玄胡索

肉桂

木香各一兩

為末每二錢姜湯或酒調服

十三

增新古散木散

同上治心脾疼痛

為末每二錢沸湯點服

良姜

香附子

右各等分為末鹽湯點服一方加木香烏藥○按香附良姜別以可炒若

同炒則不効○或為九号香附尤妙

五平 新愈痛散 同上 治急心胃痛 延胡索炒 莪木煨

良姜炒 當飯各等分

右為末醋湯調服

六平 新鐵刺散 同上 治心脾積痛婦人血

刺氣痛及中酒泄瀉 良姜炒二兩

甘草灸 蒼朮各二兩 茴香炒七

右為末鹽湯點服或酒調或煎服亦可

七平 新速効散 入門 治男婦腰痛不可忍

川練子 用巴豆五粒同炒赤去巴豆

破胡紙各一兩

右為末每服一錢空心熱酒調服○

一方明磁 治腰疼如神

肉桂 兩 木香 杜仲各四兩

右為末酒調下

八平 二仙散 入門 治纏喉風急喉痺

膽礬錢 姜蚕二錢

為末每吹少許入喉中

九平 新抑氣散 明鑑 治七情所傷中脘不

快氣不升降脇脹 香附子四兩

陳皮三兩 甘草炙五

右為末每服二錢食遠白湯點服尤

妙也女人尤宜服 入此方加扶神

十九 新卷治石羔散 入門 治遠年近日內

外翳障風熱昏暗拳毛倒睫一切眼

疾兼治頭風 卷治

石羔 黃芩 藁本

增補家傳卷六

蜜蒙花 木賊 白芷

蘿蔔子 細辛 麻仁

川芎 蒼朮 菊花

荊芥 甘草

各等分爲末每二錢用三次蜜湯調

服或加當歸枸杞山梔連翹柴胡薄

荷防風天麻桔梗等分爲丸服尤妙

一平 新洗肝散 醫林 治風毒上攻目暴腫

痛難開隱溢眵淚 薄荷

當歸 羌活 甘草

大黃 防風 山梔子

川芎 各等分

右爲末白湯調服剉煎亦可

二平 新菊花散 同上 治風毒眼目赤腫昏

暗瘕肉痛痒漸生翳膜

白疾黎 炒 羌活 木賊

蟬退 各三 菊花 六

右爲末食後臨臥茶清調下

三平 新千金還少散 全吞 補丈夫諸虛不

能及述 冠絲子 茯苓

山藥 牛膝 肉苁蓉

枸杞子 續斷 五味子

山茱萸 巴戟 蛇床子

杜仲 酒炒

右十二味製羅細末酒調服方寸七

日三夜一惟禁醋蒜外無忌服後五

夜知覺十夜力壯○若多忘加遠志

扶神體滋加柏子仁或煉蜜爲丸每

服三五十九日一夜以頭面身體

溫暖為度藥性平和調五臟健力加

遠志石菖蒲熟地小茴酒炒

四

增新聰明散

同春早孔子大聖批中九家傳名聰明散

龍骨

遠志

石菖蒲

龜甲

右四味等分為末酒調

方寸匙日三服令人聰明

五

增新八仙散

全屑服三十日精神倍六

十日氣力強志意足少壯素稟虛弱或勞傷早衰多忌服之

天門冬 生地黃 肉桂

茯苓 石菖蒲 五味子

遠志 甘草 右三

右為細末每服一錢或湯或酒任調

食後服勝加天主補心丹

六

增新川芎茶調散

同春治偏正頭痛

荊芥穗 川芎 薄荷

香附子 羌活 甘草

白芷 防風 七錢

右為細末每服二錢食後茶清調下

○一方加菊花一兩細辛五錢姜蠶起

錢生名菊散調散

七

增新又方

全屑治頭風偏正頭疼及胃

寒作痛者 川芎 荊芥

白芷 藁本 羌活 各一

細辛 防風 香附 各七錢

薄荷 甘草 五錢

右為末每服二錢食後茶調下

八

增神効散

同春

治心痛作酸又治水

停心下作聲如雷又治口眼喎斜不

省人事 胆礬一分

九

增倉卒如神散

全唇治氣自腰腹間

攻心寧急痛不可忍腹中水冷自汗

如洗手足厥冷又治寒疝入腹心腹

平癰及小腸膀胱氣痛刺脾腎氣攻

經急痛不可忍屈伸不能腹中冷重

如石自汗出 山梔子 皮搗碎炒

大附子 炮去皮 脂一箇

百

增新四聖散

同上治疝氣外腎腫脹

右為末每服二錢酒一盞入鹽少溫服

小茴香 炒 穿山甲 炒 全蝎 炒

南木香 各等分為末每服二

一百

增新七聖散

同上治風濕流注經絡間

肢節緩縱不隨脚膝疼痛不能履地

牛膝 杜仲 續斷

草薢 防風 獨活

甘草 各一 右烘乾為細末每

服二錢空心溫酒調下

二百

增新推氣散

同上治肺邪入肺右脇痛

甚脹滿不食 姜黃

枳殼 麩炒 桂心 各五 甘草 三錢

右共為末每服二錢姜湯調下水煎亦可

三百

增新沒藥散

明鑑治婦人脇痛

香附 二兩醋下外鹽 芍藥

肉桂 延胡索炒各一兩

右為末白湯調食前服

四百 新蔓菁子散醫林 治黃疸皮膚眼睛

如金色 生蔓菁子

為末熟水調每三錢不拘時服

五百 新槐花散 治吐血

陳槐花炒二兩 百草霜各二

為末茅根煎湯下

六百 新川芎三黃散醫林 治積熱衄血

大黃煨 川芎 黃芩

黃連各等分

右為末每服三錢食後并水下

七百 新髮灰散醫林 治血淋

亂髮燒灰 麝香少許

右醋湯調空心服又治婦人轉腰不尿又男子尿血皆効

八百 新當歸散明鑑 治打撲傷損皮肉破

筋骨斷疾血壅滯結腫不散或作癰疽疼痛甚及傷後中風手足痿痺

澤蘭葉 當歸 牛膝

續斷各十兩 芍藥 白芷

川芎 肉桂 白楊皮不用

細辛各五兩 川烏頭 川椒各三兩

桔梗 甘草各兩

右為末熱酒調下

九百 新補損當歸散 同上 治陰虛落車傷

脫折臂服三日筋骨即相連神効

澤蘭葉 附子炮去良 當歸炒

各一分

川椒炒 甘草 肉桂各二

川芎炒大 右為末每服二錢溫

酒下忌海藻松菜葱猪肉

新乳香定痛散 入門治打撲墮墮傷

損一切疼痛 乳香

當歸 白木各二 白芷

沒藥 甘草 羌活

人參各一

為末每二錢溫酒并童便調服如血

虛者去羌活人參加川芎芍藥生地

黃牡丹皮 按此方落馬別而妙也

新無極散 醫林一名通經甘露散一

名四順丹治經血不通崩漏腸風帶

下血風五淋產後積血

大黃 分四處

四兩 用紅花四兩入水取汁浸

四兩 大黃一日不用紅花曬乾

四兩 用童便入盆二日大

四兩 黃一日取出曬乾不用便

四兩 用當歸四兩入漆醋內

四兩 浸一日不用當歸曬乾

四兩 用好酒浸一日令乾知

四兩 杏核大晒乾巴豆三十五

四兩 粗去皮同炒豆

黃色不用

右四分同為一處入南木香一百草

霜五為末每服三錢好酒空心調下

又煉蜜丸如桐子大每服三四十九

罕心溫酒下即四順散也九修合用

不笑擇下月

新尾松散 入門治經水三年不行者

尾松 遊 土牛膝 當歸尾

各等分尾上焙焦有性為末先一日

三草

增新大黃散

全屑治婦人室女經脉不通服之如神

生地黃 三錢

為采作下服空心好酒調下

四草

增新五倍子散

明鑑治血崩帶下

艾葉

醋煮五倍子二兩炒烏梅赤色

川芎

各五右為末米飲下

五草

增新玉仙散

全屑治赤白帶下

乾姜

炒酒芍藥炒酒香附炒各一兩

甘草

生用五錢

右為末每服三錢空心溫酒送下

六草

增新四仙散

同春治婦人白帶

蒼朮

黑皮炒乾白芷

川芎

附子麵包煨去皮

右為末每服五分空心好酒調下

七草

增新蓮砂散

全屑治婦人常懷小產常服此以保胎孕十月完足

蓮肉

炒四兩縮砂炒二兩

右為末每服二三錢米飲調下日服三四次

八草

增新瘦胎散

同上治胎肥壅隘動止艱難臨月服之縮胎易產

枳殼

麸炒五錢香附子三錢甘草半一錢

九草

增新白薇散

醫林治妊娠遺尿不知出

白薇

苟藥各等分

為末每服三錢食前酒調服

百

增催生散

同春治難產并胞衣不下

白芷 伏龍肝 百草霜

滑石 各等 甘草 煨半

右為細末用芫飯湯入酒童便少許

調前未服之二次立効

百

增神應散

醫林

治難產及橫逆皆因

坐草太早努力過多兒轉未速或以

破水先下其血必乾若先露手謂之

橫產或先露足謂之逆產此藥再固

其血脈之如魚得水

白芷 百草霜

右等分為末童便米醋各半益調藥

二三錢沸湯泡溫服分二次服服畢

又用蜀葵子四十粒滑石末三錢順流水

煎湯調服如人行五里即生

百

增失笑散

明鑑

治產後心腹絞痛欲

死及兒枕痛

蒲黃 五靈脂 各等

右為末醋調一錢熬成膏湯化服之

百

增奇効散

治產後血上心已死

真鬱金 燒存

右為末溫米醋調灌下立効

百

增大調經散

同上

治產後血虛惡露

未消榮衛不調陰陽相乘增寒發熱

或自汗腫滿皆血氣未平所致

大豆 炒去皮 茯苓 兩 琥珀 一

右為末每服三錢濃煎紫蘇黑豆湯

空心調服喘急煩悶小便不利亦効

五

增八珍散

醫林

治產後不語

人參

石菖蒲

生地黄

酒蒸

川芎

各一兩

朱砂

防風

各五

細辛

各一兩

甘草

炙半兩

右為末每服三錢薄荷湯調服地黃

總服脾胃不快者以當歸代之尤妙也

五

增孤鳳散

明鑑

治產後開目不語

明礬

各一兩

錢白湯調服

五

增烏金散

醫林

治產後血迷血運敗

血不止淋瀝不斷腹痛疼頭目昏

眩多汗又治崩中下血不止

血竭

各一兩

百草霜

男婦亂髮灰

松墨

醋浸

鯉鱗

燒

當飯

延胡索

肉桂

赤芍藥

五

增桑螵蛸散

明鑑

治產後小便數及

遺尿

桑螵蛸

十五兩

黃芪

各一兩

牡蠣

煨

鹿茸

炙

黃芪

各一兩

牡蠣

煨

人參

赤石脂

厚朴

各六

各半

右為末每服二錢空心米湯調下不

禁者加龍骨一方無赤石脂厚朴有

增三母散

全屑

治產後無乳

貝母

君

知母

佐

牡蠣

使

為末猪蹄湯下

五

增湧泉散

同春

治乳汁不通不問虛

盛先用木梳頻刮乳房後服藥効

穿山甲

炒

肉豆蔻

麵包

煨熟

白芷

各

四錢

增補家傳卷六
包角錢五 胡桃仁去皮 胡麻炒半

右為細末每服不拘多少溫酒調下
任意食之

十一

新乳頭散

明鑑治夜啼不正腹痛

黃芪

甘草炙

當歸

赤芍藥

木香各等分

各為末塗乳頭與乳

十二

新乳香散

同春治盤腸氣痛

乳香

沒藥各等分

共為細末以木香煎湯調服

十三

新犀角散

同上治客忤驚啼壯熱

天麻

犀角

附冬

鈎藤鈎

辰砂各一分

鐵粉

雄黃

各半麝香少許

右為末每服半錢金銀煎湯調服

十四

新千金散

同春治小兒一切痰喘急

慢驚風雖至死但能開山灌下無不

活者

全蝎炙

白姜蚕各二分

牛黃六厘

龍腦一分

辰砂

黃連

天麻各四分

牛膽南星

甘草各二分

右為末每用五七厘薄荷燈心金銀

煎湯不拘時調下

十五

新宣風散

正傳治急驚風搐搦不定

檳榔子二枚

陳皮

甘草各五分

黑牽牛子

四兩半生半炒一本取頭末一兩

右為末蜜湯調下二三歲兒半錢四

五歲一錢食前服

百三

新牛黃化癰散

全治小兒癰疾

牛黃

薤白

姜蚕

各二錢

孩兒茶

阿膠

甘草

各三錢

大黃

一兩

穿山甲

十片黃土炒焦黃色

右為細末每服五分蜜水或黃酒調

空心服忌生冷

按此方服者慎之

百二

新碧玉散

同上治小兒十分潮熱五

七日不退

滑石

青黛

石膏

生甘草

右為末每二錢滾湯調服熱不退柴

胡薄荷湯下

百一

新瀉黃散

治脾熱黃壯大口

唇生瘡眼生偷針等証

藿香

山梔子

石膏

甘草

防風

右為末溫湯調服

百

新麝香散

明鑑治鼻痔鼻下生

瘡赤爛

麝香

雄黃

升麻

各二錢半

右為末人乳調敷

百

新天靈散

全唇治小兒諸癰如神

天靈蓋年久白者燒存性為細末

每服五厘黃酒調下立止○又治婦

人血崩不止空心溫酒調服其效如神

百

新參苓白朮散

同春治脾胃虛弱飲

食不進多因少力中滿痞噎心中氣

喘嘔吐泄瀉此藥中和不熱久服養

氣育神醒脾悅色順正僻邪

人參 白朮炒 茯苓

山藥炒 甘草炙各二錢 白扁豆一錢半

汁浸 蓮肉 縮砂

桔梗 薏苡仁炒各一錢

右為細末每服二錢漿湯調下量兒
歲數加減○回春方前云小兒泄瀉
者乳食傷脾也此方主之

百三

新牛黃奪命散

醫林小兒肺脹喘滿

氣急兩肋動跳發熱悶亂嘔渴聲

嘎痰涎潮塞俗呼馬脾風如不急治

死在旦夕牛黃奪命散無價散主之

白牽牛子 黑牽牛子各半生半熟

大黃 檳榔子各一兩

右為末三歲兒一錢冷漿水調下涎

百四

增無價散

同上 治風熱喘促悶亂不

安俗呼馬脾風

輕粉半 甘草炙半兩 珍珠半

右為末每服一字用溫漿水少許滴

香油一點抄藥在油上沉下去却漿

水灌之方加滑石錢二 名油墜膏

百五

增同天散

明鑑治痘黑陷膜脹直視

喘急發搐 蟬退五 地龍一兩

右為末每服半錢太兒一錢研乳香

湯調下連進二服愈

百六

增人齒散

明鑑治痘初出光壯然黑

陷心煩性躁氣喘妄語或見鬼神不

連治毒氣入載必死 人齒燒存性

右為末每箇作一服酒下

神仙排膿散

同春 治惡瘡毒風毒

疔瘡背花瘡小兒惡瘡膿血俱從大便中出亦治氣滯腹脹及婦人經閉不通此方壯寔之人可用虛弱者當慎之

大黃 十二兩酒浸一宿晒乾

白芷

沉香

木香

乳香

沒藥

穿山甲

陳壁土 炒各五錢

右各為細末量入虛寔用之寔者不過三錢虛者二錢牛臨卧用好生酒調服服後禁飲食湯水動三五次以稀米粥補之服此藥內有穿山甲恐令人作嘔須急之即將生葱可正凡修合此藥要誠意切不可令婦人雜

犬見又不可多合恐久放則不効矣

千金內托散

同春 治癰疽瘡癤未

成者速散已成者速潰敗膿自出無用手擠惡肉自去不用刀針服藥後疼痛頓減此藥活血勻氣調胃神虛祛風邪辟穢氣乃王道之劑宜多服之大効

黃芪 蜜炙 當歸 酒洗

人參

各二錢

川芎

防風

桔梗

白芷

厚朴

姜汁炒

甘草

生用

薄桂

各一錢

加金銀花

亦好

右為細末每服三錢黃酒調下不飲

酒木香湯調下亦可或都作一劑用

酒煎尤佳○癰疽腫痛倍白芷不腫

痛倍官桂○不進飲食加砂仁香附

子○痛甚加乳香沒藥○水不乾加
知母貝母○瘡不穿加皂角刺○咳
加半夏陳皮杏仁生薑五片○太便
閉加大黃枳殼○小便澀加麥門冬
車前子木通燈草

百四

新二活散

明鑑義十三疔狀雖異

皆熱毒之甚也治法先以雄黃丸下
之去其毒勢○雄黃丸雄黃鬱金白
角全蠍各二錢巴豆十四

粒麝香少許右為末滴水丸如菉豆
大每服二丸亦量虛實加減丸數
茶清送下○次服二活散病勢緩而用引經藥

菴活 獨活 當歸

烏藥 赤芍藥 金銀花 洗酒

天花粉 白芷 蓮翹

耳草節 各四 蘊木 紅花

荊芥 蟬蛻 葛根 各三

白檀 右為末蒼耳煎湯下

百五

新百一散

同上又各治發疔瘡煩躁

手足不任發狂者 耳草節

菴豆 辰砂 各等

右為末每服三錢熟水下

百六

新退毒散

同上治便毒腫結

穿山甲 半兩醋 猪苓 微炙

石為末食前老酒下火醋煮肥皂研

膏敷之妙

百七

新仙子散

同春治遍身瘡癰經年舉

發者 威靈仙 蔓荊子

何首烏 荊芥 苦參

右各等分為細末每二錢食前溫酒

調服日進三服忌發風物

百五

增新通天再造散

同上治癩瘡

欝金五錢 皂角刺黑大者 大黃煨各一兩

白牽牛頭末六錢 白牽牛生半炒

右為細末每服五錢日未出時無灰酒送下向東服之當日必利下惡物或臭不可近或膿或更如虫口黑色乃是多年赤色乃是近者數日後又進一服無虫乃止

百五

增新胡麻散

全書治紫白癩風并癬面

上酒瘡又名粉刺面刺俱可服之

胡麻子赤色扁者佳 白芷二兩

何首烏二兩 防風二兩 蔓荊子一兩

甘菊花一兩 苦參酒炒三兩 威靈仙二兩

升麻 當歸 牛旁子炒少

芎藭各二兩 白蒺藜 荊芥各三兩

薄荷 片苓酒炒 黃連酒炒

白芍藥酒炒各二兩

右為細末每服三錢食遠服秋分後至春分白酒調服春分後至秋分茶調服用米糊細匕丸食遠白湯下

百五

增新合掌散

明鑑治遍身生瘡百藥不効

檳榔子五箇 硫黃生者五兩 臙粉半

右和勻每用二錢安手心內香油調夜臥時塗外腎不可洗手但揩擦令乾一二日愈

百五

增新玉真散

回春治破傷風及金刃傷

打撲傷損并癰疽咬傷能定痛生肌

天南星 為防風所制 服之不麻入 防風 各等分

右為末破傷風以藥敷瘡口然後以
溫酒調一錢如牙關緊急角弓反張

用藥二錢童便調下

百五 新解毒散 明鑑治毒蛇傷入眼黑口

噤手足強直 白礬 研 耳草

右各等分為末冷水調下

百七 新石膏散 治急頭痛 石膏一味為

細末半錢許茶清點服立効 事林廣記

百八 經驗百中散 家方治一切痢疾不論赤白

日夜無度只服便疎三服全愈可秘

鹽粟穀 蜜炒 四兩 厚朴 姜汁製 炒四兩

右為細末米湯調下二三次忌生冷無毒物

百九 新上工散 家方治虫霍亂腹痛

吉野葛 六兩 黃橘 二兩 胡椒 一兩

右為末鹽湯下

百十 新沉香散 家方頭風血道妙也 沉香八

當歸 大黃 檳榔子 各二

右為細末酒用

百十一 新黑聖散 家方赤白帶下諸藥不効服之甚

得効兼治小便血 亂髮霜 棕毛霜

各等分 右為細末服

百十二 新通氣散 家方頭下 當歸 黃芩

沉香 川芎 各一兩 茯苓 芍藥 各二

大黃 一兩 右末服

百十三 新楊梅皮散 家方治白神妙可秘 楊梅皮

苦參 黃柏 少炒 各二兩 乾漆 二兩 炒 烟

右為末茶下服程湯立用

新銀白散

家方治小兒百病外麻知母

甘草

扁豆炒山藥

人參

白朮

茯苓各等分

右為細末○

大驚薄荷葱白湯下○渾身壯熱面赤散金

銀薄荷湯下○驚吐下痢不止香湯下○

瘧氣肚脹氣急百合湯下○喫食不知飢飽不食

肌肉消瘦生薑湯下○諸病後無精神少氣

力不思飲食姜棗湯下○稟受氣怯每日

一服量兒加減

新長命散

家方沉香 蘇檀 益智

甘松各五分

丁子

人參

肉桂

甘草

錢各一

肉豆蔻

琥珀錢各一

右十品為細末服○此方氣付產後金瘡氣付

尤妙也○霜腹加加不天古布羅分五最妙

