一字銘畫引

二畫 刀ゴボウ 力リキ

三畫 子ソレ 小サイレン 丸ヘン 丹サンヘン 方ツボク 天テンモンドウ 丑ケンゴレ 木モツカウ 井アケウ 弓セツキウ 升セウ二 王ボクシンヒ 水シレソ 斤タウキ

四畫 文ワウコン 斗ヒャクメツ 木カウホン 瓜モツクワ 卯チユ 奴キユク 母アクモ 永カンキウ 西ゼンゴ 支ガイヨウ 灯トウレン 竹チクヂヨ 曲キンキク 守ハンゲ 牙ガゲ 田ハンゲ 耳カンザウ

五畫 玄コミレ 令ブクリヤウ 半ハンゲ 句クバク 仲チウト 艾ヨウ 朴カウボク 没モツヤク 附フブン 芋ビヤクヂワウ 杏キヤウニン 沂タウキ 伽ビヤクジツ 多ビヤクヅヅク 史クンシレ 芃ジンゲウ 次ケウメイレ 牡ボクヒン 杜チウト 貝ハイモ

六畫 守ハンゲ 竹チクヂヨ 灯トウレン 艾ガイヨウ 没モツヤク 伽ビヤクジツ 多ビヤクヅヅク 芃ジンゲウ 朴カウボク 曲キンキク 仲チウト 永カンキウ 句クバク 史クンシレ 母アクモ 卯チユ 奴キユク 瓜モツクワ 弓セツキウ 次ケウメイレ 牡ボクヒン 芍シヤクヤク 杜チウト 貝ハイモ

七畫 沂タウキ 杏キヤウニン 芋ビヤクヂワウ 附フブン 沉ヂンコウ 利キキウ 忍ニンドウ

早 車 芊
乱 余 並 孫 走
苛 門 芸 官 乳 定
隹 虎 芦 虺 彭 疋
枝 芥 花 呉 良
糸 周 辰 果 泠
苛 芟 芓 苑 紅
尭 神 泊 洞 砂
査 行 扁 弟 弁
拾 洗 柿 茂 削
板 洋 青 邑 延
芩 枇 星 泉 枳
芦 芹 胡 妬
枝 洋 青 邑 延
芩 枇 星 泉 枳
芟 周 辰 果 泠
苛 芟 芓 苑 紅
尭 神 泊 洞 砂
査 行 扁 弟 弁
拾 洗 柿 茂 削
早 車 芊
乱 余 並 孫 走
苛 門 芸 官 乳 定
隹 虎 芦 虺 彭 疋
枝 芥 花 呉 良
糸 周 辰 果 泠
苛 芟 芓 苑 紅
尭 神 泊 洞 砂
査 行 扁 弟 弁
拾 洗 柿 茂 削

珍 前 恒 若 岩
粉 洋 射 厚 退
附 陳 姜 奈 茱
羌 荊 柴 匿 桂
犀 汚 栢 麥 烏
倍 茹 桑 索 梅
益 翁 桓 羔 茵
斬 参 渋 商 常
甚 穿 侯 竜
跛 連 筒 挟 通
麻 竟 斛 細
篠 偏 宿 假
側

雪ソウ　猪チョ　蛎ボレイ　游リウタン　淡カウボク
液クヲウセキ　泥ダイワク　鄕ワウゾクコク　黑ゲンジン　厠タウキ
斡レイカク　針キウジン　接ゾクダン　龜キハン　陽レンブヨウ
翳アクヲウ　十二　童セウヒ　搖ドツクヲウ　遠ヲンジン
肴カウコン　貴チンヒ　眞セキヲウ　會ゴミシン
喬テウジン　巢サウクヲウ　訶カシン　難シンノバリモ
椒ニセウ　婆クヲウカウ　塊バイレイ　紙ハコシン　筍シンニウ
寄サウキヤイ　的ビヤクシンヤク　越サンシン　菊キククハ　溢コウクハ
硝セウセキ　滋ワウギ　琥コハウ　十三　解カイヒ
滑クハウセキ　葱ソウハク　雷チモ　棋ワウギ　黄ラウジン
腹タイフクヒ　鈴キンレイシン　稜サンレウ　齊カツコン　瑞テンクワウフン
軾シンレ　楹カウベイ　賊モクヅク　遊リウメン
葚テンヒキ　椿チンヒ　愛バクモンドウ　歎クヲンドウ　眇ビヤウガイ

潤インチン　節キツクヲウ　連ヲタレン　澡サウコ　葵キヨウレン
榆ギユ　十四　婪ウヤン　蜜モツカウ　蒼ソウレンツ
威レイセン　膏セキカウ　銀ギンキンクヲウ　實キツ　鵝ヤウレンクヲウ
酸サンクヲウニン　圖キヨウ　葉チクヨウ　靜クイガイ　羨シンリ
精ソウニヲウ　練センレンレン　藁カウゾヨウ　漏ソウヅク　鍐ヨウまウ
蝎センカウ　蓉ニウヨウ　蒲ホヲウ　十五　餘シヤウヤク
翹レンギヤウ　蕙ニウヨウ　膠アケウ　蓮レンニク　荀ブレン
澁カニレ　蔓ミンタイ　懷ウイまウ　膝コシツ　十六　鴛ヱンヤウキヨウ　路カンボウ　黛セイタイ
揪シウブクレンウ　麵レンキク　鮮ハクセンセン　蒹ヨクイニン　嶺サンカ　十七　嬰タウニン
瀝チクレキ　鮮ハクセンセン　蒹ヨクイニン　嶺サンカ　十七　嬰タウニン
薰クンヨ　辭ヒカイ　欽ハクレン　十八　蟬センタイ　寶ハウイ　二十
離ベウイ　麴レンキク　蟬センタイ　寶ハウイ　二十
聾カウクヲウ　糯ダベイ　二十一　續ソクダン　麝シンヤカウ

蘿ノ子 蘚ハク 蘚セン 蘚ウン 驚ベツ 蠻モノ
殻。霍。澤。燈。蘚露。歸。
此等各其字ヲ用ユ一字條終

▲六陳

呉茱萸 橘皮 狼毒
半夏 枳實 麻黄

此六種ハ古者二効アリ陳ト
ハ古ト訓ス神麹モ亦古ニ効
アリ故ニ陳麹ト モ名ク其外
ニ木賊。大黄。荒花。荊芥ノ類モ
陳久ナルヲ用テ良

▲八新

紫蘇 薄荷 菊花 赤小豆
澤蘭 槐花 款冬花 桃花

此八種ハ新キヲ用ユ年ヲ
越レバ藥力ナシ 惣ノ花ハナシ

新シキヲ用テ良紅花白梅
花三ナ新キヲ用ヒテ効アリ
▲十二經引經報使之藥
其經ヘ藥ヲ引テ行メグラス使ノ藥也
手少陰心經黃連獨活 細辛
足少陰腎經獨活 肉桂 知母 細辛
塩酒
手太陰肺經桔梗 升麻 白芷 葱白
足太陰脾經升麻 蒼朮 葛根 酒浸
白芍藥
手少陰三焦經連翹 柴胡 附子 青
皮 地骨皮
足少陽膽經柴胡上行 青皮下行
手太陽小腸經薑黃 羌活 黃柏
足太陽膀胱經蔓本 羌活上行 黃
柏下行
手陽明大腸經升麻 葛根上行 白
芷 石膏下行
足陽明胃經葛根 升麻 白芷上行
石膏下行
手厥陰心包絡經柴胡 川芎上行 牡
丹 青皮下行
足厥陰肝經川芎 柴胡上行 青皮
吳茱萸下行
▲十八反 ハ相悪ム藥ハ若シ
ハ用テ與合スルコ
トアリ 牛黃ハ竜

牛夏　瓜蔞　貝母　白歛
白芨　烏頭　海藻　甘遂
芫花ニ逢バ愈タル病亦發
ス甘遂ト甘草ト反レ蜜ト全
蠍ハ葱ニ反ス石決明ハ雲母
ニ反レ藜蘆ハ酒ニ反ス人參
芍藥沙參玄參紫參細辛
苦參丹參ハミナ藜蘆ニ反ス
誤テ合スレバ毒ト𠮟リ人ヲ
殺ス

骨ノ惡ド𠮟竜骨ハ牛黄ノ得テ良ガ如シ互ニ相反スル薬ハ必ス大ニ忌ベシソノ害大ナリ

▲鐵氣ヲ忌藥

牡丹　芍藥　香附　茜根
龍膽　麻黄　遠志　何首烏
麥門冬　木瓜　雷丸　菜寄生
菜白皮　杏仁　茅根　五味子
知母　猪苓　石菖浦　皂角
山藥　地骨皮　桃仁　槐花
瓜蔞根　同仁　藜蘆　商陸
葵莉　石榴皮　雄黄

▲銅鐵ト毛ニ忌藥

玄參　皮豆蔻　益母草
地黄　辰砂　ハ銅ヲ忌デ
鐵ヲイニズ

▲犬ヲ忌ム藥

木香　薷香　丁香　乳香
沉香　白檀　紫檀　肉桂
柴胡　菊花　川芎　香附
龍腦　麝香　芎松　辰砂
見犬ヲ殺人
青黛　犀角　羚羊角
芒消　滑石　白芷　槟榔子
牛黃　薄荷　薰陸　胡椒
紫ホ

▲妊娠禁忌之藥

烏頭　附子　肉桂　天南星
半夏　巴豆　大戟　芫花

藁蘆　薏苡仁　牛膝　皂莢
牽牛子　厚朴　牡丹皮
桃仁
瞿麥　三稜　紅花　蘇木
麥芽　冬葵子　代赭石
常山　牛黃
蟹　鱔　龜　麝香　鮰
兎　雀　生姜　馬刀
諸肉　諸石藥

▲合藥科量之例

一分ト八十聚也二字ト八二分五
聚也二銖ト八四分也錢ト八十分
也二分ト八二錢半也兩ト八四分也斤ト八十六兩十ヲ又
古方二兩ト作フハ今十錢ナリ一
刀圭ト作フハ方寸匕ノ十分ノ

衆方規矩目錄一
一 香蘇 一牧目
二 葛甦 附苓 四補心
三 甦腹 七
四 九文 九
五 茗桔 十三
六 和腹 十六
七 升葛 十八
八 不換 十九
九 胃風 廿
十 神柴 廿三
十一 小柴 廿三
十二 八神 廿六

リ一寸四方ノ
方寸匕トイフ
リ○十撮ヲ
リ十合ハ升也
三合半ナリ
如トイフハ
如トイフハ胡
胡豆ノ大サ
豆ノ大サトハ赤小豆ヲリ梧桐
ノ大サトハ梧子四十粒ニアタル○
桂枝ハ厚皮ヲ削去テ半両ニア
タル○甘草ハ二両ニ當ル某草一
束上云ハ三両ヲリ一把上云ハ二両三
アタル○蜜ハ升ハ七合アリ煉テ
沫ヲ去テ十二両半ヲ度トス

十三 醫王 ヤクワウ 十七

十四 滋玉 ジギョク 二十二

十五 滋降 ジガウ 二十四

一 清肺 セイハイ 一牧目

二 九清 キウセイ 二

三 七清 シチセイ 二

四 參養 附 胃 サンヤウ 六

五 香養 カウヤウ 六

六 平胃 ヘイヰ 八

七 香平 カウヘイ 九

八 四君 シクン 十

九 香六君 カウリククン 十古

十 四物 シモツ 十五

十一 四調 シテウ 二十

十二 八珍 附 十全 ハチチン 二十一 大補

十三 二陳附加一味二陳同方枳縮二陳香砂二 十四
十四 五苓附加一味 二十六
十五 胃苓 二十七
十六 芍藥附調和參歸芍藥和中又方 二十二
十七 連解毒 二十四
十八 白虎 二十五
十九 理中 二十六

衆方規矩目錄三

一 七氣附大七氣一名四七牧目指迷七氣
二 加四七
三 分心氣
四 寬中
五 順和
六 通聖
七 烏順
八 八順
九 導痰
十 降氣
十一 小續
十二 大秦
二十六 分補
二十七 分消
二十八 補治
二十九 赤豆附牡方
三十 五皮
三十一 二八流
三十二 木流氣
三十三 木調氣
三十四 潰堅

十三 大防 十七
十四 加除濕 十七
十五 加潤燥 十八
十六 匀氣 十九
十七 騕活 十九
十八 獨寄 二十
十九 清化 二十
二十 清抑 二十二
二十一 沉天 二十三
二十二 清心化 二十五
二十三 逍遙 二十四
二十四 柴抑 二十六
二十五 溫膽 附一方又方 二十七 加味溫膽

一 升補 一版目
二 五香 附五香連翹 加味五香一乙兼。三兼。
三 承氣 調胃兼小兼。大三兼加味兼。
四 凉膈 四
五 十茹 五
六 清益 六
七 介類血 三十六
八 生津補 三十七
九 婆實 九三十八
十 垣瀉白 三十九
十一 加瀉白 四十
十二 升和氣
十三 洗肝明
二十四 滋腎明
二十五 通明利
二十六 通竅
二十七 加清胃
二十八 清凉
二十九 返魂 九七

十二 潤燥 十二
十三 五淋 十三
十四 八正 十四
十五 清心蓮 十四
十六 滋榮養 附參者 十五
十七 六黃 附當歸地黃者 十六
十八 清暈化 十七
十九 半伽定 十八
二十 驅風觸 十七
二十一 清解鬱 十八
二十二 椒梅 十八
二十三 疎肝 十九
二十四 通氣防 十九
四十一 導滯 二十
四十二 解毒 二十一
四十三 蘇和氣 二十一
四十四 催生 九方 二十二
四十五 補虛 二十三
四十六 芎歸調 二十四
四十七 消癖 二十五
四十八 消食 二十五
四十九 鎮驚 二十六
五十 醒脾 二十六
五十一 消痈 二十六
五十二 養老 二十七
五十三 羌活 二十七
五十四 加八仙 二十七
五十五 清熱除 二十八
五十六 清火安 二十八
五十七 豁痰 二十九
五十八 消痈 二十九
五十九 犀地 二十二
六十 芃羌 附芃防 二十二
方載書 二十二

目錄終

衆方規矩卷之一

香蘇散 一

治四時傷寒感冒頭痛發熱惡寒及內外兩感之證
春月宜用之探病

蘇各二 陳一半 甘草一

右入姜葱水煎服 ▲頭痛加芎芷名芎芷香蘇散專治氣虛頭痛 ▲頭如劈痛加膏葱 ▲偏正頭風加細辛膏 ▲太陽穴痛加薄荷膏 ▲傷風自汗加枝 傷風無汗

加麻黃▲惡寒加蔥加枝▲
熱加柴芩▲寒慄加枝▲
虛熱不退加參▲潮熱加
參芩▲咳嗽加桔會▲咳
嗽不止加半杏▲鼻塞聲
重加廓不和加桔▲胸膈
痞塞加梔實▲腹桑▲飲
加喬守▲食不化加枳
童▲腰痛不能俯仰加官
桂▲腹肚痛加蜜脾塞加
良薑菓▲水瀉即脾泄加
龍衍▲瘧疾加烘菓▲瘧
連去芽▲久瀉加
蛮訶▲身疼加芍
氣痛加索麪
發熱頭疼合不換金正氣
散▲感寒頭痛壯熱惡寒
身痛不能轉動合五積散
又或合敗毒散▲風濕脚
氣加槟瓜各一疎通氣道
名之檳蘇散▲春夏氣溫
腫而痛加五加瓜槟銘▲
濕氣周遊脚膝痛加忍冬
芍▲疝氣偏墜痛加發
增寒壯熱甚効加茴

我邊肉傷飲食外感風寒
夾食夾氣脇腹脹滿肘腋
疼痛頭痛身體發熱加麥
芎麻枳殼名行氣香蘇散
因濕又加蒼朮名二
大姜葱內傷飲食又加查
曲▲小兒傷寒夾食夾驚
四時瘟疫瘡疹加童葛名
香葛散▲婦人一切氣作
痛或上奏心胸或攻築脇
脇腹中結塊發渴刺痛肘
水因之不調或眩暈嘔吐
往來寒熱無間脇前產後

血皆治之加棗二枚一水一
煎服謂之正氣天香湯
按此方散氣快氣之劑
故耳鳴頭鬱目或頭痛
眩暈或咳嗽痰熱往來
或瘧寒多熱火或內寒
外熱或寒熱相半或腎
節痠痛臍腹作痛或水
腫上氣喘嗽面目浮腫
或浴溫泉中風氣逆上
而面赤頭痛等皆治之
▲避酒之人忌酒送之
胸或嘔或吞酸加荷行

▲若治酒積加棗姜塩或曲砂喬▲脚氣不腫而痛者氣痛也加栝呂
▲小兒瘧疾未成加升葛▲婦人足冷上氣或婦四五ケ月而腰下浮腫皆與本方得奇驗
▲蚘咬而發熱腫痛加連苓丹
一人頭痛嘔乾嘔或脇脇痛不止合升麻葛根湯取驗尒來治數奇人故名之香葛湯

治四時感冒發熱頭痛咳嗽停飲中脘痞滿嘔吐痰水寒中快膈不致傷脾一切發熱及內傷外感諸般咳嗽痰喘或欲成勞瘵益

陳ケ各一半 甘草各一半 麥門冬各一半 半夏 桔梗 枳殼 茯苓各一匙 生薑九分 甘草炙 人參 西 齊各一 柴胡 赤芍藥 蜜二味減半若有新病不用亦可

右入姜棗水煎服▲初咳嗽加桑杏▲久嗽加貝母▲喉中有痰口乾加門冬瓜蔞▲嘔逆加薑

砂▲脾泄加蓮肉▲頭疼
加苡仁細▲若感冒惡寒無
汗嗽嗽喘促傷風無汗鼻
塞聲重咳嗽益加麻杏▲
肺多有熱加杏苓桑皮▲
肺寒咳嗽加會永▲心下
痞悶或胸煩熱或停酒不
散或惰雜惡心加連實倍
用葛陳▲胸
▲氣促喘嗽加雷貝▲卽
血加梅門茅▲心盛發熱
加柴芩▲咳嗽吐血加升
牡蛆▲勞熱咳嗽久不愈

加雷貝門▲雉嫉傷寒去
守加泔▲陰虛痰嗽或吐
衄合四物湯名茯苓補心
瀉▲瘧疹但覺身熱似傷
寒疑似未明宜用之▲瘧
疹多寒甚初見紅斑不能
發起者亦用之
按四時咳嗽風痰膿痛
宜用之不傷脾胃進飲
食順氣殊感冒發散之
方也常去參蜜而服何
者參入手太陰肺經為
火見雜著心盛者去蜜

見必用故新病去一味加芩柴可退內外熱也雖然久病衛氣虛則加參宜順氣也心氣虛則加蜜宜連氣也▲表熱甚加蜜則間有斑出故七八日熱入裏妄語口乾脉數雖與解毒湯腹等而無驗故此方加芩連而與則表裏熱退便通而愈▲衄血七日面赤他療無驗予診脉浮數故加芍藥甘草各二錢貼全安▲瘧疾患於旅途熱多寒少兼咳嗽故加芩一錢得奇効▲喘促痰盛喉中如木雞加杏仁會▲勞嗽無汗潮熱五心煩熱加鼈甲▲小兒有痰嗽而虛弱加參或感冒發熱頭痛痰嗽喘促痞悶專用之▲一男三十餘歲咳痰泄瀉晝夜四五行口乾胸苦肌熱去守却

附

加婁物而取驗

秩宗補心瀉

治男婦血虛無汗潮熱咳嗽無顏色或心虛爲邪氣所傷吐血或心氣虛面黃痰血虛潮熱五心煩熱無汗或嗽唾血或婦人心胸雜或婦女經水不調吐血咳嗽發熱口乾喘急胸膈痞悶嘔吐痰水或婦人亡血過多或氣逆心悶月水不斷或女子血虛有汗潮熱者亦宜用之

拔血虛而胸跳或咳嗽怔忡咳嗽吐血或虛勞潮熱或勞熱如瘧或心氣不足面黃身瘦五煩熱或咳嗽唾血或汗怔忡或嘈雜或血斑血妊娠多證產後血敗暈

卜產

右入姜棗水煎服
轉筋加瓜▲腹痛加
寒痛加官▲冷甚加干
飲食不化心下痞悶加
砂一▲米穀不化加曲芽▲
肉食不化加香▲心下痞

加洞童▲中暗冒風加蓽
扁▲時氣憎寒發熱加
葛一▲發熱加
潤小便不利合五苓散▲
心腹絞痛加木▲若癪欲
登圊不通加枳▲寒濕相
搏霍乱轉筋煩渴悶乱合
連蕊散名之一香散▲感
風寒內傷飲食霍乱轉筋
吐瀉合五苓散轉筋不止
男以手挽其陰女以手牽
其乳此千金妙法▲夏時
受涼傷冷又飲食生冷傷

內頭痛身熱惡寒或腹痛
吐瀉若外感重去柴加葛
羌若內傷重加宿曲▲林
曰尸厥飛尸厥卒厥此卽中
惡之候因冒犯不正之氣
忽然手足冷肌膚栗起頭
面青黑精神不守或錯言
妄語牙緊唇不知人頭旋
暈倒此是卒厥客忤鬼擊
吊死及入廟登塚多有此
疾以藿香先灌之俟甦
以藿香正氣散加蚤星殊
驗

拔霍乱王方兼內外有
譽也殊治山嵐瘴氣之
第上也▲霍乱嘔逆去
芷加守姜汁最霍乱吐
瀉腹痛者必用之▲四
時感不正頭運嘗胃惡
寒發熱專用之▲夏月
泄瀉或傷食濕瀉俱以
兼腹痛者亦宜▲七情
過極逆氣運倒此名中
氣亦宜▲渾身拘急憎
寒喘嗽頭旨昏重加玄
杏堀梅得奇効▲出遠

方治心腹滿此方專
調榮衛利三焦行瘀濕
消脹脹▲腸胃受濕下
血不止加連梅有奇妙
▲瘧疾初發無汗服之
則必發汗而愈▲傷寒
感胃頭痛發熱而無汗
亦可也▲寢間風入於
口鼻中太陰則咽痛多
此方主之▲飲酒而傷
風發熱或吐逆亦宜

【四】敗毒散也

治瘟疫四時通用

九文湯

右人參水煎服此藥治傷
寒瘟疫時行風濕風眩四
肢痛憎寒壯熱項強聹疼
不問老人小兒皆可服或
嶺南煙瘴或卑濕之地腳
氣痿弱此藥不可缺衆人
病一般者加葛爲妙▲傷
寒頭疼身痛項強壯熱惡
寒口乾心中躁熱加芩▲
傷風鼻塞聲重咳嗽吐痰
加守杏▲頭自眩暈屬風

熟加守定▲眼目腫痛因
風寒所感加芎芷歸尾赤
芍去參芩▲酒毒發熱作
渴加葛連▲瘧疾不問先
寒後熱先熱後寒頭疼身
痛加蒼蒼果梹▲風熱濕
毒腰痛加續定苡瓜▲風
熱入大腸下血不止加桑
苨梅姜兼有蚵血加門若
因酒毒加連▲足三陽經
受熱毒氣流注脚踝上燒
赤腫痛寒熱如瘧自汗惡
風或無汗惡寒加蒼▲皮
膚瘙痒加蟬▲熱而紅腫
加瓜蒌▲大便實加虎▲
風熱上壅咽喉窒塞或痛
或不利生瘡或如肉齁痛
妨閉加芩守翹倍加桔時
行瘟疫下利赤白發熱口
乾身痛加倉米連姜棗名
倉廩散▲嗽不止加倉米
蓮▲痢後手足痛加瓜梹
▲臂痛冷起手甚難遂合
五積散加瓜瞞▲諸般瘡毒腫痛或
姜棗▲瘡疔腫發背乳癰瘰癧

等憎寒壯熱甚者頭痛拘
急仍傷寒加荊芸翹忍去
參名荊防敗毒散▲身生
瘡膿血譽腫極痛且癢或
風熱積毒發於面頭手足
如胭脂色加蒼赤芍升定
蟬苛門虵名乎血飲▲小
兒急驚風初起發熱手足
搐搦上竄天吊角弓反張
益一切感冒及瘡疹欲出
發搐加定全蝎蚕附錄▲
瘟疹疑似三日發熱加芸
荊定錄去參芩

按病人氣實者去參若
氣弱難運藥力者加參
▲四時不正瘟疫熱毒
鼻塞声重頭面腫痛加
參苛姜▲頭痛甚者加
薄荷▲如心經蘊熱口舌
乾燥加芩▲傷寒頭痛
發熱惡寒半表重半裡
輕者宜用之若半表半
裏則宜小柴胡▲無名腫物亦而痛所
有發熱世俗謂之風毒
腫若熱甚加芩可也在
上在
▲外科腫

物貼藥故毒氣不出而
周身浮腫者宜用此湯
▲一種患痢世俗謂之
腹痛病加粳米
與訶行則雖痢止而熱
不退此湯加二黃或芩
宜解散其藥毒▲腸風
下血及近血亦得驗▲
風眼目赤多血者用之
若甚腫痛加二黃或芩
連亦可▲下湯風邪等
風中浮血故赤甚此甚
痒加斤苛或伽芸荊著

灼蚯亦宜傳謂之加味
敗毒散此方宜用癮疹
▲痛風因風濕者百節
痛者脚氣痛攣煩熱者
俱得奇効▲產氣有內
難發出與此湯則悉發
出又因加減內消亦可
▲大頭瘟病頂面腫及
咽痛加力連▲小兒急
驚風加白附蚕▲小兒
啼則口眼斜順火腫
與此湯得數奇▲瘡疹
序病甚發熱與升麻葛

根湯其熱不去故此湯
加紫菀有奇効▲一人冬
月患痢無熱腹痛與芍
藥湯不効故慮感風濕
爲痢與此湯得奇效▲
或曰鼠咬加貝▲亢欲
與此湯者先試口氣熱
或骨節痛而可也

蒼桔湯　五

治感冒寒邪頭痛身疼項
背拘急惡寒嘔吐或腹痛
又傷風寒發熱頭疼惡風
無問內傷生冷外感風寒

及寒濕客于經絡腰脚酸
疼及婦人經血不調或難
産俱治之

蒼三朱圖　一朱六分　甲根陳
各二分　各八分　木各六分　片各
杜永分　芷桂守琴各四分　芎三分

右入姜棗水煎服▲胃寒
用烟禾▲挾氣加茱▲足
浮腫加五加腹▲遍身疼加
乳汁細▲巴戟風痺加羌
搖芸▲四肢濕痺合烏藥
順氣散▲腰痛加巴戟茴
手足攣拳加瓜蔞▲咳

嗽加杏雪▲婦人諸經倣
産加芟醋▲難産加艾桂
▲腹痛綿綿無增減因寒
者宜治▲腰痛感寒濕腫
胃氣閉加製▲寒濕傷腎
經腰痛不可俛仰加永嬰
▲感風寒濕痺腰痛或遍
身麻木者用之遍身壯熱
四肢骨節痛因虛寒者加
羌搖穿▲秋冬脚膝腫滿
疼痛因寒濕流注經絡加
瓜蒌根▲醉飽後色慾
不節觸傷小腹成疝氣其

疝自小腹痛連腰膀下心
頭昏痛額上汗出加索▲
又虛弱人中寒疝氣作痛
亦宜▲婦人遇經行時身
痛手足麻痺或寒熱頭疼
目眩去芎加羌桔藤姜葱
▲咳嗽加杏玄▲瀉泄去
和加行伽▲赤白帶下屬
虛寒加汝曲芙▲新產後
以此湯除敗血生新血無
寒熱之患去甲▲熱加琴▲
小兒痘疹天時濕寒不能
起發或紅斑初見者除桂

枳朮十三味慢火炒令攤冷入二一味加生薑水煎熱
服則爲實臕
拔夏至去甲此方除寒濕故有痛者必用▲頭
疼脅痛腰痛腳氣痛風等皆有發熱而足冷則與此湯可也▲寒
濕脾腎肝三陰而四肢百節痛有奇効▲因滯氣而腹脹筋張加薑▲寒
疝加吳▲因抑撲而血滯冷痛立得效▲冬月腰不立上氣面赤下冷
又腰已下冷如氷面上火熱背僧裁益甘▲婦
人兩腿痛甚有汗足稍冷加附三貼安▲婦人
淋病加車前可秘▲婦
人身冷經水不來者呵
▲赤白帶下屬虛寒有
痛加吳侯▲難產腰腹
甚痛時寒大加附得妙
又腰腹痛破水下未產
經宿亦得▲產後餘血
攻心或有冷塊攻心上

氣則取驗若無驗則正氣天香湯有大奇▲死脇腹痛大熱脉數加永附二貼而立下▲躰虛作瘧裏多無汗加桃果

和腹散 六 三和散也

治五臟不調三焦不和心腹痞悶脇脇脹風氣壅滯脾節煩痛頭面瘡浮手足微腫腸胃燥澁并高氣弱背脇痛妨飲食及脚氣攻胸腹滿悶大便不通

苓各一錢半 蘇瓜朧

泉各五分 陳橘木伽分 各一方加砂姜燈各一枚 玉

右煎服▲七情結五臟脾胃不利大便秘澁或脇背走痛妨飲食急者先當降氣加蘇滑莒拨治因滞氣而秘結者之方也▲能食而大便不通爲實秘宜三黄承氣之類不食而大便不通爲虛秘宜此方是氣滞故也▲老人之秘結或腹痛俱以氣不順故

與此湯而順氣則能愈
眞數得奇効▲脚氣不
腫而痲痺急疼痛宜此方
若腫痛宜芹粳痛湯傳同
見聞門若
九文蒼
滿上氣
大便不
氣而愈故無氣欝證則
不可用之▲治痰氣最
上方也單只連小腹痛
是也▲無病人遊山觀
水俄然胸腹滿悶卒至
肩頭而筋太強直且口
噤暈倒不知人事故細
阜未吹鼻延齒拑捺牙
通關竅與此湯而全安
▲頸筋強痛引兩脇而
脇暈不食身難動得大
驗▲腰痛難轉動而大
便祕滯得奇妙▲大抵
筋攣急則宜此湯是屬
氣滯故也▲或語曰脇
腸內有形如指物押之
則累累爲轉動與此湯
得奇術

治傷寒頭痛時疫惱寒壯熱肢体痛發熱惡寒鼻乾不得眠兼治寒暄不時人多病疫作緩脫衣及瘡疹已發未發疑似之間宜服

葛三両 芍 甘各二

右入姜煎服▲頭痛加葱▲咳嗽加桑▲上膈熱加芩苷▲無汗加麻▲咽痛加桔梗▲發黄丹毒加豉▲癮疹者紅點如蚤嚙之狀宜此湯▲小兒傷風身熱頭項強自汗表不和加芩▲瘡疹一見苗不可服慎之▲冬月加蘇八分▲四一肢麻冷加枝一半▲腰痛當脚知是瘡加枝一多半▲時氣發熱太甚乃毒氣盛加升麻半斤按治癮疹最上方也▲八九年已前六七月間天下人民多患紅斑摩之則當手不痛不癢頭痛發熱惡寒合二貼而皆愈尓以來逢此證則立得奇効

矣▲當世人多患小瘡甚痒故合毉腹散而與之則俄沒然發痰喘心腹強須臾而死矣遲與不遇勿履覆轍

不擦金 〔八〕

不擦金正氣散也

治四時傷寒瘟疫時氣山嵐瘴氣寒熱往來霍乱吐瀉下痢赤白若出遠方不伏水土者宜常服之

蒼朮 陳守 藿 甘草 右入姜棗煎服▲頭痛加芎藭 芍药▲感寒腹痛加姜官▲潮熱加柴芩▲嘔逆加香砂▲口燥心煩加柴葛▲氣堪加枳實不止加木評行▲熱極大便不通加虎苦▲瘧疾加恒山果多▲痢疾加連翹去耳▲胸脇脹滿加實砂我▲咳嗽加桔杏會▲喘急加麻黃桑▲腹痛加芍▲濕痘聲啞加菖▲寒痘聲啞加官▲膀胱非受濕

下血不止加連梅▲小兒
感冒風濕頭目昏重時發
壯熱宜此湯▲傷濕重著
骨節疼痛淅淅咳嗽加瓜
蔞守之方
胃散加藿
按平胃散
也是乃辟瘴之劑故遊
官四方水土不伏或旅
途中可服未病之先也
▲伊勢參宮後瀉痢帶
血腹痛心張加茱萸蜜
炙後憎寒發熱上
桃▲旅
吐下瀉兩腿痺四肢未
冷無汗口渴夫等此加

胃肉桂附子各一▲四十餘日
下血不止加芍藥連五
味而愈▲新久諸瘧加
柴苓童苓澤瀉果梅
治風冷乘虛客於腸胃水
穀不化泄瀉腸鳴腹痛及
腸胃濕毒下如豆汁或下
瘀血又曰風瀉者瀉而便
帶清血脈浮弦
參 附 苓 芎
芍 桂
右入粟煎服▲腹痛加木

按古今傳所謂下膿血則專用此湯也▲腹痛瀉痢如膠血後重窘迫故倍咸半加木瓶得數奇下肅則▲老人曉瀉二三行腹微痛脉緩加砂▲小兒瀉下如豆汁腹痛身熱去桂加柴胡▲產後當風致泄瀉冷▲產後腹痛宜此湯▲或語云冬月之脫肛下血加木此效術也理最可然

十神湯 十

時令不正癘疫妄行或感冒發熱憎寒頭痛身痛無汗或欲出疹此藥不開陰陽兩感益治之

麻　葛　甘草　赤芍藥
右入姜煎服　蘇　陳皮　芎

加芩▲中滿氣實加枳▲心腹脹滿加實守▲潮熱加芩門▲咳嗽喘急加桑桔守▲大便閉加虎芒▲嘔吐加薑守▲泄瀉加术苓▲瘧疾加果栀▲痢病加枳

連▲腹痛加芍▲發熱頭痛加細膏▲飲食不進加砂多▲嘔逆加喬果▲衄血不止加梅蒼▲疹毒加官參芩▲拔此方芎芷香蘇散合升葛湯加麻故專要在麻黃一味矣▲感冒風寒者發熱惡寒咳嗽頭痛甚而無汗者宜此湯▲傷寒否熱久不退且汗不出口乾頭痛是斑可出之證自與此湯間斑出而熱退也是乃醫術有功者所為矣予發歲墳見一病人其證肌熱久不退且無汗口乾頭痛故與參白虎湯則一二貼而死天刑難逭者也▲東井療婦人頂筋強急而腹脹去麻加蕎得奇效不可以來有數奇

小柴胡湯 十二

治傷寒四五日往來寒熱胸脇痛心煩嘔吐頭疼耳聾大便秘此在半表半裏也

柴二多半　芩參各一多
牛八分　芎五分
右入姜棗煎服▲小便難
潮熱腹滿加芒硝一多▲下後陰
虛生熱脈微惡寒去芒硝加
芩二多腹痛赤然▲嘔而發
熱胸脇滿小便不利去黃芩
加芩半多▲飲水過多成水結
胸去棗加蜈一多半▲往來寒
熱咳嗽胸脇痛去參棗加
牛蒡一多▲身熱不渴去參加
枝多半▲心中飽滿加枳桔一
心下痞滿加連實▲一夜靜
而晝發熱者熱在氣分加
丹連雷鑰▲晝夜發熱者
熱在氣血之分合四物湯
加連丹▲下利脹身熱挾外
感者必惡寒發熱煩渴身
首俱病此在表去參棗加
葛苄陳赤芍姜得微汗愈
▲傷寒陽症多逆潮熱加
陳茹姜▲伏暑發熱汗渴
暑入心胞不語加芩▲癘
熱多寒少或單熱頭痛胸
滿咽乾宜此湯去芎加參

括▲瘧發寒熱作渴病在
表神陰陽不分者合五苓
散名柴苓湯▲無汗加麻
▲有汗加桂枝▲寒多加苓
▲熱多加葛▲口酸而苦者
肝膽有實熱加瀉黄芩▲加
膽熱而口苦者謀慮不決
也去半夏加酸棗遠▲由酔
飽房勞而後大怒觸動榮
血致吐血者加二朮▲發
後發熱煩躁加龍骨牡蛎
▲産後惡露下忽然斷絶寒
熱往來晝靜暮劇語言狂
亂如有鬼神此熱入血室
而顛狂加桃▲産後虚羸
寒熱飲食少腹脹加陳皮
乾姜棗▲小兒感寒發熱
或作瘧宜此湯▲瘧疹出
不快身熱甚者加地▲傷
寒百合病加雷百合茯苓
▲本方去參甘加乾地黄各二
寶一入姜棗煎服名之大
柴胡湯治傷寒十餘日不
解大便不通身熱煩躁譫
言妄語此乃攻裡劑故以
利爲度如身体疼痛者表

證未解不可服之▲倍加
芍虎名敷和湯治腹痛太
便結小便澁喜飲冷以手
按之痛轉甚手不可近或
胸手熱腹脾熱
按大柴胡敷和宜實證
不宜虛證小柴胡傷寒
和解之劑也▲夏月發
熱煩渴小水不利兼傷
寒陰陽不分疑似之間
着去守加門會連▲下
痢赤白腹痛身熱加芩
如兼惡寒亦得▲熱
嗽咳冷水而輒止者加
桑木▲煩熱加門▲瞥
臥減食加朮▲多而寒
寒熱不調作腹痛去芩
加芍▲俄耳聾而頭聲
冒合香蘇散百發百中
▲發後發熱煩悶加連
丹得奇妙▲陰囊濕痒
加柴童此乃通肝經故
也▲男婦
或痛加連丹▲大飢發
熱大食傷胃已成黃疸

其候食則腹滿眩暈或
心中怫鬱不安加實朴
丹▲婦人傷寒經水適來
適斷發熱惡寒夜則譫
語此爲熱入血室故寒
熱如瘧宜此湯小柴之
人發熱惡寒入夜譫語
亦宜

八解散 十二

治傷寒感冒頭痛身熱惡
風多汗嘔逆惡心

參 苓 伽 陳
藿 朴 半 甘

右入姜棗水煎服
按此方溫劑也傷寒及
諸病之肌熱以寒劑而
不退則與此方而其熱
退是乃熱因熱用爲秘
中之秘矣▲他家去參
加朴名萬安湯是以退
諸病之肌熱也▲灸熱
食熱等亦可▲醫王證
輕用之▲頭疼發熱体
倦或舌强不能言語是
乃有傷裘與中風之疑
則宜用之▲風勞多汗

或勞傷避度怠惰自汗
或飲食無味或嘔逆惡
心俱以取驗▲感風寒
頭痛壯熱無汗則加羌
去參▲煩頭及咽腫痛
津唾難呑加桔梗升▲
咳嗽加酒▲脾胃虛而
瀉除朮
治中氣不足飲食勞倦清
氣下陷以致脾胃虛弱發
熱頭疼四肢倦怠心煩脈
洪大加甘草連消其腫加參
氣退虛熱補脾胃生氣血
甚一分 參 仍各七分 芹
陳五分 柴 周各三分 芎
右姜棗煎服▲頭痛加葛
▲痛甚加芎▲頂痛腦痛
加本細▲諸頭痛俱用此
四味足矣▲痰厥頭痛加
半夏▲額疼加芷葛▲
善嚏者滕理不容外邪所
搏加芷芎▲耳鳴目黃煩
額腫頸肩臑肘臂痛面赤
脈洪大加羌芸本芎通其
經血加芩連消其腫加參

芪益元氣▲嗌痛頷腫脉
洪大面赤加芩芎桔▲口
乾嗌乾加蒼▲夏咳嗽加
會門▲冬咳嗽加麻不
秋涼亦加桑玄▲久病瘀
熱▲嗽加參▲食不
嗽肺有伏火去參▲食不
下乃胸中胃上有寒或氣
滯加童寄陳▲如冬加
益漏▲如夏加芩連更加
梹榔砂多▲春初猶寒加
益漏▲心下痞悶加芍連
痞腹脹加實朴▲寒
加永或桂▲心下痞覺中
寒加附連▲不食而痞加
姜陳▲能食而痞加連實
▲脉緩有痰而痞加守連
▲脉弦四肢滿便難而痞
加連柴芎▲腹痛加芍芎
▲如惡寒覺冷痛加桂夏
腹痛不惡寒不惡熱加芩
芎芍▲寒瘧時腹痛加守
益漏▲脇下痛或脇下滿
急加柴芎▲臍下痛加芎
如不已者大寒也加桂▲
▲虛勞發熱去周加守芩

苓干錄會▲陰虛火動加梔
雷飲酒人元氣虛弱無力
飲食減少面紅加守炒苡
曲芽枳▲便閉加鬥▲大
便閉加黃紅麻仁▲元氣
虛弱腰痛加梔雷膝炒夢
遺加蛎竜▲下部無力加
膝牡▲脚弱加瓜離泄瀉
加炒澤苓一汗多去升柴加
酸夜間不睡亦如之▲精
神短少加參會▲用心太
過神思不寧或恠怖驚悸
加神遠酸棗柏子▲大病
後元氣未復而胸滿氣短
加陳實炒▲男婦骨蒸勞
熱加炒會▲內傷氣虛自
汗久不止加附麻根浮麥
▲十指盡麻此氣虛也加木
皆麻此氣虛也加木
羌芸葵▲咽喉腫痛口舌
生瘡勞而愈盛是屬內傷
不足加炒酒雷柱▲中氣
不足脉虛微氣不相續而
發熱加參關會梢以降陰
或少加附▲氣虛有汗潮
熱者或肉傷發熱者益宜

▲婦人因勞耳鳴頭疼身倦此氣不足加門玄▲孕八ケ月腦下墜或動面黃体倦飲食少此脾氣虛弱宜再加藁棟三十餘劑而安▲婦人每交接出血作痛此肝火動脾用此湯而痛出血不止

▲愈金瘡腫寒熱口乾此氣虛血無所附加玄門▲小兒諸痺癖塊久治不愈多服尤効▲瘧癰結痂而誤犯風寒惡寒發熱尤宜▲酒慾過傷而成淋者用此方補元氣則水道運行故淋不作矣

按治內傷不足清氣下陷之方也發熱頭痛發熱四肢倦怠而時時憎人且應之不食頭痛發熱四肢倦怠而時時憎人且重其證生脈散爲肺塞而已爾次來察脈與眼精而知可與醫王之法矣洪大而數緩大而無力急大而數時一澁是乃心脾肺之虛脈也眼色見蒼豬虛然無精是

共所爲也▲一切病後元
氣未復晴無晴脉虛大
則宜使加減消息而調
理矣▲傷寒愈後因勞
力再發其症頭疼身痛
寒熱往來腰腿酸疼洪
困無力加梢羌芸若未
効則加附運補藥力也
名之加味益氣湯▲傷
寒愈後爲沐浴感風再
發熱元氣虛宜加味益
氣湯▲傷寒愈後元氣
未復於是犯房勞則必

小便濇肌熱流困加附
得奇効▲平素不足兼
勞役內傷被風寒暑以
致瘧疾寒熱交作肢体
倦怠加芩芍守▲痢疾
久不愈不能起床不食
疲弱之甚者加沸蚕砂
卯去柴▲婦人風毒腫
愈後上下流注而腫痛
体瘦之人力發熱不食與
此湯腫痛在上加羌下
加羌而得愈按其流
注者初爲發散不足之

故數▲金瘡膿痛其口
開則此湯尤宜若其口
閉則宜用茯苓補心湯
也癰疽亦然▲內傷氣
虛盜汗不止兼乾咳肌
熱加酸門芎桔▲予之
父八十歲時冬月大小
便不通莖中及肛門若
痛數旦不勢故久氣海
翌朝小腹腫起三十寸許
二六穴痛益甚於是予嘗
然以醫王煎汁與六味
丸則頃刻小水通至夜
燥屎下終四五日而安
▲一男面龐鼾睡香臭三年予以爲腑
聞香氣虛加門丹而愈▲半
產氣虛下血不止昏暈
不知人事加芎▲產
後下血不盡與芎歸湯
四物湯之類不止故用
此湯以得奇効諸下血
崩漏帶下等亦見氣弱
体倦則亦當與此湯▲
或訛云痛風節痛加
本羌芸七仲若痛止則

去加味可用本方也

滋陰至寶湯 十四

治婦人諸虛百損五勞七傷經脉不調骸体羸憊此藥專調經水滋血脉補虛勞扶元氣健脾胃養心肺潤肺咳清頭目定心悸安神魄退潮熱除骨蒸止喘嗽化痰涎收盜汗住泄瀉開胸膈療腹痛解煩渴散寒熱祛体疼大有奇効不能盡述

滋陰至寶湯

熟地黃 當歸 俱酒洗 川芎 白芍藥 酒炒 人參 白朮 炒 茯苓 甘草 炙 各八分 半夏 湯洗七次 陳皮 各三分 生薑三片 煎服

右入煨姜三片 煎服

拔虛勞熱嗽有汗者宜茯苓補心湯是乃表裏之方也即逍遙散爲加味之方也婦人虛勞寒熱逍遙散不効則與此湯有數奇也▲男子虛勞症欲與滋陰降火湯者先用此湯有得安全

治陰虛火動發熱咳嗽吐
痰喘急盜汗口乾此方與
地黃丸相兼服之大補虛
勞神効
沂 沂水 各一分半 天
麥 伽 伽藍 各一分八分 陳七分
甘草 各五分 半夏
右入姜棗煎臨服加竹瀝
童便姜汁少▲骨蒸勞熱
加鱉柴▲熱不退加芪酸▲痰火
▲盜汗不止加芪酸▲痰火
咳嗽氣急生痰加桑皮苓
▲咳嗽痰帶血者難治
▲咳嗽無痰及喉痛生瘡壹
嗽者難治加半夏貝母杏
桑皮丹▲咳嗽痰多津液
生痰加貝母▲痰火作
熱煩燥不安盜汗痰火怔忡
嘈雜加酸丹連茹辰瀝▲
痰火驚惕同上治▲血虛腰
痛加膝仲▲血虛脚腿拘
細痿弱加芪膝離仲去天
▲夢遺泄精去天加預蜘
仲膝紙▲小便淋濁去芍
加車前蓄膝丹▲陰虛火

動小腹痛去麥加茴木瓜
▲陰虛火盛足常熱去麥加
丹滕▲陰虛火動而喘急
者加軾沉桑源▲陰虛火
動而咳嗽加芎定丹源▲
煩渴引飲小便如膏名之
下消乃腎火也去芎加瑞
仙丹葛連梅▲瘦人虛火
患赤白濁去芎加木薢丹
蓄▲膀下氣上發咆者陰
火也加秫曲沉不丹辰柿
弗 虛性人陰虛火動小
便不通加豬澤通滕▲腎

經陰虛火動失血發熱盜
汗咳嗽痰喘心慌口乾是
出火證▲陰虛發熱者是
陰血自傷屬心腎▲酒色
過度陰虛火動勞嗽寒熱
盜汗痰多午後至夜嗽甚
或火嗽有聲痰火面赤身
熱脉數皆宜二陳本方二
劑▲吐血後
見痰是陰虛火動宜此湯
按陰虛火動勞瘵之主
方也一應發熱痰嗽自
汗口乾者與之而動惱
人只與元氣虛損之極

可故察脉宇眼色而立
可與滋陰降火湯矣脉
細數而無力細弦而數
數大而虛是也眼情清
冷如肅然有悲是也大
抵陰虛症證秋冬令故
顔色青醒眼中清冷惡
寒發熱口乾壹濁兼以
咳嗽故間葛甦散加杏
會以有退其症者若不
退當宜此湯二人陰虛
發熱咳痰盜汗口乾心
慌加遠返酸▲發熱盛加

柴籐▲嗽盛加會麩▲痰
盛加貝母▲酸蛎▲胸不快加陳▲泄
瀉加蓮陳去和雷▲心
煩退則去遠酸如此加
減而半歲得愈▲午後
潮熱盜汗大府結小水
赤照加減絕三月而安
▲乾咳無痰盜汗壹嗽
脬熟小便赤以加減煎
湯與六味丸百日許而
安▲吐血止而後惡寒
發熱盜汗痰嗽壹濁照

加減一年餘而安予療
此證生者十得二三▲
産後虚勞四肢煩熱咳
嗽口乾盜汗與此湯得
奇効▲老尼咳嗽發熱
痰迷心竅而怔忡加酸
棗二十三貼而安▲小兒
尾骨節痛加桂爲引而
安▲或語曰降火症虫
出攻胸咳嗽用七味清
肺湯則虫下咳止▲又
云降火湯症熱難去則
合大七氣湯而可
功▲又云此症有積聚
者合大七氣湯而可

衆方類苑卷一終

清肺湯 一

治痰火咳嗽面目赤身熱咯血紅痰

苓 陳皮 芍藥 半夏 丹皮 茯苓 桑白皮 麥冬 杏仁 甘草 阿膠 梅花 各等分

右入棗煎服 喘急加軽粉

去天 ▲一切咳嗽上焦痰盛及久嗽不止成勞加會杏貝 吉濃姜去芍地茯苓 ▲久嗽虛汗多去茯苓梅

加會仰姜一▲久嗽喉痛一
不清去膠加桔苻瀝姜▲
嗽而痰多去芩菀膠芍加
會貝桔仰金沸▲咳嗽身
熱加柴▲咳嗽午後至
發熱去芩膠加柏瀝▲痰
咯不出去會膠加婁實瀝
咳嗽痰結胸痛去地膠丹
加白芥蕪實砂木苗柴會
杏一瀝一
按此云此湯治先吐痰
而後見血者是積熱也
滋陰降火湯治先吐血
而後見痰者是陰虛也▲
久嗽不止痰
細緊而數去芍地膠加
桔貝杏▲久嗽不止痰
中帶血加杏貝童桔

九清肺（二）

治癆瘵脈
或熱多寒
發先服祛
柴芩
童守
右入姜煎服
按治瘵第一方也熱多

九一味清肺湯也

寒火或寒熱往來而頭
痛口苦咽乾小便赤或
澁脉弦數者此之證也
若不可鑿用截藥▲傷寒寒熱往
來口苦熱不退者與此
湯得尋効實勝於小柴
胡湯▲一婦人發熱戰
慄鼓齒晝夜三四次熱
退而後頭痛與此湯而
愈又且有兼惡寒者也
▲産後寒熱往來咽渴

不食泄下與此湯而安
▲瘧痢兼作頭痛惡寒
發熱咽渴脉大數雖柴
苓證而却與此湯加枳
而安▲諸瘧不論新久
其驗如神去伽加蒼陳
藿澤瀉梅入姜煎未發
前可服▲久瘧加桂▲憎
寒加枝▲體弱加參▲無
汗加麻▲有汗加官▲
夾食加泼▲渴去芩加
參括蔞根▲有痰加貝
母

七清脾湯 三

七味清脾湯也

治因食傷脾停痰飲發爲寒熱
杜梅子 童
良各二 果多 芦五分
右入姜棗煎未發前服
被古人用此湯治脾瘧食瘧今予連年以此方治因瘧而虫攻上心胸寔去耳餘皆治虫之劑也大抵瘧欲發時有羞上胸物是當虫先用九味清脾湯退熱而後七味清脾加槟可服發虫五更必有奇効▲因寒發熱脉緊用葛甚故與此湯而散則爲嘔安▲勞嗽乾咳壹嘔用滋陰降火湯則支脯不食故因虫與此湯得奇功今被是遇中否雖然切切依有驗而記之

人參養胃湯 四

虛人患瘧者養正則邪自除也外感風寒內傷生冷

憎寒壯熱頭目昏疼不問
風寒二證夾食停滞俱能
治之

蒼朮 守谷三陳七各 霍
果苓 各五分三 甘草一
右入姜棗煎服▲寒多加
官桂熱多加柴▲汗多去蒼
藿加芪伽▲飽悶去參加
童砂▲渴去守加門冬▲
渴加芍伽▲渴不止去朮
果加衍▲嘔噦去果朮蒼
加砂伽頭炊米▲痰多去
守菓加貝瀝▲内熱盛去
守加芩▲蒼朮盛去守藿
加蘭扁

拨不換金 加參苓菓梅
之方故寒多熱火或酒
浙寒熱而瘧疾傷寒感
胃疑似之間最可也今
察方中有平胃散治胃
瘧有二陳湯治痰瘧殊
塑二陳湯治痰瘧殊
可與此湯也▲咳嗽惡
寒發熱用蒼朮散九文
散而不驗則此湯去參
加會桑得奇効▲婦人

赤白帶下酒酒而惡寒
翕翕而發熱咳嗽無汗
或潮熱與小道遥散而及
下多血故此湯加芎歸
得卒効▲産後三十日
計惡寒發熱而青不食
自汗脉數道遥散不驗
與此湯而全愈▲諸病
後有洒洒憎寒或潮熱
者必可用此湯
付
類胃湯
治脾胃虚嘔逆惡心腹脇
脹痛腸鳴泄瀉或寒熱如
瘧骨節煩痛
藿朴守芩各一錢 菓附
陳去白參各七分半 伽五分 生火
右入姜梅煎服▲心下痞
滿而不能食去果參附加
茯砂木實多芩瘦人去守
加連▲肥人加蒼▲食積
去伽守加曲查芽▲血虚
去守加芎▲氣虚去守
加參▲痰膈中滿去伽守
加蔞貝枯礬▲脾泄中滿
去守加倉芍
此方在內傷不足按先

方去砂仁加附伽也尋常去附代泼而治老人小兒之瘧疾則十得八九奇效

治脾胃不和不思飲食口不知味痞悶不舒伽一名泼砂蒼朴陳皮各八分多分七分參蜜各五分右入姜棗煎服▲脾胃寒加永官▲肉食不化加查果▲米粉麵食不化加曲▲生冷瓜菓不化加葱

永▲胸腹飽悶加枳腹萹▲傷食胃口煸加木實益▲傷食泄瀉加永梅伽▲傷食惡心嘔吐加藿香守梅永

按此方平胃散合四君子湯加砂泼多蜜故除濕痰補脾虛進飲食矣于與此方則連年有試胸滿清冷而不食是所以脾胃虛冷而不和殊胃中有寒痰也雖諸病而胸清冷而不食則止

本藥用此方進飲食且
又與本病藥也若此湯
有支胸者可與枳茂之
類丸藥矣▲久瀉日夜
五七行胸冷不食呵渴
參苓白朮散不効用此
湯得奇效▲老男心腹
痛全不食脉平和服藥
皆吐數醫束手予謂是
胛胃虛冷此湯一貼而
吐止五貼而食進得奇名
▲婦人不食胸悸而冷嗌
暈足亦冷沉香天麻湯
不効故與此湯而愈

平胃散 六

治胛胃不和飲食不進常
服則暖胃消痰

蒼朮 陳各五 甘草三 各

右入姜棗煎服或爲末塩
湯點服亦可也▲瀉胛濕
加苓喬伽名調胃散一法
加藿守▲痰嗽嗽疾加守
瘧疾寒熱加柴▲本臟氣
痛加薑▲水氣腫滿加桑
▲婦人赤白帶加芪▲子宮
久冷加桂▲酒傷加喬▲

飲冷傷食加良▲滑泄加行▲小便赤澁加苓澤▲風痰四肢沉困加薏▲腰膝冷痛加膝▲急加籐▲脾胃困弱不思飲食加茈參▲白痢加芎赤痢加連▲頭風加本▲胃寒嘔吐加薑苓喬▲氣不舒快中脘痞塞加菠砂薑▲胸中不快心下痞加枳木大便硬加虎芒▲週夏加芩炙脈洪大亦加芩連▲小腸氣痛加鈴苗▲週雨水濕潤時加苓澤欲進食加曲芽吳萸蜀椒永名吳茱萸湯治傷寒吐痢加本名和氣散加本桔名和解散治傷寒吐痢瘧疾寒熱者加柴▲飲食不進身体沉重肢節酸痛皮膚微腫米穀不化腹脹本方

一兩　桑炒　一兩　入姜名對金飲子▲積堀屬熟者合小柴胡湯加童枳曲查稜我名柴平湯▲關格吐逆小便

不レ通者合レ
按治脾濕之方也▲飲酒
太過小便不レ利或發レ黄
合五苓散加茵得奇驗

治二宿食不一レ消飲食自倍者
是乃脾胃傷也
蒼朮 各一斤 陳皮 各一斤 枳殻
厚朴 各八兩 砂仁 木香 甘草 各五
分
右入二生姜煎服一肉食不レ化
加二查果一▲米粉麵食不レ化
加二曲芽一▲生冷瓜菓不レ化
加二永童一▲飲酒傷加二連蔔一

梅▲吐瀉不レ止去レ枳加二苓
仰守レ梅▲呑酸吐酸去レ枳
木加レ連炒丹芩芍辰▲右脇
服熱藥過多後呑酸加レ連
炒▲食欝而嘈雜去レ枳霍
加レ連炒丹芩芍辰▲右脇
下有レ塊作レ痛飽悶者食積
也去二霍香一加二青皮一查芽永梹
▲腹痛甚而瀉後痛減
脈弦是食積也先用二備急一
圓而下レ之後用二此湯一
按治食積之方也▲腹
痛而瀉瀉後痛減去霍

加朮查曲官永得數驗
一婦人噯氣作酸每夜
寢間不覺浸二尺白布
六七胸腹飽悶或痛惡
食不思二年大抵去穢
加朮查芽曲永尚隨時
加減經二年餘而安殊
去臟生一男也

四君子湯 八

治脾胃不調不思飲食一
切補氣之本藥也
參五分 苓 伽各十 甘三分
右煎服或入姜棗

加陳守 ▲吐瀉加藿多 ▲嘔此加橘砂 ▲泄瀉加木衍 ▲脾胃虛弱加官斤氏 ▲咳嗽加桑會杏 ▲心煩不定蓮 ▲發潟煩口潟加參芪 ▲胃冷加喬附砂 ▲脾困氣短加木實砂 ▲胸膈喘急加實守朴 ▲風塞邪熱加荊芩潮熱往來加西芍 ▲盜汗不止加芪炙 ▲小便不

通澤通猪▲大腑閉塞加
梹虎一▲水瀉不止加木訶
衍▲遍身痛加赤芍柱一▲
四肢惡寒有熱加麻枝一▲
氣痛加茴索斤▲氣堕加
穀莪茴菽▲腹痛加永赤
芍官▲小兒疹出未成者
加升葛一▲婦人難産加百
草麝芷▲暴死有疾壱者
名疢厥加瀝姜汁▲手足
癱瘓或右半身不遂亦然
▲陽虛不任風寒体弱脉
芤者加附▲脾胃元氣虛
弱久泄少食加預蓮多桔
梗▲孕婦作淋者加斤芍一
▲五六箇月加升▲八九ケ
月加遍腹▲新産後宜調
理脾胃加陳藿砂芷姜棗
小兒慢脾風加附厥冷亦
然▲交構吐乳眼慢糞多
穢氣乃父母交合時喫乳
所致加藿木▲瘡疹欲出
未出而吐利者中焦停寒
或宿食加砂陳▲色瘡加
扁芪一▲脾虛而不生血加
斤伽一炙▲加陳茗異功散

治久嗽不已或面腫氣逆等▲加陳守
名六君子湯治氣虛挾痰
因之發飽亦可▲若見內
熱或飲食難化作酸屬虛
火者加炮姜其功甚速▲
若肝木侮脾胃而致虛損
者加木芍▲若因脾胃虛
寒而致食後飽悶者加茯
苓砂是名香砂六君子湯
▲過於飲食胃氣自傷不
能運化而昏冒謂之食厥
先用姜鹽湯多探吐之而
後加茯砂木入姜棗煎服
▲去守加預慧澤連名衛
生湯治脾虛氣弱蘭門元
氣不足不別水穀▲加藿
村名八解散治例▲加芪
斤苦陳守定桔並入姜棗
煎服名之加減四君子湯
治肥人頭眩者屬氣虛濕
痰也▲加蒼朮陳姜名
增損白朮散一切病後服
之生津止渴順氣下痰▲
加預桔慧連為未棗湯
下名曰參苓白朮散治脾

胃虚弱飲食不進或嘔吐瀉利其人大病後補助脾胃
此藥極效▲加葛藿木名白朮散治積痛和胃生津止渇頻瀉利將欲成慢驚風者服之訳効若有虫加喬▲加桔梗細苛名惺惺散小兒外感風寒鼻塞痰嗽發熱痘疹縷蒸疑似之間皆宜服
拔盆脾助胃之主藥也
▲夏月慮渋渇時時眩暈晝夜飲水三斗餘加藿木葛舌與數前常令口足癰瘍言語蹇澁加童便一盃而安▲辛酸手止陳萎名之八味順氣散尚熙加減求數驗

治脾虚不思飲食食後飽悶
莎伽苓守陳多砂朴各一參木益甘各五
右入姜棗煎服傳方六一君加薤砂
▲胃口有寒嘔吐不止去木益加喬藿名藿香安胃

湯▲脾瀉者食後到飽瀉
去卽寬脉細去守多木益
加芍薬煎服▲
腹痛去參頽入姜梅煎服▲
加二永梅▲
車▲嘔噦惡心加藿守▲
復月加連炒扁▲冬月加
永去芩
按此方治因脾胃虚寒
而致損傷者矣不專治
例一切所以得奇効也去
守益加木茅則前所謂
香砂養胃湯

治血虚發熱或寒熱往來
或日晡發熱頭目不清或
煩燥不寐育瞤脹或脇痛
一切補血之本藥也
仁
芎 芍 芍
右煎服▲加仲冬柴胡治
肝脾腎血虚發熱屬血分加參仲▲午後
如熱從足邊起者肝火加
▲實則加減用▲虚則加
參仲芪▲熱從脇下起者
陰火也加參仲梔雷會門

桂▲夜發熱加雷桐連丹
牡柴▲晝夜俱發熱合小
柴胡湯加連丹▲血虛無
汗潮熱合葛麪加姜棗或
女子血虛有汗潮熱者亦
宜之▲瘦人中風屬陰虛
火熱加膝芩桐▲尤半身
不遂手足癮疹加赤紅澁
姜汁▲多思慮以致血虛
五更時嘈雜加莎丹連貝
▲血虛陰火沖上頭痛加
酒潘泠蔓連丹▲膊下虛
冷腹痛者本方六加索練

各一分半之四物苦練湯▲
因徃閇跌撲致死血流本
經而腰痛加樂▲房勞而腰
痛加雷桐會仲▲鼻血加側
柊散▲下血因寒久不愈
加升永椶灰▲血痢加膠
朴艾▲大便秘結加嬰兒▲
小便秘澁加澤通▲血氣
痛五心熱加婺官▲五心
煩熱加芩柴籐百合▲口
乾煩渴加門葛梅▲咳嗽
加栄杏麻▲頭眩加羌細

▲不思飲食加砂多薑▲
面色痿黃加陳茨姜▲心
氣不足恍惚加遠酸辰▲
盻痛不睡加膏參淡竹葉
▲金瘡出血過多加參芪
▲經水崩來作痛者血實
氣滯也或心腹連腰作痛
加連茨奠紅索牡茂薑▲
過期不來作痛者血虛有
寒加乾紅茨桂茂通方芪
先期來者血虛有熱加芩
茨連膠栢雷芓艾▲過期
而來紫黑成塊者氣鬱血

滯加乾紅牡童茨索芓▲
經水去多久不止發腫滿
者胛經血虛加木芩砂陵
木陳朴軟猪通茨索膝芓
▲經水月久不行發腫者
瘀血滲入脾經加乾紅牡
永桂枳木茨膝索去芓下
▲先期而至血紫有塊腰
腹痛手足冷痺口乾頭眩
加芩荊茨甘索續仲卯芓
▲錯經妄行於口鼻者火
載血上氣之亂也加芩丹
犀膠芩門陳▲經水行後

作ル痛者ハ氣血虛合四君加
赤芍炒▲過期而來色淡者
痰多加陳守苓甘姜▲適
來適斷或有往來寒熱先
服小柴胡後以此湯和之
▲肥白人經水過期者痰
多用二陳加星蒼滑芎仁
▲經水過多久不止者
成血崩加仜伽膠苓丹皮
荊芥并▲骨蒸勞熱加鱉
甲柴苓▲姙娠胎動不安
下血不止加艾膠芩▲風
虛眩暈加芎羌▲發熱心

煩不得眠加連丹▲虛寒厥
微自汗氣短自利加永▲
經水過多加芩伽▲經水滿
少加葵紅▲赤白帶下加芡
苡▲血臟虛冷崩中去血過
多加膠艾▲婦人血積血
瘕加稜茂桂乾漆▲胎漏
下血腹痛加膠芩伽砂
菠艾炒粳▲子腫者面目
虛浮加苓澤伽芩丹門朴
▲產後發熱加柴芩籤
耳▲產後參梅葛瑞▲小
兒生下遍体皆黃加芩兒傚

與一服▲小兒齒久不生加
茵沉甘草爲末擦齒根識下
塩湯▲小兒血熱生瘡遍身
腫痒加甘草▲小兒尾骨
節瘡者陰虛加沢瀉或桂
火或西瓜蜜爲引如瘡不止
加乳汁沒藥▲加柴胡名增
損四物湯治產後陰虛發
熱或日間明了暮發寒熱
▲去芎下加參朮入姜亦
名增損四物湯治產後陰
陽不和如有惡露未盡停
滯胞絡亦能令人寒熱倣

小腹急痛爲異產後陰陽
不和加芎作熟去芎永去芎加
芫荽菠薐菜名加減四物湯治產後血虛氣
弱痰痺寒厥背冷頭痛▲
如有汗者氣弱頭痛加芎
桂姜▲痰痺頭痛加芎苓
姜▲熱厥頭痛加芎薑雷
▲寒厥頭痛加天雄附姜
▲加陳今丹令定分參
苓甘各減入姜棗是亦名加
減四物湯治婦人頭眩着
屢血虛痰火也▲四物加茯

發砂入姜棗名謝氣養血
湯專治婦人室女血氣不
和胎前產後諸病▲氣痛
加乘人▲痰盛加二陳湯
加姜蓋婦女以血爲主殊
不知隨氣而治然後血脈
不順故生諸病
拔補益血虛之主藥也
予連年血虛發熱挫閃
跌撲月水調理鼻衄下
血等照加減取意如日四
物苦練增損四物謝氣
養血等湯如得數劑猶

四物調經湯〔十二〕

治婦女或十五六歲經脈
不行日夜生寒熱手足麻
痺飲食火進頭痛惡心嘔
吐腹中結塊中動痛者此
誤食生冷傷感而致也

侯二炊一分　芎　朮各八分　沂芍　滑　陳　我
　　　

▲肚癰加乾漆▲瘧加黒
恒一▲泄瀉去根加術
按此方全合證治三十五
人也其外調經水則與
調氣養血湯而得數功
八物湯 十三名六珍湯
治肝脾傷損血氣虛弱惡
寒發熱或煩燥作渴或寒
熱間作或腫脚不利大便
不實或飲食少思小腹脹
痛或便血吐血盜汗自汗
等

參 伽 令芍芎芔
各一匁 久 甘五 分

右入棗煎服▲氣鬱脇
痛脈細緊或弦多從勞役
怒氣得之加蜜童便加官
桂▲孕婦出血氣性躁不能
舉胎胎壓其胞胞繫了
戻而小便不通謂之轉胞
今二陳煎湯探吐之所以
升提其氣上竅通而下竅
自利也▲產後子腸不収
加升芎以酒炒其爲君▲
小兒解顱者脏八珍君▲

熱加連煎服更以鼈甲膠繼
及火白斂末服之
按四君四物二合之方
故非氣血兩虛者勿用
之▲心中惕惕然而跳動
謂之怔忡加酸連門煎
湯調辰未服得術效痊
婦大便七日不通加梔
桃而得卒效▲一婦滑泄
帶血懶怠不食去半加
木而二十餘貼得安全
附千金大補湯
治氣血俱虛發熱惡寒白
汗盜汗肢躰倦怠或頭痛
耿暈口乾作渴久病虛損
遺精白濁二便見血小腹
作痛小便短少大便乾滿
或嗽而不利虛勞諸虛不
足五勞七傷飲食不進
八珍湯加黃芪桂各一錢
右煎服▲氣血俱虛陰陽
並損加連翹▲發熱加柴
胡▲盜汗加牡蠣▲虛寒
勞▲虛寒甚加附子▲汗加
蒸倍加柴胡▲氣弱加參▲
惡寒加桂▲肌熱加鱉

盧勞發熱加柴籐艽▲不
時而熱或無定處或從脉
心起此無根虛火也加會
門▲虛弱之人遍身痛倦
桂加守▲久病虛損眼目
昏▲見物不明久服無內
外二障之患加多沉附姜
棗▲產後羸勞四肢煩疼
時發寒熱不思飲食加續
會門姜棗▲凡瘧病有由
汗多變瘧有因去血澇多
元氣虛極或外邪相搏以
致牙關緊急四肢瘛瘲或

陰火內動或腰背灸脹肢
身搐搦若有汗而不惡寒
者曰柔若瘧若無汗而惡寒
者曰剛瘧症由去血過多脈
無所養故傷寒汗下過多
潰瘍膿血太泄多患之乃
敗症也急以此湯治之如
不應急加附
拔此湯治諸病屬氣血
兩虛挾寒者也▲骨蒸
勞熱加綠平分是他家
之秘也▲男婦氣血虛
弱而眩暈加陳皮定

食積痢或時赤痢或時水瀉或完穀俱出加連
曲澤守膠砂芸姜二一切
痙病欲死者刺頭髮際
正中二而出血且其色炙
三一二壯而甦尚可用此
湯殊傷寒汗下過多後
或金瘡產後去血過多
後或諸瘡膿血太泄後
間成痙證時時以此湯
得救矣▲產後諸虛百
損五勞七傷自汗盜汗
諸熱亦然▲手足麻木
或疼痛去氏加陳守北
勝羌附▲夢遺精滑屬
氣血虛損加山茱萸會
門▲產後乳汁自出用
此湯而愈未產而乳自
出者亦可

二陳湯 十三

治一切痰飲作爲諸病
陳守各五匁 苓二匁半
右入姜煎服▲偏頭痛在
右加芎芷芸荊北左合
四一物湯加荊芥細蔓柴汁
▲頁一痛加芎本升柴蔓細

苛▲痰在腰膝下腫痛加蒼離通相薢膝▲痰在胸膈中作痛或於曲芽砂　痰在脇下作痛或漉漉有聲加柴胡芍▲痰在經絡中或腫足脛脚作痛者在上加芸芜蕨▲在下加離膝通冬月加烏附行經▲風痰壅盛喘急咳嗽不寧加芸芜病腹脹喘星枳皂熱痰爲病滑膏澀▲滿加芩連丹蔞濕痰身重倦怠加蒼伽星

▲寒痰加永附滿益▲氣痰加蜜枳砂枳婆泡▲燥痰加冀杏貝會▲陰虛咯血痰嗽加天麥二門雷棺貝熟菀▲氣虛有痰加參伽▲血虛有痰加斤天▲帶血者加芩芍▲咳嗽白痰者肺之風寒也風痰加星桔芸實▲寒痰加永官附▲食積痰加查曲泼實連▲痰飲者痰在胸膈間痛有聲加菠砂蔞實芹芩蒼童白芥▲痰涎者渾身胸背

腹痛加白芥砂蜜茴泼實斤汤▲濕痰流注者渾身有腫塊加萋椒茶汤煮芸薹斤涉砂蜜紅澁姜汁▲脾虛生痰加參伽芍實砂桔▲酒痰加葛根砂曲芫▲飲酒嘔吐痰加參术細▲痰瀉者或多或少或瀉或不瀉脉沉滑加茶砂預車前朴姜梅灯▲若瀉不止去朴加訶衍▲肥人頭痛者氣虛濕痰加參术細苓甘草制▲瘦人頭痛

者血虛痰火加蛇斤芩芍細羌桔▲腹中水鳴因熟而痰者痰飲加茶連丹▲痛甚加茶炒▲腰背重注走津痛者是痰加蓋茴乳索砂蒼羌汤斤仲▲風寒濕流注經絡而腰痛加麻蒼芎芷芸羌▲濕痰流注脇肉作痛加星茶茗子姜▲痛後飲食少進四肢無力面色痿黃合四君子湯加連實姜▲開格上焦痰壅兩手脉盛加星枳實▲大

小便不通皆是痰膈中焦
氣滯於下加通▲痰欝
火邪在下焦大小便不利
加弓升芎柴謂之升發二
陳湯▲咳嗽氣胃中有火有
痰者加砂多蜜益實連朴
蛤▲眩暈嘈雜火動其痰
加丹芩連▲胃口有熱時
作惡心加連芩姜嚴得法▲
婦人帶下屬濕痰者胃中
痰積流下滲入膀胱加二
术升柴又云氣虛合四君
子湯血虛加弓歸

拔此方治痰之聖藥也
隨證而照加減以無不
治痰飲也

附 加味二陳湯

治一切癇病▲發於風痰火
則宜用泥香天麻濕加味二陳湯
星陳萋實桔丹
守芩各一錢五分辰砂末
右入姜煎臨服加滴姜汁
磨木香調辰砂末同服

附 加味二陳湯

治痰厥運倒陳守芩
斤實桔杏各一兩

砂仁各七 蜜官甘各二分
右入姜煎服氣逆加軾
元氣虛弱去實
附 枳縮二陳湯
治涎在心膈上攻走腰背
嘔噦大痛
實 砂仁 陳皮 半夏各一
朴 蔔 索各八 蜜湯
永 砂仁各五 甘三分
右入姜煎加灌磨木香服
附 香砂二陳湯
治傷生冷飛桃水泉海味
魚鱉一應寒物而胸中窄滿

陳皮 半夏各一 茯苓一 甘草半
砂仁 曲 甘草各六分
右入姜煎服此方傷食之
主藥尤能消食予連年與三
此湯取奇效難勝計者也
按巳上四方切得數部
故別立方銘備參考之
搜覽者也

治汗後中暍煩燥小便不
利而渴
澤瀉二半 朱苓 猪苓各一 桂半

右爲末清米飲調服或入
姜棗煎服▲熱甚去桂加
芩▲中暑煩渴身熱頭痛
霍亂泄瀉小便赤少心神
恍惚宜此湯或爲末熱湯
調下愈妙加滑石甚可▲
喘咳煩心不得眠加膠▲
恍惚加辰▲伏暑身熱大
渴未解合人參白虎湯▲
濕熱所傷身熱煩渴小便
赤少宜此湯▲身腫無汗
倍加羌▲黃疸發熱倍加
茵▲水腫從腰以下俱腫
加窻茵▲虛寒小便不通
加二斤枳膝通甘灯▲小便
虛弱不禁者合四物湯加
會山茱▲男婦赤濁合妙
香散名二香冬散用天麥二
門煎湯而下▲濕渴者瀉
水多而腰不痛腰響雷鳴
脈細加預陳茗衍詞砂甘
姜梅灯▲傷寒三四日往
來寒熱自利者本方合小
柴胡湯入姜棗茶湯
一切發熱自利者邪在半
表半裡宜此湯▲瘧發寒

熱病在表裡陰陽不分亦
然▲無汗加麻有汗加枝
寒多加官熱多加芩▲去
桂名四苓散▲小便不禁
有熱加連柏會出茱▲飲
酒伏暑鬱發爲瘧煩渴小
便不利加茵
附加味四苓散
火瀉者腹痛一陳瀉一陳
後去如湯後重如滯瀉下
赤色小水短赤煩渴脉數
是也用此湯
芩 伽 猪 澤 瀉 芍

丹陳 絡甘五分 梅一箇 茶一
右入灯草煎服▲飽悶加
朴砂去預▲腹痛去伽加
朴砂蜜煎▲嘔噦惡心加
藿梅蓮砂參▲小水短赤
去澤加通車▲口爛煩渴
去澤茶加連門蓮梅葛▲
瀉多元氣虛脫昏倦去澤
茶加參芪▲夏月暑瀉加
蒲扁▲瀉多煩爛去茶澤
加連參辰梅▲瀉多不止
去澤丹加行參▲發熱脉
數加柴芩

掇治濕之劑嫉穢小水不通或澁而可與此湯也四苓散治火瀉熱瀉發熱五苓散治濕瀉退下濕柴苓湯治痛疾寒熱熟皆其功有數多故不舉治例而可知者也

胃苓湯 十五

治脾胃不和著濕停飲泄瀉腹痛水穀不化陰陽不分不伏水土二切治泄瀉之總訣也

蒼 陳 朴 猪 加 澤 瀉 連 甘

右入姜棗煎服 ▲氣虛加參 ▲虛寒加永炒 ▲水瀉加滑 ▲食積加曲芽查 ▲痰多加半夏 ▲暴痢赤白相雜腹痛裡急後重加木梗 ▲久瀉加升 ▲腹痛加官 ▲黃胖者飲食無味四肢無力行步倦怠脉濇而濡是也減茯苓加桂如小便赤澁加滑

拔此方五苓散與平胃
散等分故傷食之泄瀉
專可服焉若瀉不止加
訶▲夏月之泄瀉去桂
之何者桂大腸之引經
也▲夏月雖先瀉下而後
瀉滯當用此湯▲夏月
瀉下身冷咽乾不欲衣
拔伏熱在內故令解毒
湯而安▲夏月慞痛厥
按因暑濕而身躰骨節
痛故用此湯而愈▲水
腫小便澁少大便結是
乃食滯與濕熱所爲也
加梹曲查砂腹泼入姜
燈煎服而安▲或語云
此方四五月至八九月
專用之例者治暑濕之
故也

芍藥湯 十六

治下痢赤白初起積滯不
行裡急後重頻上廁而去
則必腹痛

芍藥三分 片連 木香一兩分 檳
榔 桂 甘草各五

右煎空心服加枳▲後重窘迫甚者倍鹿加芒一▲吞滿氣不宣通加實一▲壯盛人加鹿一▲虛弱人去鹿▲按用此方而行血則便膿自愈和氣則後重自除

附調和鉄

治紅白痢▲下痢猶久者宜調和

芍一半 甘一錢 薤一錢

右煎空心服▲紅痢倍本方▲白痢加乾姜一▲赤白痢加吳一▲按治諸痢用通利藥後未已益服此方調理而愈

附參歸芍藥湯

治痢久一二十日去多不止者

芍一半 參 斤 芩

右入燈草梅蓮煎服▲禁口痢不食者冒口極熱加連參蓮梅粳▲腹痛裡急

後重者是熱積氣滯加蜜
炙▲未除者加升火痢作
痛者熱流下加芩炒▲痢
後發熱不止或虛坐努力
者俱是血虛倍加芍芍并
▲積中有紫血是瘀血加
芍紅▲按下痢久不止者
用此方宜調養氣血
按三方皆治痢之主藥
也初痢宜芍藥湯日久
不止用調和飲氣血虛
弱者參歸芍藥

脾胃虛而膿血不止者
胃風湯見瘧痢兼作
者柴芩湯
方見五淋小柴胡等肯肉加減次取
卒效若未愈則宜用和中
湯不有不愈者也

附和中湯

痢疾百方不應脾胃獨虛
弱而下如醬油脈弦數或
白變紅痢者專可用此湯也
飴大朴朸童婆幹
砂蜜 永倍 甘火
右煎服▲此方產前後痢
病得數帖

又方和中湯不效則宜此湯必有奇效

餘各三斤 芍藥二兩五分 桔梗一兩七分 甘草二兩 乾薑一兩 人參一兩 茯苓二兩 半夏二兩洗 桂枝二兩去皮 大棗十二枚擘

右㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服

▲此二方東井叟之配劑也

一婦新產十餘日後腹發熱微煩大便不通去血四五貼而愈

又一婦患前證故前劑三貼而下滯血更得平安

連解毒 十六

黃連 解毒湯也

治大熱不止乾嘔煩渴錯語呻吟不眠或傷寒汗吐下後熱不退諸般積熱實火者大効

連翹 各一兩 芩 梔子 丹各二錢

右水煎 腹滿嘔吐或欲作痢者加芍藥三錢 枳殼二錢 大黃各一錢 甘草二錢 生薑三片 ▲三焦實火內外皆熱煩渴小便赤口生瘡加減芳柴各一分 箏 ▲狂亂喜笑不休者此心火盛先行止法而後加守瀝竹葉麥汁 ▲臟毒下血者必在糞後

名遠血ニ加ヘ薤槐細甘謂之
八寶湯 ▲婦人赤白帶下
屬壯盛ニ而有寒熱者合四
物湯加倍連尤効
按清熱之劑也▲三十餘
歲婦人崩漏如湧身熱
口渴合四物湯煎湯與
棕灰而安又孕婦有先
證合四物湯加升伽而
安

白虎湯 十八

治傷寒汗吐下後心膈煩
悶渴欲飲水而脉洪大

膏四兩 雷一兩 甘分 粳合
右水煎 ▲熱盛煩渴不止
及發赤斑脉虛加參仁名
化斑湯 ▲一方加犀汁 ▲太便
不固熱不退加蒼 ▲脉尺
寸俱長汗大出身如水石
加桂 ▲老幼及虛人昏冒
譫語或小便澁起卽無度
或煩而不眠加丹 ▲上焦
煩渴而不欲多食謂之高
消加參仁或加升桐 ▲瘧
疾表裡俱熱時時惡寒有
汗而大渴口乾加參

按此方除熱之劑也▲

夏因署熱而遺尿加參

柏▲一男熱不甚大便瀉不省人事脈浮大無力背出男是死証加參蒼取驗而後小柴胡湯合四君子湯而調理則全愈

治五臟中寒口噤失音四肢強直兼治胃脘停痰冷氣刺痛及臟毒下寒泄利腹脹大便或黃或白或黑或有清穀

右人參 伽炒 茸炙 姜乾 甘草炙 等分或黑豆煎湯解之不可不知也▲霍乱吐瀉加童陳名治中湯嘔吐者治中湯加喬守姜▲泄瀉加陳苓名補中湯▲溏泄不止者補中湯加附▲不喜飲食米穀不化加砂附陳苓▲霍乱吐下心腹痛手足厥冷去伽加附名

四順湯一名四逆湯▲心腹急痛手不可近加實芩▲渴欲飲水加瑞▲霍亂轉筋加膏▲臍上築者腎氣動也去佛加桂▲悸多加苓若寒加乾▲腹痛去佛加附▲瘈多及灸煿熱食發譫妄加苦▲腹滿下利脈沉遲而微加附▲痼冷症加附桂苓▲胃寒嘔吐清水冷涎脈沉遲加苓附官桂喬守砂姜梅▲若寒極手足冷脈微吐不出加附去官▲噯氣有胃寒者去棗加蜜益陳朴茨▲蛔厥者胃寒外生加椒柾▲口舌生瘡飲食少思大便不實此中氣虛也手足冷腹痛加附▲身虛感雨濕而嘔吐加童陳守婆▲去耳加陳守入姜煎服治胃氣虛寒作惡心亦治舩暈按此湯治寒之劑也▲乾霍亂心腹總痛不吐瀉足冷脈沉欲絕者先用塩湯探吐而後加婆

朴蒼砂薄蜜枳陳桂朌
痛額頭黎黒手足收引
脉無氣以息者此中寒
暴死也加附▲臟腑停
寒腹痛身性泄瀉青黒
不止加陳婆苓桂梅▲
若寒極手足冷脉沉細
去桂加附▲腹痛滿去
參加砂朴木嘔噦惡心
去桂加喬歩▲瀉不止
加蒼頭▲虚汗去蒼朴
加芡▲飽悶去桂加朴
砂▲飲食不節過食生
冷腸鳴泄下加童陳砂
▲急陰證手足冷指甲
青火暗守喬苓多曲沉入姜棗
塩火煎服如急陰不省
人事用塩填臍中火艾
灸之沈醒爲度▲傷寒
自利不渴寒多而嘔或
腰痛下利霍乱吐瀉手
足厥冷者用附雛證證
皆退而吐不止則百無
一生

衆方規矩卷二終

七氣湯

治七情所傷及勞役飲食不節滿悶短氣

守五分 參 桂 甘草各

右入生姜煎服 ▲七氣心腹刺痛加索餅乳汁各加味七氣湯婦人猶加香附各一名四七湯

附 大七氣湯

治七情不節致臟氣不平心腹脹滿又治七情氣鬱結聚痰涎狀如破絮在喉

喉間咯不出嚥不下及中
脘病滿上氣喘急二
守五久 冬四 朴三 蘇二
右入姜煎服▲七情所傷
鬱結臟腑氣不和平心腹
痞悶加減▲七氣聲絡五
臟互相刑尅陰陽不和擣
霍變乱吐利交作加芍四
陳二參一 入姜棗
附 指迷七氣湯 主方
治五積六聚狀如癰瘕隨
氣上下發作有時心腹疼
痛攻刺脇肋上氣窒塞喘
嗽小腹脹脹大小便不利
此方積聚所屬異者宜雕也
稜 莪 童 陳 藿
右 入姜煎服▲心脾痛如
椒根▲加虎掾治諸般痞
積面色黃肥躰癯瘦四
肢無力皆緣內有蟲積或
好食生米或好食壁泥或
好食茶炭鹹辣等物者只
此一服除根空心服後食
頃腹心痛當下▲七情相
干陰陽不得升降氣道壅

滯攻衝作痛去穀加芎姜
棗▲挾冷腹痛七氣四肢
面色青白加守姜棗
挾治七氣及蟲積聚之
方也▲
一小女患痔腫
癰已潰壞而血多下餓
發心痛欲死加味七氣
湯二貼而安▲心痛甚
者大七氣湯加楝沉栜
切得奇效▲脾支因蟲
而瘦不食顏色青黑指
迷七氣湯加栜而安▲
常有積之人患瘡寒熱

往來腹皮堅張無汗散
方不應指迷七氣湯加
永麻二貼而安▲積塊
屬寒者宜指大七氣湯
若屬熱者宜用柴平湯
時時取卒功
治七情之氣結成痰氣狀
如梅核或如破絮在咽喉
之間咯不出嚥不下或中
脫痞滿氣不舒快或痰涎
壅盛上氣喘急或因痰飲
惡心嘔吐此藥最效功不

治男子婦人一切氣不和
多因憂愁思慮忿怒傷神
或臨食憂戚或事不隨意
使郁滯之氣留滯不散停
於胸膈之間不能流暢致
心胸痞悶脇肋虛脹噎塞
不通噫氣吞酸噦噎惡心
頭目昏眩四肢倦怠面色
憔黃口苦乾苦飲食減少
日漸瘦瘠或大腸虛秘或
因病之後脾胃虛弱不思
飲食並皆治之

述但婦人女子患此最
多
芩 朴 藥糊 牛
陳 童 砂 星 實
曲 絡一 多 梹 益 各五
右入姜煎服臨臥服
按王七情鬱結生痰在
咽喉間吐不出吞不下
氣不快者善消痰飲之
藥也▲婦人上氣喘急
胸膈痞悶吐泊涕與
此湯而安▲效而疾速
在喉嚨不下得奇效

鼈二童陳腹桑
差格五本守芍
通官緩三甘半
右入姜棗煙煎食遠服▲
加枳枳拔治氣百病最能
升降陰陽調順三焦其功
難以盡述▲一方去芎羌
加桔枳木梹菽拔莪藿治憂
思鬱怒諸氣瘀滯▲水氣
面目浮腫加豬澤車瓜門
冬▲氣塊如拳▲性急加
柴▲多怒加芩▲食火如
砂曲▲咳嗽加桔守▲胸

膈痞悶加實菠三▲焦不
和加麥▲氣閉加薤
滯腰痛加瓜枳▲上焦熱
盛加芩▲下焦熱盛加丹
▲翻胃加泥
按此方散氣降氣之劑
故專治氣鬱之主方也
▲憂鬱得嘔
因七情面目浮腫腹脹
股腫加豬澤瓜▲七情
氣結干中心腹疼痛不
可忍加枳蜜少▲氣逆
上而腰足下焦冷蒼桔

湯不効故與此湯切得奇効是乃氣欝故也▲洒淅寒熱盜汗頭痛咳嗽五心煩熱常心不快至暮虛熱夜不寢脉弦而數似勞證滋陰降火湯不効謂是窄人氣欝故去芩連減半麻加枳桔而安▲因氣惱成腫氣腹滿此方有數奇▲氣不順如痛風一身痛此湯切得奇妙

治七情四氣傷于脾胃以致陰陽不和胸膈痞滿痰氣逆逐成五膈之病一切冷氣皆治之

莎朴各一錢 甘草炙三分 砂仁 縮砂 各四分 陳皮 喬多二錢 右爲末姜鹽湯點服▲七情欝結之初也氣沉滯飲食不下氣滿膨脹宜此湯按治之

▲好酒之老儒頭重胸膈痞滿不食腸食則欲嘔數十次不應加連翹煎

服▲火女十七歳後大
月初至七月下四腹痛
時止時發今痛甚泣聲
響隣五日絶穀大便結
如啞啞有聲加桃奏芍煎
服一貼而痛減三日而
向食氣五日而大便通
得安全▲女子十七八歳
因氣惱而吐血心腹刺
痛堅如石冷如氷手經
水四五箇月不通脉沈
緊而數衆醫束手故予
委永煎服得奇妙

治嘔吐翻胃噦雜呑酸痞
噦噫氣噎膈心腹刺痛悪
心吐涎痰水
陳塩歩 丹各一分 伽八分
半各七 連 曲各六 實五
砂三 甘二分
右入姜長洗水煎入澄姜
汁竜便温服▲氣虚加參
甚一▲血虚加芎芍▲氣悩或
氣不舒暢加藿香 腹脹飽
悶加蔔▲心下嘈雜醋心加
呉倍連伽一▲嘔吐不止加藿

按順氣和中之劑善治
胸痺退上氣消食積殊
以主胸中浮有濕熱膿痰
而煩悶嘔吐或嘈雜吞
酸者也▲飲酒之人食
腑臟物腹痛吐瀉不止
去實加藿香永得奇効▲
夏月胸痛吐血是氣惱
之人故倍連加蓋而安
▲小兒七八歲因咳而面
赤咳如線而不絕此湯
二三貼而愈▲一婦人逆
千夫而面赤胸塞酒漸

寒熱時妄語有乾嘔加
柴苓而如故▲常飲酒從
去秋吃逆至今春不止
且胸痛痰支不食惡寒今
驚水穀不通而迎予診
酒毒而此湯三四貼得
大驗其後依舊去實
加參而愈▲瘧間日發
不食口苦乾嘔熱多寒
炒他藥不効加柴苓珍
效二貼而落▲七十餘一
歲尼飲食俱少平吐甚
胸痛脈沉細加喬審而

治中風一切風熱大便閉
結小便赤澁頭面生瘡眼目赤痛或熱極生風舌強
口噤或鼻生紫赤風刺癮疹而爲肺風或爲風厲而
世呼爲大風或腸風而爲痔漏或腸癰而爲諸熱譫
妄驚狂並皆治之

芒硝斤半　荊芥　虎掌芒
薄荷麻　荊　柳丹
桔梗半斤　滑石三斤

右入姜煎▲自汗去麻▲飲酒中風身熱頭痛如破加葱白▲
咳嗽喘急加守桔梗▲耳鳴因酒過加柴枳桔童星一
前▲瘡疹通治如身痒加蒼耳▲瘡瘍加守一切大風
癲狂加黍粘牡▲丙耳聾者厚味動胃火加酒熾虎▲
膽發腦則辛頻鼻澁加附子一▲頭頂偏腫連一目如
半盞其脉洪大此風

乘陽明經氣血俱多風腫去芒虎加姜葱豉煎服取汗以草蓽刺鼻中出血其腫立消▲治風熱瘡瘍癬久不愈▲瘡頭瘡用本方爲末洒浸燻乾凡三次食後白湯調服日三服至頭有汗效▲小兒身常發熱風斑及脚指紅腫去芒虎加方連爲末服按此方雖古法脾表裡客熱三焦實火而其實火用黄連解毒湯腸胃實熱用大承氣湯風熱症專用此湯▲或語云春夏專用通聖散秋冬專用五積散是乃時令表裡之方也▲狂亂症解毒湯不效則用此湯此湯若不效則備急圓可也▲打撲者倍斤虎加紅没藥▲疥癬楊梅瘡瘍良久者用此湯間有驗

治卒中風手足不遂語語

寒濕四肢骨節疼痛肩臂
麻痛筋脈拘攣及脚氣歩
履艱辛婦人血風老人
氣上

麻麥陳各二撮 蚕
莎根一錢 桔梗一錢半 甘草
右入姜棗煎服 ▲寒熱頭
痛加葱白 ▲身躰不能痲
痺爲末温酒調下 ▲瘧
掇之成瘡薄苛煎湯調下
▲中風一身俱痲加參伽
斤門 ▲久癱瘓去痲加定
芸 羌守星蜜斤 ▲口眼喎
斜加連翹芸荊滙姜汁 ▲
遍身痛加斤官乳没 ▲臂
痛加羌芸官苓蘇 ▲背心
痛合行氣香蘇散加蒼守
芩 ▲脚膝浮腫加膝揺住
▲腰痛加膝仲斷 ▲眼眩
加細茶 ▲四肢冷痺加附
官 ▲婦人血風加芸苛荊
▲胸膈脹滿加實莪 ▲虚
汗去痲加芪 ▲潮熱去柴
加芩 ▲二三年不能行合
獨活寄生湯 ▲拘攣加風
解 ▲濕氣加蒼伽桃 ▲心

腹刺痛加▲手足不能
起床加縮
合五積散▲脾痛因風者
或乳婦以脾枕兒傷於風
寒而致脾痛者宜此湯▲
白虎歷節走注骨節疼痛
加附官桂
挨卒中風先服八味順
氣散六七貼以順正氣
次與此湯以可順表氣
▲中風口眼喎斜或肩
膊及背麻痺不仁或脚
膝痿弱或言語蹇澁皆
宜此湯▲脾痺冷起手
甚難五積散合九味羌活湯
未効則此湯加羌活而
安▲乳婦以脾枕兒則
其脾麻痺不仁疼痛若
因風者宜此湯若因寒
者宜五積散

治中風先服此藥次用治風之藥

桂 蒼朮 甘草 陳皮
柴胡 各二錢 半夏

右煎服▲或加星蜜少攻痰氣▲或痰盛加半夏二▲氣厥者與中風相似何以別之風中身温氣中身冷先以此湯拔有四君子湯補脾胃中氣藥也並去手陽明經風藥通腎胃間氣隧理肺氣童泄肝氣若風在手陽明而肝腎胃之氣實者專可用之▲卒中不知人事痰涎壅盛舉劇不仁舌強不語

與此湯間求驗▲卒中風醒後七氣怫鬱而手足厥或瘛瘲痙痓間得奇効▲或語云一切氣鬱者亦也又云諸病共有少眩暈者用之

治風濕痰一切痰涎壅盛或胸膈留飲痰塞不通

半夏 星 實 苓

陳各半 甘草

右入姜煎服▲如久嗽肺

燥熱去半夏加會糀本方五▲
惛寒悚熱頭目昏沉迷悶上氣喘急口出涎沫證類傷寒此因七情內傷火致神不守舍狀如痰迷心竅不省人事一服立省真神方也▲
鬼祟加連翹桔梗參伽絡一入姜棗煎加蘆姜汁服名之清熱導痰湯▲按清熱導痰湯一方清熱導痰去棗半減參加斤蜜炙甘草五名加減導痰湯治中風痰涎壅盛不能言語牙關緊急有熱者也按本中風先此湯或八味順氣散烏藥順氣散選用而後尋治經絡臟腑左右之方而當療▲

治虛陽上攻上盛下虛痰逆壅盛

薤子酌氣湯也

載守格五桂陳格三朴甘格三

右入姜棗煎服▲治虛勝上攻喘倦咳嗽不止

按治虛勝上攻喘倦咳嗽足冷者若足不冷者無二十分之功▲水腫眠滿痰喘氣急欲絕者間與此湯得奇効若雖得奇而心躰困乏者不治也

小續命湯 十

治卒暴中風不省人事半身不遂口眼喎斜手足顫拘語言蹇澁肢躰痲痺神昏乱頭目眩暈痰涎壅盛筋脈拘攣不得轉側及腰脚氣緩弱不能動履扉伸諸風服之皆驗東垣曰中風自汗者不可重發其汗故此藥亦不可輕用也

芎一分半　麻黄　桂　芍藥　甘草　附　防己　杏　人參　各一分半

右入姜棗煎服▲精神惚惚加神遠▲骨節痛有熱倍芍去附▲心煩驚悸加犀▲骨節痛有寒濕倍加

桂附▲嘔逆腹脹倍參加
半夏▲煩悶大使澁去附倍
入澁▲臟寒下痢去離茶
倍附加朮▲脾腎虛加朮
加朮▲脾膝弱加膝斛
身痺加羌▲腰痛加獒附
▲失音倍半夏▲中風無汗
惡寒加倍本▲中風無汗
有汗惡風倍加枝芍本▲
中風身熱無汗不惡寒加
雷實去附▲中風身熱有
汗惡風加葛▲中風官桂
無汗身涼倍加附加永▲
中風有汗無熱倍加桂附
半▲中風脈微鬱痛不仁
加羌翹▲治跗腫梨二痊之
通用也▲產後中風脚氣
最爲要藥然手足搐搦者
當去附
按不可用多汗者大抵
身冷或四肢厥冷而拘
急不仁者宜▲一婦二十
餘歲產後三十有餘
日腰足冷腹痛甚膝屈
不伸脈沉遲加附得奇
效

治中風手足不遂舌強不
能言用之養血則筋自榮
凡羌活 防風 白朮 川芎 當歸 生地 熟地 白芍藥 各一錢半 細辛 甘草 各五分
右煎服 ▲天陰雨加生姜
▲春夏加雷丸 ▲心下痞滿加實朴 ▲治血弱陰虛不
能養筋筋燥而手足不能
運動指爪乾燥屬風熱甚
者
按此方榮血養筋故脈

浮大數而四肢麻木脂
肉瞤動則三歲內當發
中風是其爲養生專用
也若脈微細者同春養
榮湯可也 ▲俄手足痿
腰不立舌軟不能言者
不分左右專服之也

去風順氣活血壯筋又治
痢後脚弱緩痛不能行履
名曰痢風或兩脚腫痛足
脛枯瘦名曰鶴膝風二症
麻痺痿軟風濕挾虛之候

服之其効如神

伽半分 芎 芍藥 斤民
芍 仲 茯苓一芍 附 子一分半七
羌 參 勝 甘 草半

右入姜棗煎服

按治痿躄之聖藥也此方可治不足之痿弱不可用有餘之風痺前方有骨此方有附當著於心二方也▲腰不立身痺痛偏或痺後鶴膝風專用之而可也

治右半身不遂手足癱瘓筋骨疼痛

伽二分久 芎 斤赤芍 陳
守 蒼 連 洛 一並九 參
枳 羌絡一並 芸 甘絡八分

右入姜煎服▲身痛加姜黃▲足痛加膝離葳

按治氣虛與濕痰兼以久手足癱瘓者也予連一年試此方一應癱瘓不相應矣久字專要也次方亦然

治左半身不遂手足難擦
師次火攻噴口眼喎斜塗頭目
眩暈瘈火熾盛時痛筋骨
頭痛心悸
游子斤許芩伽星
守定各一陳堀地半酸
治膝脛痠痛足不能屈伸
右水煎入瀝姜汁服 手
不遂倍加芩桂 足不遂
倍加桐膝 拔治因血虛與
瘀血而久手足難痺者也

若久左右手足皆難痺
者血氣兩虛宜加味十
全大補湯一方離

半身不遂口眼喎斜風氣
中人中氣用風藥而十無
一愈即服之見效
伽四分 婆定各一參 泉並
童丼各一 蘇葉各三分
右入姜棗煎服▲心脾痺
加苓守各三陳蜜煮各一
入姜煎服半日效

拔中風症風藥不レ効則
此湯合二二陳湯一數得レ奇
效又腰腿痛者亦得尚
可有加減消息也

疎經活血湯

治遍身走痛如刺左痛
尤甚左屬血多因酒色損
傷筋脉空虛被風寒濕熱
感於内熱包於寒則痛傷
筋絡是以晝輕夜重宜以
疎經活血行濕此非白虎
歷節風也
涂半不沂亦由蒼瞭陳

嬰歳絡一游肋苓分七芎
離巻川芎分各六芷分四
右入レ姜煎服 ▲痰加星半
絡一 ▲上身及臂痛加桂二分
▲下身並足痛加瓜通相
屋一絡 ▲氣虛加參朮板各七
▲血虛倍四物湯加紅一
拔治痛風屬血虛者故
遍身走痛日輕夜重 ▲
懷娠婦人潮熱咳嗽吐
痰盜汗足注痛脉細
數滋陰降火湯不効故
此湯去膝嬰得奇効 ▲

傷酒食邪乘經絡虛爲
痛風與此湯而安▲中
風之人周身或手足痛
用二上下加味而得奇驗

治腎氣虛弱冷卧濕地腰
背拘急筋攣骨痛當風秋
涼過度風邪流入脚膝爲
偏枯冷痺緩弱疼痛牽
脚重行步難難並白虎歷
節風痛 中濕而偏枯冷
痺者腎氣虛也
桃 寄奴無代續 膝 仲 光

細桂 芎 防 冬 參
斤 卞 芸 各 等 甘 減半
分
右入姜煎空心服▲夫腰
背者皆由腎氣虛弱卧冷
濕地當風得之不速治喜
流脚膝爲偏枯冷痺緩弱
疼痛或腰痛攣脚重痺宜
急服此▲治肝腎虛風濕
脚攻兩脛緩縱攣痛痺弱
不仁足膝攣重又治白虎
歷節風神效
是腰痛之主方也按因
虛而爲中濕脚氣痛風

腰痛此之謂也四症並治兼以癱瘓中風亦取驗

治周身四肢骨節走注疼痛牽引胸背亦作寒熱喘咳煩悶或作腫塊痛難轉側或四肢麻痺不仁或背心一點如冰冷脈滑乃是濕痰流注經絡關節不利故也

星 田陳 半各一錢 甘草三分 茯苓 蒼朮 白朮 陳皮 枳殼 各一錢 生薑汁 棗人 煎服 ▲頭痛加羌活 ▲手臂痛加桂枝 ▲脚痛加膝相離游風 ▲骨躰痛甚及有腫塊作痛者名曰痰塊加乳没硝海石

按治遍身走痛屬濕熱者故因痰而咳嗽或腰痛或肩痛或胸痛皆治痰而背心一點如冰冷與此湯得

治瀕屬氣血虛而兼痰火

者下肝解鬱清火化痰除
睛暈諸癇之疾
沂汭伽苓陳半
實蒺藜 背遯莎格門
芍 參遠志六甘分
右入姜煎服
按氣血虛而痰火上乘心
胸故爲眩暈爲癲狂此
方主之▲百不如心故
言離虛譫鬼而高聲
譫或忿怒或罵詈與此
湯得數奇▲產後血暈
心悸多汗熱甚言語錯

亂目見不實與此湯而
安

滋液天麻湯

治因恐懼發癇病搐搦痰
涎有聲目多白睛強項背
一時許脈沉微而急方醒
後驚悸皆如
犀牛腦麝鎮墜之藥已四
犀牛餘此證尚在又添行步
動作神思如痴先灸兩踝
各二七壯次服此藥
羌活五分 揺四分 定芸芎
附子 益川烏各二

斤　蚕　甘絡半

右入姜煎服

按救癩癩癩證之劑

一人足厥冷則有小腹

羌上心胸物而恒帰或

膈塞而心中沉困煩悶

如欲絶或食遅則無力

生眩暈心如乗舟楫久

與此湯而安▲男子下

血或痢婦人産後脫血

多失血後有此證四物

湯不効則與此湯而可

若嘔出加練椒

激精神不守喜笑不常言

諸錯乱妄見妄言登高罵

詈

星　半　陳茶　連　沂

虻　甘二分　参　酸炒　菖絡

治血虚労倦五心煩熱肢

体痛頭目昏重心悸頬赤

口爛咽乾発熱盗汗減食長

嚏臥寒熟如瘧陰虚労嗽

肌体羸瘦潮成骨蒸

斤芩半夏各
右入姜煎服▲五心煩熱
加門篠▲經閉加㕮紅
腹痛加索▲胸熱加連卅
▲氣悶膈痞悶加實童泛
手擅掉加芸薪昔▲咳嗽
加會蒐▲吐痰加寺貝蕳
▲飲食不消加査曲▲瘧
瀉加門瑞▲心慌心跳加
酸遠▲久瀉加禾炒▲遍
身痛加芸羌芽▲吐血加
膠生牡▲自汗加瓦酸▲
左腹血塊加稜莪㕮紅▲
右腹氣塊加蜜棋▲血虛
煩熱月水不調臍腹脹痛
痰嗽潮熱加昔少雷篠或
加芩▲心煩加門羚▲嗽加
梅數會▲產後血虛煩熱
加芩▲婦人患癲疾歌唱
無時踰垣上屋乃榮血迷
於心絕所致加㕮遠紅方
▲若有熱者合小柴胡
湯加地辰▲氣血兩虛無
汗潮熱加昔▲子午潮熱
加芩胡連門篠艽通車灯

▲婦人肝脾血虛發熱潮熱
或自汗盜汗或頭痛目澁
或恍惚不寧頰赤口乾或
月經不調或肚腹作痛或
小腹重墜水道澁痛或腫
痛出膿內熱作渴加煨
姜片苛少煎服▲加牡丹
名加味逍遙散
拔宜虛勞熱嗽有汗者
兼以肥人五心煩熱体
瘦骨蒸婦人癡狂月經
不調照加減間治之▲
十八歲婦初產過二七日

後面赤肌身發熱心跳
不食頃刻睡餓驚聲戰
兩手差上擡掉每夜十
四五度許他醫束手於
是加籐連酸而安其
後右手腿痺痛加著桔
梗瓜羌冷而全愈▲壯
婦性弱瘧發間日數方
不應於是詳問則久月
信不來有盜汗故加籐
丹牡得奇效▲產後寒
熱往來若此方不應則
與四君子湯間得奇効

是陽生而陰長是也

柴胡抑肝湯 十四

治寡居獨陰無陽色慾心萌而多不遂是以惡寒發熱全類瘧者

柴胡 赤芍藥 各二匁半 當歸 二匁半 川芎 錄甘 各一匁 蒼朮 一匁七分 半夏 五分 右煎服

按寡婦寒熱往來似瘧或顏色時赤時青五心煩熱如勞瘵間與此湯而安此症尼僧並宮女多

溫膽湯 十五

治心虛膽怯觸事驚驚夜夢不祥異像致心驚氣欝生痰涎或短氣悸乏自汗飲食無味或傷寒之後虛煩不得眠臥

守陳皮 半夏 各二匁 茯苓 實 各一匁 甘草 五分

右入生姜棗煎服

治膽虛痰熱驚悸

不眠去茯苓加麥門冬四匁煎服

一方 治膽虛痰熱驚悸

右煎服 屬痰火而兼氣火補虛

虛ノ也治痰火而驚惕不ㇾ眠參伽酸炒門神沂泄門冬炒去心守實連茹各等分辰五分另丼三分右入ㇾ姜一片棗一枚㮈ケ煎調辰未而服附

加味溫膽湯

治病後虛煩不ㇾ得ㇾ睡臥及心瞤言虛怯觸事易驚短氣悸乏守三多半陳二多半茯實各一二分半夏一多半丼一分遠志玄參各一多

右入ㇾ姜棗煎服

按病後虛煩不ㇾ眠者選ㇾ先方得數首▲一人與ㇾ主君爲ㇾ論開ㇾ戸一年餘心熱煩滿痰火心攻腹脹嘔逆夜不ㇾ能寢他醫皆言陰虛火動而治不ㇾ應予謂氣欝生ㇾ痰而然加味溫膽湯加連而安▲婦人心驚煩悶不ㇾ眠溫膽湯加參門柴而安

分氣補心湯

治心氣虧結而四肢浮腫
上氣喘急
腹炒菝葜 茯苓 桔各一兩 薑 根 茸各五錢 蜜 各五分
右入姜棗煎服
▲咳甚而頭痛面目四肢浮腫腹脹加桑而安
分消湯
凡水腫者宜健脾去濕利小水十味等分而治中滿實脾飲
成鼓脹兼治脾虛發腫滿

飽悶
蒼朮 茯苓 陳朴 實各一錢 冬 菝葜 豬澤 腹各八分 砂七分 蜜三分 另
右入姜燈煎服
▲氣急加沉▲腫脹加蔔▲脇痛面黑是氣鼓去伽加童▲脇滿小腸脹痛身上有血絲縷是血鼓去伽芩加斤芍紅牡▲嗳氣作酸飽悶腹脹是食鼓去參芩加查曲▲惡寒手足厥冷瀉身體去清水是水脹加官▲腹

脇腹滿有塊如數者是痞
散成鼓去
曲守童近索鷩▲皆水腫
加減氣急去
發熱去泊加冊連▲泄瀉
去枳加芍
朮加通滑▲飲食停滯去
伽加查曲▲惡寒手足厥
冷脉沉細加官桂▲腰以上
腫加蘆▲腰以下腫去伽
加膝楯▲胸腹腫脹飽悶
去伽加葡萄
按水腫腹滿之主方也

以平胃和脾胃以四苓
通小水以實腹消腫脹
以泄砂除食後之飽悶
以蜜運氣若氣下脘加
升柴朝急屬氣虛加參
暮急屬血虛加連芎
宵朝暮急者氣血俱虛
宜双補之猶因加減有
數奇▲小兒面目周身
浮腫此方一二貼而如
故

朝寬暮急血虛暮寬朝急

氣虛朝暮急氣血俱虛治
膿脹大法宜補中行濕利
小便以參朮爲君蒼陳苓
爲臣芩丁門爲使以制肌
朮之火加利以澈腸膜氣不
運加蜜翁氣下陷加升柴
提之血虛加補血藥痰
盛加利痰藥隨證加減
膿之無不効者

參 伽谷二分 茯苓 陳
門 尺 各三
升 通 各九分 芩 六分 淡
分
右煎服

按經察要正傳等有論無
分辨一溪叟發開而去
其朮柴加斤著二分以
治脾胃虛感濕爲膿脹而
今世醫以是治腫脹而
不効矣愈能治之益有
肯哉虛人病後腫脹或
虛疟脚氣或產後腫脹
皆能有効逾夏一女產
後患腫脹且每脫痰支
喉驚醒衆士束手愚謂
血大下而血氣虛故此
湯三十餘貼而全愈

治年少ノ血熱遊生シ癰疥變ジ爲腫滿或ハ
赤豆炒ル 赤芍藥 川芎 當歸 桑各等分
右入レ麪煎食遠服▲熱甚ク加ル犀▲一方有澤瀉
按治血熱腫滿之主方也 癰世之小瘍多生手足至遍体太痒或癢故以熱湯洗之則變爲腫滿喘呼氣急煩悶小水赤澁或大府結燥加

則憑發四肢手腕並膝臏而腫塡宜此方若氣血虛而自利加附大便實加虎按此方善澈無名腫毒▲肩頸或手足凸腫其色赤皰雖經二三年而潰俗謂之氣腫汁不膿世俗謂之氣腫此湯主之 澈發膿膿腫血瘀之義

▲乳房中有如小石物而癥名乳核或作妳岩今有大驗▲一人患癭而此膿紀甚癢加童時癭寒熱往來與此湯而

安▲一人有助下有結核
押之則能自臟出背與脅
與此湯二劑即愈▲云婦人乳房腫
壽法即此方有數驗
痛太惡寒戰慄世俗謂
之疵風此方有數驗

治憂思太過諸氣瘀塞恒
松聲積脚氣風濕聚結腫
痛喘滿腹急或肩背腰脇
刺痛嘔吐不食胸膈脹滿
酢自噫浮腫四肢腫滿口苦
咽乾大便閉小便澁

腹陳芩姜羌若大便結
加枳共得効難勝計▲
產後遍身浮腫喘嗽氣
急小便澁少去翹加芎
腹陳芩姜七八貼而愈
▲或云癌後有此症

治風濕客於脾經氣血凝
滯以致面目虛浮四肢腫
滿心腹脹上氣促急

腹皮 芩皮 姜皮
五加 地骨 各等分

右煎服▲一方去五加地
骨用陳
按治風濕腫滿之方也
▲熱病後俄面目四肢
浮腫短氣喘促用七味
而頻愈

治無名惡瘡瘍或爛
斤芎藭 蜜 芎 芷 桂 參
蘇 芸 椒 朴 椒 芎
右煎服▲乳岩加童▲瘡
後餘毒氣流於陰陽脾經

陳一升 朴 童 蘇 葉
加 沉 椒 肥各八分 通 四 桂 膚 我
氣飲治腹中氣滯痞悶不
快胸膈走痛者蟲 加
多▲頭面腫加葱▲腫
腹腫加實▲臍至脚腫加
桑▲腫滿加丑▲厥逆有
蚯蚓本方加菖蒲葱

按治氣鬱腫滿初起也
水腫有積聚或水腫脹
滿二便不通或肩背腳
腳爲生痛或腹脹不食
喘急咳嗽而後爲水腫
二便共澁或脚氣有效
術或腸癖時作悶而
腹脹或氣逆上而耳聾
眩暈皆此方主之也他
家專積聚脹之▲氣滯
腰痛不可轉側脹之立
效

治氣鬱其症腹脇脹滿刺
痛不可忍脈沉
麥芽 枳殼 童朴 陳
皮 蒼朮各一錢 另炒砂仁各五
分 甘草三分
右入姜煎磨木香服
按治男婦因氣鬱而腸
痛腸塞氣下降不快也
若有胸痛者先可服此
湯有數奇效也

治中滿腹脹內有積塊如
石形如鱉大坐卧不安二

便澁滯上氣喘促通身腫

半夏七分 杏仁 瀉各五分 柴胡 黃芩 各二分 茯苓 澤瀉 各三分 桂枝 甘草 各一分

右入生薑煎服▲渴加瓜蔞根四分

按脈有積塊而生腫脹者矣殊此湯用熟脹而可也若冷脹當用大七氣湯

衆方規矩三終

升陽補氣湯

治飲食不時飢飽勞役胃氣不足脾氣下陷氣力不能寒熱早飯後轉增昏悶頻要眠睡怠惰四肢不快懶倦動作五心煩熱

半夏三分 升麻 羌活 各五分 柴胡 澤瀉 各一分 甘草七分半

右入生薑煎服▲腹脹及腹硬加砂仁二分

管狹倍用▲

按此方治食後頭痛煩有寒熱四肢怠惰氣不快欲嘔眠者是乃脾胃虛弱故也

五香湯

治毒氣入腹托裏若有異證於內加減

喬蜜沉乳各一兩 麝三分 右煎空心服 若嘔去麝加藿一兩 渴加參一兩 一方本方去喬加葛翹各一錢 小五香湯

附 五香連翹湯

治一切惡瘡結核瘰癧瘡瘍疽惡毒

漉二兩 翹 扇升 寄升無此生 搖通乳各分 三 青一木 各一分 麝一半 右煎瀉心服利下惡物爲度

附 加味五香湯 私方

治瘡癰無名腫毒專小兒

雞喬瀉升 脂之 梟蜜雞 葛翹各 通虎各五分 右煎服 小兒能包此湯

拂出熱湯而服之
按大人小兒瘡毒入腹則托裏之方也壽法加連童共一而常與小兒即盛脾胃止吐逆清心火治齲積遍瘡瘍痘疹

兼氣六方

桃仁兼氣湯　治療血小腹急痛大便不利小便自利或譫語呼故血結胸中手不近腹或寒熱昏迷其人如狂

肩炒一顆　要多五　共多二　桂多一　存入美煎五更服

三一兼氣湯　治消渴胃中有熱

鬼芒　朴實共

右煎服

調胃兼氣湯　治太陽陽明不悪寒反悪熱邪在中焦作滿大便秘譫語嘔噦

鬼六分半　芒二多　共一多

右上二味水煎入芒再煎一沸服

小兼氣湯　治六七日大

便不通潮熱譫語腹脹滿
悶而喘▲下痢赤黃內煩
喜欲飲冷水小便不利者
先用三一服湯濯而後調
治之
虎杖二朴各一
大黃各一
右煎服以利爲度
大棗氣湯 治胃實譫語
五六日不大便腹滿煩渴
舌乾口燥發熱脈沉
實
虎杖七 朴各一半
大黃各一 芒消半合
右先煎朴去粗內虎再
煎去粗納芒更煎二三沸
服以利爲度▲瘧疾寒熱
轉久者從卯至午發宜柴
胡湯從午至酉發者邪在
內宜大棗氣湯從酉至子
或至寅發者邪在血宜桃
仁棗氣湯下之微利後更
以小柴胡湯撤其邪可也
加味棗氣湯 治瘀血內
停胸腹脹痛或大便不通
虎杖 芒消各一 朴各二
大黃各五分
右酒水半煎服病急者不

腫

按兼氣之類可ㇾ腫壯盛人不ㇾ可ㇾ用ㇾ虛弱人若不辨虛實則誤多▲對症窺下風而與之則得卒斃

涼膈散

治表未解半入ㇾ裏下證未全憒憒不ㇾ眠三焦實火煩渴口舌生瘡譫妄便溺閉結發斑黑暗或治上焦熱甚陽明少陽之氣中血藥也

翹子 四分
芩 各二分
甘草 一分半
虎杖 五分

右水煎 或入竹葉生蜜煎食後服加姜亦可▲或作末服▲東垣加桔治諸般鬱熱退六一經實火▲肺金邪熱嗽痰加手▲咽喉腫痛涎唾加桔前▲咳而嘔加芎芩▲鼻衄嘔血加芎芩▲淋閉加滑苓▲風瘙加芎芸膏▲酒毒加葛連名清心湯用蜜竹葉同煎▲瘧疹加葛荊赤芍

芎芸桔▲陽毒發班加升
咳嗽加桑杏桔▲納胸心下滿加桔枳▲譫語發狂
踰墻赴井皆陽熱極盛加
連梢赤芍▲眼生翳瞖赤
澁流淚加菊戟芦▲本方
合四物湯名爻和散能益
血泄熱
按除積熱實火之劑▲
一婦譫言發狂晝夜不
眠不能坐因飲食與則
食不與則不食大便秘
脉細緊而數四物湯加

連四十餘貼而愈
治伏暑身体倦怠神昏頭
重吐利
蘇一多 參 陳 伽 苓
茂 朴 甘各半
右煎服▲暑風去芪加羌
一多▲脉虛弱加參玄門
半 冬
此之味名▲心煩加連柵
牲脉散 ▲胸腹加枳桔▲夾痰加
星守▲嘔吐加藿姜汁少
▲渴加葛瓜▲有擣加
羌

按伏暑退散之劑▲夏月休倦頭目昏重腹痛瀉下甚得數奇▲夏月煩熱頭身痛小水赤去參芪加連羌而安▲夏月身体四肢倦怠盡夜汚出如浴咽乾心煩加連瑞而安

治長夏濕熱蒸人四肢困倦精神短少懶于動作胸滿氣促肢節疼痛或氣高而喘身熱而煩心下膠閉小便赤而數大便溏而頻或痢或渴不思飲食自汗体重

黃蜜 蒼朮 各一參 柏 澤瀉 葛 各五分 陳 皮 各三分 甘 草 各九粒

右煎服▲汗多倍蜜▲悪心加梅蓮▲煩燥加茯苓▲小水短赤加通草▲胃脘不開飲食加砂蓮▲腰痛加仲杜多益砂蓮▲腿酸無力加膝仲

▲皮焦加茯苓▲虛汗加黃芪▲頭目瞀暈加預蘚辰▲口苦舌乾加丹梔葛

按清暑益氣之劑▲一女子十七八歲夏末羸瘦骨立四肢倦怠食少肌熱聲嘎嗜臥形如虛怯脉細緊而數他療効加錄連三十餘貼而爲全人▲一男半歲患頭瘡痛甚而晝夜不寢少中頭於枕則氣上於氣衝而欲絶故常不側臥倚築息捧兩手抱頭他治不効予六月初試脉細數無力加芍細本酸五六十貼而全愈又一男大膿頭破四形如鋺甚腫痛下血時六月中旬加泔桑杏柝得奇效其後再三發每發皆得治年老之人陰血枯槁發火氣結升而不降飲食不下者是乃成臌噫之病也

斤芍
蔞實 各七分
軽 連黙炒 沉香 各五分
右入姜棗水煎去滓調服
按老人痰支形瘦皮膚
燥痒無食味大便二三日
不行者血虚也此方
加減而專可服也若雖
幷手而有此證胸痛者
腦噎之先水也亦加減
而得寺効

治年少之人有患臟噎者
胃脘血燥不潤故便閉塞
而食不下
斤芍 芩 各一銭
實 陳 菽 各七分
砂 沉香 各五分
右入姜棗水煎去滓磨沉
香同服
按手少之臟證胸支痛
不食食則嘔噦而水飲
不入大便結是皆生於
陰血虚與此湯證有奇
殊老人亦可一人胸

痛痰嗽不レ食大便結故
與滾陰腎火湯不レ効是
以與此湯則能退レ痰除
虛熟得レ奇効▲一老僧
不レ食只羨湯茶而熟先
與香葛湯順和散大半
愈然未レ退故用此湯而
全安

凡夢枳實湯 九

治痰結咯吐不出脇膈作レ
痛不レ能レ轉レ側或痰結脇膈
滿悶作レ寒熟氣急並痰迷
心竅不レ能レ言咯喘者喘

動便有痰聲▲食積嗽者
痰嗽如レ膠咳嗽脇膈結痛
者痰結畢晨嗽者胃中食
積上半日嗽者胃中伏火
皆治之

蘘實 桔梗 貝母 各一兩 甘草 各五分 半夏 各一兩 枳實 六分 砂蜜 一斤

右入レ姜煎加レ瀝姜汁炒服
▲痰迷不レ語去レ蜜加レ薑▲
氣喘加桑軟▲痰結脇痛
久不レ治成レ腫去レ桔梗加
瞎童苗▲發熱加柴▲痰

火熨痤加門參輒
按治實症咳嗽痰喘之
效方也▲咳嗽胸脇引
痛加餘而安若誤而久
不治則成膿血而脇生
瘡也▲大抵手前咳痰
宜此湯午後嗽可用滋
陰降火湯

治陰氣在下陽氣在上咳
嗽嘔吐喘急

桑白皮一錢半 地骨皮一錢半 甘草五分 人參 陳

右入粳米二十粒煎服
按治虛症久嗽之方也
用滋陰降火湯而肺氣
弥虛則與此湯右奇効
▲婦人久嗽不已有咳
血而不食脉無力雖清
咳湯之證在肺門而肺無
火邪故用此湯而全愈
▲此症與凡羸弱實濕
則却爲吐血愼之

治咳而口乾煩熱胸膈不
利氣喘似促

桑一錢 兩錄雷陳柘各五
童 細辛 芩 甘絡二
右煎服
按大抵治喘嗽之劑也
▲感冒發熱退後咳痰
久不止不食尿赤無汗
得奇効▲久勞咳痰久
不止而後成龜胸龜背
聲嗄盜汗足冷大便結
脈細數與七十餘貽而
胸背如常喘止▲常患
喘之人因氣鬱發尿赤
脈浮數加糠杏枳芩而

安
潤燥湯
治大便開結不通
麥門冬 紅升麻 厚朴
甘草各五分 地骨皮
右煎調抹未五分食前服
▲一方去紅升加杏朴芩
▲發熱加柴胡煨倍斤半麥紅▲
血虛枯燥加蜜▲
風燥閉加麻仁
面閉加參▲痰火而閉加蔞
加桃蜜▲老人
澁倍斤半地加參

門都火用▲產婦去嬰
館斤芍一加參
按治秘結之主方也▲
欬熱之後大便不通此
湯立應若此湯不効則
三和散得數奇

五淋散

治肺氣不
道不通淋
汁或如沙石或冷淋如膏
或熱淋尿血皆効

赤芍 甘草 朴各五 赤苓各三
斤 甘各一
苓半

右水煎空心服▲一方有
虵澤通滑車▲膏淋加葡
氣淋加童▲勞淋加參▲
熱淋加連▲肉淋加翹▲
石淋加葶▲尿淋加車▲
死血淋加桃牡赤琥▲老
人氣虛作淋加參茂升少
按治諸淋之主藥也▲
久患淋病頃陰墜腫膿
出足常冷加虵膝梢力
牡翹去芍而安▲淋
痛膿出溫痛尿黃脉遲
去芍加虵通翹膝力灯

治心經蘊熱臟腑閉結小
便赤澁隆閉不通及熱淋
血淋如膏後慾慾而得者
則小便將出而痛既出而
癢以此藥主之

瞿麥 通草 灌
萹蓄 車前 甘

右入燈煎空心服▲治下
焦積熱二便閉澁多渴喘
乾口舌生瘡腫痛
按二便通利之主藥也
▲一人入熱湯則不通

治心中煩燥思慮憂愁掉
鬱小便赤濁或有沙漠夜
夢遺精遺瀝漏便赤或
酒色過度上盛下虛心火

遺冷水則能通身熱渴
脉沉實與此湯而安▲
產後六日患淋病胸脇
痛身熱嘔乾合四物湯
而得卒效一男夜必足
心熱小便澁頭中鳴加
赤芍斤甘草安

上炎肺金受邪故口苦咽
乾渴成消渇四肢倦怠躰
予五淋婦人赤白五心煩
熱此藥溫平清心養神秘
精大有奇効

蓮參各二錢蜜赤苓各
參分半
錄琴車各一錢半
門冬一錢半

右入灯心五根姜三片煎服▲
加酒濯各一▲發
上盛下虛加酒濯各一▲發
熱加柴苗各一分半▲一旉有
柴一半治熱在氣分咳乾
小便白濁夜間窈靜晝則
發熱又治口舌生瘡或口

苦咽乾燥作渇小便赤澁
或下淋不止或蓄中作痛
▲熱治心虛有熱而渇渇
之主劑也▲不因老壯氣弱
常有餘瘀服此湯久皆驗

治身体煩疼夜當遺尿柴
禁及小便頻數
伽預沂渇甚一錢各多
山藥酸炒各七分

右水煎溫服
附參耆湯

治氣盡遺尿失禁

參 陳皮 蜜炙 各一錢 伽羅各一錢 茯苓 澤瀉 各一錢五分 升麻 桂各五分 甘草三分

右入薑棗煎空心服▲年老之人氣虛寒遺瀝者加附子一枚治遺尿之主藥

按二方治遺尿之主藥也▲二十餘歲女子行止坐臥不知溺出殊窺數數麤粉脈細緊參看湯加附三十餘貼而愈

七 ▲ 去益升桂加消酸 各一錢 梅一箇 入薑煎

麥煎服治自汗之聖藥也

當歸六黃湯 十七

治盜汗屬陰虛者

片芩 黃柏 各一錢 生地 熟地 各一錢五分 甘草三分

右煎服

附 當歸地黃湯

治盜汗屬氣血兩虛者

片芩 生地 熟地 各一錢 茯苓 澤瀉 各一錢五分 甘草三分

伽羅 黃蜜各一錢 柏 麴 各一錢五分 參 陳各八分

右入棗煎服治盜汗之聖藥

也▲氣虛有汗宜服
醫王陰虛火動自汗盜
汗俱宜用六黃湯煞以
滋陰降火湯盜熱甚者
得奇驗▲斤半湯即仿
十全大補湯滋陰降火
湯等故氣血兩虛盜汗
甚以驗

清暈化痰湯 十八

治諸般眩暈

陳皮 半夏各一錢半 茯苓 甘草各一錢
枳實 竹茹各八分 黃芩 黃連各七分
細辛各六分 甘草三分

右入姜煎服 氣虛加术
參七分 ▲血虛倍芎加歸
有熱加連六分

半夏白术天麻湯 十九

治眩暈眼黑頭旋惡心煩
悶氣短促上喘無力以
心神顛倒目不敢開如在

風雲中痰頭痛身重如
山四肢厥冷不得安臥此
乃胃氣虛損傷麥而致也
陳守芽各七分半 仰各五分 茂蜜炙各一分
澤瀉各三分半 永炒二分 洎一分
右煎食前服
拔滯頭痛暈四肢厥
冷之方也▲腎虛而上
熱下冷常頭痛惡心嘔
吐心下痞滿與此湯而安

驅風觸痛湯

門冬各一多 沉半 羌活芸
糯各一分 芎各一多 甘草各一
八分 本五分 細辛各三
右入姜煎服▲一方去本加
菊▲左偏加柴胡各一多
瀉各七分▲右偏加芎一
▲正額上肩稜骨痛甚者
食積痰壅用之定分五分守查枳
各一多▲當頭痛加泥一本
五分▲風入腦髓而痛加薄
荷一把▲氣血兩虛有熱自
汗加芪一多 參仰各一多
拔滯頭痛之總訣也

治心下痛即胃脘痛多因氣鬱日久蘊積成熱而作痛也

川芎 二錢半 梔子 各七錢 一精 連 各七錢 陳皮 五分 炒 各三分 茸

右入姜煎服服後戒飲食大半日或加減一次亦可 按止心下痛之捷法也

治心或腹時痛時止面白唇紅者是胃中有蟲作痛

梅椒 梔實 各七錢 砂仁 鈴官 朴 各五錢

右入姜煎服 按治因蟲而心腹痛之方也

治左脇下痛肝積屬血或怒氣所傷或跌撲閃挫所致或爲痛

連 吳黃煎汁炒 二錢 柴胡 斤錢一半 童 各七分 芎 各一錢 梔子 各五分 紅花 各五分

右煎食遠服

拔治腰痛之主方也若
右脇下痛者肝邪入脈
故加姜黃桂陳皮生姜
治肩背痛不可回顧者此
手太陽經氣鬱而不行以
風藥散之肩痛項强腰似
折頭似拔此足太陽經不
通行
羌活 揺各一本 芸多
芎各五分 蔓三分
右煎服▲如身重腰沉沉
然經中有寒温加減五
方準

者附五分 重者川烏五分
拔治因氣鬱而痛背脊
痛之方也
治遍身骨節痛者是皆血
氣風濕痰火也
羌活 蒼朮各一 泽瀉各一
芎 冷 防 芩
芍 守 陳各七分 泽多半 蜜丸
右入姜煎服▲風痛加芸
濕痛加蒼▲熱痰痛加冷
蘘貫歷▲血虛痛加地▲
下痛加桂

膝▲痛甚加乳▲發熱加
柴▲小水短瀉加通
被治痛風之方也

治手足麻木或疼痛
沈 芎 各一 沸 各一
防 各八分 守 各七分
參 芍藥 各六分 滑石 各五分
芎藭 各四分 伽 柴胡 甘草 枝 三分

右入姜棗煎服
被治麻木之主方也
因濕燥而手足麻痛者

氣虛也宜用此湯若一輙
血虛▲一男上体麻痺舌
痺不知消味此方得效
術▲予冊七十餘歲咳
歎後舌痺不知飲食味
此湯三貼而愈

治濕熱鬱蒸於脾作五痺
右煎服▲穀疸加柴胡▲小水
砂曲 身熱加
短赤加桂▲大便實加虎
連 芍 冊 茵 猪
澤 蒼 童 游

▲胸膈飽悶加蔰萄參▲虛弱人酒人加蔓荊參

按治黃瘧之主方也

清火安神湯 十八

治驚悸怔忡心神慌亂一斤二分 生地酸炒各一多 連各八分 門一多 遠各七分 甘二分 洪 芩 連 冊 芍 冊

右入薑煎服

按治怔忡之主方也

清鬱豁痰湯 十九

治噯氣吞酸乃胃中有熱

膈上有痰令人嘔吐清水等症

陳 守 蒼 苓 連 冊 查 蜜 甘 滾 連 砂 曲

右入薑煎服

按治吞酸之主方也

消痞湯 二十

治中氣虛弱不能運化爲痞者飲食痰積不能旋化爲痞者濕熱太甚爲痞者 參 朮 芩 陳 守 朴 實 連 澤 連 砂

右入姜煎服
按治痞滿之主方也

加味犀角地黃湯 二

治上焦火盛口舌生瘡衄血熱或血熱妄行或吐血衄或下血及不啾血自來者

犀角 牡丹 各二 地黃 二 芍藥 一半 黃芩 各一 玄參 各一半 連翹 一半

右煎服 ▲如吐血成塊加虎杖一 ▲衄血加丹膠 ▲咯血加栝蔞仁 ▲嘔血加丹皮 栝蔞仁 半夏

下血加減 ▲吐血加天膠

按第一吐血之主方也 ▲衄血去犀玄加升側荊得奇效 ▲一婦人月水少來而止晝朝卒吐血加并瑞而安

泰艽羌活湯 二

治痔漏成�composition下垂不任其痒

羌活 二分 升麻 三分 本 柴胡 各五分 細辛 紅花 各七分

右煎服

治痔漏每日大便時發疼痛如無痔者非痔漏此藥主之

秦艽 防風 芎藭 當歸 各一兩 細辛 羌活 各一兩半 白芷 川烏 各一兩 獨活 一兩半 甘草 一兩 川芎 一兩半 生地黃 二兩 熟地黃 二兩 白朮 二兩 茯苓 二兩 人參 一兩半 桂心 一兩 附子 一枚 炮去皮臍 乾薑 一兩半 白薇 一兩半 細末 每服三錢 水一盞半 生薑五片 棗一枚 煎至八分 去滓 空心服之 避風寒

澤瀉 各六兩 白朮 五兩 虎掌 各三兩 柴胡 各三兩 升麻 各三兩 當歸 三兩 川芎 三兩 羌活 三兩 獨活 三兩 甘草 三兩 大黃 二兩 紅花 少許 細末 每服三錢 水一盞半 煎至八分 空心服 右煎空心服

附子 一枚 炮去皮臍 乾薑 一兩半 白薇 一兩半 細末 每服三錢 水一盞半 生薑五片 棗一枚 煎至八分 去滓 空心服 右煎空心服

連翹 一斤 伽羅 各一兩半 甘草 各一兩 丹參 各一兩 桔梗 各一兩 苦參 各半兩 烏藥 各半兩 澤瀉 各半兩 白朮 各半兩 當歸 各半兩 川芎 各半兩 羌活 各半兩 獨活 各半兩 防風 各半兩 細末 每服三錢 水一盞半 煎至八分 去滓 空心服

專治酒痔

葛根 半兩 甘草 半兩 杏仁 半兩 右每三錢 水一盞半 入黑豆 百粒 姜 五片 梅一箇 煎服

按治痔漏則宜選四方而用必有數効矣▲痔漏甚咽乾不食大便結脈弦數與芎芸湯而安▲飲潘之人痔突出而痛甚下血與乾葛湯得卒効

治下一切風熱中眼目而赤腫痛

沂芎 蒺藜 蒲黄 蝉蜕 連翹 共研 甘草 冊 青葙 決明 苦丁茶 荊芥 苦参 蔓荊子 菊花 桔梗 各一

右煎食後服▲痛不可忍加川烏一▲有翳障去芍加細辛 蒺藜 風熱肝火甚去菊加瀉柴▲大便實加虎杖

枚治瞼腫暴赤癢之故也

▲一明左眼胃大赤視黒白不分明此湯得卒効▲熱湯加虎斤黒豆生不瀉更加芒▲暴眼赤初発用升麻葛根湯加蟬與三貼如未退用敗毒散加虎尚不退却用五味湯漬洗下

治勞神腎虚血少眼痛▲久病胃脘着腎經真陰之微也如骨蒸不欲視物内

障見黑花瞳子散皆血少
勞神腎虛也
斤芍芎生地各一
柴胡參朮連芷曼菊
甘各半錢
右煎食後服
柴▲腎虛加梔霜風熟蒺
藜盛加芫荊▲風熱紅腫加
翹芩▲酒毒加連▲翳膜
加貝母
攻治眼久弔骨蹭之方也
通明利氣湯 三五
治虛火弔上攻氣鬱於耳
中或閉或鳴痰火熾盛憂
鬱痞滿咽喉不利煩躁不
寧
貝三錢 鹽消丹 芒硝各二
錢 薄荷 僵蠶 蟬退 桔
梗各一錢 甘草八分 蜜
炙甘草各五分
右入姜煎加滓服
撥氣開耳 聾之方也
通竅飲 三六
治鼻不聞香臭
細芷芫 羌活 防風 甘
桔 陳茶各一錢三分
右煎食後服

按此方因肺經有風熱而治之若面白肺虛用醫王加味清胃散

加味清胃散 三十七

柬治胃火血熱齒浮或痛或爛或牙齦潰爛作痛

麝蟲 升麻 牛蒡 荊芥等分

右煎頻頻噙漱齒齦浮動癰不可忍是胃中有濕熱

加味清涼散 三十八

按治牙齦痛之主方也

治一切實火咽喉腫痛

桔梗 甘草各一兩半 連翹 片芩 蚱蟬 甘各一兩

右入燈心細茶水煎服加山豆根一兩尤効▲咽喉乾燥加參門瑞▲咽喉發熱加薄荷▲咽喉腫痛加力彭▲咽喉生瘡加力彭▲極熟大便實去桔梗加虎▲虛火泛上咽喉腫痛不清者加桔梗雷

按治咽喉痛之主方也

治流注瘡疽發背傷折非此不能効至於救壞病活死肌再患於未萠之前拔於既愈之後此藥大能順氣血故也

寇真神傳妙劑

首烏不犯鉄 芎 歸 杜仲 熟地 遍 參 甘草 各半煎唉流注加右酒水各半煎唉病在上食後服病在下食前服 如有潮熱則種獨活散加升蘇加有寒邪未盡散加升麻和氣飲 四十

此而熟不退加芍 ▲頭痛加芎羌 ▲氣血盛者減芎 ▲熱鬱而成風痰加桔梗 ▲腦疽發背在上若或老人虛弱者並去翁 ▲如有瀉者不可用宜瀉止而後用之按治瘡疽之主藥也

升麻和氣飲

治瘡疹發於四肢痛痒不常甚至增寒壯熱下瘀血卒虛人宜服此

升 葛 芷 陳 橘

芎各一兩 厚朴 守根
芍 永 虎杖各九分 芍七分
右入姜燈草煎服
按治癰疽之方也

道滯湯 甲

治打撲損傷隨有瘀血爲
痛爲腫
芎 芩各二 柴胡 牡
各一 半 近一 桃十二 紀三分
右水煎服加酒蒸大黃一
兩 ▲治被人打死或踢
死各百會穴三壯立甦
按治跌傷之主方也

薺苨湯 解諸藥毒消蠱毒

薺苨 黑豆各一兩 甘草一分
右每七錢水二盞煎八分
溫服升麻湯 治桃生毒肋下忽腫
起而生癰狀須臾間
大如雞此即桃生毒也
升麻爲末取冷水調二
三錢遍服之若洩加
慈藪蓼根鬚其腫即消
宜煎平胃散調補兼進

白殭
解砒毒 此對於肉飯中
得之
則驚急飲凉水中得之難
治若腑作寒腹作痛則吐之若
參苓白朮散無益
巴豆毒 其證口渴臉赤
五心煩熱利不止 永燈趣妙
等分爲末每三錢凉水
調服又寒水石磨水服
豬毒 用澤蘭煎接汁

飲之
乾薑爲末白湯下
野葛毒 用其草不拘多
少以
麻油一盞煎數沸冷服
河豚鮫毒 倉卒無藥急
以清
油多灌之使毒物盡吐
此爲愈或以白礬爲末
調灑服
柊右方雖未試而備急
卒之捷覺者乎

凡胎前一切諸病宜加減
而用
蘇 沂 芎 藭 滑 陳
腹 滓 芽
右入生姜煎服▲一方加
參 氣 虛者亦可▲雖 娠 胎
氣不和煖上心腹脹痛加
蜜▲嘔吐不止是惡阻也
加芩 仲守砂 罐曲 喬▲胎
漏下血加芎 井仲文砂艾
糯米▲如胎漏下血心腹
服痛者先以芎歸 各五錢
煎入童便一服立止▲胎

氣不調常慣小產預服此
以固胎元加芎 井文砂寄
仲糯米▲因事胎動不安
及下血欲墮者加芎 參 仲
芩文 井砂▲咳嗽吐痰加
来杏貝▲泄瀉加术芩▲
瘧加棗 果青皮 守芩 葛▲
胎痛加井索文▲雖七八
箇月前後俱可浮 膚加芎
芩 澤术芩 芩 甲門 朴 吟 際
不省人事言語錯亂加蜂
守芩門遠 苡 蘇▲心痛加
索乳▲腰痛不可忍加 紙

茴仲▲白濁帶加半夏
苓精蠣龍骨▲小便淋瀝
不通加翁車滑▲大便閉
澁加牛蛭連根▲雉至九節
月加根文仰砂名達生散
▲臨產驚怒氣結連日不
下加根▲孕後覺氣不舒
或腹微癢或腰作痛或飲
食不美或胎動下血及五
六箇月內嘔服數劑甚妙
加半下文仰砂參丹
按胎前諸病大抵除禁
忌藥則宜隨諸症施治

療也必不拘于此二味者
諸方皆然也

催生九方

催生湯　候產母腹痛腰
痛見胞漿水下方服
嬰萩　牡丹　官桂　一
右水煎熱服
催生飲　下胎催生立應
斤芎　腹皮　枳殼等分
右水煎溫服
催生散　滋難產並胞衣
不下
炒黑百草霜　滑石等分

右爲末煎芍歸湯下二三
劑一方加芎藭半兩
芍歸湯　治產難生胞衣不下及子死腹中惡露
不止腹中血刺疼痛一切
腑前產後危急口噤垂死
等證　チノ三千ヒムムクリナリ
沂一勝　芎七
分　四貼　每貼服水一盞
煎水將乾投酒一盞半煎
五七沸溫服如口噤僻開
灌之人行五里許再灌盡
四貼後皆立產神驗脫衣

散　治胞衣不下
滑各四　勝　通各三　分　二
近二　加枳三
右煎服
一方去枳加瞿三　胎衣不
出腹
腑堅脹急痛即殺人服
此胞即爛下死胎
立効湯　治胞衣不出
勝八　分　一
右水煎東井叟常加滑分
等
生神散　治產前後氣沉

眩暈

蒲炒大 參中三錢 芎小一錢分

一名參分

右爲末白湯下

生氣散 治產後氣逆上

百草霜一味些少白湯

下攻催生立効等湯宜

放銘又芎歸生神生氣

等湯宜續銘是當流之

只授心傳也

產後補虛用參朮芪陳近

芎芩如癸熟輕則加琴淡

滲之其熱自除重則加永

又云新產不可用芍以其

酸寒伐發生之氣十之一日內只

以芪易芍如腹痛者用芍

炒而不妨

接新產補虛之聖藥也

新產後惡寒發熱眼暗

不知人事汗如浴麻滑

加永而煎與生神散則

漸隨服而愈

治產後諸疾宜加減而服

之

沂芎 渋 洋多 伽

芩 陳 侯 朴 炒
右入生姜棗水煎温服 ▲産後昏憒不語加菖蒲一錢能行痰止鳴呼 ▲産後昏憒不語加菖蒲一錢能行痰止鳴呼苦喘乾加蜜炙 ▲發熱不止加永炒 ▲生腸不止加茜參 ▲咳嗽加會杏 ▲兩脇痛加童桂 ▲吐痰加守貝 ▲嘔吐不止加砂守去半 ▲盜汗自汗加茜酸炒 ▲泄瀉不止加永炒去朴 ▲瘀血加童便和酒服 ▲小産後心腹痛去佾參 ▲胸膈脹悶加砂實查朴 ▲惡露不行加白牡丹 ▲入童便和酒芩一加索牡蠣紅童蘭 ▲驚悸怔忡加遠門酸棗仁 ▲接産後諸疾先爲加減消息而可用之若不驗則可考諸方矣

會牡去佾 ▲去血過多頭暈暗加荊參炒 ▲胸膈脹悶加砂實查朴 ▲惡露不行加白牡丹 ▲入童便和酒服 ▲小産後心腹痛去佾芩一加索牡蠣紅童蘭 ▲驚悸怔忡加遠門酸棗仁 ▲接産後諸疾先爲加減消息而可用之若不驗則可考諸方矣

治小兒癖疾發熱口乾尿赤

參　朮　苓　冬　守　柴
門　穀　猪　澤　胡　連
右姜棗煎服則立効
如癖病日久元氣虧損此
方不効宜多服醫王養正
積自除
按小兒癖積之主方也

消食散　四丸

治小兒傷食腹痛或服藥
或宿食不消面色黃目無
精此藥能調和胃氣乳哺
消化

查　麴　砂　芽
伽　陳　青　皮
右入姜煎服▲受寒作痛
加藿梗各一▲有熱加芩
按兒傷食之主方也

鎮驚散　四丸

治驚風搐搦痰嗽喘熱
星　芩　蟬　苛　芎
右入姜煎服
按急慢驚之主方也初發
時予與九文加定蚕錄
而取驗多

醒脾散　五十

治小兒吐瀉不止作慢驚
風脾困昏沈默默不食
參 伽 苓 蜜 全蝎
定 喬 白附 耳
右姜棗煎服
按慢驚之主方也

消痰飲 五十一

治小兒痰疾身熱面黃肌
大青筋瘦弱
參 伽 苓 胡連 曲
連 青 陳 砂 甘
右水煎服 ▲傷食加査▲
有蟲加使

按諸痓通治之方也

養老 五十二

刑溪之母年踰七旬素多
痰飲大府燥緒小水短少
故制一方
參 伽 君臣 膝 瓜蔞 陳 苓
佐
春加芍夏加會苓門冬加
歸身
倍生姜一甩或二一點或二一
貼進此藥則小水長如
是卻病捷法也
按三之文年八能二健

不レ遍以醫王煎與六味丸而安（詳二于醫下一）爾以來與此湯至今無病是乃
醫方數百千萬愚處依短才而有切方斷採撰一百二十以爲衆方規矩蓋診脉察證則先與此一方而後考諸書施治宜救沉痾矣

元祿三庚午年七月吉旦

江戸日本橋万丁

万屋清兵衛梓